

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ
DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN KOLLEGİYASI**

Q Ə R A R № 150111500016

Bakı şəhəri

“14” dekabr 2015-ci il

Dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 noyabr 1998-ci il tarixli 26 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartların, normaların, qaydaların və tövsiyələrin Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması və tətbiq edilməsi Qaydaları”nın 2, 3, 6 və 7-ci bəndlərini və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 31 avqust tarixli 155 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnamənin 8.12 və 8.45-cibəndlərini rəhbər tutaraq **qərara alınır**

1. Beynəlxalq, Avropa və Rusiya Federasiyasının milli standartları əsasında hazırlanmış aşağıdakı dövlət standartları təsdiq edilsin.

1.1. AZS 810-2015 (CODEX STAN 310-2013) “Nar” (1 nömrəli əlavə).

1.2. AZS 837-2015 (CODEX STAN 152-1985) “Buğda unu”(2 nömrəli əlavə).

1.3. AZS 838-2015 (CODEX STAN 33-1981) “Zeytun yağları və cecəldən sıxılmış zeytun yağları” (3 nömrəli əlavə).

1.4. AZS 839-2015 (CODEX STAN 87-1981) “Şokolad və şokolad məhsulları” (4 nömrəli əlavə).

1.5. AZS 840-2015 (CODEX STAN 279-1981) “Kərə yağı” (5 nömrəli əlavə).

1.6. AZS 841-2015 (CAC/MRL-2-2015) “Yeyinti məhsullarında baytarlıq preparatlarının qalıqlarına dair yol verilən maksimum konsentrasiyalar (YKM) və risklərin idarəedilməsi üzrə tövsiyyələr” (6 nömrəli əlavə).

1.7. AZS 842-2015 (CAC/RCP1-2015) “Qida gigiyenasının ümumi prinsipləri-tövsiyyə edilən beynəlxalq təcrübə kodeksi” (7 nömrəli əlavə).

1.8. AZS 843-2015 (ГОСТ Р 51074-2003) “Qida məhsulları. İstehlakçı üçün məlumat. Ümumi tələblər” (8 nömrəli əlavə).

1.9. AZS 856-2015 (ГОСТ Р 51204-98) “Dəmir yolunun kontakt şəbəkəsi üçün çubuqlu polimer izolyatorlar. Ümumi texniki şərtlər” (9 nömrəli əlavə).

1.10. AZS 860-2015 (ГОСТ Р 51377-99) “Məişət qızdırıcı qaz konvektorları təhlükəsizlik tələbləri və sınaq üsulları” (10 nömrəli əlavə).

2. Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsinə (E.Cəbrayilov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş dövlət standartının Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gündən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.

3. Texniki tənzimləmə və standartlaşdırma şöbəsinə (N. Tağıyev) tapşırılsın ki, bu Qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş dövlət standartının qeydiyyatına alınmasını təmin etsin.

4. Azərbaycan Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutuna (X.Məmmədov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş dövlət standartının texniki tənzimləmə və standartlaşdırma üzrə texniki normativ hüquqi aktların dövlət fonduna daxil edilməsini təmin etsin.

5. Ümumi şöbəyə (X.Həsənovaya) tapşırılsın ki, aidiyyəti struktur bölmələrini bu Qərarla tanış etsin.

6. Bu Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

**Kollegiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri**

Ramiz Həsənov

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsinin 14 dekabr 2015-ci il
tarixli 150111500016 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

DÖVLƏT STANDARTI

–

**YEYİNTİ MƏHSULLARINDA BAYTARLIQ
PREPARATLARI QALIQLARINA
DAİR YOL VERİLƏN MAKSİMUM
KONSENTRASIYALAR (YMK) VƏ
RİSKLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ ÜZRƏ
TÖVSIYYƏLƏR**

**AZS 841-2015
(CAC/MRL 2-2015)**

–

MÜQƏDDİMƏ

1. “Qida məhsullarının standartlaşdırılması üzrə” Texniki Komitə (TK 07) tərəfindən hazırlanıb və təqdim edilib. Kodeks Alimentarius Milli Komitəsi tərəfindən dövlət standartı kimi qəbul edilməsi məqsədamüvafiq hesab edilmişdir.

2. Bu standart CAC/MRL 2-2015 “Maximum Residue Limits for Veterinary Drugs in Food” beynəlxalq standartının autentik tərcüməsidir.

2. İlk dəfə tətbiq edilir.

3. Dövlət standartında müəyyən edilən tələblərin beynəlxalq standartlara, norma, qayda və tövsiyələrə və digər dövlətlərin müvafiq mütərəqqi milli standartlarına, elm, texnika və texnologiyanın müasir nailiyyətlərinə əsaslanmasını müəyyən etmək üçün standartın ilkin yoxlama müddəti 2020-ci il, dövrü yoxlama müddəti 5 ildir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

—
**Yeyinti məhsullarında baytarlıq preparatları
qalıqlarına dair yol verilən maksimum konsentrasiyalar
(YMK) və risklərin idarəedilməsi üzrə tövsiyyələr**

**AZS 841-2015
(CAC/MRL 2-2015)**

**Maximum Residue Limits (MRLs) and risk management
recommendations for residues of Veterinary Drugs in Foods**

1. TERMİN VƏ TƏRİFLƏR:

Bu standartda istifadə edilən terminlər aşağıdakılardır:

Baytarlıq preparatları - yeyinti məhsullarının alınması məqsədi ilə ətlik və südlük mal-qara, ev quşu, balıq və ya arılar kimi istənilən heyvanların profilaktiki, terapeutik, diaqnostik məqsədlərlə və ya fizioloji funksiyaların, davranışın dəyişdirilməsi üçün tətbiq edilən və ya yazılan hər hansı maddələr.

Yol verilən gündəlik doza (YGD) — sağlamlığa zərər vurmada gün ərzində qəbul edilməsinə icazə verilən və bədən çəkisi nisbəti ilə ifadə edilən (insanın orta bədən çəkisi-60 kq) baytarlıq preparatının miqdarı.

Piy — əsas hissəsi lipidlərdən ibarət olan və heyvanın skeletindən və ya onun hissəsindən ayrıla bilən toxuma. Bu anlayışa dərialtı, piy vəziləri və paranefral piylər aid edilir. İnterstitial, əzələdaxili və süd piyləri aid edilmir.

Qalıqların yol verilən maksimum konsentrasiyası (YMK) termini obyektin bütün hissələrinə tətbiq edilir. Piydə həll olunan birləşmələrin müəyyən edilməsi üçün yalnız piy analiz edilir və ona YMK qalıqları anlayışı tətbiq edilir. Ayrıla bilən piyin əsas göstərici olmadığı birləşmələr üçün tam obyekt analiz edilir (piy və əzələ, amma sümük yox), qalıqların YMK anlayışının bütün obyektə tətbiq edilir (məsələn, ev dovşanı əti).

Marker qalıǵı — toxuma, digər heyvan toxumalarında, yumurta və süd qalıqlarının ümumi səviyyəsi ilə müəyyən nisbətdə konsentrasiyası azalan qalıq. Qalığın konsentrasiyasının ölçülməsi üçün müvafiq dəqiqliyə malik kəmiyyətin (miqdarı) analitik metodunun olması lazımdır.

Süd — maye şəklində istehlak üçün və ya sonrakı emal üçün nəzərdə tutulmuş kənar maddələr əlavə edilmədən və ya ekstraksiya edilmədən bir və ya bir neçə sağımdan əldə edilmiş məməli heyvanların süd vəzilərinin sekreti.

Qalıqların yol verilən maksimum konsentrasiyası (YMK) termini obyektin ümumi çəkisində nisbət şəklində ifadə edilən süddə piyin həll olunan maddələrin qalıqlarının YMK-sına aid edilir.

Əzələ — heyvanın skeletinə birləşmiş və ya skeletdən ayrılmış, interstitial və ya əzələdaxili piyləri daxil edən toxuma. Əzələ toxumasına sümüyü birləşdirici toxuma, bağlar, habelə təbii münasibətlərdə sinir lifləri və limfa düyünləri də daxil oluna bilər. Əzələ toxumasına qidaya yararlı daxili orqanlar və ya ayrılabilən piy daxil deyil. *Qalıqların yol verilən maksimum konsentrasiyası (YMK)* termini (sümük istisna olmaqla) bütün obyektdə tətbiq edilir.

Quş — toyuq, hind toyuğu, ördək, qaz, firəng toyuğu və göyərçin də daxil olmaqla istənilən ev quşu.

Baytarlıq preparatlarının qalıqları — heyvan mənşəli məhsulun istənilən yeməli hissəsində baytarlıq preparatının ilkin birləşmələrinin və/və ya onların metabolitlərinin və habelə onların qatqılarının qalıqları.

Gözləmə müddəti, xaric olma müddəti — bu preparat qalıqlarının YMK həddini aşmaması üçün preparatın son qəbul etmə tarixi ilə preparatı qəbul edən heyvanın toxumasının nümunəsi və ya məhsulunun alındığı tarix arasında fərq.

Baytarlıq preparatları qalıqlarının yol verilən maksimum konsentrasiyası (YMK) — bu, yeyinti məhsullarında və ya onların üzərində baytarlıq preparatları qalıqlarının hüquqi icazə verilən və ya yol verilən maksimum (təzə məhsulun çəkisinin mq/kq və ya µq/kq kimi ifadə edilən) konsentrasiyasıdır.

Bu göstərici insan sağlamlığı üçün heç bir toksikoloji təhlükə törətməyən və hesablanması üçün əlavə təhlükəsizlik əmsali tələb edilən müvəqqəti YGD şəklində ifadə edilən qalıq növü və ya miqdarına əsaslanır. Bu həmçinin əhalinin sağlamlığı üçün digər aktual riskləri və yeyinti məhsullarının istehsalının texnoloji aspektlərini də nəzərə alır.

YMK-nin müəyyən edilməsi üçün bitki mənşəli yeyinti məhsullarında və ya ətraf mühitdə olan qalıqlar nəzərə alınır. Bununla yanaşı YMK müasir analitik metodlarla müəyyənətmə səviyyəsində azaldıla və baytarlıq preparatlarının səmərəli tətbiqinə uyğunlaşdırıla bilər.

Balıq — suda yaşayan hər hansı soyuqqanlı onurğalı və bu cür hesab edilən heyvan. Bu qrupa balıqlar, köpəkbalığına bənzərlər və dəyirmiağızlılar daxildir. Su məməliləri, onurğasızlar və amfibiylər bu anlayışa aid deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, bu termin bir sıra onurğasızlara, o cümlədən molyusklara da aid ola bilər.

Yumurta — diş quşun, xüsusən də ev quşunun törətdiyi sferik cismin təzə qidaya yararlı hissəsi.

Qalıqların yol verilən maksimum konsentrasiyası (YMK) termini qabıq kənarlaşdırıldıqdan sonra yumurtanın ağını və sarısını daxil edən obyektin yeməli hissəsinə tətbiq edilir.

2. YEYİNTİ MƏHSULLARINDA BAYTARLIQ PREPARATLARININ YOL VERİLƏN MAKSİMUM KONSENTRASIYASI (YMK)

Abamektin (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 45-ci iclas (1995-ci il); 47-ci iclas (1996-cı il) Yol verilən gündəlik doza: abamektinin və onun (Z)-8,9 izomerinin cəmi üçün 0-2 µg/kq bədənçəkisinə (1997) JMPR tərəfindən 1997-ci ildə müəyyən edilmişdir. Marker qalığı: Avermektin B1a				
Abamektin üçün yol verilən maksimum konsentrasiyalar				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlumalqara	Qaraciyər	100 µg/kq	26-cı sessiya (2003)	
İri buynuzlumalqara	Böyrək	50 µg/kq	26-cı sessiya (2003)	
İri buynuzlumalqara	Piy	100 µg/kq	26-cı sessiya (2003)	

Avilamisin (mikrob əleyhinə antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 70-ci iclas (2008-ci il) Yol verilən gündəlik doza: sutka ərzində bədən çəkisinin
--

fəallığı/kq bədən çəkisinə NOAEL əsasən 150
mq avilamisin və təhlükəsizlik faktoru 100 olan və bir vacib
ədədə qəderyuvarlaqlaşdırılmaqla aparılan müşahidə olunmayan zərərli təsirin
həddinə əsasən - 0-2 mq/kqbədən çəkisinə (70th JECFA, 2008).

Marker qalığı: Dixlorizoevernin turşusu (DIA).

Avilamisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Donuz	Əzələ	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Donuz	Qaraciyər	300 µg/kq	32-ci sesiya (2009- cu il)	
Donuz	Böyrək	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Donuz	Piy/dəri	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Toyuq	Əzələ	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Toyuq	Qaraciyər	300 µg/kq	32-ci sesiya (2009- cu il)	
Toyuq	Böyrək	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Toyuq	Piy/dəri	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Hinduşqa	Əzələ	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Hinduşqa	Qaraciyər	300 µg/kq	32-ci sesiya (2009- cu il)	
Hinduşqa	Böyrək	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Hinduşqa	Piy/dəri	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009- cu il)	
Ev dovşanı (krolik)	Əzələ	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Ev dovşanı (krolik)	Qaraciyər	300 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	
Ev dovşanı	Böyrək	200 µg/kq	32-ci sesiya	

(krolik)			(2009-cu il)	
Ev dovşanı (krolik)	Piy/dəri	200 µg/kq	32-ci sesiya (2009-cu il)	

Azaperon (sakitləşdirici maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 38-ci iclas (1991-ci il); 43-cü iclas (1994-cı il); 50-ci iclas (1998-ci il); 52-ci iclas (1999-cu il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-6 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998).

Marker qalığı : Azaperonun və azaperolun cəmi.

Azaperon üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Donuz	Əzələ	60 µg/kq	23-cü sesiya (1999 il)	
Donuz	Qaraciyər	100 µg/kq	23-cü sesiya (1999 il)	
Donuz	Böyrək	100 µg/kq	23-cü sesiya (1999 il)	
Donuz	Piy	60 µg/kq	23-cü sesiya (1999 il)	

Albendazol (antihelmint maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 34-cü iclas (1989-cu il);

Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (34th JECFA, 1989).

Marker qalığı: Süd istisna olmaqla bütün məhsullarda 2-aminosulfon metaboliti. Süddə müəyyən olunmamışdır

Albendazol üçün yol verilən maksimum konsentrasiyalar

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Bütün növ ev heyvanları	Əzələ	100 µg/kq	20-ci sesiya (1993 il)	
Bütün növ ev heyvanları	Qaraciyər	5000 µg/kq	20-ci sesiya (1993 il)	
Bütün növ ev heyvanları	Böyrəklər	5000 µg/kq	20-ci sesiya (1993 il)	
Bütün növ ev heyvanları	Piy	100 mg/kq	20-ci sesiya (1993 il)	
Bütün növ ev heyvanları	Süd	100 µg/l	20-ci sesiya (1993 il)	

Amoksisillin (mikrob əleyhinə antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 75-ci iclas (2011-ci il);

Yol verilən gündəlik doza: mikrobioloji effektlər əsasında 0-0.07 µg/kq bədən çəkisinə (75th JECFA, 2011).

Qida yükünün qiymətləndirməsi: 75th JECFA (2001) son nöqtələrdə verilənlərin sayının az olması ilə əlaqədar amoksisillin üçün EDI hesablanmışdır. Rasion modelinə görə gündə 300 q əzələ, 100 q ciyər, 50 q piy və 1.5 litr süd nəzəri gündəlik doza istifadə etməklə YGD-nin son həddinin 74%-ni təşkil etməklə 31 µg/şəxsə tövsiyyə edilmişdir.

Marker qalığı: Amoksisillin

Amoksisillin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	4 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Qoyun	Əzələ	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Qoyun	Qaraciyər	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Qoyun	Böyrək	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Qoyun	Piy	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Qoyun	Süd	4 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Donuz_	Əzələ	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Donuz	Qaraciyər	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Donuz	Böyrək	50 µg/kq	35-ci sessiya (2012 il)	
Donuz	Piy/dəri	50 µg/kq	35-ci sessiya	

Benzilpenisillin/Prokain benzilpenisillin (antibiotik maddə)**JECFA qiymətləndirməsi: 36-cı iclas (1990-cu il); 50-ci iclas (1998-ci il)**

Yol verilən gündəlik doza: 30 mg-penisillin/şəxs/gün (50th JECFA, 1998). Benzilpenisillin və prokain benzilpenisillin qalıqları bu səviyyədən aşağı olmalıdır.

Marker qalığı: Benzilpenisillin.**Benzilpenisillin/Prokain benzilpenisillin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya**

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	4 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	
Toyuq	Əzələ	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	Yalnız prokain benzilpenisillin üçüntətbiq edilir
Toyuq	Qaraciyər	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	Yalnız prokain benzilpenisillin üçüntətbiq edilir
Toyuq	Böyrək	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	Yalnız prokain benzilpenisillin üçüntətbiq edilir
Donuz	Əzələ	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	
Donuz	Qaraciyər	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	
Donuz	Böyrək	50 µg/kq	23-cü sessiya (1999 il)	

Gentamisin (mikrob əleyihinə antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 43-cü iclas (1994-cu il); 48-ci iclas (1997 il); 50-ci iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-20 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998). Marker qalığı: Gentamisin				
Gentamisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	2000 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	5000 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	200 µg/l	24-cü sessiya (2001 il)	
Donuz	Əzələ	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Donuz	Qaraciyər	2000 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Donuz	Böyrək	5000 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Donuz	Piy	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	

Danofloksasin (mikrob əleyihinə antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 48-ci iclas (1997-ci il); Yol verilən gündəlik doza: 0-20 µg/kq bədən çəkisinə(48th JECFA, 1997). Marker qalığı: Danofloksasin.				
Danofloksasin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	200 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	

İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	400 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	400 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Toyuq	Əzələ	200 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Toyuq	Qaraciyər	400 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Toyuq	Böyrək	400 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Toyuq	Piy	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	Piy/dəri normalmütənasiblikdə.
Donuz	Əzələ	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Donuz	Qaraciyər	50 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Donuz	Böyrək	200 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	
Donuz	Piy	100 µg/kq	24-cü sessiya (2001 il)	

Deksametazon (qlükokortikosteroid)

JECFA qiymətləndirməsi: 70-ci iclas (2008-ci il);

Yol verilən gündəlik doza: 0-0.015 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1995).

Marker qalığı: Deksametazon.

Deksametazon üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
-----	--------	-----	-------------------	------

İri buynuzlu mal qara	Əzələ	1,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	2,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	1,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	0,3 µg/l	32-ci sessiya (2009 il)	
Donuz	Əzələ ər	1,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
Donuz	Qaraciy	2,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
Donuz	Böyrək	1,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
At	Əzələ	1,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
At	Qaraciyər	2,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	
At	Böyrək	1,0 µg/kq	32-ci sessiya (2009 il)	

Deltametrin (insektisid)

JECFA qiymətləndirməsi: 52-ci sessiya (1999-cu il); 60-cı sessiya (2003 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-10 µg/kq bədən çəkisinə (1982). 1982-ci ildə JMPR tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Marker qalığı: Deltametrin.

Deltametrin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	30 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	50 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	50 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	500 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	30 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Toyuq	Əzələ	30 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	

Toyuq	Qaraciyər	50 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Toyuq	Böyrək	50 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Toyuq	Piy	500 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Toyuq	Yumurta	30 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Qızılbalıq	Əzələ	30 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Qoyun	Əzələ	30 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Qoyun	Qaraciyər	50 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Qoyun	Böyrək	50 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
Qoyun	Piy	5000 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	

DERKVANTEL (antigelmint vasitə)

JECFA qiymətləndirməsi 75-ci iclas (2011-ci il); 78-ci iclas (2013-cü il);

Gündəlik yol verilən tələbat: LOAEL əsaslı (görünən xoşagəlməz təzahürlərin inkişafına səbəb olan vasitənin minimal dozası) 0-0,3 mq/kq bədən çəkisi, antoqanik aktivliyin nikatin xolinoreseptlərə nisbətini göstərən itlərdə kəskin pozuntuların klinik müşahidələri üçün sutkada 0,1 mq/kq bədən çəkisi. LOAEL-ə 300 ehtiyat əmsalı tətbiq olunmuşdur (OKƏΠΔ –nin 75-ci iclası, 2011-ci il)

Hesabi alimentar ekspozisiya: PAƏ-nin hesablanması üçün göstəricilər kifayət qədər deyildir, buna görə də nəzəri maksimal sutkalıq tələbatın təyin edilməsi metodundan istifadə edilmişdir (TMCΠ). Rasion modelindən istifadə etməklə hesablanmış və MT:TR-MΔY yanaşması 6,8 mq/adam hesabi alimentar ekspozisiyaya uyğun gəlir ki, bu da təxminən ΔCΠ-nin maksimal göstəricisinin 38%-nə uyğun gəlir (OKƏΠΔ –nin 78-ci iclası, 2013-ci il)

Qalıq maddələr: Derkvantel

DERKVANTEL üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
qoyun	Əzələ	0,3 µg/kq	38-ci iclas (2015-ci il)	
qoyun	Qaraciyər	0,8 µg/kq	38-ci iclas (2015-ci il)	
qoyun	Böyrək	0,4 µg/kq	38-ci iclas (2015-ci il)	

qoyun	piy	7,0 µg/kq	38-ci iclas (2015-ci il)	
-------	-----	-----------	-----------------------------	--

Dihidrostreptomisin/Streptomisin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi 43-ci iclas (1994-ci il); 48-ci iclas (1997 il); 52 iclas (1999 il) ; 58 iclas (2002 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (48th JECFA, 1997).

YGDdiqidrostreptomisin və streptomisin qalıqlarının cəmi üçün.

Marker qalığı: Dihidrostreptomisinin və streptomisinin cəmi.

Dihidrostreptomisin/Streptomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	1000 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Toyuq	Əzələ	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Toyuq	Qaraciyər	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Toyuq	Böyrək	1000 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Toyuq	Piy	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Donuz	Əzələ	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Donuz	Qaraciyər	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Donuz	Böyrək	1000 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Donuz	Piy	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Qoyun	Əzələ	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	

Qoyun	Qaraciyər	200 µg/l	24 sessiya (2001 il)	
Qoyun	Böyrək	1000 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Qoyun	Piy	600 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Qoyun	Süd	600 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	

Diklazuril (antiprotozooy maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 45-ci iclas (1995 il); 50-ci iclas (1998 il);

Yol verilən gündəlik doza 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998).

Marker qalığı: Diklazuril

Diklazuril üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Ev quşu	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Ev quşu	Qaraciyər	3000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Ev quşu	Böyrək	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Ev quşu	Piy/dəri	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Ev dovşanı (krolik)	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Ev dovşanı (krolik)	Qaraciyər	3000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Ev dovşanı (krolik)	Böyrək	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Ev dovşanı (krolik)	Piy	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Qaraciyər	3000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Böyrək	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Piy	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Diminazen (tirpanosid vasitəsi)

JECFA qiymətləndirməsi 34 iclas (1989 il); 42-ci iclas (1994 il);

Yol verilən gündəlik doza: 0-100 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1994).

Marker qalığı: Diminazen.

Diminazen üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	500 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	12000 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	6000 µg/l	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	150 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	Analitik üsulun hesablama həddində.

Disiklanil (insektisid)

Yol verilən gündəlik doza: 0-7 mg/kg bədən çəkisinə (54th JECFA, 2000).

Marker qalığı: Disiklanil.

Disiklanil üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>Qoyun</u>	Əzələ	150 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
<u>Qoyun</u>	Qaraciyər	125 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
<u>Qoyun</u>	Böyrək	125 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
<u>Qoyun</u>	Piy	200 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	

Doramektin (antihelmint maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 45-ci iclas (1995-ci il); 52-ci iclas (1999-cü il); 58-ci iclas; 62-ci iclas (2004 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-1 µg/kq bədən çəkisinə (58th JECFA, 2002).

Marker qalığı: Doramektin.

Doramektin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	Tövsiyə olunan dozada preparatın dərialtı və ya əzələdaxili yeridilməsindən sonra 35 gün ərzində inyeksiya yerində qalıqların yüksək konsentrasiyası müşahidə olunur.
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	30 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	150 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	Tövsiyə olunan dozada preparatın dərialtı və ya əzələdaxili yeridilməsindən sonra 35 gün ərzində inyeksiya yerində qalıqların yüksək konsentrasiyası müşahidə olunur.
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	15 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	Südlük inəklərdə doramektinin yeridilmə yeri və/və ya təyin etmə vaxtından asılı olaraq preparatın südlə xaric olma müddətinin uzadılmasına gətirib çıxara bilər. Normativ sənədlərdə bu məqam nəzərə alınmalıdır.
<u>Donuz</u>	Piy	150 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
<u>Donuz</u>	Böyrək	30 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
<u>Donuz</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
<u>Donuz</u>	Əzələ	5 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	

Zeranol (boy stimulyatoru) JECFA qiymətləndirməsi: 26-cı iclas (1982-ci il); 27-ci iclas (1983-cü il); Yol verilən gündəlik doza: 0-0.5 µg/kq bədən çəkisinə (32nd JECFA, 1987). Marker qalığı: Zeranol.Zeranol üçün yol verilən maksimum				
Zeranol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	2 µg/kq	1995	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	10 µg/kq	1995	

İvermektin (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 36-cı iclas (1990-ci il); 40-cı iclas (1992-cü il); 54-cı iclas (2000 il) 58-ci iclas (2002 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-1 µg/kq bədən çəkisinə (40th JECFA, 1992). Marker qalığı: 22,23-Dihidroavermektin B1a (H2B1a).				
İvermektin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	40 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	10 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Donuz</u>	Qaraciyər	15 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>Donuz</u>	Piy	20 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>Qoyun</u>	Qaraciyər	15 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>Qoyun</u>	Piy	20 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	

İzometamidium (tripanosid) JECFA qiymətləndirməsi:34-cü iclas (1989-cu il); 40-cı iclas (1992-cü il);				
---	--	--	--	--

Yol verilən gündəlik doza: 0-100 µg/kq bədən çəkisinə (40th JECFA, 1992).

Marker qalığı: İzometamidium

İsometamidium üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	100 µg/kq	21-ci sessiya (1995 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	500 µg/l	21-ci sessiya (1995 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	1000 µg/kq	21-ci sessiya (1995 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	100 µg/kq	21-ci sessiya (1995 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	100 µg/l	21-ci sessiya (1995 il)	

Emamektin Benzoat (parazit əleyhinə vasitə)

JECFA qiymətləndirməsi: 58-ci iclas (2013 il)

Gündəlik yol verilən tələbat : İtlər üzərində 14-53 həftə ərzində aparılmış tədqiqat nəticəsində alınmış neyrotoksinlik üçün sutkada bədən çəkisinin 0,25 mq/kq-da qeyriqənaətbəxədən dəyişikliklər (NOAEL) yaratmayan və siçanlar üzərində 1 və ya 2 il ərzində aparılmış tədqiqat nəticələri ilə sutkada bədən çəkisinin 0,25 mq/kq-da ümumi NOAEL ilə bərkidilmiş məlumat əsasında bədən çəkisinin 0-0,5 mq/kq DSP 2011-ci ildə pestisidlərin qalıq miqdarı (JMPR) üzrə FAO/VOZ birgə iclasında müəyyən edilmişdir.

NOAEL -ə qeyrimüəyyənlik əmsalı 500 tətbiq edilmişdir. Bu əmsala “doza-efekt” ayrısı və vasitənin minimal dozasının istifadəsində itlərin sinir toxumalarında onların üzərində aparılan tədqiqatlarda müşahidə olunan qeyriqənaətbəxədən halların inkişafına gətirib çıxaran dəyişiklikləri nəzərə alan əlavə qeyrimüəyyənlik əmsalı 5 daxil olunur.

(JECFA 78-ci iclası 2013)

Emamektin Benzoat üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>Qızıl</u> balıq	Əzələ	100 µg/kq	38 sessiy (2015 il)	
<u>Qızıl balıq</u>	File	100 µg/kq	38 sessiy (2015 il)	Əzələ ilə dəri təbii nisbətdə
Qızıl xallı balıq	Əzələ	100 µg/kq	38 sessiy	

(forel)			(2015 il)	
Qızıl xallı balıq (forel)	File	100 µg/kq	38 sessiy (2015 il)	Əzələ ilə dəri təbii nisbətdə

Eprinomektin (antihelminth maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 50-ci iclas (1998-ci il) Yol verilən gündəlik doza: 0-10 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998). Marker qalığı: Eprinomektin B1a.				
Eprinomektin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ k	100 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	2000 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrə	300 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	250 µg/kq	26-cı sessiya (2003 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	20 µg/l	26-cı sessiya (2003 il)	
İmidokrab (protoz əleyihinə vasiə) Yol verilən gündəlik doza: 0-10 mkq/kq bədən kütləsi (50-ci iclas JECFA, 1998-ci il). Marker qalığı: imidokarb				
İmidokrab üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	300 µg/kq	2005	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Ciyər	1500 µg/kq	2005	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	2000 µg/kq	2005	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	50 µg/kq	2005	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	50 µg/kq	2005	

Karazolol (beta-adrenoreseptor-bloklayıcı maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 38-ci iclas (1991-ci il); 43-cü iclas (1994-cü il); 52-ci iclas (1999 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-0.1 µg/kq bədən çəkisinə (43rd JECFA, 1994).

YGDkarazololun kəskin farmakoloji effektlərinə əsaslanır.

Marker qalığı: Karazolol.

Karazolol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>Donuz</u>	Əzələ	5 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Donuz</u>	Qaraciyər	25 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Donuz</u>	Böyrək	25 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Müalicədən iki saat sonra inyeksiyanın yerində konsentrasiya maksimum referent təhlükəsiz dozadan (RfD) çox olduğu üçün gözləmə müddəti tətbiq edilməlidir
<u>Donuz</u>	Piy/dəri	5 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Müalicədən iki saat sonra inyeksiyanın yerində konsentrasiya maksimum referent təhlükəsiz dozadan (RfD) çox olduğu üçün gözləmə müddəti tətbiq edilməlidir

Klenbuterol (adrenoreseptorların aqonisti)

JECFA qiymətləndirməsi: 47-ci iclas (1996-ci il);

Yol verilən gündəlik doza: 0-0.004 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996).

Marker qalıǵı: Klenbuterol				
Klenbuterol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	0.2 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasnda tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tədbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMKtövsiyə edilir.
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	0.6 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasnda tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tədbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	0.6 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasnda tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tədbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	0.2 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasnda tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tədbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	0.05 µg/l	26 sessiya (2003 il)	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasnda tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tədbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.
<u>At</u>	Əzələ	0.2 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim

				praktikasında tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tətbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.
At	Qaraciyər	0.6 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasında tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tətbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.
At	Böyrək	0.6 µg/kq	2003	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasında tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tətbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.
At	Piy	0.2 µg/kq	2003	Bu preparatın sui-istifadə halı mümkün olduğu üçün həkim praktikasında tokolitik və ya respirator xəstəliklərin müalicəsində əlavə preparat kimi tətbiqinə rəsmi icazə verildikdə qalıqların YMK tövsiyə edilir.

Klosantel (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 45-ci iclas (1995-ci il); 52-ci iclas (1999-cü il); 58-ci iclas Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (40th JECFA, 1992). Marker qalığı: Klosantel.				
Klosantel üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	1000 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	1000 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	3000 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>İri buynuzlu</u>	Piy	3000 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	

<u>mal qara</u>			il)	
<u>Qoyun</u>	Əzələ	1500 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>Qoyun</u>	Qaraciyər	1500 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>Qoyun</u>	Böyrək	5000 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	
<u>Qoyun</u>	Piy	2000 µg/kq	20 sessiya (1993 il)	

Kolistin (antibiotik maddə) Yol verilən gündəlik doza: 0-7 µg/kq bədən çəkisinə(66th JECFA, 2006). JECFA qiymətləndirməsi: 66-cı iclas (2006-ci il); Marker qalığı: A və B kolistilinlərin cəmi.				
Kolistin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	50 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Qoyun</u>	Əzələ	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Qoyun</u>	Qaraciyər	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Qoyun</u>	Böyrək	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Qoyun</u>	Piy	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Qoyun</u>	Süd	50 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Keçi</u>	Əzələ	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Keçi</u>	Qaraciyər	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	

			il)	
<u>Keçi</u>	Böyrək	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Keçi</u>	Piy	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Donuz</u>	Əzələ	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Donuz</u>	Qaraciyər	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	YMK dəri+ Piyi daxil edir
<u>Donuz</u>	Böyrək	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Donuz</u>	Piy	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Toyuq</u>	Əzələ	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Toyuq</u>	Qaraciyər	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Toyuq</u>	Böyrək	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	YMK dəri+ Piyi daxil edir
<u>Toyuq</u>	Piy	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Toyuq</u>	Yumurta	300 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Hinduşqa</u>	Əzələ	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Hinduşqa</u>	Qaraciyər	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Hinduşqa</u>	Böyrək	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Hinduşqa</u>	Piy	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	YMK dəri+ Piyi daxil edir
<u>Ev dovşanı (krolik)</u>	Əzələ	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Ev dovşanı (krolik)</u>	Qaraciyər	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Ev dovşanı (krolik)</u>	Böyrək	200 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
<u>Ev dovşanı (krolik)</u>	Piy	150 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	

Levamisol (antihelminth maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 36-cı iclas (1990-cı il); 42-ci iclas (1999-cü il); 58-ci iclas

Yol verilən gündəlik doza: 0-6 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1994).

Marker qalığı: Levamisol.

Levamisol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Donuz</u>	Əzələ	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Donuz</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Donuz</u>	Böyrək	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Donuz</u>	Piy	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Toyuq</u>	Əzələ	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Toyuq</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Toyuq</u>	Böyrək	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Toyuq</u>	Piy	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Qoyun</u>	Əzələ	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Qoyun</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Qoyun</u>	Böyrək	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Qoyun</u>	Piy	10 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	

Linkomisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 54-cü iclas (2000-ci il); 58-ci iclas (2002 il); 62 iclas (2004 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (54th JECFA, 2000). Marker qalığı: Linkomisin.				
Linkomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	150 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Toyuq</u>	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Toyuq</u>	Qaraciyər	500 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Toyuq</u>	Böyrək	500 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Toyuq</u>	Piy	100 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Dəri ilə bitişik piy üçün YMK 300 µg/kq.
<u>Donuz</u>	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Donuz</u>	Qaraciyər	500 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Donuz</u>	Böyrək	1500 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>Donuz</u>	Piy	100 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Dəri ilə bitişik piy üçün YMK 300 µg/kq.

Melengestrol asetat (məhsuldarlıq artırıcısı) JECFA qiymətləndirməsi: 54-cü iclas (2000-ci il); 58-ci iclas (2002 il); 62 iclas (2004 il); 66 iclas (2006 il); 70 iclas (2008). Yol verilən gündəlik doza: 0-0.03 mg/kg bədən çəkisinə. Marker qalığı: Melengestrol asetat.				
Melengestrol asetat üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi	Qeyd

			il	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	1 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	10 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	2 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	18 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	

Moksidektin (antihelminth maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 45-cü iclas (1995-ci il); 47-ci iclas (1996 il); 48 iclas (1998); 50 iclas (1998 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-2 µg/kq bədən çəkisinə (45th JECFA, 1995).

Marker qalığı: Moksidektin.

Moksidektin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	İri buynuzlu mal-qaraya iynə vurulduqu yerdə 49 gün ərzində belə yüksək konsentrasiyada dərman preparatı qalır, vurulduğı yerdə böyük həddə dəyişir.
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	50 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	500 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
<u>Maral</u>	Əzələ	20 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Maral</u>	Qaraciyər	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Maral</u>	Böyrək	50 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Maral</u>	Piy	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Qoyun</u>	Əzələ	500 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	

Moksidektin (antihelmint maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 45-cü iclas (1995-ci il); 47-ci iclas (1996 il); 48 iclas (1998); 50 iclas (1998 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-2 µg/kq bədən çəkisinə (45th JECFA, 1995).

Marker qalığı: Moksidektin.

Moksidektin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Qoyun	Qaraciyər	100 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Qoyun	Böyrək	50 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Qoyun	Piy	50 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	

Monensin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 70-ci iclas (2008-ci il); 75-ci iclas (2011 il);

Yol verilən gündəlik doza: Gün ərzində zərərli təsiri müşahidə olunmayan hədd(NOAE) 1.14 µg/kq bədən çəkisinə, 100 təhlükəsizlik faktoru və bir qiymət mənasına qədər yuvarlaqlaşdırma əsasında 0–10 µg/kq bədən çəkisinə (70th JECFA, 2008).

Qida təsirinin qiymətləndirilməsi: Nəzərdən keçirilmiş YMK-dan istifadə edərək nəzəri gündəlik doza (NGD) 70th JECFA-da yenidən hesablanmışdır və 481 µg/şəxsə kimi qəbul edilmişdir, buda YGD həddinin 80 %-ni təşkil edir (75-ci JECFA, 2011).

Marker qalığı: Monensin.

Monensin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	10 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	10 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	2 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	

Qoyun	Əzələ	10 µg/kq		
Qoyun	Qaraciyər	20 µg/kq		
Qoyun	Böyrək	10 µg/kq		
Qoyun	Piy	100 µg/kq		
Keçi	Əzələ	10 µg/kq		
Keçi	Qaraciyər	20 µg/kq		
Keçi	Böyrək	10 µg/kq		
Keçi	Piy	100 µg/kq		
Toyuq	Əzələ	10 µg/kq		
Toyuq	Qaraciyər	10 µg/kq		
Toyuq	Böyrək	10 µg/kq		
Toyuq	Piy	100 µg/kq		
Hinduşqa	Əzələ	10 µg/kq		
Hinduşqa	Qaraciyər	10 µg/kq		
Hinduşqa	Böyrək	10 µg/kq		
Hinduşqa	Piy	100 µg/kq		
Bildirçin	Əzələ	10 µg/kq		
Bildirçin	Qaraciyər	10 µg/kq		
Bildirçin	Böyrək	10 µg/kq		
Bildirçin	Piy	100 µg/kq		

Monepantel (antihelminth vasitə)

JECFA qiymətləndirməsi: 75 iclas (2011-ci il); 78 iclas (2013 il);

Yol verilən gündəlik doza: Görünən xoşagəlməz dəyişikliklərə (NOAEL) səbəb olmayan ümumi səviyyənin əsasında 0-20 mq/kq bədən çəkisi, siçanın ciyərinə təsiri haqqında göstəriciləri və 1-ci dərəcəyə qədər yuvarqlaşdırılmış ehtiyat əmsalı 100 nəzərə almaqla sutkada bədən çəkisi 1,8 mq/kq-da, Rasion modelindən və qalığın nisbi əmsalı əzələlərdə 1,00, piyda, ciyərdə və böyrəkdə 0,66 olan qalıq əmsallı marker qalığından istifadə etməklə, və sulfon monepantel ilə monepantel çəkirlərinin fərqi sutkada 446 mq/adam olan, harada ki, təxminən АСП-nin maksimal göstəricisinin 37%-nə uyğun gəlir, nəzərə almaqla 0,94 düzəliş əmsalı tətbiq etməklə hesablanır. (ОКЭПД –nin 75-ci iclas (2011-ci il); 78-ci iclas (2013-cü il); 78-ci iclası, 2013-ci il)

Marker qalığı: Monepantelə hesablanmış sulfon monepantel

Monepantel üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Qoyun	Əzələ	500	38 sessiya 2015	
Qoyun	Qaraciyər	7000	38 sessiya 2015	

Qoyun	Böyrək	1700	38 sessiya 2015	
Qoyun	Piy	13000	38 sessiya 2015	

Neomisin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 43-cü iclas (1994-ci il); 47-ci iclas (1996 il); 52 iclas (1999 il); 58 iclas (2002 il); 60-cı iclas (2003)

Yol verilən gündəlik doza: 0-60 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996).

Marker qalığı: Neomisin.

Neomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Qaraciyər	500 mg/kq	28 sessiya (2005 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Böyrək	10000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Piy	500 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	1500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Toyuq</u>	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Toyuq</u>	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Toyuq</u>	Böyrək	10000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Toyuq</u>	Piy	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Toyuq</u>	Yumurta	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Ördək</u>	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Ördək</u>	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
<u>Ördək</u>	Böyrək	10000 µg/kq	23 sessiya	

Neomisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 43-cü iclas (1994-ci il); 47-ci iclas (1996 il); 52 iclas (1999 il); 58 iclas (2002 il); 60-cı iclas (2003) Yol verilən gündəlik doza: 0-60 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996). Marker qalığı: Neomisin.				
Neomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
			(1999 il)	
Ördək	Piy	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keci	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keci	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keci	Böyrək	10000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keci	Piy	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Böyrək	10000 µg/kq		
Donuz	Piy	500 µg/kq		
Qoyun	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Böyrək	10000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Piy	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Hinduşqa	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Hinduşqa	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Hinduşqa	Böyrək	10000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Neomisin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 43-cü iclas (1994-ci il); 47-ci iclas (1996 il); 52 iclas (1999 il); 58 iclas (2002 il); 60-cı iclas (2003)

Yol verilən gündəlik doza: 0-60 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996).

Marker qalığı: Neomisin.

Neomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>Hind</u> uşqa	Piy	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Nikarbazin (antiprotozoy maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 50-ci iclas (1998-ci il);

Yol verilən gündəlik doza: 0-400 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998).

Marker qalığı: N,N'-bis(4-nitropheyl) sidik cövhəri.

Nikarbazin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>Toyuq</u>	Əzələ	200 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	Broyler üçün
<u>Toyuq</u>	Qaraciyər	200 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	Broyler üçün
<u>Toyuq</u>	Böyrək	200 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	Broyler üçün
<u>Toyuq</u>	Piy/dəri	200 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	Broyler üçün

Narasin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 70-ci iclas (2008-ci il); 75 iclas (2011 il)

Yol verilən gündəlik doza: gündəlik 0.5 mq/kq bədən çəkisinə zərərli təsiri müşahidə olunmayan hədd (NOAEL) və 100 təhlükəsizlik faktoru əsasında 0-5 µg/kq bədən çəkisinə (70th JECFA, 2008).

Marker qalığı: Narasin A.

Narasin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
<u>İri buynuzlu</u> <u>mal qara</u>	Əzələ	15 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	
<u>İri buynuzlu</u> <u>mal qara</u>	Qaraciyər	50 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	

Narasin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 70-ci iclas (2008-ci il); 75 iclas (2011 il) Yol verilən gündəlik doza: gündəlik 0.5 mq/kg bədən çəkisinə zərərli təsiri müşahidə olunmayan hədd (NOAEL) və 100 təhlükəsizlik faktoru əsasında 0-5 µg/kg bədən çəkisinə (70th JECFA, 2008). Marker qalığı: Narasin A.				
Narasin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	15 µg/kg	35 sessiya (2012 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	50 µg/kg	35 sessiya (2012 il)	
Toyuq	Əzələ	15 µg/kg	36 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Qaraciyər	50 µg/kg	36 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Böyrək	15 µg/kg	36 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Piy	50 µg/kg	36 sessiya (2009 il)	
Donuz	Əzələ	15 µg/kg	34 sessiya (2011 il)	
Donuz	Qaraciyər	50 µg/kg	34 sessiya (2011 il)	
Donuz	Böyrək	15 µg/kg	34 sessiya (2011 il)	
Donuz	Piy	50 µg/kg	34 sessiya (2011 il)	

Pirlimisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 62-ci iclas (2004-ci il); Yol verilən gündəlik doza: 0-8 mg/kg bədən çəkisinə (62nd JECFA, 2004). Marker qalığı: Pirlimisin.				
Pirlimisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	100 µg/kg	2006	

Pirlimisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 62-ci iclas (2004-ci il); Yol verilən gündəlik doza: 0-8 mg/kg bədən çəkisinə (62nd JECFA, 2004). Marker qalığı: Pirlimisin.				
Pirlimisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	1000 µg/kq	2006	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	400 µg/kq	2006	
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/kq	2006	
İri buynuzlu mal qara	Süd	100 µg/kq	2006	JECFA tərəfindən pirlimisin qalıqlarının süd turşulu kulturalara təsiri qiymətləndirilmiş və ona görə də süd üçün YMK-sı 100 µg/kq həddində tövsiyə edilmişdir. Bu səbəbdən Kodeks üzvləri süd turşulu kulturalardan istifadə edərək emal üçün nəzərdə tutulmuş təzə südlə ticarət üçün texnoloji məsələlərin həlli məqsədilə öz yerli/regional YMK göstəricilərini uyğunlaşdırı bilərlər.

Progesteron (məhsuldarlıq artırıcısı) JECFA qiymətləndirməsi: 25-ci iclas (1981-ci il); 32 iclas (1987); 52 iclas (1999 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kg bədən çəkisinə (52nd JECFA, 1999). Marker qalığı: Progesteron.
Progesteron üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	lazımsızdır	21 sessiya (2005 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən boy stimulyatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	lazımsızdır	21 sessiya (2005 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən boy stimulyatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	lazımsızdır	21 sessiya (2005 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən boy stimulyatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.
İri buynuzlu mal qara	Piy	lazımsızdır	21 sessiya (2005 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən boy stimulyatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.

Raktopamin hidroxlorid (məhsuldarlıq artırıcısı)

JECFA qiymətləndirməsi: 40-ci iclas (1992-ci il); 62 iclas (2004 l) 66 iclas (2006 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-1 µg/kq bədən çəkisinə (66th JECFA, 2006).

Marker qalığı: Raktopamin.

Raktopamin hidroxlorid üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu	Əzələ	10 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	

Raktopamin hidroxlorid (məhsuldarlıq artırıcısı) JECFA qiymətləndirməsi: 40-ci iclas (1992-ci il); 62 iclas (2004 l) 66 iclas (2006 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-1 µg/kq bədən çəkisinə (66th JECFA, 2006). Marker qalığı: Raktopamin.				
Raktopamin hidroxlorid üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
mal qara				
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	40 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	90 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	10 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	
Donuz	Əzələ	10 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	
Donuz	Qaraciyər	40 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	
Donuz	Böyrək	90 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	
Donuz	Piy	10 µg/kq	35 sessiya (2012 il)	YMK dəri + Piy daxil edir

Sarafloksasin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 50-ci iclas (1998-ci il); Yol verilən gündəlik doza: 0-0.3 µg/kq bədən çəkisinə(50th JECFA, 1998). Marker qalığı: Sarafloksasin.				
Sarafloksasin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Toyuq	Əzələ	10 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Toyuq	Qaraciyər	80 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Toyuq	Böyrək	80 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Toyuq	Piy	20 µg/kq	24 sessiya	

Sarafloksasin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 50-ci iclas (1998-ci il); Yol verilən gündəlik doza: 0-0.3 µg/kq bədən çəkisinə(50th JECFA, 1998). Marker qalığı: Sarafloksasin.				
Sarafloksasin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
			(2001 il)	
Hinduşqa	Əzələ	10 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Hinduşqa	Qaraciyər	80 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Hinduşqa	Böyrək	80 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	
Hinduşqa	Piy	20 µg/kq	24 sessiya (2001 il)	

Donuz somatotropini (məhsuldarlıq artırıcısı) JECFA qiymətləndirməsi: 50-ci iclas (1998-ci il); Yol verilən gündəlik doza: Müəyyən edilməyib (52nd JECFA, 1999). Marker qalığı: Tətbiq edilmir.				
Donuz somatotropini üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Donuz	Əzələ	Dəqiqləşdirilməyib	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Qaraciyər	Dəqiqləşdirilməyib	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Böyrək	Dəqiqləşdirilməyib	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Piy	Dəqiqləşdirilməyib	26 sessiya (2003 il)	

Spektinomisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 42-ci iclas (1994-cü il); 50 iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1994). Marker qalığı: Spektinomisin.				
Spektinomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd

Spektinomisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 42-ci iclas (1994-cü il); 50 iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1994). Marker qalığı: Spektinomisin.				
Spektinomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	5000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	200 µg/l	23 sessiya (1999 il)	
Toyuq	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Toyuq	Qaraciyər	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Toyuq	Böyrək	5000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Toyuq	Piy	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Toyuq	Yumurta	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Qaraciyər	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Böyrək	5000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Piy	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Spektinomisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 42-ci iclas (1994-cü il); 50 iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1994). Marker qalığı: Spektinomisin.				
Spektinomisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Qoyun	Əzələ	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Qaraciyər	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Böyrək	5000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Piy	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Spiramisin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 38-ci iclas (1991-ci il); 43 iclas (1994 il); 47 iclas (1996 il); 48 icla (1997 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (43rd JECFA, 1994). Marker qalığı: İri buynuzlu mal-qarada və toyuqda, spiramisin və neospiramisinin cəmi; donuzlarda - spiramisinin ekvivalentləri (mikroba qarşı aktiv qalıqlar).				
Spiramisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	200 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	600 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	300 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	300 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
İri buynuzlu	Süd	200 µg/l	22 sessiya (1997 il)	

Spiramisin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 38-ci iclas (1991-ci il); 43 iclas (1994 il); 47 iclas (1996 il); 48 icla (1997 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (43rd JECFA, 1994).

Marker qalığı: İri buynuzlu mal-qarada və toyuqda, spiramisin və neospiramisinin cəmi; donuzlarda - spiramisinin ekvivalentləri (mikroba qarşı aktiv qalıqlar).

Spiramisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
mal qara				
Toyuq	Əzələ	200 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Toyuq	Qaraciyər	600 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Toyuq	Böyrək	800 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Toyuq	Piy	300 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Donuz	Əzələ	200 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Donuz	Qaraciyər	600 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Donuz	Böyrək	300 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	
Donuz	Piy	300 µg/kq	22 sessiya (1997 il)	

Sulfadimidin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 34 iclas (1989 il); 38 iclas (1991 il); 42 iclas (1994 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1994).

Marker qalığı: Sulfadimidin.

Sulfadimidin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Süd	25 µg/l	21 sessiya (1995 il)	
Göstərilməyib	Əzələ	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	
Göstərilməyib	Qaraciyər	100 µg/kq	21 sessiya	

Sulfadimidin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 34 iclas (1989 il); 38 iclas (1991 il); 42 iclas (1994 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (42nd JECFA, 1994). Marker qalığı: Sulfadimidin.				
Sulfadimidin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
			(1995 il)	
Göstərilməyib	Böyrək	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	
Göstərilməyib	Piy	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	

Testosteron (məhsuldarlıq artırıcısı) JECFA qiymətləndirməsi: 25 iclas (1981 il); 32 iclas (1987 il); 52 iclas (1999 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-2 µg/kq bədən çəkisinə (52nd JECFA, 1999). Marker qalığı: Testosteron.				
Testosteron üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	Vacib deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən bu maddənin boy stimulyatoru kimi istifadəsi nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	Vacib deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən bu maddənin boy stimulyatoru kimi istifadəsi nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	Vacib deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən bu maddənin boy stimulyatoru kimi istifadəsi nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.
İri buynuzlu mal qara	Piy	Vacib deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına əsasən bu maddənin boy stimulyatoru kimi istifadəsi nəticəsində yaranan qalıqlar insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə törətmir.

Tiabendazol (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 40 iclas (1992 il); 48 iclas (1997 il); 58 iclas (2002 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-100 µg/kq bədən çəkisinə(40th JECFA, 1992). Marker qalığı: Tiabendazolun və 5-hidroksitiabendazolun cəmi.				
Tiabendazol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiği il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/l	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
İri buynuzlu mal qara	Süd	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Keçi	Əzələ	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Keçi	Qaraciyər	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Keçi	Böyrək	100 µg/l	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Keçi	Piy	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Keçi	Süd	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Donuz	Əzələ	100 µg/kq	21 sessiya	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə

Tiabendazol (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 40 iclas (1992 il); 48 iclas (1997 il); 58 iclas (2002 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-100 µg/kq bədən çəkisinə(40th JECFA, 1992). Marker qalığı: Tiabendazolun və 5-hidroksitiabendazolun cəmi.				
Tiabendazol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
			(1995 il)	daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Donuz	Qaraciyər	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Donuz	Böyrək	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Donuz	Piy	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Qoyun	Əzələ	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Qoyun	Qaraciyər	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Qoyun	Böyrək	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir
Qoyun	Piy	100 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	YMK həmçinin kənd təsərrüfatında istifadə nəticəsində yemlər vasitəsilə daxil olmuş qalıqları da əhatə edir

Tilmikozin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 47 iclas (1996 il); 54 iclas (2000 il); 70 iclas (2008 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996). Marker qalığı: Tilmikozin.				
Tilmikozin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya	

Tilmikozin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 47 iclas (1996 il); 54 iclas (2000 il); 70 iclas (2008 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996). Marker qalığı: Tilmikozin.				
Tilmikozin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
mal qara			(1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	300 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Toyuq	Əzələ	150 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	
Toyuq	Qaraciyər	2400 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	
Toyuq	Böyrək	600 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	
Toyuq	Piy/dəri	250 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	
Donuz	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Qaraciyər	1500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Böyrək	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Piy	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Qaraciyər	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Böyrək	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Piy	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Hinduşqa	Əzələ	100 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	

Tilmikozin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 47 iclas (1996 il); 54 iclas (2000 il); 70 iclas (2008 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996). Marker qalığı: Tilmikozin.				
Tilmikozin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Hinduşqa	Qaraciyər	1200 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	
Hinduşqa	Böyrək	1400 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	
Hinduşqa	Piy/dəri	250 µg/kq	34 sessiya (2011 il)	
Tilozin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 70 iclas (2008 il) Yol verilən gündəlik doza: in vitro MIC həssaslıq sınağı və fekal bağlayıcı məlumatlarında müəyyən edilmiş mikrobioloji kənar nöqtələrə əsaslanan 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (MICcalc = 1.698) (70th JECFA, 2008). Marker qalığı: Tilozin A.				
Tilosin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Donuz	Əzələ	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Donuz	Qaraciyər	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Donuz	Böyrək	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Donuz	Piy	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	

Tilmikozin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 47 iclas (1996 il); 54 iclas (2000 il); 70 iclas (2008 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (47th JECFA, 1996). Marker qalığı: Tilmikozin.				
Tilmikozin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Qoyun	Qaraciyər	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Qoyun	Böyrək	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Qoyun	Əzələ	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Əzələ	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Qaraciyər	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Piy/dəri	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Böyrək	100 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	
Toyuq	Yumurta	300 µg/kq	32 sessiya (2009 il)	

Trenbolon asetat (boy stimulyatoru) JECFA qiymətləndirməsi: 26 iclas (1982 il); 27 iclas (1983 il); 32 iclas (1987 il); 34 iclas (1989 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-0.02 µg/kq bədən çəkisinə (34th JECFA, 1989). Marker qalığı: İri buynuzlu mal-qara əzələsində beta-Trenbolon; İri buynuzlu mal-qaranın qara ciyərində, alfa-Trenbolon.				
Trenbolon asetat üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	2 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	10 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	

Triklabendazol (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 40 iclas (1992 il); 66 iclas (2006 il); 70 iclas (2008 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-3 µg/kg bədən çəkisinə (40th JECFA, 1993). Marker qalığı: Ketotriklabendazol				
Triklabendazol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	250 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	850 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	400 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy/dəri	100 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	
Qoyun	Əzələ	200 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	
Qoyun	Qaraciyər	300 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	
Qoyun	Böyrək	200 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	
Qoyun	Piy/dəri	100 µg/kg	32 sessiya (2009 il)	

Trixlorfon (metrifonat) (insektisid) JECFA qiymətləndirməsi: 54 iclas (2000 il); 60 iclas (2003 il); 66 iclas (2006 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-2 mg/kg bədən çəkisinə (60th JECFA, 2003) Marker qalığı: JECFA-ın 54-cü toplantıda iri buynuzlu mal-qara əzələsi, böyrəyi, qaraciyəri və piyi üçün tövsiyə edilən YMK-nın səviyələri müəyyən edilmişdir. İnək inək südü üçün YMK təsdiq edilmişdir (WHO TRS 900, 2001)				
Trixlorfon (metrifonat) üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Süd	50 µg/l	2006	

Febantel/Fenbendazol/Ofendazol (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 38 iclas (1991 il); 45 iclas (1995 il); 50 iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-7 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998). Marker qalığı: Sulfon oksfendazolunun ekvivalenti kimi ifadə edilən fenbendazol, oksfendazol və oksfendazol sulfonunun cəmi.				
Febantel/Fenbendazol/Oxfendazol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	500 µg/l	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keçi	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keçi	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keçi	Böyrək	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Keçi	Piy	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
At	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
At	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
At	Böyrək	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
At	Piy	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Febantel/Fenbendazol/Ofendazol (antihelmint maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 38 iclas (1991 il); 45 iclas (1995 il); 50 iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-7 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998). Marker qalığı: Sulfon oksfendazolunun ekvivalenti kimi ifadə edilən fenbendazol, oksfendazol və oksfendazol sulfonunun cəmi.				
Febantel/Fenbendazol/Oxfendazol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Donuz	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Böyrək	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Piy	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Əzələ	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Böyrək	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Piy	100 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Qoyun	Süd	100 µg/l	23 sessiya (1999 il)	

Fluazuron (insektisid) JECFA qiymətləndirməsi: 48 iclas (1997 il); Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (48th JECFA, 1997). Marker qalığı: Fluazuron.				
Fluazuron üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	200 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	500 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Fluazuron (insektisid) JECFA qiymətləndirməsi: 48 iclas (1997 il); Yol verilən gündəlik doza: 0-40 µg/kq bədən çəkisinə (48th JECFA, 1997). Marker qalığı: Fluazuron.				
Fluazuron üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Piy	7000 µg/kq		

Flubendazol (antihelminth maddə) Yol verilən gündəlik doza: 0-12 µg/kq bədən çəkisinə (40th JECFA, 1992). Marker qalığı: Flubendazol.				
Flubendazol üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Donuz	Əzələ	10 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	
Donuz	Qaraciyər	10 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	
Ev quşu	Əzələ	200 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	
Ev quşu	Qaraciyər	500 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	
Ev quşu	Yumurta	400 µg/kq	21 sessiya (1995 il)	

Flumekin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 42 iclas (1994 il); 48 iclas (1997 il); 54 iclas (2000 il); 60 iclas (2002); 62 iclas (2004 il); 66 iclas (2006 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (62nd JECFA, 2004). Marker qalığı: Flumekin.				
Flumekin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
İri buynuzlu	Qaraciyər	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	

Flumekin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 42 iclas (1994 il); 48 iclas (1997 il); 54 iclas (2000 il); 60 iclas (2002); 62 iclas (2004 il); 66 iclas (2006 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (62nd JECFA, 2004). Marker qalığı: Flumekin.				
Flumekin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
mal qara				
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	3000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	1000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Toyuq	Əzələ	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Toyuq	Qaraciyər	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Toyuq	Böyrək	3000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Toyuq	Piy	1000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Donuz	Əzələ	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Donuz	Qaraciyər	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Donuz	Böyrək	3000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Donuz	Piy	1000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Əzələ	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Qaraciyər	500 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Böyrək	3000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Piy	1000 µg/kq	26 sessiya (2005 il)	
Qızıl	Əzələ	500 µg/kq	26 sessiya	Normal mütənasibdə

Flumekin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 42 iclas (1994 il); 48 iclas (1997 il); 54 iclas (2000 il); 60 iclas (2002); 62 iclas (2004 il); 66 iclas (2006 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (62nd JECFA, 2004). Marker qalığı: Flumekin.				
Flumekin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
xallı balıq (farel)			(2005 il)	dəri/əzələ daxil olmaqla.

Foksim (insektisid) JECFA qiymətləndirməsi: 45 iclas (1995 il); 47 iclas (1996 il); 58 iclas (2002 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-4 µg/kq bədən çəkisinə (52nd JECFA, 1999). Marker qalığı: Foksim				
Foksim üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Keçi	Əzələ	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Keçi	Qaraciyər	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Keçi	Böyrək	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Keçi	Piy	400 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Əzələ	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Qaraciyər	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Böyrək	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Piy	400 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Qoyun	Əzələ	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Qoyun	Qaraciyər	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Qoyun	Böyrək	50 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	

Foksim (insektisid) JECFA qiymətləndirməsi: 45 iclas (1995 il); 47 iclas (1996 il); 58 iclas (2002 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-4 µg/kq bədən çəkisinə (52nd JECFA, 1999). Marker qalığı: Foksim				
Foksim üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Qoyun	Piy	400 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	

Xlortetrasiklin/Oksitetrasiklin/Tetrasiklin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 45 iclas (1995 il); 47 iclas (1996 il); 50 iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998). Xlortetrasiklin, oksitetrasiklin və tetrasiklinin cəmi üçün YGD . Marker qalığı: ilkin dərman maddələri, ayrı-ayrı və ya kombinasiya şəklində.				
Xlortetrasiklin/Oksitetrasiklin/Tetrasiklin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	600 µg/l	26 sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	1200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
<u>İri buynuzlu mal qara</u>	Süd	100 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Balıq	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Yalnız oksitetrasiklin üçün tətbiq edilir
Nəhəng krevet (Paeneus monodon)	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	Yalnız oksitetrasiklin üçün tətbiq edilir.
Donuz	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Donuz	Qaraciyər	600 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	

Xlortetrasiklin/Oksitetrasiklin/Tetrasiklin (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 45 iclas (1995 il); 47 iclas (1996 il); 50 iclas (1998 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-30 µg/kq bədən çəkisinə (50th JECFA, 1998). Xlortetrasiklin, oksitetrasiklin və tetrasiklinin cəmi üçün YGD . Marker qalığı: ilkin dərman maddələri, ayrı-ayrı və ya kombinasiya şəkildə.				
Xlortetrasiklin/Oksitetrasiklin/Tetrasiklin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Donuz	Böyrək	1200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Ev quşu	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Ev quşu	Qaraciyər	600 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Ev quşu	Böyrək	1200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Ev quşu	Yumurta	400 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Qoyun	Əzələ	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Qoyun	Qaraciyər	600 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Qoyun	Böyrək	1200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
Qoyun	Süd	100 µg/l	26 sessiya (2003 il)	

Seftiofur (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 45 iclas (1995 il); 48 iclas (1997 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (45th JECFA, 1995). Marker qalığı: Desfuroilseftiofur.				
Seftiofur üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri	Qaraciyər	2000 µg/kq	23 sessiya	

Seftiofur (antibiotik maddə) JECFA qiymətləndirməsi: 45 iclas (1995 il); 48 iclas (1997 il) Yol verilən gündəlik doza: 0-50 µg/kq bədən çəkisinə (45th JECFA, 1995). Marker qalığı: Desfuroilseftiofur.				
Seftiofur üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
buynuzlu mal qara			(1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	6000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	100 µg/l	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Əzələ	1000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Qaraciyər	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Böyrək	6000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	
Donuz	Piy	2000 µg/kq	23 sessiya (1999 il)	

Siqalotrin (insektisid) Yol verilən gündəlik doza: 0-5 µg/kq bədən çəkisinə (62nd JECFA, 2004). Marker qalığı: Siqalotrin.				
Siqalotrin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	

Siqalotrin (insektisid) Yol verilən gündəlik doza: 0-5 µg/kq bədən çəkisinə (62nd JECFA, 2004). Marker qalığı: Siqalotrin.				
Siqalotrin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	400 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	30 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Donuz	Əzələ	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Donuz	Qaraciyər	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Donuz	Böyrək	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Donuz	Piy	400 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Əzələ	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Qaraciyər	50 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Böyrək	20 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	
Qoyun	Piy	400 µg/kq	28 sessiya (2005 il)	

Sipermetrin və alfa-Sipermetrin (insektisid) JECFA qiymətləndirməsi: 62 iclas (2004 il) Yol verilən gündəlik doza: JECFA tərəfindən sipermetrin və alfa-sipermetrin üçün ümumi YGD 0-20 µg/kq bədən çəkisinə müəyyən etmişdir. Marker qalığı: Sipermetrin qalıqlarının cəmi (sipermetrin və alfa-sipermetrinin baytarlıq ləvazimatları kimi istifadə edilməsi nəticəsində).
Sipermetrin və alfa-Sipermetrin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	50 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	50 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	50 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
İri buynuzlu mal qara	Piy	1000 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	100 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
Qoyun	Əzələ	50 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
Qoyun	Qaraciyər	50 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
Qoyun	Böyrək	50 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	
Qoyun	Piy	1000 µg/kq	29 sessiya (2006 il)	

Siflutrin (insektisid)

JECFA qiymətləndirməsi: 48 iclas (1997 il);

Yol verilən gündəlik doza: 0-20 µg/kq bədən çəkisinə (48th JECFA, 1997).

Marker qalığı: Siflutrin.

Siflutrin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	20 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	20 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu	Böyrək	20 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	

Siflutrin (insektisid)

JECFA qiymətləndirməsi: 48 iclas (1997 il);

Yol verilən gündəlik doza: 0-20 µg/kq bədən çəkisinə (48th JECFA, 1997).

Marker qalığı: Siflutrin.

Siflutrin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
mal qara				
İri buynuzlu mal qara	Piy	200 µg/kq	26 sessiya (2003 il)	
İri buynuzlu mal qara	Süd	40 µg/l	26 sessiya (2003 il)	

Eritromisin (antibiotik maddə)

JECFA qiymətləndirməsi: 66 iclas (2006 il)

Yol verilən gündəlik doza: 0-0.7 µg/kq bədən çəkisinə (66th JECFA, 2006).

Marker qalığı: Eritromisin A

Eritromisin üçün yol verilən maksimum konsentrasiya

Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
Toyuq	Əzələ	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
Toyuq	Qaraciyər	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
Toyuq	Böyrək	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
Toyuq	Piy	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
Toyuq	Yumurta	50 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	YMK dəri + Piyi daxil edir
Hinduşqa	Əzələ	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
Hinduşqa	Qaraciyər	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	YMK dəri + Piyi daxil edir
Hinduşqa	<i>Böyrək</i>	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	
Hinduşqa	Piy	100 µg/kq	31 sessiya (2008 il)	

Estradiol-17beta (məhsuldarlıq artırıcısı) JECFA qiymətləndirməsi: 25 iclas (1981 il); 32 iclas (1987 il); 52 iclas (1999 il) Yol verilən gündəlik doza: (32nd JECFA, 1987); 0-0.05 µg/kq bədən çəkisinə (52nd JECFA, 1999). Marker qalığı: Estradiol-17beta.				
Estradiol-17beta üçün yol verilən maksimum konsentrasiya				
Növ	Toxuma	YMK	Qəbul edildiyi il	Qeyd
İri buynuzlu mal qara	Əzələ	Əhəmiyyətli deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına müvafiq boy stimulatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqların insan sağlamlığı üçün böyük təhlükə törətmə ehtimalı azdır.
İri buynuzlu mal qara	Qaraciyər	Əhəmiyyətli deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına müvafiq boy stimulatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqların insan sağlamlığı üçün böyük təhlükə törətmə ehtimalı azdır.
İri buynuzlu mal qara	Böyrək	Əhəmiyyətli deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına müvafiq boy stimulatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqların insan sağlamlığı üçün böyük təhlükə törətmə ehtimalı azdır.
İri buynuzlu mal qara	Piy	Əhəmiyyətli deyil	21 sessiya (1995 il)	Lazımi heyvandarlıq praktikasına müvafiq boy stimulatoru kimi bu maddədən istifadə nəticəsində yaranan qalıqların insan sağlamlığı üçün böyük təhlükə törətmə ehtimalı azdır.

BAYTARLIQ PREPARATLARININ QALIQLARINA DAİR RİSKLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ ÜZRƏ TÖVSIYYƏLƏR

Dimetridazol (protozoa qarşı maddə)

Tövsiyə edilən risklərin idarəetmə tədbirləri

Dimetridazol və onun metabolitləri üçün yeyinti məhsullarda təhlükəsiz qalıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər məlumatların olmamasına baxmayaraq qərar verilmişdir ki, onların qidada mövcudluğu istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir və insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada dimetridazol qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında dimetridazol istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır

İpronidazol (protozoa qarşı maddə)

Tövsiyə edilən risklərin idarəetmə tədbirləri

İpronidazol və onun metabolitləri üçün yeyinti məhsullarda təhlükəsiz qalıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər məlumatların olmamasına baxmayaraq qərar verilmişdir ki, onların qidada mövcudluğu istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir və insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada ipronidazol qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında ipronidazol istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır

Karbadoks (boy stimulyatoru və antibiotik maddə)

Tövsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Mövcud elmi məlumatlara əsasən yeyinti məhsullarında karbadoks və ya onun metabolitləri üçün təhlükəsiz qalıq səviyyəsi mövcud deyil. Buda istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada karbadoksun qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında karbadoks istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Metronidazol (protozoa qarşı maddə)

Tövsiyə edilən risklərin idarəetmə tədbirləri

Metronidazol və onun metabolitləri üçün yeyinti məhsullarda təhlükəsiz qalıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər məlumatların olmamasına baxmayaraq qərar verilmişdir ki, onların qidada mövcudluğu istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir və insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada metronidazol qalıqlarının mövcudluğuna yol

verilməməlidir. Qida heyvandarlığında metronidazol istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Yaşıl malaxit (göbələyə qarşı və antiprotozoal maddə)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Mövcud elmi məlumatlara əsasən yeyinti məhsullarında yaşıl malaxit və ya onun metabolitləri üçün təhlükəsiz qalıq səviyyəsi mövcud deyil. Buda istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada yaşıl malaxitin qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında yaşıl malaxit istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Nitrofural (antibiotik maddə)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Nitrofural və onun metabolitləri üçün yeyinti məhsullarda təhlükəsiz qalıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər məlumatların olmamasına baxmayaraq qərar verilmişdir ki, onların qidada mövcudluğu istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir və insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada nitrofuralın qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında nitrofural istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

¹Semikarbazid nitrofuralın istifadə edilməsinin göstəricisi deyil və aşağı səviyyələrdə digər icazə verilən mənbə ilə bağlı ola bilər.

Olakvindoks (antibakterial maddə)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Olakvindoks və onun metabolitləri üçün yeyinti məhsullarda təhlükəsiz qalıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər məlumatların olmamasına baxmayaraq qərar verilmişdir ki, onların qidada mövcudluğu istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir və insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada olakvindoksun qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında olakvindoks istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Ronidozol (protozoa qarşı maddə)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Ronidazol və onun metabolitləri üçün yeyinti məhsullarda təhlükəsiz qalıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər məlumatların olmamasına baxmayaraq qərar verilmişdir ki, onların qidada mövcudluğu istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir və insan sağlamlığı üçün çox

təhlükəlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidadaronidazol qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında roninidazol istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Stilbenez (boy stimulyatoru)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Mövcud elmi məlumatlara əsasən yeyinti məhsullarında stilbenez və ya onun metabolitləri üçün təhlükəsiz qalıq səviyyəsi mövcud deyil. Buda istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada stilbenezin qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında stilbenez istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Furazolidon (antibiotik maddə)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Mövcud elmi məlumatlara əsasən yeyinti məhsullarında furazolidon və ya onun metabolitləri üçün təhlükəsiz qalıq səviyyəsi mövcud deyil. Buda istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada furazolidon qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında furazolidon istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Xloramfenikol (antibiotik maddə)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Mövcud elmi məlumatlara əsasən yeyinti məhsullarında xloramfenikol və ya onun metabolitləri üçün təhlükəsiz qalıq səviyyəsi mövcud deyil. Buda istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada xlorfenikolun qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında xlorfenikol istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Xlorpromazin (sakitləşdirici maddə)

Təvsiyə edilən risklərin idarə etmə tədbirləri

Xlorpromazid və onun metabolitləri üçün yeyinti məhsullarda təhlükəsiz qalıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər məlumatların olmamasına baxmayaraq qərar verilmişdir ki, onların qidada mövcudluğu istehlakçılar üçün risk kimi qəbul edilməlidir və insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qidada xlorpromazinin qalıqlarının mövcudluğuna yol verilməməlidir. Qida heyvandarlığında xlorpromazin istifadə etməməklə buna nail olunmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsinin 14 dekabr 2015-ci il
tarixli 150111500016 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.