

20 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel fixant des mesures d' application pour les listes des variétés de plantes fruitières destinées à la production de fruits et de matériels de multiplication de ces plantes, listes tenues par les fournisseurs.

Article 1. Le présent arrêté fixe les mesures d' application pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à l' article 9, § 2, 2° de l' arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l' exception des semences de légumes.

Art. 2. § 1. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :

- a) le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;
- b) des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;
- c) des descriptions de la variété au moins sur la base des caractères et de leurs niveaux d' expression, tels qu' ils sont spécifiés à l' annexe du présent arrêté;
- d) des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

§ 2. Les points b) et d) du § 1er du présent article ne s' appliquent pas aux fournisseurs dont l' activité se limite à la mise sur le marché de plantes fruitières ou de matériels de multiplication de plantes fruitières.

Bruxelles, le 20 juillet 1995.

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1. Caractères de variétés et leurs niveaux d' expression.

Citrus sp.

Jeune pousse : pigmentation anthocyannique du sommet (10 a 15 cm du sommet)

- absente
- présente

Fruit : forme de l'extremite distale

- en creux
- tronquée
- arrondie
- légerement protubérante
- fortement protubérante

Fruit : couleur de la surface

- verte
- verte a jaune
- jaune
- jaune a orange
- orange
- orange a rouge
- rose
- rouge
- pourpre

Epoque de maturité du fruit

- très précoce
- précoce

moyenne
tardive
tres tardive

Corylus avellana L.

Epoque de debourrement (quand deux feuilles emergent du
bourgeon)

tres precoc
tres precoc a precoc
precoc
precoc a moyennement precoc
moyennement precoc
moyennement precoc a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive

Epoque de la floraison male

tres precoc
tres precoc a precoc
precoc
precoc a moyennement precoc
moyennement precoc
moyennement precoc a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive

Epoque de la floraison femelle

tres precoc
tres precoc a precoc
precoc
precoc a moyennement precoc
moyennement precoc
moyennement precoc a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive

Involucre : longueur par rapport a la longueur du fruit

plus court
de meme longueur
plus long

Involucre : echancrure

faible
moyenne
forte

Involucre : dentelure du bord des echancrures

faible
moyenne
forte

Fruit : grosseur

tres petit
petit
moyen
gros
tres gros

Fruit : forme generale

globuleux
conique
ovoïde
subcylindrique court
subcylindrique long
Epoque de maturite
tres precoc
tres precoc a precoc
precoc
precoc a moyennement precoc
moyennement precoc
moyennement precoc a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive
Fruit : pourcentage d'amandon (en poids)
tres faible
faible
moyen
elevation
tres elevation

Cydonia
Plante : port
erige
demi-erige
etale
Limbe : forme
elliptique
obovale
ovale
arrondi
Fruit : forme generale
globuleux
ovale
pyriforme
retreci
irregulier
oblong

Fragaria x. Ananassa duch.
Inflorescence : position par rapport au feuillage
en-dessous
au meme niveau
au-dessus
Fruit : grosseur
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit : forme la plus frequente
reniforme
plati
globuleux

- conique
- biconique
- presque cylindrique
- cuneiforme
- ovoide
- cordiforme

Fruit : couleur

- jaune blanchatre
- orange pale
- orange
- rouge orange
- rouge
- pourpre
- pourpre fonce

Epoque de maturite : (50% des plantes avec des fruits murs)

- tres precocce
- precocce
- moyenne
- tardive
- tres tardive
- Remontee
- non remontante
- partiellement remontante
- remontante

Juglans regia L.

Epoque de debourrement

- tres precocce
- tres precocce a precocce
- precocce
- precocce a moyenne
- moyenne
- moyenne a tardive
- tardive
- tardive a tres tardive
- tres tardive

Arbre : type de l'inflorescence femelle

- simple
- en groupes

Arbre : type de ramification des rameaux avec fleurs femelles

- indetermine
- determine

Epoque de maturite

- precocce
- precocce a moyenne
- moyenne
- moyenne a tardive
- tardive

Malus

Arbre : vigueur

- faible
- moyenne
- forte

Fruit : forme

globuleuse
conique globuleuse
conique globuleuse trapue
aplatie
globuleuse aplatie
conique
conique allongee
conique tronquee
ellipsoide
conique ellipsoide (ovale)
oblongue
conique oblongue
oblongue retrecie

Fruit : couleur du lavis de l'epiderme

orange
rouge
violet
brunatre

Epoque de debut de floraison

(10 % des fleurs epanouies)

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Varietes porte-greffes

arbre : vigueur (en marcottiere)

faible
moyenne
forte

arbre : nombre de rameaux basaux (en marcottiere)

tres petit
petit
moyen
grand
tres grand

Olea europea L.

Fruit : forme

allonge
elliptique
globuleux

Fruit : mucron

absent
present

Fruit : forme de la base

arrondie
tronquee
deprimee

Fruit : largeur de la cuvette pedonculaire

etroite
moyenne
large

Prunus amygdalus Batsch

Epoque de debut de floraison

- tres precocce
- tres precocce a precocce
- precocce
- precocce a moyenne
- moyenne
- moyenne a tardive
- tardive
- tardive a tres tardive
- tres tardive

Fleur : couleur des petales

- blanc
- blanc rose
- rose
- rose fonce

Epoque de maturite

- tres precocce
- precocce
- moyenne
- tardive
- tres tardive

Fruit sec : forme du sommet

- aplati
- arrondi
- pointu

Amandon : forme

- elliptique etroit
- elliptique
- elliptique large
- elliptique tres large

Prunus armeniaca L.

Fruit : taille

- petit
- moyen
- gros

Fruit : profondeur de la cavite pedonculaire

- peu profonde
- moyenne
- profonde

Fruit : couleur de fond de la peau

- blanche
- creme a jaune
- orange clair
- orange
- orange fonce

Fruit : couleur de la chair

- blanche
- creme
- orange clair
- orange
- orange fonce

Epoque de debut de floraison (quand l'arbre presente quelques fleurs pleinement epanouies)

precoce
moyenne
tardive

Epoque de maturite

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Prunus avium L.

Prunus cerasus L.

Epoque de floraison

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Fruit : grosseur

tres petit
petit
moyen
grand
tres grand

Fruit : couleur de l'epiderme

jaune
rouge orange
vermillon sur fond jaune pale
vermillon
pourpre
noir

Fruit : epoque de maturite

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Prunus domestica L.

Fruit : taille (a la maturite physiologique)

tres petit
petit
moyen
gros
tres gros

Fruit : forme generale en vue de profil (a la maturite physiologique)

arrondie aplatie
arrondie
oblongue
allongee

Fruit : couleur de fond de l'epiderme (avec la pruline;
a la maturite physiologique)

blanchatre (transparent)
verte

vert jaunatre
jaune
jaune orange
rouge
violet
bleu violace

Fruit : couleur de la chair (a la maturite
physiologique)

blanchatre
jaune
vert jaunatre
verte
orangee
rouge

Noyau : adherence a la chair (a la
maturite physiologique)

non adherant
semi-adherant
adherant

Noyau : taille par rapport au fruit (a la maturite
physiologique)

petit
moyen
grand

Epoque de maturite

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Prunus persica (L.) Batsch

Arbre : type

normal
spur

Rameau mixte : pigmentation anthocyanique

absente
presente

Epoque de debut de floraison

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Fleur : forme

rosacee
campanulee

Petale : taille

tres petit
petit
moyen
gros
tres gros

Petiole : nectaries

absente

presente
Petiole : forme des nectaries
circulaire
reniforme
Fruit : pubescence
absente
presente
Fruit : couleur de fond de la chair
blanche
jaune a jaune orange
rouge
Noyau : adherence a la chair
absente
presente
Epoque de maturite
tres precoc
precoc
moyenne
tardive
tres tardive

Prunus salicina L.

Fruit : taille
tres petit
petit
moyen
grand
tres grand
Fruit : couleur de fond de la peau
blanchatre (transparente)
verte
vert jaunatre
jaune
orange a jaune
rouge
pourpre
bleu violace
bleu fonce
Fruit : couleur de la chair
blanchatre
jaune
vert jaunatre
verte
orange
rouge
Epoque de floraison
tres precoc
precoc
moyenne
tardive
tres tardive
Epoque de maturite
tres precoc
precoc
moyenne

tardive
tres tardive

Pyrus communis L.

Epoque de pleine floraison

tres precoc
precoc
moyenne
tardive
tres tardive

Fruit : grosseur

tres petit
petit
moyen
gros
tres gros

Fruit : profil (en section longitudinale)

concave
droit
convexe

Fruit : longueur par rapport au plus grand diametre

tres court
court
intermediaire
allonge
tres allonge

Fruit : couleur de fond de l'epiderme (a maturite)

vert
jaune-vert
jaune
rouge

Fruit : longueur du pedoncule

court
moyen
long

Epoque de maturite de recolte

tres precoc
precoc
moyenne
tardive
tres tardive

Ribes silvestre Mert et Koch et Ribes niveum Lindl.

(Groseillier a grappes)

Epoque de maturite

tres precoc
precoc
moyenne
tardive
tres tardive

Grappe : longueur (pedoncule inclus)

tres precoc
precoc
moyenne

longue
tres longue
Baie : taille
tres petite
petite
moyenne
grosse
tres grosse
Baie : couleur
blanche
jaune blanchatre
rose
rouge

Ribes uva-crispa L.
(Groseilliers a maquereau)

Plante : forme
ovoide
globuleuse
ellipsoide transverse
Fruit : taille
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit : forme
globuleux
ellipsoide
pyriforme
Fruit : couleur
jaune
vert-jaune
verte avec teinte blanche
verte
rouge
Epoque de maturite des fruits
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Ribes nigrum L. (Cassis)
Plante : rapport hauteur/diametre
petit
moyen
grand
Fruit : taille
tres petit
petit
moyen
grand
tres grand
Epoque de maturite des fruits

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi et Ursini (Ronce
fruitiere) et hybrides

Plante : port

dresse
dresse a demi-dresse
demi-dresse
demi-dresse a etale
etale

Canne dormante : epines

absentes
presentes

Fruit : taille

tres petit
petit
moyen
grand
tres grand

Epoque de debut de maturite

tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Rubus idaeus L. (Framboisier)

Canne : nombre de jeunes pousses

tres faible
faible
moyen
eleve
tres eleve

Seulement les varietes dont la recolte principale
est sur la canne de l'annee precedente en
ete :

Canne dormante : couleur

brun grisatre
brun grisatre a brune
brune
brune a brune pourpre
brun-pourpre

Fruit : couleur

jaune
rouge clair
rouge vif
rouge sombre
orange
pourpre
noir

Fruit : grosseur

tres petit

petit

moyen

gros

tres gros

Fruit : rapport longueur/largeur

aussi long que large

plus long que large

beaucoup plus long que large

Recolte principale

- sur la canne de l'annee precedente en ete

- sur la jeune canne en automne

Epoque de maturite sur cannes de l'annee precedente

tres precoce

precoce

moyenne

tardive

tres tardive

Bruxelles, le 20 juillet 1995.

Le Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN