

Ministerio de Salud

FIJA TOLERANCIAS MAXIMAS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS DE CONSUMO INTERNO

Resolución No. 581 exenta.- Santiago, 23 de febrero de 1999.- Visto: lo establecido en los artículos 4º y 6º del decreto ley No. 2.763, de 1979, y en los artículos 1º, 97 y 162 del decreto supremo No. 977, del 6 de agosto de 1996, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y

Considerando:

-Que es necesario actualizar las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de consumo interno, establecidos en la resolución exenta No. 1.450, del 13 de diciembre de 1982, del Ministerio de Salud.

-Que se ha revisado y utilizado como referencia para la adopción de límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, las recomendaciones correspondientes a la 29ª reunión, del 7 al 12 de abril de 1997, del Comité del Codex Alimentarius sobre Residuos de Plaguicidas, considerando solamente los plaguicidas que han alcanzado el último trámite, previo a aprobación (CXL), y

-Que teniendo presente que el Codex Alimentarius, es una Comisión del Programa Conjunto de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

1º.- Fíjense las siguientes tolerancias o límites máximos de plaguicidas en los alimentos de consumo interno en la forma que a continuación se indica,

- Límite Máximo de Residuos (LMR) es la concentración máxima de un residuo de plaguicida resultante del uso de un plaguicida de acuerdo a prácticas agrícolas correctas recomendadas por la Comisión del Codex Alimentarius FAO/OMS.
- La concentración se expresa en miligramos del residuo por kilogramo del alimento.
- Los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos en alimentos de consumo interno, son los siguientes:

1.- ACEFATO

IDA 0,03 mg/kg de peso corporal

RESIDUO Acefato (el metabolito O,S-dimetil-fosforamidotioato es metamidofos, que tiene recomendaciones propias).

LMR

Carne de ave	0,1	
Carne de porcino	0,1	
Carne de vacuno	0,1	
Grasa de ave	0,1	
Grasa de cerdo, vacuno	0,1	
Huevos	0,1	
Leche	0,1	
Lechugas		5
Papas	0,5	

2.- ALDICARB

IDA 0,003 mg/kg de peso corporal

RESIDUO Suma de aldicarb, su sulfóxido y su sulfona, expresada como aldicarb.

Camote	0,1	
Carne, de mamíferos diferentes de los marinos	0,01 (*)	
Frutos cítricos	0,2	
Leche	0,01 (*)	
Maíz		0,05
Papas	0,5	

	Plátano	0,5	
	Porotos	0,1	
	Remolacha azucarera	0,05 (*)	
3.-	ALDRIN Y DIELDRIN		
	IDA 0,0001 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de aldrin y dieldrin (liposoluble)		
	Carne de mamíferos, excepto marinos	0.2 (grasa)	
	Cereales en grano	0.02	
	Huevos	0.1	
	Leches	0.006	
4.-	AMITRAZ		
	IDA 0,003 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de amitraz y N. (2, 4- dimetilfenil)-N" metilformamidina, calculada como N- (2,4 dimetilfenil) -N" metilformamidina.		
	Carne de ovino	0,1	
	Carne de porcino	0,05	
	Carne de vacuno	0,05	
	Cerezas	0,5	
	Despojos comestibles, vacuno, porcino, ovino	0,2	
	Duraznos		0,5
	Frutas pomáceas	0,5	
	Leche	0,01 (*)	
	Naranjas		0,5
	Pepinos ensalada	0,5	
	Tomates		0,5
5.-	ANILAZINA		
	IDA 0,1 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Anilazina		
	Apio		10.0
	Carne de aves	0.02 (*)	
	Carne de caprino	0.02 (*)	
	Caprino, despojos comestibles	0.02 (*)	
	Carne de vacuno	0.02 (*)	
	Cebada	0.2	
	Despojos comestibles de aves de corral	0.02 (*)	
	Huevos	0.02 (*)	
	Leche	0.01 (*)	
	Tomates		10.0
	Vacuno, despojos comestibles	0.02 (*)	
6.-	AZINFOS METILO		
	IDA 0,005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Azinfos metilo		
	Almendras		0,2
	Arándanos		5,0
	Brócoli	1.0	
	Cereales en granos	0.2	
	Duraznos		4.0
	Frutas (excepto que se indique otra cosa)	1.0	
	Hortalizas (excepto que se indique otra cosa)		0.5
	Melones		0.2
	Nueces	0.3	
	Papas	0.05 (*)	
	Pepinos ensalada	0.2	

	Pimentón		1.0
	Sandías	0.2	
7.-	AZOCICLOTIN		
	IDA 0,007 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de aziclotin y cyhexatin, expresada como cyhexatin		
	Berenjenas	0,1 (*)	
	Carne, de mamíferos distintos a los marinos	0,2	
	Frutillas		0,5
	Frutos cítricos	2,0	
	Leche	0,05 (*)	
	Melones		0,5
	Pepinos ensalada	0,5	
	Pimentón		0,5
	Porotos verdes	0,2	
	Productos lácteos	0,05 (*)	
	Uvas		0,2
8.-	BENALAXILO		
	IDA 0,05 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Benalaxilo		
	Cebollas bulbo	0,2	
	Lúpulo deshidratado	0,2	
	Melones		0,1
	Papas	0,02 (*)	
	Pepinos ensalada	0,05	
	Pimentón		0,05
	Tomates		0,5
	Uvas		0,2
9.-	BENDIOCARB		
	IDA 0,004 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Bendiocarb no conjugado para plantas; Suma de conjugado y no conjugado para productos animales.		
	Carne de vacuno	0,05 (*)	
	Carne de aves	0,05 (*)	
	Huevos	0,05 (*)	
	Maíz		0,05 (*)
	Leche	0,05 (*)	
	Papas	0,05 (*)	
10.-	BENOMILO		
	IDA 0,1 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Carbendazin		
	Véase compuestos afines		
11.-	BIFENTRIN		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Bifentrin (Liposoluble)		
	Carne de vacuno	0,5 (grasa)	
	Carne de pollo	0,05 (*) (grasa)	
	Despojos comestibles de pollo	0,05 (*)	
	Frutillas		1
	Grasa de pollo	0,05 (*)	
	Hígado de vacuno	0,05 (*)	
	Huevos de gallina	0,01 (*)	
	Limones		0,05 (*)
	Papas	0,05	
	Peras	0,5	
	Riñones de vacuno	0,05 (*)	

12.-	BIORESMESTRIN		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Bioresmetrin		
	Germen de trigo		3,0
	Harina de trigo	1,0	
	Harina integral de trigo	1,0	
	Salvado de trigo, sin elaborar	5,0	
13.-	BITERTANOL		
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal.		
	RESIDUO Bitertanol		
	Cerezas		2,0
	Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas		2,0
	Damascos		1,0
	Duraznos		1,0
	Frutas pomáceas		2,0
	Maní		0,1 (*)
	Nectarines		1,0
	Pepinos ensalada		0,5
	Plátanos		0,5
	Porotos verdes		0,5
14.-	BROMOPROPILATO		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO: Bromopropilato		
	Arándanos		25
	Frutillas		20
	Manzanas		20
	Peras		25
	Tomate		15
	Pasas		5
15.-	BROMURO INORGANICO		
	IDA 1 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO ION BROMURO de todas las precedencias, sin incluir el bromo de enlace covalente.		
	Apio		300
	Cereales en granos		50
	Ciruelas		20
	Dátiles deshidratados	100	
	Especias		400
	Frutas (a no ser que se indique otra cosa)	20	
	Frutas deshidratadas	30	
	Frutillas		30
	Frutos cítricos	30	
	Harina integral de trigo	50	
	Hierbas aromáticas deshidratadas	400	
	Higos deshidratados		250
	Huesillos		50
	Lechugas		100
	Palta		75
	Pasas		100
	Porotos verdes		500
	Repollo		100
	Tomate		75
16.-	CADUSAFOS		
	IDA 0,0003 mg/kg de peso corporal		

	RESIDUO Cadusafos		
	Papas	0,02	
	Plátanos		0,01 (*)
17.-	CAPTAN		
	IDA 0,1 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Captan		
	Arándanos		20.0
	Duraznos		15.0
	Frutillas		20.0
	Manzanas		25.0
	Peras	25.0	
	Tomates		15.0
18.-	CARBARILO		
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Carbaril		
	Aceitunas		10.0
	Arándanos		7.0
	Arroz	5.0	
	Arroz descascarado	5.0	
	Arvejas	100.0	
	Berenjenas	5,0	
	Carne de vacuno	0,2	
	Cerezas	10,0	
	Ciruelas, incluye ciruelas deshidratadas 10,0		
	Damascos		10,0
	Duraznos		10,0
	Espárragos	10,0	
	Frambuesas	10.0	
	Frutillas		7.0
	Frutos cítricos	7.0	
	Harina de trigo	0.2	
	Hortalizas de hoja	10,0	
	Huevos	0,5	
	Kiwi		10.0
	Leche	0.1 (*)	
	Manzanas		5.0
	Melones		3,0
	Moras	10.0	
	Nectarines	10.0	
	Nueces enteras	10.0	
	Papas	0.2	
	Pepinos ensaladas	3,0	
	Peras	5.0	
	Plátanos		5.0
	Poroto verde	5.0	
	Productos lácteos	0.1 (*)	
	Repollo	5,0	
	Tomates		5,0
	Uvas		5.0
	Zanahorias	2.0	
19.-	CARBENDAZIM		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Carbendazim		
	Los LMR se refiere a los residuos de carbendazim presentes como metabolitos del benomilo o tiofanato-metilo, o del uso directo de		

carbendazim. Base de datos B= benomilo; C= carbendazim; T= tiofanato-metilo.

	Apio		2,0
	Berenjenas	0,5	
	Camote	1,0	
	Carne de aves, ovino, vacuno	0,1 (*)	
	Cebollas bulbo	2,0	
	Espárragos	0,1 (*)	
	Grasa de pollo	0,1 (*)	
	Habas (vainas verdes y semillas no maduras)	2,0	
	Huevos	0,1 (*)	
	Leche	0,1 (*)	
	Lúpulo deshidratado	50	
	Mango	2,0	
	Maní		0,1 (*)
	Melones		2,0
	Nueces	0,1 (*)	
	Paltas	0,5	
	Papas	3,0	
	Pepinos ensalada	0,5	
	Plátanos		1,0
	Porotos	2,0	
	Porotos verdes	2,0	
	Remolacha azucarera	0,1 (*)	
	Repollo de Bruselas	0,5	
20.-	CARBOFURAN		
	IDA 0,002 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de carbofuran y de 3- hidroxicarbofuran, expresada como carbofuran.		
	Arroz descascarado	0,2	
	Berenjenas	0,1 (*)	
	Carne de vacuno, caprino, equino, porcino, ovino	0,05(*)	
	Cebollas, bulbo	0,1 (*)	
	Coliflor	0,2	
	Despojos comestibles (vacuno, equino, porcino, ovino)	0,05 (*)	
	Duraznos		0,1 (*)
	Frutillas		0,1 (*)
	Grasa de cerdo	0,05 (*)	
	Grasa de ovino	0,05 (*)	
	Grasa de vacuno	0,05 (*)	
	Leche	0,05 (*)	
	Lechugas		0,1 (*)
	Lúpulo desecado	5,0	
	Maíz		0,1 (*)
	Maíz dulce (granos)	0,1 (*)	
	Papas	0,5	
	Plátanos		0,1
	Peras	0,1 (*)	
	Repollo	0,5	
	Repollo de Bruselas	2,0	
	Tomate	0,1 (*)	
	Zanahorias	0,5	
21.-	CARPAT		

	IDA 0,1 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Carpat		
	Arroz descascarado	0,1	
	Lúpulo deshidratado	5,0	
	Maíz dulce	0,1	
	Papas	0,1	
	Repollo	0,2	
	Té, verde y negro	20	
	Uvas		1,0
22.-	CICLODIXIM		
	IDA 0,07 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Ciclodixim		
	Hortalizas del género Brassica	2,0	
	Porotos verdes	1,0	
	Zanahorias	0,5	
23.-	CIFLUTRIN		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Ciflutrin (liposoluble)		
	Leche de vaca	0,01	
	Maíz		0,05
	Manzanas		0,5
	Pimentón		0,2
	Tomates		0,5
24.-	CIHALOTRIN		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Cihalotrin (suma de todos los isómeros)		
	Frutas pomáceas	0,2	
	Papas	0,02 (*)	
	Repollo	0,2	
25.-	CIHEXATIN		
	IDA 0,007 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de azoclotin y cihexatin, expresada como cihexatin.		
	Berenjenas	0,1 (*)	
	Carnes (mamíferos excepto marinos)	0,2	
	Frutillas		0,5
	Frutos cítricos	2,0	
	Leche	0,05 (*)	
	Manzanas		2,0
	Melones		0,5
	Pepinos ensalada	0,5	
	Peras	2,0	
	Pimentón		0,5
	Porotos verdes	0,2	
	Productos lácteos	0,05 (*)	
	Tomates		2,0
	Uvas		0,2
26.-	CIPERMETRIN		
	IDA 0,05 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Cipermetrin (suma de los isómeros) (Liposolubles)		
	Aceites comestibles vegetales	0,5	
	Arvejas		0,05 (*)
	Bayas y otras frutas pequeñas	0,5	
	Berenjenas		0,2
	Carne de aves		0,05 (*)

	Carne, de mamíferos distintos a los marinos	0,2 (grasa)		
	Cebollas bulbo		0,1	
	Cerezas		1,0	
	Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas		1,0	
	Despojos comestibles (mamíferos)	0,05 (*)		
	Duraznos			2,0
	Espinacas			2,0
	Frutas pomáceas		2,0	
	Frutos cítricos	2,0		
	Hortalizas del género Brassica	1,0		
	Huevos		0,05 (*)	
	Leches		0,05 (*)	
	Lechugas			2,0
	Maíz			0,05 (*)
	Maíz dulce		0,05 (*)	
	Maní			0,05 (*)
	Nectarines		2,0	
	Pepinos ensalada		0,2	
	Pimentón			0,5
	Porotos		0,05 (*)	
	Porotos verdes		0,5	
	Puerro		0,5	
	Raíces y tubérculos		0,05 (*)	
	Semillas oleaginosas, excepto maní	0,2		
	Té			20,0
	Tomates			0,5
27.-	CIROMAZINA			
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Ciromazina			
	Apio			5.0
	Carne de aves		0.05 (*)	
	Carne de ovino		0.05 (*)	
	Huevos		0.2	
	Leche		0.01 (*)	
	Lechugas			5.0
	Melones			0.2
	Pepinos ensalada		0.2	
	Tomates			0.5
28.-	CLOFENTEZINA			
	IDA 0,02 mg/k de peso corporal			
	RESIDUO Productos vegetales, clofentezina; productos animales, suma de todos los compuestos que contienen la porción de 2 clorobenzoilo, expresada como clofentezina.			
	Carne de aves		0,05 (*)	
	Carne de vacuno		0,05 (*)	
	Despojos comestibles de aves de corral	0,05 (*)		
	Frutas de hueso	0,2		
	Frutas pomáceas		0,5	
	Frutillas			2,0
	Frutos cítricos	0,5		
	Huevos		0,05 (*)	
	Leche de vaca		0,01 (*)	
	Pepinos ensalada		1,0	
	Uvas			1,0

29.-	Vacuno, despojos comestibles	0,1	
	CLORDANO		
	IDA 0,0005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de cis y trans clordano		
	Aceite de soya refinado	0.02	
	Aceite de soya sin refinar	0.05	
	Almendras		0.02
	Arroz pulido (blanco)	0.02	
	Carne de aves		0.5 (grasa)
	Carne de mamíferos, excepto marinos	0.05 (grasa)	
	Frutas y hortalizas		0.02 (*)
	Huevos	0.02	
	Leche	0.002	
	Maíz		0.02
	Nueces	0.02	
30.-	CLORFENVINFOS		
	IDA 0,0005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Clorfenvinfos, suma de isómeros e y z (liposoluble)		
	Apio		0,4
	Arroz	0,05	
	Berenjenas	0,05	
	Brócoli	0,05	
	Carne (de mamíferos no marinos)	0,2 (grasa)	
	Cebollas bulbo	0,05	
	Champiñones	0,05	
	Coliflor	0,1	
	Frutos cítricos	1.0	
	Leche de cabra, vaca y oveja	0,008	
	Maíz		0,05
	Maní		0,05
	Papas	0,05	
	Puerro	0,05	
	Rábano	0,1	
	Repollo	0,05	
	Repollo de Bruselas	0,05	
	Tomates		0,01
	Zanahorias	0,4	
31.-	CLOROTALONILO		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Clorotalonilo		
	Apio		15
	Brócolis		5,0
	Cebollas, bulbo	0.5	
	Cereza	0.5	
	Coliflor	1,0	
	Durazno		25
	Frambuesas	10	
	Frutos cítrico	5,0	
	Grosellas		25
	Maní		0.05
	Pepino ensalada	5,0	
	Plátano	0.2	
	Porotos verdes	5,0	
	Repollo	5,0	
	Repollo de Bruselas	5,0	

	Tomate	5,0	
	Uvas		0.5
	Zanahorias	1,0	
32.-	CLORPIRIFOS		
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Clorpirifos etilo (liposoluble)		
	Apio		0,05 (*)
	Arroz	0,1	
	Berenjenas	0,2	
	Carne de vacuno	2.0 (grasa)	
	Carne de ovino	0,2 (grasa)	
	Carne de pavo	0,2 (grasa)	
	Carne de pollo	0,1 (grasa)	
	Cebollas bulbo	0,05	
	Frutos cítricos	0,3	
	Huevos	0,05 (*)	
	Coliflor	0,05 (*)	
	Frambuesas	0,2	
	Kiwi		2,0
	Leche	0,01 (*)	
	Lechugas arrepolladas	0,1	
	Manzanas		1,0
	Papas	0,05 (*)	
	Pasas	2,0	
	Peras	0,5	
	Porotos verdes	0,2	
	Remolacha azucarera	0,05 (*)	
	Tomates		0.5
	Uvas		1,0
	Zanahorias	0,5	
33.-	CLORPIRIFOS-METILO		
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Clorpirifos-metilo (liposoluble)		
	Alcachofas	0,1	
	Arroz	0,1	
	Berenjenas	0,1	
	Despojos comestibles de pollo	0,05	
	Harina de trigo	2,0	
	Huevos	0,05	
	Leche	0,01 (*)	
	Lechugas		0,1
	Maíz		10
	Porotos verdes	0,1	
	Rábano	0,1	
	Salvado de trigo sin elaborar	20	
	Té		0,1
	Tomate	0,5	
	Vacuno, despojos comestibles	0,05	
34.-	2,4 -D		
	IDA -0,3 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO 2,4 -D		
	Arroz		0,05 (*)
	Carne (de mamíferos no marinos)	0,05 (*)	
	Frambuesas		0,1
	Frutos cítricos	2,0	

	Huevos		0,05 (*)	
	Leche		0,05 (*)	
	Maíz			0,05 (*)
	Papas		0,2	
	Productos lácteos		0,05 (*)	
35.-	DDT			
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Suma de DDE, DDD y DDT			
	Carne de mamíferos, excepto marinos	5.0 (grasa)		
	Cereales en grano		0.1	
36.-	DELTAMETRINA			
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Deltametrina (liposoluble)			
	Aceitunas			0,1
	Alcachofa			0,05
	Cacao en grano		0,05	
	Carne (de mamíferos excepto marinos)	0,5 (grasa)		
	Carne de aves		0,01 (*)	
	Cereales en grano		1,0	
	Despojos comestibles (mamíferos)		0,05	
	Despojos comestibles de aves de corral	0,01 (*)		
	Frutas de hueso		0,05	
	Frutas pomáceas		0,1	
	Frutillas			0,05
	Harina de trigo	0,2		
	Harina integral de trigo	1,0		
	Higos		0,01 (*)	
	Hortalizas de bulbo		0,1	
	Hortalizas cucurbitáceas		0,2	
	Hortalizas de frutos no cucurbitáceas	0,2		
	Hortalizas de hoja		0,5	
	Hortalizas leguminosas		0,1	
	Hortalizas del género Brásicas	0,2		
	Huevos		0,01 (*)	
	Kiwi			0,05
	Leche		0,02	
	Lentejas secas		1,0	
	Mandarinas		0,05	
	Maní			0,01 (*)
	Melones			0,01 (*)
	Naranjas			0,05
	Piña			0,01 (*)
	Plátano		0,05	
	Porotos		1,0	
	Raíces y tubérculos		0,01	
	Salvado de trigo sin elaborar	5,0		
	Té			10,0
	Uvas			0,05
37.-	DIAZINON			
	IDA 0,002 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Diazinon (liposoluble)			
	Almendras			0,05
	Carne de vacuno, porcino y ovino	0,7 (grasa)		
	Cebollas bulbo		0,05	
	Frutas (a no ser que se indique otra cosa)	0,5		

	Hojas y coronas de remolacha azucarera	5,0		
	Leche		0,02	
	Maíz			0,02 (*)
	Maíz dulce		0,02	
	Nueces		0,01 (*)	
	Papas		0,01 (*)	
	Pimentón			0,05
38.-	DICLOFLUANIDA			
	IDA 0,3 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Diclofluanida			
	Berenjenas		1,0	
	Cebollas, Bulbo	0,1		
	Cerezas		2,0	
	Duraznos			5,0
	Frambuesas		15	
	Frutillas			10
	Lechugas			10
	Manzanas			5,0
	Papas		0,1	
	Pepinos ensalada		5,0	
	Peras		5,0	
	Porotos verdes		2,0	
	Tomates			2,0
	Uvas			15
39.-	DICLORAN			
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Dicloran			
	Cebolla		10	
	Cerezas		15	
	Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas		10	
	Damascos			10
	Duraznos			15
	Frambuesas		10	
	Frutillas			10
	Lechugas			10
	Nectarines		10	
	Porotos verdes		2,0	
	Tomate		0,5	
	Uvas			10
	Zanahorias		10	
40.-	DICLORVOS			
	IDA 0,004 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUOS Diclorvos			
	Los residuos disminuyen rápidamente durante el almacenamiento y el transporte LMR del Codex se basan en los residuos que pueden encontrarse al momento de la cosecha o matanza.			
	Carne (de mamíferos no marinos)	0,05 (*)		
	Carne de aves		0,05	
	Champiñones		0,5	
	Leche		0,02 (*)	
41.-	DICOFOL			
	IDA 0,002 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Productos de origen vegetal, dicofol (suma de los isómeros o,p' y p,p') (liposoluble).			

Productos de origen animal, suma de dicofol y 2,2 -dicloro- 1,1 -bis (4 -clorofenil) etanol (p,p' -FW 152) calculada como dicofol (liposoluble).			
	Frutas (a menos que se indique otra cosa)	5,0	
	Huevos		0,05
	Lúpulo deshidratado		50
	Melones		0,2
	Nueces		0,01 (*)
	Pepinos ensalada		0,5
	Porotos		0,1
	Té		5,0
	Tomates		1,0
42.-	DIFENILAMINA		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Difenilamina		
	Manzanas		5,0
43.-	DIMETIPIN		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Dimetipin		
	Despojos comestibles (mamíferos)	0,02 (*)	
	Huevos		0,02 (*)
	Carne, de mamíferos excepto marinos	0,02 (*)	
	Leche		0,02 (*)
	Papas		0,05 (*)
	Aceite comestible de maravilla	0,02 (*)	
44.-	DIMETOATO		
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Dimetoato		
	Aceite de oliva refinado	0,05 (*)	
	Aceitunas		0,05 (*)
	Achicoria		0,5
	Apio		1,0
	Arvejas	0,5	
	Betarraga		0,2
	Cebollas bulbo	0,2	
	Cerezas	2,0	
	Espinacas		1,0
	Frutillas		1,0
	Frutos cítricos	2,0	
	Hojas o coronas remolacha azucarera	1,0	
	Lúpulo deshidratado		3,0
	Manzanas		1,0
	Papas	0,05	
	Peras	1,0	
	Plátano	1,0	
	Remolacha azucarera	0,05	
	Tomates		1,0
	Uvas		1,0
	Zanahorias	1,0	
45.-	DIQUAT		
	IDA 0,002 mg de catión de diquat/kg de peso corporal		
	RESIDUO Cati3n de diquat		
	Se encuentra normalmente como dibromuro		
	Aceite comestible de maravilla	0,1	
	Aceite comestible de Raps		0,1

	Arroz	5,0	
	Arroz pulido (blanco)	0,2	
	Carne (de mamíferos excepto marinos)	0,05 (*)	
	Cebada	5,0	
	Despojos comestibles (mamíferos)	0,05 (*)	
	Harina de trigo	0,2	
	Harina integral de trigo	2,0	
	Hortalizas (a no ser que se indique otra cosa)	0,05 (*)	
	Huevos	0,05 (*)	
	Leche	0,01 (*)	
	Maíz		0,1
	Papas	0,2	
	Salvado de trigo	5,0	
	Semillas de maravilla	0,5	
46.-	DISULFOTON		
	IDA 0,0003 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de disulfotón, demetón -S y su sulfóxido y sulfona, expresado como disulfotón.		
	Arroz	0,5	
	Cereales en grano	0,2	
	Maíz		0,5
	Maní		0,1
	Papas	0,5	
	Piña		0,1
	Hortalizas (excepto que se indique otra cosa)	0,5	
47.-	DITIANON		
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Ditianon		
	Lúpulo deshidratado	100.0	
48.-	DITIOCARBAMATOS		
	IDA (expresado en Kg de peso corporal) Ferbam y Zidam: 0,003 mg/kg; Thiram: 0,001 mg/kg; Mancozeb, Maneb, Metiram y Zineb: 0,003 mg/kg (solo o en cualquier combinación); Propineb: 0,007 mg/kg		
	RESIDUO CS 2		
	Los LMR se refieren a todos los residuos derivados del uso de cualquiera o todos los grupos de ditiocarbamatos.		
	Apio		5,0
	Cerezas	1,0	
	Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas	1,0	
	Lechugas		5,0
	Lechugas escarola	1,0	
	Manzana		3,0
	Melones		1,0
	Papas	0.1	
	Pepino ensalada	0.5	
	Peras	3,0	
	Plátano	1,0	
	Tomate	3,0	
	Uvas		5,0
	Zanahorias	0.5	
49.-	DODINA		

	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Dodina		
	Cerezas	2,0	
	Duraznos		5,0
	Frutillas		5,0
	Manzanas		5,0
	Peras	5,0	
	Uvas		5,0
50.-	ENDOSULFAN		
	IDA 0.006 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de alfa -y beta -endosulfan y de sulfato de endosulfan (liposoluble)		
	Apio		2,0
	Arroz	0,1	
	Arvejas	0,5	
	Camote	0,2	
	Cerezas	1,0	
	Carnes (de mamíferos excepto marinos)	0,1 (grasa)	
	Cebollas, Bulbo	0,2	
	Ciruelas (incluidas las ciruelas pasas)	1,0	
	Espinacas		2,0
	Frutas (a no ser que se indique otra cosa)	2,0	
	Frutas Pomáceas	1,0	
	Hojas o coronas de remolacha azucarera	1,0	
	Hortalizas (a no ser que se indique otra cosa)		2,0
	Leche	0,004	
	Lechugas		1,0
	Papas	0,2	
	Porotos verdes (vainas y/o semillas no maduras)		0,5
	Remolacha azucarera	0,1	
	Té		30
	Tomate	0,2	
	Zanahorias	0,2	
51.-	ETOFENPROX		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Etofenprox		
	Papas	0,01 (*)	
52.-	ETOPROFOS		
	IDA 0,0003 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Etoprofos		
	Arvejas	0,02 (*)	
	Camote	0,02 (*)	
	Cebollas bulbo	0,02 (*)	
	Frutillas		0,02 (*)
	Lechugas		0,02 (*)
	Maíz		0,02 (*)
	Maní		0,02 (*)
	Melones		0,02 (*)
	Papas	0,02 (*)	
	Pepino ensalada	0,02 (*)	
	Piña		0,02 (*)
	Plátanos		0,02 (*)
	Remolacha		0,02 (*)

	Repollo	0,02 (*)	
	Tomates	0,02 (*)	
	Uvas	0,02 (*)	
53.-	FENAMIFOS		
	IDA 0,0005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de fenamifos, su sulfóxido y sulfina, expresada como fenamifos.		
	Brócoli	0,05 (*)	
	Camote	0,1	
	Coliflor	0,05 (*)	
	Kiwi	0,05 (*)	
	Maní	0,05 (*)	
	Melones	0,05 (*)	
	Naranjas	0,5	
	Papas	0,2	
	Piña	0,05 (*)	
	Plátano	0,1	
	Remolacha azucarera	0,05 (*)	
	Repollo	0,05 (*)	
	Repollo de Bruselas	0,05 (*)	
	Tomate	0,2	
	Uvas	0,1	
	Zanahoria	0,2	
54.-	FENBUTATIN OXIDO		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Fenbatauin óxido		
	Almendras	0,5	
	Carne (mamíferos no marinos)	0,02 (*)	
	Carne de pollo	0,05 (*)	
	Ciruelas (incluidas ciruelas deshidratadas)	3,0	
	Despojo comestibles de pollo	0,05 (*)	
	Duraznos	7,0	
	Frutas pomáceas	5,0	
	Frutillas	10	
	Frutos cítricos	5,0	
	Huevos	0,05 (*)	
	Leche	0,05 (*)	
	Pepinos ensalada	0,5	
	Tomate	1,0	
	Uvas	5,0	
55.-	FENITROTION		
	IDA 0,005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Fenitrotrion (liposoluble)		
	Arroz pulido (blanco)	1,0	
	Arvejas	0,5	
	Berenjenas	0,1	
	Cacao en grano	0,1	
	Carne de mamíferos excepto marinos	0,05 (*) (grasa)	
	Cebollas, bulbo	0,05 (*)	
	Cereales en grano	10	
	Cerezas	0,5	
	Coliflor	0,1	
	Duraznos	1,0	
	Frutillas	0,5	
	Frutos cítricos	2,0	

	Harina de trigo	2,0	
	Harina integral de trigo	5,0	
	Leche		0,002 (*)
	Lechugas		0,5
	Manzanas		0,5
	Pan blanco		0,2
	Papas		0,05 (*)
	Pepinos ensalada		0,05 (*)
	Peras		0,5
	Pimienta		0,1
	Puerro		0,2
	Rábanos		0,2
	Repollo		0,5
	Salvado de trigo, elaborado	2,0	
	Salvado de trigo, sin elaborar	20	
	Té		0,5
	Tomate		0,5
	Uvas		0,5
56.-	FENOTRIN		
	IDA 0,07 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Fenotrin (suma de cis y trans)		
	Germen de trigo		5,0
	Harina de trigo	1,0	
	Harina integral de trigo	2,0	
	Salvado de trigo, sin elaborar	5,0	
57.-	FENTOATO		
	IDA 0,003 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Fentoato (oleosoluble)		
	Arroz desecado		0,05
	Carne de vacuno		0,05 (*)
	Frutos cítricos	1,0	
	Huevos		0,05 (*)
	Leche		0,01 (*)
58.-	FENPROPATRIN		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Fenpropatrin (grasa soluble)		
	Carne de aves		0,02 (grasa)
	Despojos comestibles de aves de corral	0,01 (*)	
	Frutas pomáceas		5
	Huevos		0,01 (*)
	Vacuno, despojos comestibles	0,05	
59.-	FENTION		
	IDA 0,007 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de Fenti3n, su an3logo oxigenado, sulf3xido y sulfona, expresado como fenti3n (liposoluble)		
	Aceite de oliva	1,0	
	Aceitunas		1,0
	Arroz		0,1
	Arroz descascarado		0,05
	Carne de mamíferos distintos a los marinos	2,0 (grasa)	
	Cebollas bulbo		0,1
	Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas		1,0
	Cerezas		2,0
	Duraznos		2,0

	Frutillas		2,0
	Frutos cítricos	2,0	
	Leche		0,05
	Lehugas		2,0
	Manzanas		2,0
	Papas		0,05 (*)
	Peras		2,0
	Plátanos		1,0
	Porotos verdes		0,1
	Repollos		1,0
	Tomates		0,5
	Uvas		0,5
60.-	FENTIN		
	IDA 0,0005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Fentin, incluyendo estaño inorgánico, di y mono fenilestaño.		
	IDA incluye la suma de fentin acetato, cloruro de fentin e hidróxido de estaño.		
	Arroz		0,1 (*)
	Lúpulo deshidratado		0,5
	Papas		0,1
61.-	FLUCITRINATO		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Flucitrinato		
	Frutas pomáceas		0,5
	Lúpulo deshidratado		10
	Maíz		0,05 (*)
	Papas		0,05
	Porotos secos		0,05 (*)
	Repollos		0,5
	Tomates		0,2
	Uvas		1,0
62.-	FOSALONA		
	IDA 0,001 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Fosalone		
	Manzanas		5,0
	Frutos cítricos	1,0	
	Papas		0,1 (*)
	Uvas		5,0
63.-	FENVALERATO		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO FENVALERATO (liposoluble)		
	Apio		2,0
	Arvejas		0,1
	Bayas y otras frutas pequeñas	1,0	
	Brócolis		2,0
	Carne, de mamíferos distintos a los marinos	1,0 (grasa)	
	Cereales en grano		2,0
	Cerezas		2,0
	Coliflor		2,0
	Despojos comestibles (mamíferos)	0,02	
	Duraznos		5,0
	Frutas pomáceas		2,0
	Frutos cítricos	2,0	
	Harina de trigo	0,2	

	Harina integral de trigo	2,0	
	Kiwi		5,0
	Leche	0,1	
	Lechugas		2,0
	Maíz dulce	0,1	
	Maní entero	0,1	
	Melones		0,2
	Pepinos ensalada	0,2	
	Pimentón		0,5
	Porotos desgranados	0,1	
	Raíces y tubérculos	0,05	
	Repollo de Bruselas	2,0	
	Repollo		3,0
	Salvado de trigo, sin elaborar	5,0	
	Sandías		0,5
	Semilla de maravilla	0,1	
	Tomates		1,0
64.-	FLUSILAZOL		
	IDA 0,001 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Flusilazol		
	Carne de pollo	0.01 (*)	
	Carne de vacuno	0.01 (*)	
	Despojos comestibles de pollo	0.01 (*)	
	Duraznos		0.5
	Frutas pomáceas	0.2	
	Grasa de vacuno	0.01 (*)	
	Huevos de gallina	0.01 (*)	
	Leche de vaca	0.01 (*)	
	Nectarines	0.5	
	Pasas	1.0	
	Plátanos		0.1
	Uvas		0.5
	Vacuno, despojos comestibles	0.02 (*)	
65.-	FOLPET		
	IDA 0,1 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Folpet		
	Frutillas		20
	Pepinos ensalada	2,0	
66.-	FOSFAMIDON		
	IDA 0,0005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de fosfamidon (isómeros E- y Z-) y de N- desetil fosfamidon (isómeros E- y Z-).		
	Arvejas	0,2	
	Brócoli	0,2	
	Cereales en grano	0,1	
	Cerezas	0,2	
	Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas	0,2	
	Duraznos		0,2
	Espinacas		0,2
	Frutilla	0,2	
	Frutos cítricos	0,4	
	Lechugas		0,1
	Manzanas		0,5
	Pepinos ensalada	0,1	

	Peras	0,5	
	Porotos verdes	0,2	
	Raíces y tubérculos	0,05 (*)	
	Repollo	0,2	
	Repollo de Brusela	0,2	
	Sandías	0,1	
	Tomates		0,1
	Zanahorias	0,2	
67.-	FOSFURO DE HIDROGENO		
	IDA NO NECESARIO		
	RESIDUO Todos los fosfuros, expresados como fosfuro de hidrógeno.		
	Las buenas prácticas de uso debieran asegurar que no haya residuos al momento del consumo.		
	Cacao en grano	0,01	
	Cereales en grano	0,1	
	Especias		0,01
	Frutas deshidratadas	0,01	
	Hortalizas deshidratadas	0,01	
	Maní		0,01
	Nueces	0,01	
68.-	FOSMET		
	IDA 0,01 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de fosmet y su análogo oxigenado (liposoluble).		
	Arándano		10
	Arvejas	0,2	
	Arvejas secas	0,02 (*)	
	Camote	10	
DO 06.03.99 TEXTO RES 581 1999 MINISTERIO DE SALUD SUBSECRETARIA DE SALUD			
	Carne de vacuno	1 (grasa)	
	Damasco		5,0
	Durazno		10
	Frutos cítricos	5,0	
	Kiwi		15
	Leche	0.02 (*)	
	Maíz		0.05
	Maíz dulce	0.05	
	Manzanas		10
	Nectarines	5.0	
	Nueces	0.1	
	Papas	0.05	
	Peras	10	
	Uvas		10
69.-	FOXIM		
	IDA 0,001 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Foxim (liposoluble)		
	Carne de ovino	0,5 (grasa)	
	Carne de vacuno	0,2 (grasa)	
	Cebollas bulbo	0,05 (*)	
	Cereales en grano	0,05 (*)	
	Coliflor	0,05 (*)	
	Leche	0,05 (*)	
	Lechugas		0,1
	Maíz dulce	0,05 (*)	
	Papas	0,05 (*)	
	Porotos verdes	0,05 (*)	

	Tomates		0,2	
70.-	GLIFOSATO			
	IDA 0,3 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Glifosato			
	Arroz		0,1 (*)	
	Arvejas secas		5,0	
	Avena		20,0	
	Carne de aves		0,1 (*)	
	Carne de porcino		0,1 (*)	
	Carne de vacuno		0,1 (*)	
	Despojos comestibles de porcino	1,0		
	Harina de trigo	0,5		
	Harina Integral de trigo	5,0		
	Huevos		0,1 (*)	
	Kiwi			0,1 (*)
	Leche de vaca		0,1 (*)	
	Maíz			0,1 (*)
	Maíz dulce		0,1 (*)	
	Porotos		2,0	
	Salvado de trigo sin elaborar	20,0		
	Vacuno, despojos comestibles	2,0		
71.-	GUAZATINA			
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Guazatina			
	Frutos cítricos	5,0		
	Cereales en grano		0,1 (*)	
	Melones			5,0
	Papas		0,1 (*)	
	Piña			0,1 (*)
72.-	HEPTACLORO			
	IDA 0,0001 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Suma de heptacloro y epóxido de heptacloro.			
	Aceite de soya, refinado	0.02		
	Aceite de soya, sin refinar	0.5		
	Carne de aves		0.2 (grasa)	
	Carne de mamíferos, excepto marinos	0.2 (grasa)		
	Cereales en grano		0.02	
	Frutos cítricos	0.01		
	Huevos		0.05	
	Leche		0.006	
	Piña			0.01
73.-	HEXACONAZOL			
	IDA 0,005 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Hexaconazol			
	Café en grano		0,05	
	Manzanas			0.1
	Plátanos			0.1
	Uvas			0.1
74.-	HIDRACIDA MALEICA			
	IDA 0,3 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Suma de hidracida maleica libre y conjugada, expresada como hidracida maleica. Basado en sal de Na o K, pura el 99,9%, y que no contenga más de 1 mg de hidracina.			
	Cebolla, bulbo		15	

75.-	Papas	50	
	IMAZALIL		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Imazalil		
	Caqui	2,0	
	Frambuesas, frutillas	2,0	
	Frutos cítricos	5,0	
	Frutas pomáceas	5,0	
	Papas	5,0	
	Pepino ensalada	0,5	
76.-	Plátano	2,0	
	IPRODIONA		
	IDA 0,2 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Iprodiona		
	Arroz descascarado	3,0	
	Frutillas		10
	Kiwi		5,0
	Lechugas		10
	Tomates		5,0
	Uvas		10
77.-	ISOFENFOS		
	IDA 0,001 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de isofenfos y su oxígeno derivado (liposoluble).		
	Apio		0,02 (*)
	Carne, de mamíferos excepto marinos	0,02 (*) (grasa)	
	Cebollas bulbo		0,1
	Frutos cítricos	2,0	
	Hortalizas del género Brassica	0,1	
	Leche		0,01 (*)
	Maíz		0,02
	Maíz dulce		0,02 (*)
	Papas		0,1
	Plátano		0,02 (*)
78.-	LINDANO		
	IDA 0,008 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Gama - HCH (liposoluble)		
	Carne de vacuno, porcino y ovino	2,0 (grasa)	
	Carnes de ave		0,7 (grasa)
	Cereales en grano		0,5
	Huevos		0,1
	Leche		0,01
79.-	MALATION		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Malation		
	Acelgas	0,5	
	Apio		1,0
	Arándanos		0,5
	Arvejas	0,5	
	Berenjenas	0,5	
	Brócoli	5,0	
	Cereales en grano	8,0	
	Cerezas	6,0	
	Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas	6,0	
	Coliflor	0,5	

	Duraznos		6,0
	Espinacas		8,0
	Frambuesas	8,0	
	Frutas deshidratadas	8,0	
	Frutillas		1,0
	Frutos cítricos	4,0	
	Harina de centeno	2,0	
	Harina de trigo	2,0	
	Harina integral de centeno	2,0	
	Harina integral de trigo	2,0	
	Lechugas		8,0
	Lentejas		8,0
	Manzanas		2,0
	Nueces enteras	8,0	
	Peras	0,5	
	Porotos verdes	2,0	
	Porotos	8,0	
	Raíces y tubérculos	0,5	
	Repollo	8,0	
	Salvado de centeno sin elaborar	20	
	Salvado de trigo sin elaborar	20	
	Tomates		3,0
	Uvas		8,0
80.-	MANCOZEB		
	IDA		
	RESIDUO Véase ditiocarbamatos.		
	Veáse compuestos afines		
81.-	MECARBAM		
	IDA 0,002 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Mecarbam		
	Carne de vacuno	0,01 (*)	
	Frutos cítricos	2,0	
	Leche de vaca	0,01	
	Vacuno despojos comestibles	0,01 (*)	
82.-	METACRIFOS		
	IDA 0,006 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Metacrifos (liposoluble)		
	Carne de vacuno	0,01 (*) (grasa)	
	Carne de aves	0,01 (*) (grasa)	
	Huevos	0,01 (*)	
	Leche	0,01 (*)	
	Vacuno despojos comestibles	0,01 (*)	
83.-	MEVINFOS		
	IDA 0,0008 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de cis y trans mevinfos		
	Cebollas bulbo	0,1	
	Cerezas	1,0	
	Damascos		0,2
	Duraznos		0,5
	Espinacas		0,5
	Frutos cítricos	0,2	
	Lechugas		0,5
	Manzanas		0,5
	Melones		0,05
	Papas	0,1	

	Peras	0,2	
	Pepinos ensalada	0,2	
	Porotos verdes	0,1	
	Repollo de Bruselas	1,0	
	Repollo	1,0	
	Frutillas		1,0
	Tomates		0,2
	Uvas		0,5
	Zanahorias	0,1	
84.-	METALAXIL		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Metalaxil.		
	Arvejas desgranadas	0,05 (*)	
	Brócoli	0,5	
	Cacao en grano	0,2	
	Cebollas bulbo	2,0	
	Cereales en grano	0,05 (*)	
	Coliflor	0,5	
	Espárragos	0,05 (*)	
	Espinacas		2,0
	Frambuesas	0,2	
	Frutas pomáceas	1,0	
	Frutos cítricos	0,5	
	Lechugas		2,0
	Lúpulo deshidratado	10,0	
	Maní		0,1
	Melones		0,2
	Palta	0,2	
	Papas	0,05 (*)	
	Pepinos ensalada	0,5	
	Remolacha azucarera	0,05 (*)	
	Repollo	0,5	
	Repollo de Bruselas	0,2	
	Sandías	0,2	
	Semilla de maravilla	0,05 (*)	
	Tomates		0,5
	Uvas		1,0
	Zanahorias	0,05 (*)	
85.-	METAMIDOFOS		
	IDA 0,004 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Metamidofos		
	El metamidofos es un metabolito del (95) acefato para el que se recomiendan LMR separados.		
	Apio		1,0
	Carne de caprino	0,01 (*)	
	Carne de ovino	0,01 (*)	
	Carne de vacuno	0,01 (*)	
	Grasa de caprino	0,01 (*)	
	Grasa de ovino	0,01 (*)	
	Grasa de vacuno	0,01 (*)	
	Leche	0,01 (*)	
	Lechugas		1,0
	Lúpulo deshidratado	5,0	
	Pepinos ensalada	1,0	
	Pimentón		1,0

	Repollos de Bruselas	1,0	
	Sandía	0,5	
86.-	METIDATION		
	IDA 0,001 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Metidation		
	Aceite de oliva virgen	2,0	
	Aceitunas		1,0
	Arvejas	0,1	
	Caprino, despojos comestibles	0,02 (*)	
	Carne de caprino	0,02 (*)	
	Carne de vacuno, porcino y ovino	0,02 (*)	
	Carne de aves	0,02 (*)	
	Cebollas, bulbo	0,1	
	Cerezas	0,2	
	Ciruelas (incluidas las ciruelas deshidratadas)	0,2	
	Despojos comestibles (vacuno, porcino y ovino)	0,02 (*)	
	Despojos comestibles de aves de corral	0.02 (*)	
	Duraznos		0,2
	Grasa de caprino	0,02 (*)	
	Grasa de cerdo	0,02 (*)	
	Grasa de ovino	0,02 (*)	
	Grasa de vacuno	0,02 (*)	
	Grasas de aves	0,02 (*)	
	Huevos	0,02 (*)	
	Leche	0,001	
	Limonos y limas	2,0	
	Lúpulo deshidratado	5,0	
	Maíz		0,1
	Mandarinas	5,0	
	Manzanas		0,5
	Naranjas		2,0
	Nectarines	0,2	
	Papas	0,02 (*)	
	Peras	0,5	
	Piña		0,05
	Pomelo	2,0	
	Té		0,1
	Tomate	0.1	
	Uvas		0,2
87.-	METIOCARB		
	IDA 0,001 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de metiocarb, su sulfóxido y sulfona, expresada como metiocarb.		
	Alcachofas	0,05 (*)	
	Brócolis		0,2
	Carne de aves	0,05 (*)	
	Carne, de mamíferos distintos a los marinos	0,05 (*)	
	Cereales en grano	0,05 (*)	
	Coliflor	0,2	
	Frutos cítricos	0,05 (*)	
	Huevos	0,05 (*)	
	Leche	0,05 (*)	
	Lechugas		0,2

	Maíz dulce		0,05 (*)	
	Repollo de Bruselas		0,2	
	Repollos			0,2
88.-	METIRAM			
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Véase ditiocarbamatos			
	Véase compuestos afines			
89.-	METOMILO			
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Suma de metomilo y hidroxitioacetimidato de metilo ("metomilo oxima"), expresada como metomilo.			
	Los LMR relacionados con metomilo y (154) tiodicarb se han reunido en una sola lista.			
	Apio			2,0
	Arvejas		5,0	
	Arvejas desgranadas		0,5	
	Avena		0,5	
	Berenjenas		0,2	
	Carne (de mamíferos distintos a los marinos)	0,02 (*)		
	Cebollas, bulbos		0,2	
	Coliflor		2,0	
	Duraznos			5,0
	Espárragos		2,0	
	Espinacas			5,0
	Frutas Pomáceas		2,0	
	Frutos Cítricos	1,0		
	Leche		0,02 (*)	
	Lechugas			5,0
	Lúpulos desecados		10	
	Maíz			0,05 (*)
	Maíz dulce		2,0	
	Maní			0,1
	Melones			0,2
	Nectarines		5,0	
	Papas		0,1	
	Pepinos ensalada		0,2	
	Piñas		0,2	
	Porotos		0,1	
	Porotos Verdes		2,0	
	Remolacha azucarera		0,1	
	Repollo		5,0	
	Sandía		0,2	
	Tomate		1,0	
	Uvas			5,0
90.-	METOPRENO			
	IDA 0,1 mg/kg de peso corporal			
	RESIDUO Metopreno			
	Carne, de mamíferos distintos que marinos	0,2		
	Cereales en grano		5,0	
	Harina de trigo	2,0		
	Huevos		0,05	
	Leche de vaca		0,05	
	Maní			2,0
91.-	MICLOBUTANIL			
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal			

	RESIDUO Micobutanil		
	Carne de aves	0.01 (*)	
	Carne de vacuno	0.01 (*)	
	Ciruelas		0.5
	Despojos comestibles de aves de corral	0.01 (*)	
	Huevos	0.01 (*)	
	Leche de vaca	0.01 (*)	
	Vacuno, despojos comestibles	0.01 (*)	
92.-	MONOCROTOFOS		
	IDA 0,0006 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Monocrotofos		
	Arvejas		0,1
	Carne de aves		0,02 (*)
	Carne de caprino		0,02 (*)
	Carne de vacuno, porcino, ovino	0,02 (*)	
	Cebollas bulbo		0,1
	Despojos comestibles (vacuno, porcino)	0,02 (*)	
	Huevos		0,02 (*)
	Leche		0,002 (*)
	Maíz		0,05 (*)
	Papas		0,05 (*)
	Porotos verdes		0,2
	Productos lácteos		0,02 (*)
93.-	OXAMILO		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de oxamilo y 2-hidroximino-N,N-dimetil-2 (metiltio)acetamida ("oxamilo oxima), expresada como oxamilo.		
	Apio		5,0
	Cebollas bulbo		0,05 (*)
	Frutos cítricos	5,0	
	Maíz		0,05 (*)
	Maní		0,1
	Manzanas		2,0
	Melones		2,0
	Pepinos ensalada		2,0
	Pimentón		2,0
	Piña		1,0
	Plátano		0,2
	Porotos, excepto habas y soya	0,2	
	Raíces y tubérculos		0,1
	Sandías		2,0
	Tomates		2,0
94.-	PACLOBUTRAZOL		
	IDA 0,1 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Paclobutrazol		
	Frutas de carozo		0.05
	Manzanas		0.5
95.-	PARAQUAT		
	IDA 0,004 mg de catión de paraquat/kg de peso corporal		
	RESIDUO Catión de paraquat (disponible normalmente como dicloruro).		
	La IDA y los LMR se basan en los datos relativos al uso de dicloruro de paraquat.		
	Aceite de maravilla		0,05 (*)
	Aceitunas		1,0

	Arroz	10	
	Arroz pulido blanco	0,5	
	Carne de vacuno, porcino y ovino	0,05 (*)	
	Despojos comestibles vacuno, porcino y ovino	0,05 (*)	
	Hortalizas	0,05 (*)	
	Huevos	0,01 (*)	
	Leche	0,01 (*)	
	Lúpulo deshidratado	0,2	
	Maíz		0,1
	Maracuyá		0,2
	Papas	0,2	
	Riñones de porcino	0,5	
	Riñones de vacuno	0,5	
	Semilla de maravilla	2,0	
96.-	PARATION		
	IDA 0,005 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Paration etilo		
	Aceite de oliva	2,0	
	Aceitunas		0,5
	Damascos		1,0
	Duraznos		1,0
	Limón	0,5	
	Mandarina		0,5
	Naranjas		0,5
	Papas	0,05 (*)	
	Puerro	0,05	
97.-	PARATION - METILO		
	IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Paration-metilo		
	Cerezas		0,01 (*)
	Ciruelas (incluidas ciruelas deshidratadas)	0,01 (*)	
	Frambuesas		0,01 (*)
	Hortalizas del género Brassica	0,2	
	Lúpulo deshidratado		0,05 (*)
	Uva		0,01
98.-	PENCONAZOL		
	IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Penconazol		
	Carne de pollo	0,05 (*)	
	Carne de vacuno	0,05 (*)	
	Duraznos		0,1
	Huevos de gallinas	0,05 (*)	
	Leche de vaca	0,01 (*)	
	Lúpulo deshidratado	0,5	
	Nectarines	0,1	
	Vacuno, despojos comestibles	0,05 (*)	
99.-	PERMETRINA		
	IDA 0,05 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Permetrina (suma de los isómeros) (liposolubles).		
	La IDA se refiere solamente a las sustancias nominales 40% cis-,		
	60% trans- y 25% cis-, 75% trans-.		
	Aceite comestible de maravilla	1,0	
	Aceite de semilla de maravilla sin refinar	1,0	
	Aceite de soya sin refinar	0,1	
	Aceitunas		1,0

Almendras			0,1
Apio			2,0
Arvejas desgranadas		0,1	
Berenjenas		1,0	
Brócolis			2,0
Carne de aves		0,1	
Carne, de mamíferos distintos a los marinos	1,0		
Cereales en grano		2,0	
Champiñones		0,1	
Coliflor		0,5	
Despojos comestibles (mamíferos)	0,1		
Espárragos		1,0	
Espinacas			2,0
Frambuesas		1,0	
Frutas de carozo		2,0	
Frutas pomáceas		2,0	
Frutillas			1,0
Frutos cítricos	0,5		
Germen de trigo		2,0	
Harina de trigo	0,5		
Harina integral de trigo	2,0		
Huevos		0,1	
Kiwi			2,0
Leche		0,1	
Lechugas			2
Lúpulo deshidratado		50	
Maíz dulce		0,1	
Maní			0,1
Melones			0,1
Papas		0,05	
Pepinos ensalada		0,5	
Porotos		0,1	
Porotos verdes		1,0	
Puerro		0,5	
Repollo		5,0	
Repollo de Bruselas		1,0	
Salvado de trigo, sin elaborar	5,0		
Semilla de maravilla		1,0	
Té			20
Tomates			1,0
Uvas			2,0
Zanahorias		0,1	
100.- PIRAZOFOS			
IDA 0,004 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Pirazofos			
Pepinos ensalada		0,1	
Repollo de Bruselas		0,1	
Zanahorias		0,2	
101.- PIRETRINAS			
IDA 0,04 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Suma de piretrinas I y II, cinerinas I y II, y jasmolinas I y II, determinada previa calibración según la norma internacional para el pelitre.			
Cereales en grano		3,0	
Frutas deshidratadas	1,0		

Hortalizas deshidratadas	1,0	
Nueces		1,0
Pescado deshidratado	3,0	
Semillas oleaginosas	1,0	
102.- PIRIMICARB		
IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO Suma de pirimicarb, demitilpirimicarb y N-formil- (metilamina) análogo (desmetilformamido-pirimicarb).		
Apio		1,0
Arvejas	0,2	
Berenjenas	1,0	
Brócolis		1,0
Carne de mamíferos, distintos marinos	0,05 (*)	
Cebollas bulbo		0,5
Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas		0,5
Coliflor		1,0
Duraznos		0,5
Espinacas		1,0
Frambuesas		0,5
Frutas pomáceas		1,0
Frutos cítricos, excepto naranjas	0,05 (*)	
Huevos		0,05 (*)
Leches		0,05 (*)
Lechuga		1,0
Maíz dulce		0,05 (*)
Naranjas		0,5
Papas		0,05 (*)
Pepino ensalada	1,0	
Perejil		1,0
Pimentón		1,0
Porotos desgranados		0,1
Porotos verdes		1,0
Puerro		0,5
Rábano		0,05 (*)
Repollo de Bruselas		1,0
Repollo		1,0
Tomates		1,0
103.- PIRIMIFOS-METILO		
IDA 0,03 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO PIRIMIFOS-METILO (LIPOSOLUBLE).		
Aceitunas		5,0
Arroz descascarado		2,0
Arroz Pulido (blanco)	1,0	
Arvejas		0,05 (*)
Carne (de mamíferos no marinos)	0,05 (*)	
Cereales en grano		10
Cerezas		2,0
Ciruelas (incluidas las ciruelas pasas)	2,0	
Dátiles desecados y confitados	0,5	
Harina de trigo	2,0	
Harina integral de Centeno	5,0	
Harina integral de trigo	5,0	
Huevos		0,05 (*)
Leche		0,05 (*)

Maní			2,0
Maní entero		25	
Papas		0,05 (*)	
Pescados desecados		8,0	
Porotos verdes		0,5	
Salvado de trigo sin elaborar	20		
104.- PROCIMIDONA			
IDA 0,1 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Procimidona			
Aceite comestible de maravilla	0,5		
Cebollas bulbo		0,2	
Cerezas		10,0	
Frambuesas		10,0	
Frutillas			10,0
Lechugas			5,0
Pepinos ensalada		2,0	
Porotos verdes		1,0	
Semillas de maravilla	0,2		
Tomates			5,0
Uvas			5,0
105.- PROCLORAZ			
IDA 0,01 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Suma de procloraz y sus metabolitos que contienen la fracción 2,4,6 triclorofenol, expresada como procloraz.			
Carne de vacuno		0,1 (*)	
Grasa de vacuno		0,5	
Leche		0,1 (*)	
Mango		2,0	
Plátano		5,0	
Vacuno, despojos comestibles	5,0		
106.- PROFENOFOS			
IDA 0,01 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Profenofos			
Huevos		0,02 (*)	
Leche		0,01 (*)	
Papas		0,05 (*)	
Tomates			2,0
107.- PROPAMOCARB			
IDA 0,1 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Propamocarb (base)			
Apio			0,2
Coliflor		0,2	
Frutillas			0,1
Lechugas			10,0
Pepino ensalada	2,0		
Pimentón			1,0
Rábanos			5,0
Repollo		0,1	
Repollo de bruselas		1,0	
Tomates			1,0
108.- PROPARGITA			
IDA 0,15 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Propargita (liposoluble)			
Almendras			0,1 (*)
Carne (mamíferos diferentes de marinos)	0,1 (* grasa)		

Carne de aves		0,1 (* grasa)
Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas		7,0
Damascos		7,0
Duraznos		7,0
Frutillas		7,0
Frutos cítricos	5,0	
Higos		2,0
Huevos		0,1 (*)
Leche		0,1 (*)
Lúpulo deshidratado		30
Maíz		0,1 (*)
Maní		0,1 (*)
Manzanas		5,0
Nectarines	7,0	
Nueces	0,1 (*)	
Papas	0,1 (*)	
Pasas	10	
Pepinos ensalada	0,5	
Peras	5,0	
Porotos	0,2	
Porotos verdes	20	
Té		10
Tomates		2,0
Uvas		10
109.- PROPICONAZOL		
IDA 0,04 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO Propiconazol		
Almendras		0,05
Carne de ave		0,05 (*)
Carne de mamíferos excepto marinos	0,05 (*)	
Despojos comestibles mamíferos	0,05	
Fruta de carozo	1,0	
Huevos		0,05 (*)
Leche		0,01 (*)
Mango		0,05
Maní		0,05
Maní entero	0,1	
Plátanos		0,1
Uvas		0,5
110.- QUINOMETIONATO		
IDA 0,006 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO Quinometionato		
Almendras		0,1
Caqui		0,05
Carne (de mamífero excepto marinos)	0,05 (*)	
Cereales en grano		0,1
Frutilla		0,2
Frutos cítricos	0,5	
Leche		0,01 (*)
Manzanas		0,2
Melones		0,1
Paltas		0,1
Pepino ensalada	0,1	
Sandía		0,02

Uvas		0,1	
111.- QUINTOCENO			
IDA 0,01 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Suma de quintoceno, pentacloroanilina y metil pentaclorofenil sulfide, expresado como quintoceno.			
Brócolis		0,02	
Lechugas		3,0	
Maní		2,0	
Plátano	1,0		
Papas	0,2		
Porotos secos	0,2		
Porotos verdes	0,01		
Repollo	0,02		
Tomates		0,1	
112.- TECNACENO			
IDA 0,02 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Tecnaceno			
Lechugas arrepollada	2,0		
113.- TERBUFOS			
IDA 0,0002 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Suma de terbufos su análogo oxigenado y sus sulfóxidos y sulfonas, expresadas como terbufos.			
Carne de pollo		0,05 (*)	
Carne de vacuno		0,05 (*)	
Despojos comestibles de pollo	0,05 (*)		
Huevos		0,01 (*)	
Leche de vaca		0,01 (*)	
Maíz			0,01 (*)
Maíz dulce		0,01 (*)	
Maní			0,05 (*)
Plátanos			0,05
Vacuno, despojos comestibles	0,05 (*)		
114.- TIABENDAZOL			
IDA 0,1 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Tiabendazol o, en el caso de productos de origen animal, la suma de tiabendazol y 5-hidroxitiabendazol.			
Carne de vacuno, equino y porcino	0,1 (*)		
Cebollas bulbo		0,1	
Cereales en grano		0,2	
Despojos comestibles (vacuno, equino, porcino)	0,1 (*)		
Frutillas			3,0
Frutos cítricos	10		
Leche		0,1 (*)	
Manzanas			10
Papas		5,0	
Peras		10	
Plátanos			3,0
Pulpa de remolacha deshidratada	5,0		
Tomates			2,0
115.- TIODICARB			
IDA 0,03 mg/kg de peso corporal			
RESIDUO Suma de tiodicarb, metomilo y metil-hidroxitioacetimidato ("metomilo oxima"), expresada como tiodicarb.			
Véase compuestos afines.			

116.- TIOFANATO-METILO

IDA 0,02 mg/kg de peso corporal

RESIDUO Carbendazim.

Apio		20
Carne de pollo		0,1 (*)
Cereales en grano		0,1 (*)
Cerezas		10
Ciruelas		
(incluidas las ciruelas deshidratadas)	2,0	
Durazno		10
Frambuesas		5,0
Frutillas		5,0
Frutos cítricos		10
Hojas o coronas de remolacha azucarera	5,0	
Lechugas		5,0
Manzana		5,0
Peras		5,0
Tomates		5,0
Uvas		10
Zanahoria		5,0

117.- TIOMETON

IDA 0,003 mg/kg de peso corporal

RESIDUO Suma de tiometon, su sulfóxido y sulfona como tiometon.

Apio		0,5
Arveja		0,5
Berenjenas		0,5
Cereales de grano		0,05 (*)
Cerezas dulces		0,5
Ciruelas (incluidas las ciruelas deshidratadas)		0,5
Damascos		0,5
Durazno		0,5
Frutillas		0,5
Lechugas		0,5
Lúpulo deshidratado	2,0	
Maní entero	0,5	
Manzana		0,5
Membrillos	0,5	
Papas	0,05 (*)	
Pera		0,5
Perejil	0,5	
Porotos verde	0,5 azucarar	
Repollo	0,5	
Tomates		0,5
Uva		0,5
Zanahoria		0,05 (*)

118.- TOLILFLUANIDA

IDA 0,1 mg/kg de peso corporal

RESIDUO Tolilfluanida

Lechugas		1,0
Frutas pomáceas	5,0	
Frutillas		3,0
Tomates		2,0

119.- TRIADIMEFORM

IDA 0,03 mg/kg de peso corporal

RESIDUO Triadimeform		
Frambuesa		1,0
Frutas pomáceas	0,5	
Piña		3,0
Uvas		0,5
120.- TRIADIMENOL		
IDA 0,05 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO Triadimenol		
Los límites tienen en cuenta los residuos de triadimenol resultantes del uso del triadimefon y/o del triadimenol.		
Datos de residuos que derivan del uso de: TF= triadimefon; TN= triadimenol.		
Carne de aves		0,05 (*)
Carne de mamíferos excepto marinos	0,05 (*)	
Huevos		0,05 (*)
Leche		0,01 (*)
121.- TRIAZOFOS		
IDA 0,001 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO Triazofos		
Arvejas		0,1
Carne de vacuno		0,01 (*)
Cebollas bulbo		0,05 (*)
Cereales en grano		0,05 (*)
Coliflor		0,1
Frutas pomáceas		0,2
Frutillas		0,05 (*)
Leche de vaca		0,01 (*)
Habas		0,02
Papas		0,05 (*)
Porotos verdes		0,2
Repollo de Bruselas		0,1
Repollo		0,1
122.- TRIFORINA		
IDA 0,02 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO Determinado como hidrato de cloral y expresado como triforina.		
Arándanos		1,0
Cereales en grano	0,1	
Cerezas	2,0	
Ciruelas, incluidas las ciruelas deshidratadas	2,0	
Duraznos		5,0
Frutillas		1,0
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas	0,5	
Manzanas		2,0
Porotos verdes	1,0	
Repollo de Bruselas	0,2	
Tomate	0,5	
123.- VAMIDOTION		
IDA 0,008 mg/kg de peso corporal		
RESIDUO Suma de vamidotion, su sulfóxido y sulfona, expresada como vamidotion.		
Arroz descascarado	0,2	
Cereales en grano	0,2	
Durazno		0,5

	Frutas pomáceas	1	
	Uvas		0,5
124.	VINCLOZOLIN		
	IDA 0,07 mg/kg de peso corporal		
	RESIDUO Suma de vinclozolin y de todos los metabolitos que contienen la fracción 3,5 dicloroanilina, expresada como vinclozolin.		
	Arvejas	1,0	
	Arándano		5,0
	Carne de pollo	0,05 (*)	
	Carne de vacuno	0,05 (*)	
	Cebollas bulbo	1,0	
	Cerezas	5,0	
	Coliflor	1,0	
	Duraznos		5,0
	Frambuesas	5,0	
	Frutas pomáceas	1,0	
	Frutillas		10,0
	Huevos de gallina	0,05 (*)	
	Kiwi		10,0
	Leche de vaca	0,05 (*)	
	Lechuga		5,0
	Lúpulo deshidratado	40,0	
	Melones		1,0
	Papas	0,1	
	Pepinos ensalada	1,0	
	Pimentón		3,0
	Porotos verdes	2,0	
	Repollos		1,0
	Tomates		3,0
	Uvas		5,0

(*) En el límite de determinación o próximo al mismo.

2°.- Estas disposiciones no obstan el cumplimiento de prohibiciones específicas de uso para determinados plaguicidas que puedan dictar las autoridades competentes.

3°.- Estas normas no son aplicables para comercio exterior de alimentos, el cual se regirá por las condiciones que en la materia acuerden el exportador nacional y el importador extranjero.

4°.- Las infracciones a las disposiciones de la presente resolución serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio se hayan cometido, previa instrucción del respectivo sumario, en conformidad con lo establecido en el libro X del Código Sanitario.

5°.- La presente resolución entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, fecha en que se entenderá derogada la resolución exenta No. 1.450, del 13 de diciembre de 1982, del Ministerio de Salud.

Anótese y publíquese.- Alvaro Erazo Latorre, Ministro de Salud (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Dr. Rodrigo Salinas Ríos, Subsecretario de Salud Subrogante.