قرار وزارى
رقم ٦٩٩ لسنة ١٩٨٥ قانونى
بخصوص تنظيم انشاء مشاتل الفراولة فى جمهورية مصر العربية

وزير الزراعة والامن الغذائى

بعد الأطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٣١٤ لسنة ١٩٨٤ «قانونى» بتنظيم زراعة الفراولة فى جمهورية مصر العربية ؛

قـــــــرر :

مادة ١ – لا يجوز أنشاء مشتل لاكثار الفراولة الا بترخيص من وزارة الزراعة (الادارة المركزية للبساتين والخضر) .

مادة ٢ – يجب أن تتوافر فى المشتل المراد أنشاؤه الشروط الاتية : –

أ – أن تكون الأرض المزمع أقامة المشتل عليها من الاراضى المناسبة لزراعة نبات الفراولة وخالية من الأملاح الضارة والحشائش المعمرة و آفات التربة وأن يكون مصدر المياه مناسب لزراعة الفراولة .

ب – أن تكون أرض المشتل بعيدة عن المراكز الادارية التى ينتج به محصول الفراولة .

جـ – يلزم تعقيم تربة المشتل بالمواد الموصى بها من قبل وزارة الزراعة .

مادة ٣ – يجب أن تكون نباتات الأمهات المستخدمة فى زراعة المشتل من رتبة الأساس (أيليت على الأقل) طبقا للمواصفات الفنية المرفقة بهذا القرار ومن الأصناف التى توصى بها وزارة الزراعة .

مادة ٤ – يلتزم أصحاب المشاتل بزراعة نباتات أختبار للفيروس حول المشتل من أنواع الفراولة البرية مثل Fragaria Vesca بمعدل ١٠٠ نبات للفدان أو جزء منه من مساحة المشتل ، ويلتزم باتباع برامج المكافحة للآفات الحشرية والمرضية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة .

مادة ٥ – تخضع مشاتل الفراولة للفحص الدورى – طوال مراحل الإنتاج – من قبل اللجان الفنية التى تشكلها الادارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة .

مادة ٦ – لاتعتبر الشتلات الناتجة من المشتل صالحة للبيع او للزراعة الا اذا كانت من رتبة (المسجلة) او من رتبة (المعتمدة) وفقا للمواصفات الفنية بهذا القرار .

مادة ٧ – تقوم لجان الفحص باصدار شهادات الاعتماد ولها أن ترفض الشتلات فى حالة عدم مطابقتها للمواصفات أو اذا تبين من الفحص الدورى عدم فاعلية المقاومة وخاصة بالنسبة للحشرات الناقلة للامراض الفيروسية او ظهور اصابات فيروسية بنباتات الاختبار أو بالاختبارات المعملية بنسب تزيد على المسموح به فى المواصفات الفنية المرفقة .

مادة ٨ – يلتزم صاحب المشتل بمعاملة الشتلات المنتجة على الوجه الاتى :–

أ– اذا كانت الزراعة على صورة شتلات طازجة Fresh Plants

تقلع الشتلات من المشتل خلال سبتمبر أو أكتوبر وتوضع فى ثلاجات على درجة ٢ مئوى (+ ٢° م) لمدة لا تقل عن اسبوع قبل زراعتها .

ب – اذا كانت الزراعة على صورة شتلات مجمدة Frigo Plants :

تقلع الشتلات من المشتل خلال ديسمبر او يناير وتخزن فى الثلاجات على درجة أثنين مئوية تحت الصفر (–٢م) حتى ميعاد زراعتها فى الموسم التالى (حوالى ٨ – ٩ أشهر) .

مادة ٩ – لا يسمح بتداول الشتلات الا اذا كانت معبأة فى عبوات مناسبة من الكرتون أو المعدن أو البلاستيك ومبطنة من الداخل بالبولى أثيلين بما يكفل تغليف الشتلات بالكامل وبحيث لا يزيد عدد الشتلات بالعبوة الواحدة عن ١٥٠٠ شتلة ويجب أن يوضع على العبوة أسم المشتل والصنف والرتبة النباتية والدرجة التجارية وعدد الشتلات وتاريخ تقليع الشتلة وتاريخ دخولها الثلاجة مع ضرورة لصق شهادة الاعتماد الصادرة وفقا لحكم المادة (٧) على كل عبوة .

مادة ١٠ – يجب أن يكون طلب الترخيص بأنشاء المشتل مصحوبا برسم قدرة خمسون جنيها عن كل فدان أو كسورة أو جزء منه تسدد بشيك أو حوالة بريدية لحساب الادارة العامة للخضر (حسابات ثالث وزارة الزراعة) .

كما يؤدى صاحب المشتل عند أستخراج شهادة الاعتماد – مصاريف الفحص والمتابعة بواقع قرش واحد عن كل عشرة شتلات يتم قبولها .

مادة ١١ – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر فى : ١٥ / ٨ / ١٩٨٥ .

« دكتور يوسف أمين والى »

المواصفات الفنية لرتب شتلات القراولة

يشترط توفر الشروط والمواصفات الفنية التالية فى كل رتبة من الشتلات : -

(أولا) رتبة النوية Nuclaar Stock

١ - ناتجة من زراعة الانسجة المرستيمية ومختبره لخلوها من الامراض الفيروسية .
٢- خالية تماماً من جميع الأمراض والافات الحشرية والحيوانية الموضحة بالجدول المرفق .

(ثانياً) رتبة سوبرايليت SUper Elite

١- تنتج داخل صوبات معزولة للحشرات وفى تربة معقمة - من رتبة النوية كاكثار أول .
٢- خالية تماماً من جميع الأمراض والأفات الحشرية والحيوانية الموضحة بالجدول المرفق .

(ثالثاً) رتبة أيليت Elite

١- تنتج داخل صوبات معزولة للحشرات وفى تربة معقمة - من رتبة سوبر أيليت كاكثار ثانى للنوية.
٢- خالية تماماً من جميع الأمراض والأفات الحشرية والحيوانية الموضحة بالجدول المرفق .

(رابعا) رتبة المسجلة Reqistered

١- تنتج شتلات هذه الرتبة فى الحقل (المشتل) من رتبة ايليت كاكثار ثالث للنوية مع ضرورة تعقيم التربة .
٢- تكون الشتلات الناتجة قوية ذات مجموع جذرى جيد ولا يقل قطر الساق عن ٠,٥ جم فى شتلات الدرجة الأولى وعن ٠,٣ جم فى شتلات الدرجة الثانية ولاتتعدى نسبة النباتات الغير مطابقة لهذه المواصفات عن ٥٪ .
٣- تكون الشتلات خالية من مظاهر الجفاف والعفن والاتزيد نسبة البراعم المكشفة فى الشتلات المجمدة عن ٥٪ .
٤- لاتزيد نسبة النباتات الغريبة عن الصنف عن ٠,١٪ .

٥- لا تزيد نسبة أصابة الشتلات بالامراض والافات الحشرية والحيوانية عن النسبة الموصى بها الموضحة بالجدول المرفق .

(خامسا) رتبة المعتمدة Certified

١- تنتج شتلات هذه الرتبة فى الحقل (المشتل) من رتبة المسجلة كاكثار رابع للنوية مع ضرورة تعقيم التربة .

٢- تكون الشتلات الناتجة قوية ذات مجموع جذرى جيد ولا يقل قطر الساق عن ٠,٥سم فى شتلات الدرجة الأولى وعن ٠,٣ جم فى شتلات الدرجة الثانية ولاتتعدى نسبة النباتات الغير مطابقة لهذه المواصفات عن ١٠٪ .

٣- تكون الشتلات خالية من مظاهر الجفاف والعفن والاتزيد نسبة البراعم المكشفة فى الشتلات المجمدة عن ٥٪ .

٤- لاتزيد نسبة النباتات الغريبة عن الصنف عن ٠,١٪ .

٥- لا تزيد نسبة أصابة الشتلات بالامراض والافات الحشرية والحيوانية عن النسب المسموح بها الموضحة بالجدول المرفق .

ملحوظة :

تعتبر الرتبتين الثانية والثالثة (سوبر ايليت وايليت) هما رتبتى الأساس Foundation stock

نسب الأمراض والآفات الحشرية والحيوانية المسموح بها في الرتب المختلفة

الآفـــــة	رتبتى سوبر ايليت وايليت	رتبة المسجلة	رتبة المعتمدة
١- أمراض فيروسية :	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
- فيروس تجعد الأوراق	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
- فيروس اصفرار حواف الأوراق	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
- فيروس التبرقش	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
- فيروس التقزم	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
- فيروس التبقع الحلقى المستتر	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
- فيروسات اخرى	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
أجمالى الامراض الفيروسية مجتمعة	صـــفـــر	٠,٢ ٪	٣ ٪
٢- أمراض فطرية :			
- مرض القلب الأحمر	صـــفـــر	٠,١ ٪	٠,١ ٪
- مرض ذبول الفيوزاريوم	صـــفـــر	٠,١ ٪	٠,١ ٪
- مرض ذبول الفير تسليم	صـــفـــر	٠,١ ٪	٠,١ ٪
- أمراض أعفان الجذور وعفن التاج	صـــفـــر	٠,١ ٪	٠,١ ٪
- تبقعات ولفحة الأوراق	صـــفـــر	٠,١ ٪	١ ٪
- مرض البياض الدقيقى	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
أجمالى الامراض الفطرية مجتمعة	صـــفـــر	٠,١ ٪	٢ ٪
٣-أمراض بكتيرية :			
- التبقع الزاوى البكتيرى للأوراق	صـــفـــر	صـــفـــر	٠,١ ٪
- الذبول البكتيرى	صـــفـــر	صـــفـــر	٠,١ ٪
٤- أمراض نيماتودية :			
- النيماتودا الناقلة للفيروس	صـــفـــر	صـــفـــر	صـــفـــر
- نيماتودا تعقد الجذور	صـــفـــر	٠,١ ٪	٠,٠٥ ٪
أجمالى الأمراض النيماتودية	صـــفـــر	٠,١ ٪	٠,١ ٪

تابع نسب الأمراض والآفات الحشرية والحيوانية المسموح بها فى الرتب المختلفة

الآفـــــة	رتبتى سوبر ايليت وايليت	رتبة المسجلة	رتبة المعتمدة
٥- الات حشرية :			
- من الفراولة	صـــفـــر	صـــفـــر	٪١
- من القطن	صـــفـــر	صـــفـــر	٪١
- من الخوخ	صـــفـــر	صـــفـــر	٪١
- من الذبابة البيضاء	صـــفـــر	صـــفـــر	٪١
- من العنكبوت الاحمر	صـــفـــر	صـــفـــر	٪٣
- العنكبوت الاخضر	صـــفـــر	صـــفـــر	٪١
- نطاطات الاوراق	صـــفـــر	صـــفـــر	٪١