

Αριθ. 454329

(8)

Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Ρεβυθιού (οσπρίου) (Cicer Arietinum L.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 6 παραγ. 3 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών » (ΦΕΚ 164Α/26.9.1985).

β) Του π.δ. 582/1985 «Έναρξη ισχύος διατάξεων του ν. 1564/1985 και κατάργηση διατάξεων του α.ν. 825/1937, του ν.δ. 1348/1942 και του ν. 4035/1960» (ΦΕΚ 203Α/5.12.1985).

γ) Της αριθ. 344172/7.5.1986 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Δημ. Πιτσιώρη». (ΦΕΚ 318 Β/9.5.1986).

δ) Της αριθ. 440756/30.12.1985 απόφασης Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 124Β/26.3.1986).

2. Την γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού, αποφασίζουμε :

Καθορίζουμε τους όρους και προϋποθέσεις των ποικιλιών Ρεβυθιού (Οσπρίου) για την εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, σύμφωνα με τον παρακάτω τεχνικό κανονισμό :

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΕΒΥΘΙΟΥ (ΟΣΠΡΙΟΥ) (CICER ARIETINUM)

Άρθρο 1.

Είδη δοκιμών

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών του ρεβυθιού είναι :

α) Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).

β) Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

Άρθρο 2.

Χαρακτηριστικά για Δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού του ρεβυθιού που ισχύουν για τις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας έχουν ως εξής :

1. Στέλεχος (στο τέλος της άνθησης) :

- μήκος βλαστού (σε εκ.).

2. Φύλλο (έναρξης άνθησης) :

α) αριθμός φυλλιδίων (αναφέρεται ο αριθμός).

β) Χρώμα : 1 (ανοικτό πράσινο) - 2 (πράσινο σκούρο) - 3 (γκριζοπράσινο).

γ) στυλπνότητα της άνω επιφάνειας : 1 (στυλπνό) - 2 (θαμπό).

δ) τριχίδια στην άνω επιφάνεια : 1 (απουσία) - 2 (λίγα τριχίδια) - 3 (πολλά τριχίδια).

3. Άνθος :

α μεγέθη βρακτίων : 1 (βράκτια μεγαλύτερα από το άνθος) - 2 (μήκος βρακτίων ίσο με το άνθος) - 3 (μήκος βρακτίων μικρότερο από το άνθος).

β) θέση που βγαίνουν τα άνθη (στα φύλλα, ενδιάμεσα, πάνω από τα φύλλα).

γ) χρώμα του πετάσου : 1 (λευκό χωρίς νευρώσεις) - 2 (λευκό με μπλε νευρώσεις) - 3 (μπλέ) - 4 (βιολετί) - 5 (ροζ) 6 (κόκκινο).

4. Λοβός :

α) μήκος (ξηρός λοβός) : (μέτρηση σε εκ.).

β) πλάτος (ξηρός λοβός) : (μέτρηση σε εκ.).

γ) σχήμα καθέτου τομής (ξηρός λοβός) : 1 (ελλειπτικό) - 2 (ωοειδές)

δ) ίνες (λοβός χλωρός) : 1 (απουσία) - 9 (παρουσία)

ε) άκρο : 1 (με αιχμή) - 2 (χωρίς αιχμή)

στ) συσφίξεις (ξηρός λοβός) : 1 (χωρίς συσφίξεις ή με πολύ ελαφρές συσφίξεις) - 2 (μέτριες) - 3 (πολύ εμφανείς).

ζ) επιφάνεια (λεία ή τραχειά) (ξηρός λοβός) : 1 (λεία) - 2 (μέτρια τραχειά) - 3 (τραχειά).

5. Σπόρος (ξηρός) :

α) σχήμα : 1 (σφαιρικό) - 2 (πεπλατυσμένο) - 3 (ζαρωμένο).

β) επιφάνεια : 1 (λεία) - 2 (λίγο ανώμαλη) - 3 (ανώμαλη με αυλακώσεις)

γ) χρώμα : 1 (κίτρινο) - 2 (πράσινο) - 3 (γκρί) - 4 (καφέ) - 5 (μαύρο) 6 (ροζ) - 7 (λευκό).

Άρθρο 3.

Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. του ρεβυθιού είναι οι εξής :

1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας :

α) έκταση επιφάνειας τεμαχίων με γαμμοειδή σπορά : 10 μ.

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος : 2

γ) δοκιμές ανά έτος : 2

δ) έτη σποράς : 2

2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας :

α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών : 50

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος : 2

γ) Δοκιμές ανά έτος : 1

δ) έτη σποράς : 2

Άρθρο 4.

Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

1. Κάθε ποικιλία κρίνεται ως προς την παραγωγικότητα, την αξία χρήσης και την σταθερότητα των αποδόσεων της. Ο πειρ/σμός διαρκεί 2 χρόνια. Αν υπάρχει λόγος παρατείνεται και για τρίτο χρόνο.

2. Η απόδοση της ποικιλίας συγκρίνεται με τη μέση απόδοση ενός μάρτυρα ή ενός Θ.Μ. που περιλαμβάνει 2 ή 3 ποικιλίες που καλλιεργούνται περισσότερο ή προσαρμόζονται καλύτερα στην περιοχή του πειρ/σμού.

3. Στα πειράματα αποδόσεων ανάλογα με το μέγεθος των σπόρων οι ποικιλίες αξιολογούνται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες πειρ/των :

α) Πειρ/τα με μικρόσπερμες ποικ. : Περιλαμβάνονται ποικιλίες με βάρος 1000 σπόρων από 100-300 γρ.

β) Πειρ/τα με μεσόσπερμες ποικ. : Περιλαμβάνονται ποικιλίες με βάρος 1000 σπόρων από 301-400 γρ.

γ) Πειρ/τα με μεγαλόσπερμες ποικ. : Περιλαμβάνονται ποικιλίες με βάρος 1001 σπόρων πάνω από 400 γρ.

4. Σε κάθε κατηγορία πειρ/των της παραγράφου 3 (α, β, γ) πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αποτελεσμάτων τουλάχιστον τεσσάρων πειρ/κών κάθε χρόνο επί 2 συνεχόμενα χρόνια, για να θεωρείται αξιόπιστη η εκτίμηση της παραγωγικότητας της ποικιλίας. Οι πειρ/κοί εγχαθίστανται σε αντιπροσωπευτικές για την καλ/γεια περιοχές και η σπορά τους γίνεται νωρίς την άνοιξη.

5. Η μέση τιμή των μαρτύρων (Θ.Μ.) σε κάθε κατηγορία πειρ/των λαμβάνεται ως βάση για τις συγκρίσεις και βαθμολογείται με 100. Σε κάθε πειρ/σμό υπολογίζεται ο Μ.Ο. της ποικιλίας και ανάγεται επί τοις % του Θ.Μ.

6. Η εκτίμηση της ποιότητας γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια που προσθέτουν ή αφαιρούν μονάδες από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας :

α) Περιεκτικότητα των σπόρων σε πρωτεΐνες : υπολογίζεται επί τοις % του ξηρού βάρους των σπόρων. Η απόκλιση της περιεκτικότητας των σπόρων του Μ.Ο. των μαρτύρων σε πρωτεΐνες από την περιεκτικότητα των σπόρων της υπό εξέταση ποικιλίας, προστίθεται ή αφαιρείται από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας.

β) Μέγεθος σπόρων : Για κάθε 20 γρ. διαφοράς, περισσότερο ή λιγότερα στο βάρος των 1000 σπόρων του Μ.Ο. των μαρτύρων από το βάρος 1000 σπόρων της ποικιλίας, προστίθεται ή αφαιρείται ένα μόριο στην επί τοις % απόδοση της ποικιλίας.

γ) Χρώμα περισπερμίου : Ανάλογα με το χρώμα του περισπερμίου των σπόρων της ποικιλίας αφαιρούνται από την επί τοις % απόδοσή της τα παρακάτω μόρια:

Χρώμα περισπερμίου	Μόρια
Λευκό	0
Ανοιχτό κίτρινο	0
Μπεζ	-2
Ανοιχτό καφέ	-6

Ποικιλίες με χρώμα περισπερμίου μαύρο, κιτρινοπράσινο ή κεραμιδί δεν γίνονται αποδεκτές.

7. Χαρακτηριστικά επίσης που επηρεάζουν συνήθως την απόδοση των ρεβυθιών είναι τα παρακάτω που προσθέτουν ή αφαιρούν μόρια από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας.

Αντοχή στην ασκόχυτα (*Ascochyta Rabiei*). Βαθμολογία : 1 πολύ ευπαθής μέχρι 9 πολύ ανθεκτική.

Η απόκλιση της βαθμολογίας για αντοχή του Μ.Ο. των μαρτύρων από τη βαθμολογία της ποικιλίας προστίθεται ή αφαιρείται από την επί τοις % απόδοση της ποικιλίας.

Αντοχή σε μύκητες εδάφους (*Fusarium Sp*, *Rhizoctonia Sp*, *Sclerotinia Sp*). Βαθμολογία όπως στην ασκόχυτα.

Αντοχή στους παγετούς άνοιξης. Βαθμολογία όπως στην ασκόχυτα.

8. Τελική εκτίμηση της απόδοσης. Προσθέτοντας ή αφαιρώντας στην επί τοις % απόδοση της ποικιλίας, το σύνολο των μορίων των διαφόρων χαρακτηριστικών παίρνεται η τελική βαθμολογία της απόδοσης της ποικιλίας. Η τιμή του Μ.Ο. των μαρτύρων είναι 100. Ποικιλία με «απόδοση» 100 δηλαδή πάνω από τον θεωρητικό μάρτυρα γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 5.

Δεδομένα πειραμάτων.

Τα δεδομένα των πειραμάτων των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελλο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποβεί ικανοποιητική στην εκτίμηση της καλλιεργητικής αξίας και χρήσης προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δοκιμών για Διακριτότητα - Ομοιομορφία - Σταθερότητα.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 1986

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ