

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Bulgaria, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009, Art.52

## BIO IMAZAMOX

Erbicida per soia ed erba medica  
Liquido solubile



**PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE**

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono  
Imazamox, puro 3,7 g (= 40 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100 g

### FRASI DI RISCHIO

Alimento tossico per gli organismi acquatici,  
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente  
acquatico

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano  
da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere,  
né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in  
materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fogliature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere  
smaltiti come rifiuti pericolosi.

### Titolare della registrazione in Bulgaria:

BASF AG, 67056 Ludwigshafen (Germania)  
N° di registrazione: 210-25/01/2005

### Importato dalla Bulgaria da:

Verde Bio S.r.l.  
Viale della Vittoria 14b  
31044 Montebelluna (TV)  
Tel. 0423 614260

### Registrazione n. 15904 del 28/01/2014 del Ministero della Salute

### Officine di rietichettatura / riconfezionamento:

Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay  
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto Netto: Litri 0,5 – 1 – 2,5 – 3 – 5

### Partita n.: vedi fondo della confezione

### NORME DI SICUREZZA

Attenzione manipolare con prudenza - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini  
ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la  
pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua  
e sapone

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.  
Consultare un Centro Antiveneni.

**ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi  
impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.**

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono  
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di  
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### CARATTERISTICHE D'AZIONE

Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene  
traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristemati) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un  
rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in  
genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

### SPETTRO D'AZIONE

Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (oda di volpe), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Ambrosia  
theophrasti* (cencio mole), *Atriplex patula* (atriplce), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio),  
*Lolium spp.* (loglio), *Senecio spp.* (senape), *Raphanus spp.* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore),  
*Polygonum spp.* (poligono), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp.* (riappola).  
La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per  
le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

### DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Erba medica, impiegare a

0,75 – 1,0 l/ha

1 – 1,250 l/ha

Sola impiegare a

Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha. Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del  
trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una  
elevata presenza di graminacee infestanti. In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere  
un graminicida specifico.

### EPOCA DI IMPIEGO

Post-emergenza precoce: su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le  
prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

### FITOTOSSICITÀ

Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia  
qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in  
condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivo). Nel caso che si debba sostituire la coltura  
diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, ceci, trifoglio, insalata e radocchio. Lasciar  
trascorrere un periodo di almeno 4 mesi prima di poter seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, girasole,  
orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni.  
Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo 6 mesi dal trattamento, previa aratura del  
terreno.

**Avvertenza:** per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

**Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.**

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni  
alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI! NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE ALTRE  
COLTURE ALIMENTI E BEVANDE E CORSI D'ACQUA. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE  
NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL  
PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE  
ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SOGLIO DELLE ACQUE  
DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 15904 del 28 gennaio 2014