

ALLEGATO I

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI
NELL'ALLEGATO 1A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN
ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI
ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
1,7 - DIOXASPIRO [5.5] UNDECANO (feromone)	Olive	—	Esente dall'indicazione
2,4-D (diserbante)	Frutta	<u>0.05</u>	Somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D
	Ortaggi	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella	<u>0.05</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	<u>0.1</u>	
	Patate	<u>0.05</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Cereali	<u>0.05</u>	
	Foraggio da prati e pascoli, trifoglio	<u>0.1</u>	
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Frutta a guscio	<u>0.02</u>	Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero della avermectina B1a
	Fragole	<u>0.1</u>	
	Altra frutta	<u>0.01</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0.02</u>	
	Peperoni	<u>0.05</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0.02</u>	
	Lattughe e simili	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.01</u>	
	Legumi da granella	<u>0.01</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0.02</u>	
	Patate	<u>0.01</u>	
	Tè	<u>0.02</u>	
	Luppolo	<u>0.05</u>	
	Cereali	<u>0.01</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, pomacce	<u>1</u>	
	Pesche	<u>0,2</u>	
	Prugne	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa	<u>2</u>	
	Lattughe	<u>1</u>	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello	<u>3</u>	
	Carciofi	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>2</u>	
	Tabacco.....	<u>2</u>	
ACIBENZOLAR-S-METHYL (fungicida)	Pere.....	<u>0,02</u>	Somma di Acibenzolar-S-methyl e del suo metabolita acido, espresso come Acibenzolar-S-methyl
	Nocciole	<u>0,1</u>	
	Banane	<u>0,1</u>	
	Manghi	<u>0,5</u>	
	Pomodori	<u>1</u>	
	Tabacco	<u>10</u>	
AMPELOMYCES QUISQUALIS (fungicida)	Fragole	⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
	Uve da tavola e da vino	⁽¹⁾	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri.....	⁽¹⁾	
AZADIRACTINA (insetticida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, actinidie, cachi, olive	<u>0,5</u>	Residuo espresso come Azadiractina A
	Carote, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, lattuga, scarole, indivie, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolini, sedani, finocchi, porri, funghi coltivati	<u>0,5</u>	
	Mandorle, castagne, nocciole, noci, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi	<u>1</u>	
	Agli, zucche, ricola	<u>1</u>	
	Semi di cotone	<u>0,5</u>	
	Patate	<u>0,5</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
	Tabacco.....	<u>5</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOCICLOTIN (acaricida)	Agrumi, mele.....	<u>0.2</u>	Somma di azociclotin e cixatin espressa come cixatin
	Frutta a guscio.....	<u>0.1</u>	
	Pere.....	<u>0.1</u>	
	Prugne, uve da vino.....	<u>0.3</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.05</u>	
	Fagioli con baccello.....	<u>0.5</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Cereali.....	<u>0.05</u>	
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi.....	<u>1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori fino al 31/07/2003 per frutta (tranne uve da tavola e da vino, banane), ortaggi e cereali.
	Frutta a guscio.....	<u>0.1</u>	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane	<u>2</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.05</u>	
	Carote, barbaforse, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefica, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello.....	<u>0.2</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane.....	<u>2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi.....	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, piselli con baccello.....	<u>0.5</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche.....	<u>3</u>	
	Sedani.....	<u>5</u>	
	Porri.....	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.1</u>	
	Semi di colza.....	<u>0.5</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>20</u>	
	Riso.....	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena.....	<u>0.3</u>	
	Altri cereali.....	<u>0.05</u>	
	Barbabietole da zucchero (radice).....	<u>0.3</u>	
	Barbabietole da zucchero (foglie).....	<u>5</u>	
	Vino.....	<u>0.5</u>	
BACILLUS THURINGIENSIS (insetticida)			Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BEAUVERIA BASSIANA (insetticida)	Agrumi, castagne, nocciole, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, lamponi, Carote, pomodori, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, zucche, zucchine, cetrioli, lattughe, indivie, radicchi, basilico Patate	— ⁽¹⁾ — ⁽¹⁾ — ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Agrumi, banane..... Pomacee..... Drupacee, uve da tavola e da vino..... Fragole..... Altra frutta..... Pomodori, peperoni, melanzane, cavoli a infiorescenza..... Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello..... Cavoli a testa..... Lattughe e simili..... Fagioli con baccello..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Frumento, orzo, avena, triticale..... Altri cereali..... Barbabietole da zucchero..... Tabacco (fresco)..... Tabacco (essiccato commerciale).....	<u>0.1</u> <u>0.3</u> <u>0.2</u> <u>0.5</u> <u>0.05</u> <u>0.2</u> <u>0.1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0.5</u> <u>0.05</u> <u>0.05</u> <u>0.1</u> <u>0.05</u> <u>5</u> <u>10</u> <u>0.5</u> <u>0.05</u> <u>0.01</u> <u>0.5</u> <u>3</u>	
BITERTANOLO (fungicida)	Frutta a guscio..... Pomacee, prugne..... Albicocche, ciliegie, pesche..... Banane..... Altra frutta..... Pomodori..... Cucurbitacee con buccia commestibile..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali..... Barbabietole da zucchero.....	<u>0.1</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>3</u> <u>0.05</u> <u>3</u> <u>0.5</u> <u>0.05</u> <u>0.05</u> <u>0.1</u> <u>0.05</u> <u>0.1</u> <u>0.1</u> <u>0.05</u> <u>0.5</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMOPROPILATO (acaricida)	Frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
CAPTANO (fungicida)	Uve da vino	<u>10</u>	Somma di captano e folpet.
	Pomacee, bacche e piccola frutta (escluse le uve da vino)	<u>3</u>	
	Drupacee	<u>2</u>	
	Pomodori	<u>3</u>	
	Lattughe e simili, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, porri	<u>2</u>	
	Altri prodotti ortofrutticoli	<u>0,1</u>	
CIEXATIN (acaricida)	Vedere AZOCICLOTIN		Somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin
CIFLUTRIN c BETA-CIFLUTRIN (insetticida)	Pomacee, ciliegie, prugne	<u>0,2</u>	Somma degli isomeri
	Albicocche, pesche	<u>0,5</u>	
	Uve	<u>0,3</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, cavoli a infiorescenza, legumi freschi	<u>0,05</u>	
	Peperoni, cavoli a foglia	<u>0,3</u>	
	Cetrioli	<u>0,1</u>	
	Cavoli a testa	<u>0,2</u>	
	Lattughe e simili	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di colza	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>20</u>	
	Mais	<u>0,05</u>	
	Altri cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,5</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitofarmacica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIMOXANIL (fungicida)	Uve	0,1	(1) Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezine
	Agli, cipolle, zucchine, meloni, lattuga, spinaci, piselli senza baccello, porri	0,05	
	Pomodori, carciofi	0,1	
	Cetrioli	0,2	
	Semi di girasole e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Tabacco (verde)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
CIROMAZINA (insetticida)	Frutta	0,05	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine	1	
	Meloni, cocomeri	0,3	
	Lattughe e simili	15	
	Sedani, carciofi	2	
	Funghi coltivati	5	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	1	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	0,05	
	Tabacco (verde)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
CLOFENTEZINE (acaricida)	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee, ribes a grappoli	0,5	
	Prugne	0,2	
	Uve da vino	1	
	Fragole	2	
	More, lamponi	3	
	Altri frutti di piante arbustive	0,3	
	Altra frutta	0,02	
	Pomodori	0,3	
	Meloni	0,1	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Tè	0,05	
CLOMAZONE (diserbante)	Luppolo	0,05	
	Cereali	0,02 ⁽¹⁾	
CLOMAZONE (diserbante)	Riso	0,02	
	Tabacco	0,05	
CLOROPICRINA (geodisinfestante)	Fragole	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni, cocomeri	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola	<u>1</u>	
	Uve da vino, fragole	<u>3</u>	
	More, lamponi, ribes a grappoli, uva spina	<u>10</u>	
	Mirtilli rossi	<u>2</u>	
	Banane	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,01</u>	
	Carote, sedani rapa, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>1</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles	<u>0,5</u>	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche	<u>5</u>	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati	<u>2</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	<u>5</u>	
	Fagioli senza baccello	<u>0,05</u>	
	Piselli senza baccello	<u>0,3</u>	
	Sedani, porri	<u>10</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,01</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01</u>	
	Semi di arachide	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,01</u>	
	Patate	<u>0,01</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	<u>0,1</u>	
	Altri cereali	<u>0,01</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORPIRIFOS (insetticida)	Limoni	<u>0,2</u>	
	Mandarini, actinidie	<u>2</u>	
	Altri agrumi, ciliegie	<u>0,3</u>	
	Pomacee, uve, more, lamponi	<u>0,5</u>	
	Pesche, prugne, fragole	<u>0,2</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>1</u>	
	Banane	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Carote	<u>0,1</u>	
	Ravanelli, cipolle	<u>0,2</u>	
	Solanacee, cavoli cinesi	<u>0,5</u>	
	Cavoli cappucci, carciofi	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Orzo	<u>0,2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabetole da zucchero	<u>0,2</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	<u>0,5</u>	
	Tabacco	<u>0,2</u>	
CONIOTHYRIUM MINITANS (fungicida)			Esente dall'indicazione
CYPRODINIL (fungicida)	Mele, pere	<u>1</u>	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne	<u>0,5</u>	
	Uve	<u>5</u>	
	Fragole	<u>2</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine	<u>0,5</u>	
	Lattuga	<u>10</u>	
	Vino	<u>0,5</u>	
E,E-8,10-DODECADIEN-1-OLO (E,E-8,10-DDOL, CODLEMONE) (feromone)	Pomacee, noci	--	Esente dall'indicazione
E-5-DECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Drupacee	--	Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
E-5-DECEN-1-OLO (feromone)	Drupacee.....	--	Esente dall'indicazione
EPOXICONAZOLO (fungicida)	Frumento, orzo.....	0,1	
	Barbabietola da zucchero.....	0,05	
ESACONAZOLO (fungicida)	Frutta.....	0,02	
	Ortaggi.....	0,02	
	Legumi da granella.....	0,02	
	Semi oleaginosi.....	0,05	
	Patate.....	0,02	
	Tè.....	0,05	
	Luppolo.....	0,05	
	Cereali.....	0,02	
	Vino.....	0,01	
ETION (insetticida - acaricida)	Agrumi.....	2	Sostanza attiva revocata
	Pomacee, drupacee, uve.....	0,5	
	Altri prodotti ortofrutticoli.....	0,1	
	Tè.....	3	
ETOFENPROX (insetticida)	Mele, pere, pesche.....	0,5	
	Agrumi, albicocche, ciliegie, prugne, mirabolani, uve, fragole, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi, actinidie, melograni, cachi.....	1	
	Nocciole, castagne.....	0,5	
	Agli, cipolle, melanzane, meloni, zucche, cocomeri fagiolini, fave, lenticchie, ceci, lupini, cicerchie.....	0,5	
	Pomodori.....	1	
	Peperoni Cavoli di Bruxelles, cavoli bianchi, cavoli verza, cavoli rossi, cavoli cappucci.....	2	
	Lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietole da foglia e da costa.....	3	
	Patate.....	0,5	
	Mais.....	0,5	
	Barbabietole da zucchero.....	0,5	
	Vino.....	0,1	
	Pomodoro trasformato.....	0,5	
ETOFUMESATE (diserbante)	Barbabietole da zucchero (radici).....	0,1	
	Barbabietole da zucchero (foglie).....	1	
	Tabacco.....	0,3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FAMOXADONE (fungicida)	Uve	2	Somma di fipronil e fipronil solfone espressi come fipronil
	Pomodori, zucchine, cetrioli	0,2	
	Meloni	0,5	
	Patate	0,02	
FENPROPIMORF (fungicida)	Fragole, lamponi	1	
	Banane	2	
	Altra frutta	0,05	
	Cavoli di Bruxelles, porri	0,5	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Orzo, frumento, avena, segale, spelt, triticale	0,5	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
FIPRONIL (insetticida)	Pomodori, melanzane	0,01	
	Semi di girasole	0,01	
	Patate	0,05	
	Mais	0,01	
	Sorgo (granella)	0,01	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,02	
	Foraggiere da mais	0,02	
	Tabacco (verde)	0,1	
FLORASULAM (diserbante)	Tabacco (essiccato commerciale)	0,05	
	Frumento, orzo	0,01	
FLUAZINAM (fungicida)	Mais	0,01	
	Mele	0,2	
	Uve	1	
	Patate	0,02	
FLUCITRINATE (insetticida)	Vino	0,02	Somma degli isomeri costituenti
	Frutta	0,05	
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLUDIOXONIL (fungicida)	Pere, albicocche, pesche, prugne, ciliegie	0,5	(1) come acido etilfosfonico. (2) come acido fosforoso.
	Uve	2	
	Fragole	2	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine	1	
	Lattuga	10	
	Frumento, orzo, riso, mais	0,05	
	Vino	0,5	
FLUTRIAFOL (fungicida)	Frumento, orzo, avena	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici) ...	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	3	
FOLPET (fungicida)	Vedere CAPTANO		
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance ..	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Mele, cotogne, pesche, fragole	0,5 ⁽¹⁾ 10 ⁽²⁾	
	Pere	1 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Uve	2 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾	
	Actinidie	2 ⁽¹⁾ 25 ⁽²⁾	
	Meloni	1 ⁽¹⁾ 70 ⁽²⁾	
	Pomodori, cetrioli, cocomeri, lattuga, spinaci, carciofi	0,5 ⁽¹⁾ 10 ⁽²⁾	
	Patate	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Tabacco (fresco)	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾	
FOSTHIAZATE (nematocida)	Pomodori	0,02	
	Banane	0,05	
	Patate	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Olive da olio	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,1</u>	
	Funghi selvatici	<u>50</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1</u>	
	Fagioli da granella	<u>2</u>	
	Piselli da granella	<u>3</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,1</u>	
	Semi di lino, di colza, di cotone e di senape	<u>10</u>	
	Semi di soia	<u>20</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,1</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Frumento, segale, triticale	<u>5</u>	
	Orzo, avena, sorgo	<u>20</u>	
	Altri cereali	<u>0,1</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,1</u>	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	<u>0,1</u>	
HYMEXAZOL (fungicida)	Barbabietole da zucchero	0,02	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Frutta	<u>1</u>	
	Carote, pastinaca	<u>30</u>	
	Ortaggi a bulbo (escluse le cipolline) ..	<u>10</u>	
	Altri ortaggi	<u>1</u>	
	Legumi da granella	<u>1</u>	
	Semi oleaginosi	<u>1</u>	
	Patate tardive	<u>50</u>	
	Patate precoci	<u>1</u>	
	Tè	<u>1</u>	
	Luppolo	<u>1</u>	
	Tabacco (prodotto lavorato finito) ...	80	
IMAZALIL (fungicida)	Agrumi pomacee	<u>5</u>	
	Banane	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori	<u>0,5</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile ..	<u>0,2</u>	
	Meloni	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate novelle	<u>0,02</u>	
	Patate tardive	<u>5</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IMAZAMOX (diserbante)	Fagioli, piselli, fagiolini	0,05	
	Mais	0,05	
	Erba medica	0,05	
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limoni, mandarini, clementine, arance	1	
	Mele, pere	0,5	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne ..	0,3	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni	1	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (verde)	10	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	50	
INDOXACARB (insetticida)	Mele, pere, albicocche pesche	0,3	
	Uve	0,5	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchini, meloni, cocomeri, zucche	0,1	
	Peperoni	0,2	
	Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli verza, cavoli cinesi, cavoli rapa	0,2	
	Lattughe, cicorie, radicchi, scarole, indivie, spinaci	2	
	Vino	0,02	
IODOSULFURON METHYL SODIUM (diserbante)	Frumento	0,01	Somma di iodosulfuron-methyl-sodium e iodosulfuron-methyl, espressa come iodosulfuron-methyl
IPROVALICARB (fungicida)	Uve	2	
	Pomodori	1	
	Patate	0,05	
	Vino	1	
ISOXADIFEN ETHYL (antidoto agronomico da associare al Fenossipropyl etile)	Riso	0,02	Somma di Isoxadifen-ethyl e metabolita nitrile

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina ...	<u>5</u>	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .
	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	
	Pomacee	<u>3</u>	
	Albicocche, pesche, uve, fragole	<u>2</u>	(1) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS ₂
	Ciliegie, prugne	<u>1</u>	
	Olive	<u>5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	(2) Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb, metam sodium, ziram
	Carote, sedani rapa, ravancilli, salsefrica, witloof	<u>0,2</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia, sedani	<u>0,5</u>	
	Pomodori, porri	<u>3</u>	
	Altre solanacee, cetriolini, zucchine ...	<u>2</u>	
	Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello ..	<u>1</u>	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	<u>0,1</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>5</u>	
	Crescione acquatico	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di colza	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>25</u>	
	Capperi	<u>25⁽¹⁾</u>	
	Orzo, avena	<u>2</u>	
	Frumento, segale	<u>1</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>2</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>2⁽²⁾</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	<u>10⁽²⁾</u>	
MESOTRIONE (diserbante)	Maïs	0,02	Somma di Mesotrione e suo metabolita acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico, espressa come Mesotrione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METACRIFOS (insetticida)	Frutta.....	<u>0,05</u>	Sostanza attiva non autorizzata in Italia
	Ortaggi.....	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,05</u>	
	Patate.....	<u>0,05</u>	
	Tè.....	<u>0,1</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1</u>	
	Cereali.....	<u>0,05</u>	
METALAXIL-M (fungicida)	Limoni, mandarini, arance, mele, ciliegie, uve da vino, actinidie ...	1	Somma di Metalaxyl e del suo enantiomero
	Pesche, fragole	0,5	
	Uve da tavola	2	
	Cipolle, pomodori, peperoni, spinaci	1	
	Melanzane, zucchine, cavoli verza, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, carciofi	0,05	
	Cetrioli.....	0,1	
	Meloni, cocomeri, cavoli broccoli, cavolfiori, lattuga	0,5	
	Semi di soia, girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Mais, sorgo	0,05	
	Tabacco	5	
	Erba medica.....	0,05	
	Agrumi.....	3	
	Frutta a guscio.....	0,05	
MICLOBUTANIL (fungicida)	Pomacee, pesche, prugne.....	0,5	
	Albicocche.....	0,3	
	Ciliegie, uve, fragole, ribes a grappoli, uva spina.....	1	
	Banane.....	2	
	Altra frutta.....	0,02	
	Carote, cucurbitacee a buccia non commestibile.....	0,2	
	Pomodori, peperoncini.....	0,3	
	Peperoni, carciofi.....	0,5	
	Cucurbitacee a buccia commestibile...	0,1	
	Altri ortaggi.....	0,02	
	Legumi da granella.....	0,02	
	Semi oleaginosi.....	0,05	
	Patate.....	0,02	
	Tè.....	0,05	
	Luppolo.....	2	
	Cereali.....	0,02	
	Vino.....	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
NAA (fitoregolatore)	Pomacee, pesche	0,1	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
	Fragole, olive	0,01	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, radicchi, spinaci, asparagi, carciofi	0,01	
OLIO MINERALE (insetticida)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, pomacee, drupacee, uve da tavola e vino, ribes, fichi, cachi, olive	—⁽¹⁾	
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli senza baccello, sedani, finocchi, carciofi	—⁽¹⁾	
	Patate	—⁽¹⁾	
	Mais	—⁽¹⁾	
	Barbabietole da zucchero	—⁽¹⁾	
OSSIDEMETON METILE (insetticida)	Frutta	0,02	Somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa come ossidemeton-metile
	Cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e simili	0,05	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Orzo e avena	0,1	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietola da zucchero	0,02	
	Tabacco	0,1	
OXAMIL (nematocida - insetticida)	Meloni, cocomeri, pomodori	0,2	
	Peperoni	0,1	
	Melanzane	0,5	
	Cetrioli, zucchine	1	
	Patate	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
OXIFLUORFEN (diserbante)	Pompelmi, limoni, arance, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve	0,05	
	Olive	1	
	Agli, cipolle, cavoli, carciofi	0,05	
	Semi di girasole	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PENCONAZOLO (fungicida)	Pomacee, uve.....	<u>0.2</u>	Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz
	Albicocche, pesche.....	<u>0.1</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.05</u>	
	Meloni, cocomeri.....	<u>0.1</u>	
	Carciofi.....	<u>0.2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.5</u>	
	Cereali.....	<u>0.05</u>	
	Tabacco.....	<u>0.5</u>	
PICOLINAFEN (diserbante)	Frumento, orzo	<u>0,05</u>	
PROCLORAZ (fungicida)	Agrumi.....	<u>10</u>	Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz
	Frutta a guscio.....	<u>0.1</u>	
	Avocadi, manghi, ananas, papaya.....	<u>5</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.05</u>	
	Agli.....	<u>0.5</u>	
	Scalogni, lattughe e simili, erbe fresche.....	<u>5</u>	
	Funghi coltivati.....	<u>2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Piselli da granella.....	<u>0.3</u>	
	Altri legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi di lino, girasole, ravizzone.....	<u>0.5</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Avena, orzo.....	<u>1</u>	
	Triticale, frumento, segale.....	<u>0.5</u>	
	Altri cereali.....	<u>0.05</u>	
	Barbabietola da zucchero (radici).....	<u>0.1</u>	
	Barbabietola da zucchero (foglie).....	<u>2</u>	
PROFENOFOS (insetticida)	Frutta.....	<u>0.05</u>	Somma di Profosydim e del solfossido
	Peperoncini.....	<u>5</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi di cotone.....	<u>2</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Cereali.....	<u>0.05</u>	
PROFOXYDIM (diserbante)	Barbabietole da zucchero.....	<u>0.05</u>	
	Riso	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROHEXADIONE CALCIUM (fitoregolatore)	Frutta	<u>0,05</u>	Prohexadione e relativi sali espressi come Prohexadione Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Grano, orzo	<u>0,2</u>	
PROPICONAZOLO (fungicida)	Altri cereali	<u>0,05</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Albicocche, pesche	<u>0,2</u>	
	Uve	<u>0,5</u>	
	Banane	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
PYMETROZINE (insetticida)	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
	Agrumi	<u>0,3</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Albicocche, pesche	<u>0,05</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0,5</u>	
	Peperoni	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,2</u>	
	Cavoli cappuccio	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di cotone	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
PYRAFLUFEN ETHYL (diserbante)	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	Somma di Pyraflufen ethyl e Pyraflufen, espressa come Pyraflufen ethyl
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>10</u>	
	Frumento, orzo	<u>0,02</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PYRIMETHANIL (fungicida)	Melc, pere	1	
	Uve	3	
	Fragole	5	
	Banane	0,1	
	Pomodori, peperoni, fagiolini, lattughe	2	
	Cetrioli	0,5	
	Vino	2	
RAME (composti inorganici del) (fungicida)	Frutta	20	Residuo espresso come rame.
	Ortaggi	20	
	Semi oleaginosi	10	
	Patate	20	
	Luppolo (essiccato)	750	
	Luppolo (estratto)	350	
	Cereali	10	
	Barbabietole da zucchero	20	
	Caffè (crudo)	50	
RESMETHRIN (insetticida)	Tabacco	20	Incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri). Sostanza attiva non autorizzata in Italia
	Frutta a guscio	0,2	
	Altra frutta	0,1	
	Ortaggi	0,1	
	Legumi da granella	0,1	
	Semi oleaginosi	0,2	
	Patate	0,1	
	Tè	0,2	
	Luppolo	0,2	
ROTENONE (insetticida)	Cereali	0,05	
	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, olive	0,05	
	Frutta a guscio, fragole, more, more di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina	0,1	
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto (escluso melone e zucca) cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo	0,05	
	Meloni, zucche	0,1	
	Patate	0,05	
	Cereali	0,05	
	Foraggiere leguminose	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Mela, pere	0,1	COMPTON ONLINE
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne ...	0,5	
	Uve	1	
	Pomodoro	0,3	
	Peperone, carciofo	0,5	
	Cetriolo, zuccchino, asparago	0,05	
	Melone, cocomero	0,2	
	Frumento, orzo, segale, avena ...	0,05	
	Vino	0,5	
TEFLUTRIN (insetticida)	Carote, navoni, rape, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cavolfiore, cavoli cappuccio, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, sedani, finocchi	0,05	
	Semi di girasole, di soia e di colza	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, mais, sorgo	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0,3	
TERBITILAZINA (diserbante)	Mais	0,02	
	Sorgo	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
THIACLOPRID (insetticida)	Mele, pere.....	0.5	Sostanza di Thiamethoxam e nitroguanidina, espresso come Thiamethoxam
	Pesche, albicocche.....	0.3	
	Pomodori, melanzane.....	0.5	
	Peperoni.....	1	
	Cetrioli, zucchine.....	0.3	
	Meloni, cocomeri.....	0.2	
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arance, mandarini, limoni, clementini, pesche.....	0.2	
	Mele.....	0.1	
	Cetrioli, zucchine, melanzane, pomodori, lattughe.....	0.2	
	Meloni, cocomeri.....	0.1	
	Peperoni.....	0.5	
	Patate.....	0.1	
	Semi di cotone.....	0.05	
	Mais.....	0.05	
	Barbabietole da zucchero.....	0.05	
	Tabacco (fresco).....	1	
TIABENDAZOLO (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi.....	5	
	Frutta a guscio.....	0.1	
	Avocadi.....	15	
	Papaja.....	10	
	Altra frutta.....	0.05	
	Cavoli broccoli.....	5	
	Funghi.....	10	
	Altri ortaggi.....	0.05	
	Legumi da granella.....	0.05	
	Semi oleaginosi.....	0.05	
	Patate tardive.....	15	
	Patate precoci.....	0.05	
	Tè.....	0.1	
	Luppolo.....	0.1	
	Cereali.....	0.05	
TIFENSULFURON METILE (diserbante)	Frutta.....	0.05	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi.....	0.05	
	Legumi da granella.....	0.05	
	Semi oleaginosi.....	0.05	
	Patate.....	0.05	
	Tè.....	0.1	
	Luppolo.....	0.1	
	Cereali.....	0.05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIADIMEFON (fungicida)	Frutta a guscio.....	<u>0,2</u>	Somma di triadimefon e triadimenol
	Mele, banane.....	<u>0,2</u>	
	Uve.....	<u>2</u>	
	Fragole.....	<u>0,5</u>	
	Ananas.....	<u>3</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,1</u>	
	Cipolle, peperoni.....	<u>0,5</u>	
	Cipolline, carciofi.....	<u>1</u>	
	Pomodori.....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,1</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,1</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,2</u>	
	Patate.....	<u>0,1</u>	
	Tè.....	<u>0,2</u>	
	Luppolo.....	<u>10</u>	
TRIADIMENOL (fungicida)	Frumento, orzo, avena, segale, triticale..	<u>0,2</u>	
	Altri cereali.....	<u>0,01</u>	
TRIADIMEFON (fungicida)	Vedere TRIADIMEFON		
TRIASULFURON (diserbante)	Frutta.....	<u>0,05</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi.....	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,05</u>	
	Patate.....	<u>0,05</u>	
	Tè.....	<u>0,1</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1</u>	
	Cereali.....	<u>0,05</u>	
TRIAZAMATE (insetticida)	Mele, pere.....	<u>0,02</u>	Somma di Triazamate e suo acido
	Barbabietole da zucchero.....	<u>0,05</u>	
TRIDEMORF (fungicida)	Frutta a guscio.....	<u>0,1</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05</u>	
	Ortaggi.....	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,1</u>	
	Patate.....	<u>0,05</u>	
	Tè.....	<u>20</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1</u>	
	Orzo, avena.....	<u>0,2</u>	
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	Altri cereali.....	<u>0,05</u>	
	Mele, pere.....	<u>0,5</u>	
	Uve.....	<u>3</u>	
	Banane.....	<u>0,1</u>	
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri.....	<u>0,2</u>	
	Frumento.....	<u>0,05</u>	
	Orzo.....	<u>0,2</u>	
	Barbabietola da zucchero.....	<u>0,05</u>	
	Vino.....	<u>0,3</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRINEXAPAC ETHYL (fitoregolatore)			Esente dall'indicazione
Z,E-8- DODECENILACETATO (feromone)	Pomacee, drupacee.....	--	Esente dall'indicazione
Z-11-TETRADECEN-1- ILE ACETATO (feromone)	Pomacee.....	--	Esente dall'indicazione
ZETA CIPERMETRINA (insetticida)	Arance, limoni, pesche..... Mele, pere Uve Solanacee, cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli cappucci, fagiolini Cetrioli, meloni Lattuga, indivia, cicoria Patate Mais, frumento..... Barbabietola da zucchero..... Tabacco (verde)	2 1 0,5 0,5 0,2 2 0,05 0,05 0,05 1	Vedere anche Cipermetrina Somma degli isomeri costituenti

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 D
DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE**

PARTE A

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari		di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0407 00, 0408 (3) (4)
	ABAMECTINA (Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e della-8,9 isomero della avermectina B1a)	<u>0.02</u> fegato bovino [cfr. regolamento (CE) n. 3425/93]	<u>0.005</u>	<u>0.01</u>
	BIFENTRIN	<u>0.01</u> altri prodotti		
		<u>0.1</u> grasso di bovini	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>
		<u>0.05</u> altri prodotti		
	BITERTANOLO	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>
	BROMOPROPILATO	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>
	2,4-D	<u>1</u> ^(P) rognoni, eccetto pollame	<u>0.01</u> ^(P)	<u>0.01</u> ^(P)
		<u>0.05</u> ^(P) altri prodotti		

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari		di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0407 00, 0408 (3) (4)
	FLUCITRINATE (somma di isomeri espressa come flucitrinato)	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>
	METACRIFOS	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>
	PENCONAZOLO	<u>0.05</u>	<u>0.01</u>	<u>0.05</u>
	PROCLORAZ (Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz)	<u>0.2</u> grasso bovino <u>2</u> fegato bovino <u>0.5</u> rognone bovino <u>0.1</u> altri prodotti	<u>0.02</u>	<u>0.1</u>
	PROFENOFOS	<u>0.05</u>	<u>0.01</u>	<u>0.05</u>
	RESMETHRIN Incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri).	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	di grassi; delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, elencati nell'allegato I D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato I D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408 (3) (4)
TRIDEMORF	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>
TRIADIMEFON E TRIADIMENOL Somma di triadimefon e triadimenol	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>

⁽¹⁾ Limiti massimi comunitari provvisori

PARTE B

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari		di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, come elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca e i prodotti alimentari elencati nell'allegato I D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408
	AZOCICLOTIN e CIEXATIN (somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin)	<u>0.2</u> carni bovine <u>0.05</u> altri prodotti	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>
	FENPROPIMORF acido carbossilico (BF 421-2) espresso come fenpropimorf	<u>0.3</u> fegato di bovini, suini, ovini e caprini <u>0.05</u> rognone di bovini, suini, ovini e caprini <u>0.01</u> carni di pollame, grassi, frattaglie commestibili <u>0.02</u> carni bovine, suine, ovine e caprine <u>0.01</u> altri prodotti	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>
	CIROMAZINA	<u>0.05</u> tutti i prodotti eccetto gli ovini	<u>0.02</u>	<u>0.2</u>
	CLOFENTEZINE (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-cloro-benzoil espressa come clofentezine)	<u>0.1</u> fegato di bovini, ovini e caprini <u>0.05</u> altri prodotti	<u>0.05</u>	<u>0.02</u>

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, come elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca e i prodotti alimentari elencati nell'allegato I D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408
Residui di antiparassitari			
ALFA-(3-IDROSSIBUTILE)-ALFA-(4-CLOROFENILE)-1h-1,2,4-TRIAZOLO-1-PROPANENITRILE (rh9090) espresso come miclobutanil	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
(Z)-11-TETRADECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Pomacee	--				Applicazione mediante diffusori sui rami
1,7 - DIOXASPIRO [5,5] UNDECANO (feromone)	Olivo	--				Applicazione mediante trappole collocate all'interno della zona medio-alta della chioma della pianta
2,4-D (diserbante)	Cereali Prati, pascoli	20 20			Diserbo totale dei terreni in avvicendamento. Tappeti erbosi, sponde di canali, sedi ferroviarie, aree industriali, aree ed opere civili.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofitica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Limone, mandarino, arancio	10			Iniezione al tronco di latifoglie e conifere. Vivai di arbustive ed arboree.	⁽¹⁾ Applicazione in terra ed in vaso
	Melo, vite	28				
	Pero	14				
	Fragola	7				
	Peperone	7				
	Peperone, cetriolo, melone	3				
	Melanzana	7				
	Lattuga	14				
	Floreali e ornamentali ⁽¹⁾	--				
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, susino	21			Vivai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	⁽¹⁾ Solo applicazione pre-fiorale (bottoni rosa) e post-fiorale (caduta petali) ⁽²⁾ Applicazione in pre-fioritura. ⁽³⁾ Applicazione fino alla ripresa vegetativa.
	Pesco ⁽¹⁾	--				
	Pomacee	30				
	Ciliegie ⁽²⁾ , albicocco ⁽²⁾	60				
	Mandorlo, vite	50				
	Fragole ⁽³⁾	45				
	Olivo	35				
	Cerota, ravanella, rapa, solanacee (escluso il peperone), zucchini, zucca, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, lattuga, legumi, carciofo	21				
	Melone, cocomero	45				
	Patata	21				
	Mais	60				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Tabacco	21				
	Floreali, ornamentali, forestali ...	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
ACIBENZOLAR-S-METHYL (fungicida)	Pero	14				
	Nocciolo	28				
	Pomodoro	3				
	Tabacco	7				
AMPELOMYCES QUISQUALIS (fungicida)	Fragola	--				Trattamento anche per fertirrigazione.
	Vite	--				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zuccchino, melone, zucca, cocomero	--				
	Rosa	--				
AZADIRACTINA (insetticida-nematocida)	Pompelmo, limone, mandarino, arancio, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, fico, actinidia, caco, olivo	3			Iniezione al tronco di platano e ippocastano. Vivai	Applicazione alla coltura e al terreno
	Mandorlo, castagno, nocciolo, noce	7				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zuccchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, lattuga, scarola, indivia, rucola, aglio, zucca, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolino, sedano, finocchio, porro, funghi coltivati	3				
	Cotone	3				
	Patata	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Florali, ornamentali e forestali ...	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
AZOCICLOTIN (acaricida)	Melo, susino	21				
	Floricoli, ornamentali	--				
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Fragola	3				a) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni
	Vite	21				
	Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo	7				
	Pomodoro, peperonc, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, zucca, cocomero	3				
	Asparago	3				
	Porro	15				
	Frumento, orzo	35				
	Riso	28				
	Barbabietola da zucchero	30				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies AIZAWAI (insetticida)	Agnomi, drupacee, fragola, actinidia, olivo	-			Tappeti erbosi Vivai	
	Pomacee, vite	3				
	Cucurbitacee, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo	-				
	Solanacee, ravanello, rapa, pomodoro, peperone, cavoli, bietola da foglia e da costa, basilico, porro	3				
	Soia, girasole	3				
	Ravizzone, colza, cotone	-				
	Patata	-				
	Mais	-				
	Barbabietola da zucchero	-				
	Tabacco	-				
	Floreali, ornamentali	-				
	Forestali, pioppo	-				
BEAUVERIA BASSIANA (bioinsetticida)	Agnomi, castagno, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, rovo, lampone	-				
	Carota, pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchina, cetriolo, lattuga, indivia, radicchio, basilico	-				
	Patata	-				
	Floreali e ornamentali	-				
		-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limone	31			Vivai Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Arancio, mandarino, melo, pero, pesco, susino	21				
	Fragola	14				
	Albicocco, ciliegio, amarena, mirabolano, vite	7				
	Cavolo broccolo, cavolfiore, cavoli a testa, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, rucola, dolcetta, melone, cocomero, zucca, mais dolce	7				
	Peperone	14				
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchini, pisello	7				
	Fagiolino, fava, porro, radicchio ..	3				
	Colza	240				
	Cotone	--				
	Frumento, mais	42				
	Barbabietola da zucchero	7				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				
BITERTANOLO (fungicida)	Pomacee, albicocco, ciliegio, pesco, susino	21			Concia delle sementi di frumento. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Cetriolo, zucchini	14				
	Barbabietola da zucchero	20				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
BROMOPROPILATO (acaricida)	Floreali, ornamentali	--			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
BROMOXINIL OTTANOATO (diserbante)	Aglio..... Frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo.....	-- --				
CAPTANO (fungicida)	Pomaceo..... Albicocco, pesco, nectarino	15 10			Concia delle sementi di ortaggi, mais e sorgo.	
CIEXATIN (acaricida)	Melo, pero..... Floreali, ornamentali	30 --				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
CIFLUTRIN (insetticida)	Melo, pesco, ciliegio, susino	3			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Pero	21				
	Vite	7				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli (esclusi i cavoli a foglia), lattuga, fagiolo, pisello	3				
	Melone, cocomero, cavoli a foglia	7				
	Patata	14				
	Frumento, orzo	3				
	Mais	28				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	-				
	Floreali, ornamentali, pioppo	-				
CIMOXANIL (fungicida)	Vite	10			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	(1) Anche applicazione in serra
	Aglio, cipolla, pomodoro ⁽¹⁾ , cetriolo, zucchini, melone, lattuga, spinacio, pisello, porro	10				
	Carciofo	21				
	Girasole, soia	28				
	Patata	10				
	Tabacco	10				
	Rosa	-				
CIROMAZINA (insetticida)	Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchini, melone, cocomero, lattuga ⁽¹⁾ , sedano, carciofo	14				Applicazione alla coltura e al terreno. (1) Solo applicazione in campo
	Funghi	14				
	Patata	35				
	Tabacco	14				
	Floreali	-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
CLOFENTEZINE (acaricida)	Agrumi, melo, pero, susino, vite da vino	30				
	Fragola	15				
	Pomodoro, melone	15				
	Floreali, ornamentali	--				
CLOMAZONE (diserbante)	Riso	--				Applicazione in pre- e post-emergenza delle colture
	Tatacco	--				
CLOROPICRINA (geodisinfestante)					Applicazione al terreno prima della semina di fragola, pomodoro, peperone, melanzana, zuccina, melone, cocomero	Tra il trattamento e l'inizio della semina o dei trapianti devono intercorrere almeno 15 giorni
CLOROTALONIL (fungicida)	Melo, pero, pesco	21				Applicazione alla coltura ed al terreno
	Susino	35				⁽¹⁾ Trattamenti ammessi fino alla fioritura.
	Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano	14				⁽²⁾ Trattamenti ammessi fino alla fioritura (esclusa)
	Fagiolo ⁽¹⁾ , pisello ⁽¹⁾ , fagiolino ⁽²⁾	--				
	Patata	14				
	Barbabietola da zucchero	14				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
CLORPIRIFOS (insetticida)	Agrumi	60			Applicazione al terreno destinato a cavoli ad infiorescenza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo rapa	Applicazione alla coltura e al terreno. (1) Applicazione alla coltura per formulati liquidi. (2) Applicazione al terreno alla semina per i prodotti granulari.
	Melo, pero, pesco	30				
	Vite	30				
	Olivo	90				
	Melanzana, fagiolo, pisello, asparago	15				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone	21				
	Soia, girasole	120				
	Patata	30 ⁽¹⁾				
	Patata	60 ⁽²⁾				
	Mais	30				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Tabacco	60				
CONIOTHYRIUM MINITANS (fungicida)	Floricali, ornamentali, pioppo	--			Terreno destinato alle colture orto-floro-fruticole suscettibili all'attacco di Sclerotinia spp	
CYPRODINIL (fungicida)	Melo	21				
	Pero	14				
	Albicocco, pesco, susino, ciliegio	7				
	Vite	21				
	Fragola	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchini	7				
	Lattuga	14				
	Floricali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
E-5-DECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Drupacee.....	--				Applicazione mediante diffusori sui rami
E-5-DECEN-1-OLO (feromone)	Drupacee.....	--				Applicazione mediante diffusori sui rami
EE-8,10-DODECADIEN-1-OLO (E,E-8,10- DDDOL , Codlemone) (feromone)	Pomacee..... Noci.....	-- --				Applicazione mediante diffusori sui rami
EPOXICONAZOLO (fungicida)	Frumento, orzo..... Barbabietola da zucchero.....	35 28				
ESACONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, vite..... Pomodoro, carciofo..... Floreali e pioppo.....	15 7 --			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofitica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
ETO FENPROX (insetticida)	Melo, pero, pesco, agrumi, ciliegio, albicocco, susino, mirabolano, fragola, mora, rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, actinidia, fico, melograno, cachi.....	7			Vivai di forestali	⁽¹⁾ Non in aree golenali
	Vite, nocciolo, castagno.....	14				
	Cipolla.....	14				
	Melanzana, melone, pomodoro, cocomero, zucca.....	3				
	Peperone, cavolo cappuccio, fagiolino, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erte fresche, spinacio, bietola da foglia e da costa, fava, lenticchia, cece, lupino, cicerchia, aglio, cavolo di Bruxelles, cavolo bianco, cavolo verza, cavolo rosso.....	7				
	Patata.....	7				
	Mais.....	28				
	Barbabietola da zucchero.....	14				
	Floreali, ornamentali, pioppo ⁽¹⁾ ...	--				
ETO FUMESATE (diserbante)	Barbabietola da zucchero.....	--				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Tabacco.....	90				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
FAMOXADONE (fungicida)	Vite	28				⁽¹⁾ Applicazione anche in serra
	Pomodoro ⁽¹⁾ , zuccchino, cetriolo, melone	10				
	Patata	14				
FENPROPIMORF (fungicida)	Frumento, orzo, segale, avena	35				Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto con mezzi meccanici
	Barbabietola da zucchero	21				
FIPRONIL (insetticida)	Pomodoro, melanzana	-			Concia delle sementi di mais	
	Girasole	-				
	Patate	-				
	Mais	-				
	Sorgo	-				
	Barbabietole da zucchero	-				
	Tabacco	-				
FLORASULAM (diserbante)	Frumento, orzo	-				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Mais	-				
FLUAZINAM (fungicida)	Melo	21				
	Vite	28				
	Patata	7				
FLUCITRINATE (insetticida)	Fagiolo	14				
	Patata	14				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali, pioppo	-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
FLUDIOXONIL (fungicida)	Pero, albicocco, pesco, susino, ciliegio	14			Concia delle sementi di frumento, orzo, riso, mais e bulbi di gladiolo.	
	Vite	21				
	Fragola	7				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zuccchino, melanzana	7				
	Lattuga	14				
	Flcerealì	-				
FLUTRIAFOL (fungicida)	Frumento, orzo, avena	35			Concia delle sementi di barbabietola da zucchero, frumento, orzo, avena, mais, riso soia.	
	Barbabietola da zucchero	30				
FOLPET (fungicida)	Vite (uve da tavola)	10			Vivai di fruttiferi. Tappeti erbosi di graminacee. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	(1) Esistono in commercio anche prodotti autorizzati con un intervallo di 15 giorni
	Vite (uve da vino)	40				
	Fragola	10				
	Pomodoro	7				
	Melone	21				
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmo, limone, mandarino, arancio	80 ⁽¹⁾				
	Melo, pero, corogno, pesco, vite, actinidia,	40				
	Fragola	30				
	Pomodoro	20				
	Cetriolo, melone, cocomero, lattuga, spinacio, carciofo	15				
	Patata	20				
	Tabacco	40				
	Ornamentali	-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
FOSTHAZATE (nematocida)	Pomodoro	--				Solo applicazione con mezzi meccanici
	Patata	--				
FOXIM (insetticida)	Carota, aglio, cipolla, solanacee, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, bietola da foglia e da costa, fagiolo, pisello, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro	42			Concia delle sementi di frumento, orzo, mais.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.
	Soia	42			Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione dei prodotti agrari	
	Patata	42			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Frumento, mais	42				
	Barbabietola da zucchero	42				
	Tabacco	42				
	Floreali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, noce, melo, pero, drupacee, vite, actinidia, olivo	--			Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, lino, senape, colza, girasole, cotone, sorgo Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo	--				
	Mais, riso, soia	--				
	Patata	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Erba medica, prati	--				
	Pioppo	--				
	Rosa	--				
HYMEXAZOL (fungicida)					Concia delle sementi di barbabietola da zucchero	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Aglio, cipolla	--				
	Tabacco	--				
IMAZALIL (fungicida)			Agrumi ⁽¹⁾	--	Concia delle sementi di cereali	

⁽¹⁾ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
IMAZAMOX (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagioliuo	35				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Mais (varietà IMI-resistenti)	90				
	Erba medica	40				
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limone, mandarino, clementino, arancio	14			Concia delle sementi di girasole, patata, mais, barbabietola da zucchero. Iniezione al tronco di latifoglie. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	⁽¹⁾ Anche applicazione in serra, con intervallo minimo di 3 giorni per uso in miscela
	Melo	28				
	Pero	50				
	Albicocco	35				
	Ciliegio, pesco, susino	21				
	Pomodoro ⁽¹⁾ , peperone ⁽¹⁾ , melanzana, melone, cocomero	7				
	Patata	14				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Tabacco	14				
	Floreali, ornamentali	--				
INDOXACARB (insetticida)	Melo, pero, albicocco, pesco, nettarino	7				
	Vite	10				
	Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zuccchino, melone, cocomero, zucca, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavoletto di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cinese, cavolo rapa, lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia	3				
	Spinacio	5				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
IODOSULFURON METHYL SODIUM (diserbante)	Frumento.....	—				Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti
IPROVALICARB (fungicida)	Vite	20				(1) in serra
	Pomodoro.....	7 ⁽¹⁾				(2) in campo
	Patata	20 ⁽²⁾ 7				
ISOXADIFEN ETHYL (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Riso	—				Diserbo in post-emergenza della coltura e delle infestanti in condizioni di risaia non sommersa.
MANCOZEB (fungicida)	Pomacee, vite	28			Concia delle sementi. Concia ad umido delle sementi di riso, mais, barbabietola da zucchero patata, ortaggi, girasole. Semeenza di colture di tabacco. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra.
	Pomodoro, patata	7				
	Asparago	28				
	Orzo, avena, frumento, segale	28				
	Tabacco	28				
	Garofano, rosa, pioppo	—				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
MESOTRIONE (diserbante)	Mais	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti con attrezzature meccaniche
METALAXYL-M (fungicida)	Arancio, limone, mandarino, ciliegio	30			Tappeti erbosi.	(1) trattamenti
	Melo, vite	28			Concia delle sementi di pomodoro,	fino alla fioritura
	Pesco	20			peperone, spinacio,	(2) trattamenti
	Actinidia	180			melanzana,	fino alla pre-fioritura
	Fragola	40			zucchino,	
	Cipolla, melone, cavolfiore, cavolo				melone, pisello,	
	broccolo, carciofo, spinacio	20			soia, girasole, mais,	
	Pomodoro	10			sorgo, tabacco,	
	Peperone, melanzana, lattuga	15			ornamentali e	
	Cetriolo	14			forestali.	
	Cavolo verza	60			Concia dei bulbi di	
	Cocomero	5			ornamentali	
	Fagiolo	14				
	Pisello ⁽¹⁾ , fagiolino ⁽²⁾	--				
	Soia	150				
	Patata	20				
	Tabacco	7				
	Floreali, ornamentali	--				
MICLOBUTANIL (fungicida)	Melo, pero, vite	15			Impiego su floreali e ornamentali da	
	Albicocco, pesco, susino	7			appartamento e da	
	Fragola	3			giardino domestico	
	Pomodoro, peperone, cetriolo,					
	zucchino, cocomero, melone	30				
	Rosa, garofano	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
NAA (fitoregolatore)	Pomacee, pesco	7			Radicazione di talee erbacee, legnose e arbustive di piante ornamentali e da frutto. Cicatrizzante per piante arboree. Spollonante per fruttiferi. Semenzai Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico Vivai di forestali	Applicazione per il diradamento in fase di fioritura e, in preraccolta, come antiscelta in fase di caduta dei frutti.
	Fragola	27				
	Olivo	24				
	Pomodoro, peperone, melanzana, zucchini, radicchio, spinacio, carciofo	7				
	Asparago	27				
	Floreali, ornamentali	-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
OLIO MINERALE (insetticida)	Agrumi: mandarino, noce, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, ribes, fico, caco, olivo	20			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Coadiuvante nei trattamenti di post-emergenza delle infestanti su cereali autunno-vernini, peperone, pomodoro, patata, fagiolo, carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, barbabietola da zucchero, mais e soia	Non usato come insetticida su barbabietola da zucchero e mais.
	Pomodoro, peperone, cucurbitacee, fagiolo, sedano, finocchio, carciofo	20				
	Patata	20				
	Mais	20				
	Barbabietola da zucchero	20				
	Floreali, ornamentali, forestali	1				
OSSIDEMETON-METILE (insetticida)	Melo, pero,	90				Divieto di impiego in serra.
	Patata	28				
	Frumento	30				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Tabacco	30				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
OXAMIL (nematocida - insetticida)	Peperone, melanzana, cetriolo, zuccchino, melone, coconero, pomodoro ^(1*)	3				⁽¹⁾ Anche trattamento al terreno in pre-trapianto, solo in serra ⁽²⁾ Trattamento fino alla semina ⁽³⁾ Solo applicazione al terreno al momento della semina.
	Papaia ⁽²⁾	-				
	Barbabietola da zucchero ⁽³⁾	-				
OXIFLUORFEN (diserbante)	Pompelmo, limone, arancio, mandarino, nocciolo, pomacee, drupacee, vite ..	-			Vivai di piante forestali e ornamentali, taleai e piantenai di pioppo ed eucalipto. Aree industriali e civili, bordi stradali, argini. Sedi ferroviarie	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. ^(*) Solo applicazione al terreno prima del trapianto
	Olio	7				
	Aglione, cipolla, carciofo	10				
	Cavoli	11				
	Girasole	11				
PENCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite, fragola	14			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Pomodoro peperone, cetriolo, zuccchino, melone, zucca, pisello, carciofo	14				
	Tabacco	14				
	Fiorali, ornamentali	-				
PICOLINAFEN (diserbante)	Frumento, orzo	-				Applicazione in post-emergenza precoce.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
PROCLORAZ (fungicida)	Furghi	10			Concia delle sementi di cereali e dei bulbi di gladiolo, tulipano, ixia. Disinfezione delle talee di floreali e ornamentali. Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali	⁽¹⁾ Massimo due trattamenti fogliari l'anno. Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali).
	Frumento, orzo	40				
	Barbabietola da zucchero	20 ⁽¹⁾				
	Garofano, rosa	-				
PROFENOFOS (insetticida)	Agrumi	70				
	Melo	-				
	Pesce	60				
	Peperone	28				
	Cavolfiore, cavolo cappuccio, carciofo	21				
	Fagiolo, fagiolino, fava	21				
	Patata	14				
	Mais	19				
	Barbabietola da zucchero	64				
	Floreali	-				
PROFOXYDIM (diserbante)	Pioppo	-				
	Riso	-				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
PROHEXADIONE CALCIUM (fitoregolatore)	Melo, pero	55				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofattica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite	14			Tappeti erbosi. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Melone, carciofo	14				
	Frumento, orzo, segale, avena	28				
	Riso	42				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Rosa	--				
PYMETROZINE (insetticida)	Limone, mandarino, arancio	21				
	Pesco	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zuccchino	3				
	Lattuga	7				
	Patata	7				
	Tabacco	14				
	Ficcerali e ornamentali	--				
PYRAFLUFEN ETIHL (diserbante)	Frumento, orzo	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
PYRIMETHANIL (fungicida)	Melo, pero	14			Concia bulbi di tulipane	⁽¹⁾ Solo impiego in colture protette
	Vite	21				
	Fragola	3				
	Pomodoro, peperone ⁽¹⁾ , cetriolo ⁽¹⁾	3				
	Lattuga, fagiolini ⁽¹⁾	14				
	Ciclamino	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
RAME (composti inorganici del) (fungicida)	Fruttiferi (escluse le fragole)....	20			Concia anticarie delle sementi di cereali (esclusi mais, sorgo, riso). Lotta contro le alghe ed i molluschi delle risaie. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Fragole	3				
	Ortaggi	3				
	Oleaginose	20				
	Patata	3				
	Cereali	20				
	Barbabietola da zucchero	20				
	Tabacco	20				
ROTENONE (insetticida)	Floreali, ornamentali, forestali ..	--			Vivai Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Agrumi, pomacee, drupacee, vite, olivo	10				
	Frutta a guscio, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina	3				
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto (escluso melone e zucca), cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, ortaggi a stelo	10				
	Melone, zucca	3				
	Patata	10				
	Cereali	20				
	Tabacco	10				
	Foraggiere leguminose	10				
	Floreali, ornamentali, forestali ..	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofitica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Melo	30			Concia delle sementi di frumento, orzo, segale ed avena. Tappeti erbosi	⁽¹⁾ Trattamento durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei turioni.
	Pero	15				
	Albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino	7				
	Vite	14				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zuccchino	3				
	Melone, cocomero, carciofo	7				
	Asparago	1 ⁽¹⁾				
	Frumento, orzo, segale, avena	30				
TEFLUTRIN (insetticida)	Carota, navone, rapa, pomodoro ⁽¹⁾ , peperone ⁽¹⁾ , melanzana, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio	-			Concia industriale delle sementi di barbabietola da zucchero	Divieto di impiego in serra. Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto. ⁽¹⁾ Anche applicazione alla sarchiatura o rincalzatura.
	Girasole, soia, colza	-				
	Patata ⁽¹⁾	-				
	Frumento, mais, sorgo	-				
	Barbabietola da zucchero	-				
	Tabacco	-				
	Floreali, ornamentali	-				
		-				
TERBUTILAZINA (diserbante)	Mais, sorgo	-				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
TETRADIFON (acaricida)	Agnimi, mandorlo, noce, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, lampone, actinidia, olivo	15			Vivai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Carota, ravanella, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro ..	15				
	Patata	15				
	Luppolo	15				
	Fumento, mais	15				
	Favino	15				
	Tabacco	15				
	Floreali, ornamentali, forestali ..	-				
THIACLOPRID (insetticida)	Melo, pero, albicocco, pesco, nettarino.	14			Concia delle sementi di patata, mais, barbabietola da zucchero, cotone. Vivai di arboree ed arbustive	⁽¹⁾ solo trattamento in campo
	Pomodoro, melanzana, peperone					
	cetriolo, zuccino melone, cocomero....	3				
	Floreali, ornamentali	-				
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arancio ⁽¹⁾ , mandarino ⁽¹⁾ , limone ⁽¹⁾ , clementino ⁽¹⁾	28				
	Melo ⁽¹⁾ , pesco ⁽¹⁾ , pesco da nettarine, pesco da percoche.....	14				
	Cetriolo, zuccino, melanzana, pomodoro, melone, cocomero, peperone	3				
	Lattuga.....	7				
	Patata ⁽¹⁾	7				
	Tabacco ⁽¹⁾	14				
	Ornamentali, floreali.....	-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
TIABENDAZOLO (fungicida)	Melo, pero	15	Mele, pere,	30	Cencia delle sementi di cipolla, aglio, patata, frumento, riso. Conservazione delle patate da seme. Semenze di colture di tabacco. Cicatrizante per drupacee, pomacee, castagno, noce, forestali, pioppo. Iniezioni al tronco per platano	Applicazione alla coltura (melo, pero) e al terreno (garofano).
	Funghi	5	agrumi ⁽¹⁾			
	Garofano	--	Patate ⁽¹⁾			
TIFENSULFURON METILE (diserbante)	Sola	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Frumento, orzo, avena, mais	--				
TRIADIMEFON (fungicida)	Vite	15			Disinfezione delle ferite su pomacee, drupacee, vite, ornamentali e forestali.	
	Peperone	7				
	Carciofo	10				
	Frumento, orzo	30				
	Floreali, ornamentali	--				

⁽¹⁾ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
TRIADIMENOL (fungicida)	Melo, vite	14			Concia delle sementi di frumento, orzo, avena, segale, triticale.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Pomodoro, peperone, cetriolo, melone	14				
	Zucchino	7				
	Frumento, orzo, avena, segale, triticale.	30				
	Ornamentali	-				
TRIASULFURON (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, avena	-				
TRIAZAMATE (insetticida)	Melo, pero	28				
	Barbabietola da zucchero	28				
TRIDEMORF (fungicida)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso).....	40				
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	Melo, pero	14				
	Vite	35				
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri	3				
	Frumento, orzo	42				
	Barbabietola da zucchero	21				
TRINEXAPAC ETHYL (fitoregolatore)	Rosa	-				
					Tappeti erbosi di graminacee	
Z/E -8-DODECENIL-ACETATO (feromone)	Poinacee, drupacee.....	-				Applicazione mediante diffusori sui rami

ALLEGATO 4

REVOCA DI IMPIEGO DI COMBINAZIONI SOSTANZA ATTIVA/COLTURA

Sostanza attiva	Colture per le quali l'impiego è revocato
ABAMECTINA	Sedano
AZOCICLOTIN	Pero, vite da tavola e da vino, fragole, melanzane, cetrioli, fagioli, soia
BIFENTRIN	Uve*, more, more di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, carciofo, mais dolce*, fava*
BITERTANOLO	Mandorle, drupacee (escluse albicocche, ciliegie, pesche, prugne), fagioli, porri
BROMOPROPILATO	Agrumi, pomacee, pesche, uve, fragole, pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, fagioli, piselli, fagiolini, sedani
CIEXATIN	Soia
CIROMAZINA	Fragole, carote*, cipolle, peperoni, prezzemolo, fagioli, piselli
CLOFENTEZINE	Drupacee (escluse le prugne), uve da tavola, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, zucche, mandorle, cocomero
2,4-D	Agrumi, nocciole, patate, trifoglio, foraggio da prati e pascoli*
ESACONAZOLO	Pesche, zucchini, meloni
FLUCITRINATE	Mele, pere, pesche, uve, pomodori, peperoni, cetrioli, cavolfiori, cavoli a testa, fagiolini, carciofi
MICLOBUTANIL	Frumento
PENCONAZOLO	Fragole*, cipolle, peperoni (in serra)*, pomodori (in serra)*

Sostanza attiva	Culture per le quali l'impiego è revocato
TRIADIMEFON	Mele, pomodori, cetrioli, meloni
TRIADIMENOL	Pesche, cereali (tranne frumento, orzo, avena, segale, triticale)

* Per le combinazioni contrassegnate dall'asterisco, in alternativa alla revoca, si consente la modifica delle condizioni di impiego, purché venga dimostrato che esse permettono il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi.

03A10875

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501479/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.