

ALLEGATO I

QUESTIONARIO TECNICO

1. Specie: <i>Triticum monococcum</i> L.		☐
<i>Triticum dicoccum</i> Schübler		☐
2. Nome e indirizzo del richiedente:		
.....		
.....		
3. Denominazione proposta:		
.....		
.....		
4. Genealogia e informazioni sulle modalità di selezione, mantenimento e riproduzione della varietà:		
.....		
.....		
5. Caratteristiche varietali da indicare (i caratteri vanno descritti secondo gli stati di espressione UPOV)		
PIANTA: ALTEZZA ALLA SPIGATURA		
1	MOLTO BASSA	
3	BASSA	
5	MEDIA	
7	ALTA	
9	MOLTO ALTA	
PIANTA: EPOCA DI SPIGATURA		
1	MOLTO PRECOCE	
3	PRECOCE	
5	MEDIA	
7	TARDIVA	
9	MOLTO TARDIVA	
STELO PRINCIPALE: GLAUCESCENZA		
1	ASSENTE O MOLTO DEBOLE	
3	DEBOLE	
5	MEDIA	
7	FORTE	
9	MOLTO FORTE	
SPIGA: COLORE (A MATURAZIONE PIENA)		
1	BIANCO	
2	ROSSO PALLIDO	
3	ROSSO FORTE	
4	BRUNO	
5	NERO	

SPIGA: SOLIDITA' DEL RACHIDE (A MATURAZIONE PIENA)			
3	DEBOLE		
5	MEDIA		
7	FORTE		
GLUMA INFERIORE: FORMA DELLA SPALLA (SPIGHETTA DEL 3° MEDIO DELLA SPIGA)			
1	INCLINATA		
2	ARROTONDATA		
3	DIRITTA		
4	LEGGERMENTE ALLUNGATA		
5	ALLUNGATA CON PRESENZA DI UN 2° BECCO		
GLUMA INFERIORE: VILLOSITA' DELLA FACCIA ESTERNA (SPIGHETTA DEL 3° MEDIO DELLA SPIGA)			
1	ASSENTE		
9	PRESENTE		
ARISTE: COLORE			
1	BIANCO		
2	BIANCO-ROSSASTRO		
3	ROSSASTRO		
4	BRUNO		
5	NERO		
SEME: COLORAZIONE AL FENOLO			
1	NULLA O MOLTO LIEVE		
3	DEBOLE		
5	MEDIA		
7	FORTE		
9	MOLTO FORTE		
TIPO DI SVILUPPO			
1	INVERNALE		
2	ALTERNATIVO		
3	PRIMAVERILE		

6. Varietà simili e caratteri che li distinguono da esse (con riferimento all'elenco dei caratteri e alla classificazione riportata nella scheda descrittiva).

Denominazione della varietà simile	Carattere in cui la varietà simile è differente	Classe di espressione della varietà simile	Classe di espressione della varietà candidata

7. Informazioni complementari per facilitare la determinazione dei caratteri distintivi della varietà 7.1 Eventuali indicazioni particolari per la conduzione della prova: 7.2 Altre informazioni
8. La varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato così come definito dall'articolo 2 (2) della direttiva CE 2001/18 del 12-3-2001 ? SI ☐ NO ☐ In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.
9. La varietà è destinata a essere impiegata come alimento ricadente nel campo d'applicazione del Regolamento CE 258/97? SI ☐ NO ☐ In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.
10. Areale di coltivazione: • Nord ☐ • Centro ☐ • Sud e isole ☐
11. Si autorizza la pubblicazione dei dati e delle risultanze delle prove

Firma e Timbro del Richiedente

ALLEGATO 2

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Triticum monococcum* L.
Triticum dicoccum Schübler

Denominazione varietale:

Costitutore:

Responsabile conservazione in purezza:

Rappresentante in Italia:

Segna rappresentativa della varietà all'iscrizione:

Tipo di varietà:

Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:

Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:

Località di svolgimento della prova:

Periodo della prova:

Data e riferimento documento UPOV:

N	CODIC	Caratter	Stato	Varietà
	UPOV	Descrizione e classificazione	espr.	di riferimento
* 1		Coleoptile: colorazione antocianica assente o molto debole debole media forte molto forte	1 3 5 7 9	
* 2		Pianta: portamento a fine accrescimento eretto semieretto intermedio semiprostrato prostrato	1 3 5 7 9	
* 3		Pianta: altezza alla spigatura molto bassa bassa media alta molto alta	1 3 5 7 9	
* 4		Pianta: epoca di spigatura molto precoce precoce media tardiva molto tardiva	1 3 5 7 9	
* 5		Guaina foglia prefiore: villosità (alla spigatura) assente o molto debole debole media forte molto forte	1 3 5 7 9	
* 6		Guaina foglia prefiore: glaucoscorza (alla spigatura) assente o molto debole debole media forte molto forte	1 3 5 7 9	

7	Foglia prefiore: portamento alla spigatura	1	☐
	eretto	3	☐
	semieretto	5	☐
	orizzontale	7	☐
	semireclinato	9	☐
	recinato		
* 8	Foglia prefiore: glaucescenza (alla spigatura)	1	☐
	assente o molto debole	3	☐
	debole	5	☐
	media	7	☐
	forte	9	☐
	molto forte		
9	Foglia prefiore: lunghezza alla spigatura	3	☐
	corta	5	☐
	media	7	☐
	lunga		
10	Foglia prefiore: larghezza alla spigatura	3	☐
	stretta	5	☐
	media	7	☐
	larga		
* 11	Stelo principale: glaucescenza	1	☐
	assente o molto debole	3	☐
	debole	5	☐
	media	7	☐
	forte	9	☐
	molto forte		
* 12	Stelo principale: altezza compresa la spiga ed escluse le ariste	1	☐
	molto basso	3	☐
	basso	5	☐
	medio	7	☐
	alto	9	☐
	molto alto		
13	Stelo principale: spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo internodo)	3	☐
	sottile	5	☐
	medio	7	☐
	spesso		
* 14	Spiga: pigmentazione antocianica delle antere	1	☐
	assente	9	☐
	presente		
* 15	Spiga: glaucescenza	1	☐
	assente o molto debole	3	☐
	debole	5	☐
	media	7	☐
	forte	9	☐
	molto forte		
* 16	Spiga: forma (vista di profilo)	1	☐
	piramidale	2	☐
	a bordi paralleli	3	☐
	semiclavata	4	☐
	clavata	5	☐
	fusiforme		

* 17	Spiga: compattezza (lunghezza dei 10 internodi centrali del rachide)		
	lasca	3	☐
	media	5	☐
	compatta	7	☐
18	Spiga: lunghezza (escluse le eriste)		
	molto corta	1	☐
	corta	3	☐
	media	5	☐
	lunga	7	☐
	molto lunga	9	☐
* 19	Spiga: colore (a maturazione piena)		
	bianco	1	☐
	rosso pallido	2	☐
	rosso forte	3	☐
	bruno	4	☐
	nero	5	☐
* 20	Spiga: solidità del rachide (a maturazione piena)		
	debole	3	☐
	media	5	☐
	forte	7	☐
* 21	Gluma inferiore: forma della spalla (spighetta del 3° medio della spiga)		
	inclinata	1	☐
	arrotondata	2	☐
	diritta	3	☐
	leggermente allungata	4	☐
	allungata con presenza di un secondo becco	5	☐
* 22	Gluma inferiore: larghezza della spalla (spighetta del 3° medio della spiga)		
	stretta	3	☐
	media	5	☐
	larga	7	☐
* 23	Gluma inferiore: forma del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga)		
	diritto	1	☐
	leggermente arcuato	2	☐
	semiarcurato	3	☐
	fortemente arcuato	4	☐
	ingincchiato	5	☐
* 24	Gluma inferiore: lunghezza del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga)		
	molto corto	1	☐
	corto	3	☐
	medio	5	☐
	lungo	7	☐
	molto lungo	9	☐
* 25	Gluma inferiore: villosità della faccia esterna (spighetta del 3° medio della spiga)		
	assente	1	☐
	presente	9	☐
26	Gluma inferiore: villosità della faccia interna (spighetta del 3° medio della spiga)		
	assente +	1	☐
	presente	9	☐

* 27	Anste: lunghezza	1	☐
	molto corte	3	☐
	corte	5	☐
	medie	7	☐
	lunghe	9	☐
	molto lunghe		
* 28	Anste: colore	1	☐
	bianco	2	☐
	bianco-rossastro	3	☐
	rossastro	4	☐
	bruno	5	☐
	nero		
* 29	Seme: forma	1	☐
	arrotondato	2	☐
	ovoidale	3	☐
	semi allungato	4	☐
	allungato		
* 30	Seme: colore	1	☐
	bianco-ambra	2	☐
	grigiastro	3	☐
	bruno-nerastro	4	☐
	brunastro		
31	Seme: villosità dell'estremità	1	☐
	assente	9	☐
	presente		
32	Seme: lunghezza dei peli dell'estremità (in vista dorsale)	3	☐
	corti	5	☐
	medi	7	☐
	lunghi		
* 33	Seme: colorazione al fenolo	1	☐
	nulla o molto lieve	3	☐
	debole	5	☐
	media	7	☐
	forte	9	☐
	molto forte		
34	Seme: peso di 1000 semi (granella svestita)	3	☐
	basso	5	☐
	medio	7	☐
	alto		
35	Tipo di sviluppo	1	☐
	invernale	2	☐
	alternativo	3	☐
	primaverile		

* caratteri di rilevazione obbligatoria.