МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕЛИОРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 31 января 2018 года №33

«Об утверждении Каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике»

В соответствии с Законами Кыргызской Республики «О химизации и защите растений» и «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 г. № 530» (в редакции от 25 января 2017 г. № 44),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике.

2. Департаменту химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики:

- обеспечить постоянное внесение зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов в специальный Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике с размещением на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

- один раз в год издавать брошюру «Дополнения к Каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике», утверждаемого приказом МСХППиМ КР, в установленные законом порядке.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Директора Департамента химизации и защиты растений МСХППиМ КР.

Министр **Н.Мурашев**

Утвержден приказомМинистерства

сельского

хозяйства, пищевой промышленности и

мелиорации Кыргызкой Республики

от «_____»_____2018 года
№ _____

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ

Торговое название, препаративная ф **Номер государственной регистрации, д**
Инверт, КЭ (18 г/л)

	«Шанхай Агрочайна Интернешнл Т I-216 05/04/12 Вертимектин, КЭ (18 г/л) «Nanjing Essence Fine – Chemic I-239 16/08/13 Вертимекпрофи, КЭ (18 г/л) Компания «Lier Chemical Co., ltd», КНР, чере I -411 02/06/16 Ронил, КЭ (18 г/л) Компания «Trustchem Co., ltd»КНР, через ОсО I-437 11/01/17
	Абактин, КЭ (18 г/л) «Синокем Агро Ко ОсОО «Пестициды» I-388-1 22/03/16 Абалон, КЭ (18 г/л) Компания «Ариста ЛайфСайенс Бенил I-439 12/01/17 Вертимек, КЭ (18 г/л Компания «NINGBO SUNJOY AgroSci I-450 20/02/17

Энтомектин, КЭ (18 г/ «Xinjiang Nong Fu Lai Chemical Co., Ltd», КНР, через I-263 08/04/14
Алвер, КЭ (18 г/л) «Ипрохем Компани Лимитед», КН I-254-1 17/02/14
Вертим-180, КЭ (18 г/ Компания «Синьцзянь Тиандао Люмен Интернэшнл I-397-1 08/04/16
Патруль, КЭ (18 г/л) Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Те через ОсОО « Кыргыз Агро Кем I-357 15/10/15
Барин, КЭ (32 г/л) Компания «Синокем Агро., Лтд», КНР, через I-443 02/02/17

Азадирахтин

Греен Голд, МЭ (30 г/

Компания «Xinjiang Juheng Biological Deve

I-362 13/11/15

Альфа-циперметрин	
	Цунами, КЭ (100 г/л) ООО «Сибагрохим» I-215-1 10/01/12
	Бест Альфа 100, КЭ (100 г/л) «Агробест Груп» Турция, через ОсОО «Е I-235 01/04/13
	Фаст Топ, КЭ (100 г/л Компания « Камсунг Кемикал Ко., Лтд», КНР, ч I -426 09/11/16



Фаскорд, КЭ (100 г/л

ЗАО «Щелково Агрохи

I-285-2 25/09/14

Альфа 100, КЭ (100 г/

«Синокем Агро Ко., Лтд» КНР, через О

I-386-1 22/03/16

ДОКСИН (DOXIN 100 Е

КЭ (100 г/л)

Компания «DOGAL», Турция, через С

I-311 30/12/14

Фастак, КЭ (100 г/л)

«БАСФ СЕ», Германи

I-282-2 22/09/14

Фаворит, КС (100 г/л) Компания «Ипрохем Компани Лимите

I-296 13/11/14



I-325 24/04/15

Альфастак,КЭ (100 г/л), «JiangSu Aijin Agrochemical Co., Ltd

I-339 29/05/15

Бестселлер, КЭ (100 г/л) Компания « Ариста ЛайфСайенс

I-367-2 29/12/15

Тастак, КС (100 г/л)

Компания «Синокем Агро., Лтд», КНР, через

I-442 02/02/17

Алюминия фосфид
Ессенсефид, ТАБ (560 «Nanjing Essence Fine-Chemical Co., «Ар-Абат» Казахста I-226 27/06/12 Док-Фокс, ТАБ (560 г/кг) «Ипрохем Компани Лимитед» КНР через ОсОО «Алби I-252 11/12/13





Дакфосал, ТАБ (570 г/

ЗАО «Щелково Агрохи

I-283-2 25/09/14







Ацетамиприд

Моспен, СП (200 г/кг

«Нанжинг Зуочуанг Кемикал Ко., Лтд» КНР чере

I-230 16/10/12

Моспи-200, РП (200 г/

Компания «Синьцзянь Тиандао Люмен Интернэшнл

I-395-1 08/04/16

Моспи-до, РП (200 г/к

Компания «Zhejiang Chemicals Import & Expo

I-198 24/12/12

Голдплан, ВРП (200 г/

«Агробест Груп» Турция, через ОсОО «

I-233 22/02/13

Ацилан, СП (200 г/кг)

«Foison International Co., Ltd» КНР, через ОсОО «Альянс

I-237 07/08/13

Моспилануз, СП (200 г/кг) «NINGBO SUNJOY AgroScience Co

I-319-1 16/01/15

Паскаль, СП (200 г/кг

«Ertar kimia tarim urunleri ve aletleri imalat paz. Zan

I-249 04/12/13

Моспилан-профи, СП (20

Компания «Лиер Кемикал Ко., Лтд»,КНР, чер

I-279 15/09/14

Монспилан-Голд, СП (20

«Changzhou Good-Jood Biochemical Co., Ltd» КНР, ч

I-275 15/08/14

Моспил-ЭС, РП (200 г/

Компания «Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Те

через ОсОО « Кыргыз Агро Кем

I-361 15/10/15

Моспирид,РП (200 г/к

Компания «Hangzhou jinghang Biotechniologi Co., ltd», К

I -403 01/06/16

Ясон, СП (200 г/кг)

«Синокем Агро Ко.. Лтд», КНР через Ос

I-390-1 22/03/16

Мозетам, РП (200 г/кг) «Ипрохем Компани Лимитед», К

I-255-1 17/02/14

Моспилануз, СП (200 г/кг) «NINGBO SUNJOY AgroScience Co

I-319-1 16/01/15

	Ракет (Rocket 20 SP), ВРС (200 г/л), «DOGAL», Тур I-328 29/04/15 Вита, РП (200 г/кг) Компания «Чжэцзян Рэйфул Кемикалс Ко., Лтд», К I-372 19/02/16
Ацетамиприд+абамектин	
	Вертимос Голд, КЭ (32+18 г/л) Компания «Changzhou Good-Jod Biochemical Co., ltd», КН I-448 15/02/17

Ацефат

Ортен, СП (750 г/кг)

Компания «Ариста ЛайфСайенс Грей

I -420-2 22/09/16

Бета-циперметрин

Кин-Макс, КЭ (50 г/л)
«Ипрохем Компани Лимитед» КНР , через Ос
I-251 11/12/13

Микс Топ, КЭ (5 г/л)

Компания «Камсунг Кемикал Ко., Лтд», КНР, че

I -427 09/11/16

	Кинг-Микс, КЭ (50 г/л) Компания « CHITERION Int. L industrial Co L «АгроСтайл», КР I-369 21/01/16
	Бетамикс, КС (100 г/л Компания « Чайна Цзянсу Интернешнл Экономик энд Техникал «Кыргыз Агро Кемикал» I -414 02/08/16
	Ремикс, КС (100 г/л) «Синокем Агро Ко., Лтд» КНР, через О I-393-1 22/03/16
Бета-циперметрин+эмамектин бензоат	
	Бета-Макс, КЭ (45+5 г/ Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Те через ОсОО « Кыргыз Агро Кем

	I-429 28/11/16
Бифентрин	
	Голдстар, КЭ (100 г/л) «Синокем Агро Ко., Лтд» КНР, через О I-394-1 22/03/16
	Толио (Tolyo 100 EC),КЭ (1 «DOGAL», Турция , через ОсОО I-329 29/04/15
	Талстардуо, КЭ (100 г/ Компания « Sino-Agri Leading Bioscences Co., ltd», КН I -410 02/06/16

Агроталстар, КЭ (100 г

«NINGBO SUNJOY AgroScience Co., Ltd», КНР, Ч

I-401 30/04/16

Гекситиазокс
Гексоран, СП (100 г/кг) «Синокем Агро Ко., Лтд» К I-392-1 22/03/16
Никсоран Клещ Голд, СП (1 Компания «Changzhou Good-Jod Biochemical Co., ltd», КН I-447 15/02/17
Эрсорин, КЭ (50 г/л)

«Ertar kimia tarim urunleri ve aletleri imalat paz. Zan I-248 04/12/13	
Белайр, КЭ (25 г/л) «Ertar kimia tarim urunleri ve aletleri imalat paz. Zan I-247 04/12/13	
Детсиц, КЭ (25 г/л) Компания «Zhejiang Chemicals Import & Expo I-200 24/12/	
Децисуз, КЭ (25 г/л) «Chiterion Int., L Industrial Co Ltd», КНР, через Ос I-253 09/01/14	
Виллцис, КЭ (25 г/л) Компания «Уилловуд ЛТД», I I-221 30/04/12	
Децикон, КЭ (25 г/л), «JiangSu Aijin Agrochemical Co., Ltd» I-338 29/05/15	
Децис – Экстра, КЭ (125 г/л) Компания «Байер КропСайенс» I-298-1 28/11/14	

Метринал, КС (25 г/л

«Синокем Агро Ко., Лтд» КНР, через О

I-383-1 22/03/16

Децикон Ультра, УМО (12

Компания «Jiangsu aijin Agrochemical Co., ltd» КНР,

I-441 19/01/17

Дельтаметрин + триазофос
Дитифос, КЭ (10+350 г «Шанхай Агрочайна Интернешнл Т I-218 05/04/12
Дельтофосдуо, КЭ (10+35 Компания « Truechem International Co., ltd «Чагылган», КР I -408 02/06/16
Дилфос, КЭ (10+350 г/ Компания «Hangzhou jinghang Biotechniologi Co., ltd», К I -405 01/06/16
Дельта, КЭ (10+350 г/ «Нанжинг Зуочуанг Кемикал Ко., Лтд» КНР чере I-232 16/10/12
Дельтадос, КЭ (10+350 г/л) «Zheijiang Chemicals Import & Export C I-289-1 20/10/14
Дельтос, КЭ (10+350 г/

	«Гринвелл агросайенс Ко., Лтд» КНР, через I-376-1 22/03/16
Диазинон	
	Дозор, КЭ (600 г/л) Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Те через ОсОО « Кыргыз Агро Кем I-355 15/10/15

Динитроортокрезол	
	Супер ДНОК НОВЫЙ, СП (45 «Ипрохем Компани Лимитед», КНР, через ОсОО « Алб I-370 01/02/16
Диметоат	
	Тайфун, КЭ (400 г/л) ООО «Сибагрохим» I-214-1 10/01/12
	Ми-8, КЭ (400 г/л) «Zhejiang Chemicals Import / Export Cor I-197 24/12/12
	Ди – 40, КЭ (400 г/л) Компания «Синокем Агро Ко., Лтд», КНР, чере I-380-1 22/03/16
	Тагор, КЭ (400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» I-284-2 25/09/14

Агроби, КЭ (400 г/л) «Chiterion Int., L Industrial Co., Limited

I-291 30/10/14

Би-58 новый, КЭ (400 г/л) «БАСФ С I-280-2 22/09/14 БИ-68, КЭ (400 г/л) Компания «Hangzhou jinghang Biotechniologi Co., ltd», К I-407 01/06/16 Димигор, КЭ (400 г/л) «Ипрохем Компани Лимитед», К I-256-1 17/02/14 Дамбл (Dumble 40 EC), КЭ (400 г/л), «DOGAL», Тур I-327 29/04/15
Алпгор (ALPGOR), КЭ (40 «Agrobest Grup», Турция, через ОсО I-333 14/05/15 Бизон, КЭ (400 г/л) Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Те через ОсОО « Кыргыз Агро Кем I-356 15/10/15

	Бэлла-58, КЭ (400 г/л Компания « Камсун Кемикалс Ко., ЛТД», КНР че I-353-2 14/10/15
	Голд Би, КЭ (400 г/л « Changzhou Good-Job Biochemical Co., ltd», КНР, че I-421 24/10/16

Диметоат+бета-циперметрин
Кинфос, КЭ (300+40 г/л) АО « Щелково Агрохим», Ро I-371 10/02/16
Дифлубензурон
ГЕРОЛЬД, ВСК (240 г/л) ЗАО «Ав I-341 03/06/15



Димилин ОФ-6, МС УМО (

Компания «Ариста ЛайфСайенс Грейт Брита

I-364-2 29/12/15

Дифуз, СК (480 г/л)

Компания «Ариста ЛайфСайенс Грейт Брита

I-368-2 29/12/15

Димилин, СК (480 г/л

Компания « Ариста ЛайфСайенс Грейт Брита

I-363-2 29/12/15

Дессенлин, СК (480 г/

«Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd", Китай, ч

I–224 11/05/12

Имидаклоприд	
	Марленоприда, СП (700 г/кг) «Nanjing Essence Fine-Chemical C через ТОО «Ар-Абат», Каз I-223 11/05/12
	Гаузол, СП (700 г/кг) «Импрохем Ко., Лтд» КНР I-193 23/11/12
	Батый, СП (700 г/кг «Синокем Агро Ко., Лтд», КНР, через С I-384-1 22/03/16
	Таучо, СП (700 г/кг) Компания « Камсун Кемикалс Ко., Лтд», КНР, че I-228 08/08/12
	Каучо, ВДГ (700 г/кг) Компания « Чайна Цзянсу Интернешнл Экономик энд Техникал Кооперейшн Гр I -415 02/08/16
	Гаучосупер, СП (700 г/ Компания «Лиер Кемикал Ко., Лтд», КНР, чер I-399 08/04/16
Конфидор, ВРК **(**200 г/л)	Компания «Байер Кроп Сайенс», I-299-1 28/11/14
	Конфидоруз, ВРК (200 г/л «NINGBO SUNJOY AgroScience Co I-315 16/01/15
	Конфи-200, ВРК (200 г/л Компания «Синьцзянь Тиандао Люмен Интернэшнл I-398-1 08/04/16

Коломдор, ВРК (200 г/

«Ипрохем Компани Лимитед», КНР, через

I-259-1 17/02/14

Император, ВРК (200 г

«Синокем АгроКо., Лтд» КНР, через О

I-381-1 22/03/16

Кунфу-До, ВРК (200 г/л) «Zheijiang Chemicals Import & Export Corp
I-288-1 20/10/14

Конфидорарт, ВР (200 г/л) «Камсун Кемикалс Ко., Лтд»,К
I-273 30/07/14

Энтолучо, КЭ (200 г/л)
«Xinjiang Nong Fu Lai Chemical Co., Ltd», КНР, через

I-265 08/04/14

Конфир, ВК (200 г/л)

Компания « Hangzhou Jinghang Biotechniogy Co., Ltd»,

I-348 02/10/15

Танрек, ВРК (200 г/л)
ЗАО Фирма «Август»
I-344-2 03/06/15







Ваучо, СП (350 г/кг) «Chiterion Int., L Industrial Co., Limited»
I-292 30/10/14

Терасон (Terason 350 SC), КС (350 г/л), «DOGAL», Ту
I-330 29/04/15

Ресуме (RESUMME), ТК (600 г/л), «Agrobest Grup», Т

I-332 14/05/15

ТАБУ, ВСК (500 г/л), ЗАО «Авгу

I-343 03/06/15



Имидаклоприд+лямбда-цигалотрин

Борец, СК (150+50 г/л) «Гринвелл Агросайенс Ко., Лтд», К
I-374-1 22/103/16

БОРЕЙ, СК (150+50 г/л), ЗАО «Авг

I-340 03/06/15

Тайфун Плюс, СП (100+2

Компания «Hangzhou jinghang Biotechniologi Co., ltd», I

I -424 01/11/16







	Конфидордуо, КЭ (200+50 г/л) Компания «Lier Chemical Co., ltd», КНР, чере I -412 02/06/16
Индоксакарб	
	Энтовант, КЭ (150 г/л) «Xinjiang Nong Fu Lai Chemical Co., Ltd», КНР, через С I-264 08/04/14
Индоксакарб+абамектин	
	Капитон, КС (75+18 г/л) Компания «CHITERION Int. L industrial Co., ltd», КНР I-449 20/02/17
Лямбда-цигалотрин	
	Гунсяо, КЭ (50 г/л) «Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd", Китай, через ТОО «Ар-Абат» Казахстан I-222 11/05/12
	Каратуз, КЭ (50 г/л) «NINGBO SUNJOY AgroScience Co., Ltd», КНР, ч I-318-1 16/01/15

Карат-Эс, КЭ (50 г/л)

Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Техникал Кооперейшен гр

I -431-1 28/11/16

Сумо, КЭ (50 г/л)

Компания «Nanjing Essence Fine-Chemical Co., ltd», КНР

I-413-1 15/06/16

Сократ, КЭ (50 г/л)

«Ипрохем Компани Лимитед», КНР, через

I-257-1 17/02/14

ЖУДО (JUDO 5 EC), КЭ (5

Компания «DOGAL», Турция, через

I-312 30/12/14



Каратэ, КЭ (50 г/л) Компания «Синге

I-293-1 31/10/14



Каратэ-До, КЭ (50 г/л) «Zheijiang Chemicals Import & Export Corp

I-287-1 20/10/14

Карат-дуо, КЭ (50 г/л

Компания «Лиер Кемикал Ко., Лтд», КНР,чер

I-277 15/09/14

Карат Голд, КЭ (50 г/л) «Changzhou Good-Job Biochemical Go L

I-268 30/05/14



Ахиллес, КЭ (50 г/л)

«Гринвелл Агросайенс Ко., Лтд»

ОсОО

«Пестициды» КР

I-378-1 22/03/16

Каратуз, КЭ (50 г/л)

«NINGBO SUNJOY AgroScience Co., Ltd», КНР, ч

I-318-1 16/01/15

Петра (PETRA), КЭ (50 г/л) «Agrobest Grup», Турц

I-334 14/05/15

	Каратлин, КЭ (50 г/л), «JiangSu Aijin Agrochemical Co., Ltd» I-337 29/05/15 Каратарт, КЭ (50 г/л) Компания « Камсун Кемикалс Ко., ЛТД», КНР че I-351-2 14/10/15 Канонир, КЭ (50 г/л) Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Те через ОсОО « Кыргыз Агро Кем I-359 15/10/15
	Каратрин, КЭ (250 г/л) Компания «Лиер Ке через ОсОО «АзияКем» I-310-1 29/12/14
Лямда-цигалотрин+дифлубензурон	
	Каратрин плюс, КС (100 + 4 Компания «БОФ Агрокемикал Ко., Лтд» КНР, чере

I-306 25/12/14
Лямбда-цигалотрин+профенофос
Полетрон Форде, КЭ (15+300 г/л) «Zheijiang Chemicals Import & Expo I-290-1 20/10/14
Политрин Лин, КЭ (15+30 Компания « Hangzhou Jinghang Biotechniogy Co., Ltd», К I-350 02/10/15 Ка Трин, КЭ (15+300 г/ Компания «Trustchem Co., ltd»КНР, через ОсОО I-438 11/01/17
Малатион
Санжоу, УМО (960 г/л) «NINGBO SUNJOY Ag I-316 16/01/15
Карбофен-500, КЭ (500 г/л) Компания « Ипрохем Компани Лимитед», КНР, ч I -434 23/12/16



Метальдегид	
	Тримап, Г (40 г/кг) «Ertar kimia tarim urunleri ve aletleri imalat paz. Zan I-250 04/12/13
Метомил	
	Мет Киллер, СП (900 г/кг) Компания « Truechem International Co., ltd», КНР I -428 10/11/16
Оксамил	
	Оксидат, ВРК (240 г/л «Xinjiang Nong Fu Lai Chemical Co., Ltd», КНР, через С I-266 08/04/14

Пирипроксифен	
	Голдамирал 5 ЕС, (50
	Компания «Agro best grup»,
	I -418 23/08/16
Пропаргит	
	Промайт, КЭ (570 г/л
	Компания «Синокем Агро Ко., ЛТД», КНР, ч
	I-385-1 22/03/16
	Пакмайт, КЭ (570 г/л
	«Шанхай Агрочайна Интернешнл Тра
	I-219 05/04/12
	Ремайт, КЭ (570 г/л)
	«Нанжинг Зуочуанг Кемикал Ко., Лтд» КНР через
	I-229 16/10/12
	Омайтдуо, КЭ (570 г/л
	Компания « Sino-Agri Leading Bioscences Co., ltd», К
	I -409 02/06/16
	Омалайт, КЭ (570 г/л

Компания «Hangzhou jinghang Biotechniologi Co., ltd», К

I -404 01/06/16

Амайт Пропар, КЭ

(570 г/л)

Компания «Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Техникал Кооперейшн Г

I -402 19/05/16

Донмайт, КЭ (570 г/л)

Компания «Zhejiang Chemicals Import & Expo

I-199 24/12/12

Орион, КЭ (570 г/л)

«Foison International Co., Ltd» КНР, через ОсОО «Альянс»

I-238 07/08/13

Агромайт, КЭ (570 г/л) «NINGBO SUNJOY Ag I-313 16/01/15
Омайт, КЭ (570 г/л) Компания « Ариста ЛайфСайенс Грейт Брита I-365-2 29/12/15 Омайт, ВЭ (570 г/л) Компания « Ариста ЛайфСайенс Грейт Брита I-366-2 29/12/15
Пропармайт-720, КЭ (720 г/л) Компания «Синьцзянь Тиандао Люмен Интернэшнл I-396-1 08/04/16
Профенофос+циперметрин
Прадо, КЭ (400+40 г/л) «Нанжинг Зуочуанг Кемикал Ко., Лт

I-231 16/10/12

Политар, КЭ (400+40 г

Компания «Hangzhou jinghang Biotechniologi Co., ltd», К

I -406 01/06/16

Политрин Супер, КЭ (400+

«Синокем Агро Ко., Лтд» КНР, через О

I-387 22/03/16

Понитрон –Экстра, КЭ (400

Компания «Ипрохем Компани Лимитед», КНР, че

I-295 13/11/14

Политрин Голд, КЭ (400+

«Changzhou Good-Job Biochemical Go Ltd». КНР, че

I-269 30/05/14

Политрин-дуо, КЭ (400+4

Компания «Лиер Кемикал Ко., Лтд», КНР,чер

I-276 15/09/14

Полетрин Фарте, КЭ (400+

«Chiterion Int. L industrial Co., Ltd», КНР, через ОсОО

	Политр Экс, КЭ (400+40 г/л) Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик эн Те через ОсОО « Кыргыз Агро Кем I-362 15/10/15 Профтрин фарте, КЭ (400+ Компания « Камсун Кемикалс Ко., Лтд», КНР, че I-227 08/08/12
Тебуфенпират	
	Селдони (SELDONY), СП (200 г/кг), «Agrobest Grup», Т I-331 14/05/15
Тефлубензурон	
	Номолт УМО, (50 г/л) «БАСФ СЕ I-281-2 22/09/14

Тиаметоксам

Крузак, СК (350 г/л)

«TRUECHEM INTERNATIONAL Co., Ltd», КНР, ч

I-346 15/07/15

	Тиамет, ВДГ (250 г/кг «Синокем Агро Ко., Лтд» КНР, через О I-389-1 22/03/16
Тиаметоксам+лямбда-цигалотрин	
	Энжиро макси, СК (141+106 «Nanjing Essence Fine-Chemical Co. Ltd», КНР, через ОсОО «Хи I-245 28/10/13 Изуми, КС (141+106 г/л) Компания «Trustchem Co., ltd»КНР, через ОсОО I-435 11/01/17
	ЭНЖИ, СК (141+106 г/ «Хайлир Пестисайдс Ко., Лтд», КНР, через I-445-2 02/02/17 Энжир, КС (141+106 г/л) Компания «Ипрохем Компани Лимитед», КНР, чере I-294 13/11/14

	Агроэнджио, СК (141+106 г/л) «NINGBO SUNJOY A I-314 16/01/15 Анжидуо, СК (141+106г/л «TRUECHEM INTERNATIONAL Co., Ltd», КНР, ч I-345 15/07/15
Триадемефон+имидаклоприд	
	Днокс, СП (25+20 г/кг) «Changzhou Good-Job Biochemical Go Lt I-271 30/05/14

Фенпироксимат	
	Протек, КС (50 г/л) «Уилловуд Лтд», Гонг-К I-220 30/04/12
Фенпропатрин	
	Данитол, КЭ (100 г/л «Сумитомо Кемикал Агро Юроп» I
Фипронил	
	Фермер, КЭ (40 г/л) Компания «Чжэцзян Рэйфул Кемикалс Ко., Лтд» I-373 19/02/16



	ЕссенФипро, УМО (75 г «Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd», КНР чере I-240 20/09/13
	Адонис, 7,5 УМО (75 г/ «Байер Инвайронментал Сайенс С.А.» Германия I-241 03/10/13
	Айжин Фипро, УМО (75 г/л), «JiangSu Aijin Agrochemical Co., Ltd»,КНР, через I-335 29/05/15
	Регенал, ВДГ (800 г/кг) ОсОО «ХимПромПлюс»,К I-267 23/05/14

	Фипронарт, ВДГ (50 г/к Компания « Камсунг Кемикал Ко., Лтд», КНР, че I -425 04/11/16
	Дионис, КС (50 г/л) Компания «Синокем Агро Ко., Лтд», КНР, чере I -446-2 13/02/17
	Агент, ВДГ (800 г/кг) Компания «Синокем Агро Ко., Лтд», КНР, чере I-444 02/02/17

Хлорантранилипрол	
	Кораген, КС (200 г/л) «Дюпон де Немур Оперей I-347-1 01/10/15 Король, КС (200 г/л) Компания « Гринвелл Агросайенс Ко., Лтд», КНР, ч I-377-1 22/03/16
Хлорпирифос	

Пиринекс 240, УМО
(240 г/л)
«Makhteshim chemical works ltd»
I-236 09/07/13

Хлорпирифит УМО
(240 г/л)
«Sesearch Instite»КНР, через ОсОО «ТД А
I-275 05/0814

Пирихлор, УМО (240 г/л)
ОсОО «ХимПромПлюс», К
I-272 03/07/14

АГРОШИТ, УМО (240 г/л) «CHITERION Int. L industrial Co., Ltd
I-317 16/01/15

Хлормифос, УМО (240 г/л), «JiangSu Aijin Agrochemical Co., Ltd
I-336 29/05/15

	Дурсбан, КЭ (480 г/л) «Дау Агро Саенсес», Австр I–321-2 9/01/15
Хлорпирифос+циперметрин	
	Кардинал, КЭ (500+50 г/л) «Синоке

КНР, через ОсОО «Пестиц I-382-1- 22/03/16 Нурфос, КЭ (500+50 г/ Компания « Чайна Цзянсу Интернешнл Экономик энд Техникал Кооперейшн Гр I -416-1 02/08/16 Нукер ПРО, КЭ (500+50 г/л) Компания «Trustchem Co., ltd»КНР, через ОсОО I-436 11/01/17 Хлорцирин 55 %, КЭ (500+50 г/л) Компания «Ариста ЛайфСайенс Бенил I-440 12/01/17	
Нур & Д, КЭ (500+50 г/л) «Zheijiang Chemicals Import & Export Co I-286-1 20/10/14 Шарелл Д, КЭ	

(500+50 г/л)

«Shangai Mio Chemikal Co., Ltd»,КНР, через Ос

I-262 01/04/14

Циперфосуз, КЭ

(500+50 г/л)

«NINGBO SUNJOY AgroScience Co., Ltd», КНР, ч

I-400 30/04/16

Нурелдуз, КЭ (500+50 г/л)

«NINGBO SUNJOY AgroScience Co., Ltd», КНР, ч

I-320-1 16/01/15

Нарвал, КЭ (500+50 г/л)
«Ипрохем Компани Лимитед», КНР, через

I-258-1 17/02/14

Елнур-Д, КЭ (500+50 г/л) «Nanjing Essence Fine-Chemical Co., L

I-225 11/05/12

Дилер, КЭ (500+50 г/л

«БОФ Агрокемикал Ко., Лтд»,КНР, через

I-324-1 23/04/15

Нуйрен, КЭ (500+50 г/

«Шанхай Агрочайна Интернэшнл Трайд К

Нурел –дуо, КЭ

(500+50 г/л

Компания «Лиер Кемикал Ко., Лтд», КНР,чер

I-278 15/09/14

Нурелл Голд, КЭ

(500+50 г/л)

«Changzhou Good-Job Biochemical Go Ltd». КНР, че

I-270 30/05/14

Нурелдуз, КЭ

(500+50 г/л)

«NINGBO SUNJOY AgroScience Co., Ltd», КНР, ч

I-320-1 16/01/15

	Нурелл-Д, КЭ (500+50 г/л) «Дау АгроС I-322-2 19/01/15 Сайга, КЭ (500+50 г/ Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Те через ОсОО « Кыргыз Агро Кем I-360 15/10/15 Циперфос, КЭ (500+50 Компания « Камсун Кемикалс Ко., ЛТД», КНР че I-354-2 14/10/15 Нурфосд, КЭ (500+50 г Компания « Hangzhou Jinghang Biotechniogy Co., Ltd», К I-349 02/10/15
Циперметрин	
	Атлетик, КЭ (250 г/л) «Ertar kimia tarim urunleri ve aletleri imalat paz. Zan I-246 04/12/13 Цетрон, КЭ (250 г/л) Компания «Лиер Кемикал Ко., Л через ОсОО «Альянсхимто

I-309-1 29/12/14

Шарпей, МЭ

(250 г/л)

ЗАО Фирма “Август”

I-342 03/06/15

Циткор, КЭ (100 г/л)

Компания « Ипрохем Компани Лимитед», КНР, ч

I-433 23/12/16

Эмамектин бензоат

Саррендер, ВРП (50 г/

«Агробест Груп» Турция, через ОсОО «

I-234 22/02/13

Пике, ВПГ (50 г/кг)

Компания «БОФ Агрокемикал Ко., Лтд», КНР, чере

I-307 25/12/14

Бекчи (Bekchi), ВРГ (50 г/кг) «DOGAL», Турция

I-326 29/04/15

Проклеми, ВРГ (50 г/к

Компания « Ningbo Sunjoy AgroScien

I-423 26/10/16

Гарант, ВДГ (50 г/кг)

Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Техникал К

«Кыргыз агро Кемикалс»

I -430 28/11/16

А-ПРОКЛЕМ, ВРГ

(50 г/кг)

Компания «TRUECHEM INTERNATIONAL Ко

«Чагылган», КР

I -419 15/09/16

Эмамектин бензоат+тиаметоксам

Апроклем голд, ВДГ(50+12

« Changzhou Good-Job Biochemical Co., ltd», КНР, че

I-422 24/10/16

Эмамектин бензоат + бета-циперметрин

Пике плюс, КЭ (5+45 г

Компания «БОФ Агрокемикал Ко., Лтд», КНР, чере

I-308 25/12/14

	Бета – Макс, КЭ (5+45 г/л) Компания « Чайна Цзянсу Интернэшнл Экономик энд Техникал Кооперейшен гр I -429 28/11/16
Эмамектин бензоат+луфенурон	
	А-Проклем дуо, ВДГ (50+400 Компания «Sino-Agri Leading Biosciences Co., ltd», КНР I -432 21/12/16
Эсфенвалерат	
	Супер-Альфа, КЭ (200 г/л) Компания « Камсун Кемикалс Ко., ЛТД», КНР че I -352-2 14/10/15
Этоксазол	
	Евроголд, КЭ (110 г/л

Компания «Agro best grup»,

I -417 23/08/16

3	4	
Виноград	Милдью, оидиум	Препарат только в сис фунгицидами. период вегета рабочим р цветения; п зеленая ягод горошину; нач Расход – 1000
Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша	Опрыскива посадке кл рабочей жидко
Лук (кроме лука на перо)	Переноспороз	Опрыскива вегетации: профилактичес последующие 14 дней. жидкости – 200
Огурец открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, переноспороз	Препарат только в сис фунгицидами. период вегета рабочим р цветения; по

		интервалом 14 – 800-1000 л/га
Спортивные газоны	Фузариоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскива вегетации: пе весеннего последующие дней. Расход р -200-400 л/га
Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации с дней. Расход – 800-1000 л/га
Томат открытого грунта	Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз	Препарат только в сис фунгицидами. период вегета рабочим плодообразова цветение 3- интервалом 14 – 600 л/га

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

Виноград	Милдью	Опрыскива вегетации пе фазах: образ опадение 70 формировани интервалом 1 рабочей жид л/га

аминной соли)

Свекла сахарная	Кагатные гнили— заболевание корнеплодов (свёкла, морковь)	Обработка закладке на х Расход рабо 3л/т)

Пшеница яровая и озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскива вегетации. Рас
	Мучнистая роса	400 л/га
Рис	Пирикуляриоз	Опрыскива вегетации. Рас 400 л /га
Рожь озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскива вегетации. Рас 400 л /га
Свекла сахарная	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации
	Мучнистая роса, церкоспороз	
Табак	Черная корневая гниль	Полив по 0,25 %-ным ра посева семян первых при Расход – 0,6-1
Виноград	Серая гниль, оидиум	Опрыскива вегетации 0,1

		раствором эмульсина концентрации. 1500л /га
Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша	Опрыскива вегетации 0,1 раствором. Ра 2000 л/га
Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскива и после сб питомниках и ограничений. Р 600 л /га
Малина (питомники)	Пурпуровая пятнистость, серая гниль	Опрыскива вегетации 0,15 раствором. Ра
Капуста	Кила	Полив по рабочим раств
Роза	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0, раствором
Сосна (питомники и молодняки)	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскива
Капуста	Кила	Опрыскива по культуре.Обра предшествова первичного зар
Смородина	Мучнистая роса	
Томаты, огурцы, роза	Пятнистость, мучнистая роса	
Яблоня, груша	Оидиум, серая гниль, парша, мучнистая роса	
Земляника	Мучнистая роса, серая гниль	
Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	Опрыскива вегетации
	Ржавчина желтая, стеблевая, септориоз	
Рожь озимая	Ржавчина бурая, стеблевая ,септориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз, церкоспореллез	
Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	

Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость	
Свекла сахарная	Мучнистая роса, ржавчина	
Кукуруза	Пузырчатая головня, корневые гнили, фузариоз, плесневение початков	Опрыскива посевов в фа нитей
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0,0 раствором
Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскива вегетации
	Мучнистая роса	
	Пыльная и твердая головня, церкоспореллезная и фузариозная корневые гнили. Снежная плесень	Протравли Расход воды 1
Рис	Пирикуляриоз	Опрыскива вегетации
	Пирикуляриоз, фузариозная корнвая гниль	Протравли Расход воды 5
Ячмень яровой и озимый	Пыльная, каменная и черная головня, фузариозная корневая гниль	Протравли Расход воды 1
Соя, горох	Аскахитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль. плесневение семян	Протравли Расход воды добавлением гектарную нор
	Септариоз, бактериоз, оливковая пятнистость	Опрыскива вегетации 0 препарата
Подсолнечник	Белая гниль	Протравли суспензией п 20дней до по 15л/т
Томаты открытого и защищенного грунта	Фузариозное увядание	Протравли 15суток до по 5-10л/т
	Бурая пятнистость	Опрыскива вегетации 0,1 препарата
Огурцы открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, антракноз, аскохитоз, оливковая пятнистость	
Капуста	Кила	Полив суспензией

		высадке расса
	Серая гниль, сосудистый бактериоз	Погружени закладке на обработка ко половине хран ВИВАТ+5% метилцеллюло мел+77,5%вод
Хлопчатник	Вертициллезное увядание	Внесение зяблевую вспа
Сахарная свекла	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскива вегетации
Виноград	Серая гниль, оидиум	
Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша	
Роза	Мучнистая роса	
Малина(питомники)	Пурпуровая пятнистость,серая гниль	
Земляника(питомники и маточники), малина(питомники)	Мучнистая роса, серая гниль	
Розы защищенного грунта	Мучнистая роса	
Картофель	Ризоктониоз, фомоз, рак	Обработка посадкой суспе
Чеснок яровой и озимый	Белая гниль донца, плесневение	Обработка однократного суспензию пре до посадки
Морковь (маточные корнеплоды)	Фомоз, белая сухая гниль	Обработка путем однокра в 5% суспе перед закладк

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

Свекла сахарная	Корнеед всходов	Протравли Расход – 15 л/т
Яблоня и груша	Парша яблони, плодовая гниль, бактериальный ожог, пятнистость листьев	Опрыскива период вегет обработка-про последующие 14 дней
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	
Томат	Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость, септориоз, бактериальная пятнистость, серая гниль	
Виноград	Милдью, серая гниль, антракноз	
Лук	Переноспороз, бактериоз	
Абрикос	Монилиоз, клястероспориоз, коккомикоз, бурая пятнистость	
Персик	Курчавость листьев, монилиоз, клястероспориоз	
Огурцы	Переноспороз, бактериоз	
Пшеница озимая,	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизации ростовых и	Предпосев семян. Расход

пшеница яровая	формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскива в фазе кущен в трубку, 2-е молочно-воско Расход-300 л/г
Рис		Предпосев семян. Расход
		Опрыскива в фазе кущен в трубку. Расх
Гречиха		Предпосев семян. Расход
		Опрыскива фазе 2-3 лис л/га
Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Предпосад клубней. Расх
		Опрыскива в фазе полны фазе бутониз 300 л/га
Подсолнечник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизации ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосев семян. Расход
		Опрыскива в фазе 2-4 ли интервалом 15 200-300 л/га
Кукуруза		Предпосев семян. Расход
		Опрыскива фазе 3-5 лис 300 л/га
Соя		Предпосев семян. Расход
		Опрыскива е-в фазе 3-х фазе бутониз л/га
Сахарная свекла	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и	Предпосев семян. Расход

	качества продукции	Опрыскива фазе 3-4 пар 300 л/га
Капуста		Замачиван течение 6 часо
		Опрыскива е-после высад 3-е с интер Расход-200-30
Свекла столовая		Замачиван течение 6 часо
		Опрыскива е-в фазе 3-4 г 3-е с интер Расход-300 л/г
Морковь		Замачиван течение 6 часо
		Опрыскива е-в фазе 2-3 л 10-12 дняе опрыскивания.
Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)		Замачиван течение 6 часо
		Опрыскива е-в фазе 2-4 л бутонизации; 3 цветения. Расх
Баклажан (открытый и защищенный грунт)		Замачиван течение 6 часо
		Опрыскива е-в фазе 2-4 л бутонизации; 3 цветения. Расх
Огурей (открытый и защищенный грунт)		Замачиван течение 6 часо
		Опрыскива в фазе 2-3 ли интервалом 1 – 300 л/га
Томат (открытый и защищенный грунт)		Замачиван течение 6 часо
		Опрыскива е-через 7 дне

		рассады в г бутонизации, цветения. Расх
Плодово-ягодные культуры		Опрыскива –через 5-7 дне 2-е –в начале опадения завя интервалом 14 800-1000 л/га
Виноград		Опрыскива е-в фазе бу фазе цветен недели после Расход-800-10
Земляника		Опрыскива е-весной в на листьев, по опрыскивания 15 дней. Расхо
Цветочные культуры		Опрыскива е-после появл весной в нача вегетации), г опрыскивания 15 дней. Расхо
Травы газонные		Опрыскива е-после прев травостоя, п опрыскиваний 15 дней. Расхо

Картофель, томаты	Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз	Опрыскива вегетации суспензией пр появления п заболевания, г интервалом 1 рабочей жидко 400-500 л/г
Лук	Пероноспороз	Опрыскива

Огурцы (открытого, защищенного грунтов, семенные посевы)		вегетации суспензией пр появления п заболевания, интервалом 1 рабочей жидк грунте и в се 500-600 л/га, грунте – 2000-
Виноградная лоза	Милдью	Опрыскива вегетации суспензией пр появления п заболевания, последую интервало Расход рабоче 1500 л/га
Яблоня **Груша**	Парша, мучнистая роса,	Опрыскива вегетации 0, рабочим раств
Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскива вегетации.
Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз	Опрыскива вегетации: пе конус», вто цветения. Рас л/га

Плодовые культуры	Мучнистая роса, парша, курчавость листьев, клястероспориоз, коккомикоз	Обработка период вегета
Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0,0 раствором
	Альтернариоз	Опрыскива цветения в бутон» и опад интервалом м не более 1 рабочей жидко
Груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскива вегетации раствором
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня	Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз	Опрыскива конусу» и Расход рабоче 1500 л/га
Сахарная свекла	Мучнистая роса, церкоспориоз	Опрыскива вегетации
Томат открытого грунта, картофель, морковь	Альтернариоз	Опрыскива появлении п болезни и с дней. Расход – 200-400 л/га
Томат открытого грунта Картофель Морковь	Альтернариоз	Опрыскива период в проявлении п болезни с и дней. Расход 200-400 л/га
Яблоня Груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскива вегетации в конус», ро последующие с интервало Расход рабоче л/га

Свекла сахарная, кормовая	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскива вегетации. жидкости – 300
Картофель	Альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующее дней. Расход р 400 л/га
Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующее дней. Расход – 400-600 л/га
Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскива вегетации в конус», «ро последующие с интервало Расход рабоче л/100 м^2
Картофель	Альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующее дней. Расход р 5 л/100 м^2
Томат открытого грунта		Опрыскива вегетации: профилактиче последующее дней. Расход р 5 л/100 м^2
Виноград	Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль	Опрыскива вегетации: пер весной в фа цветение, вто ягод в гроз обработки с и дней. Расход до 1000 л /га

Груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскива вегетации
Картофель	Альтернариоз	Опрыскива вегетации
Морковь		первых призн интервалом 10
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня	Кластероспороз, курчавость листьев, парша, кокомикоз	Опрыскива вегетации: по конус», второе Расход – 1000
Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскива вегетации
Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскива вегетации первых призн интервалом 10
Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскива вегетации. применяется цветения в с бутон» и опад интервалом м не более 1 рабочей жидко
Вишня, черешня	Коккомикоз	Опрыскива вегетации до и интервалом не Расход рабоче 2до 5 /л дере от возраста и с
Груша	Парша, мучнистая роса	
Декоративные кустарники	Пятнистости	Опрыскива вегетации первых призн интервалом 10
Персик,абрикос, слива	Кластероспороз, курчавость листьев	Опрыскива вегетации до и интервалом не Расход рабоче 2до 5 /л дере от возраста и с
Роза	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации первых призн интервалом 10
	Черная пятнистость	

Цветочные растения	Мучнистая роса	
	Серая гниль	
Яблоня	Альтернариоз	Опрыскива вегетации до и интервалом не
	Парша, мучнистая роса	
Сахарная свекла	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскива вегетациии

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

Пшеница ячмень, рожь, рис	Корневые гнили, фузариоз колоса, предотвращение полегания	Опрыскива вегетации
Ячмень, пшеница, рожь	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	
Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса	
Пшеница, ячмень яровые и озимые	Пыльная, твердая (каменная) головня, церкоспореллезная, фузариозная корневые гнили, снежная плесень	Протравли Расход – 10 л/
Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь озимая	Корневые гнили, церкоспореллез, фузариоз колоса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса, ржавчина бурая, темно-бурая пятнистость ячменя, ринхоспориоз ржи	Опрыскива вегетации
Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	
Подсолнечник	Фомопсис	
Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскива вегетации 0,1 раствором
Картофель (семенной)	Сухая (фузариозная) гниль, ризоктониоз	Обработка посадкой. Расх
Виноград	Белая и серая гнили	Опрыскива вегетации. Ра л/га

Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, сажистый грибок, «мухосед», альтернариоз, пятнистость листьев, гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, горькая плесневение)	Опрыскива вегетации. жидкости-1000 высоте дерева применяется другимии фу после обраб необходимо фунгицид действия, стробилурино

Картофель	Фитофтороз,макроспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче –с интервал Расход рабоч л/га
Томаты открытогогрунта		
Виноград	Милдью	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 14 дней. жидкости 800-

Картофель	Фитофтороз	Опрцыскив вегетации
Лук, огурцы	Пероноспороз	
Виноград	Мильдью	

Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: смыкания бо второе – посл в рядках
Виноград	Милдью	Опрыскива

		вегетации: профилактиче последующие 14 дней. Расхо 1000 л/га
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 14 дней. Расхо 500 л/га
Огурцы открытого грунта, лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 14 дней. Расхо 600 л/га
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 10-14 дней. жидкости – 400
Виноград	Милдью	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 10-14 дней. жидкости – 800
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 10-14 дней. жидкости – 300

Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 10-14 дней. жидкости – 400
Лук	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие 10-14 дней. жидкости – 600
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации рабочим раст
Виноград	Милдью	Опрыскива вегетации
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	
Лук всех генераций		
Картофель	Фитофтороз	Опрыскива вегетации
Виноград	Ложная мучнистая роса-милдью, черная фомозная гниль, отмирание побегов, краснуха	
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	
Лук всех генераций		
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опыскиван вегетации рабочим рас

		обработка-про при наступл условий бла развития бо позднее смы рядках. По интервалом 10
Томаты (открытого грунта)		Первая об активного профилактиче условиях, бл развития фит проявления заболевания, интервалом 7-
Виноградная лоза	Милдью	Профилакт обработки в роста растени 4-х листьев0 с дней, оконч через 12-14 цветения
Огурцы	Переноспороз	Первая профилактиче условиях, бл развития бо проявления ви заболевания, интервалом 10
Лук всех генераций		
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации
Виноград	Милдью	
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Огурцы открытого грунта	Переноспороз	
Лук всех генераций		

Картофель	Фитофтороз	Опрыскива вегетации
Томаты открытого грунта		
Виноград	Милдью	

Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче ботвы в рядка двух с инфицирани последующие дней. Расход – 400 л/га
Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицирани последующие дней. Расход – 600 л/га
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Огурцзашищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицирани последующие дней. Расход – 10 л/100 м
Томаты зашищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Виноград	Милдью	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие дней. Расход – 1000 л/га

Лук	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие дней. Расход – 400-600 л/га
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче ботвы в рядка двух су инфицировани последующие дней. Расход – 5 л/100 м^2
Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицировани последующие дней. Расход – 5 л/100 м^2
Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицировани последующие дней. Расход – 8 л/100 м^2
Огурцы открытого грунта	Переноспороз	Опрыскива вегетации раствором
Огурцы защищенного грунта		Опрыскива вегетации. Рас
Картофель	Фитофтороз	Опрыскива вегетации. Рас

Огурцы открытого грунта	Переноспороз	Опрыскива вегетации. Рас
Огурцы защищенного грунта		Опрыскива вегетации. Рас

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

Виноград	Ложномучнистая роса, черная пятнистость	В перид до
Томат	Фитофтороз	
Цитрусы	Альтернариоз	
Яблоня	Парша	
Груша		
Оливки	Гниль листвы	

Яблоня	Мучнистая роса	Опрыскиван розового бутона

		плода 3-4 интервалом 10-
Винограда	Оидиум	Опрыскиван раскрывание появлении на листьев, посл период об созревания я между обработк
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскиван Вегетации 0 рабочим раство
Огурцы закрытого грунта		Опрыскиван вегетации
Смородина	Американская мучнистая роса	Опрыскиван вегетации0,025%
Земляника	Мучнистая роса	Опрыскиван после сбора у рабочим раст рабочей жидко л/га
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0,02 раствором. жидкости 250- 400 л/га
Огурцы защищенного грунта		Опрыскива вегетации 0,02 раствором. жидкости – 100 3000 л/га
Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0, рабочим раств
Виноград	Оидиум	Опрыскива вегетации 0,

Персик	Мучнистая роса, плодовая гниль	рабочим рас рабочей жидко 1000 л/га
Земляника	Мучнистая роса	Опрыскива и после сбора ным рабочим р рабочей жидк л/га
Вишня (маточники)	Коккомикоз	Опрыскива вегетации 0,05 раствором. жидкости – 600 1000 л/га
Смородина черная (маточники)	Мучнистая роса	
Малина (питомники)	Пурпуровая пятнистость, серая гниль	Опрыскива вегетации рабочим рас рабочей жидко 1000 л/га
Яблоня	Мучнистая роса	
Розы открытого и защищенного грунта, горшечные цветы	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскива вегетации рабочим рас рабочей жидко 3000 л/га
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. жидкости-400-6
Огурцы защищенного грунта		
Смородина	Американская мучнистая роса	Опрыскива вегетации. жидкости-600-8
Персик	Мучнистая роса, плодовая гниль	Опрыскива вегетации. жидкости-800-1
Земляника	Мучнистая роса	Опрыскива и после уборк рабочей жидко
Вишня (маточники)	Коккомикоз	Опрыскива вегетации.

Смородина черная (маточники, питомники)	Мучнистая роса	жидкости-600-8
Малина (питомники)	Пурпуровая пятнистость, серая гниль	
Яблоня	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. Р жидкости-800-1
Розы открытого и защищенного грунта Гвоздика открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскива вегетации. Р жидкости-600-8
Гвоздика ремонтантная открытого и защищенного грунта	Ржавчина	
Наперстянка шерстистая	Септориоз	Опрыскива вегетации. Р жидкости-200-4
Виноград	Оидиум	Опрыскива вегетации. Р жидкости-800-1
Яблоня	Мучнистая роса	Опрыскива розового буто плода 3-4 интервалом 10
Винограда	Оидиум	Опрыскива раскрывание появлении н листьев, пос период об созревания между обработ
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскива Вегетации рабочим раств
Огурцы закрытого грунта		Опрыскива вегетации
Смородина	Американская мучнистая роса	Опрыскива вегетации0,025 раствором
Земляника	Мучнистая роса	Опрыскива и после сбо ным рабочим р

		рабочей жидк л/га
Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз, гнили плодов при хранении	Опрыскива вегетации. плодов п опрыскивание сбора ур предназначенн
Томаты открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскива вегетации
Огурцы открытого грунта	Переноспороз	
Огурцы защищенного грунта	Мучнистая роса, переноспороз	
Лук	Переноспороз	

Виноград	Мильдью, оидиум	Опрыскива вегетации
Томаты открытого грунта	Фитофтороз	
Огурцы открытого грунта	Переноспороз	
Огурцы защищенного грунта	Мучнистая роса, переноспороз	
Лук	Переноспороз	

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

Яблоня	Мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскива вегетации смачивания рабочей жидко

Виноград	Оидиум, Серая гниль	Опрыскива вегетации. Р жидкости 1000
Томат в открытом грунте	Мучнистая роса, Кладоспориоз	Опрыскива вегетации. жидкости 300-5
Томат в защищенном грунте	Мучнистая роса, Кладоспориоз	Опрыскива вегетации. жидкости 500-1
Огурец в открытом грунте	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. Р жидкости 300-5
Огурец в защищенном грунте	Мучнистая роса	Опрыскива Расход рабоч 1000 л/га
Баклажан в открытом грунте	Мучнистая роса	Опрыскива Расход рабоч 1000 л/га
Перец в открытом грунте	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. Р жидкости 400-1
Перец в защищенном грунте	Мучнистая роса	Опрыскива Расход рабоч 1000 л/га
Дыня в открытом грунте	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. Р жидкости 300-5
Арбуз	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. жидкости 300-5
Морковь	Альтернариоз, Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. Р жидкости 200-4
Земляника	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации. Р жидкости 300-5
Роза в защищенном	Мучнистая роса, Серая гниль	Опрыскива вегетации.

грунте		жидкости 1000
Роза	Серая гниль	Погружени перед охлажд 50 г/100л воды Нельзя обработанные холодильник, е Обработанные быть сухими.
Огурцы открытого грунта	Переноспороз	Опрыскива вегетации 0,2%
	Корневые гнили	Полив поч семян 0,25% р рабочей жидко
	Корневые гнили, переноспороз	Полив п рассады 0 раствором. жидкости-300м
Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскива вегетации
Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость	
Рожь озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз, церкоспорелла	
Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	
Смородина черная (маточники)	Американская мучнистая роса, антракноз, септориоз	Опрыскива вегетации 0,1 препарата
Смородина черная (маточники, питомники)	Американская мучнистая роса	
Райграс пастбищный, кострец безостый, овсяница луговая (семенные посевы)	Гельминтоспориоз	Опрыскива вегетации
Клевер луговой 2-го года вегетации	Антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость	Опрыскива вегетации 0

		препарата
Пшеница яровая и озимая	Ржавчина, септориоз,мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскива вегетации
Ячмень яровой и озимый	Ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость	
Рожь озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса	
Смородина черная (питомники, маточники)	Американская мучнистая роса, антракноз, септориоз	Опрыскива вегетации 0,1 раствором

Пшеница яровая и озимая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчины, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскива вегетации
Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз, пиринефороз	Опрыскива вегетации
Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскива вегетации: появлении п одного из заб через 10-14 дн
Виноград	Оидиум	Опрыскива вегетации: до цветения, яго крупинку, яго

		горошину
Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскива вегетации первых призн болезней в ф стеблей-начал стручков в ниж
Рапс озимый		Опрыскива вегетации осе листьев и весн первых призн болезней в ф стеблей-начал стручков в ниж
Соя	Альтернариоз, аскохитоз, антракноз, септориоз, церкоспороз	Опрыскива вегетации

Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, пиренофороз, церкоспореллез, коспореллез, фузариоз	Опрыскива вегетации. Рас
		Опрыскива вегетации. Рас
Ячмень яровой и озимый	Гельминтоспориозные пятнистости, пиренофороз, мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, ринхоспориоз, церкоспореллез, фузариоз	Опрыскива вегетации. Рас
Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая,стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз, кладоспориоз, альтернариоз	
Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: появлении п заболевания, 14 дней. жидкости- 300

Картофель	Фитофтороз	Опрыскива

		вегетации

Картофель	Фитофтороз	Сплошное период вегета
Томаты	Фитофтороз	
Огурцы	Пероноспороз	
Яблоня	Парша	
Виноград	Милдью	
Виноград	Милдью, черная пятнистость	Опрыскива вегетации
Картофель	Фитофтороз	
Арбузы, дыня	Переноспороз	
Томаты защищенного и открытого грунта	Фитофтороз	
Лук	Переноспороз	

Виноград	Оидиум Паутинные клещи	Опрыскива вегетации. жидкости-800-
		Опрыскива вегетации. жидкости-10л/

одной смолы + металлической меди

Виноград	Ложномучнистая роса, черная пятнистость	

Томат	Альтернариоз, фитофтороз	
Оливки	Гниль листвы	
Абрикосы	Клястероспориоз	
Цитрусы	Альтернария цитрусовая	

Виноград	Мильдью, антракноз, краснуха	Опрыскива вегетации
Яблоня	Парша	Опрыскива вегетации 0,2 препарата
Картофель	Фитофтороз, макроспороз, ризоктониоз	
Огурцы	Переноспороз, бурая угловатая пятнистость	Опрыскива вегетации
Томаты	Фитофтороз	

Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз и др. пятнистости, фузариоз колоса	Опрыскива вегетации
Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, карликовая, мучнистая роса, ринхоспориоз, пиренофороз, сетчатая пятнистость	
Рожь	Ржавчина бурая, мучнистая роса, фузариоз колоса	
Овес	Ржавчина корончатая, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость	
Пшеница	Мучнистая роса, пятнистости, ржавчина	

Хлопчатник	Дефолиация	Опрыскива раскрытии 40-4

Яблоня, груша, персик, вишня	Парша, мучнистая роса, бурая пятнистость, монилиоз, серая гниль	Опрыскива вегетации до после цвете завязывания п
Виноград	Оидиум, серая гниль, антракноз	Опрыскива вегетации до после цвете образования я
Огурцы открытого и закрытого грунта, бахчевые	Мучнистая роса, серая гниль, антракноз, альтернариоз, фузариозные гнили	Опрыскива вегетации, признаках появ
Клубника, подсолнечник	Мучнистая роса, серая гниль	Опрыскива вегетации
Цветочные культуры		Опрыскива вегетации, признаках появ

Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	Опрыскива вегетации
	Ржавчина желтая, стеблевая, септориоз	
Пшеница озимая	Ржавчина бурая, мучнистая роса	
	Ржавчина желтая, стеблевая, септориоз	
Овес, рожь озимая	Ржавчина желтая, стеблевая, септориоз, мучнистая роса, церкоспореллез, ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	
Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость	
Кукуруза (семенные посевы)	Пузырчатая головня, корнвые гнили, фузариоз, плесневение початков	Опрыскива выбрасывания
Свекла сахарная	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскива вегетации
Яблоня	Мучнистая роса, парша	
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	
Виноградная лоза	Оидиум, серая гниль	
Розы защищенного грунта	Мучнистая роса	
Земляника малина (питомники)	Мучнистая роса, серая гниль	Опрыскива и после сб питомниках и ограничений

Городские зеленые насаждения	Парша, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскива вегеации
Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз	Опрыскива вегетации с проявлением п болезни
Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость	
Сахарная свекла	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскива вегетации
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	
Яблоня	Мучнистая роса, парша	
Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскива вегетации 0,0 раствором
Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0,1-0 раствором
Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	Опрыскива вегетации
	Ржавчина желтая, стеблевая, септориоз	
Ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость	
Сахарная свекла	Мучнистая роса, ржавчина	
Кукуруза	Пузырчатая головня, корневые гнили, фузариоз, плесневение початков	Опрыскива посевов в фа нитей
Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0 рабочим раств
Огурцы защищенного грунта		
Томаты защищенного грунта		Опрыскива вегетации 0,1 раствором
Дыня		Опрыскива вегетации 0,05 раствором
Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскива вегетации 0,0 раствором
Слива, алча	Дырчатая пятнистость, плодовая гниль, монилиальный ожог, «кармашки»	Опрыскива вегетации 0

		рабочим раств
Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскива вегетации 0,0 раствором
Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскива и после сбора %-ным рабоч питомниках и ограничений
Земляника	Мучнистая роса, серая гниль	
Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации рабочим раств
Роза эфиромасличная	Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости	Опрыскива вегетации 0,05 раствором
Малина	Мучнистая роса	Опрыскива вегетации 0, рабочим раств
Городские зеленые насаждения	Мучнистая роса, ржавчина, парша	Опрыскива вегетации 0,0 раствором
Сосна	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскива питомниках
Яблоня, груша, айва	Щитовка, клещи,тля, листовертка, моли, листоблошка	Парша и д
Абрикос, персик, слива, вишня,черешня		Кластеросп Пятнистость, к
Крыжовник, смородина		Антракноз,
Виноградники	Клещи и медяницы	Оидиум, се
Кукуруза	Плесневение семян, фузариоз, бактериоз, пузырчатая, пыльная головня, корневые и стеблевые гнили	Протравли суспензией пр на 1 т семян)

Пшеница яровая и озимая	Плесневение семян, твердая головня, гельминтоспориозная, фузариознаякорневые гнили	Протравли суспензией п воды на 1 т се
Горох, фасоль, клевер, люцерна, маш	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антрокноз, бактериоз, плесневение семян	Протравли суспензией пр воды на 1 т се
Свекла сахарная, кормовая, столовая	Фомоз,черная ножка всходов, церкоспороз, альтернариоз, плесневение семян	Протравли суспензией пр на 1 т семян)
Капуста, редис, редька, репа и другие крестоцветные	Черная ножка, переноспороз, бактериоз, черная плесень, плесневение семян	Протравли суспензией п воды на 1 т се
Морковь	Фомоз, черная и белая гниль	
Лук	Шейковая гниль, плесневение семян	
Картофель	Фитофтороз, все виды парши, мокрая гниль	Обработка семенного суспензией Протравливан суспензией пр на 1 т семян)
Чеснок, яровой и озимый	Плесневение, белая гниль донца	Обработка однократного ную суспензию посадкой

Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, фузариоз колоса, желтая пятнистость или пиренофороз	Опрыскива период вегета
Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина, ринхосоприоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	
Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскива вегетации: пер конусу, втор бутону, треть после цвете плодам (опа лепестков) с и 10-14 дне

		1200 л/га
Виноград	Оидиум	Опрыскива период вегета ным рабочим р
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскива период вегета
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче ботвы в рядка двух су инфицировани последующие дней. Расход – 400 л/га
Огурцы открытого грунта	Переноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицировани последующие дней. Расход – 600 л/га
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Огурц зашищенного грунта	Переноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицировани последующие дней. Расход –
Томаты зашищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	

		10 л/100 м
Виноград	Милдью	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие дней. Расход – 1000 л/га
Лук	Переноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче последующие дней. Расход – 400-600 л/га
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: профилактиче ботвы в рядка двух су инфицировани последующие дней. Расход – 5 л/100 м^2
Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицировани последующие дней. Расход – 5 л/100 м^2
Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	
Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскива вегетации: профилактиче настоящих л позднее дву инфицировани последующие дней. Расход – 8 л/100 м^2
Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	

Пшеница яровая и озимая	Эпифитотия ржавчин бурой, желтой, стеблевой	Опрыскива вегетации
	Мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, церкоспореллез, фузариоз колоса	
Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина, ринхосоприоз, гельминтоспориозная и сетчатая пятнистости	
Рожь	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ринхоспориоз, гельминтоспориозная пятнистость	
Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, ржавчина,	
Горох	Ржавчина, мучнистая роса	Опрыскива появлении е ржавчины или росы. При заболевания (необходимы первая – единичных п через 7 дне обработки

Пшеница яровая, озимая	Септориоз, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса при слабом уровне развития болезней	Опрыскива вегетации жидкости 300
Ячмень яровой, озимый	Стеблевая ржавчина, карликовая ржавчина, мучнистая роса	
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскива вегетации: опрыскивание профилактиче
Лук (семенник)	Пероноспороз	
Томат (семенные посевы)	Бурая пятнистость, фитофтороз	

етствии с утвержденными рекомендациями по применению

Яблоня		
Тыква, огурец		
Виноградники		
Томат (теплица)		

ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН

	2	3	4	5	6
0 г/кг) чайна д Ко., /12	2-3	Пшеница яровая и озимая	Пыльная и твердая головня, церкоспореллезная и фузариозная корневая гниль	Протравливание семян. Расход – 10 л/т	- (1)
	2	Рис	Пирикуляриоз, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян. Расход – 5-8 л/т	
	2-3	Ячмень яровой и озимый	Пыльная, каменная и черная головня, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян. Расход – 10 л/т	
		Овес	Пыльная, покрытая головня, фузариозная корневая гниль		
	3	Соя	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, плесневение семян	Протравливание семян. Расход – 5-10 л/т с добавкой 0,2 кг нитрагина на одну гектарную норму семян	
	5-6	Томаты	Фузариозное увядание	Протравливание семян за 1-15 суток до посева.	

				Расход – 5-10 л/т	
		Капуста	Серая гниль, сосудистый бактериоз	Погружение кочерыг перед закладкой на хранение или во второй половине хранения в смесь: 1,5 % Фундазола + 5 % метилцеллюлозы + 16 % мела + 77,5 % воды (в объемных процентах)	
	0,5		Серая гниль	Обработка кочерыг весной 0,5 %-ным рабочим раствором	
	5-6	Чеснок	Белая гниль донца, плесневение	Погружение зубков в 3 %-ный рабочий раствор за 1-3 суток до посадки	
	2	Морковь	Фомоз, белая и сухая гнили	Погружение в 5 %-ный рабочий раствор перед закладкой на хранение	
	1,5-3 г/м^2	Табак	Черная корневая гниль	Полив почвы в парниках 0,25 %-ным рабочим раствором после посева семян и при появлении первых признаков болезни	- (2)
	5	Яблоня	Фузариозная корневая гниль	Протравливание кондиционных семян перед стратификацией. Расход – 5-10 л/т.	- (1)
	3	Подсолнечник	Белая гниль	Протравливание семян за 15-20 дней до посева. Расход – 15 л/т	
0 г/л) нта», /14	2	Пшеница яровая и озимая	Пыльная, твердая и карликовая головня, плесневение семян, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, питиозная корневая гниль	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно до посева (до одного года). 8-10 л воды на 1 т семян	- (1)
	3	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневая гниль,		

			плесневение семян;		
	2	Кукуруза	Пыльная и пузырчатая головня, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости-5-10л/т	
ципроконазол					
, КС ента» , 714	1	Пшеница яровая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход – 10 л/т	- (1)
	0,75		Твердая головня, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян		
	0,75	Пшеница озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян, бурая ржавчина		
	1,0		Пыльная головня		
	1,5	Ячмень яровой	Пыльная, ложная пыльная головня		
	1		Каменная головня, полосатая, сетчатая пятнистости, плесневение семян, мучнистая роса		
	0,75-1		Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили		
	1-1,5	Ячмень озимый	Пыльная, каменная, черная (ложная) головня, полосатая, сетчатая пятнистости, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса		
	1	Овес	Покрытая, пыльная головня		
	0,75		Гельминтоспориозная корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян		

	1	Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная корневая гниль. фузариозная корневая гниль. спорынья, снежная плесень (в районах слабого и умеренного развития)		
рам					
ск) Пиер », КНР, яКем» 14	2,5-3,0	Пшеница яровая и озимая	Твердая и пыльная головня,гельминтос-пориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
	2,5-3,0	Ячмень яровой и озмый	Каменная головня,гельминтос-пориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян. Пыльная головня, ложная пыльная головня.		
	2,5	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, стеблевая головня, плесневение семян		
	2,0-2,5	Кукуруза (кроме кукурузы на зеленый корм)	Пузырчатая головня, пыльная головня, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 5 л/т	
	4,0	Просо	Головня метелки	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10-15 л/т	
	2,0	Картофель семенной (кроме раннеспелых сортов)	Ризоктониоз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т	
, ВСК) иста рейт »,	2-3	Хлебные злаки	Головневые, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян перед посевом с увлажнением пред посевом или заблаговременно. Расход-	-(1)

ия /15				10 л/т	
	2-2,5	Кукруза	Головня пузырчатая, пыльная, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом с увлажнением пред посевом или заблаговременно. Расход-5 л/т	
	4	Просо	Головня метелки	Протравливание семян перед посевом с увлажнением пред посевом или заблаговременно. Расход-10-15 л/т	
	2	Картофель (семенной, кроме раннеспелых сортов	Ризоктониоз	Протравливание семян перед посевом с увлажнением пред посевом или заблаговременно. Расход-2 л/т	
60 г/л) tarim imalat d. Sti)» /13	0,4 – 0,6	Пшеница	Головневые болезни, корневые гнили, септориоз, пятнистости, плесень семян и всходов	Протравливание семян до высевания	-(1)
	0,5	Ячмень			
г/л) Ко КГ» 12 60 г/л) руп» cOO КГ» /13 60 г/л) oo Ko., OcOO КР	0,5	Овес			

03/16					
РК (60 anjing emical ерез Плюс», 06/16 С (60 « tional ерез », КР 6/16 60 г/л) я hang , ltd», ОО « КР 6/16	0,4-0,5	Пшеница	Пыльная, твердая головня, фузариозные и гельминтоспороиозные корневые гнили, септериоз, фузариозная снежная плесень, плесневение семян	Противление семян, расходы 10л/т	- (1)
		Ячмень яровой и озимый	Каменная, пыльная головня, пыльная ложная головня, фузариозные и гельментоспориозные корневые гнили, сетчатая пятнистость, септориоз		
		Рожь озимая	фузариозные и гельментоспориозные коневые гнили, сетчатая пятнистость, септериоз		
		Овес	Пыльная, твердая головня, красная пятнистость		
60 г/л) ково 09/14	0,4	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, твердая головня, септориоз, плесневение семян	Протравливания семян до посева. Расход - 10 л/т	- (-)
		Пшеница озимая	Фузариозные и гельментоспориозные корневые гнили, фузариозная снежная плесень		
		Ячмень	Каменная головня, пыльная головня, пыльная ложная головня, сетчатая пятнистость, септориоз, гельментоспориозные и		

			фузариозные, корневые гнили		
6 г/л) Т, L О., ерез йл» 4	0,2-0,25	Пшеница яровая и озимая	Пыльная и твердая головни, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, фузариозная снежная плесень, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	- (1)
		Ячмень яровой и озимый	Каменная (твердая), пыльная и пыльная ложная головни, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян		
		Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, снежная плесень		
		Овес	Пыльная и покрытая головни, красно-бурая пятнистость, плесневение семян		
	0,25	Просо	Головня метелок		
		Лен-долгунец	Антракноз, крапчатость		

ра, КС) ро Ко., ОсОО КР 703/16 20 г/л) rochina Co.,Ltd» «Агро Г» КР 6/12 20 г/л) айна шнл ническал Лтд», О « КР 10/15 0 г/л) охем », КНР, и-Агро» 2/16	0,2	Пшеница яровая и озимая	Твердая, пыльная головня, септориозу, снежная плесень, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, мучнистая роса, плесневые семян	Протравливание семян –10 л воды на 1 тонну семян	(-)
60 г/л) а « ия 06/15 0 г/л)	0,4-0,5	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости-10л/т	-(1)
	0,4	Пшеница озимая	Пыльная и твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили		
	0,4-		Плесневение семян,		

амсун », КНР) КР 10/15	0,5		септориоз		
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня		
	0,5		Пыльная, пыльная ложная головня		
	0,4-0,5		Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян		
		Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили		
		Овес	Пыльная и покрытая головня, красно-бурая пятнистость		
	0,5	Лен	Антракноз, крапчатость		
				Протравливание семян с увлажнением за 7-14 дней до посева. Расход рабочей жидкости – 5 л/т	
240 г/л) ce Fine- , Китай, Абат», 5/12	0,1	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)	
		Ячмень яровой	Пыльная и каменная головня, корневые гнили, плесневение семян		
люс, КС) angzhou mical з ОсОО », КР 2/17	0,15–0,18	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня (Ustilago tritici), твёрдая головня (Tilletia caries), фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.), обыкновенная (гельминтоспориозная) корневая гниль (Bipolaris sorokiniana), фузариозная снежная плесень (Fusarium nivale), септориоз (Septoria spp.), плесневение семян (Alternaria spp., Cladosporium spp., Mucor spp. И др.)	Протравливание семян перед посевом. Протравливатели: ПС-10 ПС-10А ПСШ-5 «Мобитокс» КСП-10	

		Ячмень яровой, озимый	Каменная головня (Ustilago hordei), пыльная головня (Ustilago nuda), пыльная ложная головня (Ustilago nigra), обыкновенная (гельминтоспориозная) корневая гниль (Bipolaris sorokiniana), фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.), сетчатая пятнистость (Drechslera teres), плесневение семян (Alternaria spp., Cladosporium spp., Mucor spp. И др.)		
0 г/л) айна шнл никал ЛТД», Кыргыз , КР 0/15	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				
мефеноксам					
КС л) Кроп », /12	0,8	Пшеница яровая	Твердая головня	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости –до 10 л/т	-(1)
	0,8-0,9		Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль. питиозная корневая гниль, септориоз, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция		
	1,0		Пыльная головня		
	0,8	Ячмень яровой	Каменная головня		
	0,8-0,9		Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в.т.ч. альтериозная семенная инфекция		
	1,0		Пыльная головня, ложная пыльная головня,		
	0,9	Овес	Покрытая головня, пыльная головня, фузариозная		

			корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в. т.ч альтераиозная семенная инфекция. Красно-бурая пятнистость		
+ триадимефон					
, КЭ /л) охим» 1/12	0,75-1,0	Пшеница и ячмень яровой	Бурая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
+ флутриафол					
КС л) охим» 1/12	1,5	Пшеница яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход – 10 л/т	- (1)
			Пыльная головня		
	2	Пшеница яровая (семенные посевы)			
	1,5	Пшеница озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина		
	1,5-2	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина, гельминтоспориозы в т.ч. темно-бурая и полосатая пятнистости		
	2		Пыльная головня		
-тебуконазол					
ВСК л) вгуст»,	0,3-0,4	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян; бурая ржавчина и	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно(до 1 года). Расход рабочей	60(1)

			септориоз	жидкости-10л/т
6/15	0,4		Пыльная головня	
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, черная пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
	0,4	Ячмень озимый	Каменная, пыльная головня, черная пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
	0,3-0,4	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	
	0,4		Фузариозная и тифулезная снежная плесень	
	0,3-0,4	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян	
	0,4-0,5	Подсолнечник	Фомопсис, белая и серая гниль, плесневение семян	

СП (80 tarim imalat d. Sti)» /13 STFOR г), ерез , КР 5/15	1,5-2,0	Кукуруза	Плесневение семян, фузариоз, бактериоз, пузырчатая, пыльная головня, корневые и стеблевые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (5 л воды на 1 т семян)
	1,5-2,0	Пшеница яровая и озимая	Плесневение семян, твердая головня, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	3,0-4,0	Горох, фасоль, клевер, люцерна, маш	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антрокноз, бактериоз, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (5-10 л воды на 1 т семян)
	4,0-6,0	Свекла сахарная, кормовая, столовая	Фомоз,черная ножка всходов, церкоспороз, альтернариоз, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (15л воды на 1 т семян)
	4,0-5,0	Капуста, редис, редька, репа и другие	Черная ножка, переноспороз, бактериоз, черная плесень, плесневение	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1

		крестоцветные	семян	т семян)	
	6,0-8,0	Морковь	Фомоз, черная и белая гниль		
	4,0-5,0	Лук	Шейковая гниль, плесневение семян		
	2,1-2,5	Картофель	Фитофтороз, все виды парши, мокрая гниль	Обработка клубней семенного картофеля суспензией препарата. Протравливание семян суспензией препарата (15л воды на 1 т семян)	
	5,0-6,0	Чеснок, яровой и озимый	Плесневение, белая гниль донца	Обработка зубков путем однократного погружения в 3%-ную суспензию препарата перед посадкой	
00 г/л), оссия 6/15	3,0-4,0	Пшеница яровая и озимая	Плесневение семян, твердая головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-8-10л/т.	-(1)
	4,0	Кукуруза	Плесневение семян, фузариоз, бактериоз, пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили		
	4,0-5,0	Подсолнечник	Белая, серая гнили, плесневение семян, переноспороз		
	4,0-5,0	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, обыкновенная парша, мокрая бактериальная гниль, сухая фузариозная гниль	Обработка клубней перед посадкой . Расход рабочей жидкости-до 20л/т.	
	8,0-10,0	Дыня, арбуз	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антракноз, бактериоз, плесневение семян	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-5-10л/т.	
	4,0-10,0	Цветочные культуры	Плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-10л/т.	
	4,0	Яблоня, груша	Плесневение семян, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян за 1-15 дней до посева или заблаговременно. Расход	

			рабочей жидкости-10л/т.
12.0	Хвойные культуры	Инфекционное полегание сеянцев	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-10л/т.
3,0-5,0	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, полиспороз, аскохитоз, плесневение семян	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-6-8л/т.
8,0-12,0	Сахарная свекла, столовая, кормовая	Корнеед всходов, фомоз, переноспороз, церкоспороз. Плесневение семян	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-15л/т.
3,0-4,0	Сорго	Плесневение семян, покрытая, пыльная головня, белая гниль	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-10л/т.
4,0	Гречиха	Аскохитоз, серая гниль, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-5-10л/т.
4,0-6,0	Джут, кенаф, эспарцет	Плесневение семян, аскохитоз, антракноз, фузариоз, белая и серая гниль	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-5-10л/т.
8,0	Клещевина	Фузариоз, бактериоз, плесневение семян	
6,0-8.0	Горох, фасоль, клевер, вика, чина, люцерна, маш	Аскохитоз, фузариоз, белая и серая гниль, антракноз, бактериоз, плесневение семян	
	Соя, люпин, нут, чечевица, бобы кормовые	Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз	
	Ляллеманция, перилла	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, бактериоз, плесневение семян, антракноз	
	Кормовые многолетние травы	Плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости-10л/т.

ол+тебуконазол

КС) Байер мания 1/15	0,15-0,2	Пшеница яровая, озимая	Пыльная, твердая головня, фузариозная гельминтоспориозня, ризоктониозная, корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протраливание семян перед посевом	-(1)
		Ячмень яровой, озимый	Пыльная, каменная, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян		
		Рожь озимая	Стеблевая головня, тифулез, гельминтоспориозная, фузариозная, корневые гнили, плесневение семян		
		Овес	Пыльная, покрытая головня, гельминтоспориозная, фузариозня корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение семян		

ГЕРБИЦИДЫ

3	4	5
Зерновые озимые (пшеница, ячмень, овес, рожь)	Однолетние двудольные	Опрыскивание посе в фазе кущения культу трубку
Зерновые яровые (пшеница, ячмень, овес, рожь)		
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры
Сорго		Опрыскивание посе листьев культуры

Клевер ползучий		Опрыскивание посе культуры после п тройчатого листа
Злаковые травы		Опрыскивание по кущения культуры

Пшеница озимая, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посе в фазе кущения культур
Пшеница яровая, ячмень		Опрыскивание по кущения культуры
Овес, просо, сорго		
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры
Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая		Опрыскивание посе листьев до выхода в тр
Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой		Опрыскивание по кущения
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание сорняков в послеуборо
Пары		Опрыскивание сорняков в период

		появления

жденными рекомендациями по применению

жденными рекомендациями по применению

Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вес сорняков в фазе куще выхода в трубку
Пшеница яровая, ячмень яровой		Опрыскивание вес сорняков в фазу куще выхода в трубку.
Пшеница яровая, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные	Опрыскивание по кущения культуры и роста сорняков
Пшеница озимая		Опрыскивание по кущения культуры весно
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры и в ра сорняков

жденными рекомендациями по применению

Пшеница яровая, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой двудольные)	Опрыскивание по кущения культуры и ра сорняков
Пшеница озимая		Опрыскивание по кущения культуры весно
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков

жденными рекомендациями по применению

Пшеница яровая и озимая,	Однолетние двудольные	Опрыскивание по кущения до выхода в тр
Ячмень	Многолетние двудольные	Опрыскивание посе растений более 20 см
Кукуруза		фазы 5-листьев культур
Пшеница яровая, озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание в ф выхода в трубку
Ячмень	Многолетние широколистные	Оприскивание при
Кукуруза		более 20 см, но не листьев культуры

жденными рекомендациями по применению

Пшеница озимая, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посе в фазе кущения культур

Пшеница яровая, ячмень		Опрыскивание по кущения культуры
Овес, просо, сорго		
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры
Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая		Опрыскивание посе листьев до выхода в тр
Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой		Опрыскивание по кущения
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание сорняков в послеуборо
Пары		Опрыскивание сорняков в период появления

Пшеница озимая, рожь	Однолетние двудольные в т. ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание пос в фазе кущения культ трубку. Расход рабоч 400 л/га
Пшеница яровая, ячмень, овес, просо		Опрыскивание по кущения культуры до Расход рабочей жидкос
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры. Р жидкости 200-400 л/га
Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов культуры. Широколисте это время должны нах 2-5 листьев и активного
Пшеница озимая, рожь		Опрыскивание посево листьев культуры
Пшеница яровая, ячмень, овес		
Просо		

жденными рекомендациями по применению

фурон- метил

Пшеница озимая и яровая, овес, рожь, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк, осот, вьюнок) в т.ч. устойчивые к 2,4-Д)	Опрыскивание пос фазе от начала и до культуры, в ранние сорняков. Применять на выше 7,5. При необход высевать только ози пшеницу.
Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (бодяк, осот, вьюнок), в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание пос фазе от начала и до культуры, в ранние сорняков. Применять на выше 7,5. При необход высевать только ози пшеницу.
Пшеница, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные	Опрыскивание по кущения культуры и ра сорняков. Озимые весной. Расход рабоче 300 л/га
Кукруза		Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков. Расход рабо 50-300 л/га
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание по кущения культуры и ра сорняков. Озимые весной. Расход рабоче

		300 л/га
		Опрыскивание по выхода в трубку (1 культуры и ранние фаз (с учетом чувствитель случае преобладания цепкого; если погодн позволили произвес раньше срока. Озимы весной. Расход рабоче 50-300 л/га
Кукуруза в т.ч. на силос и масло	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков. Расход рабо 50-300 л/га
Просо		Опрыскивание по кущения культуры и ра сорняков. Расход рабоч 300 л/га
Сорго		Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков. Расход рабо 50-300 л/га
Рис	Осоковые, в т.ч. клубнекамыш, однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание пос листьев – кущение ку ежовников 3 листа – ку 2 листа – начало куще от семядолей до начала

Рис	Многолетние и однолетние злаковые двудольные сорняки	Опрыскивание в ф конца кущения культуры

Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки	Опрыскивание п развития 1-2 наст люцерны (в фазе куш Расход рабочей жидкос
Рис	Осоковые, в т.ч клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе х листьев культуры в ра сорняков (2-5 листьев). смачиваемости сор опрыскиванием уровен понижается до 0-2см, ч опрыскивания чеки с водой до 10-12 см.
Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в ф культуры и ранние фазы
Соя		Опрыскивание пос образование 2 – 5 на культуры
Люцерна 1-го года вегетации	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание сем фазе 1-2 настоящих л Расход рабочей жидкос

Люцерна (старовозрастные семенные посевы)		Опрыскивание по стеблевание культуры растений 10-15 см. жидкости 200-300 л/га
Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание пос фазе кущения культуры
Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера		Опрыскивание п развития 1-го тройч клевера (в фазе кущени
Рис	Осоковые, в т.ч. клубнекамыш и однолетние двудольные	Опрыскивание пос листьев – кущения листьев сорняка

Рис	Однолетние злаковые и осоковые сорняки, в т.ч. клубнекамыш	Опрыскивание посе листьев однолетних зл и 5-6 листьев клубнекам
Рис	Однолетние злаковые и осоковые, в т.ч. клубнекамыш, некоторые широколистные (монохория, частуха, стрелолист и др.) сорняки	Опрыскивание посе листьев однолетних зл и 5-6 листьев у клубнек смеси с 0,075-0,09 л/г рабочей жидкости 30 авиационной обработке 100 л/га
Рис	Однолетние двудольные и злаковые сорняки, клубнекамыш	Опрыскивание посе листьев у одноле сорняков и 5-6 клубнекамыша. Рас жидкости 200-400 л/га, обработке 100 л/га

Озимая и яровая пшеница, ячмень, просо	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание пос кущения зерновых и ра (2-4 листа) сорняков
Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев культуры
Лук	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание культуры

Пшеница яровая, ячмень, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание по кущения культуры пр роста сорняков
Пшеница озимая		
Пшеница и ячмень яровые	Горчак розовый	
Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев культуры

Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, лен-долгунец	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание по фазы развития (2-3 л независимо от фазы ра
Свекла (сахарная и кормовая)	Многолетние злаковые (пырей ползучий, гумай, свинорой)	Опрыскивание вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до независимо от фазы ра

Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание в ф сорных растений, неза развития культуры
	Пырей ползучий	Опрыскивание при пырея ползучего, неза развития культуры

Посевы и посадки сосны и ели	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посе период активного роста

Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, фасоль, рапс	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорн активного роста (в фаз до кущения)
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, фасоль, рапс	Многолетние злаковые (пырей ползучий, свинорой, гумай	Опрыскивание посе сорняков 10-15 см
Картофель, овощи	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорн активного роста (в фаз

		до кущения)
Картофель, овощи	Многолетние злаковые (пырей ползучий, свинорой, гумай	Опрыскивание посе сорняков 10-15 см
Хлопчатник	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорн активного роста (в фаз до кущения)
Хлопчатник	Многолетние злаковые (пырей ползучий, свинорой, гумай)	Опрыскивание посе сорняков 10-15 см

1 -1,8	Сельскохозяйственные угодья предназначенные для посева культур	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста до посева культуры	-(1)
3	Пары	Злостные (горчак розовый, гумай, вьюнок полевой, свинорой пальчатый)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	
	Коллекторно-дренажная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный	Опрыскивание сорняков в период их активного роста до затоплени я их водой	
2-3	Плодовые, виноградники	Однолетние многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (при условии защиты культуры)	
	Объекты города (села0: трамвайные и железно-дорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты	Нежелательная травянистая древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	

Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорн активного роста
	Злостные (горчак розовый, гумай, вьюнок полевой, свинирой пальчатый)	
Коллекторно-дренажная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный	Опрыскивание сорн активного роста до зато
Плодовые	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорн активного роста (при культуры)
Объекты горда (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты	Нежелательная травянистая и кустарниковая растительность	Опрыскивание сорняков и растительности. Ра жидкости 200 -300 л/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яр.зерновые, овощные, технические, масличные), а также однолетних цветочных (семенные посевы)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков осенью в период
	Многолетние злаковые и двудольные	
	Злостние многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой)	
Сахарная свекла, кукуруза	Однолетные и многолетные (пырей ползучий)	Опрыскивание сорняков за 2 недели до
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в послеуборо весной за 2-4 недели до
Люцерна	Повилика тонкостебельная	Опрыскивание пос дней после укоса
Пары	Однолетние и многолетние	Опрыскивание сор их активного роста
	Многолетние злаковые и двудольные	
	Вьюнок полевой, бодяк полевой	
Зерновые	Однолетные и многолетние	Опрыскивание пос до уборки для подсуш частичного подавления
Плодовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков весной или ле защиты культуры)
Плодовые	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков весной или ле

		защиты культуры)
Виноградники		Опрыскивание сорняков в мае-июле защиты культуры)
Открытая коллекторно-дренажная и оросительная сеть	Однолетные и многолетные, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.)	Опрыскивание по сорнякам в период инт питательных веществ систему (июль-сентябрь
		Повторное опры следующий год
Арбуз, томаты рассадные и безрассадные	Заразиха	Опрыскивание посе период образования культурных растений пр с интервалом в 10 дней
Дренажные каналы и обочины дорог	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные	Опрыскивания кана их водой
Поля, предназначенные под посев различных культур (яр. Зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков осенью в период
	Многолетние злаковые двудольные	
	Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой)	
Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорн активного роста
	Многолетни злаковые и двудольные	
	Вьюнок полевой, бодяк полевой	
Оросительные и дренажные каналы, водоемы и прочее	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.)	Опрыскивание по сорнякам в течение лет
Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорн активного роста
	Горчак розовый, тростник обыкновенный	
Земли, засоренные карантинными сорняками	Амброзия полыннолистная, виды повилики, паслен колючий	
Поля предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	
Земли несельскохозяйственного пользования(полосы отчуждения линий электропередая, газо и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)		

жденными рекомендациями по применению

Пары	Однолетние многолетние злаковые двудольные	Опрыскивание сорняко активного роста
Пары	Злостные (горчак розовый, гумай, вьюнок полевой, свинорой пальчатый)	
Коллекторно-дренажная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный	Опрыскивание сорняко активного роста до зато
Плодовые виноградники	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняко активного роста (при условии защиты ку
Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетиру нежелательной расти рабочей жидкости 200-3

Плодовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание в ф или >5см высотой
Плодовые, виноградники	Многолетние злаковые и двудольные	>4-5 листьев или >1
Зерновые	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание в фазе >5см высотой , злаковые>4-5 листье высотой
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание в фазе >5см высотой, многолет 5 листьев или >10см вы
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых	Многолетние злаковые и двудольные	
Пары	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные	
Обьекты города (села): парки, скверы, бульвары, трамвайные и железнодорожные пути,санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание меж приствольных кругов ве
Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур	Многолетние злаковые и двудольные	>4-5 листьев или >1
Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур	Однолетние, злаковые и двудольные	Опрыскивание в фазе >5см высотой
Плодовые, виноградники	Однолетние, злаковые и двудольные	Опрыскивание в фазе >5см высотой
Плодовые, виноградники	Многолетние злаковые и двудольные	>4-5 листьев или >1
Поля, предназначенные под посев различных культур (овощные, технические. масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)	Многолетние злаковые и двудольные	>4-5 листьев или >1
	Однолетние, злаковые и двудольные	Опрыскивание в фазе >5см высотой
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, изгородь и т.д.)	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание в фазе >5см высотой, многолет 5 листьев или >10см вы

Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов побурения корзинок семян не более 30%). жидкости при авиацион 50-100л/га.
Соя	Десикация	Опрыскивание посевов побурения бобов ниж ярусов (при влажности 30%), не менее чем за урожая. Расход рабоч наземном опрыскивани при авиационной обраб
Зерновые культуры		Опрыскивание посевов уборки (при влажности 30%). Расход рабоче наземном опрыскива при авиационной обраб
Рапс		Опрыскивание посев естественного соз побурении 70-75% влажноти семян 2 рабочей жидкости опрыскивании-100-200 авиационной обработке
Горох		Опрыскивание посевов уборки при влажности Расход рабочей жидкос опрыскивании -100 авиационной обработке
Поля, предназнаяенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многлетние злаковые двудольные сорняки	Опрыскивание вегетир весной

Плодовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков весной или ле защиты культуры)
	Многолетние злаковые и двудольные	
Зерновые культуры	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посе до уборки (при влаж более 30 %) для подсу частичного подавления
Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их ак

Поля, предназначенные под посев яровых зерновых	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков осенью, в период
	Многолетние злаковые и двудольные	
Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорн активного роста
	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание послеуборочный период
Объекты города (села): парки, скверы, бульвары, железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. объекты	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание сорняков и растительности
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других культур	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в конце лет послеуборочный пе рабочей жидкости 200-3
	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	
	Злостные многолетние двудольные и злаковые сорняки, в т.ч. свинорой, вьюнок полевой, горчак ползучий и др.	
Плодовые, ввиноградники	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков весной или ле защиты культуры)
	Многолетние злаковые и двудольные	
Зерновые культуры	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посе до уборки (при влаж более 30 %) для подсу частичного подавления

Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их ак
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков осенью, в период
	Многолетние злаковые и двудольные	
Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорн активного роста
	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание послеуборочный период
Объекты города (села): парки, скверы, бульвары, железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. объекты	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание сорняков и растительности

Свекла сахарная, столовая, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание пос настоящих листьев кул фазах роста (2-4 листа)
Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Последовательное посевов в стадии семя (по первой, второй и -(3)
		Последовательное посевов в фазе 2-4 лис первой и вт -(3)
		Опрыскивание пос настоящих листьев ку фазы роста -(3)

жденными рекомендациями по применению

Свекла сахарная, столовая, кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, подмаренник и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание по семядолей сорняков (п и третьей волне, с и дней). Расход рабочей л/га
		Опрыскивание посе листьев сорняков по г третьей волне, с интер Расход рабочей жидкос
		Опрыскивание пос настоящих листьев кул фазы роста сорняков. жидкости – 200 л/га
Сахарная свекла	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые	Трехкратное опрыскива семядолей сорняков; появления новых сорня
		Двухкратное опры фазу 2-4 листьев сор появления новых сорня
		Опрыскивание пос настоящих листьев ку рабочей жидкости 200-
Яровая пшеница, озимая пшеница, ячмень	Однолетние и многолетние (за исключением горчака ползучего) двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к препаратам из группы 2,4-Д, 2М-4Х, сульфонилмочевин	Опрыскивание по кущения в смеси с группы 2,4-Д, сульфони
Обочины дорог		Опрыскивание по кущения в чистом виде
Пшеница, ячмень, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание по начала кущения (3-4 кущения культуры, и ра сорняков. Обрабо проводится ранней вес
Картофель	Однолетние злавовые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков за 2-3 дня массовых всходов куль

Кукуруза, соя, подсолнечник, свекла сахарная и кормовая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почв до всходов культуры

Соя, горох(кроме овощного горошка)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание пос фазы ростасорняков и листьев у культуры. В год применения пшеницу озимую, (устойчивый к имида следующий год- яро пшеницу, ячмень, р кукурузу, сою, горох люцерну, люпин, рапс (устойчивые к имидазо два года-овес, (традиционные сорта и три года-любые ограничений, включая сорта и гибриды р свеклу. Расход рабочей 300л/га (в зависи распылителей).

Подсолнечник на семена и масло, рапс(сорта и гибриды устойчивые имидазолинонам)		Опрыскивание пос фвзы ростасорняков (2 4-5настоящих листьев у В год применения пшеницу озимую, (устойчивый к имида следующий год- яро пшеницу, ячмень, р кукурузу, сою, горох люцерну, люпин, рапс (устойчивые к имидазо два года-овес, (традиционные сорта и три года-любые ограничений, включая сорта и гибриды р свеклу. Расход рабочей 300л/га (в зависи распылителей).

Земли несельскохозяйствен ного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий	Опрыскивание со фазы их роста, в олыннолистной в фаз горчака ползучего в ф
Очаги карантинных сорняков на полосах отчуждения, линий электропередач, трасс нефте- и газопроводов, насыпях железных и шоссейных дорог и др. территоии	Амброзия полыннолистная	Однократное опрыскивание в фа амброзии
Вырубки разной давности при подготовке площадей под лесные культуры, для содействия естественному возобновлению хвойных пород, при реконструкции малоценных молодняков	Все виды сорняков, лиственные и хвойные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, сосна, ель и др.)	Опрыскивание растений и почвы в ию за период выращи саженцев сосны и с корневой системой через месяц после открытой корневой си следующего года
Соя	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание по заделкой), до опрыскивание посево настоящих листьев ку

Соя	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почв заделкой), до всходов и посевов в фазе всходов листьев культуры. В п препарата рекоменду озимую пшеницу на кукурузу, яровые и оз через 2 года все ограничения
Горох на зерно, горох овощной на семена	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание почв дней после посева ил сорняков в фазе 3-6 лис
Люцерна	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные, в том числе повилики	Опрыскивание пос дней после первого уко

жденными рекомендациями по применению

Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные	Опрыскивание посе листьев культуры (ран сорняков)

Чеснок озимый		Опрыскивание посе
Чеснок из воздушных луковиц		листьев культуры

Соя	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч виды амброзии	Опрыскивание сорняков в ранние фаз злаки- до 2-3 листьев, д 6 листьев), независи развития культуры, одн

+ антидот мефенпир-диэтил

Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные	Опырскивание вегетирующим сорняка (независмо от культуры)

Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, лук, морковь, капуста, томаты рассадные и посевные, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники)	Опрыскивание посе листьев сорняков, неза развития культуры
	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посе сорняков 10-15 см, неза развития культуры

Виноград	Бермудская трава, трава Джонсона	Опрыскивание посе сорняков (Бермудская трава Джонсона на стад
Томат	Трава Джонсона, ежовник обыкновенный, просо	Опрыскивание посе листьев сорняков, при в 20см
Подсолнечник	Трава Джонсона, ежовник обыкновенный, просо, щетенник, алапекурус, мятлик однолетний, костер, дикий ячмень	Опрыскивание посе листьев сорняков
Лук	Бермудская трава, трава Джонсона, щетинник	Опрыскивание посе листьев сорняков, при 20см

Красная чечевица	Дикий овес, лисохвост мышехвостниковидный, дикая пшеница, ячмень обыкновенный, пырей ползучий	Опрыскивание посе листьев сорняков, при 8-12см
Сахарная свекла	Дикий овес, ежовник обыкновенный, алапекурус, костер	Низкая дозировка сорняков, высокая многолетних
Хлопок	Трава Джонсона	
Соевые бобы	Ежовник обыкновенный, библус, трава Джонсона, Бермудская трава, алапекурус, канареечник	Послевсходовое фазе 3-6 листьев сорня

Пшеница яровая	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов культуры до выход
Кукуруза		Опрыскивание посев листьев куль
Свекла сахарная		Опрыскивание посево настоящих листьев
Лен-долгунец	Виды осота	Опрыскивание посевов культуры при фазе розе
Капуста белокачанаая	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание растени рассады
Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы)	Опрыскивание вегетир после сбора ур
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посев листьев куль

Райграс однолетний	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы)	Опрыскивание посевов культуры
Рис	Однолетние злаковые(просовидные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры и сорняков. Расход рабо 200-300 л/га
Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (овсюг)	Опрыскивание по фазы роста сорняков (3-4 листа)

Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые: овсюг (виды)	Опрыскивание посл листьев овсюга незав развития культуры
	Однолетние злаковые: щетинник (виды)	Опрыскивание посл от фазы развития культ
	Просо куриное и другие злаковые сорняки	Опрыскивание появлении массовых в независимо от фазы ра
Пшеница озимая, яровая	Овсюг	Опрыскивание посл листьев овсюга незав развития культуры
	Однолетние злаковые (просо куриное, щетинники)	Опрыскивание появлении массовых в независимо от фазы ра

Пшеница яровая и озимая	Овсюг	Опрыскивание пос ранние фазы роста (2-3 независимо от фазы ра
	Щетинники	
	Просянка	
Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание поч культуры или в фаз листьев
Сахарная свекла		Опрыскивание поч культуры
		Опрыскивание поч культуры в баковой сме Дуал Голд , КЭ (1,3л/га жидкости 200-300л/га
Морковь		Опрыскивание поч культуры как в чистом составе баковой смес Рейсер, КЭ (2л/га).
Рапс озимый и яровой		Опрыскивание поч культуры
Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание по семядолей сорняков пер
		Опрыскивание по семядолей сорняков вто
		Опрыскивание последовательно в с сорняков первой и второ

		Опрыскивание посе листьев культуры
	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые. Все виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание по семядолей сорняков смеси с 1,5 л/га Бифор
		Опрыскивание по семядолей сорняков смеси с 1,5 л/га Бифор
		Опрыскивание последовательно в с сорняков первой и втор с 1,5 л/га Бифор Экспер
		Опрыскивание пос листьев культуры в сме Эксперт
Рапс яровой	Все виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посе настоящих листьев куль
Лен-долгунец	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание по «елочки» и в фа многолетних двудольны
	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное)	
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, просо	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание по кущения культуры до вы
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры
Свекла сахарная		Опрыскивание посе пар настоящих листьев
Лен-долгунец	Виды осота	Опрыскивание по «елочки» культуры при сорняков
Капуста белокочанная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание с высадки рассады
Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы)	Опрыскивание сорняков после сбора у
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посе листьев культуры
Райграс однолетний	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние	Опрыскивание по кущения культуры

Наперстянка шерстистая 1-го года вегетации	двудольные (ромашка непахучая, горцы)	Опрыскивание посе настоящих листьев куль
Наперстянка шерстистая 2-го года вегетации		Опрыскивание по отрастания культуры
Лаванда	Виды осота, ромашки, гречишки, горца	Опрыскивание пла отрастания культуры
Газоны	Ромашка, осот, гречишка, одуванчик	Опрыскивание по сорнякам после первого
Маклея сердцевидная	Ромашка, осоты, горцы	Опрыскивание пла отрастания культуры
Сахарная свекла	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч все виды осота, бодяка, ромашки, горца	Опрыскивание в настоящих листьев ку раб.жидкости 200-300 л
Газонная трава		Опрыскивание вегетирующим сорняка
Земляника		Опрыскивание с уборки урожая
Капуста белокачанная		Опрыскивание п рассады
Кукуруза		Опрыскивание посе листьев культуры
Свекла сахарная и кормовая	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посе листьев культуры
Капуста белокочанная		Опрыскивание п высадки рассады в грун у многолетних двудольн
Газоны	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, лютик и др.) сорняки	Опрыскивание сорняков через 1-2 дн укоса
Лен-долгунец	Виды осота, бодяка, ромашки . горца	Опрыскивание по «елочки» культуры и многолетних
Лен масличный (на пищевые и технические цели)		двудольных сор рабочей жидкости – 200

Рапс яровой и озимый		Опрыскивание по начиная с фазы 3-4 появления цветочны культуры. Расход рабо 200-300 л/га

жденными рекомендациями по применению

Свекла сахарная,столовая, кормовая, картофель, морковь, лук, лен, соя	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посе листьев у сорняков нез развития культуры
		Опрыскивание посе пырея 10-20см незав развития культуры
Свекла сахарная, кормовая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе листьев – кущения сорн
	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе сорняков 10-15см

+мефенпир-диэтил (антидот)

жденными рекомендациями по применению

Свекла сахарная, столовая и кормовая	Однолетние двудольные	Опрыскивание вегетации.Трехкратное
	Однолетние двудольные	Опрыскивание в пе Двухкратное опрыскива
Сахарная свекла, кормовая, столовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе сорнякам (в фазе двудольных и первого л с последующей обрабо дней при повторн сорняков. Расход раб 200-300 л/га
		Опрыскивание посе сорняков в смеси с 1,5 Экспресс АМ, КЭ или е фазе семядолей у первого листа у злако последующей обработ дней при повторн сорняков. Расход раб 200-300 л/га

Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание поч рассады
		Опрыскивание посе листьев культуры
		Опрыскивание сорн дней после высадки рас
Картофель		Опрыскивание поч культуры
		Опрыскивание поч культуры с последую при высоте ботвы 5 см
Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)		Опрыскивание поч до начала отрастания к
		Опрыскивание посе культуры 10-15 см
Роза эфиромасличная (насаждение 1-2 года вегетации и плодоносящие)		Ранневесеннее опрыскивание почвы р вегетации культуры

Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Двукратное вегетирующих сорняк культуры с последую при высоте ботвы 5 см
		Опрыскивание при см
Томаты безрассадные	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание последовательно в ф культуры и в фазе 2-4 л
		Опрыскивание посе листьев культуры
Томаты рассадные		Опрыскивание сорн дней после высадки рас
Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание куль культуры с последую при высоте ботвы 5см
Томаты		Опрыскивание поч рассады
		Опрыскиванеи посе листьев культуры
		Опрыскиваниес сор 20 дней после высадки
Роза эфиромасличная (насаждение 1-2 года вегетации и плодоносящие)		Ранневесеннее опрыскивание почвы ра вегетации культуры
Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)		Опрыскивание почв до начала отрастания к
		Опрыскивание посе культуры 10-15 см

Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание поч культуры
		Опрыскивание поч культуры с последую при высоте ботвы 5 см.
		Опрыскивание при см
Томаты	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание поч рассады
		Опрыскивание в с культуры
		Опрыскивание чер после высадки рассады
Томаты (рассадные)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание поч рассады. Расход рабо 200-300 л/га
		Опрыскивание сорн дней после высадки р Расход рабочей жидкос
Томаты (посевные)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры. Р жидкости – 200-300 л/га
		Опрыскивание последовательно в ф листьев культуры. Р жидкости – 200-300 л/га
Картофель (кроме раннелетнего использования)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание поч культуры. Расход рабо 200-300 л/га
		Опрыскивание поч культуры с последую при высоте ботвы 5 см жидкости – 200-300 л/га
Картофель (кроме раннелетнего использования)		Опрыскивание по высоте культуры до рабочей жидкости – 200

Соя		Опрыскивание поч культуры. Расход раб 200-300 л/га
Кукуруза на зерно		
		Опрыскивание до в и повторно в фазе 3-4 л Расход рабочей жидкос
Эхинацея пурпурная Картофель (кроме раннелетнего использования)		Опрыскивание поч культуры. Расход раб 200-300 л/га
Картофель (кроме раннелетнего использования)		Опрыскивание поч культуры. Расход рабо л/100 м^2
		Опрыскивание поч культуры с последую при высоте ботвы 5 см жидкости 3 л/100 м^2 + 9 л/300 м^2
Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков последовател листьев культуры и в с культуры. Расход раб 200-400 л/га.
		Опрыскивание сорняков в фазе 2-4 л Расход рабочей жидкос
Томат рассадный		Опрыскивание сорняков через 15-2 высадки рассады в рабочей жидкости-500л
Картофель (кроме раннеспелого)		Опрыскивание сорняков до всходо последующей обработ ботвы 5 см. Расход ра 200-300 л/га.
		Опрыскивание сорняков при высоте бо рабочей жидкости-200-3
Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почв до всходов культуры
		Двухкратное опрыс до всходов; второе-в с

		культуры
		Опрыскивание в ф культуры
Горох, горох овощной	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почв до всходов культуры
Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание поч культуры
		Опрыскивание по высоте картофеля до 5
		Двухкратное опрыс до всходов; второе по высоте картофеля до 5
Люпин узколистный	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почв до всходов
Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание отрастания культуры
	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посе люцерны 10-15 см
Томат	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание поч рассады
		Опрыскивание посе листьев культуры
		Опрыскивание сорн дней после высадки рас
Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание поч культуры. Расход раб 200-300 л/га
		Опрыскивание поч культуры с последую при высоте ботвы 5см. жидкости-200-300 л/га
		Опрыскивание при 5см. Расход рабочей ж л/га
Томат (рассадный)		Опрыскивание поч Расход рабочей жидкос
		Опрыскивание сорн дней после высадки р рабочей жидкости-200-3
Томат (посевной)		Опрыскивание посе листьев культуры. Р

		жидкости-200-300 л/га
		Опрыскивание последовательно в ф листьев культуры. Р жидкости-200-300 л/га
Соя		Опрыскивание поч культуры. Расход рабоч 300 л/га
Пшеница, ячмень, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание пос фазе кущения культуры роста однолетних сорня многолетних в фазе роз ограничения по се следующий год после нельзя высевать свек подсолнечник и гречих глубокой вспашки. Н подсолнечник и гречих год, если Рн почвы вы была продолжительн применения препарата культур. При необходи обработанных гербиц высевать только яр Расход рабочей жидкос

жденными рекомендациями по применению

Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание по кущения культуры до вы
Рис	Клубнекамыш, частуха и др. двудольные	Опрыскивание по полного кущения культу
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание по кущения культуры до вы
Рис	Клубнекамыш, частуха и др. двудольные	Опрыскивание по полного кущения культу

жденными рекомендациями по применению

Рис	Клубнекамыш,монохория, частуха и другие сорняки бототной группы	Опрыскивание по кущения и начала трубк
		Опрыскивание по кущения культуры в ф Базаграна
		Опрыскивание по кущения культуры в ф Базаграна М

Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков (2-6 листьев при высоте 10-20 см у м
		Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков (2-6 листьев при высоте 10-20 см у м
Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков (2-6 листьев при высоте 10-20 см у м
		Опрыскивание посе листьев культуры и ра сорняков (2-6 листьев при высоте 10-20 см у м

жденными рекомендациями по применению

Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры при ползучего 10-15 см, в ф однолетних дву-дольн сорняков с добавление Адью, Ж (900 изодецилового спирта). жидкости – 200-300 л/га
Лук(всех генераций, кроме лука на перо) Чеснок	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры
		Опрыскивание посе листьев культуры

Подсолнечник		Опрыскивание поч культуры
Лук(всех генераций, кроме лука на перо) Чеснок	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание пос листьев культуры
		Опрыскивание пос листьев культуры
Подсолнечник		Опрыскивание поч культуры
Подсолнечник	Злаковые сорняки	Следует применять недели после посева сорняков
Лук	Широколиственные сорняки	Перед пересадкой листьев лука
Подсолнечник	Однолетние двудольные	Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		Опрыскивание пос листьев культуры
То же		Опрыскивание фазе3настоящих листь
Яблоня(сильно и среднерослые подвои)		Опрыскивание весн сорняков высотой 10-1 защиты культуры

Подсолнечник	Однолетние двудольные	Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		Опрыскивание пос листьев культуры
То же		Опрыскивание фазе3настоящих листь
Яблоня(сильно и среднерослые подвои)		Опрыскивание весн сорняков высотой 10-1 защиты культуры
Подсолнечник	Однолетние двудольные	Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		Опрыскивание пос листьев культуры
То же		Опрыскивание фазе3настоящих листь
Яблоня(сильно и среднерослые подвои)		Опрыскивание весн сорняков высотой 10-1 защиты культуры
Подсолнечник	Однолетние двудольные	Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		Опрыскивание пос

		листьев культуры
То же		Опрыскивание фазе3настоящих листь
Яблоня(сильно и среднерослые подвои)		Опрыскивание весн сорняков высотой 10-1 защиты культуры

Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание поч после посева, до поя культуры или до выс зависимости от сферы и
Кукуруза		
Подсолнечник, соя, капуста рассадная, морковь, чеснок, томаты, картофель		
Петрушка корневая		
Лук всех генераций		
Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почв посева или в течение посева
Кукуруза, соя, хлопчатник, подсолнечник, табак, томаты рассадные, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание поч культуры или до высадк
Томаты посевные		Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		

Картофель		Опрыскивание почв всходов культуры (по окучивания)
Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почв до появления всходов к
Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почв посева или в течение посева
Кукуруза, соя, подсолнечник, табак, томаты рассадные, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание поч культуры или до высадк
Томаты посевные		Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		
Петрушка корневая		Опрыскивание поч культуры в течение д посева
Картофель		Опрыскивание почв всходов культуры (по окучивания)
Хмель		Опрыскивание почв главных корневищ культуры
Кориандр, анис		Опрыскивание поч высадки рассады

Лаванда		Опрыскивание почв культуры
Полынь лимонная		
Мята перечная		Опрыскивание почв до всходов культуры
Герань		Опрыскивание почв (с немедленной посадки культуры
Шалфей мускатный		Опрыскивание поч листьев культуры
Шалфей лекарственный		Опрыскивание плантаций в период на культуры
Ромашка далматская		Опрыскивание пос отрастания культуры
Валериана лекарственная 1-го года вегетации		Опрысккивание поч всходов культуры. поизводится на втором
Пшеница	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почв до появления всходов к
Кукуруза, соя, подсолнечник, табак, томаты рассадные, морковь, чеснок		Опрыскивание поч культуры или до высадк
Томаты посевные		Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		
Картофель		Опрыскивание почв всходов культуры (по окучивания)
Лекарственные травы		Опрыскивание до высадки рассады
Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почв до появления всходов к
Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почв посева или в течение посева
Кукуруза, соя, подсолнечник, табак, томаты рассадные, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание поч культуры или до высадки
Томат посевной		Опрыскивание поч

Лук всех генераций		культуры
Петрушка корневая		Опрыскивание поч культуры в течение 2 дн
Картофель		Опрыскивание почв всходов культуры (по окучивания)
Хмель		Опрыскивание почв главных корневищ культуры
Кориандр, анис		Опрыскивание поч высадки рассады
Лаванда		Опрыскивание поч высадки
Полынь лимонная		Опрыскивание почв культуры
Мята перечная		Опрыскивание почв до всходов культуры
Герань		Опрыскивание немедленной заделко культуры
Шалфей мускатный		Опрыскивание поч листьев культуры
Шалфей лекарственный		Опрыскивание плантаций в период на культуры
Ромашка далматская		Опрыскивание пос отрастания культуры
Валериана лекарственная 1-го года вегетации		Опрыскивание почв всходов культуры. производится на втором
Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почв до появления всходов к
Рис (при глубокей заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почв посева или в течение посева
Кукуруза, соя, подсолнечник, табак, томат рассадный, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание поч культуры или до высадк
Томат посевной		Опрыскивание поч культуры
Лук всех генерации		

Петрушка корневая		Опрыскивание поч культуры в течение 2 дн
Картофель		Опрыскивание почв всходов культуры (после последнего
Хмель		Опрыскивание почв главных корневищ культуры
Кориандр, анис		Опрыскивание поч высадки рассады
Лаванда		Опрыскивание почв культуры
Полынь лимонная		Опрыскивание почв культуры
Мята перечная		Опрыскивание почв до всходов культуры
Герань		Опрыскивание немедленной заделко культуры
Шалфей мускатный		Опрыскивание поч листьев культуры
Шалфей лекарственный		Опрыскивание плантаций в период на культуры
Ромашка далматская		Опрыскивание пос отрастания культуры
Валериана лекарственная 1-го года вегетации		Опрыскивание почв всходов культуры. производится на втором

Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почв до появления всходов к
Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почв посева или в течение посева
Кукуруза, соя, подсолнечник,табак, тома т рассадный, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание поч культуры или до высадк
Томат посевной		Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		Опрыскивание поч культуры

Петрушка корневая		Опрыскивание поч культуры в течение 2 дн
Картофель		Опрыскивание почв всходов культуры (после последнего с
Хмель		Опрыскивание почв главных корневищ культуры
Кориандр, анис		Опрыскивание поч высадки рассады
Лаванда		Опрыскивания почв культуры
Полынь лимонная		Опрыскивание почв культуры
Мята перечная		Опрыскивания почв до всходов культуры
Герань		Опрыскивание немедленной заделко культуры
Шалфей мускатный		Опрыскивание поч листьев культуры
Щалфей лекарственный		Опрыскивание плантаций в период на культуры
Ромашка далматская		Опрыскивание пос отрастания культуры
Валериана лекарственная 1-го года вегетации		Опрыскивание почв всходов культуры. производится на втором
Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание поч после посева, до поя культуры или до выс зависимости от сферы
Кукуруза		
Подсолнечник, соя, капуста рассадная, морковь, чеснок, томаты, картофель		
Петрушка корневая		
Лук всех генераций		
Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание поч культуры
Подсолнечник		Опрыскивание поч культуры или до высадк

Капуста (кроме раннеспелых и среднеспелых сортов)		Опрыскивание поч культуры или до высадк
Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почв до появления всходов к
Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почв посева или в течение посева
Кукуруза, соя, подсолнечник,табак, тома т рассадный, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание поч культуры или до высадк
Томат посевной		Опрыскивание поч культуры
Лук всех генераций		Опрыскивание поч культуры
Петрушка корневая		Опрыскивание поч культуры в течение 2 дн
Картофель		Опрыскивание почв всходов культуры (после последнего о
Хмель		Опрыскивание почв главных корневищ культуры
Кориандр, анис		Опрыскивание поч высадки рассады
Лаванда		Опрыскивания почв культуры
Полынь лимонная		Опрыскивание почв культуры
Мята перечная		Опрыскивания почв до всходов культуры
Герань		Опрыскивание немедленной заделко культуры
Шалфей мускатный		Опрыскивание поч листьев культуры
Щалфей лекарственный		Опрыскивание плантаций в период на культуры

Ромашка далматская		Опрыскивание пос отрастания культуры
Валериана лекарственная 1-го года вегетации		Опрыскивание почв всходов культуры. производится на втором
Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, куриное просо,просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост и др.)	Опрыскивание по начиная с фазы 2 ли кущения однолетних зла (независимо от культуры). Расход ра 200-300 л/га
Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, куриное просо, просо сорнополевое, овсюг и др.)	Опрыскивание пос фазы 2 листьев до однолетних злаковых со (независимо от культуры). Расход ра 200-300 л/га
Рис	Однолетние (просовидные) и многолетние злаковые (клубнекамыш).	Опрыскивание сорн листа кущение у злаков 7 листьев у клубнекам почве, или по рисовым см воды. Перед каж слить воду с че затопление чеков ме через 6 часов по обработки
Рис	Однолетние (просовидные) и многолетние злаковые (клубнекамыш).	Опрыскивание сорн листа кущение у злаков 7 листьев у клубнекам почве, или по рисовым см воды. Перед каж

		слить воду с че затопление чеков м через 6 часов по обработки
Рис	Однолетние (просовидные) и многолетние злаковые (клубнекамыш).	Опрыскивание сорн листа кущение у злаков 7 листьев у клубнекам почве, или по рисовым см воды. Перед каж слить воду с че затопление чеков м через 6 часов по обработки

Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	До посева, одновре или до всходов
Смешанные посевы кукурузы с подсолнечником		
Горох на зерно, соя, чеснок		До посева
Фасоль		За 2-3 дня до всход
Картофель		До всходов, реал разрешается не ранее, После обработки
Морковь		До посева, до всход 2 настоящих листьев
Сельдерей, укроп, петрушка		По всходам
Петрушка		До всходов
Чечевица		До посева или до всходов
Бобы кормовые		До всходов
Хлопчатник	***Однолетние двудольные и злаковые сорняки***	***Опрыскивание посева или***

		культуры
Подсолнечник		***Опрыскивание посева, одновреме или до всходов кул***
Горох на зерно, соя, чеснок		***Однолетние д злаковые сорняки***
Фасоль		***Опрыскивание дня до появле культуры***
Картофель		***Опрыскивание всходов культуры***
Морковь		***Опрыскивание посева, до всход или в фазе 1-2 листьев***
Сельдерей, укроп ,петрушка		***Опрыскивание всхода культуры***
Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание поч
Смешанные посевы кукурузы с подсолнечником		одновременно с посево культуры
Подсолнечник		
Горох на зерно, соя		Опрыскивание поч
Чеснок		культуры
Фасоль		Опрыскивание почв всходов культуры
Картофель		Опрыскивание поч культуры, реализа разрешается не ране месяца после обработк
Морковь		Опрыскивание почв всходов культуры, ил настоящих листьев корнеплодов разрешае через 4 месяцев после
Сельдерей, укроп, петрушка		Опрыскивание посе культуры
Петрушка		Опрыскивание поч

		культуры (в течение посева)
Чечевица		Опрыскивание почв заделкой) или до всход
Бобы кормовые		Опрыскивание поч культуры
Бобы кормовые		Опрыскивание поч культуры
Морковь	Однолетние двудольные злаковые сорняки	Опрыскивание почв всходов культуры или 1-2 настоящих листьев.
Горох (зерно),чеснок		Опрыскивание поч культуры. Расход раб 200-300 л/га.
Соя		
Картофель		
Чина, кормовые		Опрыскивание почв появления всходов ку рабочей жидкости- 200-
Фасоль		
Петрушка (для зелени), сельдерей		Опрыскивание поч культуры или посево настоящих листьев ку рабочей жидкости- 200-
Кукуруза с посевом подсолнечника		Опрыскивание поч одновременно с посево культуры
Подсолнечник		
Кориандр		Опрыскивание поч культуры или посево настоящих листьев куль
Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание поч культуры. Расход раб 200-300 л/га
Картофель (кроме раннего)		
Кукуруза (на зерно)		Опрыскивание поч одновременно с посево

		культуры. Расход рабо 200-300 л/га
Подсолнечник		Опрыскивание почв с посевом или до вс Расход рабочей жидкос
Морковь (за исключением пучкового товара)		Опрыскивание почв всходов культуры ил посевов в фазе одного листьев культуры. Р жидкости – 200-300 л/га
Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почв до всходов культуры
Подсолнечник, кукуруза		Опрыскивание поч одновременно с посево культуры
Горох на зерно, соя, чеснок		Опрыскивание почв до всходов культуры
Фасоль		Опрыскивание почв появления всходов куль
Картофель		Опрыскивание поч культуры. Реализа разрешается не ране месяца после обработк
Морковь		Опрыскивание поч культуры. Реализаци разрешается не ране месяца после обработк
Бобы кормовые		Опрыскивание почв до всходов культуры
Нут		Опрыскивание поч культуры
Свекла сахарная	Повилика	Опрыскивание посе пар настоящих листьев
Люцерна (семенные посевы)		Опрыскивание посе пар настоящих листье рядков культуры
Клевер, люцерна (старовозрастные посевы)	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посе в период покоя до на культуры или поздней о

Кукуруза	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посе листьев культуры и в кущения однолетних зл многолетних злаковых см и в фазе розетки осо
Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание п окучивания, в ранние ф 4 листа) однолетних высоте пырея 10-15 см.
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посе листьев культуры и сорняков в вмеси с Расход рабочей жидкос

	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посе листьев культуры. Дву опрыскивание по пе «волне» сорняков в АДЬЮ,Ж. Расход раб 200-300л/га
Картофель	Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание п окучивания, в ранние ф 4листа) однолетних с высоте пырея ползуч смеси с 200мл/га ПАВ рабочей жидкости -200-
	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Однолетних сорня пырея ползучего 10-1 200мл/га ПАВ АДЬ рабочей жидкости-200-
Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание пос листьев культурыи и ра сорняков в смеси с АДЬЮ,Ж. Расход раб 200-300л/га.
		Опрыскивание по 3листьев культуры и ра сорняков первой «волн обработкой по второй растений сорняков в с ПАВ АДЬЮ,Ж. Расход р -200-300л/га
Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание поса дней после высадки ра ранние фазы роста сор 200мл/га ПАВ АДЬЮ,Ж жидкости -200-300л/га
		Опрыскивание поса дней после высадки ра повторной обработко 2волне» сорных растен мл/га ПАВ АДЬЮ,Ж. жидкости -200-300 л/га
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов листьев культуры и в ра листа) роста сорняков в мл/га ТРЕНД® 90. Расхо жидкости — 200–300 л/г

	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание посевов листьев культуры и при многолетних злаковых с см и в ранние фазы рос сорняков в смеси с 200 ТРЕНД® 90. Расход раб 200–300 л/га

Подсолнечник, кукуруза, соя, рапс, яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почв до всходов культуры
Подсолнечник		Опрыскивание почв всходов культуры, или культуры до 3-го листа
Свекла сахарная, столовая		Опрыскивание почв до всходов культуры средней засоренности
Кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание до всходов культуры
Соя		
Подсолнечник		
Сахарная свекла		
Хлопчатник		

Картофель	Однолетние злавовые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание поч культуры. В засушл рекомендуется мел препарата (на глубину
Томаты		Внесение препара рассады культуры. условиях рекомендуетс препарата (на глубину
Капуста		Внесение препара рассады культуры. условиях рекомендуетс препарата (на глубину н
Сафлор		Опрыскивание до всходов культуры
Сахарная свекла		
Подсолнечник, хлопчатник, соя, кукуруза, рапс		

Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов листьев — кущения кул фазы роста сорняков с д мл/га Тренд 90 (особенн жарких условиях приме рабочей жидкости — 20 авиаобработке — 25-50
		Опрыскивание по выхода в трубку (1 культуры и в ранни сорняков с добавлен ТРЕНД® 90 (особенно условиях применения) необходимости, если п не позволили пров раньше этого срока, в флагового листа культ прорастании многолет видов. Расход рабочей 300 л/га, при авиаобр л/га
Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	

Лук, картофель, соя, сахарная свекла, хлопчатник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посе листьев-кущения сорня
	Многолетние злаковые сорняки	

		от фазы роста культуры
Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посе листьев до появления Норма расхода жидкост
	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание по кущения культуры (ози появления флагового расхода жидкости 300л/
Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен
Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен
Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен

Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, бодяк полевой	Опрыскивание по кущения культуры – ви листа и ранние фазы роста сорняков – листа, бодяк полевой – Расход робочей жидкос
Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен
Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен
Пшеница озимая, яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2,4Д	Опрыскивание пос 3листьев-начала куше рание фазы роста со весной.
	Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2,4Д и бодяк полевой	Опрыскивание по кушения культуры и ра сорняков. Озимые-весн
Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен
Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посе листьев до появления Норма расхода жидкост
	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание по кущения культуры (ози появления флагового расхода жидкости 300л/

Пшеница, ячмень	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание по кущения культуры (ози появления флагового расхода жидкости 300л/
Пшеница, ячмень		
Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе листьев - начала кущен

Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные, в т.ч устойчивыке к 2,4-д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание по кущения-фазу формир междоузлия культуры роста сорняков. Оз обрабатываются необходимости пересе площадей можно в зерновые культуры. жидкости -200-300л/га
		Опрыскивание по кущения культуры и ра сорняков в смеси с Озимые культуры весной. .При необходи обработанных плош высевать только зер Расход рабочей жидко при авиаприменении-25
Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание по формирования второ культуры и ранние фаз в смеси с ПАВ необходимости пересе площадей можно в зерновые культуры. жидкости -200-3 авиаприменении-25-50л

Овес		Опрыскивание по кущения культуры – второго междоузлия ку чувствительности сор фазы роста со необходимости пересе площадей можно в зерновые Расход рабочей жидкос при авиаприменении – 2
Лук	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры
Подсолнечник		Опрыскивание поч культуры
Сахарная свекла	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание по сорняков семядоли-2 на при необходимости пов дней по второй волне с настоящих листьев в с Тренд 90, Ж. Расход ра 200-300 л/га
	Однолетние двудольные, в т.ч. марь белая, щирица жминдовидная, сорняки	Опрыскивание по сорняков семядоли-2 на при необходимости пов дней по второй волне с настоящих листьев в с препаратов на основ фенмедифама и 200 мл Расход рабочей жидкос

Соя, горох. Подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе листьев сорняков (неза развития культуры). посевов при высоте пыр 15см(независимо от культуры).
	Многолетние злаковые	
Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание при картофеля 10-15 см, (ф сорняков)
	Пырей ползучий	Опрыскивание при картофеля и пырея 10-
	Многолетние злаковые при сильной засоренности	
Лук	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе листьев у сорняков
	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание при 15 см
	Многолетние злаковые при сильной засоренности	
Хлопчатник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе настоящих листьев у со
	Многолетние злаковые	

Ячмень	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в культуры
Пшеница яровая	Однолетние двудольные сорняки Многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание от ф фазы флагового листа появления вьюнка поле
Лук	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в настоящих листьев куль
Мак		Опрыскивание в фа листков культуры

Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки Многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе листьев культуры
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолктние и многолетние двудольные сорняки, а также некоторые корнеотпрысковые сорняки	Опрыскивание по кущения до выхода в тр

Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, гречиха вьюнковая, вьюнок полевой	Опрыскивание по кущения культуры и ра сорняков. Озимые весной. Расход рабочей 300 л/га, при авиацион 25- 50 л/га
		Опрыскивание посе трубкования (виден стебля) культуры (по вьюнка полевого обрабатывают весной. жидкости – 200-30 авиационной обработке
Лук (кроме лука на перо)	Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорняки, в.т.ч. подмаренник цепкий, гречиха вьюнковая, вьюнок полевой	Опрыскивание в ф культуры. Расход рабо 200-300 л/га

Свекла сахарная, столовая, кормовая, морковь, соя, подсолнечник, рапс, капуста белокочанная средне- и позднеспелых сортов, лук всех	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до (независимо от ф культуры)
генераций, горох	Многолетние злаковые	

Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание в развития (2-3 ли независимо от фазы ра

	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до (независимо от ф культуры)
Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная, мятлик)	Опрыскивание пос вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до (независимо от развити

Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до (независимо от ф культуры)
Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная)	Опрыскивание пос вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до (независимо от ф культуры)
Ячмень яровой		Опрыскивание вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до ко фазе кущения культуры)
Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, метлица обыкновенная, мятлик)	Опрыскивание пос вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до (независимо от ф культуры).
Пшеница яровая Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание вегетирующим сорняк фазы 2 листьев до (независимо от ф культуры).
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание пос фазы развития (2-3 независимо от фазы ра Озимая пшеница весной. Расход рабочей 200 при авиационной обраб
Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, просо куриное, щетинник зеленый)	Опрыскивание вегетирующим сорняк фазы 2-го листа до независимо от фазы ра
Пшеница яровая, озимая	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующим сорняк

Ячмень яровой		фазы 2-го листа до конц
Свёкла сахарная, столовая* и кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаки	Опрыскивание пос семядолей у сорняков волне)

		Опрыскивание посе листьев у сорняков (по
		Опрыскивание пос настоящих листьев ку фазы роста сорняков
Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание почв до всходов культуры
		Опрыскивание посе второй волне сорн семядолей независи развития культуры (обработками 10-15 дне
Пшеница	Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посе
Пшеница, ячмень, овес, рожь		Опрыскивание пос листьев
		Опрыскивание посе дней до посева или 3-4

Пшеница		
Свекла (сахарная, столовая, кормовая), морковь, капуста белокочанная, соя, лук всех генераций (кроме лука на перо), под-солнечник, рапс яровой и озимый, картофель	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посе листьев сорняков. Р раствора - 200-300 л/га
	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание посе пырея 10-15 см. Р раствора - 200-300 л/га
Лук на перо	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посе листьев сорняков. Р раствора - 200-300 л/га
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посе пырея 10-15 см. Р раствора - 200-300 л/га
Лен-долгунец	Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посе листьев однолетних высоте пырея ползуче фазе “елочки” кул рабочего раствора - 200
Горох (на зерно)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов листьев у сорняков. Рас раствора - 200-300 л/га
Лен масличный	Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов листьев однолетних сор высоте пырея ползучего фазе «елочки» льна). Р жидкости – 200 – 300 л/
Картофель, капуста белокочанная, лук (всех генераций)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в фазе 2-4 лис Расход рабочей жид 5 л/100 м^2
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание сорняков при высоте 1 рабочей жидкости – 5 л/100 м^2
Свекла сахарная, подсолнечник, соя	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фа сорняков

	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посе сорняков 10 – 15 см
Картофель	Однолетние и многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посе листьев у однолетних листьев у однолетних 15 см у пырея ползучего
Морковь, капуста белокочанная, лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе листьев у сорняков
Томаты		Опрыскивание посе настоящих листьев куль
огурцы		Опрыскивание посе настоящих листьев ку рабочей жидкости 200-3
Хлопчатник	Однолетние и многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание по «елочки» (при высоте 10-15 см)
Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе листьев культуры
	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе листьев культуры
Свекла сахарная, картофель, капуста, лук, хлопчатник	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе листьев до стеблевания
Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые	Опрыскивание сорняков перед посевом
	Многолетние злаковые	
Лен	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе 3 листьев до стеблеван
	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе 3 листьев до стеблеван

жденными рекомендациями по применению

жденными рекомендациями по применению

Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание пос побурения корзинок
Соя		Опрыскивание побурении 50-70% боб
Картофель	Сеникация культурных растений и подавление сорняков	Опрыскивание до в поспевания культуры
Картофель	Десикация	Опрыскивание формирования клубне кожуры
Подсолнечник	Подсушивание культуры и частичное уничтожение сорняков	Опрыскивание в корзин, в т.ч. авиаметод
Зерновые		За 2 недели до убо зерна не более 30:%
Горох		В период пож стручков, при влажност
Соя		В фазе начала нижнего и среднего яру зерна не более 35-40%
Рапс		При побурении культуры
Лен		В фазе ранней культуры
Картофель		За 10дней до уборк
Бобы кормовые(семенные посевы)		В период пожелтен бобов

Сорго (семенные посевы)		В период восковой при влажности зерна не
Хлопчатник средневолокнистых сортов	Дефолияция	Опрыскивание раскрытии 40-45% коро
Хлопчатник	Дефолиация	Опрыскивание раскрытии 40 - 45 % кор

торы роста растений

ид					
Р (0,025 г/л) ПП «НЭСТ М», сия 21/12/16	1 мл/0.25 л воды (Л)	Картофель	Улучшение клубнеобразования, повышение урожайности и пищевой (питательной) ценности клубней, стимулирование иммунной системы, повышебние устойчивости к фитофторозу, снижение	Предпосевная обработка клубней. Расход-0,25 л/50кг	
	1 мл/5 л воды (Л)			Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход – 3л /100м^2	- (1)

		аккумуляции нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов		
0.5 мл/2л воды (Л)	Томаты открытого грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2 часа. Расход –2л/кг	- (-)
1мл/5 л воды (Л)		Увеличение количества завязей, предотвращение их опадения, ускорение созревания плодов и улучшения их качества, повышение устойчивости к заболеваниям, фунгипротекторное действие, снижение аккумуляции радионуклидов, нитратов, солей тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе бутонизации - начала цветения 1-й кисти. Расход –3-4 л/100м^2	

	0,5 мл/5 л воды (Л)	Томаты защищенного грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2 часа. Расход – 2 л/кг	- (-)
	1 мл/5 л воды (Л)		Увеличение количества завязей, предотвращение их опадения, ускорение созревания плодов и улучшения их качества, повышение устойчивости к заболеваниям, фунгипротекторное действие, снижение аккумуляции радионуклидов, нитратов, солей тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе начала бутонизации и в фазе цветения 1-й кисти. Расход –3-4 л/100 м^2	- (2)

	0,25 мл/л воды (Л)	Огурцы открытого грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2-часа. Расход – 2 л/кг	- (-)
	1 мл/5 л воды (Л)		Ускорение образования и предотвращение опадения завязей, повышение раннего и общего урожая, стимулирование иммунной системы, повышение устойчивости к пероноспорозу, снижение содержание нитратов и накопления тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе 2-3 настоящих листьев и повторно в фазе бутонизации. Расход –3 - 4 л/100м^2	- (2)
	2 мл/5л воды (Л)	Яблоня	Стимулировани е образование завязей, предотвращения их опадения, повышение урожайности и засухоустойчивости, стимулирование иммунной системы, повышение устойчивости к парше обыкновенной,	Опрыскивание по розовому бутону и повторно после цветения с интервалом 20 дней. Расход –5-6 л/100м^2	- (2)

			снижение содержания радионуклидов и накопления тяжелых металлов		
	0,1 мл/2 л воды (Л)	Перцы защищенного грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2-часа. Расход – 2 л/кг	- (-)
	1 мл/5 л воды (Л)		Ускорение образования завязей и предотвращения и опадения, повышение урожайности, стимулирование иммунной системы, снижение содержания радионуклидов и накопления солей тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе начала бутонизации и повторно в фазе цветения. Расход – 3-4 л/100м^2	- (2)
	0,25 мл/л воды (Л)	Розы	Ускорение корнеобразования у черенков и повышение их качества	Замачивание зеленых черенков на 12-14 часов	- (-)

астительного происхождения, полисахариды, макро-, мезо- и микроэлементы

им, Ж трохим», Россия 0/02/16	0,5 -1,2 л/тонну	Зерновые; зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян	
	0,6-0,8 л/тонну	Картофель	Предпосадочная обработка клубней	
	1,0-5,0 л/га		Корневая подкормка растений в фазе полных всходов 2 раза с интервалом 7-10 дней	

10-20 мл/кг	Овощные, цветочно-декоративные культуры		Замачивание семян перед посевом на 10-20 минут с п просушкой; луковиц и клубнелуковиц перед посадкой-
0,5-3,0 мл/м^2			Корневая подкормка растений на 3-4 день после всход дней после всходов
1,0 л/га			При пересадке рассады. Погружение кассет до промач или полив непосредственно перед высадкой.
1,0-5,0 л/га	Овощные,цветочно-декоративные культуры		Корневая подкормка через 3-5 дней после всходов, ил высадки рассады и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 д
0,05-0,3 л/100 м^2	Ягодные культуры		Корневая подкормка растений весной при возобновлен или сразу после высадки рассады (саженцев) и далее интервалом 7-10 дней
1,0-5,0 л/га			Корневая подкормка растений весной при возобновлен или сразу после высадки рассады (саженцев) и далее интервалом 7-10 дней
2,0-7,0 л/га	Плодовые деревья,виноградники		Корневая подкормка растений в период распускания л 1-3 с интервалом 7- 10 дней
0,5-5,0 л/га	Все культуры		Некорневая подкормка растений в течение вегетацион периода 1- 5 раз с интервалом 7-14 дней
0,5-2,0 л/га	Зерновые культуры		Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение ве периода в фазе кущения-выхода в трубку и в фазе кол (выхода метелки) - цветения
0,5-2,0 л/га	Однолетние и многолетние кормовые травы (злаковые)		Некорневая подкормка растений после укоса (стравли отрастании травостоя не менее 4-6 см
0,5-2,0 л/га	Свекла сахарная,столовая		Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев за смыкании рядков
0,5-2,0 л/га	Рапс озимый, яровой		Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение ве периода, начиная с фазы начала весенней вегетации и полных всходов (для ярового рапса), затем в фазе бут
0,5-2,0 л/га	Подсолнечник		Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение ве периода, начиная с фазы 3-5 листьев и далее с интерв дней
0,5-2,0 л/га	Зернобобовые культуры		Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение ве периода, начиная с фазы 4-6 листьев с интервалом 7-
0,5-2,0 л/га	Однолетние и многолетние кормовые травы (бобовые)		Некорневая подкормка растений после укоса (стравли отрастании травостоя не менее 4-6 см
0,5-2,0 л/га	Лен масличный		Некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и в с бутонизации

дного серебра+ полисексаметиленбигуанид гидрохлорид

ро, ВР (500+100 л) ООО «Резерв» и рохимия - ька», Россия 17/02/17	**Для сельскохозяйственного производства**			
	80-100 мл/т	Пшеница озимая	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная семян. Расход
	80-100 мл/га			Опрыскивани фазе конца ку выхода в труб л/га
	60-100 мл/т	Пшеница яровая		Предпосевная

			семян. Расход
60-100 мл/га			Опрыскивание фазе конца ку выхода в труб л/га
60-100 мл/т	Ячмень озимый		Предпосевная семян. Расход
60-100 мл/га			Опрыскивание фазе конца ку выхода в труб л/га
60-100 мл/т	Ячмень яровой		Предпосевная семян. Расход
60-100 мл/га			Опрыскивание фазе конца ку выхода в труб л/га
75-100 мл/т	Подсолнечник		Предпосевная семян. Расход
75-100 мл/га			Опрыскивание фазе образов Расход-300 л/
75-100 мл/т	Соя		Предпосевная семян. Расход
75-100 мл/га			Опрыскивание фазе бутониз 300 л/га
75-100 мл/т	Картофель		Предпосадочн клубней.. Расх
75-100 мл/га			Опрыскивание фазе бутониз 300 л/га
75-100 мл/т	Свекла сахарная		Предпосевная семян. Расход
75-100 мл/га			Опрыскивание фазе 3-4 пар Расход-300 л/
75-100 мл/т	Рапс яровой		Предпосевная семян. Расход
75-100 мл/га			Опрыскивание фазе бутониз 300 л/га
75-100 мл/т	Гречиха		Предпосевная семян. Расход
75-100 мл/га			Опрыскивание фазе бутониз 300 л/га
75-100 мл/т	Горох		Предпосевная семян. Расход
75-100 мл/га			Опрыскивание фазе бутониз 300 л/га

	150-250 мл/га	Яблоня		Опрыскивани -в фазе «розо е -в фазе пло орех». Расход
	150-200 мл/га	Виноград		Опрыскивани е- в фазе цве через 15-25 д первого опры Расход-800 л/
	Для личных подсобных хозяйств			
	7,5-10,0 мл/л воды	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочн клубней. Расх
	1 мл/3 л воды			Опрыскивани фазе бутониз л/100 м2.
	1,5-2,5 мл/10 л воды	Яблоня		Опрыскивани -в фазе «розо е -в фазе пло орех». Расход
	1,0-2,0 мл/8 л воды	Виноград		Опрыскивани е- в фазе цве через 15-25 д первого опры Расход- 8 л/1
дного серебра				
ВРК (3 г/л) ОО «Резерв» и рохимия - ька», Россия 17/02/17	0,3-0,4 л/т	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз, бактериальные гнили	Опрыскивани клубнейперед Расход – 10 л
	2-3 л/га	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивани вегетации: пе профилактиче последующие 7-9 дней. Рас жидкости- 300
	2-4 л/га	Яблоня	Бактериальный ожог	Опрыскивани зеленый кону цветения, леч плодов
	2-3 л/га	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, бурая пятнистость	Опрыскивани вегетации до после цветен завязывания
		Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль, антракноз	Опрыскивани вегетации до период образ
	0,5-1	Рис	Пирикуляриоз, альтернариоз	Опрыскивани вегетации, пр признаках поя болезни

		Пшеница озимая, яровая	Септориоз листьев, бурая ржавчина, ринхоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивани вегетации
		Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, септориоз листьев, мучнистая роса, фузариоз колоса	
	1л /1000 м3 помещения	Помешения для хранения картофеля	Грибные, бактериальные и смешанные грибо-бактериальные гнили клубней, включаяя фузариоз, антракноз, серебристую паршу, ооспороз, фитофтороз, ризоктониоз, склеротиниоз	Фумигация картофелехра закладкой кар Обработка с г генератора ту установленно вентиляции картофелехра расходом раб 10 л/1000 м 3
	30 мл/тонну	Картофель продовольственный и семенной		Фумигация ср загрузки на хр Обработка с г генератора ту установленно вентиляции картофелехра расходом раб 30 л/1000 т.
		Картофель семенной		Фумигация пе Обработка с г генератора ту установленно вентиляции картофелехра расходом раб 30 л/1000 т.
		Картофель (семенной) при появлении очага бактериальной или смешанной гнили		Фумигация кл пораженных г хранилища. С помощью гене тумана, устан систему венти картофелехра расходом раб 45 л/1000 т.

+25,6%+0,25%) njing Fertilizer (Co., ltd», «Агростайл», КР 27/12/16	В соотвествии с утвержденными рекомендациями по применению
бор, Г 3%+0,3%) ива», Финляндия,	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

Пестициды», КР ***7 02/02/17***		
е кислоты		
С, сухое вое удобрение » г. Бийск, РФ 27/04/12	Томаты, перцы, баклажаны	Корневая: с высадкой в грунт и д цветов поливать РР 1:100 с инте дней (10 л/м2); Внекорневая: с п цветов до конца цветения опрыс 1:300 (0.5-0,7 л/м2)
, сухое торфо – удобрение » г. Бийск, РФ 27/04/12	Капуста	Поливать РР 1:300 по 1-1,5л под растение с интервалом 15-20 дн
	Корнеплоды	После появления всходов и в пе формирования корнеплодов пол через 12-15 дней (5-7 л/м2)
	Лук, чеснок	После появления всходов и в пе формирования луковиц поливать через 12-15 дней (5-7 л/м2)
	Кабачки, огурцы,тыквы	Полить при посадке в грунт, повт 12-15 дней РР 1:100 (10 л/м2). П появления завязей полить РР 1:3
	Клубника	После оттаивания грунта полить л/м2). Через 12-15 дней повторит 1:200 (5-7 л/м2). После сбора уро удаления листьев с 1 по 15 авгус РР 1:100 (10 л/м2) или после сбо срезать листья и пролить РР 1:1
	Картофель	Через 5-7 дней после посадки по (5-7 л/м2). После появления всхо раз через 5 7 дней после окончан опрыскать РР 1:200 (0,3-1 л/м2)
	Декоративные кустарники и деревья	После посадки пролить почву РР л/м2), через 15-20 дней повторит
	Плодовые кустарники и деревья	После оттаивания грунта полить 1:100 с интервалом 10-15 дней. П бутонов обработать РР 1:200 (3- период налива плодов обработат 1:200 (3-5 л/м2)
	Комнатные растения	Поливать первый раз РР 1:100, д 25-30 дней РР 1:300. Один раз в опрыскивать РР 1:300
	Сахарная свёкла	В период подготовки почвы к пос РР 1:100 (10 л/м2). В фазе распу опрыскать РР 1:300 (5-7 л/м2), по 15-20 дней
	Хлопок	Внести перед боронованием РР л/га). При появлении второго лис из расчёта 240-480 л/га. Опрыски проводить по достижению высот см, затем при появлении коробоч (300-600 л/га)

иновых кислот натриевые соли

б, П, Таб биофарм» РФ, одик» Кыргызстан 9/08/13	0,9-1,2	Виноград (бессемянные сорта)	Опрыскивание в конце цветения. Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	
	30-40 г/га	Томаты открытого и защищенного грунта	Опрыскивание в фазах цветения 1-й, 2-й и 3-й кистей. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
	6-20 г/га	Фасоль	Опрыскивание в фазахбутонизации и массового цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
	21-30 г/га	Огурцы открытого и защищенного грунта	Опрыскивание в фазах начала цветения (появление единичных цветков) и массового цветения. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	
		Баклажаны	Опрыскивание в фазахбутонизации и начала цветения (10 % распустившихся цветков). Расход рабочей жидкости - 400 л/га	
		Лук репчатый (семенные посадки)	Опрыскивание в фазе массового стрелкованияи через 4-6 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
	30 г/га	Люцерна (семенные посевы)	Опрыскивание в фазахбутонизации и начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
	15 г/га	Картофель	Опрыскивание в начале фазы начала массового цветения и через 7 дней после первого опрыскивания. Расход	

		рабочей жидкости - 300 л/га
7,5 г/га	Горох овощной	Опрыскивание в фазахбутонизации и начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
21 г/га	Капуста раники	Опрыскивание в фазах 6-8 листьев, начала завязывания кочана и через 10-12 дней после второй обработки. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
	Капуста поздняя	Опрыскивание в фазах 6-8 листьев и начала завязывания кочана. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
0,1 г/л воды (Л)	Томаты открытого и защищенного грунта	Опрыскивание в начале цветения 1-й, 2-й и 3-й кистей. Расход рабочей жидкости - 1 л/30 м^2
0,I г/2 л воды (Л)	Огурцы открытого и защищенного грунта	Опрыскивание в фазах начала цветения (появление единичных цветков) и массового цветения. Расход рабочей жидкости - 2 л/40 м^2
0,1 г/л воды (Л)	Баклажаны	Опрыскивание в фазахбутонизации и начала цветения (10 % распустившихся цветков). Расход рабочей жидкости - 1 л/30 м^2
0,1 г/2 л воды (Л)	Картофель	Опрыскивание в начале фазы начала массового цветения и через 7 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 2 л/70 м^2

	0,1 г/1,5 л воды (Л)	Капуста ранняя	Опрыскивание в фазах 6-8 листьев, начала завязывания кочана и через 10-12 дней после второй обработки. Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м^2	
		Капуста поздняя	Опрыскивание в фазах 6-8 листьев и начала завязывания кочана. Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м^2	

оксид

ид, Таб (10%) angzhou Good-Jod ltd», КНР, через ет Трейд», КР 15/02/17	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
мплексное ОМУ бу Панг Ханнонг» К, сабековой, КР 2/03/15	В соотвествии с утвержденными рекомендациями по применению
n-L Super 6,5+ TE (w/v) p International », Бельгия, через Кемикал», КР 2/01/16	В соотвествии с утвержденными рекомендациями по применению
een-B 0+20+2MgO+CTE) p International », Бельгия, через Кемикал», КР 2/01/16	В соотвествии с утвержденными рекомендациями по применению

3+1,6+2,7%) «ЭкоАгро», КР 7/10/15	В соотвествии с утвержденными рекомендациями по применению			
+1,07+2,88%) «ЭкоАгро», КР 7/10/15	В соотвествии с утвержденными рекомендациями по применению			
кроэлементы				
Комби, Ж грохим»,Россия 0/02/16	1,0-3,0 л/га	Зерновые культуры, злаковые травы	Некорневая подкормка в период вегетации 1-2 раз	
	1,0-3,0 л/га	Кукуруза на зерно, на корм	Некорневая подкормка в период вегетации 1-2 раз	
	1,0-2,0 л/га	Свекла сахарная, столовая	Некорневая подкормка в период вегетации 1-2 раз	
	1,0-2,0 л/га	Подсолнечник, рапс озимый, яровой, лен масличный	Некорневая подкормка в период вегетации 1-2 раз	
	1,0-2,0 л/га	Бобовые и зернобобовые культуры, бобовые кормовые травы	Некорневая подкормка в период вегетации 1-2 раз	
	1,0-2,0 л/га	Картофель	Некорневая подкормка в период вегетации 1-2 раз	
пептиды				
(62,5%), Протекшн», ия 06/15	1,-2,0	Картофель	Повышения урожайности, качества продукции, улучшение сопротивляемости неблагоприятным факторам	Некорневая подкорм течение сезона: при вы 15см, в начале клубнеобра 15дней после последней по
		Лук		Некорневая подкорм течение сезона: в период 5листьев
		Томат		Некорневая подкорм течение сезона: при вы 10см или после высадки р цветением, в начале образ при изменении цвета пло созревания

	2,0-5.9	Томат		Корневая подкормка течение сезона при высоте или при высадке рас цветением, в начале плодо и перед созреванием плодо
е наноудобрение				
ом виде Флора» РФ, гро Трейд» 1/07/13	1 литр на 1 га	Для всех культур без исключений	Повышает иммунную устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам: резкие перепады температур, заморозки, засуха, переувлажнения, недостаток суммы активных температур	Используется как обработка сельскох растений, начиная с посевного или посадочного до обработки вегетирующи
+ марганец сульфат + вода (комбинированные микроэлементы)				
льпия», 02/13	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению			
+ сульфат цинка + вода (комбинированные микроэлементы)				
Корея 02/13	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению			
+ молибден + вода				
я», Корея 02/13	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению			

удобрение

ртименте), ми Ой» ерез ОсОО иды» 1/07/13	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
	25 г/10 л воды Расход раствора - до полного смачивания листовой поверхности растения (Л)	Комнатные растения	Некорневые подкорм опрыскивания: в летний перио сентябрь) - 1 раз в 10-15 дней, в - 1 раз в месяц
	25 г/10 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера и вида растений (Л)		Подкормки путем полива: в (с марта по сентябрь) - 1 раз зимний период - 1 раз в месяц
	25 г/10 л воды/2-3 м^2 (Л)		Корневые подкормки
	25 г/10 л воды Расход раствора - до полного смачивания листовой поверхности растения (Л)	Комнатные растения	Некорневые подкорм опрыскивания: в летний перио сентябрь), 1 раз в 10-15 дней, в - 1 раз в месяц
	25 г/10 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера и вида растений (Л)		Подкормки путем полива: в (с марта по сентябрь), 1 раз зимний период - 1 раз в месяц
	Марка Рассада-Рост		

25 г/10 л воды (Л)	Рассада овощных и цветочных	Корневые и некорневые поди
Марка Зеленый ковер		
0,2-0,3 % 20-30 г/10 л воды/2 м^2 (Л)	Газоны, цветочно-декоративные, овощные, плодово-ягодные	Подкормки в течение сезона

Водорастворимый фосфор, водорастворимый калий			
Фасфит, Ж (45+30 %) Компания «AGROINPU STRIAL KIMITEK» , Испания, через ОсОО «АргоСтайл», КР VIII -98 21/10/16	Обработка семян: 300-1000 мл/т семян Некорневое 250-500 мл/га Корневое : 4-10 л/га	Все сельскохозяйственные культуры	Обработка семян пе
Гиббереллинновая кислота			
Gibberellic acid,СП (850 г/ru) Компания « Лиер Кемикал Ко., Лтд», КНР, через ОсОО «АгроПак», КР VIII-100 23/11/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

кислота			
/л) П сия 16	1 мл/т	Пшеница озимая	Предпосевная обработка сем
	20 мл/га	Ячмень яровой	жидкости – 10 л/т
	2 мл/т		Опрыскивание в фазе кущен жидкости – 300 л/га
	1 мл/т	Рис	Предпосевная обработка сем

		жидкости – 10 л/т
20 мл/га		Опрыскивание в фазе кущен жидкости – 400 л/га
10 мл/т	Подсолнечник	Предпосевная обработка сем жидкости – 10 л/т
20 мл/га		Опрыскивание в фазе 2-4-х Расход рабочей жидкости – 150 л
4 мл/т	Свекла сахарная	Предпосевная обработка сем жидкости – 10 л/т
30 мл/га	Свекла сахарная	Опрыскивание в фазах перв листьев и смыкания рядков. жидкости – 200 л/га
4 мл/т	Горох	Предпосевная обработка сем жидкости – 10 л/т
40 мл/га		Опрыскивание в фазе буто цветения. Расход рабочей жидко 350 л/га
40 мл/т	Лен-долгунец	Опрыскивание в фазах г “елочки”. Расход рабочей жидкос
10 мл/га	Картофель	Предпосадочная обработка рабочей жидкости – 10 л/т
1 мл/га		Опрыскивание в фазах полны бутонизации. Расход рабочей жи 300 л/га
5 мл/т	Томат открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 3 ча жидкости 1,5 л/кг
10 мл/га		Опрыскивание за 1-2 дня до начале бутонизации и в период г Расход рабочей жидкости – 300 л
6 мл/кг	Огурец открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 1 рабочей жидкости – 1 л/кг
10 мл/га		Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 300 л/га
12,5 мл/кг	Баклажан открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 1-2 ча жидкости – 2 л/кг
30 мл/га		Опрыскивание в фазе цветен жидкости – 300 л/га

10 мл/кг	Перец открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 1-2 ча жидкости – 1 л/кг
30 мл/га		Опрыскивание в фазе цветен жидкости – 300 л/га
10 мл/кг	Капуста белокочанная	Замачивание семян на 6- рабочей жидкости – 1 л/кг
30 мл/га		Опрыскивание в фазах полно и завязывания кочана. Расход ра ти – 400 л/га
0,01 мл/кг	Капуста цветная	Замачивание семян на 6 час жидкости – 1 л/кг
10 мл/га		Опрыскивание рассады в фаз 2-3-х настоящих листьев. жидкости – 150 л/га
1 мл/кг		Опрыскивание через 7 дн рассады в открытый грунт. Расхо – 250 л/га
150 мл/га	Морковь	Замачивание семян на 6- рабочей жидкости – 1 л/кг
250 мл/га		Опрыскивание в фазах 2-3-х и пучковой спелости (8-10 на Расход рабочей жидкости – 400 л/га
0,25 мл/кг	Салат листовой (на семена)	Замачивание семян на 8 час жидкости – 1 л/кг
5 мл/га		Опрыскивание в фазе 6 н Расход рабочей жидкости -300-40
0,1 мл/кг	Арбуз	Замачивание семян на 8 час жидкости 3,5 л/кг
30-40 мл/га		Опрыскивание: в фазе “ц цветения и в начале формирова рабочей жидкости – 300 л/га
1 мл/кг	Дыня	Замачивание семян на 8 час жидкости 3,5 л/кг
10 мл/га		Опрыскивание: в фазе 2-3-х в начале цветения и в нача

		завязей. Расход рабочей жидкост
1 мл/кг	Виноград (южная зона промышленного возделывания)	Опрыскивание в конце фазы дней после первой обработки жидкости -800-1000 л/га
10 мл/га	Виноград (северная зона промышленного возделывания)	
200 мл/га	Яблоня	Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 800 л/га
400 мл/га	Груша	Замачивание семян перед ст часов. Расход рабочей жидкости
80 мл/га	Черешня, вишня, слива	Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 500 л/га
2 мл/кг	Алыча	
125 мл/га	Земляника	Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 300 л/га
500 мл/га	Смородина черная	Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 400 л/га
30 мл/га	Роза защищенного грунта	Опрыскивание в начале о Расход рабочей жидкости – 400 л
40 мл/га	Хризантема гелениум	Опрыскивание растений пер бутонов. Расход рабочей жидкост
40-80 мл/га	Хризантема корейская	Опрыскивание растений пос рабочей жидкости – 300 л/га
30 мл/га	Гладиолус	Замачивание клубнелуковиц посадкой. Расход рабочей жидко
70 мл/га	Пустырник сердечный	Опрыскивание в начале вег дней. Расход рабочей жидкости –
1 мл/кг	Змееголовник молдавский	
35 мл/га	Валериана лекарственная (первого года вегетации)	Замачивание семян на 4 ча жидкости – 250 мл/кг
		Опрыскивание в фазе 2-4 на через 7-10 дней. Расход рабочей

		300 л/га
0,2 мл/кг	Валериана лекарственная (второго года вегетации)	Опрыскивание в фазе к культуры и через 7-10 дней жидкости – 300 л/га
30 мл/га	Наперстянка шерстистая	Предпосевная обработка сем жидкости – 250 мл/кг
		Опрыскивание в фазе к культуры и через 7-10 дней жидкости – 300-400 л/га
0,1 мл/кг	Копеечник альпийский (первого года вегетации)	Предпосевная обработка сем жидкости – 250 мл/кг
35 мл/га		Опрыскивание при высоте Расход рабочей жидкости – 300-4
0,1 мл/кг	Копеечник альпийский (второго года и последующих лет вегетации)	Опрыскивание в фазе отра через 12-14 дней. Расход рабочей жидкости – 3
35 мл/га	Ноготки лекарственные	Предпосевная обработка сем жидкости – 250 мл/кг
50 мл/га		Опрыскивание в начале веге дней. Расход рабочей жидкости –
0,15 мл/кг	Женьшень	Замачивание семян на 12 час жидкости – 3 л/кг
35 мл/га		Опрыскивание при появлении 2-х настоящих листьев. жидкости – 300-400 л/га
1 мл/кг	Кедр сибирский, кедр корейский	Замачивание семян на 24 ча жидкости – 2 л/кг
35 мл/га	Пихта кавказская	
0,2 мл/кг	Сосна крымская	Опрыскивание сеянцев вегетационного сезона (июнь-ию жидкости – 300 л/га
0,02 мл/кг	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Замачивание семян на 24 ча жидкости – 2 л/кг

30 мл/га	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Опрыскивание сеянцев вегетационного сезона (июнь-ию жидкости – 300 л/га
0,2 мл/кг	Чубушник, бирючина, гортензия (пересадка растений)	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости – 300 л
30 мл/га		Опрыскивание растений пересадки. Расход рабочей жидк
	Яблоня (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости – 1 л/200 шт.
150 мл/га	Груша (укоренение черенков)	
1 мл/л	Слива (укоренение черенков)	
0,25 мл/л	Вишня (укоренение черенков)	
0,18 мл/л	Крыжовник (укоренение черенков)	
0,5 мл/л	Смородина красная (укоренение черенков)	
0,12 мл/л	Облепиха (укоренение черенков)	Замачивание черенков на 1 рабочей жидкости – 2 л/100 шт.
0,18 мл/л	Роза (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости – 1 л/200 шт.
0,2 мл/л	Сакура, туя западная (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости – 1 л/500 шт.
0,2-0,25 мл/л	Дейция шершавая, миндаль трехлопастный, сирень, вишня войлочная (укоренение черенков)	
1 мл/500 шт.	Клематис (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости – 1 л/200 шт.
0,1 мл/л	Кипарисовик горохоплодный, ель колючая, можжевельник сибирский (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости – 1 л/100 шт.
0,5-1 мл/л	Барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости – 1 л/100 черенков
0,5 мл/л	Горох	Предпосевная обработка сем жидкости – 100 мл/кг

		Опрыскивание в период бут цветения. Расход рабочей жидко
0,04 мл/ 100 мл воды (Л)	Картофель	Предпосевная обработка рабочей жидкости – 1 л/100 кг
0,1 мл/3,5 л воды (Л)		Опрыскивание в фазах полны бутонизации. Расход рабочей жи 3 л/100 м^2
0,5 мл/л воды (Л)	Томат открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 3 ча жидкости – 150 мл/100 г
0,1 мл/3 л воды (Л)		Опрыскивание за 1-2 дня до начале бутонизации и в период Расход рабочей жидкости – 3 л/1
0,6 мл/150 мл воды (Л)	Огурец открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 1 рабочей жидкости – 100 мл/100 г
0,1 мл/3 л воды (Л)		Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 3 л/100 м^2
1,25 мл/ 100 мл воды (Л)	Баклажан открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 1-2 ча жидкости – 200 мл/100 г
3 мл/3 л воды (Л)		Опрыскивание в фазе цветен жидкости – 3 л/100 м^2
1 мл/200 мл воды (Л)	Перец открытого и защищенного грунта	Замачивание семян на 1-2 ча жидкости – 100 мл/100 г
3 мл/3 л воды (Л)		Опрыскивание в фазе цветен жидкости – 3 л/100 м^2
1 мл/100 мл воды (Л)	Капуста белокочанная	Замачивание семян на 6 рабочей жидкости – 100 мл/100 г
3 мл/3 л воды (Л)		Опрыскивание в фазе полной в фазе завязывания кочана

		жидкости – 4 л/100 м^2
0,001 мл/100 мл воды (Л)	Капуста цветная	Замачивание семян на 6 час жидкости 100 мл/100 г
0,1 мл/4 л воды (Л)		Опрыскивание рассады в фа листьев. Расход рабочей жидкост
0,1 мл/100 мл воды (Л)		Опрыскивание расте 7 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости -2,5 л/1
1,5 мл/1,5 л воды (Л)	Морковь	Замачивание семян на 6- рабочей жидкости – 100 мл/100 г
2,5 мл/2,5 л воды (Л)		Опрыскивание в фазе 2-3-х н в фазе пучковой спелости (8-10 Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м^2
0,025 мл/ 100 мл воды (Л)	Арбуз	Замачивание семян на 8 час жидкости – 350 мл/100 г
0,05 мл/4 л воды (Л)		Опрыскивание: в фазе “ц цветения и в начале формирова рабочей жидкости – 3 л/100 м^2
0,1 мл/350 мл воды (Л)	Дыня	Замачивание семян Расход рабочей 350 мл/100 г
0,1 мл/3 л воды (Л)	Дыня	Опрыскивание: в фазе 2-3 на начале цветения и в начале фор Расход рабочей жидкости – 3 л/1
0,1 мл/350 мл воды (Л)	Виноград (южная зона промышленного возделывания)	Опрыскивание в конце фазы дней после первой обработки жидкости – 8-10 л/100 м^2
0,1 мл/3 л воды (Л)	Виноград (северная зона промышленного возделывания)	
2 мл/8-10 л воды (Л)	Яблоня	Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 5-10 л/дерев
4 мл/8-10 л воды (Л)	Груша	Замачивание семян перед ст часов. Расход рабочей жидкости
1 мл/5-10 л воды (Л)	Черешня, вишня, слива	Опрыскивание в фазе бу

0,2 мл/200 мл воды (Л)	Алыча	рабочей жидкости – 5 л/100 м^2
1,25 мл/5 л воды (Л)	Земляника	Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 3 л/100 м^2
5 мл/5 л воды (Л)	Смородина черная	Опрыскивание в фазе бу рабочей жидкости – 4 л/100 м^2
3 мл/3 л воды (Л)	Роза защищенного грунта	Опрыскивание в начале о Расход рабочей жидкости – 4 л/1
0,4 мл/4 л воды (Л)		
0,4-0,8 мл/4 л воды (Л)	Хризантема гелениум	Опрыскивание перед форми Расход рабочей жидкости – 1 л/3
	Хризантема корейская	Опрыскивание после посад жидкости – 3 л/100 м^2
1 мл/л воды (Л)	Гладиолус	Замачивание клубнелуковиц посадкой. Расход рабочей жидко
0,7 мл/3 л воды (Л)	Кедр сибирский, кедр корейский	Замачивание семян на 24 ча жидкости – 200 мл/100 г
1 мл/л воды (Л)	Пихта кавказская	
0,02 мл/ 200 мл воды (Л)	Сосна крымская	Опрыскивание сеянцев вегетационного сезона (июнь-ию жидкости – 3 л/100 м^2
0,002 мл/ 200 мл воды (Л)	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Замачивание семян на 24 ча жидкости – 200 мл/100 г
0,3 мл/3 л воды (Л)	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Опрыскивание сеянцев вегетационного сезона (июнь-ию жидкости – 3 л/100 м^2
0,02 мл/ 200 мл воды (Л)	Чубушник, бирючина, гортензия (пересадка растений)	Опрыскивание перед пе рабочей жидкости – 3 л/100 м^2
0,3 мл/3 л воды (Л)		Опрыскивание через день Расход рабочей жидкости – 3 л/1
	Яблоня (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости –
1,5 мл/3 л воды (Л)	Груша (укоренение черенков)	

	0,1 мл/100 мл воды (Л)	Слива (укоренение черенков)	100 мл/20 черенков
	0,025 мл/ 100 мл воды (Л)	Вишня (укоренение черенков)	
	0,018 мл/ 100 мл воды (Л)	Крыжовник (укоренение черенков)	
	0,05 мл/ 100 мл воды (Л)	Смородина красная (укоренение черенков)	
	0,012 мл/ 100 мл воды (Л)	Облепиха (укоренение черенков)	Замачивание черенков на 1 рабочей жидкости – 200 мл/10 черенков
	0,018 мл/ 100 мл воды (Л)	Роза (укоренение черенков)	Замачивание черенков на рабочей жидкости – 100 мл/20 черенков
	0,02 мл/ 100 мл воды (Л)	Сакура, туя западная (укоренение черенков)	
	0,02-0,025 мл/ 100 мл воды (Л)	Дейция шершавая, миндаль трехлопастный, сирень, вишня войлочная (укоренение черенков)	
	0,1 мл/100 мл воды (Л)	Клематис (укоренение черенков)	
	0,01 мл/ 100 мл воды (Л)	Кипарисовик горохоплодный, ель колючая, можжевельник сибирский (укоренение черенков)	
	0,05-0,1 мл/ 100 мл воды (Л)	Барбарис обыкно-венный, барбарис Тунберга (укоренение черенков)	
	0,05 мл/ 100 мл воды (Л)		

натриевый очищенный с фульвокислотами

ван К, оссия, -Агро», 5	3-8 л/га	Все культуры	Опрыскивание почвы (культивация)
	0,2-0,4 л/т		Предпосевная обработка сем
	0,2-0,04 л/га		Некорневая подкормка в пе раза
ОО ка», сОО	0,2-0,4 л/га		Корневая подкорма в период

, КР 17			
и гуминовых кислот			
И-20, , еское ика н 5	22,5 л/га	Все культуры	Внесение в почву весной подготовке почвы (под во культивация)
	1,2 л/т	Пшеница, ячмень, рожь, злаковые травы	Предпосевная обработка сем
	0,3 л/га		Некорневая подкормка р кущения-выхода в трубку
	1,2 л/т	Овес	Предпосевная обработка семя
	0,3 л/га		Некорневая кодкормка р кущения-выметывания метелки
	1,8 л/т	Подсолнечник	Предпосевная обработка сем
	0,18 л/га		Некорневая подкормка расте бутонизации
	0,6	Многолетние травы	Предпосевная обработка сем
	0,18 л/га		Некорневая подкормка р образования соцветий и далее по
	2,4 л/т	Горох, соя, фасоль	Предпосевная обработка сем
	0,18 л/га		Некорневая подкормка р бутонизации
	0,6 мл/кг	Кабачок	Замачивание перед посадкой
	0,18 л/га		Некорневая подкормка рас листьев
	2,4 л/т	Кукуруза	Предпосевная обработка сем
	0,18 л/га		Некорневая подкормка рас листьев
	2,4 л/т	Гречиха	Предпосевная обработка сем
	0,18 л/га		Некорневая подкормка р бутонизации-начала цветения
	3,0	Картофель	Предпосадочная обработка с
	0,18		Некорневая подкормка р бутонизации и в фазе цветения
	0,6	Капуста	Замачивание семян пред пос
	0,18		Некорневая подкормка расте высадки рассады в грунт, в фаз образования кочана
	0,8	Сахарная свекла	Предпосевная обработка сем

	0,18		Некорневая подкормка р образования 2-4 листьев и листьев в рядках
	0,6	Укроп	Замачивание семян пред пос
	0,18		Некорневая подкормка рас листьев и через 20 дней
ючно- е Инком», ника н 5	700 г/10 м^2	Овощи, ягоды, цветы	Овощные, плодово-ягодные, цвет культуры – внесение весной или перекопку почвы
	700 г/Юм^5		Овощные, плодово-ягодные, цвет культуры — внесение при посадк
	70 г/10 л воды Расход рабочего раствора Юл/10 м-		Овощные, плодово-ягодные. Цвет культуры —корневая подкормка р дней после появления всходов (и рассады) с интервалом 2-3 недел
	700 г/Юм^2	Томат, баклажан, перец	Томат, баклажан, перец – внесени осенью под перекопку почвы
	700 г/ Юм^2		Томат, баклажан, перец – внесени
	70 г/Ю л воды Расход рабочего раствора 10 л/10м		Томат, бакпажан, перец – корнева растений через 10 дней после по (или высадки рассады) с интерва
	700 г/Ю м^2	Огурец, кабачок, бахчевые	Огурец, кабачок, бахчевые культу весной или осенью под перекопку
	700 г/Ю м^2		Огурец, кабачок, бахчевые культу посадке
	70 г/Ю л воды Расход рабочего раствора 10 л/Юм^2		Огурец, кабачок, бахчевые культу подкормка растений через 10 дне всходов (или высадки рассады) и лом 2 недели
	700 г/Ю м^2	Картофель, морковь, редис, свекла, репа, редька	Картофель, морковь, редис, сеема редька –внесение весной или осе почвы
	700 г/Ю м^1 или 12 г/растение		Картофель, морковь, редис, свекл редька –внесение при (посеве) по
	70 г/Ю л воды Расход рабочего раствора 10 л/Ю м		Картофель, морковь, редис, света корневая подкормка растений че появления всходов (или высадки интервалом 2-3 недели
	1,0 кг/10 м^2	Картофель	Картофель – внесение весной ил перекопку почвы
	1,0 кг/Ю м^2		Картофель – внесение при посад
	100 г/10 л воды Расход рабочего раствора 10 л/100 растений		Картофель – корневая подкормка цветения
	700 г/Ю м^2	Лук, чеснок	Лук, чеснок – внесение весной ил перекопку почвы
	700 г/Ю м^2		Лук, чеснок – внесение при посад
	70 г/Ю л воды Расход		Лук, чеснок – корневая подкормка

рабочего раствора 10 л/Юм^2		2-3 недели до начала завязывани
12 г/растение	Земляника,	Земляника – внесение при посад
700 г/Юм^2	клубника,	Земляника – корневая подкормка возобновления вегетации и дале интервалом 10-15 дней
70 г/Ю л воды Расход рабочего раствора 10 л/5 м^2	малина,	Земляника – корневая подкормка течение вегетационного периода дней
36 г/растение	смородина	Малина, смородина – внесение п
24 г/куст		Малина, смородина – корневая по начале возобновления вегетации интервалом 10-15 дней
70 г/10 л воды Расход рабочего раствора 5 л/куст		Малина, смородина – корневая по 2-3 раза в течение вегетационно интервалом 10-15 дней
100 г/м^2 или 4 г/растение	Однолетние и двулетние цветы	Анютины глазки, маргаритки, гвоз др. щеточные культуры – внесени (посадкой)
50 г /10 л воды Расход рабочего раствора 10 л/1-1,5 м^2		Анютины глазки, маргаритки, гвоз др. щеточные культуры – корнева растений через 15 дней после по бутонизации и в фазе цветения
100 г/растение	Многолетние цветы	Астильба, пион, ромашка, хризант цветочные культуры – внесение п
50 г/растение		Астильба, пион, ромашка, хризант щеточные культуры – корневая по
100 г/10 л воды Расход рабочего раствора 1-5 л/растение		Астильба, пион, ромашка, хризант щеточные культуры – корневая по 3-4 раза в период бутонизации и интервалом 10-14 дней
100 г/м^2 (12 г/растение)	Луковичные, клубнелуковичные цветы	Крокус, гиацинт, нарцисс, тюльпан при посадке
24 г/растение		Бегония, георгина, фрезия, лилия культуры –внесение в день посад
100 г/10 л воды Расход рабочего раствора 0,5 л/растение		Крокус, гиацинт, нарцисс, тюльпан подкормка растений весной в нач вегетации и после цветения
фО г/10 л воды Расход рабочего раствора 0,5 л/растение		Бегония, георгин, фрезия, лилия и культуры –корневая подкормка ра течение вегетационного периода дней
12 г/л воды Расход рабочего раствора 5-15 мл/растение	Бутонцветы	Цветочные культуры (горшечные корневая подкормка растений в
12 г/л воды Расход рабочего раствора 500 мл/растение		Цветочные культуры (открытый и – корневая подкормка растений в бутонизации
100 г/м^2	Цветы садовые – универсал	Цветочные культуры (однолетние посевом (посадкой)
100 г/Юл воды Расход рабочего раствора 500 мл/растение		Цветочные культуры (однолетние подкормка растений в период акт

100 г/м^2		Цветочные культуры (двулетние) посевом (посадкой) и (или) в подк начале возобновления вегетации
100 г/5 л воды Расход рабочего раствора 500 мл/растение		Цветочные культуры (двулетние) подкормка растений в период бут
100 г/растение		Цветочные культуры (многолетние посадкой
100 г/растение		Цветочные культуры (многолетние весной в начале возобновления в
100 г/5 л воды Расход рабочего раствора 500 мл/растение		Цветочные культуры (многолетние подкормка растений в период акт
100 г/м^2		Цветочные культуры (луковичные посадкой
100 г/10 л воды Расход рабочего раствора 500 мл/растение		Цветочные культуры (луковичные подкормка растений в период акт
12 г/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Лианы	Алоказия, аралия, сингониум, мон подкормка растений в период акт в месяц
12 г/л воды Расход рабочего раствора –до увлажнения земляного кома	Фиалка, герань	Фиалка, герань, фуксия, аспарагус амариллис и др.-корневая подкор период активного роста 2 раза в
12 г/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Кактус, алоэ	Кактус, каланхоэ, агава, аюэ, очит подкормка растений в период акт в месяц
12 г/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Лимон, мандарин	Лимон, мандарин, апельсин, поме корневая подкормка растений в роста 2 раза в месяц
12 г/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Фикус, пальма	Пальма, фикус, драцену, аралия, корневая подкормка растений в роста 2 раза в месяц
1,0 кг/10 м^2	Газон	Травы газонные – внесение в поч семян
1,0 кг/10 м^2		Травы газонные – подкормка раст таяния снега) или осенью
0,5 кг/10 л воды Расход рабочего раствора 1л/м^2		Травы газонные – корневая подко раз в месяц
500 г/растение	Декоративные кустарники	Спирея, сирень, айва японская, ж внесение при посадке
300 г/растение		Спирея, сирень, айва японская, ж подкормка растений весной в на вегетации и далее 1-2 раза с инте
100 г/10 л воды Расход рабочего раствора 30 л/растение		Спирея, сирень, айва японская, ж подкормка растений весной в на вегетации и далее 1-2 раза с инте
200 г/м^2	Розы	Роза (плетистые сорта) – внесени
200 г/м^2		Роза (плетистые сорта) – подкорм

		возобновления вегетации
45 г/л воды Расход рабочего раствора 1 л/растение		Роза (плетистые сорта) – корнева растений в период бутонизации, через 25-30 дней (за месяц до ук
150 г/м^2		Роза (чайно-гибридные, полианто внесение при посадке
150 г/м^2		Роза (чайно-гибридные, полианто подкормка растений весной в на вегетации
30 г/л воды Расход рабочего раствора 1 л/растение		Роза (чайно-гибридные, полианто корневая подкормка растений в п после цветения и через 25-30 дне укрытия)
100 г/м^2		Роза (миниатюрные сорта) – внес
100 г/м^2		Роза (.миниатюрные сорта) – под начале возобновления вегетации
15 г/л воды Расход рабочего раствора 1 л/растение		Роза (миниатюрные сорта) – корн растений в период бутонизации, через 25-30 дней (за месяц до ук
500 г/растение	Хвойные	Хвойные культуры (деревья) – вн
200 г/растение		Хвойные культуры (деревья) – по начале возобновления вегетации интервалом 25-30 дней
100 г/10 л воды Расход раствора 30 л/растение		Хвойные культуры (деревья) – ко растений один раз в месяц
300 г/растение		Хвойные культуры (кустарники) – посадке
100 г/растение		Хвойные культуры (кустарники) – начале возобновления вегетации интервалом 25-30 дней
100 г/10 л воды Расход раствора 10 л/растение		Хвойные культуры (кустарники) – растений один раз в месяц
60-100 г/м^2	Азот	Все культуры (неокультуренные п весной или осенью под обработк
40-80 г/м^2		Все культуры (окультуренные поч весной или осенью под обработк
30-40 г/м^2 приствольного круга		Плодово-ягодные, декоративные (деревья) – подкормка растений в возобновления вегетации
20-30 г/м^2		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – подкормка растени возобновления вегетации
16-20 г/пог.м		Земляника – подкормка растений возобновления вегетации
40-60 г/10 м^2		Все культуры – корневая подкорм первой половине вегетационного интервалом 20-25 дней
40-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора 10 л/10 м^2		Все культуры – корневая подкорм первой половине вегетационного интервалом 20-25 дней
50-60 г/ м^2	Фосфор	Все культуры (неокультуренные п

		весной или осенью под обработку
30-40 г/м^2		Все культуры (окультуренные поч весной или осенью под обработку
4-6 г/пог. М (1-2 г/растение)		Овощные, цветочно-декоративны внесение при посеве (посадке)
20-30 г/м^2 приствольного круга		Плодово-ягодные, декоративные (деревья) – корневая подкормка р бутонизации, после цветения и в образования завязей
20-30 г/м^2		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – корневая подкормк период бутонизации и в начале о
40-60 г/10 м^2		Все культуры – корневая подкорм бутонизации и 1-2 раза после цве в начале периода формирования интервалом 10-15 дней
40-60 г/ Юл воды Расход рабочего раствора 10 л/10 м»		Все культуры – корневая подкорм бутонизации и 1-2 раза после цве в начале периода формирования интервалом 10-15 дней
80-100 г/ \г	Калий	Все культуры (неокультуренные п весной или осенью под обработку
60-80 г/м»		все культуры (окультуренные почв весной или осенью под обработку
8-12 г/пог. М (2-4 г/растение)		Овощные, цветочно-декоративны культуры внесение при посеве (
80-100 г/м'приствольного круга		Плодово-ягодные, декоративные – корневая подкормка растений в плодов 1-2 раза с интервалом 10 сбора урожая
40-50 г/м^1		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – корневая подкормк период роста плодов 1-2 раза с и дней и после сбора урожая
50-60 г/10 м^г		Все культуры – корневая подкорм период формирования урожая 2- 10-15 дней
50-60 г/Юл воды Расход рабочего раствора 10 л/10 м^2		Все культуры – корневая подкорм период формирования урожая 2- 10-15 дней
1,0 кг/Ю м^2	Осенний	Овощные, плодово-ягодные, цвет культуры –внесение осенью под
1,0 кг/Ю м^2		Овощные, плодово-ягодные, цвет культуры –внесение при посеве (
1-2 кг/дерево		плодово-ягодные, декоративные внесение при посадке
0,5-1,0 кг/дерево		Плодово-ягодные, декоративные (деревья) – корневая подкормка р сбора урожая 1-2 раза с интерва

	0,5 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – внесение при поса
	0,3 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – корневая подкорм сбора урожая 1-2 раза с интерва
	1,0 кг/Ю м^2	Весенний	Овощные, плодово-ягодные, цвет культуры –внесение весной под с
	1,0 кг/Ю м»		Овощные, плодово-ягодные, цвет культуры –внесение при посеве (
	100 г/10 л воды		Овощные, плодово-ягодные, цвет
	Расход рабочего раствора 10 л/Ю м^2		культуры –корневая подкормка ра дней после появления всходов (и рассады) 2-3 раза с интервалом
	0,5-1.0 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные – внесение при посадке
	0,5 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – внесение при поса
	0,3 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – подкормка растени возобновления вегетации
	1,0 кг/растение	Плодовые, деревья и кустарники универсал	Плодово-ягодные, декоративные – внесение при посадке
	0,5 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные – корневая подкормка растений в бутонизации, после цветения и в образования завязей
	100 г/10 л воды Расход рабочего раствора 50 л/растение		Плодово-ягодные, декоративные – корневая подкормка растений в бутонизации, после цветения и в образования завязей
	0,7 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – внесение при поса
	0,35 кг/растение		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – корневая подкорм период бутонизации, после цвете образования завязей
	100 г/10 л воды Расход рабочего раствора 35 л/растение		Плодово-ягодные, декоративные (кустарники) – корневая подкорм период бутонизации, после цвете образования завязей
аучно- е Инком», ика н 15	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

менте

s, Г вена»,	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

ОсОО Р 8/16	
ss CRF вена», ОсОО Р 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
CRF вена», ОсОО Р 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
RF вена», ОсОО Р 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
CRF вена», ОсОО Р 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
RF вена», ОсОО Р 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
SRF вена», ОсОО Р 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
SF вена», ОсОО	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

P 8/16	
nt CRF вена», ОсОО P 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
RF вена», ОсОО P 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
SF вена», ОсОО P 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
RF вена», ОсОО P 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
RF вена», ОсОО P 8/16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

50г/л) О оссия 6	**СХП**		
	100	Пшеница яровая и озимая	Предпосевная обработка сем жидкости – 10 л/т
	80		Опрыскивание в фазе начал в фазе появления флагового лис жидкости – 300л\га.
	100	Ячмень яровой	Предпосевная обработка сем жидкости – 10 л/т
	80		Опрыскивание в фазе начал

		в фазе появления флагового лис жидкости – 300л\га.
100	Соя	Предпосевная обработка сем жидкости – 10л\т
80		Опрыскивание в фазе начал 12-14 дней после первого опр рабочей жидкости – 300л\га
100	Подсолнечник	Предпосевная обработка сем жидкости – 10л\т
100-200		Опрыскивание растений в фа и в фазе массового цветения жидкости – 300л\га
250	Сахарная свекла	Предпосевная обработка сем жидкости – 20л\т
100-250		Опрыскивание растений в ф через 15 дней после первого оп рабочей жидкости – 300л\га
100	Картофель	Опрыскивание в период ма через 20 дней после первого оп рабочей жидкости – 300 л/га
20		Предпосадочная обработка рабочей жидкости – 20 л/т
200	Огурец	Опрыскивание в фазе 2-3 начала цветения и в фазе м Расход рабочей жидкости – 400 л
0,1 мл/кг		Замачивание семян перед Расход рабочей жидкости – 1 л/кг
60	Томат	Опрыскивание в фазе начал кисти, через 10 дней после перв через 10 дней после второго оп рабочей жидкости – 400 л/га.
0,1 мл/кг		Замачивание семян перед Расход рабочей жидкости – 1 л/кг
250	Виноград	Опрыскивание в фазе цвето дней после первого опрыскиван жидкости – 600 л/га
60-100 мл/га	Цветочные и декоративные культуры	Опрыскивание растений: вегетации, 2-е – через 10 дн опрыскивания, 3-е – через 10 д опрыскивания. Расход – 400-600
100-150 мл/га	Кукуруза	Опрыскивание растений: 1 листьев, 2-е – в фазе выбр Расход рабочей жидкости – 300л\

50-100	Горох	Предпосевная обработка сем жидкости – 10 л/т
100-200		Опрыскивание растений: 1- листьев, 2-е – в фазе бутонизац раствора – 300 л/га.
50-100	Рис	Предпосевная обработка сем жидкости – 10 л/т
50-100		Опрыскивание растений в фа рабочего раствора – 300 л/га.
0,1-0,15 л/кг	Капуста белокочанная	Замачивание семян перед Расход рабочей жидкости – 1 л/кг
100-150		Опрыскивание растений: 1-е е – в фазе завязывания кочан раствора – 300 л/га.
50-100	Лук репчатый	Предпосадочная обработк рабочего раствора – 10 л/т;
100-150		Опрыскивание растений: 1 листьев, 2-е – в фазе 5-6 листь раствора – 300 л/га.
100-150	Травы газонные	Опрыскивание растений: 1-е отрастания и далее 2 раза с и (после скашивания травы), раствора – 300 л/га.
50-100	Цветочные культуры (луковичные)	Опрыскивание растений формирования бутонов, расход р 300 л/га.
400	Яблоня	Опрыскивание растений: 1-е бутон», 2-е – «плод грецкий оре раствора – 1000 л/га.
ЛПХ		
2 мл/лводы	Картофель	Предпосадочная обработка рабочей жидкости – 1 л/100 кг
2 мл/3 л воды		Опрыскивание в период ма через 20 дней после первого жидкости -3 л/100 м2
0,01 мл/ 100 мл воды	Огурец	Замачивание семян перед Расход рабочей жидкости – 100 м
2 мл/4 лводы		Опрыскивание в фазе 2-3 начала цветения и в фазе м Расход рабочей жидкости – 4 л/1
0,01 мл/ 100 мл воды	Томат	Замачивание семян перед Расход рабочей жидкости – 100 м
0,6 мл/4 л воды		Опрыскивание в фазе начал

			кисти, через 10 дней после перв через 10 дней после второго оп рабочей жидкости – 4 л/100 м2
	2,5 мл/8-10 л воды	Виноград	Опрыскивание в фазе цвето дней после первого опрыскиван жидкости – 6 л/100 м2
	0,6 мл/4 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Опрыскивание растений: вегетации, 2-е – через 10 дн опрыскивания, 3-е – через 10 д опрыскивания. Расход – 4-6 л/100

низмы 98 штаммов

нтрат в и РФ и МУ» истан, й А.Х. 3	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

микроэлементы, микроэлемент бор, микроэлемент цинк в форме хелата ЭДТА

к о я 6	**Марка:Бора**		
	0,5-1,0 л/га	Свекла сахарная и столовая	Некорневая подкормка: 1-ая 4-6 листьев, далее – с интервалом
	0,75-1,0 л/га	Рапс озимый	Некорневая подкормка формирования розетки, весной вегетации (в фазе стеблевания) и
	0,75-1,0 л/га	Рапс яровой	Некорневая подкормка в фа фазе бутонизации
	0,75-1,0 л/га	Подсолнечник	Некорневая подкормка в фа фазе 8-10 листьев (при необходим
	0,75-1,0 л/га	Зернобобовые культуры	Некорневая подкормка в фа фазе бутонизации
	0,5-1,0 л/га	Бобовые травы	Некорневая подкормка
	0,75-1,0 л/га	Кукуруза	Некорневая подкормка в фа фазе 10-12 листьев
	0,5-1,0 л/га	Картофель	Некорневая подкормка чере фазы полных всходов и в фазе цветения (при необходимости
	0,5-1,0 л/га	Овощные культуры	Некорневая подкормка
	0,5-1,0 л/га	Ягодные культуры	Некорневая подкормка
	0,5-1,0 л/га	Плодовые культуры	Некорневая подкормка
	1,0 л/га	Виноград	Некорневая подкормка

	0,5-1,0 л/га	Цветочно – декоративные культуры	Некорневая подкормка
	Марка: Цинка		
	0,5-2,0 кг/га	Зерновые,зернобобовые,технические культуры	Некорневая подкормка с инте
	5-7 кг/га		Корневая подкормка (внесе водами)
	0,1-1,0 кг/га	Плодовые, плодово-ягодные, декоративные культуры,виноградники	Некорневая подкормка с инте
	5-7 кг/га		Корневая подкормка (внесе водами)
	0,05-0,4 кг/га	Овощные, цветочнодекоративные культуры	Некорневая подкормка с инте
	5-7 кг/га		Корневая подкормка (внесе водами)

одорастворимое удобрение

в е «Doktor yive алия, ООО аина», имия », /14	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
с в е «Doktor yive алия, ООО аина», имия », /14	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
в е «Doktor yive	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

алия, ООО аина», имия », /14			
менты, живые макроорганизмы (азото- и фосфобактерии)			
лкон 5	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
ы в хелатной форме, в виде неорганических солей и серебра коллоидной формы			
ОО ОО оссия 17	0,1-0,3 л/т. Расход рабочего растрвора – 10-20 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка сем
	1,5-3,0 л/га. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га	Зерновые, зернобобовые культуры	Некорневая подкормка ра вегетационного периода 2-3 раза
	2,5-5,0т л/га. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га	Технические, кормовыекультуры	
	0,3-0,4 л/т. Расход рабочего раствора -20 л/т	Картофель	Предпосадочная обработка кл
	2,0-3,0 л/га. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га	Картофель	Некорневая подкормка ра вегетационного периода 2-3 раза
		Овощные, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка ра вегетационного периода 3-6 раз
	5,0-10,0 л/га. Расход рабочего раствора – 800-100 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка ра вегетационного периода 3-4 раза
е			
с, Раис, Ж antes», 4	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
марки Mo, Fe,	1 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га	Полевые культуры (зерновые, зернобобовые, технические, кормовые и др.)	Некорневая подкормка в развития растений 1-3 раза с инт
ntes»,	1,5-2 л/га Расход	Картофель	Некорневая подкормка в фаз

4	рабочего раствора 300-600 л/га		в фазе бутонизации и после цвет
		Томаты, огурцы, перец, кабачки, баклажаны, тыква, арбузы и др	Некорневая подкормка в пе листьев до начала цветения 1-3 р 10-14 дней
	1-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га	Зеленные культуры	Некорневая подкормка чере появления всходов или высадки 10 дней после первой подкормки
	2-3 л/га Расход рабочего раствора 800-1000 л/га	Плодово-ягодные культуры	Некорневая подкормка после с интервалом 7-10 дней и в пери раза с интервалом 10-14 дней
		Декоративные деревья и кустарники	Некорневая подкормка 1-3 ра 10-15 дней
	1-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га	Цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка 2-6 ра
РК, Ж antes», 4	100-150 мл/100 л рабочего раствора	Зерновые колосовые культуры (пшеница, рожь, овес, ячмень, тритикале)	Применяется в качестве конд при опрыскивании сельскохозя путем добавления в рабочий рас
		Сахарная свекла	
		Подсолнечник	
		Зернобобовые культуры (соя, горох, нут, вика, кормовые бобы)	
		Рапс	
		Лен	
		Гречиха	
		Картофель	
		Капуста	
		Лук репчатый	
		Зеленные культуры (салат, петрушка, укроп, сельдерей)	
		Семечковые сады	
		Косточковые сады	
		Столовая свекла	
		Томат	
К НЭСТ 16			

омплекное удобрение

	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

) ystem», rtilizer d», cOO 2			
удобрение (биостимуляторы и аминокислоты)			
ystem», lantica через ия» 2	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
ые удобрения			
Ж, RIAL cOO КР 5	Некорневое 150-500 мл/га Корневое 2-4 л/га Субстрат/гидропоника 1,5 – 2,5 л/1м3	Все сельскохозяйственные культуры	В период вегетации
RIAL , через », КР 5	Обработка семян: 250-1000 мл/т семян Некорневое 150-500 мл/га Корневое капельное: 1 л/га Гидропоника: 250 мл/га	Все сельскохозяйственные культуры	Обработка семян перед посе
RIAL cOO КР 5	Обработка семян: 250-1000 мл/т семян Некорневое 150-500 мл/га Корневое капельное: 3-5 л/га	Все сельскохозяйственные культуры	Обработка семян перед п вегетации
енте), ое, RIAL , через », КР 5	Некорневое 250-500 мл/га Корневое капельное: 2,5-10 л/га Гидропоника: 1,5-2,5 л/га	Все сельскохозяйственные культуры	В период вегетации
LPROS O	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

раина /15			
Ж » 3	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
АС», ЗАО , КР 17	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
еское Инком», тостан 05/14	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
е удобрение с повышенным содержанием калия			
, Ж, RIAL cOO КР 5	Некорневое 500-1000 мл/га Корневое капельное: 4-6л/га	Все сельскохозяйственные культуры	Опрыскивание в период вегет
биоудобрение на основе микроводорослей			
К AEN ания, ипар- 17	**Листовая/внекорневая**		
	Плодовые культуры	250-300 мл/100 л воды	На стадии созревания, расцветания. Кратность обрабо приемений каждые 15 дней.
	Фруктовые, цитрусовые и оливковые деревья	200-300 мл/100 л воды	От 2-х до 4-х применений
	Виноград	200-250 мл/100 л воды	От 3-х до 6-ти применений
	Почвенный/корневой		
	Плодовые культуры	5-7 л/га	От 4-х до 6-ти применений цикл
	Фруктовые, оливковые деревья		От 2-х до 5-ти применений в
	Виноград	4-6 л/га	От 3-х до 5-ти применений цикла
+молибден+вода			
менты рея	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

3			
е кислоты			
0 г/л) , РФ, ициды» 3	0,50	Томаты	Опрыскивание в фазе 1, 2 и 3 л/га
	0,1	Лук на семена	Опрыскивание в фазе масс через 7 дней после первой обраб после второй обработки. Расход-
		Лук на репку	Опрыскивание в фазе 4 лист после первой обработки. Расход-
		Картофель	Опрыскиванеи в фазе на период массового цветения и ч обработки. Расход-300 л/га
	0,015	Огурцы	Опрыскивание в фазе 2-4 начала цветения, массового цвет после третьей обработки. Расход
	0,040	Капуста белокачанная	Опрыскивание в фазе 6-7 массового завязывания кочанов.
	0,020	Соя	Опрыскивание в фазе начал 300 л/га
		Фасоль	Опрыскивание в фазе массового цветения и через 7 обработки. Расход-300 л/га
	0,030	Свекла сахарная	Опрыскивание в фазе 8-10 н через 15 дней после первой обр л/га
	0,075	Хлопчатник	Опрыскивание в фазе нач начала цветения. Расход-300 л/га
	0,040	Подсолнечник	Опрыскивание в фазе 2-4 цветения. Расход-300 л/га
	0,050	Люцерна на смена	Опрыскивание в фазе нач массового цветения. Расход-300
		Гречиха	Опрыскивание в фазе на цветков нижних соцветий и масс
		Ячмень	Обработка семян. Расход-10
			Опрыскивание в фазе кущени
	0,060	Овес	Обработка семян. Расход-10
	0,050		Опрыскивание в фазе кущени
	0,050	Рис	Обработка семян. Расход-10
		Кукуруза	Обработка семян. Расход-10

			Опрыскивание в фазе 5-5-6 л/га
		Виноград	Опрыскивание цветения и после первого. . Расход-300 л/га
		Пшеница яровая и озимая	Предпосевная обработка с л/га
	0,030	Пшеница яровая	Предпосевная обработка с л/га

ислоты+N+P+K+Ca+органические вещества+pH

жидкое, спания, Жер», 5	3-5	Луковичные культуры	На 10 или 15, 30, 45 и 60 день п сходов культуры
	1-2	Зерновые	В фазе раннего проявления всхо
	3-5	Томат, перец, огурец, тыква, горох	На 10 или 15 день пересадки ил носить каждые 7-10 дней до конца
	4-6	Бахчевые культуры (арбуз, дыня)	На 10 или 15, 30,45 дни после азвития плодов, и после каждого с
	3-5	Ягодные культуры (клубника, ежевика, малина, черника)	На 10-15 день после пересадки, 0 дней . Начало плодоношения, повторят
	5	Фруктовые деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива)	В начале вступления в полную к оста побегов. Каждые 15-20 дней, до конца ве пи плодоношения

Фолиар, ть antes», 4	0,25-1,5 л/га	Зерновые культуры	Некорневая подкормка 1-2 периода вегетации
		Сахарная свекла	Некорневая подкормка в вфазе 6-8 листьев и в фазе 8-10
		Кукуруза, подсолнечние	Некорневая подкормка в фаз 6-8 листьев и в начале цветения
		Соя и зернобобовые культуры	Некорневая подкормка в ф начале цветения
		Кормовые культуры (люцерна, клевер)	Некорневая подкормка после выпаса при отрастании травостоя
		Рис	Некорневая подкормка в выхода в трубку и в фазе выхода

ая кислота, 2 гидрокси кальциевая соль

Г ational 3	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
оламин	
(В К ция, » КР 5	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
ми, орошок ческое Инком», отостан /14	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
енаят натрия+нитрофенолят натрия+нитрогваяколят натрия)	
, ВР сахи .о.», риста ейт 1/17	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
лементы	
талия, », КР 3	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
лементы	

Мила, Яра дия, О КР 5/16	Агрохимические показатели почвы с учетом требований культуры	Все культуры	Основное, припосевное ве составление питательных торфо-
элементы			
в РП ОМРО мания, ICL ьгия, лган», 2/17	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
CRF, Г) РРИС», ОсОО Р /16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Г) РРИС», ОсОО Р /16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
акт М, Г) РРИС», ОсОО Р /16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

астер нь, Г) РРИС», ОсОО Р /16	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
ты			
Р талия, н», блика 3	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
о и микроэлементы			
именте нские рения», 6	15-20 г/10 л	Овощные культуры	Подкормка растений в период или формирования кочана у кап у моркови и свеклы 3-4 раза с дней
		Зеленные культуры	Корневая подкормка растени после появления всходов
	25г/10 л	Картофель	Подкормка растений в фазе б 10-15 дней
	15-20 г/10 л	Земляника	Подкормка растений ве возобновления вегетации, в после цветения и после сбора ур
	10-20 г/10л	Ягодные(декоративные культуры)	Подкормка растений в п плодов 1-2 раза с интервалом 10
	20-25 г/10 л	Плодовые (декоративные культуры0	
	10-15 г/10 л	Цветочно-декоративные культуры	Подкормка растений через появления всходов или высадки р раз с интервалом 10-15 дней
	1,5-2,0 г/л	Цветочно-декоративные культуры (горшечные)	Некорневая подкормка ра активного роста
именте нские рения», 8/16	1,5-1,0 г/л	Овощные, цветочные культуры (рассада)	Подкормка растений в фа листьев, через 10-15 дней после 1-2 раза до высадки в грунт
	50 г/10л	Овощные, цветочные культуры (рассада)	Полив почвы перед высадкой
	15-20 г/10л	Овощные культуры	Подкормка растений через высадкии рассады (или поя далее 1-2 подкормки с интервало

	10-15г/10л	Зеленные культуры	Корневая подкормка растен после появления всходов
	25г/10л	Картофель	Внесение при посадке
	15-20г/10л	Земляника	Подкормка растений ве возобновления вегетации и в ф расчета 15-20 г/10л воды, расход Корневая подкормка -4-10 л/м л/10 м2
		Ягодные, декоративные культуры (кустарники)	Подкормка растений ве возобновления вегетации
	20-25г/10л	Плодовые, декоративные культуры (деревья)	
	10-15г/10л	Цветочно-декоративные культуры	Подкормка растений через появления всходов или высадки р раза с интервалом 10-15 дней
	1,5-2,0г/л	Цветочно-декоративные культуры (горшечные)	Некорневая подкормка ра активного роста
, в е нские рения», 3/16	30-50г/10л	Картофель, свекла столовая, капуста, морковь	Подкормка растений через появления всходов или высадки интервалом 10-15 дней
	20-25 г/10л	Лук, томат, огурец, дыня	
	10-15г/10л	Редис, салат	Подкормка растений через появления всходов или высадки интервалом 7-10 дней
	15-20г/10л	Баклажан, перец	Подкормка растений через появления всходов или высадки интервалом 7-10 дней
		Земляника	Подкормка растений ве возобновления вегетации, в после цветения и после сбора ур
	10-20г/10л	Ягодные, декоративные культуры(кустарники)	Подкормка растений ве возобновления вегетации и интервалом 10-15 дней из расчет
	25г/10л	Плодовые, декоративные культуры (деревья)	
	20-25г/10л	Цветочно-декоративные культуры	Подкормка растений через пояления всходов или высадки р раз с интервалом 10-15 дней
	1,5-2,0г/л	Цветочно-декоративные культуры (горшечные)	Некорнвая подкормка ра активного роста

тилсилатрана и ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевой соли, в соотношении 9:1

Таб ь» РФ	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

3	
2%, B2O3 – 0,16%, Mo – 0,002%	
Ltd., я 4	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
г/л), , КР 5	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
5% и ЭДТК	
(Zn 5), У, , ОсОО 5	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

WSNPK20-20-20 Fe, WSNPK12-3-43 Fe, WSNPK 0-43-28+2MgO+0,5B			
Нутри в ассортименте Компания «XIAMEN TOPUSING IMPEXP Co., ltd», КНР, через ОсОО «Агрохимия», КР VIII -99 04/11/16	Все сельскохозяйственные культуры	2-3 кг/га	Опрыс
Нутривант Универсал плюс 19-19-19Нутривант картофельный 0-43-28 +макро микроэлементы+фертивант	Картофель и все корнеплоды	2-3 кг/га	Опрыс
Нутривант бахчевый 6-16-31 + макро микроэлементы+фертивант	Бахчевые культуры (арбуз,дыня,огырцы,патиссоны, кабачки,тыква)	2-3 кг/га	Опрыс

Нутривант томатный 6-18-37 + макро микроэлементы+фертивант2-3 кг/га	Пасленовые (Томат, баклажан, перец)	2-3 кг/га	Опрыс
Нутривант плодовый 12-5-27 + макро микроэлементы+фертивант	Плодово-декоративные деревья и кустарники	2-3 кг/га	Опрыс
Нутривант хлопковый 4-24-32 +макро микроэлементы+фертивант	Хлопчатник	2-3 кг/га	Опрыс
Нутривант рис 0-46-30 +макро микроэлементы+фертивант	Рис	2-3 кг/га	Опрыс
Нутривант сахарная свекла 0-36-24 +макро микроэлементы+фертивант	Сахарная свекла и все корнеплоды	2-3 кг/га	Опрыс
Нутривант дрип 12-6-28+7,4CaO+макро микроэлементы+Пекацид(комплексон)	Уникальное удобрение для капельного полива	1-1,5 кг на 100 литров воды	5-6 раз

иологические удобрения

ктерии

n ии ая я»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
n e	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

ические средства защиты растений

ococcum

	Суспензия				
у- а	50 мл/кг	Овощные культуры, цветы	Фиксация атмосферного азота, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян	1
	100-200 мл/т	Зерновые культуры			
	200-500 мл/т	Бобовые, крупяные культуры			
	300-500 мл/т	Кукуруза			

500 мл/т	Свекла			
700 мл/т	Технические(масличные культуры)			
100-200 мл/т	Картофель		Обработка клубней перед посадкой	
10мл/100ед.	Овощные, плодово-ягодные культуры		Обработка рассады перед посадкой	
	Саженцы фруктовых деревьев		Обработка саженцев перед посадкой	
500 мл/га	Зерновые, бобовые, технические (масличные), крупяные культуры, свекла, картофель		Корневая подкормка в период вегетации	
1 л/га	Овощные, ягодные культуры, цветы			2-3
2 мл/дерево	Саженцы фруктовых деревьев		Корневая подкормка после посадки	1
50-100мл/га	Зерновые, бобовые, технические(масличные), крупяные культуры, свекла, картофель		Некорневая подкормка (опрыскивание) в период вегетации	
500мл/га	Овощные, ягодные культуры, цветы			
Порошок				
10 г/м^2	Овощные, плодово-ягодные культуры, фруктовые саженцы, цветы	Фиксация атмосферного азота, повышение урожайности	Внесение в почву перед посевом и посадкой рассады, саженцев	1
1 г/кг почвенной смеси	Овощные, плодово-ягодные культуры, цветы		Внесение в почвенную смесь пред посевом семян, пред пикированием рассады	

ensis var. kurstaki

2-3	Томат открытого грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)
1	Картофель	Картофельная моль	Погружение клубней перед закладкой на хранение в 1 %-й	5(1)

			рабочий раствор. Расход рабочей жидкости - 100 л/15 т клубней	
	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации при численности не более 20 особей на 100 колосьев. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
0,5-1	Капуста, другие овощные культуры	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)
1,5-2		Капустная совка (гусеницы 1-3 возраста)		
0,5-1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня	Яблонная и плодовая моли (гусеницы 1-3 возраста)		
1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня, декоративные древесные породы	Американская белая бабочка, боярышница (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста сорта и деревьев)	
1-1,5		Златогузка, пяденицы, листовертки весенней группы, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)		
2-3	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста сорта и деревьев)	5(3)
1-1,5	Смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника	Листовертки, крыжовниковая огневка (гусеницы 1-3 возраста),	Опрыскивание в период вегетации против каждого	5(2)

		крыжовниковый пилильщик (ложногусеницы 1-3 возраста)	поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га, на землянике - 300-400 л/га	
1	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, подсолнечник, морковь, капуста	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
2-3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации через 8-10 дней после начала лета бабочек. Обработка через 5-7 дней против каждого поколения вредителя. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	
0,5	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)
1	Амми зубная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)
	Валериана лекарственная			
	Бессмертник песчаный	Репейница (гусеницы 1-4 возраста)		
1,2	Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)		
	Ноготки лекарственные	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), совки (гусеницы 1-4 возраста)		

	Фенхель	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		
	Стальник полевой	Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)		
	Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		5(2)
1,5	Ревень тангут-ский, паслен дольчатый	Озимая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе 2-3 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	
	Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	
2	Шиповник	Листовертки, златогузка, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(1)
3	Черемуха, яблоня	Горностаевые моли (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста сорта и деревьев)	5(2)
3 (А)	Дуб	Златогузка, зеленая дубовая листовертка, кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	-(2)
	Дуб, береза	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)		
	Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-3 возраста)		
	Сосна	Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3		

		возраста)		
	Пихта, кедр, лиственница	Сибирский шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)		
	Пихта	Пихтовая пяденица		
3	Городские зеленые насаждения	Летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-800 л/га	
20-30 мл/10л воды (Л)	Капуста, свекла, морковь	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки, луговой мотылек, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации и против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости -0,5-1 л/10 $м^2$	5(2)
20-30 мл/10л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста сорта и деревьев)	5(3)
	Плодовые культуры	Яблонная и плодовая моли, златогузка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации и против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости -2-5 л/дерево (в зависимости от возраста сорта и деревьев)	5(2)
	Смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника	Смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации и против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей	

				жидкости - 2-5 л/куст (в зависимости от возраста сорта куста), на землянике - 2-5 л/10 м^2	
		Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации и против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/куст	
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации и против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости -2-10 л/10 м^2	
		Лекарственные культуры	Листовертки, моль, златогузка, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		

ngiensis, var. thuringiensis

ин г, о, ан	2-5	Картофель, томат, баклажан, перец	Колорадский жук	Опрыскивание в период массового отрождения личинок каждого поколения вредителя с интервалом 6-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)
	2	Капуста и другие овощные культуры	Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
	1-1,5	Капуста и другие овощные культуры	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)
	2-3	Яблоня, слива, абрикос,	Яблонная и	Опрыскивание в	5(2)

	шелковица, груша, вишня, черешня	плодовая моли, боярышница, американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	
3-5		Листовертки, шелкопряды, пяденицы, златогузка (гусеницы 1-3 возраста)		
21-30	Огурец защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,7-1 % раствором с интервалом 15-17 дней. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(6)
2	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, подсолнечник, морковь, капуста	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)
	Свекла сахарная	Матовый мертвоед	Опрыскивание в период массового отрождения личинок при численности более 2/м^2 против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
6-8	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	
5	Смородина, крыжовник	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3	Опрыскивание в период вегетации против каждого	

		возраста), пилильщики, листовая галлица	поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	
		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 15-17 дней. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	5(6)
2-4	Хмель	Хмелевая тля	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	5(2)
2-3		Листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	
2,5-3	Люцерна (семенные посевы)	Люцерновый клоп (личинки 3-4 возраста)	Опрыскивание в период цветения с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
5		Люцерновая совка (гусеницы младших возрастов)		
		Пяденицы (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)
6 г/м^2	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. Расход рабочей жидкости -0,2 л/м^2	-(1)
2	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с	5(3)

			интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
2-3	Амми зубная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)
	Мачек желтый	Шовный листоед (личинки 1-2 возраста)		
	Бессмертник песчаный	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), репейница (гусеницы 1-4 возраста)		
3	Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	
	Кенаф	Озимая и хлопковая совки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
	Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)		
	Ноготки лекарственные, фенхель	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		
	Стальник полевой	Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)		
	Ревень тангутский, паслен дольчатый	Подгрызающие совки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	
	Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
	Шиповник	Листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе отрастания побегов - бутонизации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	
2 (А)	Дуб	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста),	Опрыскивание в период вегетации.	-(1)

		пяденица зимняя и обдирало (гусеницы 1-2 возраста)	Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	
1-1,5 (А)		Непарный шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)		
2-2,5 (А)	Береза	Непарный шелкопряд, летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-2 возраста)		
40-100 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание при появлении личинок 1-2 возраста. Интервал между обработками при среднесуточной температуре выше 20 °С - 6-7 дней, ниже 20 °С - 8-10 дней. Расход рабочей жидкости 0,5-1,5 л/10 м^2	5(3)
	Томат, баклажан, перец			5(4)
40-80 г/10 л воды (Л)	Яблоня, слива, абрикос, шелковица, груша, вишня, черешня	Яблонная и плодовая моли, яблонная плодожорка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Во время цветения обработки запрещены. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(2)
80-100 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-17 дней. Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м^2	5(6)
40-50 г/10 л воды (Л)	Капуста, морковь, свекла	Капустная совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с	5(2)

			интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м^2
60-80 г/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)
80-100 г/10 л воды (Л)	Смородина, крыжовник	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, листовая галлица	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости -0,5-2 л/куст (в зависимости от возраста и сорта куста)
		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости -0,5-2 л/куст (в зависимости от возраста и сорта куста)
40-50 г/10 л воды (Л)	Хмель	Хмелевая тля, листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости -2 л/10 м^2
50-70 г/10 л воды (Л)	Лекарственные культуры	Листовертки, моли, совки, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание против каждого поколения вредителей с интервалом 6-10 дней. Расход рабочей

				жидкости - 0,5-2 л/10 м^2	
	3	Пшеница	Корневые гнили	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
			Мучнистая роса, септориоз, ржавчина бурая	Опрыскивание в период выход в трубку-колошение с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	1(2)
	2 г/кг	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 0,2 % суспензии препарата в течение 3-6 часов с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	-(1)
	6			Полив рассады в лунку при высадке на постоянное место, повторный - под корень через 3-4 недели. Расход рабочей жидкости - до 3000 л/га	1(2)
	7-14		Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации для профилактики и при появлении первых признаков болезни с интервалом 6-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 2000 л/га	1(3)
	7-12	Томат защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации для профилактики и при появлении первых признаков болезни с интервалом 8-10 дней. Расход рабочей	1(2)

			жидкости - до 1500 л/га	
3-4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации для профилактики и при появлении первых признаков болезни с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)
4-5 г/кг	Капуста (белокочанная, цветная, семенники)	Бактериозы, полегание	Предпосевное замачивание семян в 0,5 %-й суспензии препарата с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/кг семян	-(1)
5 г/л воды			Обмакивание корней рассады и маточников перед посадкой в 0,5 %-й суспензии препарата. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 корней	
2			Опрыскивание растений через месяц после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	
12			Полив рассады под корень после высадки на постоянное место. Расход рабочей жидкости - до 3000-4000 л/га	
7-10	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га	1(3-4)
2	Подорожник большой	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей	1(1)

			жидкости - 200-300 л/га	
4-5	Смородина черная		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	1(2)
3-4	Земляника		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	1(4)
6-8	Земляника	Мучнистая роса	Полив растений под корень. Расход рабочей жидкости - до 4000 л/га	1(3)
5-7	Хмель	Ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	1(4)
1 г/л воды	Гвоздика защищенного грунта	Фузариоз	Замачивание черенков в 0,1 %-й суспензии препарата в течение 15 минут перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 1 л/500-1000 черенков	-(1)
1-3 г/л воды	Роза защищенного грунта		Замачивание черенков в 0,1-0,3 %-й суспензии препарата в течение 15 минут перед посадкой. Расход рабочей жидкости -1 л/500-1000 черенков	
5-7		Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 1-2 раз в месяц. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га	-(2)
1,5-2	Мята перечная		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	1(2)
5 г/кг	Эхинацея пурпурная, змееголовник молдавский	Корневые гнили	Протравливание семян за сутки до посева. Расход рабочей	-(1)

			жидкости - 1-1,5 л/кг семян	
2 г/кг семян	Женьшень	Корневые и прикорневые гнили	Замачивание стратифицированных семян 0,2 % суспензии препарата в течение 30 минут с последующим просушивание. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	
1,5-2		Прикорневые гнили, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам болезней. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(1-2)
2 г/л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые гнили	Замачивание семян перед посевом в 0,2 %-й суспензии препарата в течение 3-6 часов с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости – 100-150 мл/100 г семян	-(1)
1 г/л воды (Л)	Гвоздика защищенного грунта	Фузариоз	Замачивание черенков в 0,1 %-й суспензии препарата в течение 15 минут перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 1 л/500-1000 черенков	
1-3 г/л воды (Л)	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Обмакивание черенков перед посадкой в 0,1-0,3 %-й суспензии препарата. Расход рабочей жидкости - 1 л/500-1000 черенков	
7 г/л воды (Л)			Опрыскивание в период вегетации не реже 1-2 раз в месяц. Расход рабочей жидкости -10 л/100 м^2	-(2)

	2	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
	0,2		Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкание рядков - бутонизация, повторно с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)
	0,4 г/кг	Капуста белокочанная	«Черная ножка», слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
	6 г/10 л воды			Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт. Расход рабочей жидкости – 10 л/1000 растений	
	0,2			Опрыскивание рассады через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – 200-500 л/га	-(2)
	0,2 г/кг	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
	0,2		Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)

0,2 г/кг	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
1-1,5			Полив в лунку 0,05-0,06 %-й рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место. Расход рабочей жидкости - до 3000 л/га	
0,2		Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - до 2000 л/га	-(2-3)
0,4 г/кг	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
0,2		Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(3)
0,4 г/кг	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
1-1,5	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в лунку 0,05-0,06 % рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом 3 недели. Расход рабочей	-(2)

			жидкости - до 3000 л/га	
0,2		Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 3000 л/га	-(2-3)
	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)
3		Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости - 10000 л/га или 1 л/м^2	
200 г/2-3 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 2-3 л/100 кг клубней	-(1)
2 г/10 л воды (Л)		Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкание рядков - бутонизация, повторно - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	-(2)
0,2 г/л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости 100-150 мл/100 г семян	-(1)
5-6 г/10 л воды (Л)			Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,05 %-й рабочей жидкостью через 3 дня после	

			высадки в грунт. Расход рабочей жидкости -1 л/100 растений (погружение); 150-200 мл/растение (полив)	
2 г/10 л воды (Л)		Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	-(2)
0,2 г/л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)
5-6 г/10 л воды (Л)			Полив в лунку 0,05-0,06 % рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	
1 г/10 л воды (Л)		Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м^2	-(2-3)
0,4 г/л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневвые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости 100-150 мл/100 г семян	-(1)
2 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое -	-(3)

			профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	
0,4 г/л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)
5 г/10 л воды (Л)			Полив в лунку 0,05 %-й рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом 3 недели. Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)
1 г/10 л воды (Л)		Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м^2	-(2-3)
0,4 г/л воды (Л)	Капуста белокочанная	«Черная ножка», слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости 100-150 мл/100 г семян	-(1)
0,6 г/л воды (Л)			Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт. Расход рабочей жидкости - 1 л/100-150 растений	
2 г/10 л воды (Л)			Опрыскивание рассады через 7-10 дней после	-(2)

				высадки в грунт и повторно через 2-3 недели. Расход рабочей жидкости 10 л/100 м^2	
		Цветочные растения открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	-(1)
	3 г/10 л воды (Л)		Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости – 10 л/10 растений	
	0,2 г/л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м^2	
	0,3 г/л воды (Л)		Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 растений	
П,	2	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
	0,2		Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкание рядков - бутонизация, повторно - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)
	0,4 г/кг	Капуста белокочанная	«Черная ножка», слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
	6 г/10 л воды			Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт.	

			Расход рабочей жидкости – 10 л/1000 растений	
0,2			Опрыскивание рассады через 7- 10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – 200-500 л/га	-(2)
0,2 г/кг	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
0,2		Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)
0,2 г/кг	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
1-1,5			Полив в лунку 0,05-0,06 %-й рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место. Расход рабочей жидкости - до 3000 л/га	
0,2		Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - до 2000 л/га	-(2-3)
0,4 г/кг	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили,	Предпосевное замачивание семян в	-(1)

		фузариозное увядание	течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	
0,2		Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(3)
0,4 г/кг	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)
1-1,5	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в лунку 0,05-0,06 % рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом 3 недели. Расход рабочей жидкости - до 3000 л/га	-(2)
0,2		Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 3000 л/га	-(2-3)
	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)
3		Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости - 10000 л/га или 1 л/м^2	
200 г/2-3 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей	-(1)

			жидкости - 2-3 л/100 кг клубней	
2 г/10 л воды (Л)		Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкание рядков - бутонизация, повторно - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	-(2)
0,2 г/л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости -100-150 мл/100 г семян	-(1)
5-6 г/10 л воды (Л)			Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,05 %-й рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт. Расход рабочей жидкости 1 л/100 растений (погружение); 150-200 мл/растение (полив)	
2 г/10 л воды (Л)		Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	-(2)
0,2 г/л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)
5-6 г/10 л			Полив в лунку 0,05-	

воды (Л)			0,06 % рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	
1 г/10 л воды (Л)		Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м^2	-(2-3)
0,4 г/л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости 100-150 мл/100 г семян	-(1)
2 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	-(3)
0,4 г/л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)
5 г/10 л воды (Л)			Полив в лунку 0,05 %-й рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом 3 недели. Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)
1 г/10 л воды		Пероноспороз,	Опрыскивание в	-(2-3)

(Л)		мучнистая роса	период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м^2	
0,4 г/л воды (Л)	Капуста белокочанная	«Черная ножка», слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости 100-150 мл/100 г семян	-(1)
0,6 г/л воды (Л)			Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт. Расход рабочей жидкости - 1 л/100-150 растений	
2 г/10 л воды (Л)			Опрыскивание рассады через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели. Расход рабочей жидкости 10 л/100 м^2	-(2)
	Цветочные растения открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м^2	-(1)
3 г/10 л воды (Л)		Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости – 10 л/10 растений	
0,2 г/л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м^2	

	0,3 г/л воды (Л)		Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 растений	
	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				
	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				
	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				
С	0,5-1,5	Куруза	ускорение сроков всхожести, обеспечение одновременного появления однородных всходов, повышение энергии прорастания семян; - повышение иммунной реакции растений на воздействие возбудителей болезней за счет действия компонентов биопрепарата, что по своей природе сходны с полисахаридами патогенов; - повышение стойкости растений к широкому спектру возбудителей болезней без эффекта привыкания, повышение стойкости к стрессам; - сбалансированное питание растений микро- и макроэлементами, обеспечение гормонами и витаминами, улучшение развития и ускорение сроков созревания; - улучшение качественного состава продукции (сокращение содержания		
	0,5-1,5	Технические культуры: подсолнух, лен			
	0,3-1,0	Зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес, просо			
	0,25-0,3	Зернобобовые культуры: фасоль, горох, бобы, соя и др.			
	0,25-0,3	Сидераты: - горчица, клевер и др. - бобовые - зернобобовая смесь			

			нитратов, увеличение содержания белков, клейковины, масла); - повышение урожайности на 10-30%; - снижение расхода минеральных удобрений, пестицидов и микроэлементов на 15-30%; - улучшение плодородия почвы.		
	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				

ensis var. Israelensis

ок	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				

ensis subsp.israilensis,

ПК о	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				

ensis.kurstaki.

д.	0,5-1	Капуста и овощные	Капустная и репная белянка, капустная моль, огневки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание растений в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	
	1,5-2		Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста)		
	0,5-1	Яблоня, слива, абрикос,черешня, груша,	Яблонная и плодовые моли (гусеницы 1-3		

	вишня	возраста)		
1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня, декоративные древесные породы	Американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)		
1-1,5		Златогузка, пяденицы, листовертки весенней группы, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)		
2-3	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней	
1-1,5	Смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника	Листовертки, крыжовниковая огневка (гусеницы 1-3 возраста), крыжовниковый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	
0,6-1	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, капуста, подсолнечник, морковь	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		
0,7	Картофель	Картофельная моль	Погружение клубней перед закладкой на хранение в 1%-й рабочий раствор. Расход -100 л/15 т клубней	
2-3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней	
0,5	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	
1	Амми зубнай	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		
	Бессмертник песчаный	Репейница (гусеницы 1-4 возраста)		
	Валериана	Луговой мотылек		

	лекарственная	(гусеницы 1-3 возраста)		
	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации при численности не более 20 особей на 100 колосьев	
1,2	Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	
	Ноготки лекарственные	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), совки (гусеницы 1-4 возраста)		
	Фенхель	Луговой мотылек(гусеницы 1-3 возраста)		
	Стальник полевой	Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)		
	Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		
1,5	Ревань тангутский, паслен дольчатый	Озимая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе 2-3 настоящих листьев	
	Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев	
2	Шиповник	Листовертки, златогузка, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	
0,8-1(А)	Дуб	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста), зеленая дубовая листовертка (гусеницы 1-2 возраста)		
0,5(А)		Кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)		
0,8-1	Дуб, береза	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)		
0,8	Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-2 возраста)		
1-1,1	Черемуха, яблоня	Горностаевые моли		

		(гусеницы 1-2 возраста)		
1-1,2	Сосна	Сосновый щелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)		
1-1,5		Щелкопряд монашенка (гусеницы 1-2 возраста)		
1		Сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-2 возраста)		
1-1,5	Городские зеленые насаждения	Летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-3 возраста)		
20-30 г/10л воды	Капуста, свекла, морковь	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки, луговой мотылек, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	
	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней. Расход-от 2 до 5 л на 1 дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	
	Плодовые культуры	Яблонная и плодовые моли, златогузка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход-от 2 до 5 л на 1 дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	
	Смородина, земляника, крыжовник, рябина черноплодная	Смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики		
	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход-от 2 до 5 л на 1 куст (в зависимости от	

				возраста и типа формирования куста)	
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	
		Лекарственные культуры	Листовертки, моль, златогузка, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход-1 л/10 м^2	
),	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению				

ensis subsp thuringiensis

П, д.	2-5	Картофель, томат, баклажан, перец	Колорадский жук	Опрыскивание в период массового отрождения личинок каждого поколения вредителя с интервалом 6-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)
	2	Капуста и другие овощные культуры	Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
	1-1,5	Капуста и другие овощные культуры	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)
	2-3	Яблоня, слива, абрикос, шелковица, груша, вишня, черешня	Яблонная и плодовая моли, боярышница, американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей	5(2)
	3-5		Листовертки,		

		шелкопряды, пяденицы, златогузка (гусеницы 1-3 возраста)	жидкости - 800-1200 л/га	
21-30	Огурец защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,7-1 % раствором с интервалом 15-17 дней. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(6)
2	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, подсолнечник, морковь, капуста	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)
	Свекла сахарная	Матовый мертвоед	Опрыскивание в период массового отрождения личинок при численности более 2/м^2 против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
6-8	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	
5	Смородина, крыжовник	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, листовая галлица	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	
		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 15-17 дней.	5(6)

			Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	
2-4	Хмель	Хмелевая тля	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	5(2)
2-3		Листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	
2,5-3	Люцерна (семенные посевы)	Люцерновый клоп (личинки 3-4 возраста)	Опрыскивание в период цветения с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
5		Люцерновая совка (гусеницы младших возрастов)		
		Пяденицы (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)
6 г/м^2	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. Расход рабочей жидкости - 0,2 л/м^2	-(1)
2	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)
2-3	Амми зубная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)
3	Мачек желтый	Шовный листоед (личинки 1-2 возраста)		
	Бессмертник песчаный	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), репейница (гусеницы 1-4 возраста)		
	Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев. Расход	

			рабочей жидкости - 400-600 л/га	
	Кенаф	Озимая и хлопковая совки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
	Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)		
	Ноготки лекарственные, фенхель	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		
	Стальник полевой	Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)		
	Ревень тангутский, паслен дольчатый	Подгрызающие совки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	
	Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
	Шиповник	Листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе отрастания побегов - бутонизации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	
2 (А)	Дуб	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста), пяденица зимняя и обдирало (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	-(1)
1-1,5 (А)		Непарный шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)		
2-2,5 (А)	Береза	Непарный шелкопряд, летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-2 возраста)		
40-100 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание при появлении личинок 1-2 возраста. Интервал между обработками при среднесуточной температуре выше 20 °С - 6-7 дней, ниже 20 °С - 8-10 дней. Расход рабочей	5(3)
	Томат, баклажан, перец			5(4)

			жидкости - 0,5-1,5 л/10 м^2	
40-80 г/10 л воды (Л)	Яблоня, слива, абрикос, шелковица, груша, вишня, черешня	Яблонная и плодовая моли, яблонная плодожорка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Во время цветения обработки запрещены. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(2)
80-100 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-17 дней. Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м^2	5(6)
40-50 г/10 л воды (Л)	Капуста, морковь, свекла	Капустная совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м^2	5(2)
60-80 г/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	
80-100 г/10 л воды (Л)	Смородина, крыжовник	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, листовая галлица	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 0,5-2 л/куст (в зависимости от	

			возраста и сорта куста)
		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости - 0,5-2 л/куст (в зависимости от возраста и сорта куста)
40-50 г/10 л воды (Л)	Хмель	Хмелевая тля, листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 2 л/10 м^2
50-70 г/10 л воды (Л)	Лекарственные культуры	Листовертки, моли, совки, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание против каждого поколения вредителей с интервалом 6-10 дней. Расход рабочей жидкости - 0,5-2 л/10 м^2

uefaciens

)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

japonikum ,Rhizobium leguminosarum, биологические активные продукты жизнедеятельности бактерий

НТ Т-	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

у-					

nulovirus (CpGV)

ин	0,1	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-1000 л/га	-(4)
		Персик, нектарин	Восточная плодожорка		-(6)
	1 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	-(4)
ио		Персик, нектарин	Восточная плодожорка		-(6)

л, 32 г/л, комплекс стрептотрициновых антибиотиков

д –	1,5-2	Пшеница и ячмень озимые	Корневые гнили, базальный бактериоз, черный бактериоз	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
О				Опрыскивание в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
	2	Огурец защищенного грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, трахеомикозное и бактериальное увядание	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – до 1500 л/га	
	6-8			Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующее – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – до 4000 л/га	2(2)

2		Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов. Расход рабочей жидкости – до 2000 л/га	2(1)
2-3	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – до 1500 л/га	-(1)
6-8			Полив под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующее – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – до 4000 л/га	2(2)
2	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, альтернариоз, черная бактериальная пянистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 300-600 л/га	
			Полив под корень или опрыскивание рассады в фазе 2-4 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	-(1)
8			Полив в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 4000 л/га	2(2)
1-2	Яблоня	Бактериальный ожог, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, формирования завязи, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром	2(5)

			до 4-5 см. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га	
20 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание	Полив рассады под корень 0,2 %-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующее – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/расте-ние (на постоянном месте)	2(2)
		Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации через 7-10 дней после высадки растений на постоянное место, последующее – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м^2	2(1-2)
20 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень 0,2 %-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующее – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/расте-ние (на постоянном месте)	2(2)
	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, альтернариоз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей	-(2)

				жидкости – 10 л/100 м^2	
		Яблоня	Бактериальный ожог, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, формирования завязи, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево	2(4)

лиэдроза хлопковой совки Helicoverpa armigera Hbn. Штамм ХС-18

Ф	5х10^9 полиэдров/ га+300 гр (ИЗ)+40 мл/га	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание	-(2)

ержанием N-P-K 2-5-5

Р», КР	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

ых авермектинов Аверсектин С

%)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

ценаля (97%) и цис-9-гексадеценаля (3%)

а	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

цис-14 – гексадекатриенилацетат

с	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

екадиенилацетат	
а с	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
одекадиенол	
с 1	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
ат (8%), цис-5-тетрадеценилацетат (8%), цис-7-додеценилацетат (42%) и цис-9-тетрадеценилацет (42%)	
0,1	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
ол +О-нитрофенол + 5-нитрофенол, 9+6+3 г/л	
ан D» 4	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
индола 6 г/л, с содержанием N-P-K 10-5-5	
Р	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
ид	
	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

ГР	

я кислота, 1г

ет »	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

орид

	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

0 О ГР	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

Э О	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

осеид Амблисейуса (Swirskii) развивающийся в пшеничных отрубях (2,4 кг) в количестве 160000 штук	
wirskii) центр МСХ и М КР	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению