

Priloga 5

Dodatne zahteve za uradno potrditev semena krmnih rastlin**Del A: Najvišja vsebnost vlage v semenu**

Za uradno potrditev mora seme izpolnjevati zahteve glede najvišje vsebnosti vlage, določene v Preglednici 1 tega dela priloge.

Preglednica 1: Najvišja vsebnost vlage v semenu posamezne vrste krmnih rastlin

Vrsta	Najvišja vsebnost vlage v semenu ⁽¹⁾ (utežni %)
1	2
TRAVE	
<i>Agrostis canina</i> <i>Agrostis capillaris</i> <i>Agrostis stolonifera</i> <i>Agrostis gigantea</i>	12
<i>Alopecurus pratensis</i>	13
<i>Arrhenatherum elatius</i>	13
<i>Bromus catharticus</i> <i>Bromus sitchensis</i>	13
<i>Cynodon dactylon</i>	13
<i>Dactylis glomerata</i>	13
<i>Festuca arundinacea</i> <i>Festuca filiformis</i> <i>Festuca ovina</i> <i>Festuca pratensis</i> <i>Festuca rubra</i> <i>Festuca trachyphylla</i>	13
<i>xFestulolium</i> <i>Lolium multiflorum</i> <i>Lolium perenne</i> <i>Lolium x hybridum</i>	13
<i>Phalaris aquatica</i>	14
<i>Phleum nodosum</i> <i>Phleum pretense</i>	13
<i>Poa annua</i> <i>Poa nemoralis</i> <i>Poa palustris</i> <i>Poa pratensis</i> <i>Poa trivialis</i>	12
<i>Trisetum flavescens</i>	12
METULJNICE	
<i>Galega orientalis</i>	12
<i>Hedysarium coronarium</i>	12
<i>Lotus corniculatus</i>	13
<i>Lupinus albus</i> <i>Lupinus angustifolius</i> <i>Lupinus luteus</i>	15

<i>Medicago lupulina</i>	13
<i>Medicago sativa</i>	
<i>Medicago x varia</i>	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	13
<i>Pisum sativum</i>	15
<i>Trifolium alexandrinum</i>	13
<i>Trifolium hybridum</i>	
<i>Trifolium incarnatum</i>	
<i>Trifolium pratense</i>	
<i>Trifolium repens</i>	
<i>Trifolium resupinatum</i>	
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	13
<i>Vicia faba</i>	15
<i>Vicia pannonica</i>	14
<i>Vicia sativa</i>	
<i>Vicia villosa</i>	
DRUGE KRMNE RASTLINE	
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	12
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	13
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	13

Opomba:

- (1) Vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage presežena.

Del B: Zahteve glede prisotnosti plevelnih rastlin, katerih seme je težko odstraniti iz partije semena krmnih rastlin

Število plevelnih rastlin, katerih seme je težko izločiti iz partije semena krmnih rastlin v semenskem posevku krmnih rastlin, ne sme presegati števila, določenega v Preglednicah tega dela priloge.

1. Trave, sabljasti triplat, krmna jastrebina, medenica, navadna nokota ter vrste iz rodov *Trifolium* in *Medicago*

Preglednica 1: Največje dovoljene vrednosti za preverjanje zapleveljenosti semenskih posevkov trav, sabljastega triplata, krmne jastrebine, medenice, navadne nokote ter vrste iz rodov *Trifolium* in *Medicago* na eno kontrolno enoto (100 m²)

Vrsta napake	Kategorija		
	O	C / C1 ¹	C2 ¹
Največje dovoljeno število rastlin drugih vrst ali plevelov, katerih seme je v postopku dodelave težko odstraniti iz semena	5	10	10

¹ kategoriji C1 in C2 veljata samo za lucerno (*Medicago sativa*)

2. Krmni ohrovt in oljna redkev

Preglednica 2: Največje dovoljene vrednosti za preverjanje zapleveljenosti semenskih posevkov krmnega ohrovt in oljne redkve na eno kontrolno enoto (100 rastlin)

Vrsta napake	Kategorija	
	O	C
Največje dovoljeno število rastlin plevelov, katerih seme je v postopku dodelave težko odstraniti od semena (npr. <i>Raphanus</i> ,	0	10

<i>Convolvulus, Sinapis, Vicia...</i>		
---------------------------------------	--	--

3. Krmne korenovke

Preglednica 3: Največje dovoljene vrednosti za preverjanje zapleveljenosti semenskih posevkov krmnih korenovk na eno kontrolno enoto (100 rastlin)

Vrsta napake	Kategorija	
	O	C
Največje dovoljeno število rastlin drugih vrst, katerih seme je v postopku dodelave težko odstraniti od semena (npr. <i>Sinapis</i> ...)	0	5

4. Krmni grah, navadna turška detelja ter vrste iz rodov *Lupinus* in *Vicia*

Preglednica 4: Največje dovoljene vrednosti za zapleveljenosti semenskih posevkov krmnega graha, navadne turške detelje ter vrste iz rodov *Lupinus* in *Vicia* na eno kontrolno enoto (100 rastlin)

Vrsta napake	Kategorija		
	O	C1	C2 ²
Splošna ocena zapleveljenosti	<=1	<=1	<=1

² kategorija C2 velja samo za volčji bob (*Lupinus spp.*), krmni grah (*Pisum sativum*), bob in grašice (*Vicia spp.*)