

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

24 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 22 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2016;

Vu l'avis 60.407/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis de la Commission d'Avis des Préparations de Plantes, donnés les 24 mars 2015, 22 septembre 2015, 10 novembre 2015, 15 décembre 2015, 16 février 2016 et 12 avril 2016;

Considérant la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2015/414 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires;

Considérant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (EU) 2015/2283 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments;

Considérant la communication à la Commission européenne, le 3 avril 2015, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Considérant la communication complémentaire à la Commission européenne, le 13 mai 2016, en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances

aux denrées alimentaires et en application de l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, l'annexe, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2012, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, mais aux conditions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être mises dans le commerce au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

Liste 1 : Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou dans les denrées alimentaires

Wetenschappelijke naam

Nom scientifique Famille

Famille Synoniemen

Synonymes Nederlandse naam

Nom Néerlandais Franse naam

- Nom Français Beperkingen en afwijkingen voorwaarden Limites et conditions de dérogation

<i>Abrus precatorius</i> L.	Leguminosae	weesboontje	régliste d'amérique
<i>Aconitum</i> spp.	Ranunculaceae	monnikskap	aconit
<i>Actaea spicata</i> L.	Ranunculaceae	christoffelkruidactée	en épi
<i>Adenium</i> spp.	Apocynaceae		
<i>Adonis</i> spp.	Ranunculaceae	voorjaarsadonis	adonis du printemps
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Apiaceae	hondspeterselie	petite ciguë
<i>Agapanthus</i> spp.	Amaryllidaceae	afrikaanse lelie	agapanthe
<i>Agrostemma githago</i> L.	Caryophyllaceae	bolderik	nielle des blés
<i>Aletris farinosa</i> L.	Nartheciaceae		
<i>Aleurites</i> spp.	Euphorbiaceae	o.a. houtolieboom	aleurite, e.a. bancoulier
<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd. Euphorbiaceae kemiri, kukui graine de lumbang, kukui, kemiri Enkel niet-geraffineerde olie is toegelaten indien door ontledingsverslagen aangetoond werd dat de olie geen phorbolesters bevat en het gehalte aan eleostearinezuur lager is dan 1% Seule l'huile non raffinée est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que cette huile ne contient pas d'esters de phorbol et que la teneur en acide éléostéarique est inférieure à 1%.			
<i>Alkanna</i> spp.	Boraginaceae	alkanna	orcanette
<i>Amaryllis</i> spp.	Amaryllidaceae	amaryllis	amaryllis
<i>Ammi majus</i> L.	Apiaceae	groot akkerscherf	grand ammi
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	<i>Anacyclus</i>	duitse bertram	pyrèthre d'Allemagne
<i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Link.	<i>Anacyclus</i>	roomse bertram	pyrèthre d'Afrique
<i>Anadenanthera</i> spp.	Leguminosae		
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulaceae	guichelheil	mouron rouge des champs
<i>Anamirta cocculus</i> (L.) Wight et Arn.	Menispermaceae		kokkelkorrelstruik
		coque du levant	
<i>Anchusa</i> spp.	Boraginaceae	ossentong	buglosse
<i>Andromeda</i> spp.	Ericaceae	lavendelhei	andromède
<i>Anemone</i> spp.	Ranunculaceae	anemoon	anémone
<i>Galipea officinalis</i> Hancock, <i>Cusparia officinalis</i> (Hancock.) Engl. (Willd.) T.S.Elias		angusturaboom	angusture vraie
			<i>Angostura trifoliata</i>

Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coult.	Cactaceae	Anhalonium lewinii	
Henning	peyote, peyotl	peyote, peyotl	
Annona spp.	Annonaceae	o.a. zuurzakboom	e.a. corossol, coeur de boeuf
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.	Moraceae	upas	ipo
Aquilegia vulgaris L.	Ranunculaceae	wilde akelei	ancolie vulgaire
Areca catechu L.	Arecaceae	areka, betelnootpalm	aréquier
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.	Compositae	Chrysanthemum frutescens L.	
struikmargriet	anthémis		
Arisaema spp.	Araceae	o.a. drakeraap	e.a. navet indien
Aristolochia spp.	Aristolochiaceae	pijpbloem	aristoloche commune
Arnica chamissonis Less.	Compositae	valkruid	arnica
Arnica montana L.	Compositae	valkruid	arnica
Artemisia annua L.	Compositae	zomeralsem	armoise annuelle
Arum maculatum L.	Araceae	gevlekte aronskelk	arum tacheté, gouet tacheté
Asarum canadense L.	Aristolochiaceae	Canadese mansoor	asaret du Canada
Asarum europaeum L.	Aristolochiaceae	mansoor	asaret d'Europe
Aspidosperma spp.	Apocynaceae		
Athyrium filix-femina (L.) Roth	Athyriaceae	wijfjesvaren	fougère femelle
Atractylis gummifera (L.) Less.	Compositae	chardon à glu	
Atropa spp.	Solanaceae		
Aucuba japonica Thunb.	Garryaceae	broodboom	aucuba
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.	Compositae	Eupatorium triplinerve	Vahl
Baccharis spp.	Compositae		
Baptisia spp.	Leguminosae	o.a. wilde indigo	e.a. indigo sauvage
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.	Iridaceae	Belamcanda chinensis (L.) DC.	
luipaardbloem	fleur léopard		

Borago spp. Boraginaceae incl. bernagie incl. bourrache Enkel het gebruik van volgende plantendelen is toegelaten : zaad, bloem.

De bereidingen zijn enkel toegelaten in voedingsmiddelen indien door ontledingsverslagen kan aangetoond worden dat die bereidingen maximaal 4 µg/kg toxische pyrrolizidine alkaloiden bevatten.

Seule l'utilisation des parties suivantes de la plante est autorisée : graine, fleur.

Les préparations sont autorisées dans les denrées alimentaires seulement s'il peut être prouvé par des rapports d'analyse que la teneur en alcaloïdes de pyrrolizidine toxiques de ces préparations ne dépasse pas 4 µg/kg.

Brachyglottis spp. Compositae

Brayera anthelmintica Kunth Rosaceae Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel. kosoboom
kousso

Brugmansia spp. Solanaceae

Brunfelsia spp. Solanaceae

Bryonia spp. Cucurbitaceae o.a. heggerank bryone

Buxus sempervirens L. Buxaceae palmboompje buis commun

Caladium spp. Araceae pédiveau

Calea zacatechichi Schltdl Compositae droomkruid l'herbe rêveuse

Calla palustris L. Araceae slangewortel calla des marais

Caltha palustris L. Ranunculaceae dotterbloem souci d'eau, populage des marais

Canarium indicum L. Burseraceae nangainoten noix de nagaille

Cannabis sativa L. Cannabaceae hennep chanvre

Caragana arborescens Lam. Leguminosae erwtenstruik arbre aux pois

Carlina spp. Compositae

Caryota spp. Areaceae e.a. palmier céleri

Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. Celastraceae qat khat

Catharanthus roseus (L.) G.Don. Apocynaceae roze maagdenpalm pervenche de Madagascar

Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. Berberidaceae blauwe zilverkaars blue cohosh

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson Rubiaceae Cephaelis acuminata Karst.,
Uragoga granatensis Baill.

Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill., Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac			braakwortel
racine d'ipeca, ipéca du Brésil			
Erysimum x cheiri (L.) Crantz	Brassicaceae	Cheiranthus x cheiri L.	muurbloem giroflée des murailles, vélard
Cestrum spp.	Solanaceae		
Ceterach officinarum DC.	Aspleniaceae		Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat. Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray	Melanthiaceae	helonias	fausse unicorne
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium ambrosioides L.	welriekende ganzevoet chénopode fausse-ambroise, thé-du-mexique
Cibotium barometz (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae		Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat. Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Cicuta virosa L.	Apiaceae	waterscheerling	ciguë vireuse, ciguë aquatique
Cineraria spp.	Compositae	cinéraire	
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.	Cucurbitaceae	Cucumis colocynthis L.	kolokwint
coloquinte officinale			
Clivia miniata (Lindl.) Bosse	Amaryllidaceae	clivia, sint-Jozefsbloem	fleur lis de saint Joseph
Clusia rosea Jacq.	Clusiaceae		
Cnidoscolus spp.	Euphorbiaceae		
Colchicum autumnale L.	Colchicaceae	herfsttijloos	colchique d'automne
Colutea arborescens L.	Leguminosae	europese blazenstruik	baguenaudier commun, arbre à vessies
Comandra spp.	Santalaceae		
Conium maculatum L.	Apiaceae	gevlekte scheerling	grande ciguë
Convallaria majalis L.	Asparagaceae	lelietje-van-dalen, meiklokje	muguet
Convolvulus arvensis L.	Convolvulaceae	akkerwinde	liseron des champs
Convolvulus scammonia L.	Convolvulaceae	purgeerwinde	scammonée

Coriaria myrtifolia L.	Coriariaceae	looiersstruik	redoul
Coriaria thymifolia Humb. et Bonpl.	Coriariaceae		
Corydalis spp.	Papaveraceae	helmbloem, o.a. holwortel	e.a. corydale creuse
Corydalis solida (L.) Clairv.	Papaveraceae	Corydalis bulbosa (L.) DC.	vingerhelmbloem
corydale solide, corydale à tubercule plein Enkel het decoct van de wortelstok is toegelaten in voedingsmiddelen. Seule la décoction du rhizome est autorisée dans les denrées alimentaires.			
Corynanthe spp.	Rubiaceae	yohimbe	yohimbe
Cotinus coggygria Scop.	Anacardiaceae		Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat. Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Cotoneaster spp.	Rosaceae	dwergmispel	cotonéaster
Crinum asiaticum L.	Amaryllidaceae	lelie	crinum d'asie
Crotalaria spp.	Leguminosae		
Croton spp.	Euphorbiaceae		
Cryptostegia spp.	Apocynaceae		
Cycas spp.	Cycadaceae	cycaspalm, varenpalm	cycas
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Poaceae	handjesgras	chiendent dactyle
Cynoglossum spp.	Boraginaceae	hondstong	cynoglosse
Cypripedium calceolus L.	Orchidaceae	vrouwenschoentje	sabot de vénus
Cytisus spp.	Leguminosae		
Dalechampia scandens Jacq.	Euphorbiaceae		liane ortie
Daphne spp.	Thymelaeaceae		
Datura spp.	Solanaceae		
Delphinium spp.	Ranunculaceae	ridderspoor	staphisaigre, dauphinelle
Derris spp.	Leguminosae		
Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara		Dicentra spectabilis (L.) Lem.	gebroken hartje
coeur de marie, coeur de jeanette			

Dichondra repens J.R. Forst. et G. Forst.	Convolvulaceae		dichondra rampant
Dictamnus albus L. fraxinelle	Rutaceae	vuurwerkplant, essenkruid	dictame blanc,
Dieffenbachia spp.	Araceae	dieffenbachia	dieffenbachia
Digitalis spp.	Plantaginaceae	vingerhoedskruid	digitale
Tamus communis L. tamier commun	Dioscoreaceae	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	spekwortel
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.	Leguminosae	tonkabonen boom	fève de tonka
Dirca palustris L.	Thymelaeaceae	dirca des marais	
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Dryopteridaceae	mannetjesvaren	fougère mâle
Duboisia spp.	Solanaceae		
Durio zibethinus L.	Malvaceae	doeriandurian, durion	
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. d'âne, momordique	Cucurbitaceae	springkomkommer	concombre
Echium spp.	Boraginaceae	o.a. slangekruid	e.a.vipérine
Ephedra spp.	Ephedraceae	o.a. zeedruif	ephédra
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. d'hiver	Ranunculaceae	winterakoniet	eranthé d'hiver, hellébore
Erechtites spp.	Compositae		
Erythrina spp.	Brassicaceae	erythrina	erythrine
Erythroxylum coca Lam.	Leguminosae	cocastruik	coca
Euonymus atropurpureus Jacq.	Celastraceae	vuurkardinaalsmuts	fusain noir pourpre
Euonymus europaeus L.	Celastraceae	wilde kardinaalsmuts	fusain d'europe
Euphorbia spp. poinsettia	Euphorbiaceae	o.a. wolfsmelk, kerstster	e.a. euphorbe panachée,
Tetradium ruticarpum (A.Juss.) T.G.Hartley Evodia ruticarpa (A.Juss.) Hook.f. & Thomson (A. Juss.) Benth	Rutaceae	Euodia ruticarpa (A. Juss.) Benth.,	
Excoecaria agallocha L.	Euphorbiaceae		

<i>Ficaria verna</i> Huds.	Ranunculaceae	<i>Ficaria renunculoïdes</i> Monch.	speenkruid	renoncule ficaire, ficaire fausse-renoncule
<i>Forestiera</i> spp.	Oleaceae			
<i>Fritillaria imperialis</i> L.	Liliaceae	keizerskroon	fritillaire impériale, couronne impériale	
<i>Galanthus</i> spp.	Amaryllidaceae	o.a. sneeuwklokje	e.a. perce-neige	
<i>Galega officinalis</i> L.	Leguminosae	galega	galéga, sainfoin d'Espagne	Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan galegine en peganine bepaald is. Une dérogation peut être accordée si la teneur en galéguine et péganine est déterminée.
<i>Garcinia hanburyi</i> Hook. f.	Clusiaceae			
<i>Geissospermum</i> spp.	Apocynaceae			
<i>Gelsemium</i> spp.	Gelsemiaceae	jasmin jaune		
<i>Genista tinctoria</i> L.	Leguminosae	verfbrem	genêt des teinturiers	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lamiaceae	hondsdrif	lierre terrestre	
<i>Globularia alypum</i> L.	Plantaginaceae	drietandkogelbloem	globulaire turbitt	
<i>Globularia vulgaris</i> L.	Plantaginaceae	gewone kogelbloem	globulaire commune	
<i>Gloriosa superba</i> L.	Colchicaceae	prachtlelie		
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Plantaginaceae	genadekruid	gratiole	
<i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill. griffonia	Leguminosae	<i>Bandeiraea simplicifolia</i> (DC.) Benth. griffonia		
<i>Harungana madagascariensis</i> Lam. ex Poir. ex Poir.) Choisyharonga boom	Hypericaceae	<i>Haronga madagascariensis</i> L. (Lam. guttier du gabon		
<i>Heimia</i> spp.	Lythraceae			
<i>Heliotropium</i> spp.	Boraginaceae	heliotroop, zonnewende	héliotrope	
<i>Helleborus</i> spp.	Ranunculaceae	nieskruid, o.a. kerstroos	hellébore, e.a. rose de Noël	
<i>Hepatica nobilis</i> Mill.	Ranunculaceae	leverbloempje	anémone hépatique	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier et Levier berce de caucase	Apiaceae		reuzenberenklauw	
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae	manchineel	mancenillier	

Homalomena spp.	Araceae		
Hura crepitans L.	Euphorbiaceae	zandkokerboom	arbre au diable, sablier blanc
Hyacinthus orientalis L.	Asparagaceae	hyacintjacinthe d'orient	
Hyoscyamus spp.	Solanaceae		
Ilex aquifolium L.	Aquifoliaceae	hulst	houx
Illicium anisatum L.	Schisandraceae	Illicium religiosum Siebold et Zucc.	japanse steranijs anis étoilé du japon
Ipomoea spp.	Convolvulaceae	pronkwinde	ipomée
Iris spp.	Iridaceae	o.a. lis	iris
Jatropha curcas L.	Euphorbiaceae	purgeernoot	médecinier, pourghère
Juglans nigra L.	Juglandaceae	zwarte walnoot	noyer noir
Juniperus sabina L.	Cupressaceae	sabijnse jeneverbes	genévrier sabine
Kalmia latifolia L.	Ericaceae	lepelboom	laurier de montagne
Laburnum anagyroides Medik.	Leguminosae	Cytisus laburnum L.	gewone goudenregen cytise faux ébénier
Lactuca virosa L.	Compositae	gifsla	laitue vireuse
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville	Papaveraceae		creosootstruik
Leopoldia comosa (L.) Parl.	Asparagaceae	Muscari comosum (L.) Mill.	kuifhyacint muscari à toupet
Leucojum vernum L.	Amaryllidaceae	lenteklokje	névéole de printemps
Ligustrum vulgare L.	Oleaceae	wilde liguster	troène commun
Linaria vulgaris Mill.	Plantaginaceae	vlasbekje	linaire commune
Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is. Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.			
Liriope spp.	Asparagaceae		
Lithospermum spp.	Boraginaceae	o.a. parelzaad	e.a. grémil
Lobelia inflata L.	Campanulaceae	gezwollen lobelia	lobélie enflée
Lonchocarpus spp.	Leguminosae		

Lonicera caprifolium L. Caprifoliaceae tuinkamperfoelie chèvrefeuille des jardins

Lupinus spp. Cactaceae lupine lupin De planten Lupinus angustifolius L. en Lupinus albus L. zijn toegelaten in voedingsmiddelen indien aangetoond werd dat het zaad en het meel van de planten maximum 200 mg/kg totaal alkaloiden en geen anagyryne bevat. Les plantes Lupinus angustifolius L. et Lupinus albus L. sont autorisées dans les denrées alimentaires s'il a été démontré que la graine et la farine de ces plantes ne contiennent pas plus de 200 mg/kg d'alcaloïdes totaux et ne contiennent pas d'anagyryne.

Lycoris spp. Amaryllidaceae

Lyonia spp. Ericaceae

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Asparagaceae dalkruid maianthème à deux feuilles

Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. Euphorbiaceae kamalaboom kamala, rottlière des teinturiers

Mandragora officinarum L. Solanaceae alruin mandragore officinale

Meconopsis spp. Papaveraceae schijnpapaver

Menispermum canadense L. Menispermaceae Canadees Maanzaad. Ménisperme du Canada

Mercurialis annua L. Euphorbiaceae tuinbingelkruid mercuriale annuelle

Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae bosbingelkruid mercuriale vivace

Mesembryanthemum spp. Aizoaceae o.a. middagbloem, ijskruid e.a. ficoïde glaciale

Mimosa spp. Leguminosae mimosa

Mosannonna depressa (Baill.) Chatrou Annonaceae Guatteria gaumeri Greenm. yumel
yumel

Mucuna pruriens (L.) DC. Leguminosae Dolichos pruriens L. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden harmaan alkaloiden, levo-dopa en lectine bevat. Een analyse van de niet proteinogene aminozuren moet uitgevoerd worden. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes harmanes, lévo-dopa et lectine. Une analyse des acides aminés non protéinogènes doit être effectuée.

Myoporum laetum G. Forst. Scrophulariaceae Ngaio boom Arbre Ngaio

Narcissus spp. Amaryllidaceae witte narcis, dichtersnarcis narcisse des poètes

Nerium spp. Apocynaceae oleander laurier-rose

Nicotiana spp.	Solanaceae	o.a. tabak	tabac	
Nigella damascena L.	Ranunculaceae	juffertje-in-'t-groen	nigelle de damas	
Nymphaea alba L.	Nymphaeaceae	witte waterlelie	nymphéa blanc	
Nymphaea odorata Ait.	Nymphaeaceae	geurende waterlelie	nymphéa odorants	
Ochrosia spp.	Apocynaceae			
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglossaceae	addertong	ophioglosse	
commun, ophioglosse vulgaire, langue de serpent, ophioglosse des alpes, herbe sans couture				Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoon dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat. Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Ornithogalum spp.	Asparagaceae	vogelmelk	ornithogale	
Orobancha spp.	Orobanchaceae	bremraap	orobanche	
Oxalis spp.	Oxalidaceae	klaverzuring	oxalide, oxalis	
Paeonia spp.	Paeoniaceae	pioen	pivoine	
Papaver somniferum L.	Papaveraceae	slaapbol, papaver, maankop	pavot officinal	Het zaad afkomstig van deze plant is toegelaten als "maanzaad" op bakkerijproducten. La graine provenant de cette plante est autorisée en tant que "graine de pavot" sur les produits de la boulangerie
Paris quadrifolia L.	Melanthiaceae	eenbes	parisetten	
Parthenocissus quinquefolia (L.)	Vitaceae	vijfbladige wingerd	vigne vierge	
Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille	Rubiaceae		yohimbe	
		yohimbe		
Peganum harmala L.	Nitrariaceae	harmala	harmal	
Petasites spp.	Compositae	hoefblad	pétasite	
Petunia violacea Lindl.	Solanaceae			
Pfaffia spp.	Amaranthaceae			
Philodendron spp.	Araceae			
Physostigma venenosum Balf.	Leguminosae	calabarbonen	fèves de calabar	
Phytolacca spp.	Phytolaccaceae	karmozijnbes	phytolaque	
Pieris formosa (Wall.) D. Don	Ericaceae		Piérisme andromède	

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don Murr. du Japon	Ericaceae	Andromède
---	-----------	-----------

Pilocarpus spp. Rutaceae

Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb	Araceae	Driebladige pinellia	Pinellia
Afwijking kan toegestaan worden voor bereidingen van de gedroogde wortel.			Des
dérogations peuvent être attribuées pour des préparations de la racine séchée.			

Piper methysticum Forster f.	Piperaceae	kava, kawa	kava, kawa
------------------------------	------------	------------	------------

Piscidia piscidula (L.) Sarg.	Leguminosae	Piscidia erythrina (Loefl.) L.	piscidia piscidie
-------------------------------	-------------	--------------------------------	-------------------

Podophyllum peltatum L.	Berberidaceae	Voetblad, eendevoet	podophyllée pelté
-------------------------	---------------	---------------------	-------------------

Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Leguminosae	driebladcitrus	oranger trifolié
-------------------------------	-------------	----------------	------------------

Psoralea spp. Rubiaceae

Psychotria viridis Ruiz. et Pav.	Dennstaedtiaceae	Chacrana	Sami Ruca
----------------------------------	------------------	----------	-----------

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.	Olacaceae	adelaarsvaren	fougère-aigle
--------------------------------	-----------	---------------	---------------

Ptychopetalum spp. Ericaceae

Pyrularia pubera Michx.	Santalaceae	buffelnoot
-------------------------	-------------	------------

Quassia spp. Simaroubaceae

Quillaja saponaria Molina.	Quillajaceae	zeephoutboom	bois de panama, quillaia
----------------------------	--------------	--------------	--------------------------

Ranunculus spp.	Ranunculaceae	boterbloem	renoncule
-----------------	---------------	------------	-----------

Rauvolfia spp. Apocynaceae

Rhododendron spp.	Ericaceae	rododendron	rhododendron
-------------------	-----------	-------------	--------------

Rhodomirtus spp. Myrtaceae

Rhus spp.	Anacardiaceae	sumak	sumac
-----------	---------------	-------	-------

Rhus aromatica Aiton	Anacardiaceae	welriekende sumac	rhus aromatique
Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.			
Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.			

Rhus coriaria L.	Anacardiaceae	sumak	sumac, sumac des corroyeurs, vinaigrier
Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.			
Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.			

Rhus glabra L. Anacardiaceae gladde sumak sumac à bois glabre Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.

Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.

Rhynchosia spp. Leguminosae

Richardia scabra L. Rubiaceae valse ipecacuanha faux ipéca

Ricinus communis L. Euphorbiaceae wonderboom ricin commun

Rivina humilis L. Phytolaccaceae

Roemeria hybrida L. DC. Papaveraceae

Rubia tinctorum L. Rubiaceae meekrap garance des teinturiers

Ruta spp. Rutaceae

Salvia divinorum Epling & Jstiva Lamiaceae centraal amerikaanse salie
sauge des aztèques

Sanguinaria canadensis L. Papaveraceae bloedwortel sanguinaire du canada

Sansevieria spp. Asparagaceae vrouwentongensansevière

Santalum album L. Santalaceae sandelboom Santal blanc, sandal

Sassafras albidum (Nutt.) Nees Lauraceae *Sassafras officinale* T. Nees & C.H. Eberm.
sassafrashout bois de sassafras

Saussurea spp. Compositae

Schefflera spp. Araliaceae

Schinus molle L. Anacardiaceae peruviaanse peperboomfaux poivrier Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen. Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.

Schinus terebinthifolius Raddi. Anacardiaceae braziliaanse peperboombaies roses, poivre rose Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen. Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.

Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A.Gray Melanthiaceae *Sabadilla officinalis* (Schltdl. & Cham.) Standl. Brandt. et Ratzeb. sabadilkruid cévadille

Scindapsus spp. Araceae

Scopolia spp. Solanaceae

Scrophularia spp. Scrophulariaceae helmkruid scrofulaire

Scutellaria baicalensis Georgi Lamiaceae Baikalglidkruid Scutellaire du lac Baïkal
 Het gebruik van de wortel afkomstig van deze plant is toegelaten in voedingsmiddelen. L'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.

Scutellaria lateriflora L. Lamiaceae Het gebruik van de hele plant is toegelaten indien met analyse aangetoond werd dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden furano neoclerodanen bevat en door een botanisch certificaat werd aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant. L'utilisation de la plante entière est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néo-clérodanes et si par certificat botanique il a été démontré que les parties utilisées proviennent de cette plante.

Scutellaria spp. Lamiaceae blauw glidkruid scutellaire toque

Securigera varia (L.) Lassen Leguminosae Coronilla varia L. bont kroonkruid coronille bigarrée

Senecio spp. Compositae kruiskruid séneçon

Sesbania spp. Leguminosae

Sida cordifolia L. Malvaceae bala bala

Sida rhombifolia L. Malvaceae

Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae

Solandra grandiflora Sw. Solanaceae liane trompette

Solanum americanum Mill. Solanaceae Solanum nigrum L. zwarte nachtschade
 morelle noire

Solanum dulcamara L. Solanaceae bitterzoet douce-amère, morelle douce-amère

Solenostemma argel (Delile) Hayne Apocynaceae

Sorbus domestica L. Rosaceae peervormig elijsterbes cormier, sorbier domestique

Spartium junceum L. Leguminosae spaanse brem genêt d'Espagne

Spathiphyllum spp. Araceae

Spigelia anthelmia L. Loganiaceae spigélie vermifuge

Spigelia marilandica (L.) L. Loganiaceae

Sprekelia spp. Amaryllidaceae goudlelie e.a. croix de saint-jacques

Stephanotis spp. Apocynaceae bruidsbloem jasmin de madagascar

Sternbergia spp. Amaryllidaceae

Strophanthus spp.	Apocynaceae		
Strychnos spp.	Loganiaceae		
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake	Caprifoliaceae	sneeuwbes	symphorine
Symphytum spp.	Boraginaceae	smeerwortel	consoude
Tabebuia spp.	Bignoniaceae		
Tabernanthe iboga Baill.	Apocynaceae	ibogo	iboga
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip (Trevir) Vis.	Compositae	Chrysanthemum cinerariifolium	dalmatisch vlooienkruid pyrèthre
Taxus spp.	Taxaceae	taxus	if
Tephrosia spp.	Leguminosae		
Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast. quadrivalvis Rich. & A.Rich.	Cupressaceae	Callitris quadrivalvis Vent. sandarak, kamercipres	Callitris sandaraque, thuja de Barbarie
Teucrium chamaedrys L.	Rutaceae	echte gamander	germandrée petit- chêne
Teucrium polium L.	Lamiaceae		germandrée tomenteuse
Thevetia spp.	Lamiaceae	o.a. gele oleander	e.a. laurier-rose jaune
Thuja occidentalis L.	Apocynaceae	westerse levensboom	thuya d' occident
Trichocereus spp.	Cactaceae		
Trichodesma incanum Bunge	Boraginaceae		
Trollius europaeus L.	Ranunculaceae	europese trollius	trolle d' europe
Tulipa spp.	Liliaceae	tulp	tulipe
Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulaceae		
Tussilago spp.	Compositae	klein hoefblad	tussilage
Tylophora asthmatica Wight et Arn.	Apocynaceae		asmatica, faux-ipeca
Urginea spp.	Asparagaceae	zeeajuin	scille maritime
Veratrum spp.	Melanthiaceae	nieswortel	vératre
Viburnum prunifolium L.	Adoxaceae		amerikaanse sneeuwbal viorne à feuilles de prunier

Vincetoxicum hirundinaria Medik. witte engbloem dompte-venin	Apocynaceae	Vincetoxicum officinale Moench	
Wikstroemia spp.	Thymelaeaceae		
Wisteria floribunda (Willd.) DC. japon	Leguminosae	japanse blauwereggen	glycine du japon
Wisteria sinensis (Sims) Sweet.	Leguminosae	chinese blauwereggen	glycine de chine
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br.	Apocynaceae	uzara	uzara
Zanthoxylum acanthopodium DC. worden toegekend indien het gehalte aan alkaloiden bepaald is. la teneur en alcaloïdes est déterminée.	Rutaceae		Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloiden bepaald is. Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zanthoxylum americanum Mill.	Rutaceae		Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloiden bepaald is. Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zanthoxylum armatum DC. zanthoxylle	Rutaceae	Zanthoxylum alatum Roxb.	geelhout Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloiden bepaald is. Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zigadenus spp.	Melanthiaceae	alkaligras	cannash

Lijst 2 : Eetbare paddenstoelen

Liste 2 : Champignons comestibles

Deel 1 : Gekweekte eetbare paddenstoelen

Partie 1 : Champignons comestibles cultivés

Wetenschappelijke naam

Nom scientifique Famille

Famille Synoniemen

Synonymes Nederlandse naam

Nom Néerlandais Franse naam

- Nom Français Beperkingen en afwijkingen voorwaarden Limites et conditions de dérogation

Agaricus arvensis Sch. : Fr.	Agaricaceae	Anijschampignon	Agaric des jachères
------------------------------	-------------	-----------------	---------------------

Agaricus bisporus (Lange) Sing. var. Albidus (Lange) Sing. champignon	Agaricaceae	Gekweekte champignon	Agaric bispore, Champignon de Paris, variété blanche
--	-------------	----------------------	--

Agaricus bisporus (Lange) Sing. var. Avellanuss Lange) Sing.	Agaricaceae		
Kastanjechampignon	Agaric bispore, Champignon de (Paris, variété blonde)		
Agaricus bitorquis (Quélet) Saccardo	Agaricaceae	Straatchampignon	Psalliotte
des trottoirs			
Agaricus campestris L. : Fr.	Agaricaceae	Weidechampignon	Agaric des jachères
Agaricus silvicola (Vitt.) Peck	Agaricaceae	Slanke anijschampignon	Agaric
sylvicole			
Agaricus subrufescens Peck	Agaricaceae	Agaricus blazei Murill	Amandelpaddenstoel
Agaric auguste			
Agrocybe cylindracea (DC. : Fr.) Maire	Bolbitiaceae	Populierleemhoed	Pholiote du
Peuplier, Pivoulade			
Boletus aereus			
Bull. ex Fr.	Boletaceae	Bronskleurig eekhoortjesbrood	Cèpe bronzé, Tête-
de-nègre			
Boletus reticulatus			
Schaeff.	Boletaceae	Boletus aestivalis (Paulet) Fr.	Vroeg eekhoortjesbrood
Cèpe d'été			
Boletus rex-veris D. Arora & Simonini	Boletaceae		Cèpe Roi du printemps
Coprinus comatus (Müll. :Fr.) Pers.	Agaricaceae	Geschubde inktzwam	Coprin
chevelu			
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	Paecilomyces hepiali Q.T. Chen & R.Q. Dai	
Ophiocordyceps sinensis			
toegelaten.		Enkel het gebruik in voedingssupplementen is	
Seule l'utilisation dans les compléments alimentaires est autorisée.			
Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Singer	Physalacriaceae	Fluweelpootje	Collybie à
pied velouté			
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae		Gesteelde lakzwam
Ganoderma, Bois de Cerf, Ganoderme luisant			
Ganoderma tsugae Murr.	Ganodermataceae		
Grifola frondosa (Dicks.) Gray	Meripilaceae	Eikhaas	Poule de bois, Polypore en
touffes			
Grifola umbellata (Pers.) Pilat	Meripilaceae	Schermpjeseikhaas	

Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) Kummer Hypholome doux	Strophariaceae	Dennezwavelkop	
Hericium erinaceus (Bull. : Fr.) Pers.	Hericiaceae	Pruikzwam	Hydne hérisson
Hirneola auricula-judae (Bull. : Fr.) Berk. Judas	Auriculariaceae	Judasoor	Oreille de
Hypsizygus tessulatus (Bull. : Fr.) Sing.	Lyophyllaceae	Buna Shimeji	Buna Shimeji
Hypsizygus ulmarius (Bull. : Fr.) Kühner de l'Orme	Lyophyllaceae	Iepenzwam	Lyophylle
Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill Polypore souffré	Fomitopsidaceae	Zwavelzwam	
Lasiosphaeria gigantea Batch Ex Pers.	Lasiosphaeriaceae		
Lentinula edodes (Berk.) Pegler	Marasmiaceae	Shiitake	Shiitake
Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke	Tricholomataceae	Paarse schijnridder	Pied bleu
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser pudique	Agaricaceae	Blanke Parasolzwam	Lépiote
Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo	Lyophyllaceae	Hon-Shimeji	Hon-Shimeji
Morchella esculenta (L. : Fr.) Pers. commune	Morchellaceae	Gewone morielje	Morille
Pholiota mutabilis (Scop. : Fr.) Kumm. Smith & Singer Pholiote changeante	Strophariaceae	Kleine bundelzwam	
Pholiota nameko (I. Ito) S. Ito & Imai	Strophariaceae	Nameko	Naméko
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.) corne, Rolland d'abondance	Pleurotaceae	Trechteroesterzwam	Pleurote
Pleurotus citrinopileatus Singer jaune	Pleurotaceae	Goudkleurige oesterzwam	Pleurote
Pleurotus colombinus	Pleurotaceae		
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.) corne, Rolland d'abondance	Pleurotaceae	Trechteroesterzwam	Pleurote
Pleurotus cystidiosus O.K. Miller	Pleurotaceae		

Pleurotus eryngii (DC. : Fr.) Quélet	Pleurotaceae	Kruisdisteloesterzwam	Pleurote du Panicaud
--------------------------------------	--------------	-----------------------	----------------------

Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc.	Pleurotaceae		
--	--------------	--	--

Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm	Pleurotaceae	Gewone oesterzwam	
Pleurote en huitre			

Pleurotus pulmonarius (Fr. : Fr.) Quélet	Pleurotaceae	Bleke oesterzwam	Pleurote pulmonaire
--	--------------	------------------	---------------------

Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer	Pleurotaceae		
-------------------------------------	--------------	--	--

Pleurotus salmoneostramineus Vassil	Pleurotaceae	Zalmoesterzwam	Pleurote saumon
-------------------------------------	--------------	----------------	-----------------

Pleurotus sp. Florida (Eger)	Pleurotaceae	Floridazwam	Pleurote de Floride
------------------------------	--------------	-------------	---------------------

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.	Polyporaceae	Schermpjeseikhaas	Polypore en ombelle
----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Stropharia rugosoannulata Murrill	Strophariaceae	Blauwplaatstropharia	Strophaire à anneau rugueux
-----------------------------------	----------------	----------------------	-----------------------------

Volvariella volvacea (Bull. : Fr.) Singer	Pluteaceae	Rijststrozwam, Tropische beurszwam	Volvaire cultivée
---	------------	------------------------------------	-------------------

De paddenstoelen vermeld in deel 2 van lijst 2 in de mate dat ze kunnen geteeld worden en voor menselijke consumptie geschikt blijven.

Les champignons repris dans la partie 2 de la liste 2 dans la mesure où ils peuvent être cultivés et restent propres à la consommation humaine.

Deel 2 : Wilde paddenstoelen die mogen in de handel gebracht worden in zoverre de reglementering van bedreigde soorten dat toelaat

Partie 2 : Champignons sauvages qui peuvent être mis dans le commerce pour autant que la réglementation pour la conservation des espèces menacées le permette

Wetenschappelijke naam

Nom scientifique	Familie
------------------	---------

Famille Synoniemen

Synonymes	Nederlandse naam
-----------	------------------

Nom Néerlandais	Franse naam
-----------------	-------------

- Nom Français Bepkingen en afwijkingen voorwaarden Limites et conditions de dérogation

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. Agaricaceae trottoirs		Straatchampignon	Psalliotte des
Agaricus campestris L. : Fr.	Agaricaceae	Weidechampignon	Agaric champêtre
Agrocybe cylindracea (DC. : Fr.) Maire jeuplier; Pivoulade	Bolbitiaceae	Populierleemhoed	Pholiotte du
Aleuria aurantia (Pers. : Fr.) Fuck. Pézize orangée	Pyronemataceae		Grote oranje bekerzwam
Amanita rubescens (Pers. : Fr.) S.F. Gray rougissante; Golmotte	Amanitaceae	Parelamaniet	Amanite
Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) Kummer s.l. Armillaire couleur de miel s.l.	Physalacriaceae	Honingzwam s.l.	
Hirneola auricula-judae (Bull. : Fr.) Berk. Judas	Auriculariaceae	Judasoor	Oreille de
Boletus badius non sensu Persoon Kastanjeboleet Bolet bai	Boletaceae	Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Gilbert	
Boletus edulis Bull. : Fr.	Boletaceae	Eekhoortjesbrood	Cèpe de Bordeaux
Boletus erythropus Pers.	Boletaceae	Gewone heksenboleet	Bolet à pied rouge
Bovista plumbea Pers. Enkel het gebruik van het vruchtlichaam is toegelaten.	Agaricaceae	Loodgrijze bovist	Boviste plombée Seule l'utilisation du sporophore est autorisée.
Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Singer de la Saint-Georges; Mousseron	Lyophyllaceae	Voorjaarspronkridder	Tricholome
Cantharellus cibarius Fr. : Fr. Chanterelle orangée	Cantharellaceae	Hanekam; Dooierzwam; Cantharel	
Cantharellus tubaeformis Fr. : Fr. en tube	Cantharellaceae	Trechtercantharel	Chanterelle
Coprinus comatus (Müll. : Fr.) S.F. Gray Coprin chevelu	Agaricaceae	Geschubde inktzwam	
Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers. Trompette de la mort	Cantharellaceae	Hoorn-van-overflow	
Disciotis venosa (Pers. : Fr.)	Morchellaceae	Grote aderbekerzwam	Pézize veinée

Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Singer pied velouté	Physalacriaceae	Fluweelpootje	Collybie à pied velouté
Hydnum repandum L. : Fr.	Hydnaceae	Gele stekelzwam	Pied de mouton
Hygrophoropsis aurantiaca(Wlf. : Fr.) Maire Fausse girolle	Hygrophoropsidaceae		Valse cantharel
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke Laccaire améthyste	Hydnangiaceae	Amethistzwam; Rode koolzwam	
Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke	Hydnangiaceae	Fopzwam	Laccaire laqué
Lactarius deliciosus (L. :Fr.) Gray Lactaire délicieux	Russulaceae	Oranjegroene melkzwam	
Langermannia gigantea (Batsch. : Pers.) Rostk. loup géante	Agaricaceae	Reuzenbovist	Vesse-de-loup
Lepista inversa (Scop.) Pat. Clitocybe inversé	Tricholomataceae	Roodbruine trechterzwam	
Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke Pied bleu	Tricholomataceae	Paarse schijnridderzwam	
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser Lepiote pudique	Agaricaceae	Lepiota naucina	Blanke parasolzwam
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer Coulemelle, Lépiote élevée	Agaricaceae	Grote parasolzwam	
Marasmius oreades (Balt. : Fr.) Fr. des Oréades; Faux mousseron	Marasmiaceae	Weidekringzwam	Marasme
Morchella angusticeps Peck	Morchellaceae	Morille	
Morchella elata Fr. : Fr.	Morchellaceae	Kegelmorielje	Morille conique
Morchella esculenta (L. : Fr.) Pers. commune	Morchellaceae	Gewone morielje	Morille
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) Kummer forme d'huître	Pleurotaceae	Gewone Oesterzwam	Pleurote en
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. charbonnière	Russulaceae	Regenboogrussula	Russule
Russula vesca Fr.	Russulaceae	Smakelijke russula	Russule comestible

Russula virescens (Schaeff.) Fr.	Russulaceae	Ruwe russula	Russule verdoyante;
Palomet			
Suillus granulatus (L.) O. Kuntze	Suillaceae	Melkboleet	Bolet granulé
Suillus grevillei (Klotzsch : Fr.) Singer	Suillaceae	Gele ringboleet	Bolet élégant
Suillus luteus (L. : Fr.) S.F. Gray	Suillaceae	Bruine ringboleet	Bolet jaune
Tremella fuciformis Berk.	Tremellaceae	Witte trilzwam	Trémelle blanche
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken	Tricholomataceae	Matsu-take	Matsutake
Tricholoma populinum	Tricholomataceae	Lange Populieridderzwam	Tricholome
des peupliers			
Tricholoma portentosum (Fr. : Fr.) Quélet	Tricholomataceae	Glanzende	
ridderzwam	Tricholome prétentieux		
Tricholoma terreum (Sch. : Fr.) Kummer	Tricholomataceae	Donkergrijze	
ridderzwam	Tricholome terreux; Petit-gris		
Tuber aestivum Vitt.	Tuberaceae	Zomertruffel	Truffe d'été
Tuber magnatum Pico sp.	Tuberaceae	Witte truffel	Truffe blanche
Tuber melanosporum Vitt.	Tuberaceae	Perigordtruffel	Truffe du Périgord
Tuber indicum Cooke & Massee	Tuberaceae	Chinese of Aziatische truffel	Truffe
chinoise ou asiatique			
Tuber uncinatum Chatin	Tuberaceae	Bourgognetruffel	Truffe de Bourgogne
Wolfiporia extensa (Peck) Ginns	Fomitopsidaceae	Poria cocos Wolf	
Pachyme	Enkel het gebruik van het sclerotium is toegelaten.	Seule l'utilisation du sclérote	
est autorisée.			

Lijst 3 : Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm

Liste 3 : Plantes à notifier si sous forme prédosée

Botanische naam

Nom botanique Famille

Famille Synoniem

Synonyme Naam

Nom Toegelaten plantendeel of specifieke bereiding Parties de plante autorisée ou préparation particulière Voorwaarden Conditions

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Malvaceae oker, okra okra, gombo, cabo, calou vrucht fruit

Abelmoschus moschatus Medik. Malvaceae ambrettezaad, muskuszaad ambrette zaad graine

Abies alba Mill. Pinaceae gewone zilverspar, grote spar, zilverspar sapin pectiné, sapin blanc, sapin argenté schors, tak, naald, knop, zaad, hars écorce, rameau, aiguille, bourgeon, graine, résine

Abies balsamea (L.) Mill. Pinaceae balsemspar, canadabalsem sapin baumier schors, naald, hars, twijg écorce, aiguille, résine, brindille

Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen Pinaceae
Abies pectinata Dc. Var. Equi-Trojani Asch. & Sint. Ex Boiss nordmann-spar, kaukasische spar, krimspar sapin de nordmann, sapin du caucase, sapin de crimée schors, naald écorce, aiguille

Abies sibirica Ledeb. Pinaceae siberische zilverden sapin de sibérie schors, tak, naald, hars écorce, rameau, aiguille, résine

Abroma augusta L. f Malvaceae wortelschors écorce de racine De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Acacia catechu (L.f.) Willd. Leguminosae acacia à cachou, cachoutier gom gomme

Acacia decurrens Willd. Leguminosae gom gomme

Acacia nilotica (L.) Delile Leguminosae Acacia arabica (Lam.) Willd. echte acacia, gom-acacia acacia du nil schors, vrucht, gom écorce, fruit, gomme

Acacia senegal (L.) Willd. Leguminosae arabische gom gommier blanc, acacia sénégál schors, gom écorce, gomme

Acacia seyal Delile Leguminosae gom gomme

Acanthus mollis L. Acanthaceae stekelige berenklaauw acanthe molle, acanthe à feuilles larges hele plant plante entière

Acer campestre L. Sapindaceae Spaanse aak, veldesdoorn Erable champêtre
 knop bourgeon Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare
 hoeveelheden hypoglycines bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient
 aucune quantité détectable en hypoglycines.

Acer negundo L. Sapindaceae vederesdoorn érable negundo, érable négondo,
 érable à giguère, érable à feuilles de frêne, érable américain schors écorce Analyse moet
 aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat. L'analyse doit
 démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.

Acer saccharinum L. Sapindaceae witte esdoorn of zilveresdoorn érable argenté,
 érable de virginie, plaine blanche bast, hout liber, bois Analyse moet aantonen dat
 de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat. L'analyse doit démontrer
 que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.

Achillea ageratum L. Compositae achillée à feuilles d'agératum, achillée
 visqueuse bovengrondse delen parties aériennes

Achillea atrata L. Compositae dofzwart duizendblad achillée noirâtre
 bovengrondse delen parties aériennes

Achillea erba-rotta All. Compositae achillée à feuilles simples
 bovengrondse delen parties aériennes

Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) I. Richardson Compositae
 duizendblad, hemdsknoopjes, muskusduizendblad achillée musquée bovengrondse delen
 parties aériennes

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo Compositae Diotis candidissima Desf., Otanthus
 maritimus (L.) Hoffmanns & Link bovengrondse delen parties aériennes

Achillea millefolium L. Compositae gewoon duizendblad achillée millefeuille
 bovengrondse delen parties aériennes

Achillea nana L. Compositae wilde bertram achillée naine bovengrondse delen
 parties aériennes

Achillea ptarmica L. Compositae wilde bertram achillée sternutatoire
 bovengrondse delen parties aériennes

Achyranthes bidentata Blume Amaranthaceae dubbelgetande amarant achyranthes
 bidentata blume wortel racine

Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen Compositae parakres, kiespijnknoppenkruid,
 braziliaanse cresson cresson de para, brède mafane bovengrondse delen parties aériennes

Acorus calamus L. Acoraceae kalmoes, echte kalmoesacore, acore odorant, acore
 vrai wortelstok rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
 een inname van beta-asarone hoger dan 115 µg en 2 µg/kg lichaamsgewicht. De etikettering moet de
 volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. La portion

journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de bêta-asarone supérieure à 115 µg et 2 µg/kg poids corporel. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Actaea heracleifolia (Kom.) J.Compton Ranunculaceae *Cimicifuga heracleifolia* Kom. zilverkaars wortel, wortelstok racine, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoeningen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.

Actaea racemosa L. Ranunculaceae *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt. zwarte amerikaanse slangenwortel actée américaine, cimicaire wortel, wortelstok racine, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoeningen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.

Actinidia chinensis Planch. Actinidiaceae kiwi, chinese kruisbes kiwi, groseille de chine vrucht, knop fruit, bourgeon

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson Actinidiaceae kiwi kiwi vrucht, knop fruit, bourgeon

Adansonia digitata L. Malvaceae baobab baobab, pain de singe vrucht fruit

Adiantum capillus-veneris L. Pteridaceae europees venushaar capillaire, cheveux de vénus hele plant plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Adiantum pedatum L. Adiantaceae hoefijzervaren adiante du canada, capillaire du canada, adiante pédalée hele plant gekookt of gedroogd plante entière cuite ou séchée De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Adoxa moschatellina L. Adoxaceae muskuskruid petite musquée hele plant
plante entière

Aegopodium podagraria L. Apiaceae zevenblad égopode podagraire, herbe
aux goutteux, podagraire blad feuille

Aesculus hippocastanum L. Hippocastanaceae witte paardekastanje marronnier
commun, marronnier d'inde zaad, bladknop graine, bourgeon de feuille De aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van aescine hoger dan 75 mg.

De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière
recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'aescine supérieure à 75 mg. Les résultats
d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. Zingiberaceae *Amomum angustifolium* Sonn.
madagascar cardamom maniguette fine, cardamom de Madagascar vrucht, zaad
fruit, graine

Aframomum exscapum (Sims) Hepper Zingiberaceae vrucht, zaad
fruit, graine

Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans Rutaceae *Barosma betulina* (P.J.Bergius)
Bartl. et H.L. Wendl. bucco, boechioe buchu blad feuille

Agathosma crenulata (L.) Pillans Rutaceae *Barosma crenulata* (L.) Hook., *Barosma*
serratifolia (Curtis) Willd. eironde buchu blad feuille

Agathosma serratifolia (Curtis) Spreeth Rutaceae blad feuille

Agave americana L. Asparagaceae honderdjarige aloë agave américain, agave
d'amérique bloemstengel tige florale

Agave sisalana Perrine Asparagaceae sisal sisal bloemstengel, wortel tige florale,
racine

Agave tequilana F.A.C. Weber Asparagaceae blauwe agave agave bleu
bloemstengel, blad tige florale, feuille

Agrimonia eupatoria L. Rosaceae gewone agrimonie aigremoine eupatoire hele
plant plante entière

Agrimonia repens L. Rosaceae *Agrimonia odorata* Mill. welriekende agrimonie aigremoine
odorante bovengrondse delen parties aériennes

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Lamiaceae akkerzenegroen bugle petit pin, d'ive
ou d'ivette bovengrondse delen parties aériennes

Ajuga iva (L.) Schreb. Lamiaceae ivette musquée, germandrée musquée, bugle
fausse ivette bovengrondse delen parties aériennes

Ajuga reptans L. Lamiaceae kruipend zenegroen bugle rampante
 bovengrondse delen parties aériennes

Albizia julibrissin Durazz. Leguminosae perzische slaapboom, zijdeboom
 acacia de constantinople, arbre de soie schors écorce De etikettering moet de volgende
 waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter
 l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Alcea rosea L. Malvaceae *Althaea rosea* (L.) Cav stokroos passe-rose, passerose, rose
 trémière bloem fleur

Alchemilla vulgaris L. Rosaceae *Alchemilla xanthochlora* Rothm. spitslobbige
 vrouwemantel alchémille à lobes aigus hele plant plante entière

Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae grote waterweegbree plantain d'eau
 commun wortel racine

Alisma plantago-aquatica subsp. orientale (Sam.) Sam. Alismataceae *Alisma orientale* (Sam.) Juz.
 waterweegbree plantain d'eau wortelstok, knolrhizome, tubercule

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Brassicaceae *Sisymbrium alliaria* (L.) Scop.
 look-zonder-look alliaire, herbe à ail hele plant plante entière

Allium ampeloprasum L. Amaryllidaceae *Allium porrum* L. oerprei Poireau d'été hele
 plant plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts
 of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement
 suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Allium ascalonicum L. Amaryllidaceae sjalot échalote, échalotte bol bulbe De
 etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig
 gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre
 médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Allium cepa L. Amaryllidaceae ui oignon bol bulbe De etikettering moet de
 volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van
 anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou
 votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Allium sativum L. Amaryllidaceae knoflook ail cultivé bol bulbe De
 etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig
 gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre
 médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Allium schoenoprasum L. Amaryllidaceae bieslook ciboulette blad
 feuille De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of
 apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement
 suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Allium ursinum L. Amaryllidaceae daslook ail des ours hele plant
 plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts

of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae zwarte els aulne noir, aulne glutineux,
aulne commun schors, bladknop, blad, gom écorce, bourgeon de feuille, feuille, gomme

Alnus incana (L.) Moench Betulaceae grauwe els, witte els, grijze els aulne blanc,
aulne rugueux, aulne de montagne, arcoce, varneschors, bladknop écorce, bourgeon de feuille

Aloe africana Mill. Xanthorrhoeaceae blad, gel, latex (sap)
feuille, gel, latex (jus) De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe arborescens Mill. Xanthorrhoeaceae kandelaaraloë aloès arborescent
blad, gel feuille, gel De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe ferox Mill. Xanthorrhoeaceae kaapse aloë aloès blad feuille De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe perryi Baker Xanthorrhoeaceae blad, gel feuille, gel
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar

zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe plicatilis (L.) Mill. Xanthorrhoeaceae waaieraalwijn, waaieraloë aloès éventail blad, gel feuille, gel De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe vera (L.) Burm. f. Xanthorrhoeaceae Aloe barbadensis Mill. echte aloë aloès blad feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als barbaloine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en barbaloine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloysia citriodora Palau Verbenaceae Lippia citriodora (Lam.) Kunth, Aloysia triphylla (L'Hér) Britton geurig ijzerhard, citronelle verveine odorante, verveine citronnée, citronelle verveine blad feuille

Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae grote galgant grand galanga wortelstok rhizome

Alpinia hainanensis K.Schum. Zingiberaceae Alpinia katsumadae Hayata hele plant plante entière

Alpinia officinarum Hance Zingiberaceae kleine galgant petit galanga wortelstok rhizome

Alpinia oxyphylla Miq. Zingiberaceae vrucht, wortelstok fruit, rhizome

Althaea officinalis L. Malvaceae echte heemst, witte malve, witte maluw guimauve officinale, mauve blanche, bourbon de saint-jacques hele plant plante entière

Amaranthus caudatus L.	Amaranthaceae	kattenstaartamarant	amarante queue de renard,
amarante caudée	blad, zaad	feuille, graine	
Amaranthus cruentus L.	Amaranthaceae	paarse amarant	amarante étalée, amarante couleur
de sang, amarante rouge, amarante paniculée, amarante sanglante, épinard du soudan, queue de renard	zaad	graine	
Ammi visnaga Lam.	Apiaceae	fijn akkerscherm, khella	petit ammi, herbe
aux cure-dents, khella	vrucht	fruit	
Amomum villosum var. xanthioides (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen			Zingiberaceae
Amomum xanthioides Wall. ex Baker		zaad	graine
Amorphophallus konjac K. Koch	Araceae	konjac	konjac wortel racine
Amyris balsamifera L.	Rutaceae	amyris, sandelhout west, west-indisch rozenhout	
amyris baumier, amyris, bois de rose, chandelle	hout, oliears	bois, oléorésine	
Ananas comosus (L.) Merr.	Bromeliaceae	ananas	ananas vrucht fruit
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees		Acanthaceae	justicie, indiase gentiaan
echinacée d'inde	blad	feuille	
Anemarrhena asphodeloides Bunge	Asparagaceae		wortelstok
rhizome			
Anethum graveolens L.	Apiaceae	dille	aneth, fenouil bâtard vrucht fruit
Angelica archangelica L.	Apiaceae	grote engelwortel	angélique vraie hele
plant	plante entière		
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae		aziatische
engelwortel, bai zhi	bai zhi	wortel	racine
Angelica pubescens Maxim.	Apiaceae	shishiudo, du hu	shishiudo, du hu
hele plant	plante entière		
Angelica sinensis (Oliv.) Diels	Apiaceae	chinese engelwortel, dong quai	angélique
chinoise, dong quai	hele plant	plante entière	
Angelica sylvestris L.	Apiaceae	gewone engelwortel	angélique des bois
blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	Cusparia officinalis Engl.; Cusparia trifoliata	
(Willd.) Engl.	schors	écorce	
Annona muricata L.	Annonaceae	zuurzak, guanssbana	corossolier vrucht rijpe
fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden		
acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité		
délectable en acétogénines.			

Annona reticulata L. Annonaceae custardappel, ossenhart cachiman, corossolier
 réticulé, anone coeur de boeuf, coeur de boeuf vrucht rijpe fruit mûr Analyse moet
 aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat. L'analyse doit
 démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.

Annona squamosa L. Annonaceae zoetzak, suikerappel, kaneelappel of schubappel
 attier, pommier cannellevrucht rijpe fruit mûr Analyse moet aantonen dat de
 bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat. L'analyse doit démontrer que la
 préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.

Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd. Combretaceae
 bast, gom liber, gomme

Anredera baselloides (Kunth) Baill. Basellaceae blad, wortel
 feuille, racine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts
 of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter
 l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de
 traitement contre le diabète.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Compositae rozenkransje pied-de-chat, pied-de-chat
 dioïque bovengrondse delen parties aériennes

Anthemis tinctoria L. Compositae gele kamille anthémis des teinturiers, camomille
 des teinturiers hele plant plante entière

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apiaceae echte kervel autres noms
 communs : camomille puante, anthémis puante, camomille des chiens, maroute, camomille maroute,
 marouette, anthémis cotule, anthémis bâtarde, oeil-de-vache. bloeiende toppen sommités
 fleuries

Anthyllis vulneraria L. Leguminosae wondklaver vulnéraire hele plant
 plante entière

Antirrhinum majus L. Plantaginaceae grote leeuwenbek grand mufler, mufler à
 grandes fleurs, gueule-de-loup, gueule-de-lion bovengrondse delen parties aériennes

Aphanes arvensis L. Rosaceae *Alchemilla arvensis* (L.) Scop. grote leeuwenklauw
 alchemille des champs bovengrondse delen parties aériennes

Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault Nostocaceae klamath, AFA
 algue blue-vert du lac klamath, AFA hele plant plante entière Analyse moet
 aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden marine toxines bevat. Het gehalte aan
 microcystine moet onder 1 µg/g zijn. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient
 aucune quantité détectable en toxines marines. La teneur en microcystine doit être inférieure à 1 µg/g.

Apium graveolens L. Apiaceae selderij céleri sauvage hele plant plante
 entière

Arachis hypogaea L. Leguminosae aardnoot arachide, cacahuète zaad, vette
 olie graine, huile grasse

Aralia elata (Miq.) Seem. Araliaceae japanse engelenboom angélique en arbre du japon blad, wortelschors feuille, écorce de racine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Aralia racemosa L. Araliaceae trosaralia, Amerikaanse nardus aralia à grappes wortelstok, wortel rhizome, racine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Arbutus unedo L. Ericaceae aardbeiboom arbousier commun vrucht, blad fruit, feuille De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Arctium lappa L. Compositae Amerikaanse nardus grande bardane hele plant plante entière

Arctium minus (Hill) Bernh. Compositae *Lappa minor* Hill kleine klit petite bardane hele plant plante entière

Arctium tomentosum Mill. Compositae donzige klit bardane tomenteuse, bardane poilue hele plant plante entière

Argania spinosa (L.) Skeels Sapotaceae arganboom arganier vrucht, pitolie fruit, huile de noyaux Voor de pitolie, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).

Pour l'huile de noyaux, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).

A Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Brassicaceae mierikswortel, mierik raifort, cranson wortel racine

Artemisia abrotanum L. Compositae *Artemisia procera* Willd. citroenkruid aurone, citronnelle, aurone mâle, abrotone, armoise citronnelle, arquebuse. bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia absinthium L. Compositae absintalsem bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia capillaris Thunb. Compositae welriekende alsem armoise capillaire bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia dracunculus L. Compositae dragon estragon bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname

van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia frigida Willd. Compositae westerse bijvoet armoise douce
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia genipi Weber ex Stechm. Compositae alpenbijvoet génépi vrai, génépi noir
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia glacialis L. Compositae
aériennes bovengrondse delen parties
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia judaica L. Compositae
aériennes bovengrondse delen parties
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia pontica L. Compositae kleine alsem, pontische alsem petite absinthe, absinthe romaine
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia umbelliformis Lam. Compositae kleine alpenabsint génépi blanc
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia vallesiaca All. Compositae armoise du valais
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia verlotiorum Lamotte Compositae bovengrondse delen
parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia vulgaris L. Compositae bijvoet armoise vulgaire bovengrondse delen
parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg Moraceae broodboom
arbre à pain vrucht, zaad, hout fruit, graïne, bois Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling

ondergaan. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.

Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis Fucaceae knotswier ascophylle noueuse
thallus thallus

Asimina triloba (L.) Dunal Annonaceae pawpaw asiminier vrucht rijpe
fruit mûr Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden
acetogenines bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité
détectable en acétogénines.

Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren Leguminosae aspalathus, rooibos thé
aspalathus, rooibos thé bovengrondse delen parties aériennes

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. Asparagaceae chinese asperge
asperge chinoise wortel racine

Asparagus officinalis L. Asparagaceae asperge asperge wortel, scheut racine,
pousse

Asparagus racemosus Willd. Asparagaceae satavari, satavar, shatamull
wortelstok rhizome

Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech Leguminosae Astragalus adscendens
Boiss. & Hausskn. gom gomme

Astracantha cretica (Lam.) Podlech Leguminosae Astragalus creticus Lam.
gom gomme

Astracantha gummiifera (Labill.) Podlech Leguminosae Astragalus gummiifer Labill.
gom gomme

Astracantha microcephala (Willd.) Podlech Leguminosae Astragalus microcephalus Willd.
gom gomme

Astragalus membranaceus Moench Leguminosae astragalus astragale
wortel racine

Astrantia major L. Apiaceae zeeuws knoopje, groot sterrenscherm grande
astrance, grande radiairebovengrondse delen parties aériennes

Athamanta macedonica (L.) Spreng. Apiaceae vrucht, blad
fruit, feuille De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken
tijdens zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de
grossesse.

Atractylodes lancea (Thunb.) DC. Compositae wortelstok, wortel
rhizome, racine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts
of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement
suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Atractylodes macrocephala Koidz. Compositae wortelstok
rhizome De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Atractylodes ovata (Thunb.) DC. Compositae wortelstok
rhizome De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Avena fatua L. Poaceae oot folle-avoine, averon, coquiole, havenon
bovengrondse delen parties aériennes

Avena sativa L. Poaceae haver, gekweekte haveravoine, avoine cultivée
bovengrondse delen parties aériennes

Baccharis trimera (Less.) DC. Compositae *Baccharis genistelloides* var. *trimera* (Less.) Baker
carqueja baccharis hele plant plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Bacopa monnieri (L.) Wettst. Plantaginaceae *Bacopa monnieri* (L.) Pennell kleinbladige bacopa,
brahmi hysope d'eau, brahmi hele plant plante entière

Bactris gasipaes Kunth Arecaceae perzikipalm palmier pêche, péjibaie, parépou
vrucht fruit

Balanites aegyptiaca (L.) Delile Zygophyllaceae dattier du désert
plante entière

Ballota nigra L. Lamiaceae stinkende ballote ballote fétide, ballote noire
bovengrondse delen parties aériennes

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek Lamiaceae stinkende ballote
ballote du midi, ballote fétide hele plant plante entière

Bambusa bambos (L.) Voss Poaceae *Bambusa arundinacea* (Retz.) Willd. bamboe
bambou tabashir scheut, stengel pousse, tige De grondstof moet een
hittebehandeling ondergaan. La matière première doit être traitée à la chaleur.

Bambusa vulgaris Schrad. Poaceae bamboe bambouscheut, stengel
pousse, tige De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan. La matière première
doit être traitée à la chaleur.

Barbarea verna (Mill.) Asch. Brassicaceae vroeg barbarakruid cresson de terre,
barbarée printanière bovengrondse delen parties aériennes

Barbarea vulgaris R.Br. Brassicaceae gewoon barbarakruid barbarée commune, herbe de
sainte-barbe bovengrondse delen parties aériennes

Bellis perennis L. Compositae madeliefje pâquerette bovengrondse delen
parties aériennes

Berberis aquifolium Pursh. Berberidaceae Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. mahonia
aquifolium (pursh) nutt. mahonia wortel racine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag
niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. La
portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline
(exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.

Berberis aristata DC. Berberidaceae wortel racine De aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als
berberine) hoger dan 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une
ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.

Berberis vulgaris L. Berberidaceae zuurbes epine-vinette wortel racine De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden
(uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas
conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.

Bertholletia excelsa Bonpl. Lecythidaceae paranoot, brazielnoten, Amazonianoten
noyer d'Amazonie, noyer du Brésil, châtaignier du Brésil noot noix

Beta vulgaris L. Amaranthaceae gekweekte biet betterave cultivée hele plant
plante entière

Betula alleghaniensis Britton Betulaceae gele berk bouleau jaune schors, blad
écorce, feuille

Betula lenta L. Betulaceae suikerberk bouleau flexible, bouleau acajou, bouleau
merisier schors, blad, sap écorce, feuille, sève

Betula pendula Roth Betulaceae ruwe berk bouleau verruqueux, bouleau blanc
knop, schors, blad, teer, sap bourgeon, écorce, feuille, goudron, sève

Betula pubescens Ehrh. Betulaceae zachte berk, gewone berk bouleau pubescent,
bouleau des marais knop, schors, blad, sap bourgeon, écorce, feuille, sève

Bixa orellana L. Bixaceae orleaanboom rocouyer blad, vrucht, zaad
feuille, fruit, graine

Blainvillea acmella (L.) Philipson Compositae *Spilanthes acmella* (L.) Murray, *Acmella*
oleracea (L.) R. K. Jansen champagneblad, abc-kruid, parakers brèdes mafane
bovengrondse delen parties aériennes

Borago officinalis L. Boraginaceae bernagie, komkommerkruid bourrache,
bourrache officinale bloem, zaad fleur, graine Het gehalte aan toxische pyrrolizidine
alkaloiden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn. La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques
toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.

Boronia megastigma Nees ex Bartlett Rutaceae boronia boronia
bovengrondse delen parties aériennes

Boswellia sacra Flueck.	Burseraceae	wierookboom	arbre à encens	gomhars
gomme-résine				

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	Burseraceae	wierookboom	encens	oliehars
oléorésine				

Brassica cretica Lam.	Brassicaceae	bovengrondse delen	parties aériennes	
-----------------------	--------------	--------------------	-------------------	--

Brassica napus L.	Brassicaceae	Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.	koolzaad	
colza, navette	wortel, zaad	racine, graine		

Brassica nigra (L.) K.Koch	Brassicaceae	zwarte mosterd	moutarde noire	
bovengrondse delen	parties aériennes			

Brassica oleracea L.	Brassicaceae	incl. tuinkool	incl. chou potager	
bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.		

Brassica rapa L.	Brassicaceae	Sinapis juncea L.	raapzaad	navette d'été	hele plant
plante entière					

Buglossiodes arvensis	Boraginaceae	olie van het zaad	huile de la graine
Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).			

Bupleurum chinense DC.	Apiaceae	sikkelgoudscherm	buplèvre chinois
wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le diabète.	

Bupleurum rotundifolium L.	Apiaceae	doorwas	buplèvre à feuilles rondes
bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le diabète.	

Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch.	Burseraceae	vrucht,
schors	fruit, écorce	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden podophyllotoxine en analogen bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en podophyllotoxine et analogues.

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. Leguminosae grijze knikkernoot canique grise,
z'yeux à chatte schors, zaad écorce, graine

Cakile maritima Scop. Brassicaceae zeeraket roquette de mer, cakilier maritime,
tétine de souris blad, wortel feuille, racine

Calendula arvensis (Vaill.) L. Compositae akkergoudsbloem souci des champs,
souci sauvage bloem fleur De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet
gebruiken bij zwangerschap.

Niet gebruiken bij leverproblemen. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne
pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas des problèmes de foie.

Calendula officinalis L. Compositae tuingoudsbloem souci officinal
bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet de volgende
waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.

Niet gebruiken bij leverproblemen. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne
pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas des problèmes de foie.

Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae struikhei callume, bruyère commune
bovengrondse delen parties aériennes

Camelina sativa (L.) Crantz Brassicaceae huttentut, dedersaad, vlasdodder, vlasdotter
cameline, lin bâtard zaad graine

Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae theestruik théier blad feuille De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 600 mg looistoffen
(uitgedrukt als epigallocatechine-3-gallaat). Enkel het gebruik van volgende extractievloeistoffen zijn
toegelaten : water, alcohol met een maximumgehalte van 25 %. La portion journalière recommandée
ne doit pas conduire à une ingestion de tanins (exprimé en épigallocatechine-3-gallate) supérieure à
600 mg. Seule l'utilisation des solvants d'extraction suivants est acceptée : eau, alcool avec une teneur
maximale de 25%.

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson Annonaceae ylang-ylang ylang-ylang,
canang odorant bloem fleur De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname
hoger dan 3 mg safrol. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de
safrole supérieure à 3 mg.

Canarium acutifolium (DC.) Merr. Burseraceae noot noix

Capparis spinosa L. Capparaceae kappertjes câprier commun, câprier épineux
bovengrondse delen parties aériennes

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Brassicaceae gewoon herderstasje bourse-à-
pasteur commune bovengrondse delen parties aériennes

Capsicum annuum L. Solanaceae Capsicum frutescens L. spaanse peper, chilipepers, paprika,
groene peper, rode peper piment annuel, piment des jardins, piment rouge, poivre de guinée
vrucht fruit

Carex arenaria L.	Cyperaceae	zandzegge	laîche des sables	blad, wortelstok	feuille, rhizome
Carica papaya L.	Caricaceae	papaja, meloenboom	papayervrucht	fruit	
Carissa carandas L.	Apocynaceae	kristusdoorn	karondavvrucht, blad	fruit, feuille	
Carlina acaulis L.	Compositae	zilverdistel	carline acaule	wortel	racine
Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens	Compositae			hoge zilverdistel	carline argentée wortel racine
Carpinus betulus L.	Betulaceae	haagbeuk	charme knop, blad	bourgeon, feuille	
Carthamus lanatus L.	Compositae		carthame laineux	olie van het zaad, bloem	huile de la graine, fleur
Carthamus tinctorius L.	Compositae	saffloer	carthame des teinturiers	bloem, zaad	fleur, graine
Carum carvi L.	Apiaceae	echte karwij	carvi, cumin de prés	vrucht	fruit

Cassia fistula L. Leguminosae indische goudenregen canéficier, cassier vrucht
(peul), blad fruit (gousse), feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De
analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de
volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij
zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.

Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit
pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg.
Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit
comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez
votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un
spécialiste.

Castanea sativa Mill.	Fagaceae	tamme kastanje	châtaigner, commun
schors, bladknop, blad, zaad		écorce, bourgeon de feuille, feuille, graine	

Catalpa bignonioides Walter	Bignoniaceae	groene trompetboom	catalpa bignioïdes,
arbre aux haricots, catalpa boule, catalpa commun		blad	feuille

Ceanothus americanus L.	Rhamnaceae	amerikaanse sering	thé du new jersey
blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden peptide alkaloïden bevat L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes peptidiques.	

Cecropia peltata L. Urticaceae bois trompette, coulequin hele plant
 plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts
 of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter
 l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de
 traitement contre le diabète.

Cedrus libani A. Rich. Pinaceae libanonceder, libanese ceder cèdre du liban
 kegelvrucht, blad, hout cône, feuille, bois

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae kapokboom kapokier, bois coton,
 fromager bast, blad, olie van het zaad liber, feuille, huile de la graine

Centaurea behen L. Compositae bloem fleur

Centaurea calcitrapa L. Compositae kalketrip centaurée chausse-trape, centaurée
 étoilée, chardon étoilé bloem fleur

Centaurea centaurium L. Compositae centaurie, groot duizendguldenkruid
 grande centaurée bloem fleur

Centaurea cyanus L. Compositae korenbloem bleuet des champs, centaurée bleuet
 bloem fleur

Centaurea jacea L. Compositae knoopkruid centaurée jacée, tête de moineau,
 ambrette bloem fleur

Centaurea montana L. Compositae bergcentaurie centaurée des montagnes
 bloem fleur

Centaurium erythraea Rafn Gentianaceae *Erythraea centaurium* (L.) Pers. echt
 duizendguldenkruid erythrée petite centaurée bovengrondse delen parties aériennes

Centella asiatica (L.) Urb. Apiaceae *Hydrocotyle asiatica* L. gotu kola hydrocotyle
 d'asie bovengrondse delen parties aériennes

Centranthus ruber (L.) DC Caprifoliaceae rode spoorbloem, rode valeriaan
 valériane rouge, centranthe rouge wortel racine Analyse moet aantonen dat de
 bereiding geen detecteerbare hoeveelheden valepotriaten bevat. L'analyse doit démontrer que la
 préparation ne contient aucune quantité détectable en valépotriates.

Cerasus mahaleb (L.) Mill. Rosaceae weichselboom bois de sainte-lucie, cerisier
 de sainte-lucie, faux merisier zaad graine

Ceratonia siliqua L. Leguminosae johannesbroodboom caroubier vrucht, zaad
 fruit, graine

Cercis siliquastrum L. Leguminosae judasboom arbre de judée, gainier vrucht,
 gomme van het zaad fruit, gomme de la graine

Cetraria islandica (L.) Parmeliaceae ijslands mos lichen d'islande thallus thallus De
 aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg.

De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

Chaenomeles speciosa Nakai Rosaceae chinese sierkwee cognassier de chine
vrucht fruit

Chamaemelum nobile (L.) All. Compositae Anthemis nobilis L. roomse kamille camomille
romaine bovengrondse delen parties aériennes

Chamaecrista nomame (Sieber) H.Ohashi Leguminosae Cassia nomame (Sieber) Honda
vrucht (peul), blad fruit (gousse), feuille

Chelone glabra L. Plantaginaceae schildpadbloem tête de tortue
bovengrondse delen parties aériennes

Chenopodium quinoa Willd. Amaranthaceae quinoa quinoa gewassen zaden grains
lavées

Chenopodium vulvaria L. Amaranthaceae stinkende ganzenvoet vulvaire hele
plant plante entière Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden
ascaridole bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité
détectable en ascaridole.

Chimaphila umbellata (L.) Nutt. Ericaceae Chimaphila cymosa J.Presl & C.Presl pipsissewa
chimaphile à ombelles, pirole en ombelle hele plant plante entière

Chiococca alba (L.) Hitchc. Rubiaceae bejuco de berac wortel racine

Chionanthus virginicus L. Oleaceae sneeuwvlokkenboom arbres à neige
wortelschors écorce de racine

Chlorella vulgaris Beijerinck Chlorellaceae Chlorella pyrenoidosa H. Chick, Chlorella communis
Artari chlorella chlorella ééncellige alg algue unicellulaire

Chondrus crispus Stackhouse Gigartinaceae iers moswier varech, mousse d'irlande
thallus thallus

Chrysanthellum americanum (L.) Vatke Compositae chrysanthellum bloeiende
toppen sommités fleuries

Chrysanthellum indicum subsp. afroamericanum B.L. Turner Asteraceae gele
kamille camomille d'or bovengrondse delen parties aériennes

Chrysophyllum cainito L. Sapotaceae cainito, sterappel caïmitier, caïnite
vrucht fruit

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty Poaceae vetiver vétiver wortel racine

Cichorium endivia L. Compositae andijvie chicorée endive blad feuille

Cichorium intybus L. Compositae wilde cichorei chicorée sauvage hele plant
plante entière

Cinchona calisaya Wedd. Rubiaceae *Cinchona ledgeriana* (Howard) Bern.Moens ex
Trimen kinaboom, quinaboom quinquina jaune, quinquina calisaya schors écorce De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De
etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12
jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine
supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux
enfants de moins de 12 ans.

Cinchona lancifolia Mutis Rubiaceae schors écorce De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De
etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12
jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine
supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux
enfants de moins de 12 ans.

Cinchona micrantha Ruiz & Pav. Rubiaceae schors écorce De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De
etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12
jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine
supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux
enfants de moins de 12 ans.

Cinchona nitida Ruiz & Pav. Rubiaceae schors écorce De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De
etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12
jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine
supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux
enfants de moins de 12 ans.

Cinchona officinalis L. Rubiaceae kinaboom, quinaboom quinquina jaune, quinquina
calisayaschors, blad écorce, feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas
conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement
suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd. Rubiaceae schors écorce De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De
etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12
jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine
supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux
enfants de moins de 12 ans.

Cinchona pubescens Vahl Rubiaceae rode kinaboom, rode kinine quinquina
rouge schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van
kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen
aan kinderen jonger dan 12 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Cinnamomum camphora (L.) J.Presl	Lauraceae	kamferboom	camphrier, laurier
du japon	hele plant	plante entière	

Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl	Lauraceae	Cinnamomum aromaticum Nees
chinese kaneel	cannelier de chine	bovengrondse delen parties aériennes

Cinnamomum verum J.Presl.	Lauraceae	Cinnamomum zeylanicum Blume, C. zeylanicum
Nees	chinese kaneel, kaneelboom	canelle de chine, cannelier schors, blad écorce, feuille

Cistanche salsa (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchaceae	stengel tige
-------------------------------------	---------------	--------------

Cistus creticus L.	Cistaceae	Cistus ladaniferus Stokes	rotsroosciste de crête
vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		

Cistus x incanus L.	Cistaceae	cistusroos	ciste à gomme	hele plant
plante entière				

Cistus monspeliensis L.	Cistaceae	rotsroos	ciste de montpellier	vrucht, blad, hars
fruit, feuille, résine				

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae	watermeloen	pastèque
vrucht, zaad	fruit, graine		

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle	Rutaceae	limoen lime, limettier	vrucht	fruit
---	----------	------------------------	--------	-------

Citrus aurantium L. Rutaceae Citrus aurantium L. ssp. amara Engl., Citrus aurantium L. ssp. sinensis L., Citrus aurantium L. ssp. aurantium L, Citrus aurantium var. dulcis bittere oranje
 appelboom curaçao oranjeappel orange amère, bigaradier orange de curaçao bloem, vrucht, pericarp fleur, fruit, péricarpe Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht :
 De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van para-synephrine hoger dan 20 mg. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden meta-synephrine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken door personen die behandeld worden voor hypertensie. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij tekenen van onrust of nervositeit, de inname van het product stoppen. Pour les compléments alimentaires avec des préparations du fruit : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de para-synéphrine supérieure à 20 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en méta-synéphrine. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement . Ne pas utiliser en cas de traitement anti-hypertenseur . Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans. Cesser l'utilisation du produit en cas d'agitation ou de nervosité.

Citrus x limon (L.) Osbeck	Rutaceae	Citrus limon (L.) Burm. f.	citroenboom,
limoen	citron, citronnier	bovengrondse delen parties aériennes	

Citrus maxima (Burm.) Merr. pompelmoesboom	Rutaceae pamplemoussier	Citrus grandis (L.) Osbeck, Citrus decumana L. vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine
Citrus medica L. vrucht, zaad	Rutaceae fruit, graine	sucade-citroen, cedraat, citroenboom	cédratier
Citrus myrtifolia Raf. chinois vrucht, pericarp	Rutaceae fruit, péricarpe	Citrus aurantium var. myrtifolia Ker Gawl.	chinotto
Citrus nobilis Lour.	Rutaceae	vrucht	fruit
Citrus paradisi Macfad. parties aériennes	Rutaceae	grapefruit	grapefruit bovengrondse delen
Citrus reticulata Blanco mandarinier, clémentine	Rutaceae bovengrondse delen	mandarijn, tanquerine, satsuma, clementine	parties aériennes
Citrus sinensis (L.) Osbeck fleur, feuille, fruit	Rutaceae	sinaasappel	oranger bloem, blad, vrucht
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. Cladoniaceae echt rendiermos lichen des rennes, lichen des caribous thallus thallus De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.			
Clematis armandii Franch. gedroogde stengel	Ranunculaceae tige séchée	bosrank	clématite d'armand
Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.			
Clematis chinensis Osbeck wortel	Ranunculaceae racine séchée	chinese clematis	gedroogde
Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.			
Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball	Lamiaceae	Calamintha nepeta	blad feuille
Clinopodium vulgare L. clinopode commun, sariette vulgaire	Lamiaceae	Calamintha vulgaris (L.) Druce	borstelkrans parties aériennes
Clitoria ternatea L. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur	Leguminosae	kittelbloem	pois bleu bloem fleur

bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique.

Cnicus benedictus L.	Compositae	gezegende distel	chardon-bénit
bovengrondse delen	parties aériennes		
Cochlearia officinalis L.	Brassicaceae	echt lepelblad	cochléaire officinale, cranson
bovengrondse delen	parties aériennes		
Cocos nucifera L.	Arecaceae	kokospalm	cocotierzaad, vette olie graine, huile grasse
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.	Campanulaceae	codonopsis	codonopsis
wortel	racine		
Coffea arabica L.	Rubiaceae	koffie (boom)	caféier zaad graine
Coffea canephora Pierre ex Froehner	Rubiaceae	Coffea robusta Lind. ex De Wild	
robusta koffieplant	caféier robusta	zaad	graine
Coix lacryma-jobi L.	Poaceae	jobstranen	larmes de job zaad graine

Coix lacryma-jobi var. ma-yuen (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae	Coix ma-yuen Rom. Caill.
jobstranen	larmes de job	zaad, olie van het zaad graine, huile de la graine

Cola acuminata (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae	kolaboom	noix de cola, colatier zaad graine
---	-----------	----------	------------------------------------

Cola nitida (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae	kolaboom	noix de cola, colatier zaad graine
-------------------------------------	-----------	----------	------------------------------------

Coleus forskohlii (Poir.) Briq.	Lamiaceae	bovengrondse delen, wortel
parties aériennes, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie.	

Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le coeur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Combretum micranthum G.Don	combretaceae	kinkeliba	kinkéliba	blad
feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.		

Combretum sundaicum Miq.	Combretaceae	blad, bladsteel	feuille, pédoncule
--------------------------	--------------	-----------------	--------------------

Commiphora africana (A.Rich.) Endl.	Burseraceae	afrikaanse mirre	myrrhe
africaine	gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing

bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Commiphora habessinica (O.Berg) Engl. Burseraceae gomhars
gomme-résine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Commiphora mukul Engl. Burseraceae guggul myrrhe des indes olie-
gomhars Oleo-gomme-résine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Commiphora myrrha (Nees) Engl. Burseraceae Commiphora molmol (Engl.) Engl. ex
Tschirch mirre myrrhe olie-gomhars oleo gomme-résine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Commiphora schimperi (O.Bergman) Engl. Burseraceae gomhars
gomme-résine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Conyza canadensis (L.) Cronquist Compositae Erigeron canadensis L. canadese fijnstraal
vergerette du canada, conyze du canada hele plant plante entière

Copaifera langsdorffii Desf. Leguminosae oliears van de schors
oléorésine de l'écorce

Coptis japonica (Thunb.) Makino Ranunculaceae wortelstok
rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.

Coptis teeta Wall. Ranunculaceae wortelstok rhizome De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.

Coptis trifolia (L.) Salisb. Ranunculaceae coptide trifoliée wortelstok
rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.

Corallina officinalis L. Corallinaceae thallus thallus

Cordia myxa L. Boraginaceae sebestenboom vrucht fruit Het gehalte aan
toxische pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn. La teneur en
alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.

Coriandrum sativum L. Apiaceae koriander coriandre bovengrondse delen,
olie van het zaad parties aériennes,

huile de graine Voor de olie van het zaad, enkel de producten conform met de toelating als novel
food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).

Pour l'huile de graine, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel
ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).

Cornus florida L. Cornaceae grootbloemige amerikaanse kornoelje cornouiller
à fleurs d'amérique, bois-de-chien vrucht, schors fruit, écorce

Cornus mas L. Cornaceae gele kornoelje cornouiller mâle vrucht fruit

Cornus officinalis Siebold & Zucc. Cornaceae japanse kornoelje cornouiller
officinal vrucht fruit

Cornus sanguinea L. Cornaceae rode kornoelje cornouiller sanguin, sanguin
knop, vrucht, blad bourgeon, fruit, feuille

Corrigiola telephiifolia Pourr. Molluginaceae corrigiole à feuilles de téléphium
wortel racine

Corylus avellana L. Betulaceae hazelaar noisetier, coudrier bladknop,
blad, vrucht, zaad bourgeon de feuille, feuille, fruit, graine

Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson Myrtaceae Eucalyptus citriodora Hook.
citroen eucalyptus eucalyptus citronné blad feuille

Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr. Menispermaceae
wortel, stengel racine, tige De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname
van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. La portion journalière
recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine)
supérieure à 10 mg.

Crambe maritima L. Brassicaceae zeekool chou marin, crambé maritime hele
plant plante entière

Crataegus azarolus L. Rosaceae azarooldoorn azarolier, azérolier vrucht, blad,
bloeiende top fruit, feuille, sommité fleurie De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan
2,6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines
oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.

Crataegus curvisepala Lindm. Rosaceae koraalmeidoorn aubépine à feuilles
en éventail vrucht, blad, bloeiende top fruit, feuille, sommité fleurie De aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5
mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas

conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.

Crataegus laevigata (Poir.) DC. Rosaceae *Crataegus oxyacantha* auct. tweestijlige meidoorn aubépine à deux styles bladknop, blad, bloeiende top, zaad bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.

Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae eenstijlige meidoorn aubépine à un style bladknop, blad, bloeiende top, zaad bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. Rosaceae vrucht, blad, bloeiende top fruit, feuille, sommité fleurie De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoïden hoger dan 2,6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.

Crithmum maritimum L. Apiaceae zeevenkel fenouil marin, perce-pierre blad feuille De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Crocus sativus L. Iridaceae saffraankrokus safran bloem fleur De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressie behandeling. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression.

Crossostephium chinense (A.Gray ex L.) Makino Compositae bovengrondse delen parties aériennes

Cruciata laevipes Opiz Rubiaceae *Galium cruciata* (L.) Scop. kruisbladwalstro gaillet croisette bovengrondse delen parties aériennes

Cryptocarya agathophylla van der Werff Lauraceae *Ravensara aromatica* Sonn.; *Agathophyllum aromaticum* (Sonn.) Willd ravsara ravsare aromatique, ravsara aromatica vrucht fruit

Cucumis melo L. Cucurbitaceae meloenmelon vrucht, zaad fruit, graine

Cucumis sativus L. Cucurbitaceae comcommer concombres vrucht fruit

Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitaceae	reuzenpompoe	potiron vrucht	fruit
Cucurbita pepo L. pépon, citrouille	Cucurbitaceae bloem, vrucht	courgette, pompoe, sierpompoe fleur, fruit	courge,	
Cuminum cyminum L.	Apiaceae	komijn cumin officinal	vrucht	fruit
Cupressus sempervirens L. schors, vrucht, blad	Cupressaceae écorce, fruit, feuille	italiaanse cipres	cypres provençal	
Curcuma longa L. Amomum curcuma Jacq rhizome	Zingiberaceae curcuma, rhizome de curcuma, safran des indes De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.	Curcuma domestica Val., Curcuma domestic Loir., curcuma, rhizome de curcuma, safran des indes	wortelstok	
Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae	curcuma	curcuma	wortelstok rhizome
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe safran de java, zedoaire	Zingiberaceae wortelstok	javaanse curcuma, zedoarwortelstok rhizome		
Cuscuta chinensis Lam. zaad	Convolvulaceae graine	duivelsnaaigaren	cuscuta de chine	
Cuscuta epithymum Murray petites fleurs, petite cuscute	Convolvulaceae bovengrondse delen	klein warkruid parties aériennes	cuscute du thym, cuscute à	
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. zaad, gom	Leguminosae graine, gomme	guarplant	plante à guar	
Cyathula officinalis K.C. Kuan	Amaranthaceae	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. cyclanthère à feuilles digitées	Cucurbitaceae vrucht, blad	caigua, mexicaanse augurk fruit, feuille	caigua,	
Cydonia oblonga Mill.	Rosaceae	Cydonia vulgaris Pers.	kwee	cognassier vrucht fruit
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf lemongrass de l'amerique centrale	Poaceae bovengrondse delen	citroengras parties aériennes	citronelle,	
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W. Watson (Nees ex Steud.) Stapf	Poaceae bovengrondse delen	Cymbopogon flexuosus parties aériennes		
Cymbopogon jwarancusa subsp. olivieri (Boiss.) Soenarko laniger (Desf.) Duthie	Poaceae bovengrondse delen	Cymbopogon parties aériennes		
Cymbopogon martini (Roxb.) Will. Watson	Poaceae	palmarossa	palmarosa	

Cymbopogon nardus (L.) Rendle citronnelle des indes	Poaceae bovengrondse delen		citronella	verveine des indes, parties aériennes
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. bovengrondse delen	Poaceae parties aériennes	Andropogon schoenanthus L.	kameelgras	
Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor bovengrondse delen	Poaceae parties aériennes		java citronella	citronelle de java
Cynara cardunculus L. capitule, feuille	Compositae	kardoen	cardon	bloemhoofd, blad
Cynara scolymus L. capitule, feuille	Compositae	artisjokartichaut		bloemhoofd, blad
Cyperus rotundus L. rhizome	Cyperaceae De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	notengras	souchet rond	wortelstok
L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.				
Cytinus hypocistis (L.) L. fleur, jus	Cytinaceae	gele hypocist		bloem, sap
Daemonorops draco (Willd.) Blume draco Willd.	Arecaceae vrucht, hars	Daemonorops propinqua Becc.; Calamus fruit, résine		
Dahlia pinnata Cav. wortel	Compositae racine	Dahlia variabilis (Willd.) Desf.		dahlia commun
Daucus carota L.	Apiaceae	peen	carotte	wortel, zaad racine, graine
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. chrysanthème, Chrysanthème d'automne, Chrysanthème horticole fleur, feuille	Compositae		tuinchrysant	bloem, blad
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl sophie blad, zaad	Brassicaceae feuille, graine	sofiekruid		l'herbe de sainte
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.				
Desmodium adscendens DC.	Desmodium	Desmodium	blad	feuille
Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden dimethyltryptamine derivaten en alkaloiden van het type beta-carboline (type harmane) bevat L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de dérivés de la diméthyltryptamine ni d'alkaloïdes de type bêta-carboline (type harmane)				
Dianthus caryophyllus L. bloem	Caryophyllaceae	tuinanj		oeillet des fleuristes
Dimocarpus longan Lour. zaadmantel, bloem, vrucht	Sapindaceae	Euphoria longan (Lour.) Steud.	longan	longane arille, fleur, fruit

Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae	igname ailée, grande igname, cambarre		
wortelknol	tubercule	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.	
Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palib.) C. Pei & C. T. Ting	Dioscoreaceae			
wortelstok	rhizome			
Dioscorea composita Hemsl.	Dioscoreaceae		wortelknol	tubercule
Dioscorea oppositifolia L.	Dioscoreaceae	Dioscorea opposita Thunb.	yam	yam
wortel, wortelstok	racine, rhizome			
Dioscorea polystachya Turcz.	Dioscoreaceae	Dioscorea batatas Decne	yamswortel, chinese	
igname igname wortelstok	rhizome			
Dioscorea villosa L.	Dioscoreaceae	wilde yam	igname indigène	wortelknol
tubercule				
Diospyros kaki Thunb.	Ebenaceae	kaki	kaki, plaqueminier	vrucht, blad, zaad
fruit, feuille, graine				
Diospyros virginiana L.	Ebenaceae	amerikaanse persimoon	plaquemines de virginie.	
vrucht, olie van het zaadfruit, huile de graine				
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC	Brassicaceae	grote zandkool, wilde rucola	diplotaxis à	
feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse	
hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.			La portion journalière	
recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.				
Dipsacus fullonum L.	Caprifoliaceae	grote kaardebol, wilde kaardebol	cabaret des	
oiseaux, cardère à foulon, bonnetier sauvage, chardon à bonnetier		wortel	racine	
Dipsacus inermis Wall.	Caprifoliaceae	Dipsacus asper Wallich., Dipsacus asperoidis C. Y. Cheng et T. M. Ai		
sechuan kaardebol, xu duan	xu duanwortel	racine		
Dipsacus japonicus Miq.	Caprifoliaceae	japanse kaardebol	dipsacus japonicus	
miq. wortel	racine			
Dorstenia contrajerva L.	Moraceae		wortel	racine
Dracocephalum moldavica L.	Lamiaceae		thé des jardins, tête de dragon,	
mélisse de moldavie	blad, zaad	feuille, graine		
Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae		écorce de winter, foye,	
canelo bast	liber			
Drosera anglica Huds.	Droseraceae	Drosera longifolia L.	lange zonnedaauw	rossolis
d'angleterre, rossalis à feuilles longues	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat	
de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.			L'analyse doit démontrer	
que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.				

Drosera intermedia Hayne Droseraceae kleine zonnedaauw Droséra
intermédiaire hele plant plante entière Analyse moet aantonen dat de bereiding geen
detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation
ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.

Drosera peltata Thunb. Droseraceae bovengrondse delen parties
aériennes Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden
naftochinonen bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité
détectable en naphtoquinones.

Drosera ramentacea Burch ex DC Droseraceae hele plant
plante entière Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden
naftochinonen bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité
détectable en naphtoquinones.

Drosera rotundifolia L. Droseraceae ronde zonnedaauw droséra, rossolis à feuilles
rondes bovengrondse delen parties aériennes Analyse moet aantonen dat de bereiding
geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation
ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.

Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco Dunaliellaceae Haematococcus salinus Dunal

Durvillea antarctica (Chamisso) Hariot Durvillaeaceae Fucus antarcticus Chamisso
thallus thallus

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants Amaranthaceae *Chenopodium botrys* L. druifkruid
bloeiwijzen inflorescences Analyse moet aantonen dat de bereiding geen
detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne
contient aucune quantité détectable en ascaridole.

Echinacea angustifolia DC. Echinacea kogelbloem, rode zonnebloem échinacée à
feuilles étroites wortel racine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname
hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2,4 g gedroogde wortel. La portion journalière
recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2,4 g de
racine séchée.

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. Compositae bleekbladige zonnehoed échinacée
pâle hele plant plante entière Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel
of wortelstok : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de
hoeveelheid equivalent met 720 mg gedroogde wortel. Pour les compléments alimentaires avec des
préparations de la racine ou rhizome : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une
ingestion supérieure à la quantité équivalente à 720 mg de racine séchée.

Echinacea purpurea (L.) Moench Compositae purperen rudbeckia, rode
zonnehoed échinacée pourpre hele plant plante entière De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2 g gedroogde
kruid. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la
quantité équivalente à 2 g d'herbe séchée.

Echium plantagineum L. Boraginaceae slangenkruid vipérine faux-plantain olie van het zaad huile de la graine Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.

Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.

Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).

Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchell Lessoniaceae arame aramé thallus thallus

Elaeis guineensis Jacq. Arecaceae oliepalm palmier à huile d'afrique olie van de pit huile de noyaux

Elettaria cardamomum (L.) Maton. Zingiberaceae echte kardemom, kardoem
cardamome zaad graine

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim Araliaceae *Acanthopanax senticosus*
(Rupr. et Maxim.) Harms. Siberische ginseng eleuthérocoque wortel racine

Elymus repens (L.) Gould Poaceae *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. kweek,
graswortel

chiendent des sables chiendent commun, chiendent rampant wortelstok rhizome

Embelia ribes Burm.f. Primulaceae wortel, blad, vrucht racine,
feuille, fruit De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Epilobium angustifolium L. Onagraceae gewoon wilgenroosje epilobe en épi,
epilobe à feuilles étroites bovengrondse delen parties aériennes

Epilobium parviflorum Schreb. Onagraceae viltige bastwezerik, kleinbloemig
wilgeroosje epilobe à petites fleurs bovengrondse delen parties aériennes

Equisetum arvense L. Equisetaceae heermoes prêle des champs
bovengrondse delen parties aériennes

Equisetum fluviatile L. Equisetaceae holpijp prêle des eaux bovengrondse delen
parties aériennes

Equisetum hyemale L. Equisetaceae schaafstro prêle d'hiver bovengrondse delen
parties aériennes

Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae reuzenpaardenstaart grande prêle, grande
queue-de-cheval bovengrondse delen parties aériennes

Erica cinerea L. Ericaceae inflorescences	rode dophei	bruyère cendrée bloeiwijze
Erica tetralix L. Ericaceae caminet bloem fleur	gewone dophei	bruyère quaternée, bruyère à quatre angles,
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. japon, bibassier blad, zaad	Rosaceae feuille, graine	japanse mispel, loquat néflier du
Eriodictyon californicum (Hook. et Arn.) Torr. herbe sainte bovengrondse delen	Boraginaceae parties aériennes	heilig kruid, yerba sancta
Erodium cicutarium L 'Hérit. commun, erodium à feuilles de ciguë	Geraniaceae hele plant	gewone reigersbek plante entière bec-de-cigogne
Eruca vesicaria L. Cav. Brassicaceae bovengrondse delen	Eruca sativa Mill. parties aériennes	Rucola, raketslaroquette De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
Eryngium campestre L. Apiaceae roulant bovengrondse delen	echte kruisdistel parties aériennes	panicaud champêtre, chardon
Eschscholtzia californica Cham. pavot jaune de californie	Papaveraceae bovengrondse delen	slaapmutsje eschscholtzia de californie, parties aériennes
Eucalyptus dives Schauer blad, twijg	Myrtaceae feuille, brindille	pepermunt eucalyptus eucalyptus mentholé
Eucalyptus globulus Labill. arbre à fièvre, gommier bleu	Myrtaceae schors, vrucht, blad	eucalyptusboom, koortsboom eucalyptus, écorce, fruit, feuille
Eucalyptus odorata Behr	Myrtaceae	blad feuille
Eucalyptus radiata Sieber ex DC. feuille	Myrtaceae	eucalyptus radiéblad
Eucalyptus smithii R.T.Baker écorce, fruit, feuille	Myrtaceae	schors, vrucht, blad
Eucheuma horridum J. Agardh	Solieriaceae	thallus thallus
Eucheuma spinosum J. Agardh	Solieriaceae	thallus thallus
Eucommia ulmoides Oliv. arbre à gutta-percha	Eucommiaceae schors écorce	gutta-percha boom, chinese rubberboom
Eugenia uniflora L. schors, bloem, vrucht, blad	Myrtaceae écorce, fleur, fruit, feuille	surinaamse kers ceriser de cayenne
Euphrasia rostkoviana Hayne euphrase glanduleuse	Orobanchaceae bovengrondse delen	Euphrasia officinalis L. beklierde ogentroost parties aériennes

Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. Orobanchaceae stijve ogentroost, ogentroost
euphrase raide, euphrase glanduleuse, casse-lunettes bovengrondse delen parties
aériennes

Euterpe oleracea Mart. Arecaceae açai açai vrucht, zaad fruit, graine

Evernia prunastri (L.) Ach. Parmeliaceae eikmos, gewoon geweimos evernia,
lichen de chêne, mousse de chêne thallus thallus

Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. Rubiaceae schors écorce De
etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig
gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant :
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le
diabète.

Fabiana imbricata Ruiz & Pav Solanaceae hele plant plante
entière

Fagopyrum esculentum Moench Polygonaceae *Polygonum fagopyrum* L. gewone boekweit
sarrasin commun, blé noir bovengrondse delen parties aériennes

Fagus sylvatica L. Fagaceae gewone beuk hêtre commun schors, knop, vrucht
ecorce, bourgeon, fruit

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Dec. Polygonaceae *Polygonum cuspidatum* Siebold & Zucc.
japanse duizendknoop renouée du japon, reynoutria du japon hele plant plante
entière

Ferula assa-foetida L. Apiaceae duivelsdrek ase fétide wortel, gomhars
racine, gomme- résine

Ficus benghalensis L. Moraceae banyan figuier des banians, banian de l'inde
schors, vrucht écorce, fruit De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage
doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage
concomitant de traitement contre le diabète.

Ficus carica L. Moraceae vijg figuier comestible hele plant plante
entière

Ficus religiosa L. Moraceae bodhiboom figuier des pagodes, arbre de la
bodhi, pipal schors, vrucht, blad écorce, fruit, feuille De etikettering moet de volgende
waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische
behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou
votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim Rosaceae *Spirea ulmaria* L. moerasspirea, geitenbaard
reine-des-prés, ulmaire, barbe de bouc bovengrondse delen parties aériennes De
etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij
gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. L'étiquetage doit comporter les avertissement suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Filipendula vulgaris Moench. Rosaceae knolspirea spirée filipendule hele plant plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. L'étiquetage doit comporter les avertissement suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae venkel fenouil bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragole supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans.

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl Oleaceae forsythia forsythia vrucht, blad, wortel fruit, feuille, racine

Fragaria x ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier Rosaceae aarbeï frasier hele plant plante entière

Fragaria vesca L. Rosaceae bosaardbei fraisier sauvage, fraisier des bois vrucht, blad fruit, feuille

Fragaria viridis Weston Rosaceae heuvelaardbei fraisier des collines, fraisier vert hele plant plante entière

Frangula alnus Mill. Rhamnaceae Frangula dodonei Ard., Rhamnus frangula L. sporkehout, vuilboom bourdaine, frangule schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : -Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Frangula purshiana Cooper Rhamnaceae Rhamnus purshiana DC.cascara cascara, écorce sacrée schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit

comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Fraxinus excelsior L. parties aériennes	Oleaceae	gewone es	frêne commun	bovengrondse delen
Fraxinus ornus L. blad, manna	Oleaceae feuille, manne	pluim-es, manna-es	frêne à fleurs, frêne à manne	
Fucus serratus L.	Fucaceae	zaagwier	varech denté	thallus thallus
Fucus vesiculosus L. thallus thallus	Fucaceae	fucus, blaaswier	fucus, varech vésiculeux	
Fumaria officinalis L. bovengrondse delen	Papaveraceae parties aériennes	gewone duivekervel	fumeterre officinale	
Galeopsis segetum Neck. hennepnetel	Lamiaceae galéopsis des champs, chanvre bâtard	Galeopsis ochroleuca Lam. bovengrondse delen	bleekgele parties aériennes	
Galium aparine L. gratte-langue, gaille	Rubiaceae bovengrondse delen	kleefkruid parties aériennes	gaillet gratteron, rièble, grateron,	
Galium mollugo L. bovengrondse delen	Rubiaceae parties aériennes	glad walstro	caille-lait blanc, gaillet mou	
Galium odoratum (L.) Scop. la connaît aussi sous les noms de "rièble", "grateron", "gratte-langue", "gaille". parties aériennes	Rubiaceae	Asperula odorata L.	lieievrouwebedstro bovengrondse delen	on
Galium verum L. bovengrondse delen	Rubiaceae parties aériennes	geel walstro	gaillet jaune, caille-lait jaune	
Garcinia x mangostana L.	Clusiaceae	mangostan	mangoustanier	vrucht fruit
Garcinia gummi-gutta (L.) Roxb.. guttegomboom	Clusiaceae guttier gomhars	Garcinia cambogia (Gaernt) Desr. gomme-résine		
Gardenia jasminoides J. Ellis gardénie commun, jasmin du cap	Rubiaceae	Gardenia augusta (L.) Merr. hele plant	gardenia plante entière	
Gastrodia elata Blume	Orchidaceae		hele plant	plante entière
Gaultheria procumbens L. bovengrondse delen	Ericaceae parties aériennes	liggende bergthee	gaulthérie du canada	
Gelidium amansii J.V. Lamouroux	Gelidiaceae		thallus thallus	

Gelidium sesquipedale (Clemente) Thuret		Gelidiaceae		agar agar	agar agar
thallus thallus					
Gentiana lutea L.	Gentianaceae	gele gentiaan	grande gentiane, gentiane jaune		
wortelstok, wortel	rhizome, racine				
Geranium maculatum L.	Geraniaceae		bovengrondse delen	parties	
aériennes					
Geranium pratense L.	Geraniaceae	beemdooievaarsbek	géranium des prés		
bovengrondse delen	parties aériennes				
Geranium robertianum L.	Geraniaceae	robertskruid	géranium herbe à robert		
bovengrondse delen	parties aériennes				
Geranium sanguineum L.	Geraniaceae	bloedooievaarsbek	géranium sanguin,		
herbe à becquet	bovengrondse delen	parties aériennes			
Geum rivale L.	Rosaceae	knikkend nagelkruid	benoîte des ruisseaux, benoite des		
ruisseaux	hele plant	plante entière			
Geum urbanum L.	Rosaceae	geel nagelkruid	benoîte commune	hele plant	
plante entière					

Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae ginkgo ginkgo, arbre des pagodes, arbre aux quarante écus blad feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van flavonolglycosiden hoger dan 21,6 mg en van terpeenlactonen hoger dan 5,4 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de glycosides de flavonol supérieure à 21,6 mg et de lactones terpéniques supérieure à 5,4 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

Glycine max (L.) Merr. Leguminosae soja soja zaad graine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Glycyrrhiza glabra L. Leguminosae zoethout réglisse wortel racine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.

Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC. Leguminosae chinees zoethout réglisse de l'oural, réglisse de sibérie wortel, wortelstok, stolon racine, rhizome, stolon De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.

Gossypium herbaceum L. Malvaceae katoenplant, oosters katoen cotonnier pilus, wortel, zaad pilus, racine, graine Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden gossypol bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.

Gossypium hirsutum L. Malvaceae behaarde katoen coton mexicain zaad graine Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden gossypol bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.

Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham Gracilariaceae knoopwier thallus thallus

Grindelia camporum Greene Compositae gomplant grindélia bovengrondse delen parties aériennes

Grindelia hirsutula Hook. & Arn. Compositae *Grindelia humilis* Hook & Ar. bovengrondse delen parties aériennes

Grindelia robusta Nutt. Compositae grindelia grindélia robuste bovengrondse delen parties aériennes

Grindelia squarrosa (Pursh) Dun. Compositae grindelia grindélia bovengrondse delen parties aériennes

Guaiacum officinale L. Zygophyllaceae guajakhout, echt pokhout bois de gaiac schors, hout écorce, bois

Guaiacum sanctum L. Zygophyllaceae guajakhout, pokhout bois de gaiac schors, hout écorce, bois

Guazuma ulmifolia Lamk. Malvaceae bois de hêtre, bois d'homme, bois d'orme schors, blad, vrucht, zaad écorce, feuille, fruit, graine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Cucurbitaceae jiaogulan jiaogulan, herbe de l'immortalité blad feuille De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Gypsophila paniculata L. Caryophyllaceae pluimgipskruid gypsophile
paniculée wortel racine

Haematococcus pluvialis Flotow Haematococcaceae bloedregenalg
haematococcus pluvialis éencellige alg algue unicellulaire

Haematoxylum campechianum L. Leguminosae campechehout bois de campêche
ongefermenteerd kernhout duramen non fermenté

Hamamelis virginiana L. Hamamelidaceae virginische toverhazelaar
hamamélis de virginie schors, blad écorce, feuille

Haplopappus baylahuen Remy Compositae bovengrondse delen
parties aériennes

Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. Pedaliaceae duivelsklauw griffe du diable
secundaire wortelknol tubercule secondaire De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg.

L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.

Harpagophytum zeyheri Decne. Pedaliaceae griffe du diable, plante-grappin,
araignée de boiswortel, wortelknol racine, tubercule De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg.

L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen Amaranthaceae *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze
braziliaanse ginseng suma, le ginseng brésilien, pfaffia wortel racine

Hedeoma pulegioides (L.) Pers. Lamiaceae hedeoma hédéome
bovengrondse delen parties aériennes

Hedera helix L. Araliaceae klimop lierre blad feuille Enkel de volgende preparaten zijn toegelaten, in overeenstemming met de volgende maximale dagelijkse dosis :

a) droog extract (DER 4-8:1), extractie solvent ethanol 24-30% m/m

- b) droog extract (DER 6-7:1), extractie solvent ethanol 40% m/m
- c) droog extract (DER 3-6:1), extractie solvent ethanol 60% m/m
- d) vloeibaar extract (DER 1:1), extractie solvent ethanol 70% v/v
- e) soft extract (DER 2.2-2.9:1), extractie solvent ethanol 50% v/v : propylene glycol (98:2)

Maximale dagelijkse dosis :

Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen :

- a) 31 mg
- b) 29 mg
- c) 46 mg
- d) 210 mg
- e) 84 mg

Kinderen van 6 tot 11 jaar :

- a) 23 mg
- b) 10 mg
- c) 35 mg
- d) 157 mg
- e) 56 mg

Kinderen van 3 tot 5 jaar :

- a) 16 mg
- b) 11 mg
- c) 23 mg

e) 42 mg Seules les préparations suivantes sont autorisées, avec les doses journalières maximales correspondantes :

- a) extrait sec (DER 4-8:1), solvant d'extraction éthanol 24-30% m/m
- b) extrait sec (DER 6-7:1), solvant d'extraction éthanol 40% m/m
- c) extrait sec (DER 3-6:1), solvant d'extraction éthanol 60% m/m
- d) extrait fluide (DER 1:1), solvant d'extraction éthanol 70% v/v
- e) extrait mou (DER 2.2-2.9:1), solvant d'extraction éthanol 50% v/v : propylène glycol (98:2)

Doses journalières maximales :

Adolescents à partir de 12 ans et adultes :

- a) 31 mg
- b) 29 mg
- c) 46 mg
- d) 210 mg
- e) 84 mg

Enfants de 6 à 11 ans :

- a) 23 mg
- b) 10 mg
- c) 35 mg
- d) 157 mg
- e) 56 mg

Enfants de 3 à 5 ans :

- a) 16 mg
- b) 11 mg
- c) 23 mg
- e) 42 mg

Hedychium coronarium J. Koenig	Zingiberaceae	bloem, wortelstok
fleur, rhizome		
Helianthus annuus L.	Compositae	gewone zonnebloem
soleil	bovengrondse delen	parties aériennes
parties aériennes		tournesol commun, grand
Helianthus tuberosus L.	Compositae	aardpeer
knol	tubercule	topinambour, hélianthe tubéreux
Helichrysum arenarium (L.) Moench.	Compositae	strobloem, zandstrobloem
immortelle des sables	bovengrondse delen	parties aériennes
parties aériennes		
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don.	Compositae	kerrieplant
bovengrondse delen	parties aériennes	immortelle d'italie
parties aériennes		
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Compositae	gele strobloem
stoechade	bovengrondse delen	parties aériennes
parties aériennes		immortelle
Heracleum sphondylium L.	Apiaceae	gewone berenklauw
plant	plante entière	berce commune hele

Herniaria glabra L.	Caryophyllaceae	kaal breukkruid	herniaire glabre	hele plant	plante entière	
Herniaria hirsuta L.	Caryophyllaceae		bovengrondse delen		parties aériennes	
Hesperis matronalis L.	Brassicaceae	damastbloem	julienne des dames, girarde, giroflée	des dames, violette de damas, aragone	bovengrondse delen	parties aériennes
Hibiscus sabdariffa L.	Malvaceae	roselle, jamaïcazuring	carcadé, oseille de guinée, oseille rouge, roselle, bissap	tak, bloem, blad, zaad	rameau, fleur, feuille, graine	
Hieracium pilosella L.	Compositae	muizenoor	epervière piloselle	bovengrondse delen	parties aériennes	
Hierochloe odorata (L.) Beauv.	Poaceae	Hierochloe odorata (L.) Wahl.	veenreukgras	hierochloë odorante	bovengrondse delen	parties aériennes
Himanthalia elongata (L.) S.F. Gray	Himanthaliaceae		riemwier	spaghetti de la mer, haricot de mer	thallus	thallus
Hippophae rhamnoides L.	Eleagnaceae	duindoorn	argousier	vrucht, olie van de bes	fruit, huile de baies	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	Sargassaceae		hai zao hai zao, hijiki, hiziki	thallus	thallus	
Hordeum vulgare L.	Poaceae	incl. gewone gerst, zesrijige gerst	incl. orge	carrée, orge à six rangs, escourgeon	zaad, wortel, scheut	graine, racine, germe
Houttuynia cordata Thunb.	Saururaceae		hele plant	plante	entière	
Humulus lupulus L.	Cannabaceae	hop	houblon	bloeiwijzen	inflorescences	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van 8-prenylnaringenine hoger dan 400 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de 8-prénylnaringénine supérieure à 400 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.	Lycopodiaceae	Lycopodium serratum Thunb.		bovengrondse delen	parties aériennes	
Hydrastis canadensis L.	Ranunculaceae	canadese geelwortel	hydraste du canada	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.

Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine	Acanthaceae	blad,
wortel, zaad feuille, racine, graine		
Hymenaea courbaril L.	Leguminosae	lokusboom, gomcopal courbaril schors, fruit,
blad, zaad, hars écorce, fruit, feuille, graine, résine		
Hypericum perforatum L.	Hyperaceae	sint-janskruid millepertuis perforé,
millepertuis commun bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van hypericine hoger dan 700 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen uw arts of apotheker informeren. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'hypéricine supérieure à 700 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Informez votre médecin ou pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments.		
Hyssopus officinalis L.	Lamiaceae	hyssop hysope bovengrondse delen parties
aériennes		
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.	Aquifoliaceae	mate maté blad feuille
Illicium verum Hook. f.	Schisandraceae	chinese steranijs anis étoilé de chine
schors, vrucht écorce, fruit		
Impatiens balsamina L.	Balsaminaceae	tuinbalsemien balsamine des jardins
bovengrondse delen parties aériennes		
Indigofera tinctoria L.	Leguminosae	indigostruik indigotier blad feuille
Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat		
L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine.		
Inula britannica L.	Compositae	engelse alant inule des fleuves, inule britannique
bovengrondse delen parties aériennes		
Inula helenium L.	Compositae	griekse alant inule grande aunée blad,
wortelstok, wortel feuille, rhizome, racine		
Ipomoea batatas (L.) Poir	Convolvulaceae	zoete aardappelpatate douce knol
tubercule		
Isatis tinctoria L.	Brassicaceae	wede pastel bovengrondse delen, sap
parties aériennes, jus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indirubine bevat. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indirubine.	
Jasminum grandiflorum L.	Oleaceae	grootbloemige jasmijn jasmin à grandes
fleurs bloem fleur		

Jasminum officinale L. Oleaceae gewone jasmijn jasmin commun bloem
fleur De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de
zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de
grossesse.

Jateorhiza palmata (Lam.) Miers Menispermaceae *Menispermum palmatum* Lam. kolombo,
calumbo racine de colombo wortel racine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag
niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. La
portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline
(exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.

Juglans cinerea L. Juglandaceae witte walnoot, boternoot noyer cendré, noyer
blanc, noyer à beurre zaad graine

Juglans regia L. Juglandaceae okkernoot noyer royal bovengrondse delen
parties aériennes

Jumellea fragrans (Thouars) Schltr. Orchidaceae blad feuille

Juniperus communis L. Cupressaceae gewone jeneverbes genévrier commun
vrucht, blad, hout fruit, feuille, bois Voor voedingssupplementen met
bereidingen van de vrucht : De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen
langdurig gebruik zonder deskundig advies (maximum 6 weken). Niet gebruiken bij
nierfunctiestoornissen. Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fruit :
L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un
spécialiste (maximum 6 semaines). Pas d'utilisation en cas d'insuffisance rénale.

Justicia adhatoda L. Acanthaceae *Adhatoda vasica* Nees malabarnoot, adalsa, arusa
noix de malabar hele plant plante entière

Justicia pectoralis Jacq. Acanthaceae bovengrondse delen parties
aériennes

Kaempferia galanga L. Zingiberaceae kentjoer wortelstok rhizome

Kavalama urens (Roxb.) Raf. Malvaceae *Sterculia urens* Roxb. gom
gomme

Kickxia spuria (L.) Dumort. Plantaginaceae eironde leeuwenbek linairre bâtarde
bovengrondse delen parties aériennes

Knautia arvensis (L.) Coult. Caprifoliaceae beemdkroon knautie des champs,
scabieuse des champs bovengrondse delen parties aériennes

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson Krameriaceae *Krameria triandra* Ruiz &
Pav. ratanhiaratanhiawortel racine

Lactuca indica L. Compositae chinese sla bovengrondse delen
parties aériennes

Lactuca sativa L.	Compositae	sla	aitue, laitue cultivée, salade		
bovengrondse delen	parties aériennes				
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.	Lythraceae		banaba lilas des indes, queens crape		
myrtle, banaba	blad	feuille			
Laminaria digitata (Hudson) J.V. Lam.	Laminariaceae		gladgesteeld vingerwier		
laminaire digitée	thallus	thallus			
Laminaria hyperborea (Gun.) Foslie	Laminariaceae		ruwgesteeld vinger wier		
laminaire hyperboréale, goemon rouge	thallus	thallus			
Laminaria japonica J.E. Areschoug	Laminariaceae		kelp	Laminaire	thallus
thallus					
Laminaria palmata Bory de St.Vincent	Laminariaceae			thallus	thallus
Lamium album L.	Lamiaceae		witte dovenetel	lamier blanc	bovengrondse delen
parties aériennes					
Larix decidua Mill.	Pinaceae		europese lork, lork	mélèze d'europe, mélèze,	
mélèze commun	bovengrondse delen, hars		parties aériennes, résine		
Larix occidentalis Nutt.	Pinaceae		west amerikaanse lork	mélèze de l'ouest	hele
plant	plante entière				
Laurus nobilis L.	Lauraceae		laurierboom	laurier-sauce	vrucht, blad
fruit, feuille					
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.	Lamiaceae		lavendel	lavande	
bovengrondse delen	parties aériennes				
Lavandula angustifolia Mill.	Lamiaceae	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia,			
Lavandula officinalis Chaix, Lavandula spica L.	lavendel	lavande bloeiende top	sommités	fleuries	
Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica (DC.) Guinea	Lamiaceae	Lavandula vera DC.			
lavendel	lavande des pyrénées	bloeiende top	sommités	fleuries	
Lavandula latifolia Medik	Lamiaceae	Lavandula hybrida E.Rev. ex Briq.			
breedbladige lavendel, spijklavendel	lavande aspic	bovengrondse delen	parties	aériennes	
Lavandula stoechas L.	Lamiaceae	franse lavendel	lavande stéchade, lavande papillon,		
lavande à toupet	bovengrondse delen	parties aériennes			
Lawsonia inermis L.	Lythraceae	henna henné	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Ledum palustre L.	Ericaceae	moerasrozemarijn; moeraspalm	lédon, lédum	des	
marais	bovengrondse delen	parties aériennes			

Lens culinaris Medik. Leguminosae linze lentille cultivée zaad graine
Leonurus cardiaca L. Lamiales hartgespan agripaume bovengrondse delen
parties aériennes De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet
gebruiken tijdens de zwangerschap.

Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling. L'étiquetage
doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre
l'hypertension.

Leonurus japonicus Houtt. Lamiales Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu, Leonurus
heterophyllus Sweet bovengrondse delen parties aériennes De
etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling. L'étiquetage
doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre
l'hypertension.

Lepidium campestre (L.) R. Br. Brassicaceae veldkruidkers passeraie champêtre
bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet de volgende
waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts
raadplegen. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en
hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.

Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz Brassicaceae bovengrondse delen
parties aériennes De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor
personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. L'étiquetage
doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de
la thyroïde, consultez votre médecin.

Lepidium latifolium L. Brassicaceae peperkers grande passeraie, passeraie à
feuilles larges bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet de volgende
waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts
raadplegen. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en
hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.

Lepidium meyenii Walp. Brassicaceae Lepidium peruvianum G. Chacón de Popovici
maca maca wortel racine Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare
hoeveelheden alkaloiden bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune
quantité détectable en alcaloïdes.

Lepidium sativum L. Brassicaceae tuinkers cresson alénois, passeraie cultivé
hele plant plante entière

Leptospermum petersonii subsp. petersonii. Myrtaceae Leptospermum citratum (J.F.Bailey
& C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfold bloeiende toppen sommités
fleuries

Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst. Myrtaceae manuka manuka
schors, blad écorce, feuille De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas
utiliser en cas de grossesse.

Lespedeza capitata Michx. Leguminosae lespedeza lespedeza
bovengrondse delen parties aériennes

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. Compositae gewone margriet marguerite,
marguerite commune bovengrondse delen parties aériennes

Levisticum officinale W.D.J. Koch Apiaceae lavas céleri perpétuel, livèche,
herbe-à-maggi hele plant plante entière

Ligusticum striatum DC. Apiaceae Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng,
K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu. Ligusticum wallichii Franch. wortel racine
Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat.
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en
indospicine. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Lilium brownii F.E. Br. ex Mieliez Liliaceae bol bulbe
Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.
L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en
alcaloïdes.

Lindera aggregata (Sims) Kosterm. Lauraceae wortel racine

Linum usitatissimum L. Linaceae gekweekt vlas lin cultivé zaad graine

Liquidambar styraciflua L. Altingiaceae amerikaanse amberboom copalme d'
amérique schors écorce

Litchi chinensis Sonn. Sapindaceae lychee litchi, letchi vrucht, zaad fruit, graine

Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug Hapalidiaceae lithothamnium calcareum
lithothamne thallus thallus

Litsea cubeba (Lour.) Pers. Lauraceae vrucht fruit

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Lobariaceae longenmos pulmonaire thallus
thallus De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur
hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La
portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30
mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae japanse kamperfoelie chèvrefeuille du
japon bloem, steel fleur, tige

Lotus corniculatus L. plante entière	Leguminosae	gewone rolklaver	lotier corniculé	hele plant
Lotus corniculatus subsp. corniculatus L. lotier corniculé	Leguminosae	gewone rolklaver	parties aériennes	
Luma chequen (Molina) A.Gray feuille	Myrtaceae	Eugenia chequen Mol.		blad
Lycium barbarum L. commun, lyciet de barbarie	Solanaceae	Lycium halimifolium Mill. vrucht	boksdoorn	lyciet
Lycium chinense Mill.	Solanaceae	chinese boksdoorn	lyciet de chine	vrucht fruit
Lycopersicon esculentum Mill. lycopersicum (L.) H. Karst.	Solanaceae	Solanum lycopersicum L., Lycopersicon tomaat vrucht	tomate	fruit
Lycopodium clavatum L. bovengrondse delen, spoor	Lycopodiaceae	grote wolfsklauw Parties aériennes, spore		lycopode en massue
Lycopus europaeus L. wolfspoet	Lamiaceae	L. mollis A.Kern., Lycopus menthifolius Mabilie lycope, lycopse d'europe, chanvre d'eau	bovengrondse delen	parties aériennes
De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.				
Lycopus virginicus Michx. parties aériennes	Lamiaceae		bovengrondse delen	
De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.				
Lysimachia vulgaris L. lysimaque	Primulaceae	grote wederik	lysimaque commune, grande	
		bovengrondse delen	parties aériennes	
Lythrum salicaria L. toppen	Lythraceae	grote kattenstaart	salicaire commune	
sommité				
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.				
Macadamia ternifolia F. Muell vrucht, zaad	Proteaceae	macadamianoten	noyer du queensland	
		fruit, graine		
Macrocystis pyrifera (L.) C.Ag.	Laminariaceae	kelp	kelp	thallus thallus
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliaceae	Michelia champaca L.		
bloem		fleur		

Magnolia officinalis Rehder & Wilson Magnoliaceae magnolia magnolia officinal
schors, bloem écorce, fleur De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van
anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de
grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Malpighia glabra L. Malpighiaceae *Malpighia punicifolia* L. west-indische kers, barbadoskers
cerise de barbade, acérola vrucht fruit

Malus domestica Borkh. Rosaceae *Malus sylvestris* (L.) Mill. var. *domestica* (Borkh.) Mansf
eetappel pommier commun hele plant plante entière

Malus pumila Mill. Rosaceae paradijsappelboom pommier paradis
knop, bloem, vrucht, blad bourgeon, fleur, fruit, feuille

Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. *sylvestris* Rosaceae wilde appel pommier
sauvageknop, bloem, vrucht, blad bourgeon, fleur, fruit, feuille

Malva sylvestris L. Malvaceae groot kaasjeskruid, wilde malvemauve sauvage,
fromageon, petit fromage, fouassier bovengrondse delen parties aériennes

Mammea americana L. Calophyllaceae Amerikaanse mammi-appel abricotier des
antilles, abricotier-pays pulp van de vrucht pulpe du fruit

Mangifera indica L. Anacardiaceae mango manguier hele plant plante
entière

Manihot esculenta Crantz Eupharbiaceae cassave, maniok manioc gekookte
wortel racine cuite

Manilkara zapota (L.) P.Royen Sapotaceae *Achras sapota* L. sapodilla sapotillier
vrucht, bloem fruit, fleur

Maranta arundinacea L. Marantaceae pijlwortel marante, dictame, herbe aux flèches
bol, wortelstok buble, rhizome

Marchantia polymorpha L. Marchantiaceae parapluutjesmos hépatique des
fontaines thallus thallus Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare
hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan. L'analyse doit
démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première
doit être traitée à la chaleur.

Marrubium vulgare L. Lamiaceae malrove marrube bovengrondse delen
parties aériennes

Marsdenia cundurango Rchb.f. Apocynaceae *Marsdenia reichenbachii* Triana condurango
condurango schors écorce

Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst. Apocynaceae *Gymnema sylvestre* (Retz.) R.Br.
blad feuille De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage

doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry thallus thallus	Phyllophoraceae	kernwier
Matricaria chamomilla L. Rauschert echte kamille parties aériennes	Compositae matricaire camomille, camomille vulgaire Voor voedingssupplementen met bereidingen van de bloem of blad :	Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) bovengrondse delen De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van alpha-bisabolol hoger dan 1,9 mg en van apigenine-7-glucoside hoger dan 5,6 mg. Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fleur ou la feuille : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de alpha-bisabolol supérieure à 1,9 mg et d'apigénine-7-glucoside supérieure à 5,6 mg.
Medicago sativa L. bovengrondse delen parties aériennes	Leguminosae luzerne, alfalfa luzerne commune De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.	
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel mirthei melaleuca, arbre à thé, mélaleuque	Myrtaceae bovengrondse delen parties aériennes	theeboom, medicinale De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen. L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca cajuputi Powell blad, twijg feuille, brindille	Myrtaceae De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen. L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.	kajapoetboom, cajepoutboom cajeputier
Melaleuca leucadendra (L.) L. feuille	Myrtaceae De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen. L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.	Melaleuca leucadendron (L.) L. blad
Melaleuca linariifolia Sm. feuille	Myrtaceae De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen. L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.	melaleuque à feuilles linéaires blad
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake feuille, brindille	Myrtaceae De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen. L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.	niaouli niaouli blad, twijg
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn. peau blad, twijg feuille, brindille	Myrtaceae De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen. L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.	nerolina nerolina, l'arbre à
Melilotus altissimus Thuill. grand mélilot	Leguminosae bovengrondse delen parties aériennes	goudgele honingklaver, gele honingklaver

Melilotus officinalis (L.) Lam. Fabaceae citroengele honingklaver,
 akkerhoningklaver mélilot officinal bloeiende top sommité fleurie De etikettering moet de
 volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit
 comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Melissa officinalis L. Lamiaceae citroenmelisse mélisse, mélisse officinale
 bovengrondse delen parties aériennes

Melittis melissophyllum L. Lamiaceae bijenblad mélitte à feuilles de mélisse
 bovengrondse delen parties aériennes

Mentha aquatica L. Lamiaceae watermunt, aalkruid, bakkruid, boerenbalsem,
 vlooienkruid menthe aquatique hele plant plante entière

Mentha arvensis L. Lamiaceae akkermunt menthe des champs
 bovengrondse delen parties aériennes

Mentha spicata L. Lamiaceae aarmunt, groene munt menthe en épi, menthe verte,
 menthe douce bovengrondse delen parties aériennes

Mentha x piperita L. Lamiaceae pepermunt menthe poivrée bovengrondse delen
 parties aériennes

Mentzelia cordifolia Dombey ex Urb. & Gilg Losaceae *Mentzelia scabra* Kunth
 hele plant plante entière

Menyanthes trifoliata L. Menyanthaceae waterdrieblad trèfle d'eau blad feuille

Mesembryanthemum crystallinum L. Aizoaceae Gasoul crystallinum (L.) Rothm.;
Cryophytum crystallinum (L.) N.E.Br. ijsplantje, ijskruid ficoïde glaciale blad feuille De
 aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van mesembrine alkaloiden hoger
 dan 90 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion
 journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes de type mesembrine
 supérieure à 90 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Mespilus germanica L. Rosaceae mispel néflier, néflier commun vrucht fruit

Mikania amara (Vahl.) Willd. Compositae schors, blad écorce, fruit

Mitchella repens L. Rubiaceae bovengrondse delen parties
 aériennes De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de
 zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de
 grossesse.

Momordica balsamina L. Cucurbitaceae vrucht, blad fruit, feuille
 Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De
 grondstof moet een hittebehandeling ondergaan. L'analyse doit démontrer que la préparation ne
 contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.

Momordica charantia L. Cucurbitaceae alsempeer, balsempeer, sopropo, bittere augurk, bittere komkommer concombres amers, margose vrucht, blad fruit, feuille Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.

Monarda didyma L. Lamiaceae bergamot, scharlaken monarda monarde pourpre, thé d'oswego bovengrondse delen parties aériennes

Monarda punctata L. Lamiaceae bovengrondse delen parties aériennes

Morinda citrifolia L. Rubiaceae noni, indische moerbeï noni, pomme-chien puree en concentraat van vrucht, sap purée et concentré de fruit, jus Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).

Morinda officinalis F.C. How Rubiaceae hele plant plante entière

Moringa oleifera Lam. Moringaceae moringa moringa blad, vrucht, zaad feuille, fruit, graine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 500 mg gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 500 mg de plante séchée.

L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer aux enfants de moins de 18 ans.

Morus alba L. Moraceae witte moerbeï mûrier blanc vrucht, blad fruit, feuille De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Morus nigra L. Moraceae zwarte moerbeï mûrier noir knop, steel, schors, vrucht, blad bourgeon, tige, écorce, fruit, feuille

Murraya koenigii (L.) Spreng. Rutaceae kerrieboom arbre à curry, calou pilé, murraya schors, blad, wortel van de volwassen struik écorce, feuille, racine d'un buisson adulte

Musa x paradisiaca L. (pro sp.) Musaceae *Musa x sapientum* L. banaan bananier vrucht, blad, wortel fruit, feuille, racine

Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh Myrtaceae *Psidium dubium* H.B.K. camu camu, rumbes camu camu, açari, camo vrucht fruit

Myrica cerifera L. Myricaceae arbre à suif, appelé cirier, arbre à cire
wortel racine De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw
arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas
utiliser en cas de grossesse.

Myrica gale L. Myricaceae wilde gagel, was gagel piment royal, myrte des marais,
bois-sent-bon, myrique baumier bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet
de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit
comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Myristica fragrans Houtt. Myristicaceae nootmuskaatboom muscadier
foelie, zaad macis, graine

Myroxylon balsamum var. *balsamum* (L.) Harms Leguminosae tolubalsemboom
baumier de tolu schors van de stam écorce du tronc

Myrtus communis L. Myrtaceae mirt myrte bovengrondse delen parties
aériennes

Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. Caprifoliaceae *Nardostachys grandiflora* DC. jatamansi,
indisch aarborstelgras, narduskruid jatamansi, nard indien hele plant plante entière

Nasturtium officinale R. Brown Brassicaceae witte waterkers cresson de fontaine
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag
niet leiden tot een inname van pulegone hoger dan 3,5 mg. La portion journalière recommandée
ne doit pas conduire à une ingestion de pulégone supérieure à 3,5 mg.

Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbonaceae lotus, indische lotusbloem, heilige lotus
lotus, lotus des indes, lotus sacré hele plant plante entière De etikettering moet de
volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van
anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou
votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Nepeta cataria L. Lamiaceae wild kattekruid herbe aux chats bovengrondse delen
parties aériennes

Nepeta tenuifolia Benth. Lamiaceae *Schizonepeta tenuifolia* (Benth.) Briq. japans kattenkruid
chataire japonaise blad feuille

Nephelium lappaceum L. Sapindaceae ramboetan ramboutan, litchi chevelu
vrucht fruit

Nigella sativa L. Ranunculaceae zwarte komijn nigelle cultivée, cumin noir
koud geperste olie van het zaad huile de la graine pressée à froid De etikettering moet de
volgende waarschuwing bevatten : Niet geraffineerde olie van deze plant bekomen door koude
persing is instabiel en hoge dosissen zijn niet geschikt voor de consumptie door kwetsbare groepen,
met name : kinderen onder 12 jaar, adolescenten onder 18 jaar, zwangere en lacterende vrouwen.

L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'huile non raffinée de cette plante obtenue par pression à froid est instable et à haute dose ne convient pas pour la consommation par des groupes vulnérables notamment : les enfants de moins de 12 ans, les adolescents de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.

Ocimum basilicum L. Lamiaceae basilicum, baziëkruid basilic, basilic commun
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragole supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.

Ocimum gratissimum L. Lamiaceae bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragole supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Ocimum tenuiflorum L. Lamiaceae Ocimum sanctum L. heilige basilicum basilic sacré
hele plant plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragole hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragole supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Oenanthe aquatica (L.) Poiret Apiaceae watertorkruid, watervinkel oenanthe
phellandre, fenouil d'eau, oenanthe aquatique rijpe vrucht fruit mûr

Oenothera biennis L. Onagraceae middelste teunisbloem onagre bisanuelle
zaad graine

Olea europaea L. Oleaceae olijfboom olivier knop, vrucht, blad
bourgeon, fruit, feuille

Olea europaea L. subsp. europaea Oleaceae olijfboom olivier schors,
vrucht, blad écorce, fruit, feuille

Ononis spinosa L. Leguminosae Ononis vulgaris "Rouy, p.p.C" kattendoorn bugrane
épineuse, arrête-boeuf hele plant plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams Leguminosae Ononis arvensis L. wild
zoethout, stalkruid bugrane des champs wortel racine De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de
hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van
producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion
d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats
d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Onopordon acanthium L. Compositae wegdistel chardon aux ânes,
onopordon fausse-acanthe bovengrondse delen parties aériennes

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. Asparagaceae japanse slangenbaard
barbe de serpent, muguet du japon knol tubercule De etikettering moet de
volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van
anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou
votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Opopanax chironius (L.) W.D.J.Koch Apiaceae opopanax opopanax, opopanax
de chiron hele plant, gomhars plante entière, gomme-résine

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Cactaceae vijgcactus oponce, figuier de barbarie
cladode, bloem, vrucht cladode, fleur, fruit

Orchis mascula L. Orchidaceae mannetjesorchis orchis mâle wortelknol
tubercule

Origanum compactum Benth Lamiaceae origano origan bovengrondse delen
parties aériennes

Origanum dictamnus L. Lamiaceae hopmarjolein, kandische majoraan dictame de
crète bovengrondse delen parties aériennes

Origanum majorana L. Lamiaceae Majorana hortensis Moench. marjolein, majoraan
marjolaine, amarique bovengrondse delen parties aériennes

Origanum vulgare L. Lamiaceae wilde marjolein, oregano origan, origan vulgaire,
marjolaine sauvage bovengrondse delen parties aériennes

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Lamiaceae javaanse nierthee thé de java,
moustaches de chat blad feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5,5 g gedroogde bladeren. La portion
journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à
5,5 g de feuilles séchées.

Orthosiphon aristatus var. aristatus Lamiaceae kattensnor moustaches de chat
bovengrondse delen parties aériennes

Oryza sativa L. Poaceae rijst riz zaad, wortel graine, racine

Oxalis acetosella L. Oxalidaceae witte klaverzuring oseille des bois
bovengrondse delen parties aériennes

Pachira aquatica Aubl. Malvaceae watercacao marce, noisetier de la guyane, noix
de malabar, arbre à monnaie blad, zaad feuille, graine

Pachira insignis (SW.) Savigny Malvaceae zaad graine

Padus avium var. *avium* Rosaceae *Prunus padus* L. gewone vogelkers cerisier à grappes,
merisier à grappes schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg. La portion
journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène
(libre et lié) supérieure à 5 mg.

Paeonia lactiflora Pall. Paeoniaceae *Paeonia albiflora* Pall., *Paeonia chinensis* L. Vilmorin
chinese pioen pivoine blanche, pivoine commune bloem, wortel, zaad fleur,
racine, graine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de
zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de
grossesse.

Paeonia officinalis L. Paeoniaceae boerenpioen pivoine officinale bloem,
wortel fleur, racine

Paeonia x suffruticosa Andrews Paeoniaceae boompioen pivoine en arbrewortel
racine

Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr Palmariaceae *Fucus palmatus* L., *Rhodymenia*
palmata (L.) Greville rood lapwier rhodyménie palmé thallus thallus

Panax ginseng C.A. Mey. Araliaceae ginseng ginseng, mandragore
coréenne wortel, blad, bes racine, feuille, bes De etikettering moet de volgende
waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische
behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou
votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen. Araliaceae blad, wortel, zaad
feuille, racine, graine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage
doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage
concomitant de traitement contre le diabète.

Panax pseudoginseng Wall. Araliaceae blad, wortel, zaad
feuille, racine, graine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage
doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage
concomitant de traitement contre le diabète.

Panax quinquefolius L. Araliaceae Amerikaanse ginseng ginseng américain
wortel, blad, zaad racine, feuille, graine De etikettering moet de volgende
waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische
behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou
votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Panicum miliaceum L.	Poaceae	pluimgierst	millet commun, mil, millet cultivé, panic, panic millet	bloem, vrucht	fleur, fruit
Panzerina lanata (L.) Sojssk	Leguminosae	Panzeria lanata (L.) Bunge.	bovengrondse delen	parties aériennes	
Papaver rhoeas L.	Papaveraceae	grote klapproos	grand coquelicot	bloem	fleur
Parietaria officinalis L.	Urticaceae	groot glaskruid	pariétaire officinale	bovengrondse delen	parties aériennes
Parmelia saxatilis (L.) Ach.	Parmeliaceae	thallus	thallus	De	
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.					
Parthenium hysterophorus L.	Compositae		bovengrondse delen	parties aériennes	
Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.	Vitaceae	Ampelopsis tricuspidata	Siebold et Zucc.	oosterse wingerd, oosterse wilde wingerd	vigne-vierge à trois pointes
			bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de jonge scheut : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5% gedroogde plant. Pour les compléments alimentaires avec des préparations de jeune pousse : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5% de plante séchée.
Passiflora edulis Sims	Passifloraceae	Passiflora incarnata L.	passiebloem, passiekruid	passiflore sauvage	bovengrondse delen
			parties aériennes		
Pastinaca sativa L.	Apiaceae	pastinaak	panais	wortel	racine
Paullinia cupana Kunth	Sapindaceae	guarana	guarana zaad	graine	
Pedaliium murex L.	Pedaliaceae		bovengrondse delen	parties	aériennes
Pelargonium graveolens L'Herit	Geraniaceae	rozenpelargonium, rozengeranium	pélargonium à forte odeur	bovengrondse delen	parties aériennes
Pelargonium radens H.E. Moore	Geraniaceae	Pelargonium radula (Cav.) L'Hér.	bovengrondse delen	parties aériennes	
Pelargonium sidoides DC.	Geraniaceae	geranium	pélargonium	hele plant	plante entière
Perilla frutescens (L.) Britton	Lamiaceae	zwarte netel, perilla, japans sesam-zaad	perilla	blad, zaad	feuille, graine

Persea americana Mill. Lauraceae avocadoboom avocatier blad feuille

Persicaria bistorta (L.) Samp. Polygonaceae *Polygonum bistorta* L. adderwortel, adderkruid
bistorte, renouée bistorte, serpentine, feillote wortelstok rhizome

Persicaria maculosa Gray Polygonaceae *Polygonum persicaria* L. perzikkruid
renouée persicaire bovengrondse delen parties aériennes

Petiveria alliacea L. Phytolaccaceae parelhoenkruid herbe aux poules blad, wortel
feuille, racine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken
tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser
en cas de grossesse.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill Apiaceae tuinpeterselie
persil cultivé hele plant plante entière

Peucedanum ostruthium (L.) W. Koch Apiaceae meesterwortel, varkenskerf
impéatoire, peucedan officinal hele plant plante entière

Peumus boldus Molina Monimiaceae boldo boldo blad feuille

Phaseolus vulgaris L. Leguminosae gewone boon haricot commungekookt of geweekt
zaad graine cuite ou trempée

Phellodendron amurense Rupr. Rutaceae kurkboom phellodendron de l'amour,
arbre au liège schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname
van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.

De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes
d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.

L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Phillyrea latifolia L. Oleaceae alavert à larges feuilles blad feuille

Phlebodium aureum (L.) J. Sm. Polypodiaceae *Polypodium leucatomos* Poir. blauwvaren
blad, wortelstok feuille, rhizome

Phoenix dactylifera L. Areaceae dadelpalm palmier dattier, dattier vruchtvlies
pulpe du fruit

Photinia melanocarpa (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps Rosaceae *Aronia melanocarpa*
(Michaux.) S. Elliott zwarte appelbes amélanchier à fruits noirs, aronie à fruits noirs vrucht fruit

Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke Verbenaceae *Lippia dulcis* Trev. azteeks
zoetkruid l'herbe sucrée des Aztèques bovengrondse delen parties aériennes

Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. Phyllanthaceae bloeiende top Sommités fleuries De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Phyllanthus emblica L. Phyllanthaceae *Emblica officinalis* Gaertn. amalaki, amla amalaki, amla, arbre de malacca bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Phyllanthus niruri L. Phyllanthaceae hele plant plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin Hapalidiaceae lithothamne thallus thallus

Physalis alkekengi L. Solanaceae lampionplant, jodenkers coqueret, coqueret alkékege, lanterne chinoise rijpe vrucht fruit mûr

Physalis peruviana L. Solanaceae goudbes, ananaskers, incabes, kaapse kruisbes rijpe vrucht fruit mûr coqueret du pérou, groseille du cap

Picea abies (L.) Karst. Pinaceae fijnspar, grote spar epicéa commun, epicéa, faux sapin, pesse, sapin élevé, sapin rouge naald, top van de tak aiguille, bout de branche

Picramnia antidesma Sw. Picramniaceae

schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.

Pimenta dioica (L.) Merr. Myrtaceae *Pimenta officinalis* Lindl. piment, jamaicapeper poivrier de la jamaïque, piment de la jamaïque bes baie

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore Myrtaceae west-indische bay-boom, bay-rumboom, bay st.thomas piment couronné, bois d'inde blad feuille

Pimpinella anisum L. Apiaceae anijs anis zaad graine

Pimpinella major (L.) Huds. Apiaceae grote bevernel grand boucage wortel racine

Pimpinella saxifraga L.	Apiaceae	kleine bevernel	petit boucage	hele plant
naald, oliehars, zaad				
Pinus koraiensis Siebold & Zucc.	Pinaceae	koreaanse den	pin de corée	
aiguille, oléorésine, graine				
Pinus massoniana Lamb.	Pinaceae	naald, oliehars, zaad		
aiguille, oléorésine, graine				
Pinus mugo Turra	Pinaceae	Pinus montana Mill.	bergden	pin buissonnant, pin mugho
knop, naald, scheut		bourgeon, aiguille, pousse		
Pinus pinaster Ait.	Pinaceae	Pinus maritima Lam.	zeeden	pin maritime, pin des landes
schors, zaad, blad, knop (kegel)		écorce, graine, feuille, bourgeon (cône)		
Pinus pinea L.	Pinaceae	parasolden	pin parasol, pin pignon	naald, oliehars, zaad
aiguille, oléorésine, graine				
Pinus sylvestris L.	Pinaceae	grove den	pin sylvestre, pin-sauvage	
schors, knop, vrucht, blad, scheut		écorce, bourgeon, fruit, feuille		
Piper aduncum L.	Piperaceae	Piper angustifolium Ruiz & Pav.	maticopeper	matico
bovengrondse delen		parties aériennes		
Piper longum L.	Piperaceae	lange peper	poivre long	vrucht fruit
Piper nigrum L.	Piperaceae	zwarte peper, witte peper	poivrier noir, poivrier blanc	
vrucht, oliehars, olie		fruit, oléorésine, huile		
Pistacia lentiscus L.	Anacardiaceae	Lentiscus vulgaris Fourr., Terebinthus lentiscus (L.) Moench		
mastiekboom		lenticque, pistachier lenticque	blad, hars, twijg	feuille, résine, brindille
Pistacia terebinthus L.	Anacardiaceae	terpentijnboom	pistachier	térébinthe, térébinthe
vrucht fruit				
Pistacia vera L.	Anacardiaceae	pistache, pimpernoot	pistachier, pistachier commun,	
pistachier cultivé, pistachier vraiv Frucht		fruit		
Pisum sativum L.	Leguminosae	erwt	pois	peul, zaad gousse, graine
Plantago afra L.	Plantaginaceae	Plantago psyllium L.	vlozaad, weegbree	plantain psyllium,
plantain pucier, herbe aux puces, plantain psyllion, pucier			zaadhuid, zaad	tégument de graine,
graine				
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.				
Plantago arenaria Waldst. et Kit.	Plantaginaceae	zandweegbree	plantain de sables	
zaad graine				
Plantago lanceolata L.	Plantaginaceae	smalle weegbree	plantain lancéolé	
bovengrondse delen		parties aériennes		

Plantago major L. Plantaginaceae grote weegbree plantain à larges feuilles, grand plantainbovengrondse delen parties aériennes

Plantago media L. Plantaginaceae ruige weegbree plantain intermédiaire, langue d'agneau hele plant plante entière

Plantago orbignyana Steinh. ex Decne. Plantaginaceae *Plantago ovata* Phil. vlozaad plantain pucier, plantain des indes zaad graine

Plantago ovata Forssk. Plantaginaceae *Plantago ispaghula* Roxb. ex Fleming vlozaad plantain pucier, plantain des indes zaad graine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.

Platanus orientalis L. Platanaceae oosterse plataan platane d'Orient knop bourgeon

Platycodon grandiflorus (Jacquin) A. DC. Campanulaceae ballonklokje, chinese klokjesbloem, ballonbloem platycodon à grandes fleurs wortel racine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Langdurig gebruik kan de maag irriteren. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'usage prolongé peut irriter l'estomac.

Plectranthus barbatus Andrews Lamiaceae *Coleus barbatus* (Andrews) Benth blad, wortel, knol feuille, racine, tubercule De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie.

Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le coeur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Plukenetia volubilis L. Euphorbiaceae olie van het zaad huile de la graine Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).

Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Lamiaceae patchoeli patchouli blad feuille

Polygala senega L. Polygalaceae senegawortel, senecawortel, ratelslangwortel polygala de virginie, sénega, laitier, herbe au lait wortel, wortelstok racine, rhizome De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.

Polygala sibirica L. Polygalaceae wortel racine De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.

Polygala tenuifolia Willd. Polygalaceae siberische vleugeltjesbloem polygala de chine wortel racine

Polygala vulgaris L. Polygalaceae Polygala comosa Schkuhr gewone vleugeltjesbloem
polygale commun bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet
de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. L'étiquetage
doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Lilliacae Polygonatum officinale All. welriekende
salomonszegel sceau de salomon odorant wortelstok rhizome

Polygonum aviculare L. Asparagaceae varkensgras renouée des oiseaux, traînage
bovengrondse delen parties aériennes

Populus alba L. Salicaceae witte abeel, zilverpopulier peuplier blanc, peuplier
argenté, abèle schors, knop, blad écorce, bourgeon, feuille De etikettering moet de
volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van
anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. L'étiquetage doit comporter les
avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant
d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Populus balsamifera L. Salicaceae balsempopulier peuplier baumier schors,
knop, blad écorce, bourgeon, feuille De etikettering moet de volgende waarschuwingen
bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. L'étiquetage doit comporter les
avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant
d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Populus nigra L. Salicaceae zwarte populierpeuplier noir schors, knop
écorce, bourgeon De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. L'étiquetage doit comporter les
avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant
d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Populus tremula L. Salicaceae ratelpopulier peuplier tremble schors,
knop écorce, bourgeon De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. L'étiquetage doit comporter les
avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant
d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Populus tremuloides Michx. Salicaceae Amerikaanse ratelpopulier peuplier
faux-tremble schors, knop écorce, bourgeon De etikettering moet de volgende
waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van
anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Porphyra umbilicalis Kützinger Bangiaceae navelwier, purperwier nori, porphyre
thallus thallus

Portulaca oleracea L. Portulacaceae postelein pourpier, pourpier potager
bovengrondse delen parties aériennes

Potentilla anserina L. Rosaceae zilverschoon potentille des oies, potentille
ansérine hele plant plante entière

Potentilla argentea L. Rosaceae viltganzerik potentille argentée hele plant
plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Potentilla erecta (L.) Raeusch. Rosaceae tormentil, bloedwortel, zevenblad,
zevenvingerkruid tormentille, potentille dressée, potentille officinale, herbe de sainte catherine
hele plant plante entière

Potentilla reptans L. Rosaceae vijfvingerkruid potentille rampante, quintefeuille
wortelstok rhizome

Prangos pabularia Lindl. Apiaceae prangos yugan vrucht fruit De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.

Primula elatior Hill Primulaceae slanke sleutelbloem primevère élevée, primevère
des boisbloem, wortel fleur, racine

Primula veris L. Primulaceae *Primula officinalis* (L.) Hill. gulden sleutelbloem primevère
officinale bloem, wortel fleur, racine

Prunella vulgaris L. Lamiaceae gewone brunel brunelle commune
bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken samen met contraceptiva. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser concomitamment avec des contraceptifs.

Prunus africana (Hook. f.) kalkman Rosaceae *Pygeum africanum* Hook. f. rood
stinkhout, afrikaanse kers, pygeum mueri, pygeum, prunier d'afrique schors écorce

Prunus armeniaca L. Rosaceae abrikoos abricotier vrucht, blad, zaad
fruit, feuille, graine

Prunus avium (L.) L. cerisier, bigarreaulier	Rosaceae	zoete kers vrucht, steel fruit, pédoncule	merisier, cerisier des oiseaux,
Prunus cerasus L. (namelijk zaad en pulp), bloemsteel, blad, schors, gom feuille, écorce, gomme	Rosaceae	Cerasus vulgaris Mill. Fruit (dont graine et pulpe), pédoncule	zure kers griottier
Prunus domestica L. blad écorce, bourgeon, fleur, fruit, feuille	Rosaceae	pruimboom prunier	schors, knop, bloem, vrucht,
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb Batsch. amandelboom bourgeon de feuille, graine, fleur, fruit, huile	Rosaceae	Amygdalus communis L., Prunus amygdalus knop, bladknop, zaad, bloem, vrucht, olie De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	bourgeon, La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Prunus persica (L.) Stokes zaad fruit, feuille, graine	Rosaceae	perzik pêcher, pêcher commun	vrucht, blad,
Prunus serotina Ehrh. écorce, feuille	Rosaceae	amerikaanse vogelkers cerisier tardif	schors, blad
Prunus spinosa L. épineux bovengrondse delen	Rosaceae	sleedoorn parties aériennes	prunellier, epine noire, prunier
Psidium guajava L. écorce, fruit, feuille, racine extracten zijn toegelaten.	Myrtaceae	gauva goyavier Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (25%) Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (25%) est autorisée.	schors, vrucht, blad, wortel
Psidium guineense Sw. brésil vrucht, blad fruit, feuille	Myrtaceae	Psidium araca Raddi braziliaanse guave	goyavier du
Pterocarpus erinaceus Poir.	Leguminosae	vène sap van het hout	jus du bois
Pterocarpus indicus Willd. du bois	Leguminosae	sap van het hout jus du bois	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Pterocarpus marsupium Roxb. kino de malobarbloem, kernhout, blad, gomhars	Fabaceae	kinoboom, sandelboom, bastaardteak fleur, duramen, feuille, gomme-résine	
Pterocarpus officinalis Jacq. résine	Leguminosae	Pterocarpus draco L.	hars
Pterocarpus santalinus L. f. hout bois	Leguminosae	rode sandelboom	santal rouge

Pueraria montana var. *lobata* (Willd.) Sanjappa & Pradeep Leguminosae *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi kudzu kudzu bloem, wortel fleur, racine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Pueraria tuberosa (Willd.) DC. Leguminosae bloem, wortel fleur, racine
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimées en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn. Compositae heelblaadjes pulicaire
dysentérique hele plant plante entière

Pulmonaria officinalis L. Boraginaceae gevlekt longkruid pulmonaire
officinale wortel racine Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloiden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn. La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.

Punica granatum L. Lythraceae granaatboom grenadier bloem, vrucht, zaad
fleur, fruit, graine

Pyrola rotundifolia L. Ericaceae rond wintergroen, rondbladig wintergroen
pyrole à feuilles rondes blad feuille

Pyropia tenera (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi Bangiaceae
Porphyra tenera Kjellman thallus thallus

Pyrus communis L. Rosaceae peer poirier schors, vrucht, blad écorce,
fruit, feuille

Quercus alba L. Fagaceae Amerikaanse witte eik chêne blanc, chêne blanc d'amérique
schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon

Quercus coccifera L. Fagaceae hulsteik chêne des garrigues, chêne kermès
schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon

Quercus ilex L. Fagaceae steeneik chêne vert, yeuse schors, vrucht,
galnoot, blad, bladknop écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon

Quercus infectoria G. Olivier Fagaceae schors, vrucht, galnoot,
blad, bladknop écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon

Quercus petraea (Matt.) Liebl. Fagaceae wintereik chêne sessile schors,
vrucht, galnoot, blad, bladknop écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon

Quercus pubescens Willd. Fagaceae donzige eik chène pubescent, chène blanc schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon

Quercus robur L. Fagaceae zomereik chène pédonculé schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon

Quercus serrata subsp. *serrata* Fagaceae *Quercus glandulifera* Blume chinese eik chène à feuilles de chataîgnier schors, vrucht, galnoot, blad écorce, fruit, noix de galle, feuille

Quercus suber L. Fagaceae kurkeik chène-liège, corcier, surier, suv schors, vrucht, galnoot, blad écorce, fruit, noix de galle, feuille

Quillaja saponaria Molina Quillajaceae *Quillaja smegmadermos* DC. schors écorce

Raphanus raphanistrum subsp. *sativus* (L.) Domin Brassicaceae *Raphanus sativus* var. *niger* (Mill.) J.Kern. knopherik, wilde radijs ravenelle, radis ravenelle, radis sauvage hele plant plante entière

Raphanus sativus L. Brassicaceae tuinradijs radis cultivé hele plant plante entière

Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. Arecaceae *Raphia pedunculata* P.Beauv. zetmeel afkomstig van het merg van de scheut amidon de la moelle de la pousse

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) DC. Plantaginaceae chinees vingerhoedskruid digitale de chine, rehmannia wortel racine

Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke Polygonaceae *Polygonum multiflorum* Thunb., Fallopia multiflora (Thunb.) K. Haraldson knoopkruid renouée à fleurs multiples wortel, stengel, zaad racine, tige, graine

Rhamnus alpina L. Rhamnaceae alpenwegedoorn nerprun des alpes schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae wegedoorn nerprun purgatifhele plant plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende

waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rheum australe D. Don Polygonaceae Rheum emodii Wall. ex Meisn. blad, wortelstok feuille, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. Het gehalte aan rhaponticosiden moet bepaald worden. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. La teneur en rhaponticosides doit être déterminée. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rheum x hybridum Murray Polygonaceae Tuinrabarber rhubarbe wortel, wortelstok racine, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rheum officinale Baill. Polygonaceae chinese rabarber rhubarbe de chine, racine de rhubarbe officinale wortel, wortelstok racine, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rheum palmatum L. Polygonaceae chinese rabarber, sierrabarber, turkse rabarber rhubarbe de chine, rhubarbe palmée, rhubarbe décorative wortel, wortelstok racine, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn

voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rheum rhabarbarum L. Polygonaceae Rheum undulatum L. rabarber rhubarbe des jardins
wortel, wortelstok racine, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rheum rhaponticum L. Polygonaceae wortel, wortelstok racine, rhizome De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rhodiola crenulata (Hook. f. & Thomson) Ohba Crassulaceae rozewortel orpin rose
wortel racine

Ribes nigrum L. Grossulariaceae zwarte aalbes groseillier noir, cassis, cassissierknop, vrucht, blad bourgeon, fruit, feuille

Ribes rubrum L. Grossulariaceae aalbes, trosbes groseillier à grappes vrucht, blad
fruit, feuille

Ribes uva-crispa L. Grossulariaceae kruisbes groseillier épineux, groseillier à maquereau vrucht, blad fruit, feuille

Robinia pseudoacacia L. Leguminosae gewone robinia, valse acacia robinier
faux-acacia gekookte bloem, gekookte zaad fleur cuite, graine cuite

Rocella phycopsis Ach. Rocellaceae Rocella tinctoria DC. thallus
thallus De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La

portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

Rosa canina L.	Rosaceae	hondsroos	rosier des chiens, eglantier commun
bloem, vrucht, blad, zaad		fleur, fruit, feuille, graine	
Rosa x centifolia L. (pro sp.)	Rosaceae	franse provenceroos, provenceroos	
rosier cent-feuilles, rose pâle	bloem, blad	fleur, feuille	
Rosa gallica L.	Rosaceae	franse roos	rosier de france, rosier de provins
bloem, vrucht, blad, zaad		fleur, fruit, feuille, graine	
Rosa moschata Mill.	Rosaceae	echte muskusroos	rosier musqué
vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feuille, graine		bloem,
Rosa rubiginosa L.	Rosaceae	eglantier	rosier rouillé, rosier rubigineux,
rosier églantier	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feuille	
Rosa x damascena Mill.	Rosaceae	Rosa gallica f. trigintipetala Dieck	damastroos
rosiers de damas	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feuille	
Rosmarinus officinalis L.	Lamiaceae	rozemarijn	romarin
parties aériennes			bovengrondse delen
Rubia cordifolia L.	Rubiaceae	rubia cordifolia l.	rubiceae
racine			wortel
Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lucidine bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de lucidine.			
Rubus caesius L.	Rosaceae	dauwbraam	ronce bleue
parties aériennes			bovengrondse delen
Rubus chingii var. suavissimus (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	Rubus suavissimus S. Lee	
vrucht	fruit		
Rubus fruticosus L.	Rosaceae	gewone braam	ronce commune, ronce des buissons,
murier sauvage	hele plant	plante entière	
Rubus idaeus L.	Rosaceae	gewone framboos	framboisier commun, framboisier
blad, vrucht	feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.	
Rubus rosa L.H. Bailey	Rosaceae	blad, vrucht	feuille, fruit
Rumex acetosa L.	Polygonaceae	veldzuring	oseille sauvage, oseille des prés,
oseille, oseille commune	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.			

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex acetosella L. Polygonaceae schapenzuring petite oseille hele plant
plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van
totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten
beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen
bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts
raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée
ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg.
Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit
comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez
votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un
spécialiste.

Rumex alpinus L. Polygonaceae alpenzuring oseille des alpes hele plant
plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van
totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten
beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen
bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts
raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée
ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg.
Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit
comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez
votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un
spécialiste.

Rumex conglomeratus Murray Polygonaceae Rumex acutus Sm. kluwenzuring patience
agglomerée hele plant plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De
analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de
volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij
zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.
La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes
totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour
chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer
aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas
d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex crispus L. Polygonaceae krulzuring patience crépue, churelle hele
plant plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van
totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten
beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen
bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts
raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée
ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg.

Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex longifolius DC. Polygonaceae hele plant plante entière De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden*
(uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot
van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan
kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig
gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à
une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse
doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements
suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de
grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex obtusifolius L. Polygonaceae ridderzuring patience à feuilles obtuses, patience
sauvage, rumex à feuilles obtuses hele plant plante entière De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan
14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet
de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij
zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.
La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes
totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour
chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer
aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas
d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex patientia L. Polygonaceae spinaziezuring patience des moines, oseille épinard
hele plant plante entière De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten
moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende
waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of
borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion
journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en
rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de
produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de
moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation
prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex sanguineus L. Polygonaceae bloedzuring hele plant plante
entière De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal
anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn
voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet
toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.
Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit
pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les
résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter

les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Ruscus aculeatus L. Asparagaceae stekelige muizendoorn fragon, petit houx hele plant plante entière De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Ruscus hypoglossum L. Asparagaceae cladode, wortelstok cladode, rhizome De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Sabatia angularis (L.) Pursh Gentianaceae bovengrondse delen
parties aériennes

Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders Laminariaceae Laminaria
saccharina (L.) J.V. Lam. suikerwier laminaire sucrée, baudrier de neptune thallus
thallus

Saccharum officinarum L. Poaceae suikerriet canne à sucre tak, sap
branche, jus

Salix alba L. Salicaceae schietwilg, knotwilg saule blanc schors, knop, bloem, blad écorce, bourgeon, fleur, feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Salix caprea L. Salicaceae boswilg saule marsault, saule des chèvres, marsaule, marseau schors écorce De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Salix fragilis L. Salicaceae kraakwilg saule, fragile, saule cassant schors, blad écorce, feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les

avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Salix pentandra L. Salicaceae laurierwilg saule laurier, saule à cinq étamines
schors, blad écorce, feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten
: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. La portion journalière recommandée
ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les
avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant
d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Salix purpurea L. Salicaceae bittere wilg osier rouge, saule pourpre
schors, blad écorce, feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten
: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. La portion journalière recommandée
ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les
avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant
d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Salvia hispanica L. Lamiaceae chia chia olie van het zaad huile de la
graine Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn
toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). Seuls les produits conformes à
l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et
(UE) 2015/2283).

Salvia miltiorrhiza Bunge Lamiaceae rode salie sauge de chine blad, wortel
feuille, racine

Salvia officinalis L. Lamiaceae echte salie sauge officinale bovengrondse delen
parties aériennes

Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams Lamiaceae Salvia lavandulifolia Vahl
lavendelsalie sauge à feuilles de lavande bovengrondse delen parties aériennes

Salvia pratensis L. Lamiaceae veldsalie, weidesalie sauge commune, sauge des
prés bovengrondse delen parties aériennes

Salvia sclarea L. Lamiaceae scharlei sauge sclarée bovengrondse delen
parties aériennes

Sambucus nigra L. Adoxaceae gewone vlier sureau noir, sureau commun hele
plant plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van
waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg. La portion journalière
recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié)
supérieure à 5 mg.

Sanguisorba minor Scop. bovengrondse delen	Rosaceae parties aériennes	kleine pimpernel	petite pimprenelle
Sanguisorba officinalis L. officinale, grande pimprenelle	Rosaceae hele plant	grote pimpernel plante entière	sanguisorbe
Sanicula elata Buch.-Ham. ex D. Don sanicle, sanicle d'europeblad, wortel	Apiaceae feuille, racine	Sanicula europaea L.	heelkruid
Santolina chamaecyparissus L. bloeiende top, blad, zaad	Asteraceae sommité fleurie, feuille, graine	heiligenbloem	santale petit cyprès
Saponaria officinalis L. plant	Caryophyllaceae plante entière	zeepkruid	saponaire officinale hele
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk Hook. f.	Apiaceae racine de silère wortel	Siler divaricatum (Turcz.) Benth. &	
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach silère wortelschors	Rosaceae écorce de racine	Poterium spinosum L.	racine de
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.			
Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell hijiki, hiziki	Sargassaceae hijiki, hiziki	Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	thallus
Sarracenia purpurea L. blad, wortelstok	Sarraceniaceae feuille, rhizome	paarse trompetbekerplant	sarracénie pourpre
Satureja hortensis L. sarriette des jardins	Lamiaceae bloeiende top, zaad	bonekruid sommité fleurie, graine	sarriette commune, sarriette,
Satureja montana L. sarriette des montagnes, sarriette vivace	Lamiaceae bovengrondse delen	winterbonenkruid, bergbonekruid, bergsteentijm	parties aériennes
Satureja thymbra L. aériennes	Lamiaceae	bovengrondse delen	parties
Saussurea costus (Falc.) Lipsch. costus wortel	Asteraceae racine	Saussurea lappa (Decne.) Sch. Bip.	costus
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. de chine	Schisandraceae decoct van tak, gekookt jong blad, vrucht	schisandra, wu wei zu	schisandra
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.			
Schizochytrium microalgae huile	Thraustochytriaceae		olie
Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). Seuls les produits conformes à			

l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).

Scorzonera hispanica L. Compositae	grote schorseneer	scorsonère d'espagne
wortel racine		

Scrophularia ningpoensis Helmsl.	Scrophulariaceae	zwart helmkruid
scrophularia ningpoensis helmsl.	wortel racine	

Scutellaria baicalensis Georgi	Lamiaceae	baikalgldkruid scutellaire du lac baïkal
blad, wortel	feuille, racine	

Scutellaria lateriflora L. Lamiaceae	hele plant	plante entière
--------------------------------------	------------	----------------

Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden furano neoclerodanen bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néo-clérodanes. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.

Secale cereale L.	Poaceae	rogge seigle	hele plant	plante entière
-------------------	---------	--------------	------------	----------------

Sedum acre L. Crassulaceae	muurpeper	orpin âcre	bovengrondse delen
parties aériennes			

Sedum album L. Crassulaceae	wit vetkruid	orpin blanc, sédum blanc	blad
feuille			

Sedum roseum (L.) Scop.	Crassulaceae	Rhodiola rosea L.	rozenwortel	rhadiole
rose, orpin rose wortel racine				

Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Cereus grandiflorus (L.) Mill.
koningin der nacht reine de la nuit bloem fleur		Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden narcissine bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en narcissine.

Sempervivum tectorum L. Crassulaceae	gewone huislook	joubarbe des toits,
barbe de jupiter bovengrondse delen	parties aériennes	

Senna alexandrina Mill. Leguminosae Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia M.Vahl, Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault, Senna angustifolia (Vahl) Batka. alexandrijnse senna séné d'alexandrie
blad, peul feuille, gousse De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne

pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Senna italica Mill. Leguminosae *Cassia italica* (Mill.) F.W.Andrews

vrucht (peul), blad fruit (gousse), feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Fabaceae *Cassia obtusifolia* L.

hele plant plante entière De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Senna occidentalis (L.) Link Leguminosae faux kinkéliba, café-nègre, café puant, café bâtard, casse-puante blad feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Senna tora (L.) Roxb. Leguminosae blad, zaad feuille, graine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz Taxodiaceae mammoetboomséquoia
géant jonge bebladerde scheuten jeunes pousses feuillées Enkel geglycerineerde koude
maceraten zijn toegelaten waarvoor de aanbevolen dagelijkse dosis overeenstemt met maximum 41
mg equivalent droge plant. Seuls sont autorisés les macéras froids glycinés pour lesquels la
dose journalière recommandée correspond à maximum 41 mg d'équivalent plante sèche.

Serenoa repens (W.Bartram) Small Arecaceae *Serenoa serrulata* (Michx.) G. Nicholson;
Serenoa serrulata (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks.; *Sabal serrulata* (Michx.) Schult.f. zaagpalm,
zaagpalmetto sabal, palmier de floride, chou palmiste, palmier d'amérique du nord vrucht fruit

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van vetoplosbare
bestanddelen hoger dan 256 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag
raad aan uw arts of apotheker. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une
ingestion de constituants liposolubles supérieure à 256 mg. L'étiquetage doit comporter
l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin ou pharmacien.

Sesamum indicum L. Pedaliaceae *Sesamum orientale* L. sesam sésame zaad graine

Seseli tortuosum L. Apiaceae bovengrondse delen parties
aériennes

Sideritis syriaca L. Lamiaceae bergthee Thé Grec des Montagnes
bovengrondse delen parties aériennes

Sigesbeckia orientalis L. Compositae *Sigesbeckia serrata* DC. herbe grasse, herbe
divine, herbe saint-paul blad, wortel feuille, racine

Silaum silaus (L.) Shinz Et Thell. Apiaceae weidekervel silaüs des prés
vrucht, wortel fruit, racine

Silybum marianum (L.) Gaertn. Compositae mariadistel chardon-marie
bovengrondse delen parties aériennes

Simmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid. Simmondsiaceae jojoba jojoba
zaad vrij van olie graine sans huile De etikettering moet de volgende
waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij kinderen, adolescenten onder 18 jaar en tijdens de
zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser chez les enfants
et adolescents de moins de 18 ans, ni durant la grossesse.

Sisymbrium officinale (L) Scop.Brassicaceae *Erysimum officinale* L. gewone raket sisymbre
officinal, herbe aux chantres, vélar bovengrondse delen parties aériennes Analyse
moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden cardioactieve steroïde glycoside
bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en
glycosides stéroïdes cardiotoniques.

Smilax aristolochiifolia Mill. Smilacaceae *Smilax medica* Schltdl. et Cham.
wortelstok, wortel rhizome, racine

Smilax aspera L. Smilacaceae struikwinde,stekende winde salsepareille
d'europe wortelstok, wortel, wortelscheut rhizome, racine, pousse de racine

Smilax china L.	Smilacaceae	chinawortel	squine	hele plant	plante entière
Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae				wortelstok, wortel rhizome, racine
Smilax glabra Roxb.	Smilacaceae			wortelstok, wortel	rhizome, racine
Smilax officinalis Kunth	Smilacaceae	Smilax tonduzii Apt		echte sarsaparilla	
	salsepareille	wortel	racine		
Smilax purhampuy Ruiz	Smilacaceae	Smilax febrifuga Kunth		ecuadoriaanse sarsaparilla	
	smilax febrifuga kunth	wortelstok, wortel		rhizome, racine	
Smilax regelii Killip & C.V. Morton	Smilacaceae			hondurese sarsaparilla, jamaicaanse sarsaparilla	
	salsepareille, salsepareille du honduras	wortelstok, wortel		rhizome, racine	
Solanum melongena L.	Solanaceae	Solanum ovigerum Dun.		aubergine	aubergine
	vrucht, wortel	fruit, racine			
Solanum tuberosum L.	Solanaceae		aardappel	pomme de terre knol	tubercule
Solidago virgaurea L.	Compositae		echte guldenroede	solidage verge d'or	
	bovengrondse delen	parties aériennes			
Sorbus aucuparia L.	Rosaceae		wilde lijsterbes	sorbier des oiseleurs	
	bovengrondse delen	parties aériennes			
Sorghum bicolor (L.) Moench	Poaceae		kafferkoren, durra, kafir	sorgho	
commun	zaad, jonge scheut	graine, jeune pousse	De aanbevolen dagelijkse		
hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.					
Spatholobus suberectus Dunn.	Leguminosae		stam	tige	De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.					
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C. Presl.	Caryophyllaceae			rode schijnspurrie	
	spergulaire rouge	bovengrondse delen	parties aériennes		De etikettering moet
de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.					
Spinacia oleracea L.	Amaranthaceae		spinazie	epinard blad	feuille

Spirulina major Kützinger ex Gomont spiruline	Pseudanabaenaceae ééncellige alg	Spirulina major Kützinger	spirulina
Spirulina maxima (Setchell & Gardner) Geitler & Gardner	Pseudanabaenaceae spiruline	Arthrospira maxima Setchell	algue unicellulaire
Spirulina platensis (Gomont) Geitler spirulina platensis, platensis, spiruline, algue de vie	Pseudanabaenaceae ééncellige alg	spirulina platensis, platensis	algue unicellulaire
Stachys officinalis (L.) Trevis. bovengrondse delen	Lamiaceae parties aériennes	Betonica officinalis L.	betonie bétaine
Stachys recta L.	Lamiaceae parties aériennes	bergandoorn	épiaire droite bovengrondse delen
Stachys sylvatica L. bovengrondse delen	Lamiaceae parties aériennes	bosandoorn	épiaire des bois, ortie puante
Stellaria media (L.) Vill. intermédiaire, morgeline	Caryophyllaceae bovengrondse delen	vogelmuur	stellaire parties aériennes
Stemmacantha carthamoides (Willd.) Iljin	Dittrich rhapontique des alpes	Asteraceae wortel	Rhaponticum carthamoides (Willd.) racine
Styphnolobium japonicum (L.) Schott sophora du japon	Leguminosae gekookt jong blad, bloem, bloemknop, decoct van de stengel	Sophora japonica L.	honingboom jeune feuille cuite, fleur, bouton floral
décoction de la graine, décoction de la tige detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat. contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen L'analyse doit démontrer que la préparation ne		
Symplocos racemosa Roxb.	Symplocaceae		bast liber
Syringa vulgaris L. bourgeon de feuille	Oleaceae	sering	lilas commun, lilas français bladknop
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry Eugenia caryophyllata Thunb. (nom. illeg.) géroflier	Myrtaceae kruidnagelboom	Caryophyllus aromaticus L., girofle, giroflier,	
Syzygium cumini (L.) Skeels schors, vrucht, blad, zaad	Myrtaceae écorce, fruit, feuille, graine	jambolan	jamblon, jamelonier
Syzygium jambos (L.) Alston jambosier, jam-rose, pomme rose	Myrtaceae vrucht, blad	rozenappel fruit, feuille	jamrosat, jambrosade, De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.

Syzygium malaccense (L.) Merr. Et L.	M. Perry.	Myrtaceae	djamboe bol, maleisische rozenappel, maleisische wasappel	jambosier rougeblad	feuille
Tagetes erecta L.		Compositae	groot afrikaantje	rose d'inde	
bovengrondse delen		parties aériennes			
Tagetes minuta L.		Compositae	geelgroen afrikaantje	tagète des décombres	
bovengrondse delen		parties aériennes			
Tamarindus indica L.		Leguminosae	tamarindeboom	tamarinier	vrucht fruit
Tamarix gallica L.		Tamaricaceae	franse tamarisk	tamaris commun, tamaris de france,	
tamarix commun, tamarix de france		jonge bladscheut	jeunes pousse		
Tanacetum balsamita L.		Compositae	balsemwormkruid	menthe-coq	
bovengrondse delen		parties aériennes			
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.		Compositae	moederkruid	grande camomille	
bovengrondse delen		parties aériennes			
Tanacetum vulgare L.		Compositae	boerenwormkruid	tanaisie vulgaire	
bovengrondse delen		parties aériennes			
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.					
Taraxacum campylodes G.E.Haglund		Asteraceae	Taraxacum officinale Web.		
paardebloem		pissenlit, dent de lion	hele plant	plante entière	
Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.		Combretaceae	bibhitaki, bastaard myrobalaan		
bibhitaki		vrucht fruit			
Terminalia chebula Retz.		Combretaceae	zwarte myrobalaan	badamier chebule,	
myrobalan chebule		vrucht fruit			
Thalictrum flavum L.		Ranunculaceae	poelruit	pigamon	wortel racine
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.					
Theobroma cacao L.		Malvaceae	cacaoboom	cacaoyer	zaad graine
Thlaspi arvense L.		Brassicaceae	witte krodde, boerenkers	tabouret des	
champs, monnoyère		zaad graine			
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.					

Thymus satureioides Coss.	Lamiaceae	satureja tijm	thym saturéioïde	
bovengrondse delen	parties aériennes			
Thymus serpyllum L.	Lamiaceae	wilde tijm, veldtijm, citroentijmserpolet à feuilles étroites, piolet, thym sauvage, thym rouge	bovengrondse delen	parties aériennes
De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.				
Thymus vulgaris L.	Lamiaceae	echte tijm, hooitijm, roomse kwendel, tijmoes thym commun, thym vrai, pouilleux, frigouille	bovengrondse delen	parties aériennes
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 4 g gedroogde plant.				
De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 4 g de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.				
Thymus zygis L.	Lamiaceae	spaanse tijm, rode tijm	thym d'espagne, thym rouge	
bovengrondse delen	parties aériennes			
Tilia americana L.	Malvaceae	amerikaanse linde	tilleul d'amérique	
bovengrondse delen	parties aériennes			
Tilia cordata Mill.	Malvaceae	winterlinde, kleinbladige linde	tilleul à petites feuilles, tilleul des bois, tilleul à feuilles en coeur	plante entière
Tilia platyphyllos Scop.	Malvaceae	zomerlinde, grootbladige linde	tilleul à larges feuilles	plante entière
Tilia tomentosa Moench	Malvaceae	Tilia argentea DC.	zilverlinde	tilleul argenté
plant	plante entière			hele
Tilia x europaea L.	Malvaceae	Tilia x vulgaris B. Heyne	hollandse linde	tilleul de
hollande, tilleul commun	schors, bloem, blad, zaad	écorce, fleur, feuille, graine		
Tinospora sinensis (Lour.) Merr.	Menispermaceae	Tinospora cordifolia (Willd.) Miers		
wortel, stengel, blad	racine, tige, feuille			
Trachyspermum ammi (L.) Sprague	Apiaceae	ajowan	ajowan zaad	graine
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.				
Tragopogon porrifolius L.	Compositae	paarse morgenster, boksbaard	salsifis	
cultivé wortel	racine			
Tribulus terrestris L.	Zygophyllaceae	tribulus	croix-de-malte, tribule terrestre	
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.				
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van saponinen hoger dan 15 mg.				

De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling of antidiabetische behandeling. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 21 jaar. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de saponines supérieure à 15 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension ou le diabète.

Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 21 ans.

Trichilia catigua A. Juss. Meliaceae catuaba catuaba schors écorce Een gedetailleerde botanische identificatie is vereist. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden tropaan alkaloïden bevat. Une identification botanique détaillée est requise. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes tropaniques.

Trichosanthes kirilowii Maxim. Cucurbitaceae chinese komkommer concombres chinois
vrucht (pericarp en zaad) fruit (péricarpe et graine) Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden trichosanthine bevat. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en trichosanthine.

Tridax procumbens L. Compositae bovengrondse delen parties aériennes
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Trifolium arvense L. Leguminosae hazenpootje pied-de-lièvre, trèfle des champs, trèfle bovengrondse delen parties aériennes
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Trifolium campestre Schreb. Leguminosae liggende klaver trèfle des champs
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Trifolium pratense L. Leguminosae rode klaver trèfle des prés, trèfle rouge, triolet
bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Trifolium repens L. Leguminosae witte klaver trèfle rampant, trèfle blanc, coucou
 bovengrondse delen parties aériennes De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag
 niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger
 dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. La portion
 journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside
 du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour
 chaque lot de produits.

Trigonella caerulea (L.) Ser. Leguminosae zevengetijdeklaver trigonelle bleue
 bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet de volgende
 waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter
 l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Trigonella foenum-graecum L. Leguminosae fenegriek fenugrec zaad
 graïne De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de
 zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de
 grossesse.

Trillium erectum L. Melanthiaceae drieblad, boslelie trille rouge, trille dressé
 wortelstok rhizome De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :
 Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas
 utiliser en cas de grossesse.

Triticum aestivum L. Poaceae Triticum vulgare Vill.; Triticum sativum Lam. gewone
 tarwe blé commun, froment bovengrondse delen parties aériennes

Triticum dicoccon (Schränk.) Schübl. Poaceae emmertarwe, emmer, tweekoren
 amidonnier vrucht fruit

Triticum durum Desf. Poaceae Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husnot
 harde tarwe froment dur scheut, zaad pousse, graïne

Triticum spelta L. Poaceae spelt épeautre scheut, zaad pousse,
 graïne

Triticum turgidum L. Poaceae engelse tarwe blé barbu, gros blé scheut, zaad
 pousse, graïne

Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae oost-indische kers grande capucine
 bovengrondse delen zonder vrucht parties aériennes sans fruit De aanbevolen
 dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine.
 De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de
 volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier
 behandeling, uw arts raadplegen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à
 une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats
 d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter
 l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde,
 consultez votre médecin.

Tropaeolum minus L. Tropaeolaceae bovengrondse delen zonder vrucht
 parties aériennes sans fruit De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot

een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.

Tsuga canadensis (L.) Carrière	Pinaceae	oostelijke, canadese hemlockspar	
pruche du canada, pruche de l'est		blad, hars	feuille, résine
Turnera diffusa Wild. ex Schult.	Passifloraceae	damiaanblad, damiana	feuilles de damiana,
turnéra	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende
			waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische
			behandeling. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou
			votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Ulmus glabra Huds.	Ulmaceae	Ulmus campestris L.; Ulmus scabra Mill.	ruwe olm,
ruwe iep, bergiep		orme des montagnes, orme rude, orme blanc	schors, knop
bourgeon			écorce,
Ulmus pumila L.	Ulmaceae	siberische iep	orme de sibérie
écorce, feuille			schors, blad
Ulmus rubra Muhl.	Ulmaceae	Ulmus fulva Michx.	rode ieporme rouge
écorce			schors
Ulva lactuca L.	Ulvaceae	zeesla	laitue de mer
		thallus	thallus
Uncaria gambir (Hunter) Roxb.	Rubiaceae	cachou, gambir, gambirstruik	cachou
gambir, arbre catechu	bovengrondse delen	parties aériennes	
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil.	Rubiaceae	Nauclea rhynchophylla Miq.	
haak	crochet		
Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae	katsklauw	griffe de
chat	schors, stam, wortel	écorce, tige, racine	
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar	Alariaceae	Alaria pinnatifida Harvey	wakame
wakamé	thallus	thallus	
Urtica dioica L.	Urticaceae	grote brandnetel	ortie dioïque, grande ortie
plant	plante entière		hele
			Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok :
			De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid
			equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten
			: Vraag raad aan uw arts of apotheker. Pour les compléments alimentaires avec des préparations de
			la racine ou le rhizome : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion
			supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter
			l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.

Urtica urens L. Urticaceae kleine brandnetel ortie brûlante, petite ortie hele plant plante entière Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker. Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.

Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg. Parmeliaceae baardmos usnée, barbe de saint-antoine, barbe de jupiter thallus thallus De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

Usnea longissima Ach. Parmeliaceae baardmos usnée, mousse d'espagne thallus thallus De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

Usnea plicata Wiggers Parmeliaceae thallus thallus De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

Vaccinium myrtilloides Michx. Ericaceae *Vaccinium angustifolium* var. *myrtilloides* (Michx.) House airelle fausse-myrtille, bleuët, bleuët sauvage vrucht, blad fruit, feuille

Vaccinium corymbosum L. Ericaceae blauwe bes myrtille arbustive, grande myrtille, myrtille américaine, bleuët géant, corymbelle vrucht, blad fruit, feuille

Vaccinium macrocarpon Aiton Ericaceae grote veenbes, cranberry canneberge à gros fruits, airelle à gros fruits bes baie

Vaccinium myrtillus L. Ericaceae blauwe bosbes myrtille commune, myrtillier, baies de myrtille vrucht, blad fruit, feuille

Vaccinium oxycoccos L. Ericaceae *Oxycoccus palustris* Pers. kleine veenbes canneberge des marais, airelle canneberge, canneberge ou atocas vrucht fruit

Vaccinium uliginosum L. Ericaceae rijbsbes myrtille des marais vrucht, blad fruit, feuille

Vaccinium vitis-idaea L. Ericaceae rode bosbes airelle, airelle vigne d'ida, airelle rouge vrucht, blad fruit, feuille De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 6,8 g gedroogd blad. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 6,8 g de feuille séchée. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Valeriana jatamansi Jones Valerianaceae *Valeriana wallichii* DC. indische valeriaan
valériane d'inde wortel racine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot
een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te nemen
bereiding mag geen valepotriaten bevatten. La portion journalière recommandée ne doit pas
conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. la forme finale
à consommer ne peut pas contenir de valépotriates.

Valeriana officinalis L. Caprifoliaceae echte valeriaan valériane officinale, valériane des
collines, valériane à petites feuilles wortel racine De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag
niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te
nemen bereiding mag geen valepotriaten bevatten. La portion journalière recommandée ne doit
pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. la forme
finale à consommer ne peut pas contenir de valépotriates.

Valerianella locusta (L.) Laterr. Caprifoliaceae *Valeriana locusta* L. veldsla, korensla, ezelsoor
mâche, blanchette, boursette, clairette, raiponce, oreillette, salade de blé blad feuille

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews Orchidaceae vanille-orchidee vanille
vrucht, oliehart fruit, oléorésine

Verbascum densiflorum Bertol. Scrophulariaceae stalkaars bouillon blanc à
grandes fleurs, molène à fleurs denses, bonhomme, molène bovengrondse delen parties
aériennes

Verbascum phlomoides L. Scrophulariaceae keizerskaars molène faux-
phlomisbloem fleur

Verbascum thapsus L. Scrophulariaceae koningskaars bouillon blanc à petites
fleurs bovengrondse delen parties aériennes

Verbena officinalis L. Verbenaceae ijzerhard verveine sauvage, verveine
officinale bovengrondse delen parties aériennes De etikettering moet de volgende
waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. L'étiquetage doit comporter
l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Veronica anagallis-aquatica L. Plantaginaceae blauwe waterereprijs véronique mouron
d'eau, mouron aquatique hele plant plante entière

Veronica beccabunga L. Plantaginaceae beekpunge véronique des ruisseaux, cresson de
cheval, salade de chouette bovengrondse delen parties aériennes

Veronica chamaedrys L. Plantaginaceae gewone ereprijs, gamander-ereprijs véronique
petit-chêne, fausse germandrée hele plant plante entière

Veronica officinalis L. Plantaginaceae mannetjesereprijs véronique officinale, thé
d'Europe bovengrondse delen parties aériennes

Viburnum lantana L.	Adoxaceae	wollige sneeuwbal	viorne mancienne, viorne
lantane, mansienne	bovengrondse delen	parties aériennes	
Viburnum opulus L.	Adoxaceae	gelderse roos	viorne obier, boule-de-neige
bovengrondse delen	parties aériennes		
Vicia faba L.	Leguminosae	tuinboon, labboon	fèves, féverolles
zaad	graine cuite	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij favisme.	
L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de favisme.			
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi	Leguminosae	Phaseolus chrysanthos Savi	
adzukiboon	haricot azuki	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée
Viola calcarata L.	Violaceae	langsporig viooltje	pensée des alpes
bovengrondse delen	parties aériennes		
Viola odorata L.	Violaceae	maarts viooltje	violette odorante
bovengrondse delen	parties aériennes		
Viola palustris L.	Violaceae	moerasviooltje	violette des marais
bovengrondse delen	parties aériennes		
Viola tricolor L.	Violaceae	driekleurig viooltje	pensée sauvage, violette tricolore
des jardins, pensée tricolore	bovengrondse delen	parties aériennes	
Viscum album L.	Santalaceae	maretak	gui
feuille		tak, blad	branche,
Vitex agnus-castus L.	Lamiaceae	monnikenpeper, kuisboom	gatillier, agneau-chaste
hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 96 mg gedroogde vrucht.	
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.			
Pour les compléments alimentaires avec des préparations de fruit : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 96 mg de fruit séché.			
L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.			
Vitex trifolia L.	Lamiaceae	vrucht	fruit
De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding..			
L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.			
Vitis vinifera L.	Vitaceae	druif, wijnstok, wijngaardstok	vigne cultivée, vigne
vinifère vrucht, bladknop, blad, zaad		fruit, bourgeon de feuille, feuille, graine	

Withania somnifera (L.) Dunal	Solanaceae	ashwagandha, indiase ginseng		
ashwagandha, ginseng indien	hele plant	plante entière		
Xeranthemum annuum L.	Compositae	papierbloem	immortelle	bloem
fleur				
Yucca filamentosa L.	Asaparagaceae	palmlelie	yucca filamenteux	
bovengrondse delen	parties aériennes			
Yucca schidigera Roezl ex Ortgies	Asaparagaceae			bovengrondse delen
parties aériennes				
Zea mays L.	Poaceae	maïs	maïs	bloem, vrucht, haarwortels van gekiemde zaad
fleur, fruit, radicules de graine germée				
Zingiber officinale Rosc.	Zingiberaceae	gembergingembre, amome des indes		
wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 1,5 g gedroogde wortelstok voor adolescenten en volwassenen en de hoeveelheid equivalent met 0,75 g gedroogde wortelstok voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 1 g gedroogde wortelstok voor zwangere vrouwen (extracten zijn niet toegelaten). Het gebruik voor kinderen onder 6 jaar is niet toegestaan. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 1,5 g de rhizome séché pour adolescents et adultes et à la quantité équivalente à 0,75 g de rhizome séché pour les enfants de 6 à 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à 1 g de rhizome séché pour les femmes enceintes (les extraits ne sont pas autorisés). L'utilisation pour les enfants de moins de 6 ans n'est pas autorisée.		
Ziziphus jujuba Mill.	Rhamnaceae	jujubeboom, chinese dadel	jujubier, dattier	
chinois bovengrondse delen	parties aériennes			

* Pour calculer la teneur "totale" en anthranoïdes, il faut déterminer les teneurs de chaque composant séparément et ensuite, en fonction des dosages administrés, en faire la somme. Pour les mélanges de différentes espèces de plantes, la teneur totale est limitée à la dose maximale autorisée de l'ingrédient auquel s'applique la dose la plus faible en cas d'utilisation simple.

Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 24 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

debut

Publié le : 2017-02-10

Numac : 2016024295