

Art. 6. Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments alimentaires, il est interdit :

1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires ;

2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

Art. 7. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission.

Art. 8. § 1^{er}. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires qui ne sont pas préemballés.

§ 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en exécution du présent arrêté sont à considérer comme déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 9. § 1^{er}. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 10. L'arrêté royal du 12 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 11. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

Art. 6. In de etikettering en de presentatie van en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden:

1° aan het product eigenschappen ter voorkoming, ter behandeling of ter genezing van ziekten en toespelingen op dergelijke eigenschappen toe te schrijven;

2° te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

Art. 7. De bepalingen van dit besluit laten de toepassing van de verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie onverlet.

Art. 8. § 1. Het is verboden voedingssupplementen in de handel te brengen, die niet voorverpakt zijn.

§ 2. De voedingsmiddelen die niet aan de bepalingen van dit besluit of aan de door de Minister in uitvoering van dit besluit vastgestelde bepalingen voldoen zijn te beschouwen als schadelijk verklaard in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 9. § 1. De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van de diverse wettelijke bepalingen.

§ 2. De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden gestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 10. Het koninklijk besluit van 12 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014, wordt opgeheven.

Art. 11. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit

Brussel, 29 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE

De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

[C – 2021/21875]

31 AOÛT 2021. — Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[C – 2021/21875]

31 AUGUSTUS 2021. — Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2, 7, § 1^{er}, modifié par la loi du 22 mars 1989, 18, § 1^{er}, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, et 20, § 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 26 mars 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 25 mars 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 69.485/3 du Conseil d'État, donné le 28 juin 2021, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Plantes: les organismes vivants qui sont en mesure, par photosynthèse, de produire des substances organiques à partir de matières premières inorganiques, les plantes parasites et les champignons;

2° Plantes dangereuses: plantes impropres à la consommation humaine;

3° Préparation de plantes: le résultat de toute manipulation qui modifie la plante ou partie de la plante pour servir à la consommation humaine, à l'exclusion des additifs;

4° Forme prédosée: les formes suivantes: les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;

5° Arômes: les substances définies à l'article 1^{er}, § 1^{er}, 1° de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires;

6° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

7° Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;

8° Compléments alimentaires: les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'une source concentrée d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique;

9° Substances des plantes: substances actives des plantes, qui ont un effet nutritionnel ou physiologique, ou des marqueurs des plantes.

Art. 3. § 1^{er}. Il est interdit de mettre dans le commerce en tant que denrées alimentaires ou composants incorporés à des denrées alimentaires, des plantes reprises dans la liste 1 des plantes dangereuses en annexe du présent arrêté.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, de artikelen 2, 7, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989, 18, § 1, laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, en 20, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten;

Gelet op het advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten, gegeven op 26 maart 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 25 maart 2021;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 69.485/3 van de Raad van State, gegeven op 28 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en van de Minister van Landbouw, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2002/46/EG van 10 juni 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° Planten: levende organismen, die in staat zijn uit anorganische grondstoffen door fotosynthese organische stoffen op te bouwen, de parasitaire planten en de paddenstoelen;

2° Gevaarlijke planten: planten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;

3° Plantenbereiding: het resultaat van iedere behandeling die de plant of het plantendeel wijzigt om voor voedingsdoeleinden te dienen, met uitzondering van toevoegsels;

4° Voorgedoseerde vorm: de volgende vormen: capsules, pastilles, tabletten, pillen, comprimés, dragées, gelulen, granulen, ouwels en soortgelijke vormen, poederzakjes, drinkbare ampullen, druppelteller flesjes en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden;

5° Aroma's: de stoffen gedefinieerd in artikel 1, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen;

6° Minister: de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft;

7° Dienst: het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu;

8° Voedingssupplementen: als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron vormen van één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect;

9° Plantenstoffen: actieve stoffen van planten, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten, of merkers van planten.

Art. 3. § 1. Het is verboden planten, die vermeld zijn in lijst 1 van gevaarlijke planten in bijlage bij dit besluit, in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen.

§ 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des préparations de plantes obtenues à partir de plantes mentionnées dans la liste 1 de l'annexe au présent arrêté en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires.

Cette disposition n'est pas d'application pour la fabrication d'arômes.

Le Ministre peut fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes;

Le Ministre ou son délégué peut donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1^{er} lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations des plantes sont obtenues ; il détermine les conditions de ces dérogations individuelles sur base d'avis de la Commission d'avis des préparations de plantes; ces conditions portent sur la composition des produits et sur les mentions à apposer dans leur étiquetage.

Art. 4. § 1^{er}. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires:

a) des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

b) des denrées alimentaires contenant des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

c) des champignons séchés:

– autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 et 2 en annexe du présent arrêté, s'ils sont en entier;

– autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté, s'ils sont fractionnés;

d) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté d'espèces différentes mélangés entre eux ou avec des champignons repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté;

e) des champignons, autres que frais, fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée;

f) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté qui sont fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée, à l'exception des truffes et des morilles;

g) des champignons contenant des insectes, des parties d'insectes ou des débris d'insectes;

h) des champignons qui ne sont pas frais de telle manière qu'ils peuvent présenter un danger pour la santé.

§ 2. Le Ministre peut fixer une liste de champignons qui peuvent être utilisés ou non pour la fabrication d'arômes ou d'additifs.

Art. 5. § 1^{er}. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté et qui répondent aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément aux dispositions suivantes.

Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire ou via l'application FOODSUP sur le site internet du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au moins les données suivantes :

1° la nature du produit;

2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative);

3° l'analyse nutritionnelle du produit, si d'application, et des données qualitatives et quantitatives concernant les substances actives significatives connues ou des marqueurs, par unité et par portion journalière, la toxicité et la stabilité;

4° l'étiquetage du produit;

5° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du Service;

6° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 10, § 1^{er}, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

§ 2. Het is verboden plantenbereidingen, verkregen uit planten die vermeld zijn in lijst 1 van de bijlage bij dit besluit, te fabriceren en in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen.

Deze bepaling is niet van toepassing voor de fabricage van aroma's.

De Minister kan een lijst van planten vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma's mogen gebruikt worden;

De Minister of zijn afgevaardigde kan afwijkingen toestaan op het verbod bedoeld in het eerste lid wanneer aan de hand van een toxicologisch en analytisch dossier kan worden aangetoond dat de plantenbereidingen de toxische eigenschappen of stoffen van de plant, waaruit de plantenbereidingen bekomen zijn, niet meer bevatten; hij stelt de voorwaarden van deze individuele afwijkingen vast op basis van het advies van de Commissie van advies voor plantenbereidingen; deze voorwaarden hebben betrekking op de samenstelling van de producten en de vermeldingen die aangebracht moeten worden op hun etikettering.

Art. 4. § 1. Het is verboden als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen te fabriceren en in de handel te brengen:

a) paddenstoelen die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddenstoelen in bijlage bij dit besluit;

b) voedingsmiddelen, die paddenstoelen bevatten, die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddenstoelen in bijlage bij dit besluit;

c) gedroogde paddenstoelen:

– andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 en 2 in bijlage bij dit besluit, indien ze geheel zijn;

– andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit, indien ze in stukken zijn;

d) verschillende soorten paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit die gemengd zijn met elkaar of met paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit;

e) andere paddenstoelen dan verse, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat hun soort niet meer te herkennen is;

f) paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat hun soort niet meer te herkennen is, met uitzondering van truffels en morieljes;

g) paddenstoelen die insecten, insectendelen of insectenafval bevatten;

h) paddenstoelen die niet zodanig vers zijn dat ze een gevaar voor de gezondheid kunnen uitmaken.

§ 2. De Minister kan een lijst van paddenstoelen vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma's of toevoegsels mogen gebruikt worden.

Art. 5. § 1. Het is verboden voedingssupplementen in de handel te brengen samengesteld uit of bevattende één of meer planten die vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit besluit en waarbij voldaan werd aan de beperkingen en voorwaarden, indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd overeenkomstig de volgende bepalingen.

Een notificatiedossier moet in één exemplaar of via de toepassing FOODSUP op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.gezondheid.belgie.be) ingediend worden. In het notificatiedossier zijn ten minste de volgende gegevens vermeld:

1° de aard van het product;

2° de ingrediëntenlijst van het product (kwalitatief en kwantitatief);

3° de nutritionele analyse van het product en, indien van toepassing, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de aanwezigheid van bekende significante werkzame stoffen of "merkers", indien bekend, per doseereenheid en per dag, over de toxiciteit en over de stabiliteit;

4° de etikettering van het product;

5° de verbintenis geregeld en op wisselende tijdstippen ontledingen van het product uit te voeren en de resultaten ter beschikking van de Dienst te houden;

6° het bewijs van betaling van een retributie per genotificeerd product op de rekening van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten overeenkomstig artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui:

1° ne sont pas reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté ou;

2° sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté mais qui ne répondent pas aux conditions et restrictions,

si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément au § 1^{er} du présent article.

Le dossier de notification doit contenir les données du § 1^{er}, 2e alinéa ainsi que toutes les données nécessaires relatives à la nature, à la toxicité et aux quantités des substances actives les plus importantes, dans la mesure où elles sont connues et détectables.

§ 3. Dans le mois de la réception du dossier de notification visé aux paragraphes 1^{er} et 2, le Service envoie un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un numéro de notification. Ce numéro de notification doit être repris dans tout document commercial.

Dans l'accusé de réception, le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements.

§ 4. Sans préjudice de la législation sur les médicaments, le Ministre peut, en ce qui concerne les plantes dans la liste 3 de l'annexe, déterminer des teneurs minimales et maximales en substances actives et marqueurs en vue de la fabrication et du commerce de ces plantes.

Les arrêtés y relatifs sont pris sur avis de la Commission d'avis des préparations de Plantes.

§ 5. Les dispositions des paragraphes 1^{er} à 3 ne sont pas d'application:

1° aux épices mentionnées dans l'arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif aux épices et produits à base d'épices;

2° à d'autres herbes aromatisantes qui sont apparemment destinées à être utilisées pour être ajoutées aux denrées alimentaires;

3° aux préparations de plantes sous forme concentrée ou déshydratée servant à la préparation de limonades, jus de fruits et jus de légumes et dont les espèces sont mentionnées dans l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires;

4° au thé (*Camellia sinensis*), au café (espèces du genre *Coffea*) et aux tisanes en sachets.

§ 6. Le Ministre peut, après avis de la Commission visée au § 4, 2^{ème} alinéa:

1° interdire que certaines plantes ou préparations de plantes soient mélangées entre elles;

2° réserver le commerce en certaines plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée ou non, à la détention de diplômes ou attestations déterminés;

3° modifier les listes en annexe du présent arrêté;

4° en ce qui concerne les plantes dans la liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, établir des substances caractéristiques de la plante ou des catégories caractéristiques des substances de la plante.

Art. 6. § 1^{er}. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes doit comporter les mentions suivantes:

1° la dénomination: « complément alimentaire »;

2° la portion recommandée à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage;

3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour;

§ 2. Het is verboden voedingssupplementen in de handel te brengen samengesteld uit of bevattende één of meer planten die:

1° niet vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit besluit of;

2° vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit besluit maar waarbij niet voldaan werd aan de beperkingen en voorwaarden,

indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd, zoals bepaald in § 1 van dit artikel.

Het notificatiedossier moet de gegevens van § 1, 2de lid bevatten en bovendien alle nodige gegevens over de aard, de toxiciteit en de hoeveelheid van de belangrijkste werkzame stoffen, voor zover bekend en aantoonbaar.

§ 3. Binnen de maand na ontvangst van het in de paragrafen 1 en 2 bedoelde notificatiedossier stuurt de Dienst een ontvangstmelding aan de indiener ervan. De ontvangstmelding bevat een notificatienummer. Dit notificatienummer moet in alle handelsdocumenten vermeld worden.

In de ontvangstmelding kan de Dienst opmerkingen en aanbevelingen geven, onder meer voor het aanpassen van de etikettering, met name door het opleggen van de vermelding van waarschuwingen.

§ 4. Onverminderd de toepassing van de wetgeving op de geneesmiddelen, kan de Minister, met betrekking tot de planten in lijst 3 van de bijlage, voor de fabricage en het in de handel brengen van die planten minimale en maximale gehalten aan actieve stoffen en merkers vaststellen.

De desbetreffende besluiten worden genomen op advies van de Commissie van advies voor plantenbereidingen.

§ 5. De bepalingen van de paragrafen 1 tot 3 zijn niet van toepassing:

1° op de specerijen die vermeld zijn in het koninklijk besluit van 17 september 1968 betreffende specerijen en specerijproducten;

2° op andere keukenkruiden die klaarblijkelijk bestemd zijn om als toevoeging aan de voedingsmiddelen te worden toegevoegd;

3° op plantenbereidingen in geconcentreerde of gedehydrateerde vorm die dienen voor de bereiding van limonades, vruchtensappen en groentesappen en waarvan de soorten vermeld zijn in het artikel 7, § 2 van koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentesappen en bepaalde soortgelijke producten;

4° op thee (*Camellia sinensis*), op koffie (soorten van het geslacht *Coffea*) en op tisanes in zakjes.

§ 6. De Minister kan, na advies van de in § 4, 2de lid bedoelde Commissie:

1° verbieden dat bepaalde planten of plantenbereidingen met elkaar worden gemengd;

2° de handel in bepaalde planten en plantenbereidingen, al dan niet onder voorgedoseerde vorm, aan vereisten inzake het bezit van een bepaald diploma of getuigschrift voorbehouden;

3° de lijsten in bijlage bij dit besluit wijzigen;

4° met betrekking tot de planten in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit, karakteristieke plantenstoffen of karakteristieke categorieën van plantenstoffen vastleggen.

Art. 6. § 1 Onverminderd de algemene en bijzondere bepalingen inzake etikettering en reclame voor voedingsmiddelen moet de etikettering van voedingssupplementen die planten en/of plantenbereidingen bevatten de volgende vermeldingen bevatten:

1° de benaming: « voedingssupplement »;

2° de aanbevolen dagelijkse te gebruiken portie.

Er mag niet worden aanbevolen de dagelijks in te nemen portie te spreiden over verschillende dagen.

Er mag niet worden aanbevolen de waar in onderdelen te splitsen wanneer deze hiervoor niet geschikt is;

3° een waarschuwing voor de overschrijding van de aanbevolen dagelijkse in te nemen portie;

4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants;

5° une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;

6° outre la dénomination, si elle existe, de la ou des plantes dans la langue de la région, le nom scientifique;

7° le nom des substances de plantes ou le nom des catégories de substances de plantes qui sont indiquées en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, ou une indication relative à la nature de ces substances de plantes;

8° la teneur en substances ou en catégorie de substances présentes des plantes, reprises en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté par portion recommandée dans l'étiquetage à consommer chaque jour.

§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce sous forme non préemballée des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes.

§ 3. Les mentions, visés au § 1^{er}, 8° doivent être des valeurs moyennes calculées sur base de l'analyse du produit.

Art. 7. Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments alimentaires, il est interdit:

1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;

2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

Art. 8. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en application du présent arrêté sont à considérer comme déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 9. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la présence de certaines plantes dans les denrées alimentaires.

Les plantes, mentionnées ou non dans les listes de l'annexe, pour lesquelles la consommation humaine est jusqu'au 15 mai 1997 restée négligeable dans l'Union européenne, tombent sous l'application du Règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission.

Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.

Art. 11. L'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est abrogé.

Art. 12. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

4° een waarschuwing dat het product buiten bereik van jonge kinderen moet worden bewaard;

5° een vermelding dat voedingssupplementen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt;

6° naast de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, ook de wetenschappelijke naam;

7° de naam van de plantenstoffen of de naam van de categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit zijn aangegeven, of informatie betreffende aard van deze plantenstoffen;

8° het gehalte van de aanwezige plantenstoffen of van een categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van de bijlage bij dit besluit zijn aangegeven, per in de etikettering aanbevolen dagelijks te gebruiken portie.

§ 2. Het is verboden voedingssupplementen die planten en/of plantenbereidingen bevatten onder niet-voorverpakte vorm in de handel te brengen.

§ 3. De in § 1, 8° bedoelde vermeldingen moeten gemiddelden zijn op basis van de analyse van het product.

Art. 7. In de etikettering en de presentatie en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden:

1° aan het product eigenschappen ter voorkoming, ter behandeling of ter genezing van ziekten en toespelingen op dergelijke eigenschappen toe te schrijven;

2° te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

Art. 8. De voedingsmiddelen die niet aan de bepalingen van dit besluit of aan de door de Minister bij toepassing van dit besluit vastgestelde bepalingen voldoen zijn als schadelijk te beschouwen in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 9. De bepalingen van dit besluit laten de toepassing van andere reglementaire bepalingen betreffende de aanwezigheid van bepaalde planten in voedingsmiddelen onverlet.

Planten, die al dan niet in de lijsten van de bijlage vermeld zijn, en die tot 15 mei 1997 in de Europese Unie niet in significante mate voor de menselijke voeding zijn gebruikt, vallen onder de toepassing van Verordening (EU) nr. 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie.

Art. 10. Inbreuken op de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en vervolgd overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, en gestraft overeenkomstig de voornoemde wet van 24 januari 1977.

Art. 11. Het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2020, wordt opgeheven.

Art. 12. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE

De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

ANNEXE à l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samen gesteld zijn of deze bevatten

Liste 1: Plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou dans les denrées alimentaires

Lijst 1 : Gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden

ANNEXE TABLEAUX

Wetenschappelijke naam / Nom scientifique	Famille / Famille	Synonymes	Nederlandse naam / nom Néerlandais	Franse naam / nom Français	Beperkingen en afwijkingsvoorwaarden	Limites et conditions de dérogation
Abrus precatorius L.	Leguminosae		weesboontje	réglisse d'amérique		
Aconitum spp.	Ranunculaceae		monnikskap	aconit		
Actaea spicata L.	Ranunculaceae		christoffelkruid	actée en épi		
Adenium spp.	Apocynaceae					
Adonis spp.	Ranunculaceae		voorjaarsadonis	adonis du printemps		
Aethusa cynapium L.	Apiaceae		hondspeterselie	petite ciguë		
Agapanthus spp.	Amaryllidaceae		afrikaanse lelie	agapanthe		
Agrostemma githago L.	Caryophyllaceae		bolderik	nielle des blés		
Alertris farinosa L.	Nartheciaceae					
Aleurites spp.	Euphorbiaceae		o.a. houtolieboom	aleurite, e.a. bancoulter		
Aleurites moluccana (L.) Willd.	Euphorbiaceae		kemiri, kukui	graine de lumbang, kukui, kemiri	Enkel niet-geraffineerde olie is toegelaten indien door ontledingsverslagen aangetoond werd dat de olie geen phorbolesters bevat en het gehalte aan eleostearinezuur lager is dan 1%	Seule l'huile non raffinée est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que cette huile ne contient pas d'esters de phorbol et que la teneur en acide éléostéarique est inférieure à 1%.
Alkanna spp.	Boraginaceae		alkanna	orcanette		
Amaryllis spp.	Amaryllidaceae		amaryllis	amaryllis		
Ammi majus L.	Apiaceae		groot akkerscherm	grand ammi		
Anacyclus officinarum Hayne	Anacyclus		duitse bertram	pyrèthre d'Allemagne		
Anacyclus pyrethrum (L.) Link.	Anacyclus		roomse bertram	pyrèthre d'Afrique		
Anadenanthera spp.	Leguminosae					
Anagallis arvensis L.	Primulaceae		guichelheil	mouzon rouge des champs		
Anamirta cocculus (L.) Wight et Arn.	Menispermaceae		kokkelkorrelstruik	coque du levant		
Anchusa spp.	Boraginaceae		ossentong	buglosse		

Andromeda spp.	Ericaceae		lavendelhei		andromède		
Anemone spp.	Ranunculaceae		anemoon		anémone		
Galipea officinalis Hancock, Cusparia officinalis (Hancock.) Engl.		Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias	angusturaboom		angusture vraie		
Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coul.	Cactaceae	Anhalonium lewinii Henning	peyote, peyotl		peyote, peyotl		
Annona spp.	Annonaceae		o.a. zuurzakboom		e.a. corossol, cœur de bœuf		
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.	Moraceae		upas		ipo		
Aquilegia vulgaris L.	Ranunculaceae		wilde akelei		ancolie vulgaire		
Areca catechu L.	Arecaceae		areka, betelnootpalm		aréquier		
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.	Compositae	Chrysanthemum frutescens L.	struikmargriet		anthémis		
Arisaema spp.	Araceae		o.a. drakeraap		e.a. navet indien		
Aristolochia spp.	Aristolochiaceae		pijpbloem		aristolochie commune		
Arnica chamissonis Less.	Compositae		valkruid		arnica		
Arnica montana L.	Compositae		valkruid		arnica		
Artemisia annua L.	Compositae		zomeralsem		armoïse annuelle		
Arum maculatum L.	Araceae		gevekte aronskelk		arum tacheté, gouet tacheté		
Asarum canadense L.	Aristolochiaceae		Canadese mansoor		asaret du Canada		
Asarum europaeum L.	Aristolochiaceae		mansoor		asaret d'Europe		
Aspidosperma spp.	Apocynaceae						
Athyrium filix-femina (L.) Roth	Athyriaceae		wijfjesvaren		fougère femelle		
Atractylis gummiifera (L.) Less.	Compositae				chardon à glu		
Atropa spp.	Solanaceae						
Aucuba japonica Thunb.	Garryaceae		broodboom		aucuba		
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.	Compositae	Eupatorium triplinerve Vahl					
Baccharis spp.	Compositae						
Baptisia spp.	Leguminosae						
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.	Iridaceae	Belamcanda chinensis (L.) DC.	o.a. wilde indigo luipaardbloem		e.a. indigo sauvage fleur léopard		

Borago spp.	Boraginaceae		incl. bernagie	incl. bourrache	Enkel het gebruik van volgende plantendelen is toegelaten: zaad, bloem.	Seule l'utilisation des parties suivantes de la plante est autorisée: graine, fleur.
Brachyglottis spp.	Compositae					
Brayera anthelmintica Kunth	Rosaceae	Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel.	kosoboorn	kouso		
Brugmansia spp.	Solanaceae					
Brunfelsia spp.	Solanaceae					
Bryonia spp.	Cucurbitaceae		o.a. heggerank	bryone		
Buxus sempervirens L.	Buxaceae		palmboomje	buis commun		
Caladium spp.	Araceae			pédiveau		
Calea zacatechichi Schltdl	Compositae		droomkruid	l'herbe rêveuse		
Calla palustris L.	Araceae		slangewortel	calla des marais		
Caltha palustris L.	Ranunculaceae		dotterbloem	souci d'eau, populage des marais		
Canarium indicum L.	Burseraceae		nangainoten	noix de nagaille		
Cannabis sativa L.	Cannabaceae		hennep	chanvre		
Caragana arborescens Lam.	Leguminosae		erwtenstruik	arbre aux pois		
Carlina spp.	Compositae					
Caryota spp.	Arecaceae			e.a. palmier céleri		
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl.	Celastraceae		qat	khat		
Catharanthus roseus (L.) G. Don.	Apocynaceae		roze maagdenpalm	pervenche de Madagascar		
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.	Berberidaceae		blauwe zilverkaars	blue cohosh		
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson	Rubiaceae	Cephaelis acuminata Karst., Uragoga granatensis Baill.	braakwortel	racine d'ipeca, ipéca du Brésil		
		Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill., Cephaelis ipecacuanha (Brot.)				

		Tussac						
<i>Erysimum</i> × <i>cheiri</i> (L.) Crantz	Brassicaceae	<i>Cheiranthus</i> × <i>cheiri</i> L.	muurbloem		grioflée des murailles, vélard			
<i>Cestrum</i> spp.	Solanaceae							
<i>Ceterach officinarum</i> DC.	Aspleniaceae					Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid praquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de praquiloside.	
<i>Chamaelirium luteum</i> (L.) A. Gray	Melanthiaceae		helonias		fausse unicomne			
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakín & Clematis	Amaranthaceae	<i>Chenopodium</i> <i>ambrosioides</i> L.	welriekende ganzevoet		chénopode fausse- ambroise, thé-du- mexique			
<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae					Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid praquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de praquiloside.	
<i>Cicuta virosa</i> L.	Apiaceae		waterscheerling		ciguë vireuse, ciguë aquatique			
<i>Cineraria</i> spp.	Compositae				cinéraire			
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrader	Cucurbitaceae	<i>Cucumis colocynthis</i> L.	kolokwint		coloquinte officinale			
<i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Bosse	Amaryllidaceae		clivia, sint-Jozefsbloem		flor lis de saint Joseph			
<i>Clusia rosea</i> Jacq.	Clusiaceae							
<i>Cnidioscolus</i> spp.	Euphorbiaceae		herfstijloos		colchique d'automne			
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchicaceae		europese blazenstruik		baguenaudier commun, arbre à vessies			
<i>Coluta arborescens</i> L.	Leguminosae							
<i>Comandra</i> spp.	Santalaceae		gevekte scheerling		grande ciguë			
<i>Conium maculatum</i> L.	Apiaceae		liletje-van-dalen, melklokje		muguet			
<i>Convallaria majalis</i> L.	Asparagaceae							
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae		akkerwinde		liseron des champs			

<i>Convolvulus scammonia</i> L.	Convolvulaceae			purgerwinde		scammonée		
<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	Coriariaceae			looiersruik		redoul		
<i>Coriaria thymifolia</i> Humb. et Bonpl.	Coriariaceae							
<i>Corydalis</i> spp.	Papaveraceae			helmbloem, o.a. holwortel		e.a. corydale creuse		
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Papaveraceae		<i>Corydalis bulbosa</i> (L.) DC.	vingerhelmbloem		corydale solide, corydale à tubercule plein	Enkel het decoct van de wortelstok is toegelaten in voedingsmiddelen.	Seule la décoction du rhizome est autorisée dans les denrées alimentaires.
<i>Corynanthe</i> spp.	Rubiaceae			yohimbe		yohimbe		
<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	Anacardiaceae						Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid praquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de praquiloside.
<i>Cotonaster</i> spp.	Rosaceae			dwergmispel		cotonéaster		
<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae			lilie		crinum d'asie		
<i>Crotalaria</i> spp.	Leguminosae							
<i>Croton</i> spp.	Euphorbiaceae							
<i>Cryptostegia</i> spp.	Apocynaceae							
<i>Cycas</i> spp.	Cycadaceae			cycaspalm, varenpalm		cycas		
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae			handjesgras		chiendent dactyle		
<i>Cynoglossum</i> spp.	Boraginaceae			hondstong		cynoglosse		
<i>Cyrtopodium calceolus</i> L.	Orchidaceae			vrouwenschoentje		sabot de vénus		
<i>Cytisus</i> spp.	Leguminosae							
<i>Dalechampia scandens</i> Jacq.	Euphorbiaceae					liane ortie		
<i>Daphne</i> spp.	Thymelaeaceae							
<i>Datura</i> spp.	Solanaceae							
<i>Delphinium</i> spp.	Ranunculaceae			ridderspoor		staphisaigre, dauphinelle		
<i>Derris</i> spp.	Leguminosae							
<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara			<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.	gebroken hartje		cœur de marie, cœur de jeanette		
<i>Dichondra repens</i> J.R. Forst. et G. Forst.	Convolvulaceae					dichondra rampant		
<i>Dictamnus albus</i> L.	Rutaceae			vuurwerkplant, essenkruid		dicrame blanc, fraxinelle		
<i>Dieffenbachia</i> spp.	Araceae			dieffenbachia		dieffenbachia		
<i>Digitalis</i> spp.	Plantaginaceae			vingerhoedskruid		digitale		
<i>Tamus communis</i> L.	Dioscoreaceae		<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	spekwortel		tamier commun		
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.)	Leguminosae			tonkabonen boom		fève de tonka		

Willd.									
<i>Dirca palustris</i> L.	Thymelaeaceae						dirca des marais		
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Dryopteridaceae				mannejesvaren		fougère mâle		
<i>Duboisia</i> spp.	Solanaceae								
<i>Durio zibethinus</i> L.	Malvaceae				doerian		durian, durion		
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich.	Cucurbitaceae				springkomkommer		concombre d'âne, momordique		
<i>Echium</i> spp.	Boraginaceae				o.a. slangekruid		e.a. vipérine		
<i>Ephedra</i> spp.	Ephedraceae				o.a. zeedruif		ephédra		
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Ranunculaceae				winterakoniet		eranthé d'hiver, hellébore d'hiver		
<i>Erechtites</i> spp.	Compositae								
<i>Erythrina</i> spp.	Brassicaceae				erythrina		erythrine		
<i>Erythroxylum coca</i> Lam.	Leguminosae				cocastruik		coca		
<i>Euonymus atropurpureus</i> Jacq.	Celastraceae				vuurkardinaalsmuts		fusain noir pourpré		
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Celastraceae				wilde kardinaalsmuts		fusain d'Europe		
<i>Euphorbia</i> spp.	Euphorbiaceae				o.a. wolfsmelk, kerstster		e.a. euphorbe panachée, poinsettia		
<i>Tetradium ruticarpum</i> (A. Juss.) T.G.Hartley	Rutaceae				Euodia ruticarpa (A. Juss.) Benth., Evodia ruticarpa (A. Juss.) Hook.f. & Thomson (A. Juss.) Benth				
<i>Excoecaria agallocha</i> L.	Euphorbiaceae								
<i>Ficaria verna</i> Huds.	Ranunculaceae				Ficaria renunculoides Monch.		renoncule ficaire, fausse-renoncule		
<i>Forestiera</i> spp.	Oleaceae								
<i>Fritillaria imperialis</i> L.	Liliaceae				keizerskroon		fritillaire impériale, couronne impériale		
<i>Galanthus</i> spp.	Amaryllidaceae				o.a. sneeuwkllokje		e.a. perce-neige		
<i>Galega officinalis</i> L.	Leguminosae				galega		galéga, sainfoin d'Espagne	Een afwijking kan worden toegerekend indien het gehalte aan galegine en peganine bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en galégine et péganine est déterminée.
<i>Garcinia hanburyi</i> Hook. f.	Clusiaceae								
<i>Geissospermum</i> spp.	Apocynaceae								
<i>Gelsemium</i> spp.	Gelsemiaceae						jasmin jaune		
<i>Genista tinctoria</i> L.	Leguminosae				verfbrem		genêt des teinturiers		
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lamiaceae				hondsdraf		lierre terrestre		
<i>Globularia alypum</i> L.	Plantaginaceae				drietandkogelbloem		globulaire turbitt		

<i>Globularia vulgaris</i> L.	Plantaginaceae		gewone kogelbloem	globulaire commune	
<i>Gloriosa superba</i> L.	Colchicaceae		prachtelie		
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Plantaginaceae		genadekruid	gratiole	
<i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill.	Leguminosae	<i>Bandeiraea simplicifolia</i> (DC.) Benth.	griffonia	griffonia	
<i>Harungana madagascariensis</i> Lam. ex Poir.	Hypericaceae	<i>Haronga madagascariensis</i> L. (Lam. ex Poir.) Choisy	haronga boom	guttier du gabon	
<i>Heimia</i> spp.	Lythraceae				
<i>Heliotropium</i> spp.	Boraginaceae		heliotrop, zonnewende	héliotrope	
<i>Helleborus</i> spp.	Ranunculaceae		nieskruid, o.a. kerstroos	hellébore, e.a. rose de Noël	
<i>Hepatica nobilis</i> Mill.	Ranunculaceae		leverbloempje	anémone hépatique	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier et Levier	Apiaceae		reuzenberenklauw	berce de caucase	
<i>Hippomane mancinella</i> L.	Euphorbiaceae		manchineel	mancenillier	
<i>Homalomena</i> spp.	Araceae				
<i>Hura crepitans</i> L.	Euphorbiaceae		zandkokerboom	arbre au diable, sablier blanc	
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Asparagaceae		hyacint	jacinthe d'orient	
<i>Hyoscyamus</i> spp.	Solanaceae				
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae		hulst	houx	
<i>Illicium anisatum</i> L.	Schisandraceae	<i>Illicium religiosum</i> Siebold et Zucc.	japanse steranijs	anis étoilé du japon	
<i>Ipomoea</i> spp.	Convolvulaceae		pronkwinde	ipomée	
<i>Iris</i> spp.	Iridaceae		o.a. lis	iris	
<i>Jatropha curcas</i> L.	Euphorbiaceae		purgeernoot	médiciner, pourghère	
<i>Juglans nigra</i> L.	Juglandaceae		zwarte walnoot	noyer noir	
<i>Juniperus sabina</i> L.	Cupressaceae		sabijnse jeneverbes	genévrier sabine	
<i>Kalmia latifolia</i> L.	Ericaceae		lepelboom	laurier de montagne	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Leguminosae	<i>Cytisus laburnum</i> L.	gewone goudenregen	cytise faux ébénier	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Compositae		gifsla	laitue vireuse	
<i>Larrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville	Papaveraceae		creosootstruik	créosotier	
<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Parl.	Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	kuifhyacint	muscar à toupet	
<i>Leucosium vernum</i> L.	Amaryllidaceae		lenteklokje	nivéole de printemps	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Oleaceae		wilde liguster	troène commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Plantaginaceae		vlasbeksje	linaire commune	Een afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloiden
					Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.

Liriope spp.	Asparagaceae					bepaald is.	
Lithospermum spp.	Boraginaceae						
Lobelia inflata L.	Campanulaceae					e.a. grémil	
Lonchocarpus spp.	Leguminosae					lobélie enflée	
Lonicera caprifolium L.	Caprifoliaceae					chèvrefeuille des jardins	
Lupinus spp.	Cactaceae					lupin	Les plantes <i>Lupinus angustifolius</i> L. et <i>Lupinus albus</i> L. sont autorisées dans les denrées alimentaires s'il a été démontré que la graine et la farine de ces plantes ne contiennent pas plus de 200 mg/kg d'alcaloïdes totaux et ne contiennent pas d'anagyriine.
Lycoris spp.	Amaryllidaceae						
Lyonia spp.	Ericaceae						
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt	Asparagaceae					maianthème à deux feuilles	
Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae					kamala, rotlière des teinturiers	
Mandragora officinarum L.	Solanaceae					mandragore officinale	
Meconopsis spp.	Papaveraceae					schijnpapaver	
Menispermum canadense L.	Menispermaceae					Canadées Maanzaad.	
Mercurialis annua L.	Euphorbiaceae					tuinbingelkruid	
Mercurialis perennis L.	Euphorbiaceae					bosbingelkruid	
Mesembryanthemum spp.	Aizoaceae					o.a. middagbloem, ijskruid	
Mimosa spp.	Leguminosae						
Mosannonna depressa (Baill.) Chatrou	Annonaceae					yumel	
						Guatteria gaumeri Greenm.	

Mucuna pruriens (L.) DC.	Leguminosae	Dolichos pruriens L.			Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden harmaan alkaloiden, levo-dopa en lectine bevat. Een analyse van de niet proteïnogene aminozuren moet uitgevoerd worden.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes harmanes, lévo-dopa et lectine. Une analyse des acides aminés non protéinogènes doit être effectuée.
Myoporum laetum G. Forst.	Scrophulariaceae		Ngaio boom	Arbre Ngaio		
Narcissus spp.	Amaryllidaceae		witte narcis, dichtersnarcis	narcisse des poètes		
Nerium spp.	Apocynaceae		oleander	laurier-rose		
Nicotiana spp.	Solanaceae		o.a. tabak	tabac		
Nigella damascena L.	Ranunculaceae		juffertje-in-'t-groen	nigelle de damas		
Nymphaea alba L.	Nymphaeaceae		witte waterlelie	nymphéa blanc		
Nymphaea odorata Ait.	Nymphaeaceae		geurende waterlelie	nymphéa odorants		
Ochrosia spp.	Apocynaceae					
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglossaceae		addertong	ophioglosse commun, ophioglosse vulgaire, langue de serpent, ophioglosse des alpes, herbe sans couture	Een afwijking kan worden toegekend indien de analyse aantoont dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheid ptaquiloside bevat.	Une dérogation peut être accordée si l'analyse démontre que la préparation ne contient aucune quantité détectable de ptaquiloside.
Ornithogalum spp.	Asparagaceae		vogelmelk	ornithogale		
Orobanchae spp.	Orobanchaceae		bremraap	orobanche		
Oxalis spp.	Oxalidaceae		klaverzuuring	oxalide, oxalis		
Paeonia spp.	Paeoniaceae		pioen	pivoine		
Papaver somniferum L.	Papaveraceae		slaapbol, papaver, maankop	pavot officinal	Het zaad afkomstig van deze plant is toegelaten als "maanzaad" op bakkerijproducten.	La graine provenant de cette plante est autorisée en tant que "graine de pavot" sur les produits de la boulangerie
Paris quadrifolia L.	Melanthiaceae		eenbes	parisetten		
Parthenocissus quinquefolia (L.)	Vitaceae		vijfbladige wingerd	vigne vierge		
Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Peganum harmala L.	Nitariaceae		harmala	harmal		
Petasites spp.	Compositae		hoefblad	pétasite		
Petunia violacea Lindl.	Solanaceae					
Pfaffia spp.	Amaranthaceae					
Philodendron spp.	Araceae					

Physostigma venenosum Balf.	Leguminosae		calabarbonen	fèves de calabar		
Phytolacca spp.	Phytolaccaceae		karmozijnbes	phytolaque		
Pieris formosa (Wall.) D. Don	Ericaceae			Pieris andromède		
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don Murr.	Ericaceae			Andromède du Japon		
Pilocarpus spp.	Rutaceae					
Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb	Araceae		Driebladige pinellia	Pinellia	Afwijking kan toegestaan worden voor bereidingen van de gedroogde wortel.	Des dérogations peuvent être attribuées pour des préparations de la racine séchée.
Piper methysticum Forster f.	Piperaceae		kava, kawa	kava, kawa		
Piscidia piscidula (L.) Sarg.	Leguminosae	Piscidia erythrina (Loefl.) L.	piscidia	piscidie		
Podophyllum peltatum L.	Berberidaceae		Voetblad, eendevoet	podophylleec pelté		
Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Leguminosae		driebladcitrus	oranger trifolié		
Psoralea spp.	Rubiaceae					
Psychotria viridis Ruiz. et Pav.	Dennstaedtiaceae		Chacruna	Sami Ruca		
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.	Olacaceae		adelaarsvaren	fougère-aigle		
Ptychopetalum spp.	Ericaceae					
Pyrolaria pubera Michx.	Santalaceae		buffelhoot			
Quassia spp.	Simaroubaceae					
Quillaja saponaria Molina.	Quillajaceae		zeephoutboom	bois de panama, quillaia		
Ranunculus spp.	Ranunculaceae		boterbloem	renoncule		
Rauvolfia spp.	Apocynaceae					
Rhododendron spp.	Ericaceae		rododendron	rhododendron		
Rhodomyrtus spp.	Myrtaceae					
Rhus spp.	Anacardiaceae		sumak	sumac		
Rhus aromatica Aiton	Anacardiaceae		welriekende sumac	rhus aromatique	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.

<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae		sumak	sumac, sumac des corroyeurs, vinaigrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukensbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhus glabra</i> L.	Anacardiaceae		gladde sumak	sumac à bois glabre	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukensbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhynchosia</i> spp.	Leguminosae					
<i>Richardia scabra</i> L.	Rubiaceae		valse ipecacuanha	faux ipéca		
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae		wonderboom	ricin commun		
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae					
<i>Roemeria hybrida</i> L. DC.	Papaveraceae					
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Rubiaceae		meekrap	garance des teinturiers		
<i>Ruta</i> spp.	Rutaceae					
<i>Salvia divinorum</i> Epling & Játiva	Lamiaceae		centraal Amerikaanse salie	sauge des azitèques		
<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	Papaveraceae		bloedwortel	sanguinaire du canada		
<i>Sansevieria</i> spp.	Asparagaceae		vrouwentongen	sansevière		
<i>Santalum album</i> L.	Santalaceae		sandelboom	Santal blanc, sandal		
<i>Sassafras albidum</i> (Nutt.) Nees	Lauraceae		sassafras hout	bois de sassafras		
<i>Saussurea</i> spp.	Compositae					
<i>Schefflera</i> spp.	Araliaceae					
<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiaceae		peruviaanse peperboom	faux poivrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukensbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi.	Anacardiaceae		braziliaanse peperboom	baies roses, poivre rose	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukensbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltld. & Cham.) A.Gray	Melanthiaceae	<i>Sabadilla officinalis</i> (Schltld. & Cham.) Standl. Brandt. et Ratzeb.	sabadilkruid	cévadille		
<i>Scindapsus</i> spp.	Araceae					
<i>Scopolia</i> spp.	Solanaceae					
<i>Scrophularia</i> spp.	Scrophulariaceae		helmkruid	scrofulaire		

Scutellaria baicalensis Georgi	Lamiaceae		Baikalglidkruid	Scutellaire du lac Baïkal	Het gebruik van de wortel is afkomstig van deze plant is toegelaten in voedingsmiddelen.	L'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.
Scutellaria lateriflora L.	Lamiaceae				Het gebruik van de hele plant is toegelaten indien met analyse aangetoond werd dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden furano neoclerodanen bevat en door een botanisch certificaat werd aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'utilisation de la plante entière est autorisée s'il a été démontré par des rapports d'analyse que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néoclerodanes et si par certificat botanique il a été démontré que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Scutellaria spp.	Lamiaceae		blauw glidkruid	scutellaire toque		
Securigera varia (L.) Lassen	Leguminosae	Coronilla varia L.	bont kroonkruid	coronille bigarrée		
Senecio spp.	Compositae		kruiskruid	séneçon		
Sesbania spp.	Leguminosae					
Sida cordifolia L.	Malvaceae		bala	bala		
Sida rhombifolia L.	Malvaceae					
Simarouba amara Aubl.	Simaroubaceae					
Solandra grandiflora Sw.	Solanaceae			liane trompette		
Solanum americanum Mill.	Solanaceae	Solanum nigrum L.	zwarte nachtschade	morelle noire		
Solanum dulcamara L.	Solanaceae		bitterzoet	douce-amère, morelle douce-amère		
Solenostemma argel (Delile) Hayne	Apocynaceae					
Sorbus domestica L.	Rosaceae		peervormiglijsterbes	cormier, sorbier domestique		
Spartium junceum L.	Leguminosae		spanse brem	genêt d'Espagne		
Spathiphyllum spp.	Araceae					
Spigelia anthelmia L.	Loganiaceae			spigélie vermifuge		
Spigelia marilandica (L.) L.	Loganiaceae					
Sprekelia spp.	Amaryllidaceae		goudlelie	e.a. croix de saint-jacques		
Stephanotis spp.	Apocynaceae		bruidsbloem	jasmin de madagascar		
Sternbergia spp.	Amaryllidaceae					
Strophanthus spp.	Apocynaceae					
Strychnos spp.	Loganiaceae					
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake	Caprifoliaceae		sneeuwbes	symphorine		
Symphytum spp.	Boraginaceae		smeervortel	consoude		
Tabebuia spp.	Bignoniaceae					

Tabernanthe iboga Baill.	Apocynaceae	Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir) Vis.	iboga	iboga		
Tanacetum cinerariifolium (Trevir) Sch. Bip	Compositae	Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir) Vis.	dalmatisch vlooienkruid	pyréthre		
Taxus spp.	Taxaceae		taxus	if		
Tephrosia spp.	Leguminosae					
Tetradlepis articulata (Vahl) Mast.	Cupressaceae	Callitris quadrivalvis Vent. Callitris quadrivalvis Rich. & A.Rich.	sandarak, kamercipres	sandaraque, thuja de Barbarie		
Teucrium chamaedrys L.	Rutaceae		echte gamander	germandrée petit-chêne		
Teucrium polium L.	Lamiaceae			germandrée tomenteuse		
Thevetia spp.	Lamiaceae		o.a. gele oleander	e.a. laurier-rose jaune		
Thuja occidentalis L.	Apocynaceae		westerse levensboom	thuya d' occident		
Trichocereus spp.	Cactaceae					
Trichodesma incanum Bunge	Boraginaceae					
Trollius europaeus L.	Ranunculaceae		europese trollius	trolle d' europe		
Tulipa spp.	Liliaceae		tulp	tulipe		
Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulaceae					
Tussilago spp.	Compositae		klein hoeblad	tussilage		
Tylophora asthmatica Wight et Arn.	Apocynaceae			asmatica, faux-ipec		
Urginea spp.	Asparagaceae		zeeaiuin	scille maritime		
Veratrum spp.	Melanthiaceae		nieswortel	vétratre		
Viburnum prunifolium L.	Adoxaceae		amerikaanse sneeuwbal	viome à feuilles de prunier		
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Apocynaceae	Vincetoxicum officinale Moench	witte engbloem	dompte-venin		
Wikstroemia spp.	Thymelaeaceae					
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Leguminosae		japanse blauwewegen	glycine du japon		
Wisteria sinensis (Sims) Sweet.	Leguminosae		chinese blauwewegen	glycine de chine		
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br.	Apocynaceae		uzara	uzara		
Zanthoxylum acanthopodium DC.	Rutaceae				Een afwijking kan worden toegerekend indien het gehalte aan alkaloiden bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
Zanthoxylum americanum Mill.	Rutaceae				Een afwijking kan worden toegerekend indien het gehalte aan alkaloiden	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.

<i>Zanthoxylum armatum</i> DC.	Rutaceae	<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb.	geelhout	zanthoxylle	bepaald is.	Une dérogation peut être accordée si la teneur en alcaloïdes est déterminée.
<i>Zigadenus</i> spp.	Melanthiaceae		alkaligras	cannash		

Lijst 2: Champignons comestibles

Lijst 2: Eetbare paddenstoelen

Partie 1: Champignons comestibles cultivés

Deel 1: Gekweekte eetbare paddenstoelen

Nom scientifique	Famille	Synoniem	Nom néerlandais	Nom français	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Wetenschappelijke naam	Familie	Synonyme	Nederlandse naam	Franse naam		
<i>Agaricus arvensis</i> Sch.: Fr.	Agaricaceae		Anijschampignon	Agaric des jachères		
<i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Sing. var. <i>Albidus</i> (Lange) Sing.	Agaricaceae		Gekweekte champignon	Agaric bisporé, Champignon de Paris, variété blanche		
<i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Sing. var. <i>Avellanuss</i> (Lange) Sing.	Agaricaceae		Kastanjechampignon	Agaric bisporé, Champignon de (Paris, variété blonde)		
<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo	Agaricaceae		Straatchampignon	Psallioté des trottoirs		
<i>Agaricus campestris</i> L.: Fr.	Agaricaceae		Wiedchampignon	Agaric des jachères		
<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.) Peck	Agaricaceae		Slanke anijschampignon	Agaric sylvicole		
<i>Agaricus subrufescens</i> Peck	Agaricaceae	<i>Agaricus blazei</i> Murill	Amandelpaddenstoel	Agaric auguste		
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du Peuplier, Pivoulade		
<i>Boletus aereus</i> Bull. ex Fr.	Boletaceae		Bronskleurig eekhoornjesbrood	Cèpe bronzé, Tête-de-nègre		
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	Boletaceae	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	Vroeg eekhoornjesbrood	Cèpe d'été		
<i>Boletus rex-veris</i> D. Arora & Simonini	Boletaceae			Cèpe Roi du printemps		
<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.) Pers.	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		
<i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	<i>Paeclomyces hepiali</i> Q.T. Chen & R.Q. Dai <i>Ophiocordyceps</i>			Enkel het gebruik in voedingssupplementen is toegelaten.	Seule l'utilisation dans les compléments alimentaires est autorisée.

		sinensis					
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer	Physalaciaceae			Fluweelpootje		Collybie à pied velouté	
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae			Gesteelde lakzwam		Ganoderma, Bois de Cerf, Ganoderme luisant	
Ganoderma tsugae Murr.	Ganodermataceae						
Grifola frondosa (Dicks.) Gray	Meripilaceae			Eikhaas		Poule de bois, Polypore en touffes	
Grifola umbellata (Pers.) Pilat	Meripilaceae			Schermpijesekhaas			
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kummer	Strophariaceae			Dennezwavelkop		Hypholome doux	
Heridium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.	Hericiaceae			Pruikzwam		Hydne hérisson	
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae			Judasoor		Oreille de Judas	
Hypsizygus tessulatus (Bull.: Fr.) Sing.	Lyophyllaceae			Buna Shimeji		Buna Shimeji	
Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.) Kühner	Lyophyllaceae			Iepenzwam		Lyophylle de l'Orme	
Lactiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill	Fomitopsidaceae			Zwavelzwam		Polypore souffré	
Lasiosphaeria gigantea Batch Ex Pers.	Lasiosphaeriaceae						
Lentinula edodes (Berk.) Pegler	Marasmiaceae			Shiitake		Shiitake	
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae			Paarse schijnridder		Pied bleu	
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser	Agaricaceae			Blanke Parasolzwam		Lépiote pudique	
Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo	Lyophyllaceae			Hon-Shimeji		Hon-Shimeji	
Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae			Gewone morielje		Morille commune	
Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm. Smith & Singer	Strophariaceae			Kleine bundelzwam		Pholiote changeante	
Pholiota nameko (I. Iro) S. Ito & Imai	Strophariaceae			Nameko		Nameko	
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae			Trechteroesterzwam		Pleurote corne, Rolland d'abondance	
Pleurotus citrinopileatus Singer	Pleurotaceae			Goudkleurige oesterzwam		Pleurote jaune	
Pleurotus colominus	Pleurotaceae						
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae			Trechteroesterzwam		Pleurote corne, Rolland d'abondance	

Pleurotus cystidiosus O.K. Miller	Pleurotaceae					
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Kruisdistelosterzwam		Pleurote du Panicaut	
Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc.	Pleurotaceae					
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm	Pleurotaceae		Gewone oesterzwam		Pleurote en huitre	
Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Bleke oesterzwam		Pleurote pulmonaire	
Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer	Pleurotaceae					
Pleurotus salmoneostramineus Vassil	Pleurotaceae		Zalmoesterzwam		Pleurote saumon	
Pleurotus sp. Florida (Eger)	Pleurotaceae		Floridazwam		Pleurote de Floride	
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.	Polyporaceae		Schermpiesekhaas		Polypore en ombelle	
Stropharia rugosoannulata Murrill	Strophariaceae		Blauwplaatsstropharia		Strophaire à anneau rugueux	
Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer	Pluteaceae		Rijststrozwam, Tropische beurszwam		Volvaire cultivée	

Les champignons repris dans la partie 2 de la liste 2 dans la mesure où ils peuvent être cultivés et restent propres à la consommation humaine

De paddenstoelen vermeld in deel 2 van lijst 2 in de mate dat ze kunnen geteeld worden en voor menselijke consumptie geschikt blijven.

Partie 2: Champignons sauvages qui peuvent être mis dans le commerce pour autant que la réglementation pour la conservation des espèces menacées le permette

Deel 2: Wilde paddenstoelen die mogen in de handel gebracht worden in zoverre de reglementering van bedreigde soorten dat toelaat

Nom scientifique	Famille	Synoniem	Nom néerlandais	Nom français	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Wetenschappelijke naam	Familie	Synonyme	Nederlandse naam	Franse naam		
Agaricus bitorquis (Quélet) Sacc.	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalliotte des trottoirs		
Agaricus campestris L.: Fr.	Agaricaceae		Widdechampignon	Agaric champêtre		
Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du jeuplier; Pivoulade		
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.	Pyronemataceae		Grote oranje bekerzwam	Pézize orangée		
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray	Amanitaceae		Parelamaniet	Amanite rougissante; Golmotte		
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer s.l.	Physalaciaceae		Honingzwam s.l.	Armillaire couleur de miel s.l.		
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
Boletus badius non sensu Persoon	Boletaceae	Xerocomus	Kastanjeboleet	Bolet bai		

		badius (Fr.: Fr.) Gilbert				
<i>Boletus edulis</i> Bull.: Fr.	Boletaceae				Cèpe de Bordeaux	
<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Boletaceae				Bolet à pied rouge	
<i>Bovista plumbea</i> Pers.	Agaricaceae				Boviste plombée	Enkel het gebruik van het vruchtlichaam is toegelaten.
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.: Fr.) Singer	Lyophyllaceae				Tricholome de la Saint-Georges; Mousseron	Seule l'utilisation du sporophore est autorisée.
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.: Fr.	Cantharellaceae				Chanterelle orangée	
<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.: Fr.	Cantharellaceae				Chanterelle en tube	
<i>Coprinus comatus</i> (Müll.: Fr.) S.F. Gray	Agaricaceae				Coprin chevelu	
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.: Fr.) Pers.	Cantharellaceae				Trompette de la mort	
<i>Disciotis venosa</i> (Pers.: Fr.)	Morchellaceae				Pézize veinée	
<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer	Physalaciaceae				Collybie à pied velouté	
<i>Hydnum repandum</i> L.: Fr.	Hydnaceae				Pied de mouton	
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wlf.: Fr.) Maire	Hygrophoropsidaceae				Fausse girofle	
<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke	Hydnangiaceae				Laccaire améthyste	
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) Cooke	Hydnangiaceae				Laccaire laqué	
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.: Fr.) Gray	Russulaceae				Lactaire délicieux	
<i>Langemannia gigantea</i> (Batsch.: Pers.) Rostk.	Agaricaceae				Vesse-de-loup géante	
<i>Lepista inversa</i> (Scop.) Pat.	Tricholomataceae				Clitocybe inversé	
<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae				Pied bleu	
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vitt.) Wasser	Agaricaceae				Lépiote pudique	
<i>Macrolepista procera</i> (Scop.: Fr.) Singer	Agaricaceae				Coulemelle, Lépiote élevée	
<i>Marasmius oreades</i> (Balt.: Fr.) Fr.	Marasmiaceae				Marasme des Oréades; Faux mousseron	
<i>Morchella angusticeps</i> Peck	Morchellaceae				Morille	
<i>Morchella elata</i> Fr.: Fr.	Morchellaceae				Morille conique	
<i>Morchella esculenta</i> (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae				Morille commune	
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer	Pleurotaceae				Pleurote en forme d'huitre	
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Russulaceae				Russule charbonnière	

<i>Russula vesca</i> Fr.	Russulaceae			Smakelijke russula	Russule comestible	
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	Russulaceae			Ruwe russula	Russule verdoyante; Palomet	
<i>Suillus granulatus</i> (L.) O. Kuntze	Suillaceae			Melkboleet	Bolet granulé	
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch: Fr.) Singer	Suillaceae			Gele ringboleet	Bolet élégant	
<i>Suillus luteus</i> (L.: Fr.) S.F. Gray	Suillaceae			Bruine ringboleet	Bolet jaune	
<i>Tremella fuciformis</i> Berk.	Tremellaceae			Witte trilzwam	Trénelle blanche	
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken	Tricholomataceae			Matsu-take	Matsutake	
<i>Tricholoma populinum</i>	Tricholomataceae			Lange Populieridderzwam	Tricholome des peupliers	
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.: Fr.) Quélet	Tricholomataceae			Glanzende ridderzwam	Tricholome prétentieux	
<i>Tricholoma terreum</i> (Sch.: Fr.) Kummer	Tricholomataceae			Donkergrijze ridderzwam	Tricholome terreux; Petit-gris	
<i>Tuber aestivum</i> Vitt.	Tuberaceae			Zomertruffel	Truffe d'été	
<i>Tuber magnatum</i> Pico sp.	Tuberaceae			Witte truffel	Truffe blanche	
<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.	Tuberaceae			Perigordtruffel	Truffe du Périgord	
<i>Tuber indicum</i> Cooke & Massee	Tuberaceae			Chinese of Aziatische truffel	Truffe chinoise ou asiatique	
<i>Tuber uncinatum</i> Chatin	Tuberaceae			Bourgognetruffel	Truffe de Bourgogne	
<i>Wolfiporia extensa</i> (Peck) Ginns	Fomitopsidaceae		Poria cocos Wolf		Pachyme	Enkel het gebruik van het sclerotium is toegelaten.
						Seule l'utilisation du sclérote est autorisée.

Lijst 3: Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm

Lijst 3: Plantes à notifier si sous forme prédosée

Botanische naam / Nom botanique	Familie / Famille	Synoniem / Synonyme	Naam	Nom	Toegelaten plantendeel of specifieke bereiding	Parties de plante autorisée ou préparation particulière	Voorwaarden	Conditions
Abelmoschus esculentus (L.) Moench	Malvaceae		oker, okra	okra, gombo, cabo, calou	vrucht	fruit		
Abelmoschus moschatus Medik.	Malvaceae		ambrettezaad, muskuszaad	ambrette	zaad	graine		
Abies alba Mill.	Pinaceae		gewone zilverspar, grote spar, zilverspar	sapin pectiné, sapin blanc, sapin argenté	schors, tak, naald, knop, zaad, hars	écorce, rameau, aiguille, bourgeon, graine, résine		
Abies balsamea (L.) Mill.	Pinaceae		balsenspar, canadabalsem	sapin baumier	schors, naald, hars, twijg	écorce, aiguille, résine, brindille		
Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen	Pinaceae	Abies pectinata Dc. Var. Equi- Trojani Asch. & Sint. Ex Boiss	nordmann-spar, kaukasische spar, krimspar	sapin de nordmann, sapin du caucase, sapin de crimée	schors, naald	écorce, aiguille		
Abies sibirica Ledeb.	Pinaceae		siberische zilverden	sapin de sibérie	schors, tak, naald, hars	écorce, rameau, aiguille, résine		
Abroma augusta L. f	Malvaceae				wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Acacia catechu	Leguminosae			acacia à cachou,	gom	gomme		

(L.f.) Willd.				cachoutier	gom	gomme		
Acacia decurrens Willd.	Leguminosae					gomme		
Acacia nilotica (L.) Delile	Leguminosae	Acacia arabica (Lam.) Willd.	echte acacia, gom-acacia	acacia du nil	schors, vrucht, gom	écorce, fruit, gomme		
Acacia senegal (L.) Willd.	Leguminosae		arabische gom	gommier blanc, acacia sénégal	schors, gom	écorce, gomme		
Acacia seyal Delile	Leguminosae				gom	gomme		
Acanthus mollis L.	Acanthaceae		stekelige berenklaauw	acanthé molle, acanthé à feuilles larges	hele plant	plante entière		
Acer campestre L.	Sapindaceae		Spaanse aak, veldesdoorn	Érable champêtre	knop	bourgeon	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Acer negundo L.	Sapindaceae		vederesdoorn	érable negundo, érable négondo, érable à giguère, érable à feuilles de frêne, érable américain	schors	écorce	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Acer saccharinum L.	Sapindaceae		witte esdoorn of zilveresdoorn	érable argenté, érable de virginie, plaine blanche	bast, hout	liber, bois	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycines.
Achillea ageratum L.	Compositae			achillée à feuilles d'agératum, achillée visqueuse	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea atrata L.	Compositae		doelzwart duizendblad	achillée noirâtre	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea erba-rotta All.	Compositae			achillée à feuilles simples	bovengrondse delen	parties aériennes		
Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) Richardson	Compositae		duizendblad, hemsduizendblad	achillée musquée	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	Compositae	<i>Diotis candidissima</i> Desf., <i>Oreanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns & Link			bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae		gewoon duizendblad	achillée millefeuille	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Achillea nana</i> L.	Compositae		wilde bertram	achillée naine	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Compositae		wilde bertram	achillée sternutatoire	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Achyranthes bidentata</i> Blume	Amaranthaceae		dubbelgerande amarant	achyranthes bidentata blume	wortel	racine		
<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen	Compositae		parakres, kiespijnknoppenkru id, braziliaanse cresson	cresson de para, brède mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Acorus calamus</i> L.	Acoraceae		kalmoes, echte kalmoes	acore, acore odorant, acore vrai	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van beta- asarone hoger dan 115 µg en 2 µg/kg lichaamsgewicht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de bêta-asarone supérieure à 115 µg et 2 µg/kg poids corporel. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Actaea heracleifolia</i> (Kom.) J.Compton	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.	zilverkaars		wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements

								bevatten :	suivants :
Actaea racemosa L.	Ranunculaceae	Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.	zwarte amerikaanse slangenwortel	actée américaine, cimicataire	wortel, wortelstok	racine, rhizome		De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoeningen .	Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommation. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
Actinidia chinensis Planch.	Actinidiaceae		kiwi, chinoise kruisbes	kiwi, groseille de chine	vrucht, knop	fruit, bourgeon			
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson	Actinidiaceae		kiwi	kiwi	vrucht, knop	fruit, bourgeon			
Adansonia digitata L.	Malvaceae		baobab	baobab, pain de singe	vrucht	fruit			

Adiantum capillus-veneris L.	Pteridaceae		europées venushaar	capillaire, cheveux de vénus	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Adiantum pedatum L.	Adiantaceae		hoefijzervaren	adiante du canada, capillaire du canada, adiante pédalée	hele plant gekookt of gedroogd	plante entière cuite ou séchée	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Adoxa moschatellina L.	Adoxaceae		muskuskruid	petite musquée	hele plant	plante entière		
Aegopodium podagraria L.	Apiaceae		zevenblad	égopode podagraire, herbe aux goutteux, podagraire	blad	feuille		
Aesculus hippocastanum L.	Hippocastanaceae		witte paardekastanje	marronnier commun, marronnier d'inde	zaad, bladknop	graine, bourgeon de feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van aescine hoger dan 75 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'aescine supérieure à 75 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

<i>Aframomum angustifolium</i> (Sonn.) K.Schum.	Zingiberaceae	<i>Anomum angustifolium</i> Sonn.	madagascar cardamom	maniguette fine, cardamom de Madagascar	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Aframomum exscapum</i> (Sims) Hepper	Zingiberaceae				vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Agathosma betulina</i> (P.J.Bergius) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma betulina</i> (P.J.Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	bucco, boeche	buchu	blad	feuille		
<i>Agathosma crenulata</i> (L.) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma crenulata</i> (L.) Hook., <i>Barosma serratifolia</i> (Curtis) Willd.	eirolde buchu		blad	feuille		
<i>Agathosma serratifolia</i> (Curtis) Spreeth	Rutaceae				blad	feuille		
<i>Agave americana</i> L.	Asparagaceae		honderdjarige aloë	agave américain, agave d'Amérique	bloemstengel	tige florale		
<i>Agave sisalana</i> Perrine	Asparagaceae		sisal	sisal	bloemstengel, wortel	tige florale, racine		
<i>Agave tequilana</i> F.A.C. Weber	Asparagaceae		blauwe agave	agave bleu	bloemstengel, blad	tige florale, feuille		
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Rosaceae		gewone agrimonia	aigremoine eupatoire	hele plant	plante entière		
<i>Agrimonia repens</i> L.	Rosaceae	<i>Agrimonia odorata</i> Mill.	welriekende agrimonia	aigremoine odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae		akkerzenegroen	bugle petit pin, d'ive ou d'ivette	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae			ivette musquée, germandrée musquée, bugle fausse ivette	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ajuga reptans</i> L.	Lamiaceae		kruipend zenegroen	bugle rampante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae		perzische slaapboom, zijdeboom	acacia de constantinople, arbre de soie	schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav	stokroos	pas-se-rose, passero-se, rose trémière	bloem	fleur		
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Rosaceae	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	spitslobbige vrouwemantel	alchémille à lobes aigus	hele plant	plante entière		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Alismataceae		grote waterweegbree	plantain d'eau commun	wortel	racine		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> subsp. orientale (Sam.) Juz. Sam.	Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juz.	waterweegbree	plantain d'eau	wortelstok, knol	rhizome, tubercule		
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	<i>Sisymbrium alliaria</i> (L.) Scop.	look-zonder-look	alliaire, herbe à ail	hele plant	plante entière		
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium porrum</i> L.	oerprei	Poireau d'été	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium ascalonicum</i> L.	Amaryllidaceae		sjalot	échalote, échalotte	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae		ui	oignon	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

<i>Allium sativum</i> L.	Amaryllidaceae		knoflook	ail cultivé	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Amaryllidaceae		bieslook	ciboulette	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Allium ursinum</i> L.	Amaryllidaceae		daslook	ail des ours	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Betulaceae		zwarte els	aulne noir, aulne glutineux, aulne commun	schors, bladknop, blad, gom	écorce, bourgeon de feuille, feuille, gomme		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Betulaceae		grijs- of grauwe els	aulne blanc, aulne rugueux, aulne de montagne, arcoc, varne	schors, bladknop	écorce, bourgeon de feuille		

Aloe africana Mill.	Xanthorrhoeaceae									blad, gel, latex (sap)	feuille, gel, latex (jus)	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe arborescens Mill.	Xanthorrhoeaceae									blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

							bevat : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe ferox Mill.	Xanthorrhoeaceae		kaapse aloë	aloës	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloe perryi Baker	Xanthorrhoeaceae				blad, gel	feuille, gel	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe plicatilis (L.) Mill.	Xanthorrhoeaceae							anthranoiden* (uitgedrukt als barbaloin) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : - Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	anthranoides totaux* (exprimés en barbaloin) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Aloe vera (L.) Burm. f.	Xanthorrhoeaceae	Aloe barbadensis Mill.	echte aloë	aloës	blad	feuille	borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en barbaloiné) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Aloysia citriodora Palau	Verbenaceae	Lippia citriodora (Lam.) Kunth, Aloysia triphylla (L'Hér) Britton	geurig ijzerhard, citronelle	verveine odorante, verveine citronnée, citronnelle verveine	blad	feuille	borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Alpinia galanga (L.) Willd.	Zingiberaceae		grote galgant	grand galanga	wortelstok	rhizome		

<i>Alpinia hainanensis</i> K.Schum.	Zingiberaceae	<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata	kleine galgant	petit galanga	hele plant	plante entière		
<i>Alpinia officinarum</i> Hance	Zingiberaceae				wortelstok	rhizome		
<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.	Zingiberaceae				vrucht, wortelstok	fruit, rhizome		
<i>Althaea officinalis</i> L.	Malvaceae		echte heemst, witte malve, witte maluw	guimauve officinale, mauve blanche, bourbon de saint-jacques	hele plant	plante entière		
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amaranthaceae		kattenstaartamarant	amarante queue de renard, amarante caudée	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranthaceae		paarse amarant	amarante étalée, amarante couleur de sang, amarante rouge, amarante paniculée, amarante sanglante, épinard du soudan, queue de renard	zaad	graine		
<i>Ammi visnaga</i> Lam.	Apiaceae		fijn akkerscherm, khella	petit ammi, herbe aux cure-dents, khella	vrucht	fruit		
<i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen	Zingiberaceae	<i>Amomum xanthioides</i> Wall. ex Baker			zaad	graine		
<i>Amorophallus konjac</i> K. Koch	Araceae		konjac	konjac	wortel	racine		
<i>Amyris balsamifera</i> L.	Rutaceae		amyris, sandelhout west, west-indisch rozenhout	amyris baumier, amyris, bois de rose, chandelle	hout, oliebars	bois, oléorésine		
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae		ananas	ananas	vrucht	fruit		
<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees	Acanthaceae		justicie, indiase gentiaan	echinacée d'inde	blad	feuille		
<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	Asparagaceae				wortelstok	rhizome		
<i>Anethum graveolens</i> L.	Apiaceae		dille	aneth, fenouil bâtard	vrucht	fruit		

<i>Angelica archangelica</i> L.	Apiaceae					grote engelwortel	angélique vraie	hele plant	plante entière		
<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae					aziatische engelwortel, bai zhi	bai zhi	wortel	racine		
<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	Apiaceae					shishiudo, du huo	shishiudo, du huo	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Apiaceae					chinese engelwortel, dong quai	angélique chinoise, dong quai	hele plant	plante entière		
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Apiaceae					gewone engelwortel	angélique des bois	blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
<i>Angostura trifoliata</i> (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae							schors	écorce		
						<i>Cusparia officinalis</i> Engl.; <i>Cusparia trifoliata</i> (Willd.) Engl.					
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae					zuurzak, guanábana	corossolier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.
<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae					custardappel, ossenhart	cachiman, corossolier réticulé, anone cœur de bœuf, cœur de bœuf	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.
<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae					zoetzak, suikerappel, kaneelappel of schubappel	attier, pommier cannelle	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.
<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.	Combretaceae							bast, gom	liber, gomme		

Anredra baselloides (Kunth) Baill.	Basellaccae									L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijkijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiqutage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Compositae			rozenkransje	pied-de-chat, pied- de-chat dioïque	bovengrondse delen	parties aériennes					
Anthemis tinctoria L.	Compositae			gèle kamille	anthémis des teinturiers, camomille des teinturiers	hele plant	plante entière					
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Apiaceae			echte kervel	autres noms communs : camomille puante, anthémis puante, camomille des chiens, maroute, camomille maroute, marouette, anthémis cotule, anthémis bâtarde, œil-de-vache.	bloeiende toppen	sommités fleurées					
Anthyllis vulneraria L. Antirrhinum majus L.	Leguminosae Plantaginaceae			wondklaver	vulnéraire	hele plant	plante entière					
Aphanes arvensis L.	Rosaceae			grote leeuwenklaus	grand muflier, mufler à grandes fleurs, gueule-de- loup, gueule-de- lion	bovengrondse delen	parties aériennes					

Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault	Nostocaceae		klamath, AFA	algue bleu-vert du lac klamath, AFA	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden marine toxines bevat. Het gehalte aan microcystine moet onder 1 µg/g zijn.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en toxines marines. La teneur en microcystine doit être inférieure à 1 µg/g.
Apium graveolens L.	Apiaceae		selderij	céleri sauvage	hele plant	plante entière		
Arachis hypogaea L.	Leguminosae		aardnoot	arachide, cacahuète	zaad, vette olie	graine, huile grasse		
Aralia elata (Miq.) Seem.	Araliaceae		japanse engelenboom	angélique en arbre du japon	blad, wortelschors	feuille, écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Aralia racemosa L.	Araliaceae		troscalia, Amerikaanse nardus	aralia à grappes	wortelstok, wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Arbutus unedo L.	Ericaceae		aardbeiboom	arbusier commun	vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Arctium lappa L.	Compositae		amerikaanse nardus	grande bardane	hele plant	plante entière		
Arctium minus (Hill) Bernh.	Compositae	Lappa minor Hill	kleine klit	petite bardane	hele plant	plante entière		
Arctium tomentosum Mill.	Compositae		donzige klit	bardane tomenteuse, bardane poilue	hele plant	plante entière		

Argania spinosa (L.) Skeels	Sapotaceae			arganier	vrucht, pitolie	fruit, huile de noyaux	Voor de pitolie, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt t zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Pour l'huile de noyaux, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Brassicaceae			raifort, cranson	wortel	racine		
Artemisia abrotanum L.	Compositae	Artemisia procera Willd.		aurone, citronnelle, aurone mâle, abrotone, armoise citronnelle, arquebu se.	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia absinthium L.	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia capillaris Thunb.	Compositae			armoise capillaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia dracunculus L.	Compositae			estragon	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

Artemisia frigida Willd.	Compositae			westerse bijvoet	armoïse douce	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia genipi Weber ex Stechm.	Compositae			alpenbijvoet	génépi vrai, génépi noir	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia glacialis L.	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia judaica L.	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia pontica L.	Compositae			kleine alsem, pontische alsem	petite absinthe, absinthe romaine	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia umbelliformis Lam.	Compositae			kleine alpenabsint	génépi blanc	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.

<i>Artemisia vallesiaca</i> All.	Compositae				armoïse du valais	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Compositae		bijvoet		armoïse vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae		broodboom		arbre à pain	vrucht, zaad, hout	fruit, graine, bois	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
<i>Ascophyllum nodosum</i> (L.) Le Jolis	Fucaceae		knotswier		ascophylle noueuse	thallus	thallus		
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Annonaceae		pawpaw		asiminier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.
<i>Aspalathus linearis</i> (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosae		aspalathus, rooibos thé		aspalathus, rooibos thé	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Asparagus cochinchinensis</i>	Asparagaceae		chinese asperge		asperge chinoise	wortel	racine		

(Lour.) Merr.													
Asparagus officinalis L.	Asparagaceae			asperge	asperge	wortel, scheut	racine, pousse						
Asparagus racemosus Willd.	Asparagaceae			satavari, satavar, shatamull		wortelstok	rhizome						
Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech	Leguminosae	Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn.				gom	gomme						
Astracantha cretica (Lam.) Podlech	Leguminosae	Astragalus creticus Lam.				gom	gomme						
Astracantha gummifera (Labill.) Podlech	Leguminosae	Astragalus gummifer Labill.				gom	gomme						
Astracantha microcephala (Willd.) Podlech	Leguminosae	Astragalus microcephalus Willd.				gom	gomme						
Astragalus membranaceus Mönch	Leguminosae		astragalus		astragale	wortel	racine						
Astrantia major L.	Apiaceae		zeeuus knoopte, groot sterrenscherm	grande astrance, grande radiaire	bovengrondse delen	parties aériennes							
Athamanta macedonica (L.) Spreng.	Apiaceae				vriucht, blad	fruit, feuille		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.				
Arctostaphylos lanceolata (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulants.	L'étiqetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.				

<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	Compositae				wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Avena fatua</i> L.	Poaceae			oot	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Avena sativa</i> L.	Poaceae			haver, gekweekte haver	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	Compositae		<i>Baccharis genistelloides</i> var. <i>trimer</i> (Less.) Baker	carqueja	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	Plantaginaceae		<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell	kleinbladige bacopa, brahmi	hele plant	plante entière		
<i>Bacris gasipaes</i> Kunth	Arecaceae			perzikpalm	vrucht	fruit		
<i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delile	Zygophyllaceae				hele plant	plante entière		
<i>Ballota nigra</i> L.	Lamiaceae			stinkende ballote	bovengrondse delen	parties aériennes		

Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek	Lamiaceae		stinkende ballote	ballote du midi, ballote fétide	hele plant	plante entière		
Bambusa bambos (L.) Voss	Poaceae	Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.	bamboe	bambou tabashir	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	La matière première doit être traitée à la chaleur.
Bambusa vulgaris Schrad.	Poaceae		bamboe	bambou	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	La matière première doit être traitée à la chaleur.
Barbarea verna (Mill.) Asch.	Brassicaceae		vroeg barbarakruid	cresson de terre, barbarée printanière	bovengrondse delen	parties aériennes		
Barbarea vulgaris R.Br.	Brassicaceae		gewoon barbarakruid	barbarée commune, herbe de sainte-barbe	bovengrondse delen	parties aériennes		
Bellis perennis L.	Compositae		madeliefje	pâquerette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Berberis aquifolium Pursh.	Berberidaceae	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	mahonia aquifolium (pursh) nutt.	mahonia	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isochinoline d'alkaloïdes (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Berberis aristata DC.	Berberidaceae				wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isochinoline d'alkaloïdes (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.

Berberis vulgaris L.	Berberidaceae		zuurbes	epine-vinette	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae		paranoot, brazilnoten, Amazonianoten	noyer d'Amazonie, noyer du Brésil, châtaignier du Brésil	noot	noix		
Beta vulgaris L.	Amaranthaceae		gekwekte biet	betterave cultivée	hele plant	plante entière		
Betula alleghaniensis Britton	Betulaceae		gele berk	bouleau jaune	schors, blad	écorce, feuille		
Betula lenta L.	Betulaceae		suikerberk	bouleau flexible, bouleau acajou, bouleau merisier	schors, blad, sap	écorce, feuille, sève		
Betula pendula Roth	Betulaceae		ruwe berk	bouleau verruqueux, bouleau blanc	knop, schors, blad, teer, sap	bourgeon, écorce, feuille, goudron, sève		
Betula pubescens Ehrh.	Betulaceae		zachte berk, gewone berk	bouleau pubescent, bouleau des marais	knop, schors, blad, sap	bourgeon, écorce, feuille, sève		
Bixa orellana L.	Bixaceae		orleanboom	rocouyer	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine		
Blainvillea acmella (L.) Philipson	Compositae	Spilanthes acmella (L.) Murray, Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen	champagneblad, abc-kruid, parakers	brêdes mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
Borago officinalis L.	Boraginaceae		bernagie, komkommerkruid	bourrache, bourrache officinale	bloem, zaad	fleur, graine	Het gehalte aan toxische pyrrrolizidine alkaloiden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
Boronia megastigma Nees ex Bartlett	Rutaceae		boronia	boronia	bovengrondse delen	parties aériennes		

Boswellia sacra Flueck.	Burseraceae		wierookboom	arbre à encens	gomhars	gomme-résine		
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	Burseraceae		wierookboom	encens	olichars	olcorésine		
Brassica cretica Lam.	Brassicaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Brassica napus L.	Brassicaceae	Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.	koolzaad	colza, navette	wortel, zaad	racine, graine		
Brassica nigra (L.) K.Koch	Brassicaceae		zwarte mosterd	moutarde noire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Brassica oleracea L.	Brassicaceae		incl. tuinkool	incl. chou potager	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikertering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Brassica rapa L.	Brassicaceae	Sinapis juncea L.	raapzaad	navette d'été	hele plant	plante entière		

Buglossiodes arvensis	Boraginaceae					huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediën t zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Bupleurum chinense DC.	Apiaceae	sikkelgoudscherm	buplèvre chinoise	wortel	racine		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling)	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le antidiabète
Bupleurum rotundifolium L.	Apiaceae	doorwas	buplèvre à feuilles rondes	bovengrondse delen	parties aériennes		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants ou de traitement contre le diabète.
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch.	Burseraceae			vrucht, schors	fruit, écorce		Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden podophyllotoxine en analogen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en podophyllotoxine et analogues.
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.	Leguminosae	grijze knikkernoot	canique grise, z'yeux à chatte	schors, zaad	écorce, graine			

<i>Cakile maritima</i> Scop.	Brassicaceae			zerraket	roquette de mer, cakilier maritime, rétine de souris	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Calendula arvensis</i> (Vaill.) L.	Compositae			akkergoudsbloem	souci des champs, souci sauvage	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij leverproblemen.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas de problèmes de foie.
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae			tuingoudsbloem	souci officinal	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij leverproblemen.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas de problèmes de foie.
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Ericaceae			struikhei	callune, bruyère commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Brassicaceae			huttentut, dederzaad, vlasdodder, vlasdotter	cameline, lin bâlard	zaad	graine		
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Theaceae			theestruik	théier	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 600 mg looistoffen (uitgedrukt als epigallocatechine-3-gallaat). Enkel het gebruik van volgende extractievlciostoff en zijn toegelaten: water, alcohol met een maximumgehalte van 25 %.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de tanins (exprimé en épigallocatechine-3-gallate) supérieure à 600 mg. Seule l'utilisation des solvants d'extraction suivants est acceptée: eau, alcool avec une teneur maximale de 25%.

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson	Annonaceae		ylang-ylang	ylang-ylang, canang odorant	bloem	fleur	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 3 mg safrol.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de safrole supérieure à 3 mg.
Canarium acutifolium (DC.) Merr.	Burseraceae				noot	noix		
Capparis spinosa L.	Capparaceae		kappertjes	câprier commun, câprier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes		
Capsella bursa- pastoris (L.) Medlk.	Brassicaceae		gewoon herderstasje	bourse-à-pasteur commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
Capsicum annuum L.	Solanaceae	Capsicum frutescens L.	spanse peper, chilipepers, paprika, groene peper, rode peper	piment annuel, piment des jardins, piment rouge, poivre de guinée	vrucht	fruit		
Carex arenaria L.	Cyperaceae		zandzegge	laïche des sables	blad, wortelstok	feuille, rhizome		
Carica papaya L.	Caricaceae		papaja, meloenboom	papayer	vrucht	fruit		
Carissa carandas L.	Apocynaceae		kristusdoorn	karonda	vrucht, blad	fruit, feuille		
Carina acaulis L.	Compositae		zilverdistel	carline acaule	wortel	racine		
Carina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens	Compositae		hoge zilverdistel	carline argentée	wortel	racine		
Carpinus betulus L.	Betulaceae		haagbeuk	charme	knop, blad	bourgcon, feuille		
Carthamus lanatus L.	Compositae			carthame laineux	olie van het zaad, bloem	huile de la graine, fleur		
Carthamus tinctorius L.	Compositae		saffloer	carthame des teinturiers	bloem, zaad	fleur, graine		
Carum carvi L.	Apiaceae		echte karwij	carvi, cumin de prés	vrucht	fruit		
Cassia fistula L.	Leguminosae		indische goudenregen	canéficier, cassier	vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B)	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B)

Castanea sativa Mill.	Fagaceae			tamme kastanje	châtaigner, châtaignier commun	schors, bladknop, blad, zaad	écorce, bourgeon de feuille, feuille, graine	hoger dan 18 mg. De analyseresul- taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen; Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	supérieure à 18 mg. Les résul- tats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Catalpa bignonioides Walter	Bignoniaceae			groene trompetboom	catalpa bignonioides, arbre aux haricots, catalpa boule, catalpa commun thé du new jersey	blad	feuille		
Ceanothus americanus L.	Rhamnaceae			amerikaanse sering		blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden peptide alkaloiden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes peptidiques.

<i>Cecropia peltata</i> L.	Urticaceae			bois trompette, coulequin	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	Pinaceae		libanonceder, libanese ceder	cèdre du liban	kegelvrucht, blad, hout	cône, feuille, bois		
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae		kapokboom	kapokier, bois coton, fromager	bast, blad, olie van het zaad	liber, feuille, huile de la graine		
<i>Centaurea behen</i> L.	Compositae				bloem	fleur		
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Compositae		kalketrip	centaurée chausse- trape, centaurée étoilée, chardon étoilé	bloem	fleur		
<i>Centaurea centaurium</i> L.	Compositae		centaurie, groot duizendguldenkruid	grande centaurée	bloem	fleur		
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Compositae		korenbloem	bleuet des champs, centaurée bleuet	bloem	fleur		
<i>Centaurea jacea</i> L.	Compositae		knoopkruid	centaurée jaccée, tête de moineau, ambrette	bloem	fleur		
<i>Centaurea montana</i> L.	Compositae		bergcentaurie	centaurée des montagnes	bloem	fleur		
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Gentianaceae	<i>Erythraea centaurium</i> (L.) Pers.	echt duizendguldenkruid	erythraée petite centaurée	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Apiaceae	<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.	gotu kola	hydrocotyle d'asie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC	Caprifoliaceae		rode spoorbloem, rode valerian	valériane rouge, centranthe rouge	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden valepotriaten bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en valépotriates.
<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.	Rosaceae		weichselboom	bois de sainte-lucie, cerisier de sainte- lucie, faux merisier	zaad	graine		

<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae		johannesbroodboom	caroubier	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae		judasboom	arbre de judée, gainier	vrucht, gomme van het zaad	fruit, gomme de la graine		
<i>Cetraria islandica</i> (L.)	Parmeliaceae		ijslands mos	lichen d'Islande	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Chaenomeles speciosa</i> Nakai	Rosaceae		chinese sierkwee	cognassier de chine	vrucht	fruit		
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Compositae	<i>Anthemis nobilis</i> L.	roomse kamille	camomille romaine	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Chamaecrista nomame</i> (Siebert) H. Ohashi	Leguminosae	<i>Cassia nomame</i> (Siebert) Honda			vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille		
<i>Chelone glabra</i> L.	Plantaginaceae		schildpadbloem	tête de tortue	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Amaranthaceae		quinoa	quinoa	gewassen zaden	graines lavées		
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Amaranthaceae		stinkende ganzenvoet	vulvaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Nutt.	Ericaceae	<i>Chimaphila cymosa</i> J. Presl & C. Presl	pipissesewa	chimaphile à ombelles, pirole en ombelle	hele plant	plante entière		
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae			bejuco de berac	wortel	racine		
<i>Chionanthus virginicus</i> L.	Oleaceae		sneeuwvlokkenboom	arbres à neige	wortelschors	écorce de racine		

<i>Chlorella vulgaris</i> Beijerinck	Chlorellaceae	Chlorella pyrenoidosa H. Chick, Chlorella communis Artari	chlorella	chlorella	éucellige alg	algue unicellulaire		
<i>Chondrus crispus</i> Stackhouse	Gigartinales		iers moswier	varech, mousse d'Irlande	thallus	thallus		
<i>Chrysanthellum</i> americanum (L.) Vatte	Compositae			chrysanthellum	bloeiende toppen	sommités fleuries		
<i>Chrysanthellum</i> indicum subsp. afroamericanum B.L. Turner	Asteraceae		gele kamille	camomille d'or	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Chrysophyllum</i> cainito L.	Sapotaceae		cainito, sterappel	caimitier, caïnite	vrucht	fruit		
<i>Chrysopogon</i> zizanioides (L.) Roberty	Poaceae		vétiver	vétiver	wortel	racine		
<i>Cichorium endivia</i> L.	Compositae		andijvie	chicorée endive	blad	feuille		
<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae		wilde cichorei	chicorée sauvage	hele plant	plante entière		
<i>Cinchona calisaya</i> Wedd.	Rubiaceae	<i>Cinchona</i> ledgeriana (Howard) Bern.Moens ex Trimen	kinaboorn, quinaboorn	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors	écorce	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Cinchona lancifolia Mutis	Rubiaceae							schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona micrantha Ruiz & Pav.	Rubiaceae							schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona nitida Ruiz & Pav.	Rubiaceae							schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

<i>Cinchona officinalis</i> L.	Rubiaceae			kinaboorn, quinaboorn	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinchona pitayensis</i> (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae					schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinchona pubescens</i> Vahl	Rubiaceae			rode kinaboorn, rode kinine	quinquina rouge	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	Lauraceae			kamferboom	camphrier, laurier du japon	hele plant	plante entière		

<i>Cinnamomum cassia</i> (Nees & T.Nees) J.Presl	Lauraceae	<i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees	chinese kaneel	cannelier de chine	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl.	Lauraceae	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume, C. zeylanicum Nees	chinese kaneel, kaneelboom	cannelle de chine, cannelier	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Cistanche salsa</i> (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchaceae				stengel	tige		
<i>Cistus creticus</i> L.	Cistaceae	<i>Cistus ladaniferus</i> Stokes	rotsroos	ciste de crête	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
<i>Cistus × incanus</i> L.	Cistaceae		cistusroos	ciste à gomme	hele plant	plante entière		
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae		rotsroos	ciste de Montpellier	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae		watermeloen	pastèque	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae		limoen	lime, limettier	vrucht	fruit		
<i>Citrus aurantium</i> L.	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> L., ssp. amara Engl., <i>Citrus aurantium</i> L., ssp. sinensis L., <i>Citrus aurantium</i> L., ssp. <i>aurantium</i> L., <i>Citrus aurantium</i> var. <i>dulcis</i>	bittere oranje appelboom curaçao oranjeappel	orange amère, bigaradier orange de curaçao	bloem, vrucht, pericarp	fleur, fruit, péricarpe	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van para-synephrine hoger dan 20 mg. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden meta-synephrine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	Pour les compléments alimentaires avec des préparations du fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de para-synéphrine supérieure à 20 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en méta-synéphrine. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de

									grosesse ou d'allaitement. Ne pas utiliser en cas de traitement anti-hypertenseur. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans. Cesser l'utilisation du produit en cas d'agitation ou de nervosité.
Citrus x limon (L.) Osbeck	Rutaceae		Citrus limon (L.) Burm. f.	citroenboom, limoen	citron, citronnier	bovengrondse delen	parties aériennes	gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken door personen die behandeld worden voor hypertensie. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij tekenen van onrust of nervositeit, de innname van het product stoppen.	
Citrus maxima (Burm.) Merr.	Rutaceae		Citrus grandis (L.) Osbeck, Citrus decumana L.	pompelmoesboom	pamplemoussier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Citrus medica L.	Rutaceae			sucade-citroen, cedraat, citroenboom	cédratier	vrucht, zaad	fruit, graine		
Citrus myrtifolia Raf.	Rutaceae		Citrus aurantium var. myrtifolia Ker Gawl.	chinotto	chinois	vrucht, pericarp	fruit, péricarpe		
Citrus nobilis Lour.	Rutaceae					vrucht	fruit		
Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae			grapefruit	grapefruit	bovengrondse delen	parties aériennes		
Citrus reticulata Blanco	Rutaceae			mandarijn, tanquerine, satsuma, clementine	mandarinier, clémentine	bovengrondse delen	parties aériennes		
Citrus sinensis (L.) Osbeck	Rutaceae			sinaasappel	oranger	bloem, blad, vrucht	fleur, feuille, fruit		

Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Cladoniaceae		echt rendiermos	lichen des rennes, lichen des caribous	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Clematis armandii Franch.	Ranunculaceae		bosrank	clématite d'armand	gedroogde stengel	tige séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clematis chinensis Osbeck	Ranunculaceae		chinese clematis		gedroogde wortel	racine séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts	Lamiaceae	Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball			blad	feuille		

<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Lamiaceae	<i>Calamintha vulgaris</i> (L.) Druce	borstelkrans	clinopode, clinopode commun, sariette vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Clitoria ternatea</i> L.	Leguminosae		kitrelbloem	pois bleu	bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique.
<i>Cnicus benedictus</i> L.	Compositae		gezegende distel	chardon-bénit	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Brassicaceae		echt lepelblad	cochléaire officinale, cranson	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae		kokospalm	cocotier	zaad, vette olie	graine, huile grasse		
<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.	Campanulaceae		codonopsis	codonopsis	wortel	racine		
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae		koffie (boom)	caféier	zaad	graine		
<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner	Rubiaceae	<i>Coffea robusta</i> Lind. ex De Wild	robusta koffieplant	caféier robusta	zaad	graine		
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Poaceae		jobstranen	larmes de job	zaad	graine		
<i>Coix lacryma-jobi</i> var. <i>ma-yuen</i> (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae	<i>Coix ma-yuen</i> Rom. Caill.	jobstranen	larmes de job	zaad, olie van het zaad	graine, huile de la graine		
<i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine		
<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine		
<i>Coleus forskohlii</i> (Poir.) Briq.	Lamiaceae				bovengrondse delen, wortel	parties aériennes, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Combretum micranthum G.Don	combretaceae		kinkeliba		kinkéliba	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Combretum sundaicum Miq.	Combretaceae					blad, bladsteel	feuille, pédoncule		
Commiphora africana (A.Rich.) Endl.	Burseraceae		afrikaanse mirre		myrrhe africaine	gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora habessinica (O.Berg) Engl.	Burseraceae					gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora mukul Engl.	Burseraceae		guggul		myrrhe des indes	olie-gomhars	Oleo-gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora myrrha (Nees) Engl.	Burseraceae	Commiphora molmol (Engl.) Engl. ex Tschirch	mirre		myrrhe	olie-gomhars	oleo gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Commiphora schimperi (O.Bergman) Engl.	Bursaceae							gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Conyza canadensis (L.) Cronquist	Compositae	Erigeron canadensis L.	canadese fijnstraal	vergerette du canada, conyze du canada	hele plant	plante entière					
Copaifera langsdorffii Desf.	Leguminosae				oliehars van de schors	oléorésine de l'écorce					
Coptis japonica (Thunb.) Makino	Ranunculaceae				wortelstok	rhizome				De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.
Coptis teeta Wall.	Ranunculaceae				wortelstok	rhizome				De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.
Coptis trifolia (L.) Salisb.	Ranunculaceae			coptide trifoliée	wortelstok	rhizome				De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.

Corallina officinalis L.	Corallinaceae				thallus	thallus		
Cordia myxa L.	Boraginaceae	sebestenboom			vrucht	fruit	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloiden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
Coriandrum sativum L.	Apiaceae	koriander		coriandre	bovengrondse delen, olie van het zaad	parties aériennes, huile de graine	Voor de olie van het zaad, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Pour l'huile de graine, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Cornus florida L.	Cornaceae	grootbloemige Amerikaanse kornoelje		cornouiller à fleurs d'amérique, bois-de-chien	vrucht, schors	fruit, écorce		
Cornus mas L.	Cornaceae	gele kornoelje		cornouiller mâle	vrucht	fruit		
Cornus officinalis Siebold & Zucc.	Cornaceae	japanse kornoelje		cornouiller officinal	vrucht	fruit		
Cornus sanguinea L.	Cornaceae	rode kornoelje		cornouiller sanguin, sanguin	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
Corrigiola telephiifolia Pourr.	Molluginaceae			corrigiole à feuilles de téléphium	wortel	racine		
Corylus avellana L.	Betulaceae	hazelaar		noisetier, coudrier	bladknop, blad, vrucht, zaad	bourgeon de feuille, feuille, fruit, graine		
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Myrtaceae	citroen eucalyptus		eucalyptus citronné	blad	feuille		

<i>Coscinium fenestratum</i> (Goetgh.) Colebr.	Menispermaceae					wortel, stengel	racine, tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isochinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Crambe maritima</i> L.	Brassicaceae	zeekool	chou marin, crambé maritime	hele plant	plante entière				
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Rosaceae	azaroldoorn	azarolier, azérolier	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie			De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van procyanidines oligomere hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoïdes supérieure à 2,6 mg.
<i>Crataegus curvisepala</i> Lindm.	Rosaceae	koraalmeidoorn	aubépine à feuilles en éventail	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie			De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van procyanidines oligomere hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoïdes supérieure à 2,6 mg.

<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i> auct.	twestijlige meidoorn	aubépine à deux styles	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoïdes supérieure à 2,6 mg.
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae		eensijlige meidoorn	aubépine à un style	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoïdes supérieure à 2,6 mg.
<i>Crataegus pentagyna</i> Waldst. & Kit.	Rosaceae				vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoïdes supérieure à 2,6 mg.
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Apiaceae		zeevenkel	fenouil marin, perce-pierre	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Crocus sativus L.	Iridaceae		saffraankrokus	safran	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressie behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression.
Crossostephium chinense (A.Gray ex L.) Makino	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Cruciata laevipes Opiz	Rubiaceae	Galium cruciata (L.) Scop.	kruisbladwalstro	gallet croisette	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cryptocarya agathophylla van der Werff	Lauraceae	Ravensara aromatica Sonn.; Agathophyllum aromaticum (Sonn.) Willd	ravensara	ravensara aromatique, ravensara aromatica	vrucht	fruit		
Cucumis melo L.	Cucurbitaceae		meloen	melon	vrucht, zaad	fruit, graine		
Cucumis sativus L.	Cucurbitaceae		concommer	concombre	vrucht	fruit		
Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitaceae		reuzenpompoen	potiron	vrucht	fruit		
Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae		courgette, pompoen, sierpompoen	courge, pépon, citrouille	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Cuminum cyminum L.	Apiaceae		komijn	cumin officinal	vrucht	fruit		
Cupressus sempervirens L.	Cupressaceae		italiaanse cipres	cypres provençal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		

Curcuma longa L.	Zingiberaceae	Curcuma domestica Val., Curcuma domestica Loir., Amomum curcuma Jacq	kurkuma	curcuma, rhizome de curcuma, safran des indes	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae		curcuma	curcuma	wortelstok	rhizome		
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		javanse curcuma, zedoarwortelstok	safran de java, zedoaire	wortelstok	rhizome		
Cuscuta chinensis Lam.	Convolvulaceae		duivelsnaigaren	cuscuta de chine	zaad	graine		
Cuscuta epithymum Murray	Convolvulaceae		klein warkruid	cuscuta du thym, cuscuta à petites fleurs, petite cuscuta	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.	Leguminosae		guarplant	plante à guar	zaad, gom	graine, gomme		
Cyathula officinalis K.C. Kuan	Amaranthaceae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'etiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Cyclanthera pedata (L.) Schrad.	Cucurbitaceae		caigua, mexicaanse augurk	caigua, cyclanthere à feuilles digitées	vrucht, blad	fruit, feuille		
Cydonia oblonga Mill.	Rosaceae	Cydonia vulgaris Pers.	kwee	cognassier	vrucht	fruit		
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	Poaceae		citroengras	citronelle, lemongrass de l'amerique centrale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W. Watson	Poaceae	Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Stapf			bovengrondse delen	parties aériennes		
Cymbopogon javanicus subsp. olivieri (Boiss.) Soenarko	Poaceae	Cymbopogon laniger (Desf.) Duthie			bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Cymbopogon martini</i> (Roxb.) Will. Watson	Poaceae		palmarossa	palmarosa	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	Poaceae		citronella	verveine des indes, citronnelle des indes	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	Poaceae	<i>Andropogon schoenanthus</i> L.	kamelgras		bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cymbopogon winterianus</i> Jowitt ex Bor	Poaceae		java citronella	citronelle de java	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Compositae		kardoen	cardon	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
<i>Cynara scolymus</i> L.	Compositae		artisjok	artichaut	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae		notengras	souchet rond	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L.	Cytinaceae		gele hypocist		bloem, sap	fleur, jus		
<i>Demonorops draco</i> (Willd.) Blume	Arecaceae	<i>Demonorops propinqua</i> Becc.; <i>Calamus draco</i> Willd.			vrucht, hars	fruit, résine		
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	Compositae	<i>Dahlia variabilis</i> (Willd.) Desf.		dahlia commun	wortel	racine		
<i>Daucus carota</i> L.	Apiaceae		peen	carotte	wortel, zaad	racine, graine		
<i>Dendranthema grandiflorum</i> (Ramat.) Kitam.	Compositae		tuinchrysant	chrysanthème, Chrysanthème d'automne, Chrysanthème horticole	bloem, blad	fleur, feuille		
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae		sofiekruid	l'herbe de sainte sophie	blad, zaad	feuille, graine	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.

Desmodium adscendens DC.			Desmodium	Desmodium	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden dimethyltryptamin e derivaten en alkaloïden van het type beta- carboline (type harmaline) bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de dérivés de la diméthyltryptamin e ni d'alkaloïdes de type bêta- carboline (type harmane)
Dianthus caryophyllus L.	Caryophyllaceae		tuinanj		bloem	fleur		
Dimocarpus longan Lour.	Sapindaceae	Euphoria longan (Lour.) Steud.	longan		zaadmantel, bloem, vrucht	arille, fleur, fruit		
Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae				wortelknol	tubercule	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palib.) C. Pei & C. T. Ting	Dioscoreaceae				wortelstok	rhizome		
Dioscorea composita Hemsl.	Dioscoreaceae				wortelknol	tubercule		
Dioscorea oppositifolia L.	Dioscoreaceae	Dioscorea opposita Thunb.	yam		wortel, wortelstok	racine, rhizome		
Dioscorea polystachya Turcz.	Dioscoreaceae	Dioscorea bataras Decne	yamswortel, chinese igname		wortelstok	rhizome		
Dioscorea villosa L.	Dioscoreaceae		wilde yam		wortelknol	tubercule		
Diospyros kaki Thunb.	Ebenaceae		kaki		vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Diospyros virginiana L.	Ebenaceae		amerikaanse persimoen		vrucht, olie van het zaad	fruit, huile de graine		

<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC	Brassicaceae		grote zandkool, wilde rucola	diploxaxis à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aërtennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Caprifoliaceae		grote kaardebol, wilde kaardebol	cabaret des oiseaux, cardère à foulon, bonnetier sauvage, chardon à bonnetier	wortel	racine		
<i>Dipsacus inermis</i> Wall.	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus asper</i> Wallich., <i>Dipsacus asperoides</i> C. Y. Cheng et T. M. Ai	sechuan kaardebol, xu duan	xu duan	wortel	racine		
<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	Caprifoliaceae		japanse kaardebol	<i>dipsacus japonicus</i> Miq.	wortel	racine		
<i>Dorstenia contrajerva</i> L.	Moraceae				wortel	racine		
<i>Dracoccephalum moldavica</i> L.	Lamiaceae			thé des jardins, tête de dragon, mélisse de moldavie	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae			écorce de winter, foye, canelo	bast	liber		
<i>Drosera anglica</i> Huds.	Droseraceae	<i>Drosera longifolia</i> L.	lange zonnedauw	rossolis d'angleterre, rossalis à feuilles longues	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Droseraceae		kleine zonnedauw	<i>Drosera</i> intermédiaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.

<i>Drosera peltata</i> Thunb.	Droseraceae				bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphthoquinones.
<i>Drosera rotundifolia</i> Burch ex DC	Droseraceae				hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphthoquinones.
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Droseraceae		ronde zonnedauw	droséra, rossolis à feuilles rondes	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphthoquinones.
<i>Dunaliella salina</i> (Dunal) Teodoresco	Dunaliellaceae	<i>Haematococcus salinus</i> Dunal						
<i>Durvillea antarctica</i> (Chamisso) Hariot	Durvillaeaceae	<i>Fucus antarcticus</i> Chamisso			thallus	thallus		
<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin & Clematis	Amaranthaceae	<i>Chenopodium botrys</i> L.	druifkruid		bloeiwijzen	inflorescences	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Echinacea		kogelbloem, rode zonnebloem	échinacée à feuilles étroites	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2,4 g gedroogde wortel.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2,4 g de racine séchée.

<i>Echinacea pallida</i> (Nutt.) Nutt.	Compositae		bleekbladige zonnehoed	echinacée pâle	hele plant	plante entière	Voor voedingssuppleme nten met bereidingen van de wortel of wortelstok : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 720 mg gedroogde wortel.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou rhizome : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 720 mg de racine séchée.
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Compositae		purperen rudbeckia, rode zonnehoed	echinacée pourpre	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2 g gedroogde kruid.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2 g d'herbe séchée.
<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae		slangenkruid	vipérine faux- plantain	olie van het zaad	huile de la graine	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn. Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt t zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg. Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Eisenia bicyclis</i> (Kjellman) Setchell	Lessoniaceae		aramé	thallus	thallus	thallus		
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae		oliepalm	palmier à huile d'Afrique	olie van de pit	huile de noyaux		

<i>Eleteria cardamomum</i> (L.) Maton.	Zingiberaceae		echte kardemom, kardoem	cardamome	zaad	graine		
<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim	Araliaceae	<i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms.	Siberische ginseng	eleuthérocoque	wortel	racine		
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Poaceae	<i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv.	kweek, graswortel chiendent des sables	chiendent commun, chiendent rampant	wortelstok	rhizome		
<i>Embelia ribes</i> Burm.f.	Primulaceae				wortel, blad, vrucht	racine, feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Onagraceae		gewoon wilgentroosje	epilobe en épi, epilobe à feuilles étroites	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Onagraceae		viltige bastwezerik, kleinbloemig wilgentroosje	epilobe à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae		heermoes	prêle des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Equisetum fluviale</i> L.	Equisetaceae		holpijp	prêle des eaux	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae		schaafstro	prêle d'hiver	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equisetaceae		reuzenpaardenstaart	grande prêle, grande queue-de-cheval	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae		rode dophei	bruyère cendrée	bloeiwijze	inflorescences		
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae		gewone dophei	bruyère quaternée, bruyère à quatre angles, caminet	bloem	fleur		
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae		japanse mispel, loquat	néflier du japon, bibassier	blad, zaad	feuille, graine		
<i>Erodietyon californicum</i> (Hook. et Arn.) Torr.	Boraginaceae		heilig kruid, yerba sancta	herbe sainte	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Erodium cicutarium</i> L. 'Hérit.	Geraniaceae		gewone reigersbek	bec-de-cigogne commun, erodium à feuilles de ciguë	hele plant	plante entière		

<i>Eruca vesicaria</i> L. Cav.	Brassicaceae	<i>Eruca sativa</i> Mill.	Rucola, raketsla	roquette	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de goitrine supérieure à 5 mg.
<i>Eryngium campestre</i> L.	Apiaceae		echte kruisdistel	pancraut champêtre, chardon roulant	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	Papaveraceae		slaapmutsje	eschscholtzia de californie, pavot jaune de californie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Eucalyptus dives</i> Schauer	Myrtaceae		pepermunt eucalyptus	eucalyptus mentholé	blad, twiig	feuille, brindille		
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae		eucalyptusboom, koortsboom	eucalyptus, arbre à fièvre, gommier bleu	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Eucalyptus odorata</i> Behr	Myrtaceae				blad	feuille		
<i>Eucalyptus radiata</i> Sieber ex DC.	Myrtaceae			eucalyptus radié	blad	feuille		
<i>Eucalyptus smithii</i> R.T.Baker	Myrtaceae				schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Eucheuma horridum</i> J. Agardh	Solieriaceae				thallus	thallus		
<i>Eucheuma spinosum</i> J. Agardh.	Solieriaceae				thallus	thallus		
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Eucommiaceae		gutta-percha boom, chinese rubberboom	arbre à gutta- percha	schors	écorce		
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae		surinaamse kers	ceriser de cayenne	schors, bloem, vrucht, blad	écorce, fleur, fruit, feuille		
<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Orobanchaceae	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	beklierde ogentroost	euphrase glanduleuse	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	Orobanchaceae		stijve ogentroost, ogentroost	euphrase raide, euphrase glanduleuse, casse- lunettes	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Arecaceae		açaï	açaï	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	Parmeliaceae		elkmos, gewoon geweimos	evernia, lichen de chêne, mousse de chêne	thallus	thallus		

Exostema caribaeum (Jacq.) Schult.	Rubiaceae							schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Fabiana imbricata Ruiz & Pav	Solanaceae							hele plant	plante entière		
Fagopyrum esculentum Moench	Polygonaceae	Polygonum fagopyrum L.	gewone boekweit	sarrasin commun, blé noir	bovengrondse delen	parties aériennes					
Fagus sylvatica L.	Fagaceae		gewone beuk	hêtre commun	schors, knop, vrucht	ecorce, bourgeon, fruit					
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Dec.	Polygonaceae	Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.	japanse duizendknoop	renouée du japon, reynoutria du japon	hele plant	plante entière					
Ferula assa-foetida L.	Apiaceae		duivelsdrek	ase fétide	wortel, gomhars	racine, gomme- résine					
Ficus benghalensis L.	Moraceae		banyan	figuier des banians, banian de l'inde	schors, vrucht	écorce, fruit				De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Ficus carica L.	Moraceae		vijg	figuier comestible	hele plant	plante entière					

<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae				figuier des pagodes, arbre de la bodhi, pipal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim	Rosaceae		<i>Spiraea ulmaria</i> L.	moerasspirea, geitenbaard	reine-des-prés, ulmaire, barbe de bouc	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	Rosaceae			knolspirea	spirée filipendule	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Foeniculum vulgare Mill.	Apiaceae		venkel	fenouil	bovengrondse delen	parties aëriennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl	Oleaceae		forsythia	forsythia	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier	Rosaceae		aardbei	fraiser	hele plant	plante entière		
Fragaria vesca L.	Rosaceae		bosaardbei	fraisier sauvage, fraisier des bois	vrucht, blad	fruit, feuille		
Fragaria viridis Weston	Rosaceae		heuvelaardbei	fraisier des collines, fraisier vert	hele plant	plante entière		
Frangula alnus Mill.	Rhamnaceae	Frangula dodonei Ard., Rhamnus frangula L.	sporkehout, vuilboom	bourdaïne, frangule	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucosfranguline A) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en glucosfranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de

Frangula purshiana Cooper	Rhamnaceae	Rhamnus purshiana DC.	cascara	cascara, écorce sacrée	schors	écorce	arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en cascarioside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Fraxinus excelsior L.	Oleaceae		gewone es	frêne commun	bovengrondse delen	parties aériennes		
Fraxinus ornus L.	Oleaceae		pluim-es, manna-es	frêne à fleurs, frêne à manne	blad, manna	feuille, manne		
Fucus serratus L.	Fucaceae		zaagwier	varech denté	thallus	thallus		
Fucus vesiculosus L.	Fucaceae		fucus, blaaswier	fucus, varech vésiculeux	thallus	thallus		
Fumaria officinalis L.	Papaveraceae		gewone duivekervel	fumeterre officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		

Galeopsis segetum Neck.	Lamiaceae	Galeopsis ochroleuca Lam.	bleekele hennepnetel	galéopsis des champs, chanvre bâlard	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galium aparine L.	Rubiaceae		kleefkruid	gaillet gratteron, rièble, grateron, gratte-langue, gaille	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galium mollugo L.	Rubiaceae		glad walstro	caille-lait blanc, gaillet mou	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galium odoratum (L.) Scop.	Rubiaceae	Asperula odorata L.	lievevrouwebedstro	on la connaît aussi sous les noms de "rièble", "grateron", "gratte-langue", "gaille".	bovengrondse delen	parties aériennes		
Galium verum L.	Rubiaceae		geel walstro	gaillet jaune, caille-lait jaune	bovengrondse delen	parties aériennes		
Garcinia × mangostana L.	Clusiaceae		mangostan	mangoustanier	vrucht	fruit		
Garcinia gummi-gutta (L.) Roxb.	Clusiaceae	Garcinia cambogia (Gaertn) Destr.	guttégomboom	guttier	gomhars	gomme-résine		
Gardenia jasminoides J. Ellis	Rubiaceae	Gardenia augusta (L.) Merr.	gardenia	gardenie commun, jasmin du cap	hele plant	plante entière		
Gastrodia elata Blume	Orchidaceae				hele plant	plante entière		
Gaultheria procumbens L.	Ericaceae		liggende bergthee	gaulthérie du canada	bovengrondse delen	parties aériennes		
Gelidium amansii J.V. Lamouroux	Gelidiaceae				thallus	thallus		
Gelidium sesquipedale (Clemente) Thuret	Gelidiaceae		agar agar	agar agar	thallus	thallus		
Gentiana lutea L.	Gentianaceae		gele gentiaan	grande gentiane, gentiane jaune	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
Geranium maculatum L.	Geraniaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Geranium pratense L.	Geraniaceae		beemdoovievaarsbek	géranium des prés	bovengrondse delen	parties aériennes		
Geranium robertianum L.	Geraniaceae		robertskruid	géranium herbe à robert	bovengrondse delen	parties aériennes		
Geranium sanguineum L.	Geraniaceae		bloedooievaarsbek	géranium sanguin, herbe à becquet	bovengrondse delen	parties aériennes		
Geum rivale L.	Rosaceae		knikkend nagelkruid	benoite des ruisseaux, benoite des ruisseaux	hele plant	plante entière		

Geum urbanum L.	Rosaceae				geel nagelkruid ginkgo	benoite commune ginkgo, arbre des pagodes, arbre aux quarante écus	hele plant blad	plante entière feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van flavonolglycosiden hoger dan 21,6 mg en van terpeenlactonen hoger dan 5,4 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de glycosides de flavonol supérieure à 21,6 mg et de lactones terpéniques supérieure à 5,4 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.
Ginkgo biloba L.										
Glycine max (L.) Merr.	Leguminosae				soja	soja	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

Glycyrrhiza glabra L.	Leguminosae		zoethout	réglisse	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.	Leguminosae		chinees zoethout	réglisse de l'oural, réglisse de sibérie	wortel, wortelstok, stolon	racine, rhizome, stolon	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.

<i>Gossypium herbaceum</i> L.	Malvaceae		katoenplant, oosters katoen	cotonnier	pilus, wortel, zaad	pilus, racine, graine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden gossypol bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Malvaceae		behaarde katoen	coton mexicaïn	zaad	graine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden gossypol bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
<i>Gracilaria gracilis</i> (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham	Gracilariaceae		knoopwier		thallus	thallus		
<i>Grindelia camporum</i> Greene	Compositae		gomplant	grindélia	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	Compositae	<i>Grindelia humilis</i> Hook & Ar.			bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Compositae		grindelia	grindélia robuste	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dun.	Compositae		grindelia	grindélia	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Guaiacum officinale</i> L.	Zygophyllaceae		guajakhout, echt pokhout	bois de gaïac	schors, hout	écorce, bois		
<i>Guaiacum sanctum</i> L.	Zygophyllaceae		guajakhout, pokhout	bois de gaïac	schors, hout	écorce, bois		
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lamk.	Malvaceae			bois de hêtre, bois d'homme, bois d'orme	schors, blad, vrucht, zaad	écorce, feuille, fruit, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino	Cucurbitaceae		jiaogulan	jiaogulan, herbe de l'immortalité	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Gypsophila paniculata L.	Caryophyllaceae		pluimipiskruid	gypsophile paniculée	wortel	racine		
Haematococcus pluvialis Flotow	Haematococcaceae		bloedregenalg	haematococcus pluvialis	éencellige alg	algue unicellulaire		
Haematoxylum campechianum L.	Leguminosae		campechehout	bois de campêche	ongefermenteerd kernhout	duramen non fermenté		
Hamamelis virginiana L.	Hamamelidaceae		virginische toverhazelaar	hamamélis de virginie	schors, blad	écorce, feuille		
Haplopappus baylahuen Remy	Compositae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.	Pedaliaceae		duivelsklauw	griffe du diable	secundaire wortelknol	tubercule secondaire	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal irdoiden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.

Harpagophytum zeyheri Decne.	Pedaliaceae			griffe du diable, plante- grappin, araignée de bois	wortel, wortelknol	racine, tubercule	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen	Amaranthaceae	Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze	braziliaanse ginseng	suma, le ginseng brésilien, pfaffia	wortel	racine		
Hedeoma pulegioides (L.) Pers.	Lamiaceae		hedeoma	hédéome	bovengrondse delen	parties aériennes		
Hedera helix L.	Araliaceae		klimop	lierre	blad	feuille	Enkel de volgende preparaten zijn toegelaten, in overeenstemming met de volgende maximale dagelijkse dosis: a) droog extract (DER 4-8:1), extractie solvent ethanol 24-30% m/m b) droog extract (DER 6-7:1), extractie solvent ethanol 40% m/m c) droog extract (DER 3-6:1), extractie solvent ethanol 60% m/m d) vloeibaar	Seules les préparations suivantes sont autorisées, avec les doses journalières maximales correspondantes: a) extrait sec (DER 4-8:1), solvent d'extraction éthanol 24-30% m/m b) extrait sec (DER 6-7:1), solvent d'extraction éthanol 40% m/m c) extrait sec (DER 3-6:1), solvent

									extract (DER 1:1), extraitie solvent ethanol 70% v/v c) soft extract (DER 2.2-2.9:1), extraitie solvent ethanol 50% v/v: propylene glycol (98:2) Maximale dagelijkse dosis : Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen : a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg Kinderen van 6 tot 11 jaar : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Kinderen van 3 tot 5 jaar : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg	d'extraction éthanol 60% m/m d) extrait fluide (DER 1:1), solvant d'extraction éthanol 70% v/v e) extrait mou (DER 2.2-2.9:1), solvant d'extraction éthanol 50% v/v: propylène glycol (98:2) Doses journalières maximales : Adolescents à partir de 12 ans et adultes : a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg Enfants de 6 à 11 ans : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Enfants de 3 à 5 ans : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg
								bloem, wortelstok	fleur, rhizome	
			gewone zonnebloem		tournesol commun, grand soleil		bovengronde delen	parties aériennes		
			aardpeer		topinambour, hélianthe tubéreux		knol	tubercule		
						</				

<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench.	Compositae		strobloem, zandstrobloem	immortelle des sables	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don.	Compositae		kerrieplant	immortelle d'Italie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Compositae		gele strobloem	immortelle stoechade	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Apiaceae		gewone berenklauw	berce commune	hele plant	plante entière		
<i>Herniaria glabra</i> L.	Caryophyllaceae		kaal breukkruid	herniaire glabre	hele plant	plante entière		
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Caryophyllaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Brassicaceae		damastbloem	julienne des dames, girarde, giroflée des dames, violette de damas, aragone	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae		roselle, jamaïcazuring	carcadé, oseille de guinée, oseille rouge, roselle, bissap	tak, bloem, blad, zaad	rameau, fleur, feuille, graine		
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Compositae		muizenoor	epervière piloselle	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv.	Poaceae	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Wahl.	veenreukgras	hierochloë odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Himanthalia elongata</i> (L.) S.F. Gray	Himanthaliaceae		riemwier	spaghetti de la mer, haricot de mer	thallus	thallus		
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Elagnaceae		duindoorn	argousier	vrucht, olie van de bes	fruit, huile de baies	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura	Sargassaceae		hai zao	hai zao, hijiki, hiziki	thallus	thallus		
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Poaceae		incl. gewone gerst, zestijsse gerst	incl. orge carrée, orge à six rangs, escourgeon	zaad, wortel, scheut	graine, racine, germe		

Houttuynia cordata Thunb.	Saururaceae					hele plant	plante entière		
Humulus lupulus L.	Cannabaceae			hop	houblon	bloeiwijzen	inflorescences	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van 8-prenylharingenine hoger dan 400 µg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de 8-prenylharingénine supérieure à 400 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.	Lycopodiaceae		Lycopodium serratum Thunb.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Hydrastis canadensis L.	Ranunculaceae			canadese geelwortel	hydraste du canada	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Hygrophila auriculata (Schumacher) Heine	Acanthaceae					blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
Hymenaea courbaril L.	Leguminosae			lokusboom, gomcopal	courbaril	schors, fruit, blad, zaad, hars	écorce, fruit, feuille, graine, résine		
Hypericum perforatum L.	Hyperaceae			sint-janskruid	millepertuis perforé, millepertuis commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van hypericine hoger dan 700 µg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'hypericine supérieure à 700 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de

									produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Informez votre médecin ou pharmacien en cas de prise simul- tanée de médi- caments.	produits. De étiquetage doit de volgende waarschuwing bevatten : Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen uw arts of apotheker informer.
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Lamiaceae				hysop	hysop	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hil.	Aquifoliaceae				mate	mate	blad	feuille		
<i>Illicium verum</i> Hook. f.	Schisandraceae				chinese steranijs	anis étoilé de chine	schors, vrucht	écorce, fruit		
<i>Impatiens balsamina</i> L.	Balsaminaceae				tuinbalsemien	balsamine des gardins	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Indigofera tinctoria</i> L.	Leguminosae				indigostruik	indigotier	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine.
<i>Inula britannica</i> L.	Compositae				engelse alant	inule des fleuves, inule britannique	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Inula helenium</i> L.	Compositae				griekse alant	inule grande auncée	blad, wortelstok, wortel	feuille, rhizome, racine		
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir	Convolvulaceae				zoete aardappel	patate douce	knol	tubercule		

<i>Isatis tinctoria</i> L.	Brassicaceae			wede	pastel	bovengrondse delen, sap	parties aériennes, jus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indirubine bevat.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indirubine.
<i>Jasminum grandiflorum</i> L.	Oleaceae			grootbloemige jasmijn	jasmin à grandes fleurs	bloem	fleur		
<i>Jasminum officinale</i> L.	Oleaceae			gewone jasmijn	jasmin commun	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Jateorhiza palmata</i> (Lam.) Miers	Menispermaceae		Menispermum palmatum Lam.	kolombo, calumbo	racine de colombo	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
<i>Juglans cinerea</i> L.	Juglandaceae			witte valnoot, boternoot	noyer cendré, noyer blanc, noyer à beurre	zaad	graine		
<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae			okkernoot	noyer royal	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Jumellea fragrans</i> (Thouars) Schltr.	Orchidaceae					blad	feuille		
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae			gewone jeneverbes	genévrier commun	vrucht, blad, hout	fruit, feuille, bois	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht : De	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fruit :

									etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies (maximum 6 weken). Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste (maximum 6 semaines). Pas d'utilisation en cas d'insuffisance rénale.
<i>Justicia adhatoda</i> L.	Acanthaceae	<i>Adhatoda vasica</i> Nees	malabarnoot, adulsa, arusa		noix de malabar	hele plant	plante entière			
<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	Acanthaceae					bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Kaempferia galanga</i> L.	Zingiberaceae		kentjoer			wortelstok	rhizome			
<i>Kavalama urens</i> (Roxb.) Raf.	Malvaceae	<i>Sterculia urens</i> Roxb.				gom	gomme			
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Plantaginaceae		eironde leeuwenbek		linaire bâtarde	bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Caprifoliaceae		beemdkroon		knautie des champs, scabieuse des champs	bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae	<i>Krameria triandra</i> Ruiz & Pav.	ratanhia		ratanhia	wortel	racine			
<i>Lactuca indica</i> L.	Compositae		chinese sla			bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Lactuca sativa</i> L.	Compositae		sla		aitue, laitue cultivée, salade	bovengrondse delen	parties aériennes			
<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	Lythraceae		banaba		lilas des indes, queens crape myrtle, banaba	blad	feuille			
<i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V. Lam.	Laminariaceae		gladgesteeld vingervier		laminariae digitée	thallus	thallus			
<i>Laminaria hyperborea</i> (Gun.) Foslie	Laminariaceae		ruwgesteeld vingerwier		laminariae hyperboréale, goemon rouge	thallus	thallus			
<i>Laminaria japonica</i> J.E. Areschoug	Laminariaceae		kelp		Laminariae	thallus	thallus			
<i>Laminaria palmata</i> Bory de St. Vincent	Laminariaceae					thallus	thallus			

<i>Lamium album</i> L.	Lamiaceae			witte dovenetel	lamier blanc	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Larix decidua</i> Mill.	Pinaceae			europese lork, lork	mélèze d'europe, mélèze, mélèze commun	bovengrondse delen, hars	parties aériennes, résine		
<i>Larix occidentalis</i> Nutt.	Pinaceae			west amerikaanse lork	mélèze de l'ouest	hele plant	plante entière		
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae			laurierboom	laurier-sauce	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Lavandula × intermedia</i> Emeric ex Loisel.	Lamiaceae			lavendel	lavande	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lamiaceae			lavendel	lavande	bloeiende top	sommités fleuries		
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea	Lamiaceae			lavendel	lavande des pyrénées	bloeiende top	sommités fleuries		
<i>Lavandula latifolia</i> Medik	Lamiaceae			breedbladige lavendel, spijklavendel	lavande aspic	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae			franse lavendel	lavande stéchade, lavande papillon, lavande à toupet	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lythraceae			henna	henné	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphthoquinones.
<i>Ledum palustre</i> L.	Ericaceae			moerasrozemarijn; moeraspalm	lédon, lédum des marais	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lens culinaris</i> Medik.	Leguminosae			linze	lentille cultivée	zaad	graine		

Leonurus cardiaca L.	Lamiaceae		hartgespan	agripaume	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
Leonurus japonicus Houtt.	Lamiaceae	Leonurus artemisia (Lour.) S.Y. Hu, Leonurus heterophyllus Sweet			bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Brassicaceae		veldkruiders	passerage champêtre	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.

<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae					bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Brassicaceae	peperkers		grande passerage, passerage à feuilles larges		bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Lepidium meyenii</i> Walp.	Brassicaceae		maca		maca	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
<i>Lepidium sativum</i> L.	Brassicaceae	tuinkers		cresson alénois, passerage cultivé		hele plant	plante entière		
<i>Leptospermum petersonii</i> subsp. <i>petersonii</i> .	Myrtaceae		<i>Leptospermum citratum</i> (J.F.Bailey & C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfold			bloeiende toppen	sommités fleuries		
<i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Myrtaceae	manuka		manuka		schors, blad	écorce, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Lespedeza capitata</i> Michx.	Leguminosae	lespedeza		lespedeza		bovengrondse delen	parties aériennes		

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.	Compositae		gewone margriet	marguerite, marguerite commune	bovengrondse delen	parties aériennes		
Levisticum officinale W.D.J. Koch	Apiaceae		lavas	céleri perpétuel, livèche, herbe-à-maggi	hele plant	plante entière		
Ligusticum striatum DC.	Apiaceae	Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu. Ligusticum wallichii Franch.			wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Lilium brownii F.E. Br. ex Mieliez	Liliaceae				bol	bulbe	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Lindera aggregata (Sims) Kosterm.	Lauraceae				wortel	racine		
Linum usitatissimum L.	Linaceae		gekweekt vlas	lin cultivé	zaad	graine		
Liquidambar styraciflua L.	Altingiaceae		amerikaanse amberboom	copalme d'Amérique	schors	écorce		
Litchi chinensis Sonn.	Sapindaceae		lychee	litchi, litchi	vrucht, zaad	fruit, graine		
Lithothamnion calcarum (Pallas) Areschoug	Haplidiaceae		lithothamnium calcarum	lithothamne	thallus	thallus		
Litsea cubeba (Lour.) Pers.	Lauraceae				vrucht	fruit		

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lobariaceae		longenmos	pulmonaire	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Lonicera japonica Thunb.	Caprifoliaceae		japanse kamperfoelie	chèvrefeuille du japon	bloem, steel	fleur, tige		
Lotus corniculatus L.	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	hele plant	plante entière		
Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.	Leguminosae		gewone rolklaver	lotier corniculé	bovengrondse delen	parties aériennes		
Luma chequen (Molina) A. Gray	Myrtaceae	Eugenia chequen Mol.			blad	feuille		
Lycium barbarum L.	Solanaceae	Lycium halimifolium Mill.	boksdooorn	lyciet commun, lyciet de barbarie	vrucht	fruit		
Lycium chinense Mill.	Solanaceae		chinese boksdooorn	lyciet de chine	vrucht	fruit		
Lycopersicon esculentum Mill.	Solanaceae	Solanum lycopersicum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst.	tomaat	tomate	vrucht	fruit		
Lycopodium clavatum L.	Lycopodiaceae		grote wolfsklauw	lycopode en massue	bovengrondse delen, spoor	Parties aériennes, spore		

<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lamiaceae	<i>L. mollis</i> A.Kern., <i>Lycopus menthifolius</i> Mabille	wolfspoot	lycope, lycopé d'europe, chanvre d'eau	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Lycopus virginicus</i> Michx.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae		grote wedderik	lysimaque commune, grande lysimaque	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae		grote kattenstaart	salicaire commune	toppen	sommité	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Macadamia ternifolia</i> F. Muell	Proteaceae		macadamianoten	noyer du queensland	vrucht, zaad	fruit, graine		
<i>Macrocystis pyrifera</i> (L.) C.Ag.	Laminariaceae		kelp	kelp	thallus	thallus		

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliaceae	Michelia champaca L.	magnolia	magnolia officinal	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Magnolia officinalis Rehder & Wilson	Magnoliaceae				schors, bloem	écorce, fleur		
Malpighia glabra L.	Malpighiaceae	Malpighia punicifolia L.	west-indische kers, barbadoskers	cerise de barbade, acérôla	vrucht	fruit		
Malus domestica Borkh.	Rosaceae	Malus sylvestris (L.) Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf	eetappel	pommier commun	hele plant	plante entière		
Malus pumila Mill.	Rosaceae		paradijsappelboom	pommier paradis	knop, bloem, vrucht, blad	bourgcon, fleur, fruit, feuille		
Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris	Rosaceae		wilde appel	pommier sauvage	knop, bloem, vrucht, blad	bourgcon, fleur, fruit, feuille		
Malva sylvestris L.	Malvaceae		groot kaasjeskruid, wilde malve	mauve sauvage, fromageon, petit fromage, fouassier	bovengrondse delen	parties aériennes		
Mammea americana L.	Calophyllaceae		amerikaanse mammi-appel	abricotier des antilles, abricotier-pays	pulp van de vrucht	pulpe du fruit		
Mangifera indica L.	Anacardiaceae		mango	manguier	hele plant	plante entière		
Manihot esculenta Crantz	Euphorbiaceae		cassave, maniok	manioc	gekookte wortel	racine cuite		
Manilkara zapota (L.) P.Royen	Sapotaceae	Achras sapota L.	sapodilla	sapotillier	vrucht, bloem	fruit, fleur		
Maranta arundinacea L.	Marantaceae		pijlwortel	marante, dictame, herbe aux flèches	bol, wortelstok	buble, rhizome		

Marchantia polymorpha L.	Marchantiaceae		parapluijesmos	hépatique des fontaines	thallus	thallus	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Marrubium vulgare L.	Lamiaceae		malrove	marrube	bovengrondse delen	parties aériennes		
Marsdenia cundurango Rchb.f.	Apocynaceae	Marsdenia reichenbachii Triana	condurango	condurango	schors	écorce		
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst.	Apocynaceae	Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.			blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry	Phyllophoraceae		kernwier		thallus	thallus		
Matricaria chamomilla L.	Compositae	Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert	echte kamille	matricaire camomille, camomille vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de bloem of blad : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van α -bisabolol hoger dan 1,9 mg en van apigenine-7-glucoside hoger dan 5,6 mg.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fleur ou la feuille : La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d' α -bisabolol supérieure à 1,9 mg et d'apigénine-7-glucoside supérieure à 5,6 mg.

Medicago sativa L.	Leguminosae		luzerne, alfalfa	luzerne commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betcher) Cheel	Myrtaceae		theeboom, medicinale mirthehei	mélaleuca, arbre à thé, mélaeuque	bovengrondse delen	parties aériennes	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca cajuputi Powell	Myrtaceae		kajapoetboom, cajuputboom	cajuputier	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca leucadendra (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca leucadendron (L.) L.			blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca linarifolia Sm.	Myrtaceae			mélaleuca à feuilles linéaires	blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		niaouli	niaouli	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.

<i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		nerolina	nerolina, l'arbre à peau	blad, twiig	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Leguminosae		goudgele honingklaver, gele honingklaver	grand mélilot	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Fabaceae		citroengele honingklaver, akkethoningklaver	mélilot officinal	bloeiende top	sommité fleurie	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Melissa officinalis</i> L.	Lamiaceae		citroenmelisse	mélisse, mélisse officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Lamiaceae		bijenblad	mélitte à feuilles de mélisse	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mentha aquatica</i> L.	Lamiaceae		watermunt, aalkruid, bakkruid, boerenbalsem, vlooienkruid	menthe aquatique	hele plant	plante entière		
<i>Mentha arvensis</i> L.	Lamiaceae		akker-munt	menthe des champs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mentha spicata</i> L.	Lamiaceae		aarmunt, groene munt	menthe en épi, menthe verte, menthe douce	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mentha x piperita</i> L.	Lamiaceae		pepermunt	menthe poivrée	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Mentzelia cordifolia</i> Dombey ex Urb. & Gilg	Losaceae	<i>Mentzelia scabra</i> Kunth			hele plant	plante entière		
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthaceae		waterdrieblad	trèfle d'eau	blad	feuille		

Mesembryanthemum crystallinum L.	Aizoaceae	Gasoul crystallinum (L.) Rothm.; Cryophytum crystallinum (L.) N.E.Br.	ijsplantje, ijskruid	ficoïde glaciale	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van mesembrine alkaloïden hoger dan 90 µg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes de type mesembrine supérieure à 90 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Mespilus germanica L.	Rosaceae		mispel	néflier, néflier commun	vrucht	fruit		
Mikania amara (Vahl) Willd.	Compositae				schors, blad	écorce, fruit		
Mitchella repens L.	Rubiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Momordica balsamina L.	Cucurbitaceae				vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Momordica charantia L.	Cucurbitaceae		alsempeer, balsempeer, sopropo, bittere augurk, bittere komkommer	concombre amer, margose	vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Monarda didyma L.	Lamiaceae		bergamot, scharlaken monarda	monarde pourpre, thé d'oswego	bovengrondse delen	parties aériennes		

Monarda punctata L.	Lamiaceae				noni, pomme-chien	bovengrondse delen	parties aériennes	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Morinda citrifolia L.	Rubiaceae				noni, indische moerbeï				
Morinda officinalis F.C. How	Rubiaceae					hele plant	plante entière		
Moringa oleifera Lam.	Moringaceae				moringa	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 500 mg gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 500 mg de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer aux enfants de moins de 18 ans.
Morus alba L.	Moraceae				witte moerbeï	vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae		zwarte moerbe	mûrier noir	knop, steel, schors, vrucht, blad	bourgeon, tige, écorce, fruit, feuille		
<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	Rutaceae		kerrieboom	arbre à curry, calou pilé, murraya	schors, blad, wortel van de volwassen struik	écorce, feuille, racine d'un buisson adulte		
<i>Musa x paradisiaca</i> L. (pro sp.)	Musaceae	<i>Musa x sapientum</i> L.	banana	bananier	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
<i>Myrciaria dubia</i> (H.B.K.) McVaugh	Myrtaceae	<i>Psidium dubium</i> H.B.K.	camu camu, rumbes	camu camu, cacaï, camo	vrucht	fruit		
<i>Myrica cerifera</i> L.	Myricaceae			arbre à suif, appelé cirier, arbre à cire	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Myrica gale</i> L.	Myricaceae		wilde gage, was gage	piment royal, myrte des marais, bois-sent-bon, myrique baumier	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicaceae		nootmuskatboom	muscadier	foelie, zaad	macis, graine		
<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>balsamum</i> (L.) Harms	Leguminosae		tolubalsemboom	baumier de tolu	schors van de stam	écorce du tronc		
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae		mirt	myrte	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Nardostachys jatamansi</i> (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	<i>Nardostachys grandiflora</i> DC.	jatamansi, indisch aarborstelgras, narduskruid	jatamansi, nard indien	hele plant	plante entière		

Nasturtium officinale R. Brown	Brassicaceae		witte waterkers	cresson de fontaine	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van pulegone hoger dan 3,5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de pulegone supérieure à 3,5 mg.
Nelumbo nucifera Gaertn.	Nelumbonaceae		lotus, indische lotusbloem, heilige lotus	lotus, lotus des indes, lotus sacré	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Nepeta cataria L.	Lamiaceae		wild kattenkruid	herbe aux chats	bovengrondse delen	parties aériennes		
Nepeta tenuifolia Benth.	Lamiaceae	Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.	japans kattenkruid	chataire japonaise	blad	feuille		
Nephelium lappaceum L.	Sapindaceae		ramboetan	ramboutan, litchi chevelu	vrucht	fruit		
Nigella arvensis L.	Ranunculaceae		zwarte komijn	nigelle cultivée, cumin noir	koud geperste olie van het zaad	huile de la graine pressée à froid	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet geraffineerde olie van deze plant bekomen door koude persing is instabiel en hoge dosissen zijn niet geschikt voor de consumptie door kwetsbare groepen, met name: kinderen onder 12 jaar, adolescenten onder 18 jaar, zwangere en lacterende vrouwen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'huile non raffinée de cette plante obtenue par pression à froid est instable et à haute dose ne convient pas pour la consommation par des groupes vulnérables notamment : les enfants de moins de 12 ans, les adolescents de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.

Ocimum basilicum L.	Lamiaceae		basilicum, baziëkruid	basilic, basilic commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Ocimum gratissimum L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Ocimum tenuiflorum L.	Lamiaceae		heilige basilicum	basilic sacré	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids

								voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	corpoel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Apiaceae			watertorkruid, watervenkel	oenanthe phellandre, fenouil d'eau, oenanthe aquatique	rijpe vrucht	fruit mûr		
Oenothera biennis L.	Onagraceae			middelste teunisbloem	onagre bisanuelle	zaad	graine		
Olea europaea L.	Oleaceae			olijfboom	olivier	knop, vrucht, blad	bourgcon, fruit, feuille		
Olea europaea L. subsp. europaea	Oleaceae			olijfboom	olivier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Ononis spinosa L.	Leguminosae		Ononis vulgaris "Rouy, p.p.C"	kattedoorn	bugrane épineuse, arrête-bœuf	hele plant	plante entière	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams	Leguminosae		Ononis arvensis L.	wild zoethout, stalkruid	bugrane des champs	wortel	racine	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent)	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant)

Onopordon acanthium L.	Compositae			wegdistel	chardon aux ânes, onopordon fausse- acanthé	bovengrondse delen	parties aériennes	hoger dan 40 mg. De analyse- sultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagaceae			japanse slangenbaard	barbe de serpent, muguet du japon	knol	tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Opopanax chironius (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae			opopanax	opopanax, opopanax de chiron	hele plant, gomhars	plante entière, gomme-résine		
Opuntia ficus- indica (L.) Mill.	Cactaceae			viëgcactus	oponce, figuier de barbarie	cladode, bloem, vrucht	cladode, fleur, fruit		
Orchis mascula L.	Orchidaceae			mannejesorchis	orchis mâle	wortelknol	tubercule		
Origanum compactum Benth	Lamiaceae			origano	origan	bovengrondse delen	parties aériennes		
Origanum dictamnus L.	Lamiaceae			hopmarjolein, kandische majoraan	dictame de crête	bovengrondse delen	parties aériennes		
Origanum majorana L.	Lamiaceae	Majorana hortensis Moench.		marjolein, majoraan	marjoline, amarique	bovengrondse delen	parties aériennes		
Origanum vulgare L.	Lamiaceae			wilde marjolein, orego	origan, origan vulgaire, marjoline sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes		

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.	Lamiaceae		javanse nierthee	thé de java, moustaches de chat	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5,5 g gedroogde bladeren.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5,5 g de feuilles séchées.
Orthosiphon aristatus var. aristatus	Lamiaceae		kattensnor	moustaches de chat	bovengrondse delen	parties aériennes		
Oryza sativa L.	Poaceae		rijst	riz	zaad, wortel	graine, racine		
Oxalis acetosella L.	Oxalidaceae		witte klaverzuring	oselle des bois	bovengrondse delen	parties aériennes		
Pachira aquatica Aubl.	Malvaceae		watercacao	marce, noisetier de la guyane, noix de malabar, arbre à monnaie	blad, zaad	feuille, graine		
Pachira insignis (SW.) Savigny	Malvaceae				zaad	graine		
Padus avium var. avium	Rosaceae	Prunus padus L.	gewone vogelkers	cerisier à grappes, merisier à grappes	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Paconia lactiflora Pall.	Paoniaceae	Paconia albiflora Pall., Paconia chinensis L. Vilmorin	chinese pioen	pivoine blanche, pivoine commune	bloem, wortel, zaad	fleur, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Paconia officinalis L.	Paoniaceae		boerenpioen	pivoine officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
Paconia x suffruticosa Andrews	Paoniaceae		boompioen	pivoine en arbre	wortel	racine		

Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr	Palmariaceae	Fucus palmatus L., Rhodymenia palmata (L.) Greville	rood lapwier	rhodyménie palmé	thallus	thallus		
Panax ginseng C.A. Mey.	Araliaceae		ginseng	ginseng, mandagore coréenne	wortel, blad, bes	racine, feuille, bes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax pseudoginseng Wall.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Panax quinquefolius L.	Araliaceae			amerikaanse ginseng	ginseng américain	wortel, blad, zaad	racine, feuille, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panicum miliaceum L.	Poaceae			pluingierst	millet commun, mil, millet cultivé, panic, panic millet	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Panzerina lanata (L.) Soják	Leguminosae	Panzeria lanata (L.) Bunge.				bovengrondse delen	parties aériennes		
Papaver rhoeas L.	Papaveraceae			grote klaproos	grand coquelicot	bloem	fleur		
Parietaria officinalis L.	Urticaceae			groot glaskruid	pariétaire officinale	bovengrondse delen	parties aériennes		
Parmelia saxatilis (L.) Ach.	Parmeliaceae					thallus	thallus	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Parthenium hysterophorus L.	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes		

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.	Vitaceae	Anpelopsis tricuspidata Siebold et Zucc.	oosterse wingerd, oosterse wilde wingerd	vigne-vierge à trois pointes	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de jonge scheut: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5% gedroogde plant.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de jeune pousse: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5% de plante séchée.
Passiflora edulis Sims	Passifloraceae	Passiflora incarnata L.	passiebloem, passiekruid	passiflore sauvage	bovengrondse delen	parties aériennes		
Pastinaca sativa L.	Apiaceae		pastinaak	panais	wortel	racine		
Paullinia cupana Kunth	Sapindaceae		guarana	guarana	zaad	graine		
Pedaliium murex L.	Pedaliaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Pelargonium graveolens L'Herit	Geraniaceae		rozenpelargonium, rozengeranium	pélargonium à forte odeur	bovengrondse delen	parties aériennes		
Pelargonium radens H.E. Moore	Geraniaceae	Pelargonium radula (Cav.) L'Hér.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Pelargonium sidoides DC.	Geraniaceae		geranium	pélargonium	hele plant	plante entière		
Perilla frutescens (L.) Britton	Lamiaceae		zwarte netel, perilla, japans sesam-zaad	perilla	blad, zaad	feuille, graine		
Persea americana Mill.	Lauraceae		avocado-boom	avocatier	blad	feuille		
Piscaria bistorta (L.) Samp.	Polygonaceae	Polygonum bistorta L.	adderwortel, adderkruid	bistorte, renouée, bistorte, serpentaire, feuillete	wortelstok	rhizome		
Piscaria maculosa Gray	Polygonaceae	Polygonum persicaria L.	perzikkruid	renouée persicaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Petiveria alliacea L.	Phytolaccaceae		parelhoenkruid	herbe aux poules	blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nymman ex A.W. Hill	Apiaceae		tuinpeterselie	persil cultivé	hele plant	plante entière		
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. Koch	Apiaceae		meesterwortel, varkenskerf	impératoire, peucedan officinal	hele plant	plante entière		
<i>Peumus boldus</i> Molina	Monimiaceae		boldo	boldo	blad	feuille		
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae		gewone boon	haricot commun	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée		
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Rutaceae		kurkboom	phellodendron de l'amour, arbre au liège	schors	écorce	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isoquinoline (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Oleaceae			alavert à larges feuilles	blad	feuille		
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae		blauwvaren		blad, wortelstok	feuille, rhizome		
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Arecaceae		dadelpalm	palmier dattier, dattier	vruchtvlies	pulpe du fruit		
<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae		zwarte appelbes	amélanchier à fruits noirs, aronie à fruits noirs	vrucht	fruit		
<i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae		azteeks zoetkruid	l'herbe sucrée des Aztèques	bovengrondse delen	parties aériennes		

Phyllanthus amarus Schumacher & Thonn.	Phyllanthaceae					bloeiende top	Sommités fleurées	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus emblica L.	Phyllanthaceae	Embllica officinalis Gaertn.	amalaki, amla	amalaki, amla, arbre de malacca		bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus niruri L.	Phyllanthaceae					hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin	Hapaliaceae			lithothamne		thallus	thallus		
Physalis alkekengi L.	Solanaceae		lampionplant, jodenkers	coqueret, coqueret alkékéngé, lanterne chinoise		rijpe vrucht	fruit mûr		
Physalis peruviana L.	Solanaceae		goudbes, ananaskers, incabes, kaapse kruisbes	coqueret du pérou, groselle du cap		rijpe vrucht	fruit mûr		
Picea abies (L.) Karst.	Pinaceae		fijspar, grote spar	épicea commun, épicea, faux sapin, pesse, sapin élevé, sapin rouge		naald, top van de tak	aiguille, bout de branche		
Picramnia antidesma Sw.	Picramniaceae					schors	écorce	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

								L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Pimenta dioica (L.) Merr.	Myrtaceae	Pimenta officinalis Lindl.	piment, jamaïcapeper	poivrier de la jamaïque, piment de la jamaïque	bes	baie	producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae		west-indische bay-boom, bay-rumbloom, bay st.thomas	piment couronné, bois d'inde	blad	feuille		
Pimpinella anisum L.	Apiaceae		anijs	anis	zaad	graine		
Pimpinella major (L.) Huds.	Apiaceae		grote bevernel	grand boucage	wortel	racine		
Pimpinella saxifraga L.	Apiaceae		kleine bevernel	petit boucage	hele plant	plante entière		
Pinus koraiensis Siebold & Zucc.	Pinaceae		korcaanse den	pin de corée	naald, olichars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
Pinus massoniana Lamb.	Pinaceae				naald, olichars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
Pinus mugo Turra	Pinaceae	Pinus montana Mill.	bergden	pin buissonnant, pin mugho	knop, naald, scheut	bourgeon, aiguille, pousse		
Pinus pinaster Ait.	Pinaceae	Pinus maritima Lam.	zeeden	pin maritime, pin des landes	schors, zaad, blad, knop (kegel)	écorce, graine, feuille, bourgeon (cône)		
Pinus pinea L.	Pinaceae		parasolden	pin parasol, pin pignon	naald, olichars, zaad	aiguille, oléorésine, graine		

<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae		grove den	pin sylvestre, pin-sauvage	schors, knop, vrucht, blad, scheut	écorce, bourgeon, fruit, feuille		
<i>Piper aduncum</i> L.	Piperaceae	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.	maticopeper	matico	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Piper longum</i> L.	Piperaceae		lange peper	poivre long	vrucht	fruit		
<i>Piper nigrum</i> L.	Piperaceae		zwarte peper, witte peper	poivrier noir, poivrier blanc	vrucht, olie	fruit, oléorésine, huile		
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae	<i>Lentiscus vulgaris</i> Fourr. , <i>Terebinthus lentiscus</i> (L.) Moench	mastiekboom	lentisque, pistachier lentisque	blad, hars, twiig	feuille, résine, brindille		
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Anacardiaceae		terpenijnboom	pistachier térébinthe, térébinthe	vrucht	fruit		
<i>Pistacia vera</i> L.	Anacardiaceae		pistache, pimpermoot	pistachier, pistachier commun, pistachier cultivé, pistachier vrai	vrucht	fruit		
<i>Pisum sativum</i> L.	Leguminosae		erwt	pois	peul, zaad	gousse, graine		
<i>Plantago afra</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago psyllium</i> L.	vlozaad, weegbree	plantain psyllium, plantain pucier, herbe aux puces, plantain psyllion, pucier	zaadhuid, zaad	tégument de graine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	Plantaginaceae		zandweegbree	plantain de sables	zaad	graine		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae		smalle weegbree	plantain lancéolé	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae		grote weegbree	plantain à larges feuilles, grand plantain	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae		ruige weegbree	plantain intermédiaire, langue d'agneau	hele plant	plante entière		
<i>Plantago orbignyana</i> Steinh. ex Decne.	Plantaginaceae	<i>Plantago ovata</i> Phil.	vlozaad	plantain pucier, plantain des indes	zaad	graine		

<i>Plantago ovata</i> Forssk.	Plantaginaceae	<i>Plantago</i> <i>ispaghula</i> Roxb. ex Fleming	vlozaad	plantain pucier, plantain des indes	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platanaceae		oosterse plataan	platane d'Orient	knop	bourgeon		
<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacquin) A. DC.	Campanulaceae		ballonklokje, chinese klokjesbloem, ballonbloem	platycodon à grandes fleurs	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Langdurig gebruik kan de maag irriteren.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'usage prolongé peut irriter l'estomac.
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Lamiaceae	<i>Coleus</i> <i>barbatus</i> (Andrews) Benth			blad, wortel, knol	feuille, racine, tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
<i>Plukenetia volubilis</i> L.	Euphorbiaceae				olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënten zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Lamiaceae		patchoeli	patchouli	blad	feuille		

<i>Polygala senega</i> L.	Polygalaceae				senegawortel, senecawortel, ratelslangwortel	polygala de virginie, sénéga, laitier, herbe au lait	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
<i>Polygala sibirica</i> L.	Polygalaceae						wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	Polygalaceae				siberische vleugeltjesbloem	polygala de chine	wortel	racine		
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygalaceae			Polygala comosa Schkuhr	gewone vleugeltjesbloem	polygale commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Liliaceae			<i>Polygonatum officinale</i> All.	wetrikende salomonszegel	sceau de salomon odorant	wortelstok	rhizome		
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Asparagaceae				varkensgras	renouée des oiseaux, trainasse	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae				witte abeel, zilverpopulier	peuplier blanc, peuplier argenté, abèle	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Populus balsamifera L.	Salicaceae			balsempopulier	peuplier baumier	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus nigra L.	Salicaceae			zwarte populier	peuplier noir	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus tremula L.	Salicaceae			ratepopulier	peuplier tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus tremuloides Michx.	Salicaceae			amerikaanse ratepopulier	peuplier faux- tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :

									Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Porphyra umbilicalis Kützing	Bangiaceae							thallus	thallus	
Portulaca oleracea L.	Portulacaceae	naveltwier, purpervier	postelein	pouppier, pouppier potager	bovengrondse delen	parties aériennes				
Potentilla anserina L.	Rosaceae	zilver schoon		potentille des oies, potentille anserine	hele plant	plante entière				
Potentilla argentea L.	Rosaceae	vilganzertik		potentille argentée	hele plant	plante entière			De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.	Rosaceae	tormentil, bloedwortel, zevenblad, zevenvingerkruid		tormentille, potentille dressée, potentille officinale, herbe de sainte catherine	hele plant	plante entière				
Potentilla reptans L.	Rosaceae	vijfvingerkruid		potentille rampant, quintefeuille	wortelstok	rhizome				

Prangos pabularia Lindl.	Apiaceae		prangos	yugan	vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
Primula elatior Hill	Primulaceae		slanke sleutelbloem	primevère élevée, primevère des bois	bloem, wortel	fleur, racine		
Primula veris L.	Primulaceae	Primula officinalis (L.) Hill.	gouden sleutelbloem	primevère officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
Prunella vulgaris L.	Lamiaceae		gewone brunel	brunelle commune	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken samen met contraceptiva.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser concomitamment avec des contraceptifs.
Prunus africana (Hook. f.) kalkman	Rosaceae	Pygeum africanum Hook. f.	rood stinkhout, afrikaanse kers, pygeum	mueri, pygeum, prunier d'Afrique	schors	écorce		
Prunus armeniaca L.	Rosaceae		abrikoo	abricotier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Prunus avium (L.) L.	Rosaceae		zoete kers	merisier, cerisier des oiseaux, cerisier, bigarreaux	vrucht, steel	fruit, pédoncule		
Prunus cerasus L.	Rosaceae	Cerasus vulgaris Mill.	zure kers	griottier	Fruit (namelijk zaad en pulp), bloemsteel, blad, schors, gom	Fruit (dont graine et pulpe), pédoncule, feuille, écorce, gomme		
Prunus domestica L.	Rosaceae		pruimboom	prunier	schors, knop, bloem, vrucht, blad	écorce, bourgeon, fleur, fruit, feuille		

<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb	Rosaceae	<i>Amygdalus communis</i> L., <i>Prunus amygdalus</i> Batsch.	amandelboom	amandier	knop, bladknop, zaad, bloem, vrucht, olie	bourgeon, bourgeon de feuille, graine, fleur, fruit, huile	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Rosaceae		perzik	pêcher, pêcher commun	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae		amerikaanse vogelkers	cetisier tardif	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Prunus spinosa</i> L.	Rosaceae		sleedoorn	prunellier, épine noire, prunier épineux	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae		gauva	goyavier	schors, vrucht, blad, wortel	écorce, fruit, feuille, racine	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (25%) extracten zijn toegelaten.	Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (25%) est autorisée.
<i>Psidium guineense</i> Sw.	Myrtaceae	<i>Psidium araca</i> Raddi	braziliaanse guave	goyavier du Brésil	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Pterocarpus</i> <i>erinaceus</i> Poir.	Leguminosae			vène	sap van het hout	jus du bois		
<i>Pterocarpus</i> <i>indicus</i> Willd.	Leguminosae				sap van het hout	jus du bois	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Pterocarpus</i> <i>marsupium</i> Roxb.	Fabaceae		kinoboom, sandelboom, bastaardtrek	kino de malabar	bloem, kernhout, blad, gomhars	fleur, duramen, feuille, gomme-résine		
<i>Pterocarpus</i> <i>officinalis</i> Jacq.	Leguminosae	<i>Pterocarpus</i> <i>draco</i> L.			hars	résine		
<i>Pterocarpus</i> <i>santalinus</i> L. f.	Leguminosae		rode sandelboom	santal rouge	hout	bois		

<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae	<i>Pueraria</i> <i>lobata</i> (Willd.) Ohwi	kudzu	kudzu	bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Pueraria tuberosa</i> (Willd.) DC.	Leguminosae				bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Pulicaria</i> <i>dysenterica</i> (L.) Gaertn.	Compositae		heelblaadjes		hele plant	plante entière		
<i>Pulmonaria</i> <i>officinalis</i> L.	Boraginaceae		gevekt longkruid		wortel	racine	Het gehalte aan toxische pyrrolizidine alkaloïden in de bereiding moet lager dan 4 µg/kg zijn.	La teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques dans la préparation doit être inférieure à 4 µg/kg.
<i>Punica granatum</i> L.	Lythraceae		granaatboom		bloem, vrucht, zaad	fleur, fruit, graine		

<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Ericaceae		rond wintergroen, rondbladig wintergroen	pyrole à feuilles rondes	blad	feuille		
<i>Pyropia tenera</i> (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi	Bangiaceae	<i>Porphyra</i> <i>tenera</i> Kjellman			thallus	thallus		
<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae		peer	poirier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
<i>Quercus alba</i> L.	Fagaceae		amerikaanse witte eik	chêne blanc, chêne blanc d'amérique	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus coccifera</i> L.	Fagaceae		hulsteik	chêne des garrigues, chêne kermès	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae		steeneik	chêne vert, yeuse	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier	Fagaceae				schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Fagaceae		wintereik	chêne sessile	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Fagaceae		donzige eik	chêne pubescent, chêne blanc	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae		zomereik	chêne pédonculé	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
<i>Quercus serrata</i> subsp. <i>serrata</i>	Fagaceae	<i>Quercus</i> <i>glandulifera</i> Blume	chinese eik	chêne à feuilles de chataignier	schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae		kurkeik	chêne-liège, corcier, surier, suv	schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		

Quillaja saponaria Molina	Quillajaceae	Quillaja smegmaderm os DC.				schors	écorce			
Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin	Brassicaceae	Raphanus sativus var. niger (Mill.) J.Kern.	knopherik, wilde radijs	ravenelle, radis ravenelle, radis sauvage	hele plant	hele plant	plante entière			
Raphanus sativus L.	Brassicaceae		tuinradijs	radis cultivé	hele plant	hele plant	plante entière			
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.	Arecaceae	Raphia pedunculata P.Beauv.			zetmeel afkomstig van het merg van de scheut	amidon de la moelle de la pousse				
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) DC.	Plantaginaceae		chinees vingerhoedskruid	digitale de chine, rehmannia	wortel	racine				
Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke	Polygonaceae	Polygonum multiflorum Thunb., Fallopia multiflora (Thunb.) K. Haraldson	knoopkruid	renouée à fleurs multiples	wortel, stengel, zaad	racine, tige, graine				
Rhamnus alpina L.	Rhamnaceae		alpenwegedoorn	nerprun des alpes	schors	écorce				La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre

De aanbevolen
dagelijkse
hoeveelheid mag
niet leiden tot een
inname van totaal
anthranoiden*
(uitgedrukt als
glucofranguline A)
hoger dan 14 mg.
De
analyseresultaten
moeten
beschikbaar zijn
voor elk lot van
producten. De
etikettering moet
de volgende
waarschuwingen
bevatten : Niet
toedienen aan
kinderen jonger
dan 12 jaar. Bij
zwangerschap of

Rhamnus cathartica L.	Rhamnaceae			wegedoorn	nerprun purgatif	hele plant	plante entière	borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en équivalents glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum australe D. Don	Polygonaceae	Rheum emodii Wall. ex Meisn.				blad, wortelstok	feuille, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine)

									25 mg. Het gehalte aan rhaponticosiden moet bepaald worden. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	supérieure à 25 mg. La teneur en rhaponticosides doit être déterminée. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum x hybridum Murray	Polygonaceae				Tuinrubarber	rhubarbe	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

							zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum officinale Baill.	Polygonaceae			chinese rabarber		rhubarbe de chine, racine de rhubarbe officinale	wortel, wortelstok	racine, rhizome
								De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 25 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.
								La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rheum palmatum L.	Polygonaceae		chinese rabarber, sierrabarber, turkse rabarber	rhubarbe de chine, rhubarbe palmée, rhubarbe décorative	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhabbarum L.	Polygonaceae	Rheum undulatum L.	rabarber	rhubarbe des jardins	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

								beavatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum raphanistrum L.	Polygonaceae						wortel, wortelstok	racine, rhizome	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranolides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhodiola crenulata (Hook. f. & Thomson) Ohba	Crassulaceae						wortel	racine	
Ribes nigrum L.	Grossulariaceae						knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille	

Ribes rubrum L.	Grossulariaceae		aalbes, trosbes	groszeiljer à grappes	vrucht, blad	fruit, feulle	
Ribes uva-crispa L.	Grossulariaceae		kruisbes	groszeiljer épineux, groszeiljer à maquerneau	vrucht, blad	fruit, feulle	
Robinia pseudoacacia L.	Leguminosae		gewone robinia, valse acacia	robinier faux-acacia	gekookte bloem, gekookte zaad	fleur cuite, graine cuite	
Rocella phycopsis Ach.	Rocellaceae	Rocella tinctoria DC.			thallus	thallus	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Rosa canina L.	Rosaceae		hondsroos	rosier des chiens, églantier commun	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feulle, graine	
Rosa x centifolia L. (pro sp.)	Rosaceae		franse provenceroos, provenceroos	rosier cent-feuilles, rose pâle	bloem, blad	fleur, feulle	
Rosa gallica L.	Rosaceae		franse roos	rosier de france, rosier de provins	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feulle, graine	
Rosa moschata Mill.	Rosaceae		echte muskuroos	rosier musqué	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit, feulle, graine	
Rosa rubiginosa L.	Rosaceae		egellantier	rosier rouillé, rosier rubigineux, rosier églantier	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feulle	
Rosa x damascena Mill.	Rosaceae	Rosa gallica f. trigintipetala Dieck	damastroos	rosiers de damas	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit, feulle	
Rosmarinus officinalis L.	Lamiaceae		rozemarijn	romarin	bovengrondse delen	parties aériennes	
Rubia cordifolia L.	Rubiaceae		rubia cordifolia L.	rubiaccae	wortel	racine	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de lucidine.

Rubus caesius L.	Rosaceae		dauwbraam	ronce bleue	bovengrondse delen	parties aériennes		
Rubus chingii var. suavissimus (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	Rubus suavissimus S. Lee			vrucht	fruit		
Rubus fruticosus L.	Rosaceae		gewone braam	ronce commune, ronce des buissons, murier sauvage	hele plant	plante entière		
Rubus idaeus L.	Rosaceae		gewone framboos	framboisier commun, framboisier	blad, vrucht	feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Rubus rosa L.H. Bailey	Rosaceae				blad, vrucht	feuille, fruit		
Rumex acetosa L.	Polygonaceae		veldzuring	oseille sauvage, oseille des prés, oseille commune	hele plant	plante entière	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als theïne) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en théine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex acetosella L.	Polygonaceae		schapenzuring	petite oselle	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex alpinus L.	Polygonaceae		alpenzuring	oselle des alpes	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

Rumex conglomeratus Murray	Polygonaceae	Rumex acutus Sm.	kluvenzuring	patience agglomérée	hele plant	plante entière	bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
							De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex crispus L.	Polygonaceae				patience crépue, churelle	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhone) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex longifolius DC.	Polygonaceae					hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhone) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

Rumex obtusifolius L.	Polygonaceae			ridderzuring	patience à feuilles obtuses, patience sauvage, rumex à feuilles obtuses	hele plant	plante entière	bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex patientia L.	Polygonaceae			spinaziezuring	patience des moines, oseille épinard	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een innname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rhéine) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Rumex sanguineus L.	Polygonaceae							anthranoiden* (uitgedrukt als rheiⁿe) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	anthranoides totaux* (exprimés en rheiⁿe) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
						hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheiⁿe) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rheiⁿe) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre

									borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	médicin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae			stekelige muizendoorn	fragon, petit houx	hele plant	plante entière		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Ruscus hypoglossum L.	Asparagaceae					cladode, wortelstok	cladode, rhizome		De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Sabatia angularis (L.) Pursh	Gentianaceae					bovengrondse delen	parties aériennes			
Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders	Laminariaceae	Laminaria saccharina (L.) J.V. Lam.		suikervier	laminaire sucrée, baudrier de neptune	thallus	thallus			
Saccharum officinarum L.	Poaceae					tak, sap	branche, jus			
Salix alba L.	Salicaceae				saule blanc	schors, knop, bloem, blad	écorce, bourgeon, fleur, feuille		De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer

Salix caprea L.	Salicaceae			boswilg	saule marsault, saule des chèvres, marsault, marseau	schors	écorce	adolescenten onder 18 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix fragilis L.	Salicaceae			kraakwilg	saule, fragile, saule cassant	schors, blad	écorce, feuille	adolescenten onder 18 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Salix pentandra L.	Salicaceae			laurierwilg	saule laurier, saule à cinq étamines	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix purpurea L.	Salicaceae			bittere wilg	osier rouge, saule pourpre	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salvia hispanica L.	Lamiaceae			chia	chia	olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel

<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk	Apiaceae	<i>Siler divaricatum</i> (Turcz.) Benth. & Hook. f.		racine de silère	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	Rosaceae	<i>Poterium spinosum</i> L.		racine de silère	wortelschors	écorce de racine		
<i>Sargassum fusiforme</i> (Harvey) Setchell	Sargassaceae	<i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura	hijiki, hiziki	hijiki, hiziki	thallus	thallus		
<i>Sarracenia purpurea</i> L.	Sarraceniaceae		paarse trompetbekerplant	sarracénie pourpre	blad, wortelstok	feuille, rhizome		
<i>Satureja hortensis</i> L.	Lamiaceae		bonekruid	sarriette commune, sarriette des jardins	bloeiende top, zaad	sommité fleurie, graine		
<i>Satureja montana</i> L.	Lamiaceae		winterbonenkruid, bergbonekruid, bergsteentijm	sarriette des montagnes, sarriette vivace	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Satureja thymbra</i> L.	Lamiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Saussurea costus</i> (Falc.) Lipsch.	Asteraceae	<i>Saussurea lappa</i> (Decne.) Sch. Bip.	costus	costus	wortel	racine		
<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	Schisandraceae		schisandra, wu wei zu	schisandra de chine	decoct van tak, gekookt jong blad, vrucht	décoction de branche, jeune feuille cuite, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

Schizochytrium microalgae	Thraustochytriaceae				olie	huile	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt t zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Scorzonera hispanica L.	Compositae		grote schorseneer	scorsonère d'Espagne	wortel	racine		
Scrophularia ningpoensis Hemsl.	Scrophulariaceae		zwart helmkruid	scrophularia ningpoensis hemsl.	wortel	racine		
Scutellaria baicalensis Georgi	Lamiaceae		baikalglidkruid	scutellaire du lac baikal	blad, wortel	feuille, racine		
Scutellaria lateriflora L.	Lamiaceae				hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden furano neoderodanen bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néo- clérodanes. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Secale cereale L.	Poaceae		rogge	seigle	hele plant	plante entière		
Sedum acre L.	Crassulaceae		muurpeper	orpin acre	bovengrondse delen	parties aériennes		
Sedum album L.	Crassulaceae		wit vetkruid	orpin blanc, sédum blanc	blad	feuille		
Sedum roseum (L.) Scop.	Crassulaceae	Rhodiola rosea L.	rozenwortel	rhadiole rose, orpin rose	wortel	racine		
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Cereus grandiflorus (L.) Mill.	koningin der nacht	reine de la nuit	bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden narcissine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en narcissine.

Sempervivum tectorum L.	Crassulaceae	Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia M.Vahl, Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault, Senna angustifolia (Vahl) Batka.	gewone huislook	joubarbe des toits, barbe de jupiter	bovengrondse delen	parties aériennes		
Senna alexandrina Mill.	Leguminosae		alexandrijnse senna	séné d'alexandrie	blad, peul	feuille, gousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna italica Mill.	Leguminosae	Cassia italica (Mill.) F.W.Andrews			vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit

Senna obtusifolia (L.) H.S.Irvin & Barneby	Fabaceae	Cassia obtusifolia L.				etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
						De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

Senna occidentalis (L.) Link	Leguminosae				faux kinkéliba, café-nègre, café puant, café bâtarde, casse-puante	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna tora (L.) Roxb.	Leguminosae					blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

									waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz	Taxodiaceae				mammoetboom	séquoia géant	jonge bebladerde scheuten	jeunes pousses feuillées	Enkel geglycerineerde koude maceraten zijn toegelaten waarvoor de aanbevolen dagelijkse dosis overeenstemt met maximum 41 mg equivalent droge plant.	Seuls sont autorisés les macéras froids glycérinés pour lesquels la dose journalière recommandée correspond à maximum 41 mg d'équivalent plante sèche.
Serenoa repens (W.Bartram) Small	Arecaceae				zaagpalm, zaagpalmetto	sabal, palmier de floride, chou palmiste, palmier d'amérique du nord	vrucht	fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van vetoplosbare bestanddelen hoger dan 256 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de constituants liposolubles supérieure à 256 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin ou pharmacien.
Sesamum indicum L.	Pedaliaceae				sesam	sésame	zaad	graine		
Seseli tortuosum L.	Apiaceae						bovengrondse delen	parties aériennes		
Sideritis syriaca L.	Lamiaceae				bergthee	Thé Grec des Montagnes	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	Compositae	<i>Sigesbeckia serrata</i> DC.		herbe grasse, herbe divine, herbe saint-paul	blad, wortel	feuille, racine		
<i>Silium silaus</i> (L.) Shinz Et Thell.	Apiaceae		weidekervel	siläus des prés	vrucht, wortel	fruit, racine		
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae		mariadistel	chardon-marie	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.	Simmondsiaceae		jojoba	jojoba	zaad vrij van olie	graine sans huile	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij kinderen, adolescenten onder 18 jaar en tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, ni durant la grossesse.
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum officinale</i> L.	gewone raket	sisymbre officinal, herbe aux chantres, vélar	bovengrondse delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden cardioactieve steroïde glycoside bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en glycosides stéroïdes cardiotoniques.
<i>Smilax aristolochifolia</i> Mill.	Smilacaceae	<i>Smilax medica</i> Schltdl. et Cham.			wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae		struikwinde, stekende winde	salsepareille d'europe	wortelstok, wortel, wortelscheut	rhizome, racine, pousse de racine		
<i>Smilax china</i> L.	Smilacaceae		chinawortel	squine	hele plant	plante entière		
<i>Smilax cordifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax glabra</i> Roxb.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax officinalis</i> Kunth	Smilacaceae	<i>Smilax tonduzii</i> Apt	echte sarsaparilla	salsepareille	wortel	racine		
<i>Smilax purthampuy</i> Ruiz	Smilacaceae	<i>Smilax febrifuga</i> Kunth	ecuadoriaanse sarsaparilla	smilax febrifuga kunth	wortelstok, wortel	rhizome, racine		
<i>Smilax regelii</i> Killip & C. V. Morton	Smilacaceae		hondurese sarsaparilla, jamaicaanse sarsaparilla	salsepareille, salsepareille du honduras	wortelstok, wortel	rhizome, racine		

<i>Solanum melongena</i> L.	Solanaceae	<i>Solanum ovigerum</i> Dun.	aubergine	aubergine	vrucht, wortel	fruit, racine		
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanaceae		aardappel	pomme de terre	knol	tubercule		
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Compositae		echte guldenroede	solidage verge d'or	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Rosaceae		wilde lijsterbes	sorbier des oiseleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Poaceae		kafferkoren, durra, kafir	sorgho commun	zaad, jonge scheut	graine, jeune pousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn.	Leguminosae				stam	tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl.	Caryophyllaceae		rode schijnspurrie	spergulaire rouge	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

<i>Spinacia oleracea</i> L.	Amaranthaceae		spinazie	epinard	blad	feuille		
<i>Spirulina major</i> Kützing Gomont	Pseudanabaenaceae	<i>Spirulina major</i> Kützing	spirulina	spiruline	éencellige alg	algue unicellulaire		
<i>Spirulina maxima</i> (Scherell & Gardner) Geitler	Pseudanabaenaceae	<i>Arthrospira maxima</i> Scherell & Gardner	spirulina	spiruline	éencellige alg	algue unicellulaire		
<i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler	Pseudanabaenaceae		<i>spirulina platensis</i> , <i>platensis</i>	<i>spirulina platensis</i> , algue de vie	éencellige alg	algue unicellulaire		
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Lamiaceae	<i>Betonica officinalis</i> L.	betonie	bétoine	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Stachys recta</i> L.	Lamiaceae		bergandoorn	épière droite	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Lamiaceae		bosandoorn	épière des bois, ortie puante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae		vogelmuur	stellaire intermédiaire, morgeline	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Stemmacantha carthamoides</i> (Willd.) Dittrich	Asteraceae	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin		rhapontique des alpes	wortel	racine		
<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	Leguminosae	<i>Sophora japonica</i> L.	honingboom	sophora du japon	gekookt jong blad, bloem, bloemknop, decoct van het zaad, decoct van de stengel	jeune feuille cuite, fleur, bouton floral, décoction de la graine, décoction de la tige	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
<i>Symplocos racemosa</i> Roxb.	Symplocaceae				bast	liber		
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleaceae		sering	lilas commun, lilas français	bladknop	bourgeon de feuille		
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et L.M. Perry	Myrtaceae	<i>Caryophyllus aromaticus</i> L., <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. (nom. illeg.) Mansfeld	kruidnagelboom	girofle, girofler, gérofler	bloemknop	bourgeon de fleur		
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Myrtaceae		jambolan	jambolan, jambelonier	schors, vrucht, blad, zaad	écorce, fruit, feuille, graine		

<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	Myrtaceae		rozenappel	jambrosat, jambrosier, jambrose, pomme rose	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry.	Myrtaceae		djamboc bol, maleisische rozenappel, maleisische wasappel	jambrosier rouge	blad	feuille		
<i>Tagetes erecta</i> L.	Compositae		groot afrikaantje	rose d'inde	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tagetes minuta</i> L.	Compositae		geelgroen afrikaantje	tagète des décombres	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae		tamarindeboom	tamarinier	vrucht	fruit		
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae		franse tamarisk	tamaris commun, tamaris de france, tamarix commun, tamarix de france	jonge bladscheut	jeunes pousse		
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Compositae		balsemwormkruid	menthe-coq	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Compositae		moederkruid	grande camomille	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Compositae		boerenwormkruid	tanaïsie vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thuyon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
<i>Taraxacum campyloides</i> G.E.Haglund	Asteraceae	Taraxacum officinale Web.	paardebloem	pissenlit, dent de lion	hele plant	plante entière		
<i>Terminalia bellerica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae		bibhitaki, bastaard myrobalaan	bibhitaki	vrucht	fruit		
<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Combretaceae		zwarte myrobalaan	badamier chebule, myrobalaan chebule	vrucht	fruit		

<i>Thalictrum flavum</i> L.	Ranunculaceae		poelruit	pigamon	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes d'isochinoline (exprimée en berberine) en supérieure à 10 mg.
<i>Theobroma cacao</i> L.	Malvaceae		cacaoboom	cacaoyer	zaad	graine		
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Brassicaceae		witte krodde, boerenkers	tabouret des champs, monnyère	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
<i>Thymus</i> <i>satureioides</i> Coss.	Lamiaceae		satureja tijm	thym saturéioïde	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Thymus serpyllum</i> L.	Lamiaceae		wilde tijm, veldtijm, citroentijm	serpolet à feuilles étroites, piolet, thym sauvage, thym rouge	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Lamiaceae		echte tijm, hooitijm, roomse kwendel, tijmoes	thym commun, thym vrai, pousseux, fringouille	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 4 g gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 4 g de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
<i>Thymus zygis</i> L.	Lamiaceae		spaanse tijm, rode tijm	thym d'espagne, thym rouge	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tilia americana</i> L.	Malvaceae		amerikaanse linde	tilleul d'amérique	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Malvaceae		winterlinde, kleinbladige linde	tilleul à petites feuilles, tilleul des bois, tilleul à feuilles en cœur	hele plant	plante entière		
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Malvaceae		zomerlinde, grootbladige linde	tilleul à larges feuilles	hele plant	plante entière		
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Malvaceae	<i>Tilia argentea</i> DC.	zilverlinde	tilleul argenté	hele plant	plante entière		
<i>Tilia x europaea</i> L.	Malvaceae	<i>Tilia x vulgaris</i> B. Heyne	hollandse linde	tilleul de hollandse, tilleul commun	schors, bloem, blad, zaad	écorce, fleur, feuille, graine		
<i>Tinospora sinensis</i> (Lour.) Merr.	Menispermaceae	<i>Tinospora cordifolia</i> (Willd.) Miers			wortel, stengel, blad	racine, tige, feuille		

Trachyspermum ammi (L.) Sprague	Apiaceae			ajowan	ajowan	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Tragopogon portifolius L.	Compositae				paarse morgenster, boksbaard	wortel	racine		
Tribulus terrestris L.	Zygophyllaceae				tribulus	gekookte plantendelen van de hele plant	parties de plantes cuites de la plante entière	De aanbevelen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van saponinen hoger dan 15 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling of antidiabetische behandeling. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 21 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de saponines supérieure à 15 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension ou le diabète. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 21 ans.
Trichilia catigua A. Juss.	Meliaceae					schors	écorce	Een gedetailleerde botanische identificatie is vereist. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden tropaan alkaloiden bevat.	Une identification botanique détaillée est requise. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes tropaniques.

Trichosanthes kirilowii Maxim.	Cucurbitaceae			chinese komkommer	concombre chinois	vrucht (pericarp en zaad)	fruit (péricarpe et graine)	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden trichosanthine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en trichosanthine.
Tridax procumbens L.	Compositae					bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Trifolium arvense L.	Leguminosae			hazepootje	pied-de-lievre, trèfle des champs, trèfle	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium campestre Schreb.	Leguminosae			liggende klaver	trèfle des champs	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent

Trifolium pratense L.	Leguminosae		rode klaver	trèfle des prés, trèfle rouge, triolet	bovengrondse delen	parties aériennes	beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	être disponibles pour chaque lot de produits. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium repens L.	Leguminosae		witte klaver	trèfle rampant, trèfle blanc, coucou	bovengrondse delen	parties aériennes	beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	être disponibles pour chaque lot de produits. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trigonella caerulea (L.) Ser.	Leguminosae		zevengetideklaver	trigonelle bleue	bovengrondse delen	parties aériennes	beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

Trigonella foenum-graecum L.	Leguminosae		fenegriek	fenugrec	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Trillium erectum L.	Melanthiaceae		driehblad, boslelie	trille dressé	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Triticum aestivum L.	Poaceae	Triticum vulgare Vill. ; Triticum sativum Lam.	gewone tarwe	blé commun, froment	bovengrondse delen	parties aériennes		
Triticum dicocon (Schrank.) Schübl.	Poaceae		emmertarwe, emmer, tweekoren	amidonnier	vrucht	fruit		
Triticum durum Desf.	Poaceae	Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husnot	harde tarwe	froment dur	scheut, zaad	pousse, graine		
Triticum spelta L.	Poaceae		spelt	épeautre	scheut, zaad	pousse, graine		
Triticum turgidum L.	Poaceae		engelse tarwe	blé barbu, gros blé	scheut, zaad	pousse, graine		
Tropaeolum majus L.	Tropaeolaceae		oost-indische kers	grande capucine	bovengrondse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progioitrine en 5 mg goitrine. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progioitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou

Tropaeolum minus L.	Tropaeolaceae				bovengrondse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts raadplegen.	behandeling, uw arts raadplegen.	ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Tsuga canadensis (L.) Carrière	Pinaceae			pruche du canada, pruche de l'est	blad, hars	feuille, résine			
Turnera diffusa Wild. ex Schult.	Passifloraceae			oostelijke, canadese hemlockspar damiaanblad, damiana	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	<i>Ulmus campestris</i> L.; <i>Ulmus scabra</i> Mill.	ruwe olm, ruwe iep, bergiep	orme des montagnes, orme rude, orme blanc	schors, knop	écorce, bourgeon		
<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulmaceae		siberische iep	orme de sibérie	schors, blad	écorce, feuille		
<i>Ulmus rubra</i> Muhl.	Ulmaceae	<i>Ulmus fulva</i> Michx.	rode iep	orme rouge	schors	écorce		
<i>Ulm lactuca</i> L.	Ulmaceae		zeesla	laitue de mer	thallus	thallus		
<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		cachou, gambir, gambirstruik	cachou gambir, arbre catechu	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.	Rubiaceae	<i>Nauclea rhynchophylla</i> Miq.			haak	crochet		
<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae		katsklauw	griffe de chat	schors, stam, wortel	écorce, tige, racine		
<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar	Alariaceae	<i>Alaria pinnatifida</i> Harvey	wakame	wakamé	thallus	thallus		
<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae		grote brandnetel	ortie dioïque, grande ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.

Urtica urens L.	Urticaceae		kleine brandnetel	ortie brûlante, petite ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssuppleme nten met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équi- valente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Deman- der l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.
Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, barbe de saint-antoine, barbe de jupiter	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concen- tration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Usnea longissima Ach.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, mousse d'espagne	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion jour- nalière recom- mandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.

<i>Usnea plicata</i> Wiggers	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	Ericaceae	<i>Vaccinium angustifolium</i> var. <i>myrtilloides</i> (Michx.) House		airelle fausse- myrtille, bleuet, bleuet sauvage	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Ericaceae		blauwe bes	myrtille arbustive, grande myrtille, myrtille américaine, bleuet géant, corymbelle	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	Ericaceae		grote veenbes, cranberry	canneberge à gros fruits, airelle à gros fruits	bes	baie		
<i>Vaccinium myrtillos</i> L.	Ericaceae		blauwe bosbes	myrtille commune, myrtillier, baies de myrtille	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Ericaceae	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kleine veenbes	canneberge des marais, airelle canneberge, canneberge ou atocas	vrucht	fruit		
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Ericaceae		rijsbes	myrtille des marais	vrucht, blad	fruit, feuille		
<i>Vaccinium vitis- idaea</i> L.	Ericaceae		rode bosbes	airelle, airelle vigne d'ida, airelle rouge	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 6,8 g gedroogd blad. De etikettering	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 6,8 g de feuille séchée.

Valeriana jatamansi Jones	Valerianaceae	Valeriana wallichii DC.	indische valeriana	valériane d'inde	wortel	racine	moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Valeriana officinalis L.	Caprifoliaceae		echte valeriana	valériane officinale, valériane des collines, valériane à petites feuilles	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te nemen bereiding mag geen valepotriaten bevatten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. La forme finale à consommer ne peut pas contenir de valepotriates.
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Caprifoliaceae	Valeriana locusta L.	veldsla, korensla, ezelsoor	mâche, blanchette, bourselette, clarette, raiponce, oreillette, salade de blé	blad	feuille		
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews	Orchidaceae		vanille-orchidée	vanille	vrucht, oliechans	fruit, oléorésine		
Verbascum densiflorum Bertol.	Scrophulariaceae		stalkaars	bouillon blanc à grandes fleurs, molène à fleurs denses, bonhomme, molène	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Scrophulariaceae		keizerskaars	molène faux-phlomis	bloem	fleur		
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Scrophulariaceae		koningskaars	bouillon blanc à petites fleurs	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenaceae		ijzerhard	verveine sauvage, verveine officinale	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Plantaginaceae		blauwe waterereprijs	véronique mouron d'eau, mouron aquatique	hele plant	plante entière		
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Plantaginaceae		beekpunge	véronique des ruisseaux, cresson de cheval, salade de chouette	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Plantaginaceae		gewone ereprijs, gamander-creprijs	véronique petit-chêne, fausse germandrée	hele plant	plante entière		
<i>Veronica officinalis</i> L.	Plantaginaceae		mannetjesereprijs	véronique officinale, thé d'Europe	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viburnum lantana</i> L.	Adoxaceae		wollige sneeuwbal	viome manciennne, viome lantane, mansienne	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viburnum opulus</i> L.	Adoxaceae		gelderse roos	viome obier, boule-de-neige	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Vicia faba</i> L.	Leguminosae		tuinboon, labboon	fèves, féverolles	gekookt zaad	graine cuite	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij favisme.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de favisme.
<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi	Leguminosae	Phaseolus chrysanthos Savi	adzukiboon	haricot azuki	gekookt of geweeke zaad	graine cuite ou trempée		
<i>Viola calcarata</i> L.	Violaceae		langsporige viooltje	pensée des alpes	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae		maars viooltje	violetle odorante	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viola palustris</i> L.	Violaceae		moerasviooltje	violetle des marais	bovengrondse delen	parties aériennes		

<i>Viola tricolor</i> L.	Violaceae		driekleurig viooltje	pensée sauvage, violette tricolore des jardins, pensée tricolore	bovengrondse delen	parties aériennes		
<i>Viscum album</i> L.	Santalaceae		maretak	gui	tak, blad	branche, feuille		
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Lamiaceae		monnikkenpeper, kuisboom	gattilier, agneau-chaste	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 96 mg gedroogde vrucht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 96 mg de fruit séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Vitex trifolia</i> L.	Lamiaceae				vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitis Vitaceae		druiif, wijnstok, wijngaardstok	vigne cultivée, vigne vinifère	vrucht, bladknop, blad, zaad	fruit, bourgeon de feuille, feuille, graine		
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	Solanaceae		ashwagandha, indiase ginseng	ashwagandha, ginseng indien	hele plant	plante entière		
<i>Xeranthemum annuum</i> L.	Compositae		papierbloem	immortelle	bloem	fleur		
<i>Yucca filamentosa</i> L.	Asparagaceae		palmlilie	yucca filamenteux	bovengrondse delen	parties aériennes		

Yucca schidigera Roel ex Origies	Asparagaceae					parties aériennes			
Zea mays L.	Poaceae	maïs	maïs		bloem, vrucht, haarwortels van gekiemde zaad wortelstok	fleur, fruit, radicelles de graine germée rhizome			
Zingiber officinale Rosc.	Zingiberaceae	gingembre, amome des indes	gember				De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 1,5 g gedroogde wortelstok voor adolescenten en volwassenen en de hoeveelheid equivalent met 0,75 g gedroogde wortelstok voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 1 g gedroogde wortelstok voor zwangere vrouwen (extracten zijn niet toegelaten). Het gebruik voor kinderen onder 6 jaar is niet toegestaan.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 1,5 g de rhizome séché pour adolescents et adultes et à la quantité équivalente à 0,75 g de rhizome séché pour les enfants de 6 à 12 ans. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à 1 g de rhizome séché pour les femmes enceintes (les extraits ne sont pas autorisés). L'utilisation pour les enfants de moins de 6 ans n'est pas autorisée.	
Ziziphus jujuba Mill.	Rhamnaceae		jujubéboom, chinese dadel	jujubier, dattier chinois	bovengrondse delen	parties aériennes			

* Pour calculer la teneur "totale" en anthranoïdes, il faut déterminer les teneurs de chaque composant séparément et ensuite, en fonction des dosages administrés, en faire la somme. Pour les mélanges de différentes espèces de plantes, la teneur totale est limitée à la dose maximale autorisée de l'ingrédient auquel s'applique la dose la plus faible en cas d'utilisation simple.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

* Het "totaal" gehalte aan anthranoiden dient berekend te worden via bepaling van de gehalten in de afzonderlijke grondstoffen en vervolgens, op basis van de toegediende mengverhoudingen, gesommeerd te worden. Bij mengsels van verschillende plantensoorten het totaal gehalte te beperken tot de maximale dosis toegelaten voor het ingrediënt waarvoor de laagste dosis geldt bij enkelvoudig gebruik.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE

De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL