

CABINET

Arrêté n°2021-125/MAAHM/CAB
portant mise à jour de la liste des organismes
nuisibles faisant l'objet de quarantaine végétale au
Burkina Faso.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS
HYDRO-AGRIQUES ET DE LA MECANISATION

Visa DCE/EF n°0317

- Vu la Constitution ;
- Vu le Décret n°2021-0001/PRES du 05 janvier 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le Décret n°2021-000628/PRES/PM du 30 juin 2021 portant remaniement du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2021-0023/PRES/PM/SGG-CM du 1er février 2021 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2016-027/PRES/PM/SGG-CM du 23 février 2016 portant organisation - type des départements ministériels ;
- Vu décret n°2021-0365_/PRES/PM/MAAHM portant organisation du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du 05 Mai 2021 ;
- Vu arrêté n°2020-012/MAAH/CAB portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) du 05 mars 2020 ;
- Vu la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) ;
- Vu le règlement n°7/2007/CM/UEMOA du 6 Avril 2007 relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments ;
- Vu le règlement C/REG.21/11/10 portant harmonisation du cadre structurel et des règles opérationnelles en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'espace CEDEAO ;



Vu la loi n°025-2017/AN du 15 mai 2017 portant protection des végétaux au Burkina Faso ; ✓

Vu Arrêté N°2018-165/ MAAH/CAB établissant la liste des organismes nuisibles faisant objet de quarantaine végétale au Burkina Faso du 18 décembre 2018. ✓

ARRETE :

Article 1: En application de la loi n°025-2017/AN du 15 mai 2017 portant protection des végétaux au Burkina Faso et à son article 12, **il est mis à jour** la liste des organismes nuisibles faisant objet de quarantaine végétale. ✓

Article 2 : On entend par organismes nuisibles de quarantaine, des organismes nuisibles inscrits par une organisation nationale ou régionale de protection des plantes sur une liste officielle comme **absent** du pays ou de la région ou **localisé** et faisant l'objet d'une lutte officielle. ✓

Article 3 : La liste A1 des organismes nuisibles de quarantaine qui ne sont pas encore présents sur le territoire national (**Absent**) est établie pour les cultures suivantes :

		<i>Botrytis allii</i> Munn <i>Botrytis bysso</i>	Afrique du sud, Afrique Saharienne, Australie, Europe, Amérique, Chine, USA
	Bactéries	<i>Erwinia rhapontici</i> , Patel and Kulkari	Canada, USA, Chine, Israël, Pologne, Royaume Uni
		<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> ,	Afrique sub-saharienne, Brésil, Amériques, Asie
	Insectes	<i>Delia antiqua</i> Meig	Egypte, Asie, Antarctique, Amérique, Europe
	Acariens	<i>Aceria tulipae</i> (K.)	Egypte, Afrique du sud, Tanzanie, Europe, Asie, Amérique, Océanie
	Nématodes	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Europe, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Afrique du Nord, Océanie, Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Réunion
		<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Océanie, Afrique du Sud
		<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Lycopersicon esculentum</i>	Champignons	<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. & Laff.	Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Soudan, Afrique du Sud, Asie, Australie
		<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	Canada
		<i>(Passalora fulva)</i> <i>Fulvia fulva</i> (Cooke) Cif. Atti Ist. bot. 1954	Afrique, Côte d'Ivoire, Togo, Sierra Leone, Guinée, Sénégal, Europe, Amérique, Australie,
		<i>Septoria lycopersici</i> Speg.	Afrique du Sud, Cameroun, Europe, Amérique, Australie, Inde, Ukraine, Sibérie, Etats Baltes, Byelorussie, Transcaucasie, Mordovie
	Phytoplasmes	Aster yellow phytoplasma group	
		<i>Phytoplasma asteris</i>	
	Virus	Potato witches broom phytoplasma Johnston, 1960.	Europe centrale et de l'est, Amérique, Roumanie, Russie, Mexique
		Beet curly top virus (BCTV) Thomas and Mink, 1979.	Afrique, Eurasie, Amérique

Liste A1 : Organismes nuisibles absents au Burkina Faso

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
Allium spp.	<u>Champignons</u>	<i>Botryotinia squamosa</i> Viennot-Bourgin	Amérique du Nord, Europe, Asie
		<i>Peronospora destructor</i> (Berk.) Casp. ex Berk.	Canada, USA, Amérique centrale et australe, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Asie, Australie
		<i>Botryotinia allii</i> (Sawada) W. Yamam	Amérique, Afrique (Egypte), Europe, Océanie
		<i>Alternaria sesami</i> (S.Kawamura) Mohanty & Behera	Amérique, Inde, Cuba, Nigéria, Egypte, Soudan, Ethiopie, Kenya, Tanzanie, Somalie, Mozambique
		<i>Botrytis allii</i> Munn	Amériques, Europe (excepté Espagne et Portugal)
		<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary 1884	Amérique
		<i>Sclerotium cepivorum</i> (actuel <i>Stromatinia</i>), Berk	Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud.
		<i>Stromatinia cepivora</i> (Berk.) Whetzel 1945	Europe, Asie, Amérique, Afrique du nord (Liby, Egypte), Afrique du Sud, Afrique de l'Est (Ethiopie), Australie
		<i>Kluyveromyces marxianus</i> var <i>marxianus</i> (Hansen) van der Walt	Europe, Amérique, Asie, Chine, Japon, Sri-Lanka, Bénin, Afrique de l'Est, Afrique du Sud.
		<i>Puccinia allii</i> (DC.) Rudolphi	Afrique, Europe, Amérique, Canada, Australie, Chine, Inde,
		<i>Puccinia asparagi</i>	Asie, Europe, Amérique du Nord, Pérou, Queensland, Maroc, Afrique de l'Est, Afrique du Sud
		<i>Phytophthora porri</i> Foister, Trans. Bot. Soc. Edinb 1931	Afrique du Sud, Japon, Amérique du Nord, Océanie, Europe
		<i>Urocystis(cephulae) magica</i> Pass., in Thümen 1875	Egypte, Gabon Maroc, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Chili, Pérou.
		<i>Colletotrichum circinans</i> (Berk.) Voglino	Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud.

		Tomato bushy stunt virus (TBSV) Smith, 1937.	Europe, Amérique du Nord et du Sud, Afrique du Nord
		Tomato aspermy virus (TAV) Hammond and Kaper, 1986	Eurasie, Australie, Canada, Japon, Russie Amérique, Chine, Afrique
		Potato witches broom phytoplasma Johnston, 1960.	Europe centrale et de l'est, Amérique, Roumanie, Russie, Mexique
		Tomato Necrotic streak virus	
		Tomato black ring virus	Maroc, Tunisie, USA, Portugal, France, Italie Allemagne et Canada.
	<u>Bactéries</u>	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) (phylotype II et IV)	Ethiopie, Lybie, Malawi, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Amériques, Asie
	<u>Insectes</u>	<i>Keiferia licopersicella</i> Walshingham	Amériques
		<i>Neoleucinodes elegantalis</i> Guenée	Amériques
	<u>Nématodes</u>	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	Europe, Asie, Amérique du Nord et Centrale et du Sud, Afrique du Nord, Sierra Leone
		<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Sud, Algérie, Tunisie
		<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud
	<u>Mauvaises herbes / phanérogames parasites</u>	<i>Orobanche ramosa</i> L.	
		<i>Orobanche aegyptiaca</i> Pers.	
		<i>Orobanche</i> spp.	

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Arachis hypogaea</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phytophthora boehmeriae</i> Sawada	Asie, Australie, Chine, Europe, Inde, Japon, Océanie, Afrique du Sud, Asie, Grèce, Mexique, Océanie, Amérique du Sud.
		<i>Cylindrocladium parasiticum</i> Crous, M.J. Wingf. & Alfenas (1993)	
		<i>Oidium arachidis</i> Chorin 1961	Inde Nepal, Nigeria, Chine Thaïlande
		<i>Colletotrichum arachidis</i> Sawada 1959	Afrique sub-saharienne, Malawi.
	<u>Nématodes</u>	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest (sauf pays sahéliens), Afrique du Sud
		<i>Aphelencoides arachidis</i> Bos	Nigéria, Egypte, Afrique du Sud
		<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Océanie, Afrique du Sud
		<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt, Swart, Vrain & Webster	Afrique du Sud.
<i>Vigna unguiculata</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phakopsora pachyrhizi</i> H. Syd and P. Syd	Amérique, Togo, Bénin, Afrique centrale, Afrique du Sud, Asie, Australie, Russie
		<i>Phakospora ampelopsidis</i>	Amérique du Sud, Asie, USA, Europe
		<i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel	Asie, Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe, Australie, Egypte, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie
	Bactéries	<i>Xyllela fastidiosa</i>	Amérique du Nord, Amérique Latine
	<u>Nématodes</u>	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest (sauf pays sahéliens), Afrique du Sud
<i>Oryza sativa</i>	<u>Champignons</u>	<i>Tilletia barclayana</i> (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Afrique (Sierra Léone), Amérique, Asie, Australie, Europe (Grèce)
		<i>Sphaerulina oryzina</i> Hara	Asie, Afrique, Amérique, Australie

		<i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras.)	Amérique, Afrique (Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud), Europe, Asie, Australie
		<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka	Sierra Léone, Asie, Amérique du Nord, Océanie.
		<i>Entyloma oryzae</i> H. & D. Sydow	Afrique, Asie, France, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud.
		<i>Sclerospora oryzae</i> Brizi	Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud.
	Bactéries	<i>Acidovorax avenae subsp. avenae</i> (Manns), Willuns, Goor, Thielemans, Gills, Kerster, De Ley	Amériques, Asie, Afrique de l'ouest
		<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994	Asie, Colombie, Japon, Corée du sud, Philippines, Amérique du sud, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam
		<i>Burkholderia plantarii</i> (Azegami et al. 1987) Urakami et al. 1994	Japon, Chine, Corée du Sud
		<i>Burkholderia gladioli</i> , (Severini 1913) Yabuuchi et al. 1993	Asie, Amériques, Afrique du sud, Zimbabwe, Algérie, Egypte, Australie
		<i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (Ex Tanni et al.) Miyajima et al.	Afrique du sud, Afrique de l'Est, Afrique centrale Amériques, Asie,

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Oryza sativa</i> (Suite)	Bactéries (suite)	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Van Hall	Asie, Amériques, Océanie, Afrique du sud, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Nigéria
		<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>zizaniae</i> (ex Bowden et percich) Young et al.	Idaho (USA)
		<i>Xanthomonas translucens</i> (Jones et al.) Vauterin et al.	Afrique du Sud, Ethiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Maroc, Tanzanie, Tunisie, Zambie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie
	Insectes	<i>Nephotettix virescens</i> Distant	Asie
		<i>Nephotettix nigropictus</i> Stal	Asie, Australie

		<i>Nephotettix malayanus</i> Ishihara & Kawaze	Asie, Australie, Océanie
		<i>Recilia dorsalis</i> Motschulsky	Asie, Australie, Océanie
		<i>Nilaparvata lugens</i> Stål	Asie, Australie, Océanie
		<i>Leptocorisa acuta</i> Thunberg	Asie, Océanie
	Nématodes	<i>Ditylenchus angustus</i> (Butier) Filipjev	Asie, Egypte, Madagascar, Philippines, Thaïlande
		<i>Aphelencoïdes arachidis</i> Bos	Nigéria, Egypte, Afrique du Sud
		<i>Meloidogyne graminicola</i> Golden & Birchfield	Asie, USA, Afrique du Sud
	Mauvaises herbes	<i>Striga asiatica</i>	Togo, Ghana, Madagascar, Tanzanie, Asie.
		<i>Avena fatua</i> L.	Europe, Asie, Amérique, Afrique septentrionale
		<i>Digitaria insularis</i> L.	Japon, Philippines, Amériques, Océanie

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Zea mays</i>	Champignons	<i>Peronosclerospora philippinensis</i> (W. weston) C. G. et Shaw	Afrique, Europe, Amérique, Asie, Australie
		<i>Physopella zae</i> (Mains) Cummins & Ramachar	Amérique, Caraïbes
		<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai. & Hara	Afrique (Nigéria), Asie
		<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) B. Sutton	Afrique, Europe, Amérique, Asie, Australie
		<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai. & Hara	Afrique (Nigéria), Asie

	<u>Bactéries</u>	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vadaver & Mandel) Davis, Gillaspie, Vadaver and Harris	Canada, Illinois, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, North America, Ontario, South Dakota, USA, Wisconsin
	<u>Insectes</u>	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	USA, Europe
		<i>Spodoptera eridania</i> Stoll	Amérique, Bénin Nigéria, Gabon
	<u>Nématodes</u>	<i>Heterodera zea</i> Graham	USA, Europe Asie, Egypte
		<i>Aphelenoides arachidis</i> Bos	Nigéria, Egypte, Afrique du Sud
		<i>Pratylenchus goodeyi</i> Sher and Allen	Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie) , Nigéria
	<u>Mauvaises herbes</u>	<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze	Togo, Ghana, Madagascar, Tanzanie, Asie.
		<i>Avena fatua</i> L.	Europe, Asie, Amérique, Afrique septentrionale

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Sorghum vulgare</i>	<u>Champignons</u>	<i>Periconia circinata</i> (L. Mangin) Sacc. & D. Sacc. 1906	USA, Europe, Afrique du Sud, Tanzanie, Chine, Australie
	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>holcicola</i> (Elliot 1930) Vauterin, Hoste, Kersters and Swings 1995	Ethiopie, Gambie, Niger, Afrique du Sud, Togo, USA, Europe, Océanie, Asie.
	<u>Insectes</u>	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	USA, Europe
		<i>Spodoptera eridania</i> Stoll	Amérique, Bénin Nigéria, Gabon
	<u>Nématodes</u>	<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt, Swart, Vrain & Webster	Afrique du Sud
		<i>Aphelenoides arachidis</i> Bos	Nigéria, Egypte, Afrique du Sud

	<u>Mauvaises herbes</u>	<i>Pratylenchus goodeyi</i> Sher & Allen	Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie), Nigéria
		<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze	Togo, Ghana, Madagascar, Tanzanie, Asie.
		<i>Avena fatua</i> L.	Europe, Asie, Amérique, Afrique septentrionale
<i>Pennisetum glaucum</i>	<u>Bactéries</u>	<i>Pseudomonas syringae</i> van Hall	Iowa, USA, Australie
		<i>Pantoea agglomerans</i> (Ewing & Fife)	Zimbabwe, Inde
		<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pennamericanum</i> (Pammel) Dowson	Nigéria
	<u>Insectes</u>	<i>Spodoptera eridania</i> Stoll	Amérique, Bénin Nigéria, Gabon
	<u>Mauvaises herbes</u>	<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze	Togo, Ghana, Madagascar, Tanzanie, Asie.
		<i>Avena fatua</i> L.	Europe, Asie, Amérique, Afrique septentrionale

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Dioscorea spp.</i>	<u>Champignons</u>	<i>Penicillium oxalicum</i> Currie & Thom	Afrique Sub-saharienne, Nigéria, Brésil
		<i>Penicillium sclerotigenum</i> T. Yamam. 1955	Chine, Brésil, Japon, Corée
	<u>Virus</u>	Dioscorea green banding mosaic virus (DGBMV) A.Porth and F.Nienhaus, 1986.	Nigéria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo
		Dioscorea latent virus Waterworth et al., 1974.	Puerto Rico .
		Chinese yam necrotic mosaic virus	
	<u>Insectes</u>	<i>Gonoplanea dioscorea</i>	

		<i>Heteroligus meles</i> Bilib	
		<i>Ascalapha odorata</i> L.	Danemark
		<i>Stictococcus vayssierei</i> Richard	Cameroun, République centrafricaine, RDC, Congo, Guinée équatoriale, Gabon et Ouganda
		<i>Dasyses incrustata</i> Meyrick	Nigéria, Danemarck
		<i>Loxura atymnus</i> Stoll	Inde, Indonésie et Malaisie
		<i>Theretra nesus</i> Drury	
		<i>Palaeopus costicollis</i> Marshall	Jamaïque
<i>Solanum tuberosum</i>	Nématodes	<i>Pratylenchus coffeae</i> Sher and Allen	Europe, Asie, Amériques du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique (Ghana, Nigéria, Afrique du Sud, Kenya, Malawi, RD Congo, Madagascar, etc.)
	Champignons	<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i> Pethybridge	Europe, Indonésie, Canada, Australie, USA, Egypte, Inde, Pérou, Iran
		<i>Phytophthora megasperma</i> Drechsler	Japon, Irlande du Nord, Royaume –Uni, Canada, Australie
		<i>Phytophytora parasitica</i> Dastur	Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud.
		<i>Puccinia pittieriana</i> Henn	Centre et sud de l'Amérique
		<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival 1909	Amerique du Sud, Australie, Pologne, Irlande, Nouvel Zelande
	Virus	<i>Tomato aspermy virus</i> (TAV) Hammond and Kaper, 1986	Eurasie, Australie, Canada, Japon, Russie Amérique, Chine, Afrique
		<i>Potato yellowing virus</i> (PYV) Jeffries, 1998.	Chili, Peru, Bolivie
	Bactéries	<i>Clavibacter michiganense</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis, Gillaspie, Vidaver and Harris	Afrique du Sud, Egypte, Kenya, Madagascar, Maroc, Ouganda, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, Amérique, Océanie, Europe
		<i>Clavibacter michiganense</i> pv. <i>sepedonicus</i> (Spieckeman & kotthoff) Davis, Gzllaspie, Vidavar and Harris	Asie, Ameriques, Europe, Caraïbes.
		<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) (phylotype II et IV)	Ethiopie, Lybie, Malawi, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Amériques, Asie
		<i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.	Ameriques du nord et latine, Taïwan

	Phytoplasmes	Patato witches broom phytoplasma	
	Insectes	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Amériques, Europe
		<i>Euzophera osseatelle</i> , Treischeke, 1832	
		<i>Pseudococcus maritimus</i> , Westwood, 1840	Europe, Amérique du nord, Chili
		<i>Empoasca fabae</i> , Harris, 1841	Algérie et Etats-Unis d'Amérique
		<i>Tipula paludosa</i> , Meigen, 1830	Europe, Amérique du nord
		<i>Xylotrupes gideon</i> Guérin-Méneville, 1830	Asie, Océanie
		<i>Epicaerus cognatus</i> , Sharp, 1891	Mexique
		<i>Epilachna fulvos ignata</i>	Mexique
		<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanchard	

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
	Nématodes	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud
		<i>Nacobus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen	Etats-Unis, Amérique Centrale, Amérique du Sud
		<i>Nacobus dorsalis</i> Thorne & Allen, 1944	Etats-Unis, Amérique Centrale, Amérique du Sud
		<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	Europe, Asie, Amérique du Nord et Centrale et du Sud, Afrique du Nord, Sierra Leone
		<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Sud, Algérie, Tunisie
		<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Océanie, Afrique du Sud
		<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Europe, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Afrique du Nord, Océanie, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Ile de la Réunion

		<i>Pratylenchus goodeyi</i> Sher and Allen	Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie) , Nigéria
		<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871	Europe, Russie
	<u>Plantes parasites</u>	<i>Orobanche aegyptiaca</i>	Europe, Afrique du Nord
		<i>Orobanche ramosa</i>	
	<u>Champignons</u>	<i>(Glomerella cingulata)</i> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc 1884	Afrique Sub-saharienne, Rwanda, RDC .
	<u>Virus</u>	<i>Cassava brown streak virus (CBSV)</i> Kitajima and Costa	Afrique du Centre et de l'Est
		Cassava Columbian symptomless Kitajima and Costa, 1979.	Brésil
		Indian mosaic cassava virus Abraham, 1956.	Asie (Inde, Cambodge) ; Sri Lanka
		Cassava frogskin disease	
<i>Manihot esculenta</i>	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cassavae</i> (Whiehe & Dowson) Maraite and Weyns	Kenya, Ouganda, Malawi, Tanzanie, Rwanda
	<u>Phytoplasmes</u>	<i>Cassava antholysis</i>	Amerique latine et du nord ; Europe ; Asie ; Afrique
		Cassava witches broom	Amerique latine et du nord ; Europe ; Asie ; Afrique
		<i>Elsione brascilliensis</i>	Amérique latine et du nord ; Europe ; Asie ; Afrique
	<u>Nématodes</u>	<i>Radopholus similis</i> Race citrus	Côte d'Ivoire
	<u>Insectes</u>	<i>Aonidomytilus albus</i> Cockerell	Afrique, Asie, Amériques
		<i>Stictococcus vayssierei</i> Richard	Cameroun, République centrafricaine, RDC, Congo, Guinée équatoriale, Gabon et Ouganda
	<u>Acariens</u>	<i>Tetranychus sayedi</i> Baker & Pritchard	Inde, RCI, RDC, Congo Kenya
		<i>Tetranychus amicus</i> Meyer & Rodrigues	Maurice, Ile de la Réunion

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Triticum aestivum</i>	<u>Champignons</u>	<i>Tilletia caries</i> (DC.) Tul. & C. Tul.	Asie, Afrique du Sud, Amérique, Australie
		<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	Asie, Ethiopie, Kenya, Algérie, Guinée, Malawi, Mauritanie, Maroc, Maurice, Afrique du Sud, Europe, Australie, Amérique
	<u>Bactéries</u>	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>tessellarius</i> (Carlson & Vidaver) Davis, Gillaspie, Vidaver and Harris	Afrique du Sud, Egypte, Kenya Madagascar, Maroc, Ouganda, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, Amérique, Océanie, Europe
		<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>undulosa</i> (Smith, Jones & Reddy) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings	Europe, Asie, Afrique du Sud, Ethiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Maroc, Tanzanie, Tunisie, Zambie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie
		<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Van Hall	
	<u>Nématodes</u>	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Europe, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Afrique du Nord, Océanie, Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Ile de la Réunion
		<i>Heterodera avenae</i> Wollenweber	Europe, Asie, Amérique du Nord, Australie
		<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt et al.	Afrique du Sud
		<i>Anguina tritici</i> (J.G.Steinbuch) Chitwood	Europe, Australie, Brésil, Asie, Russie, Afrique du Nord et de l'Est
	<u>Mauvaises herbes</u>	<i>Avena fatua</i> L. William L. Halvorson	Europe, Asie, Amérique, Afrique septentrionale

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Glycine max</i>	<u>Champignons</u>	<i>Peronospora manshurica</i> (Naumov) H.	USA, Japon, Islande, Pays Nordiques, Suède
		<i>Phakospora pachyrhizi</i> H.Syd & P.Syd	Amérique, Togo, Bénin, Afrique centrale, Afrique du Sud, Asie, Océanie, Russie
	<u>Virus</u>	Cowpea yellow mosaic virus (CYMV) Chant, 1959	Cuba, Kenya, Tanzanie, Afrique de l'Ouest
	<u>Insectes</u>	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say	Amériques, Europe, Afrique, Océanie
	<u>Nématodes</u>	<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Egypte
		<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Europe, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Afrique du Nord, Océanie, Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Ile de la Réunion
		<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt et al.	Afrique du Sud
		<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Mangifera indica</i>	Acariens	<i>Oligonychus mangiferus</i> (Rhaman and Sapra)	Asie
		<i>Oligonychus yothersi</i>	Amérique centrale
<i>Citrus sp.</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phytophthora hebernalis</i> Carne	RDC, Asie, Amérique, Europe, Océanie
		<i>Phytophthora citricola</i> Sawada	Australie, Antilles, Japon, Portugal, Afrique du Sud, Taiwan, Royaume-Uni
		<i>Phytophthora boehmeriae</i> Sawada	Chine, Océanie, Grèce, Brésil, Afrique du sud, Argentine
	<u>Virus</u>	<i>Citrus xyloporosis virus</i> (CXV) Fawcett and Bitancourt, 1937.	Brésil, Palestine, Israël, Afrique du Sud et du Nord, Californie, Argentine, Mexique
	<u>Bactéries</u>	<i>Xylella fastidiosa</i> Well et al.	Amériques, Europe, Asie.

	<u>Insectes</u>	<i>Icerya purchasi</i> Maskell	Amériques, Europe, Australie, Afrique
		<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell	Amériques, Asie, Australie, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est
		<i>Thrips palmi</i> Karny	RCI, Nigéria, Soudan, Océanie, Amériques
	<u>Nématodes</u>	<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb	Côte d'Ivoire, Nigéria, Europe, Asie
		<i>Radopholus citri</i> Machon & Bridge, 1996	Java, Indonésie
	<u>Acariens</u>	<i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Europe, Asie, Afrique, Océanie
	<u>Plantes parasites</u>	<i>Phragmanthera capitata</i>	Côte d'Ivoire, Cameroun
		<i>Tapinanthus belvisii</i>	Côte d'Ivoire

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Saccharum officinarum</i>	<u>Champignons</u>	<i>Puccinia erianthi</i> Padwick & A. Khan	Inde, Amérique du Sud, Angola, Cameroun, Afrique du Sud, Australie
		<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara	Asie, Nigéria, Amérique, Océanie
	<u>Bactéries</u>	<i>Clavibacter michiganensis subsp. nebrakensis</i> (Vidaver & Mandel)	Amérique du Nord

		<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb) Dye	Ghana, Afrique du Sud, Madagascar, Amérique, Asie, Europe, Océanie
	<u>Nématodes</u>	<i>Aphelencoides arachidis</i> Bos	Nigéria, Egypte, Afrique du Sud
		<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt et al.	Afrique du Sud
		<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud
<i>Musa</i> spp.	<u>Champignons</u>	<i>Bipolaris hawaiiensis</i> (M.B. Ellis) J.Y. Uchida & Aragaki	Thaïlande, Chine, USA

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
	<u>Virus</u>	Banana bunchy top virus Magee	Afrique de l'Est et Centrale, Asie, Chine, Inde, Australie.
	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>musacearum</i> (Yirgou & Bradbury 1968)	Afrique de l'Est et Centrale
	<u>Insectes</u>	<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell	Amériques, Asie, Australie, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est
		<i>Aleurothrixus floccoccus</i> Maskell	Amériques, Europe, Asie, Afrique
		<i>Pseudococcus comstocki</i> Kuwana	USA, Europe, Asie
	<u>Acariens</u>	<i>Tetranychus amicus</i> Meyer & Rodrigues	Ile Maurice, Ile de la Réunion
		<i>Tetranychus lombardinii</i>	

		Baker & Pritchard	
	Nématodes	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud
		<i>Pratylenchus coffeae</i> (Zimmermann) Filipjev & Schuurmans Stekhovem	Europe, Asie, Amériques du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique (Ghana, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Malawi, RD Congo, Madagascar, etc.)
		<i>Pratylenchus goodeyi</i> Sher and Allen	Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda), Nigéria
Acacia senegal	Champignons	<i>Haplophragmiopsis ponderosum</i> (Sydow, Sydow & Butler)	Inde, Pakistan, Burma

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
Anacardium occidentale	Champignons	<i>Cortitium salmonicolor</i> B.	Inde, Nigéria
		<i>Phytophthora palmivora</i> Butler	Amérique, Asie, Europe, Australie, Afrique (Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo Cameroun, etc.)
	Bactéries	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>anacardii</i>	Amérique Latine
Digitaria exilis	Champignons	<i>Ustilago syntherismae</i> (Schwein.) Peck	Espagne
Brassica spp.	Champignons	<i>Peronospora parâsitica</i> f. sp.. <i>brassica</i> (Gäum.) Maire.	Inde, Portugal
		<i>Peronospora parasitica</i> f. sp. <i>rafani</i> Gäum.	Afrique du Sud, Inde, France, Portugal, Ukraine
		<i>Peronospora parasitica</i> f.sp. <i>capsellae</i> (Pers.) de Bary.	Canada
	Virus	Cauliflower mosaïc virus (<i>CaMV</i>) Tompkins, 1937	Afrique de l'est et Centrale, Asie, Chine, Inde, Australie.

	<u>Bactéries</u>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i>	Algérie, Afrique du sud, Asie, Europe, Océanie, Amériques
	<u>Nématodes</u>	<i>Heterodera crucifera</i> Franklin, 1945	Europe, , Turquie, Russie, Amérique du Nord
		<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871	Europe, Russie
<i>Phaseolus vulgaris</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phakospora pachyrhizi</i> H.Syd & P.Syd	Amérique, Togo, Bénin, Afrique centrale, Afrique du Sud, Asie, Australie, Russie
	<u>Bactéries</u>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>cannabina</i> (Sutic & Dowson) Young, Dye & Wikie	Europe, Japon
		<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (ex Smith 1908) Gardan et al. 1992	Asie, Europe, Amériques ; Océanie, Afrique du nord, Afrique du sud, Tanzanie
		<i>Curtobacterium flaccumfasciens</i> pv. <i>Flaccumfasciens</i>	USA, Australie, Canada, Mexique, Amérique latine, Tunisie, Russie

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
	<u>Insectes</u>	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say	Amériques, Europe, Afrique, Océanie
	<u>Nématodes</u>	<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Egypte
		<i>Ditylenchus africanus</i> Wendt et al.	Afrique du Sud
		<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud
<i>Capsicum</i> spp.	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>raphani</i> (White) Dye	Brésil, USA
	<u>Nématodes</u>	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique ddu Sud
<i>Vigna subterranea</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phakospora pachyrhizi</i> H.Syd & P.Syd	Amérique, Togo, Bénin, Afrique centrale, Afrique du Sud, Asie, Australie, Russie

<i>Sesamum indicum</i>	<u>Champignons</u>	<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffon & Maubl.	Inde
		<i>Fusarium solani</i> (Mart.) Sacc.	Inde
	<u>Bactéries</u>	<i>Pseudomonas cichorii</i> (Swingle 1925) Stapp 1928	Asie, Europe, Amériques, Burundi, Afrique du sud, Tanzanie
<i>Daucus carota</i>	<u>Champignons</u>	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magn.) Bri. & Cav.	Ghana, Inde, Nigéria
	<u>Nématodes</u>	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud
		<i>Heterodera carotae</i> (Jones) Quot	Europe, Sud-Ouest de l'Asie, Afrique du Nord, Amérique du Nord, Australie, Amérique du Sud, Ghana
<i>Lactuca sativa</i>	<u>Champignons</u>	<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price 1986	Europe
	<u>Nématodes</u>	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique ddu Sud
<i>Fragaria sp</i>	<u>Nématodes</u>	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema-Bos, 1890) Christie, 1932	Europe
		<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal) Chitwood	Europe, Asie, Amérique du Nord, Centrale et du Sud, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique ddu Sud

Article 4 : La liste A2 fournit les organismes nuisibles de quarantaine qui sont déjà présents dans le pays mais ne sont pas largement répandus et font l'objet d'une lutte active ou d'un programme d'éradication :

4

Liste A₂ : organismes nuisibles présents, localisés et qui font l'objet d'une lutte officielle au Burkina Faso

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Allium</i> spp.	<u>Champignons</u>	<i>Phoma terrestris</i> E. M. Hans.	USA, Mexique, Argentine, Brésil, Australie, Soudan, Egypte, Sierra Léone, Afrique du Sud, Ouganda
		<i>Sclerotium cepivorum</i> Berk.	Canada (Colombie britannique), USA
	<u>Virus</u>	Onion yellow dwarf virus (OYDV) (Bos,1985) Melhus et al., 1929.	Amérique, Europe Asie, Afrique.
	<u>Bactéries</u>	<i>Erwinia chrysanthemi</i> , Burkholder, Mc Fadden and Dimock	
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<u>Virus</u>	Tobacco etch virus (TEV) Purcifull Blakeslee, 1921	Afrique, Asie de l'Est, Amérique, Canada, Chine, Mexique, USA
<i>Arachis hypogaea</i>	<u>Virus</u>	Peanut clump virus (PCV) J.C.Thouvenel	Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Inde
		Peanut mottle virus (PeMoV) Kuhn	Afrique, Asie, Amérique, Australie, Inde, Japon, Taïwan
		African cassava mosaic virus (ACMV) Bock	Afrique, Madagascar, Seychelles, Zanzibar, Pemba.
<i>Vigna unguiculata</i>	<u>Champignons</u>	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara	Inde, Amérique Latine, USA, Europe, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ethiopie, RDC
		<i>Phoma exigua</i> Desm.	Angola, Kenya, Amérique latine
		<i>Elsinoe phaseoli</i> Jenkins	Sud et ouest du Burkina ;
	<u>Bactéries</u>	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones	Burkina Faso (zones humides)

		<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> Burkholder	Burkina Faso (zones humides)
		<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Van Hal	Burkina Faso (zones humides)
	<u>Virus</u>	Blackeye cowpea mosaic virus (BICMV) Anderson, 1955.	Amérique, Afrique, Brésil, Inde, Sri-Lanka, Japon, Taïwan, Thaïlande, Malaisie, Iles Fiji
		Cowpea aphid borne mosaic virus (CABMV) Vidano and Conti, 1965.	Amérique, Afrique, Brésil, Inde, Sri-Lanka Japon, Taïwan, Thaïlande, Malaisie, Iles Fiji
		Cowpea mottle virus (CPMoV) Shoyinka et al., 1978.	Inde, Niger, Nigéria, Côte d'Ivoire, Togo

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Oryza sativa</i>	<u>Champignons</u>	<i>Corallocytophthora oryzae</i> Yu et Zhang	Afrique, Mali, Burundi, Madagascar, Kenya, Côte d'Ivoire
	<u>Bactérie</u>	<i>Xanthomonas oryza</i> pv. <i>oryzicola</i>	
		<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzae</i>	
	<u>Virus</u>	Rice stripe necrosis virus (RSNV) Louvel and Bidaux, 1977.	Côte d'Ivoire, Sierra-Léone (Afrique de l'Ouest)
	<u>Mauvaises Herbes</u>	<i>Eichhornia crassipes</i>	Burkina Faso, Afrique
		<i>Typha domingensis</i>	Burkina Faso, Afrique
<i>Zea mays</i>	<u>Champignons</u>	<i>Peronosclerospora sorghi</i> (Weston & Uppal) Shaw	Afrique, Europe, Amérique, Asie, Australie
		<i>Claviceps gigantea</i> S.F. Fuentes, Isla, Ullstrup & A.E. Rodr.	Mexique
	<u>Bactéries</u>	<i>Pantoea stewartii</i> (Smith)	Afrique de l'ouest, Amérique du nord, Europe, Asie

	<u>Virus</u>	Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Dale, 1965.	Amérique, Chine et Afrique
		<i>Sugar cane mosaic virus</i> (SCMV) Brandes, 1919.	Amérique, Asie, Afrique, Inde.
		<i>Maize chlorotic mottle virus</i> (MCMoV) Hedert and Castillo	Nigéria, Sao Tomé, Tanzanie, Rwanda, Zambie, Togo
	<u>Insectes</u>	<i>Hadromerus sagittarius</i> Olivier	Niger Nigéria Sénégal, Afrique Centrale
<i>Sorghum vulgare</i>	<u>Champignons</u>	<i>Peronosclerospora sorghi</i> (weston and uppal) C. G.Shaw	Afrique, Europe (Italie), Amérique, Asie, Australie
		<i>Claviceps africana</i> Frederickson, Mantle & De Milliano	Afrique, Europe, Amérique, Asie, Australie
	<u>Bactéries</u>	<i>Pantoea steotii</i>	Burkina Faso, Afrique
	<u>Virus</u>	Peanut clump virus (PCV) J.C.Thouvenel	Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Inde
		Maize dwarf mosaic virus (MDMV), Dale, 1965.	Amérique, Chine et Afrique
		Sorghum stunt mosaic virus (SSMV) Mayhew and Flock, 1981	Burkina Faso, Amérique, Asie, Afrique
		Sugarcane Cane mosaic virus (SCMV) Brandes, 1919	Amérique, Chine et Afrique

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Pennisetum glaucum</i>	<u>Virus</u>	Peanut clump virus (PCV) Thouvenel et al., 1974.	Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Inde
		Imperata yellow mottle virus (IYMV) Kaboré, 2002.	Burkina Faso
<i>Dioscorea</i> spp.	<u>Virus</u>	Yam mosaic virus (YMV) Thouvenel and Fauquet, 1977.	Nigéria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo
	<u>Nématodes</u>	<i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & LeHew) Andrassy	Afrique de l'Ouest
		<i>Pratylenchus brachyurus</i> Godfrey	Afrique de l'Ouest
		<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Afrique de l'Ouest
<i>Solanum tuberosum</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary	Afrique, Europe, Amérique, Asie, Australie
		<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthier	Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Allemagne, Pologne, Belgique, Slovénie, USA
	<u>Bactéries</u>	<i>Erwinia carotovora</i>	Afrique, Asie, Amériques, Océanie
	<u>Virus</u>	Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Martin	Péru Amérique du nord, Canada, USA, Afrique.
		Potato virus Y Smith, 1931.	Amérique du nord, Canada, USA, Afrique.
		Potato virus X (PVX) Smith, 1931.	Amérique du nord, Canada, USA, Afrique.
		Potato yellow dwarf virus (PYDV) Barrus and Chupp, 1922	Amérique du nord, Canada, USA, Afrique.

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Manihot esculenta</i>	<u>Champignons</u>	<i>Botryodiplodia theobromae</i> Pat.	Nigéria, Niger, Cameroun
		<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc. In Penz.	Tanzanie, Brésil, Porto Rico, RDC, Bénin
		<i>Cladosporium</i> sp.	Burkina Faso
		<i>Uromyces manihotis</i> P. Henn .	République Dominicaine, Brésil
		<i>Uromyces</i> spp.	République Dominicaine, Brésil
		<i>Exobasidium</i> spp. Woronin	
	<u>Virus</u>	African cassava mosaic virus (ACMV) Warburg; 1894	Afrique, Madagascar, Seychelles, Zanzibar (Pemba)
	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> Vauterin et al.	Burkina Faso (Hauts Bassins, Cascades, Centre ouest), Afrique, Amérique latine, Amérique du nord, Asie
	<u>Acariens</u>	<i>Tetranychus</i> (<i>Mononychellus</i>) <i>tanaioa</i> Bondar	Amérique latine, Afrique
<i>Triticum aestivum</i>	<u>Champignons</u>	<i>Ustilago tritici</i> (Bjerk.) Wint. and <i>T. laevis</i> Kühn	Europe, Nouvelle zélande

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Glycine max</i>	<u>Champignons</u>	<i>Septoria glycines</i> Hemmi.	USA
	<u>Virus</u>	Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) Vidano and Conti, 1965	Amérique, Afrique, Brésil, Inde, Sri Lanka Japon, Taïwande, Thaïlande, Malaisie, Iles Fiji
		Soybean mosaic virus (SMV) Qardener and Kendrick, 1921.	Nigéria, Kenya, Niger, Mauritanie, Mozambique, Amérique
		Cowpea yellow mosaic virus (CYMV) Abbott and Tippet, 1966.	Kenya, Tanzanie, Afrique de l'Ouest
	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cannabis</i> Severin 1978	Amériques
		<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones.	USA, Australie, Canada, Mexique, Amérique latine, Tunisie, Russie
		<i>Xanthomonas phaseoli</i> pv. <i>glycines</i> (Nakano) Dye	Afrique du sud, Afrique de l'est, Afrique du nord, Asie, Canada, Australie, Europe
		<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper) Gardan <i>et al.</i>	Afrique, Asie, Europe, Amérique
		<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Van Hall	Afrique, Asie, Europe, Amérique
		<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i>	Afrique, Asie, Europe, Amérique

<i>Mangifera indica</i>	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>Mangiferaeindica</i>	Afrique, Amérique, Asie
<i>Citrus sp.</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phytophthora citrophthora</i> (Sm et Sm) Leonian	Taiwan
	<u>Virus</u>	<i>Citrus cachexia viroid</i> (CCVd)	Brésil, Palestine, Israël, Afrique du Sud et du Nord Californie, Argentine, Mexique
		<i>Citrus tristeza virus</i> (CTV) Meneghini, 1946.	Dans les zones tropicales et semi tropicales
	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>Citri</i>	Amérique, Asie, Afrique, Océanie
	<u>Nématodes</u>	<i>Radopholus similis</i> Cobb	Afrique de l'Ouest
<i>Saccharum officinarum</i>	<u>Champignons</u>	<i>Urocystis scitaminea</i> Syd.	Iran
	<u>Bactéries</u>	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i>	Afrique, Amérique, Asie, Europe
		<i>Pseudomonas rubrisubalbicans</i>	Afrique, Amérique, Asie, Europe
		<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lapsa</i>	Afrique, Amérique, Asie, Europe
		<i>Xanthomonas albilineans</i>	Afrique, Amérique, Asie, Europe
		<i>Clavibacter xyli</i> pv. <i>Xyli</i>	Afrique, Amérique, Asie, Europe
	<u>Virus</u>	Sugar cane mosaic virus (SCMV) Gold and Martin	Amérique, Asie, Afrique, Inde.
		Peanut clump virus (PCV) Thouvenel et al., 1974	Côte d'Ivoire, Sénégal, Inde
		African cassava mosaic virus (ACMV) Warburg, 1894.	Afrique, Madagascar, Seychelles, Zanzibar, Pemba.
<i>Musa sp</i>	<u>Bactéries</u>	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) (phylotype II)	Amériques
<i>Anacardium occidentale</i>	<u>Champignons</u>	<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffon & Maubl.	Brésil, Nigéria

	<u>Bactéries</u>	<i>Xanthomonas citri</i> pv <i>manguiferae indicae</i>	
<i>Brassica</i> spp.	<u>Bactéries</u>	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	Afrique, Asie, Europe, Amériques, Australie
		<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>	Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amériques
		<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Campestris</i>	Amériques, Afrique, Asie, Europe, Asie, Océanie
		<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>raphani</i>	Asie, USA, Europe
		<i>Pectobacterium carotovorum</i>	

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Phaseolus vulgaris</i>	<u>Champignons</u>	<i>Phoma exigua</i> Desm.	Angola, Kenya, Amérique latine
		<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magn.) Bri. & Cav.	Amerique, Europe, Asie, Afrique Centrale, Sénégal, Mali, Maroc, Lybie, Nigéria
	<u>Virus</u>	Bean common mosaic virus (BCMV) Stewart and Reddick, 1917.	Afrique, Amérique, Asie, Australie, Europe.
		Bean yellow mosaic virus (BYMV) Doolittle and Jones, 1925.	Afrique, Amérique, Asie, Australie, Europe
		Bean southern mosaic virus (BSMV) Zaumeyer and Harter, 1943.	Afrique, Amérique, Europe.

<i>Capsicum</i> spp.	<u>Champignons</u>	<i>Botryodiplodia theobromae</i> Pat.	Inde, Afrique, Océanie
		<i>Phytophthora capsici</i> Leonian	Mexique, Espagne, Afrique, Europe
		<i>Cercospora capsici</i> Heald & Wolf	Asie, Amérique, Afrique, Océanie, Europe
	<u>Virus</u>	Pepper mild mottle virus (PMMoV) McKinney	Amérique, Europe, Japon, Russie, Afrique, Argentine.
		Potato virus X (PVX) Smith	Amérique, Europe, Japon, Russie, Afrique, Argentine.
		Potato virus Y (PVY) Smith	Amérique, Europe, Japon, Russie, Afrique, Argentine.
		Tobacco etch virus (TEV) Purcifull	Afrique, Asie de l'Est, Amérique, Canada, Chine, Mexique, USA

Cultures	Groupes	ONQ	Distribution géographique
<i>Vigna subterranea</i>	<u>Champignons</u>		
	<u>Virus</u>	Blackeye cowpea mosaic virus (BICMV) Anderson, 1955.	Amérique, Afrique, Brésil, Inde, Sri Lanka Japon, Taïwande, Thaïlande, Malaisie, Iles Fiji
		Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) Vidano and Conti, 1965	Amérique, Afrique, Brésil, Inde, Sri Lanka Japon, Taïwande, Thaïlande, Malaisie, Iles Fiji
<i>Sesamum indicum</i>	<u>Champignons</u>	<i>Alternaria brassicicola</i> (Schwein.) Wiltshire	Tanzanie

: Les listes établies ne sont pas les listes définitives, elles doivent être mises à jour lorsque la catégorisation des organismes nuisibles listés change, des organismes nuisibles sont ajoutés ou retirés ou bien il y a eu modification des interdictions, restrictions ou exigences. ✓

Article 6 : Lors des inspections phytosanitaires, l'interception d'un organisme nuisible faisant objet de quarantaine dans un lot entraînera automatiquement la prise de dispositions réglementaires (mise en quarantaine, destruction ou changement d'orientation). ✓

Article 7 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de la loi N°025-2017/AN du 15 mai 2017 portant protection des végétaux au Burkina Faso. ✓

Article 8 : Le Directeur de la Protection des Végétaux et du Conditionnement est chargé en ce qui le concerne de l'application correcte des dispositions du présent arrêté. ✓

Article 9 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera. ✓

Ouagadougou, le

13 SEPT 2021



Salifou OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre de l'Étalon

Ampliations :

- CAB/MAAHM
- SG/MAAHM
- DR Agriculture/MAAHM
- DGPV
- DPVC
- INERA
- UO - JKZ
- UNB
- CNSF
- Tout Poste de Contrôle phytosanitaire
- Intéressés