

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29.10.2015 N 37 "Об установлении требований к сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений"

а основании части первой статьи 21 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 года "О семеноводстве" и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. N 867 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия", Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить требования к сортовым и посевным качествам семян:

зерновых и крупяных сельскохозяйственных растений согласно приложению 1;

зернобобовых, масличных, технических сельскохозяйственных растений согласно приложению 2;

кормовых (однолетних кормовых и медоносных трав, многолетних бобовых и злаковых трав) сельскохозяйственных растений согласно приложению 3;

картофеля согласно приложению 4;

сахарной свеклы согласно приложению 5;

кормовой свеклы согласно приложению 6;

овощных сельскохозяйственных растений согласно приложению 7;

плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений согласно приложению 8;

цветочных сельскохозяйственных растений согласно приложению 9;

других растений, используемых в сельском хозяйстве, согласно приложению 10.

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Министр

Л.К.Заяц

Приложение 1 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ И КРУПЯНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Таблица 1

Требования к сортовым и посевным качествам семян зерновых и крупяных сельскохозяйственных растений (за исключением кукурузы)

№

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные семена

элитные семена

репродукционные семена

первая репродукция

вторая - третья репродукции

последующие репродукции

1

Овес

(пленчатые формы)

(*Avena sativa*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,9

99,7

98,0

98,0

97,0

Зараженность посева головней

%, не более

0

0

0

0,3

0,5

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи

шт./кг, не более

0

10

50

100

230

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

10

40

40

70

в том числе:

трудноотделимых (овсюг)

0

0

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Примесь мешочков головни и их частей

%, не более

0

0

0

0,002

0,002

Примесь склероций спорыньи

%, не более

0

0,01

0,03

0,03

0,05

Всхожесть

%, не менее

92

92

90

90

87

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

2

Овес

(голозерные формы)

(*Avena sativa*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не более

99,9

99,7

98,0

98,0

97,0

Зараженность посева головней

%, не более

0

0

0

0,3

0,5

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи

шт./кг,

не более

0

5

30

60

150

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

5

20

20

70

в том числе:

трудноотделимых (овсюг)

0

0

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Примесь мешочков головни и их частей

%, не более

0

0

0

0,002

0,002

Примесь склероций спорыньи

%, не более

0

0,01

0,03

0,03

0,05

Всхожесть

%, не менее

87

87

85

85

82

Влажность

%, не более

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

3

Пшеница мягкая

(*Triticum aestivum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,9

99,7

98,0

98,0

97,0

Зараженность посева головней:

%, не более

пыльной/твердой

0

0

0

0,1/0,3

0,3/0,5

стеблевой и карликовой

0

0

0

0

0

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи в семенах яровой пшеницы и семян овса в семенах озимой пшеницы

шт./кг,

не более

0

5

20

40

130

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

5

20

20

70

в том числе:

трудноотделимых (овсюг)

0

0

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Примесь мешочков головни и их частей

%, не более

0

0

0

0,002

0,002

Примесь склероций спорыньи

%, не более

0

0,01

0,03

0,03

0,05

Примесь галлов пшеничной нематоды

шт./кг

0

0

0

0

0

Всхожесть

%, не менее

90

90

87

87

85

Жизнеспособность семян озимой пшеницы, высеваемых в год уборки урожая

%, не менее

93

93

90

90

88

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

4

Пшеница твердая

(*Triticum durum* Desf.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,9

99,7

98,0

98,0

97,0

Зараженность посева головней:

%, не более

пыльной/твердой

0

0

0

0,1/0,3

0,3/0,5

стеблевой и карликовой

0

0

0

0

0

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи в семенах яровой пшеницы и семян овса в семенах озимой пшеницы

шт./кг,

не более

0

5

20

40

130

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

5

20

20

70

в том числе:

трудноотделимых (овсюг)

0

0

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Примесь мешочков головни и их частей

%, не более

0

0

0

0,002

0,002

Примесь склероций спорыньи

%, не более

0

0,01

0,03

0,03

0,05

Примесь галлов пшеничной нематоды

шт./кг

0

0

0

0

0

Примесь семян мягкой пшеницы

%, не более

0

0,1

0,3

0,3

0,5

Всхожесть

%, не менее

87

87

85

85

82

Жизнеспособность семян озимой пшеницы, высеваемых в год уборки урожая

%, не менее

90

90

88

88

85

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

5

Гречиха

(*Fagopyrum esculentum* Moench)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи

шт./кг,

не более

0

10

30

30

40

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

10

24

80

100

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Всхожесть

%, не менее

90

90

85

85

85

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

6

Просо

(*Panicum miliaceum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,9

99,8

99,5

99,5

98,0

Зараженность посева обыкновенной головней

%, не более

0

0

0

0,3

0,5

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи

шт./кг,

не более

0

10

20

20

50

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

20

30

100

150

в том числе:

трудноотделимых (куриное просо, вьюнок полевой)

0

0

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

70

70

70

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

7

Сорго

(*Sorghum vulgare Pers.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,0

99,0

95,0

95,0

-

Зараженность посева пыльной головней

%, не более

0

0

0

0,5

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

97,0

97,0

-

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи

шт./кг,

не более

0

12

32

32

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

20

30

100

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

80

75

70

70

-

Влажность

%, не более

13,0

13,0

13,0

13,0

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

-

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

-

8

Рожь

(*Secale cereale* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Зараженность посева твердой и стеблевой головней (в сумме)

%, не более

0

0

0

0,3

0,5

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян овса

шт./кг,

не более

0

5

25

50

150

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

5

30

30

50

в том числе:

трудноотделимых (овсюг)

0

0

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Примесь мешочков головни и их частей

%, не более

0

0

0

0,002

0,002

Примесь склероций спорыньи

%, не более

0

0,03

0,05

0,05

0,07

Всхожесть

%, не менее

90

90

87

87

85

Жизнеспособность семян, высеваемых в год уборки урожая

%, не менее

93

93

90

90

88

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

9

Тритикале

(Triticale trisecies.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,8

99,5

98,0

98,0

96,0

Зараженность посева головней:

%, не более

пыльной и твердой (в сумме)

0

0

0

0,3

0,5

стеблевой и карликовой

0

0

0

0

0

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи в семенах ярового тритикале и семян овса в семенах озимого тритикале

шт./кг,

не более

0

10

50

100

230

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

10

40

40

70

в том числе:

трудноотделимых (овсюг)

0

0

-
-
-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0
0
0
0
0

Примесь мешочков головни и их частей

%, не более

0
0
0
0,002
0,002

Примесь склероций спорыньи

%, не более

0
0,01
0,03
0,03
0,05

Примесь галлов пшеничной нематоды

шт./кг

0
0

0

0

0

Всхожесть

%, не менее

87

87

85

85

82

Жизнеспособность семян, высеваемых в год уборки урожая

%, не менее

90

90

88

88

85

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

10

Ячмень

(*Hordeum sativum* Jessen)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,9

99,7

98,0

98,0

97,0

Зараженность посева головней пыльная/твердая

%, не более

0

0

0

0,1/0,3

0,3/0,5

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

Содержание семян других культурных растений, кроме семян озимой ржи, в семенах ярового ячменя и семян овса в семенах озимого ячменя

шт./кг,

не более

0

5

30

60

230

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг,

не более

0

5

20

20

70

в том числе:

трудноотделимых (овсюг)

0

0

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

0

Примесь мешочков головни и их частей (пыльная и твердая)

%, не более

0

0

0

0,002

0,002

Примесь склероций спорыньи

%, не более

0

0,01

0,03

0,03

0,05

Всхожесть:

%, не менее

семян ярового ячменя

92

92

90

90

87

семян озимого ячменя

90

90

87

87

85

Жизнеспособность семян озимого ячменя, высеваемых в год уборки урожая

%, не менее

93

93

90

90

88

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

Наличие клеща

шт./кг,

не более

0

0

20

20

20

Таблица 2

ТРЕБОВАНИЯ К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН КУКУРУЗЫ
(ZEA)

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные семена

элитные семена

репродукционные семена

первая репродукция

вторая - третья репродукции

гибрид первого поколения

гибрид второго поколения

1

Самоопыленные линии

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая типичность

%, не менее

99,5

99,5

98,0

98,0

-

-

Содержание ксенийных зерен

шт. на

100 початков, не более

20

20

50

50

-

-

Зараженность нигроспориозом, серой и красной гнилями, фузариозом и белью

шт. на

100 початков, не более

300

300

500

500

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

98,0

98,0

-

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

0

0

5

5

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг

0

0

0

0

-

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

-

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

-

-

Всхожесть

%, не менее

92

92

87

87

-

-

Влажность

%, не более

14,0

14,0

14,0

14,0

-

-

2

Сорта и гибридные популяции (кроме сортов-гибридов и самоопыленных линий)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая типичность

%, не менее

99,5

99,5

98,0

98,0

-

-

Содержание ксенийных зерен

шт. на

100 початков, не более

20

20

300

300

-

-

Зараженность нигроспориозом, серой и красной гнилями, фузариозом и белью

шт. на

100 початков, не более

300

300

500

500

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

98,0

98,0

-

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

0

0

5

5

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг

0

0

0

0

-

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

0

0

0

0

-

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

-

-

Всхожесть

%, не менее

92

92

90

90

-

-

Влажность

%, не более

14,0

14,0

14,0

14,0

-

-

3

Сорта-гибриды

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая типичность

%, не менее

для родительских компонентов

-

-

-

-

98,0

98,0

для товарного назначения

-

-

-

-

98,0

-

Уровень гибридности семян:

%, не менее

простых гибридов

-

-

-

-

95

-

двойных межлинейных и трехлинейных гибридов

-

-

-

-

85

-

Содержание ксенийных зерен:

шт. на

100 початков, не более

для родительских компонентов

-

-

-

-

50

400

для товарного назначения

-

-

-

-

600

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

для родительских компонентов

-

-

-

-

98,0

98,0

для товарного назначения

-

-

-

-

98,0

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели):

шт./кг, не более

для родительских компонентов

-

-

-

-

0

5

для товарного назначения

-

-

-

-

5

-

Содержание семян сорных растений

шт./кг

-

-

-

-

0

0

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая)

-

-

-

-

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

-

-

-

-

0

0

Всхожесть

%, не менее

-

-

-

-

92

92

Влажность

%, не более

-

-

-

-

14,0

14,0

Приложение 2 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН ЗЕРНОБОБОВЫХ,
МАСЛИЧНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные семена

элитные семена

репродукционные семена

первая репродукция

вторая - третья репродукции

последующие репродукции

гибрид первого поколения

1

Бобы кормовые

(*Vicia faba* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,7

99,5

98,0

98,0

98,0

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

97,0

97,0

96,0

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

0

0

5

5

7

-

Заселенность зерновкой

шт./кг

0

0

0

0

0

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

0

2

2

3

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

90

90

87

87

85

-

Влажность

%, не более

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

-

2

Вика мохнатая и паннонская (озимая)

(*Vicia rannonica* Grants)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97,0

97,0

96,0

96,0

94,0

-

Содержание семян других культурных растений

%, не более

0

0,1

-

-

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

10

20

60

60

80

-

в том числе:

трудноотделимых (куколь обыкновенный, вьюнок полевой)

0

4

-

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

85

85

80

80

80

-

Влажность

%, не более

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

-

3

Вика посевная

(*Vicia savita* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,7

99,5

98,0

98,0

95,0

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

98,0

97,0

97,0

95,0

-

Содержание семян других культурных растений

%, не более

0

0,1

-

-

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

10

20

60

60

80

-

в том числе:

трудноотделимых (куколь обыкновенный и вьюнок полевой)

0

4

-

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

85

85

80

80

75

-

Влажность

%, не более

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

-

4

Горох посевной, горох полевой (пелюшка)

(*Pisum sativum* L., *Pisum arvense* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,8

99,6

97,0

97,0

96,0

-

Засоренность посевного гороха полевым горохом

%

0

0

-

-

-

-

Засоренность полевого гороха посевным горохом

%

0

0

-
-
-
-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

97,0

97,0

95,0

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

3

5

20

20

40

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

2

10

10

15

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Примесь семян полевого гороха в посевном горохе

%

0

0

-

-

-

-

Примесь семян посевного гороха в полевом горохе

%

0

0

-

-

-

-

Заселенность живой гороховой зерновкой

шт./кг, не более

0

10

10

10

10

-

Всхожесть

%, не менее

90

90

85

85

80

-

Влажность

%, не более

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

-

5

Горчица сарептская, горчица белая

(*Brassica juncea* Czern *Sinapis alba* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,6

99,0

97,0

97,0

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

98,0

98,0

-

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

40

40

320

320

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

40

40

400

400

-

-

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

0

0

0

0

-

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

-

-

Всхожесть

%, не менее

90

85

85

85

-

-

Влажность

%, не более

12,0

12,0

12,0

12,0

-

-

6

Лен масличный

(*Linum usitatissimum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,7

99,0

98,0

98,0

97,0

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

97,0

97,0

96,0

-

Содержание семян других культурных растений

шт./кг, не более

20

20

40

40

60

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

120

140

500

500

1500

-

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

0

0

0

0

0

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

20

-

Зараженность болезнями (фузариоз, антракноз, крапчатость, бактериоз)

%, не более

10,0

15,0

20,0

20,0

30,0

-

Всхожесть

%, не менее

90

85

80

80

80

-

Влажность

%, не более

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

-

7

Лен долгунец

(*Linum usitatissimum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,7

99,0

98,0

98,0

90,0

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

97,0

97,0

97,0

-

Содержание семян других культурных растений

шт./кг, не более

20

20

40

40

60

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

200

360

860

860

1700

-

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

0

0

0

0

0

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

0

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

20

-

Зараженность болезнями (фузариоз, антракноз, крапчатость, бактериоз)

%, не более

10,0

15,0

20,0

20,0

30,0

-

Всхожесть

%, не менее

90

90

80

80

80

-

Влажность

%, не более

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

-

8

Люпин белый однолетний

(Lupinus albus L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,8

99,6

98,0

98,0

96,0

-

Зараженность антракнозом

%

0

0

0

0

0

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

96,0

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели), всего

шт./кг, не более

0

0

10

10

15

-

в том числе трудноотделимых растений (гороха посевного и полевого)

0

0

-

-

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

0

5

5

10

-

в том числе ядовитых растений (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Содержание алкалоидных зерен (при посеве на зеленый корм в чистом виде до 5%;
до 10% при посеве в смеси с овсом, кукурузой или подсолнечником при условии, что
наличие алкалоидных семян не превышает 5% от общей массы смеси)

%, не более

0

0,5

2

2

3

-

Зараженность антропоидом

%

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

87

87

80

80

80

-

Влажность

%, не более

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

-

9

Люпин (желтый, узколистый)

(*Lupinus luteus* L., *angustifolius* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота (кроме сортов горького люпина)

%, не менее

99,6

99,0

98,0

98,0

96,8

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

97,0

97,0

95,0

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели), всего

шт./кг, не более

3

10

40

40

50

-

в том числе трудноотделимых растений (гороха полевого и посевного)

0

0

0

-

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

5

20

20

30

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Содержание алкалоидных зерен (при посеве на зеленый корм в чистом виде до 5%;

до 10% при посеве в смеси с овсом, кукурузой или подсолнечником при условии, что наличие алкалоидных семян не превышает 5% от общей массы смеси)

%, не более

0

0,5

2

2

3

-

Зараженность антракнозом

%

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

87

85

80

80

75

-

Влажность

%, не более

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

-

10

Рапс, сурепица

(озимая форма)

(*Brassica napus oleifera* DC)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,8

99,6

97,2

97,2

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

96,0

96,0

-

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

%, не более

0

0

0,08

0,08

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,04

0,08

0,44

0,44

-

-

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

-

-

Массовая доля глюкозинолатов

рапс/сурепица

%, не более

2,0/3,0

2,0/3,0

2,0/3,0

2,0/3,0

-

-

Массовая доля эруковой кислоты в безэруковых сортах

%, не более

3,0

3,0

-

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

70

-

-

Влажность

%, не более

12,0

12,0

12,0

12,0

-

-

11

Рапс, сурепица

(яровая форма)

(*Brassica napus oleifera* DC)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,8

99,6

97,2

97,2

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

96,0

96,0

-

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

%, не более

0

0

0,08

0,08

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,04

0,08

0,44

0,44

-

-

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

-

-

Массовая доля глюкозинолатов

рапс/сурепица

%, не более

2,0/3,0

2,0/3,0

2,0/3,0

2,0/3,0

-

-

Массовая доля эруковой кислоты в безэруковых сортах

%, не более

3,0

3,0

-

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

70

-

-

Влажность

%, не более

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

12

Рыжик

(*Camelina sativa* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,7

99,3

95,0

95,0

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

97,0

92,0

92,0

-

-

Содержание семян других культурных растений

шт./кг, не более

80

120

200

200

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

160

200

800

800

-

-

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

0

0

0

0

-

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками, кроме клеща

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Наличие клеща

шт./кг, не более

0

0

20

20

-

-

Всхожесть

%, не менее

90

85

80

80

-

-

Влажность

%, не более

13,0

13,0

13,0

13,0

-

-

13

Соя

(*Glycine hispida* Maxim.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,7

99,5

98,0

98,0

97,2

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

98,0

95,0

95,0

95,0

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

0

5

8

8

10

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

3

5

10

10

15

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

90

85

80

80

75

-

Влажность

%, не более

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

-

14

Фасоль

(*Phaseolus vulgaris* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,8

99,6

99,2

99,2

98,4

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

99,0

98,0

98,0

97,0

-

Содержание семян других культурных растений

шт./кг, не более

0

0

5

5

15

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

0

1

1

2

-

в том числе ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Заселенность зерновкой

шт./кг

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

90

90

87

87

85

-

Влажность

%, не более

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

-

15

Чечевица пищевая крупносемянная

(Ervum lens)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,8

99,6

98,0

98,0

96,8

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

98,0

95,0

95,0

95,0

-

Содержание семян других культурных растений

шт./кг, не более

2

6

10

10

30

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

0

5

5

10

-

в том числе:

-

трудноотделимых (плоскосемянная вика)

0

0

-

-

-

-

ядовитых (гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая)

0

0

0

0

0

-

Всхожесть

%, не менее

90

85

80

80

75

-

Влажность

%, не более

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

-

16

Подсолнечник

(*Helianthus annuus* L.)

Сорта (кроме родительских компонентов сортов-гибридов первого поколения, сортов-гибридов первого поколения)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая типичность

%, не менее

99,9

99,8

98,0

98,0

-

-

Панцирность

%, не менее

99,0

98,0

96,0

96,0

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

100

99

98

98

-

-

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

0

3

10

10

-

-

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

0

2

5

5

-

-

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

0

0

0

0

-

-

Масса 1000 семян

г, не менее

50

50

50

50

-

-

Примесь склероций белой и серой гнили

шт./кг, не более

0

0

3

3

-

-

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

0

0

-

-

Всхожесть

%, не менее

92

92

87

87

-

-

Влажность

%, не более

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

Сорта-гибриды первого поколения и их родительские компоненты

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая типичность

%, не менее

99,9

98,0

98,0

98,0

-

98,0

Панцирность (только материнских компонентов)

%, не менее

99,0

98,0

97,0

97,0

-

97,0

Степень стерильности материнских форм

%, не менее

98,0

95,0

95,0

95,0

-

-

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

97,0

97,0

97,0

-

98,0

Содержание семян других культурных растений (не распространяется на семена, используемые для посева на кормовые цели)

шт./кг, не более

5

10

10

10

-

10

Содержание семян сорных растений, всего

шт./кг, не более

3

5

5

5

-

5

в том числе ядовитых (чемерица белая, болиголов пятнистый, лютик едкий и ползучий)

0

0

0

0

-

0

Примесь склероций белой и серой гнили

шт./кг, не более

0

0

3

3

-

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

0

0

-

0

Всхожесть

%, не менее

85

85

80

80

-

85

Влажность

%, не более

10,0

10,0

10,0

10,0

-

10,0

Приложение 3 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН КОРМОВЫХ (ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ И МЕДОНОСНЫХ ТРАВ, МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ И ЗЛАКОВЫХ ТРАВ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные и элитные семена

репродукционные семена

1. Однолетние кормовые и медоносные травы

1.1

Амарант

(*Amaranthus L.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92,0

90,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,4

0,8

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

20

40 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

80

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1.2

Ежовник хлебный (пайза)

(*Echinochloa frumensea*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

97,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

120

240 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,02

0,1

склеротий спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

90

85

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1.3

Люцерна хмелевидная

(*Medicago lupulina* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92,0

90,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,4

0,4

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

70

Влажность

%, не более

13,0

13,0

1.4

Могар

(*Setaria moharia* (Alef.) Mansl.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

97,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

120

240 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,02

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

90

85

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1.5

Перко

(Perko)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

92,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,2

0,2

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,2

0,4 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

120

240 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

12,0

12,0

1.6

Просо африканское

(*Amerikanum* (L.) *Pennisetum* Schumann)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92,0

90,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,4

0,4

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,8

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

200

200 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,02

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

70

65

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1.7

Просо кормовое

(*Panicum miliaceum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

95,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

120

240 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,02

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1.8

Райграс однолетний

(*Lolium multiflorum* Lam.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

120

240 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,02

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1,9

Редька масличная

(*Rafanus sativus* L. var.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

92,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,3

0,3

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

75

Влажность

%, не более

12,0

12,0

1.10

Сераделла посевная

(*Ornithopus sativus* Broth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

95,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,2

0,3

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,3

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

70

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1.11

Сорго сахарное, суданка (суданская трава), сорго-суданковый гибрид

(*Sorghum saccharatum* covn, *effusum* lacushev, *sorghum sudanense* (Piper.) Stapf.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99,0

98,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,2

0,2

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,2

0,5 <*>

в том числе наиболее вредных (вязель пестрый (*Coronilla varia* L.), сорго алеппское (*Sorghum halepense* L.))

шт./кг, не более

20

20 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,02

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

80

Влажность

%, не более

15,0

15,0

1.12

Фацелия

(*Fhacelia tanacetifolia* Benth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97,0

95,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,8

0,8

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,8

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), подмаренник цепкий (*Galium aparine* L.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

70

Влажность

%, не более

14,0

14,0

1.13

Чумиза

(Sefaria (L.) Beauv)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

95,0

Содержание семян других видов однолетних кормовых и медоносных трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.))

шт./кг, не более

120

240 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,02

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

2. Многолетние бобовые травы

2.1

Галега восточная

(*Galega orientalis* Lam.)

Требования к сортовым качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,1

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Примесь склеротий клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

70

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.2

Донник белый, лекарственный

(*Melilotus albus* Medik, *officinalis* (L.) Desr.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

94,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

75

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.3

Клевер гибридный диплоидный

(*Trifolium hybridum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,2 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь склероций клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

70

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.4

Клевер гибридный тетраплоидный

(*Trifolium hybridum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь склероций клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

70

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.5

Клевер луговой диплоидный

(*Trifolium pratense* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,2

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Примесь склеротий клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2,6

Клевер луговой тетраплоидный

(*Trifolium pratense* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

94,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,3

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Примесь склероций клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.7

Клевер ползучий

(*Trifolium repens* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92,0

88,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,6

1,2 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

400 <*>

Примесь склероций клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

70

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.8

Люцерна желтая

(серповидная)

(*Medicago falcata* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь склеротий клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

70

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2,9

Люцерна изменчивая

(*Medicago varia* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

94,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,3

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь склероций клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.10

Люцерна посевная

(синяя)

(*Medicago sativa* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M.B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Примесь склероций клеверного рака и тифули

%

0

0

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

80

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.11

Лядвенец рогатый

(*Lotus corniculatus* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

90,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.12

Лядвенец топяной

(болотный)

(*Lotus uliginosus* Schkuhr)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90,0

90,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

1,0

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

200 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

65

65

Влажность

%, не более

13,0

13,0

2.13

Эспарцет закавказский

(кавказский)

(*Onobrihis transcaucasia* Grossh.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

96,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,2

0,2

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,1

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

20

50 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

80

Влажность

%, не более

14,0

14,0

2.14

Эспарцет песчаный

(дикий)

(*Onobrihis arenarid*

(Kit)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

96,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,3

0,3

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,3

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

40

50 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

14,0

14,0

2.15

Эспарцет посевной, виколистный, обыкновенный

(*Onobrihis vicifolia Scop.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98,0

97,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,3

0,3

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,2

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

40

50 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

80

Влажность

%, не более

14,0

14,0

2.16

Чина луговая

(*Lathirus pratensis* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

95,0

Содержание семян других видов многолетних бобовых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,8

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

100

100 <*>

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

75

Влажность

%, не более

14,0

14,0

3. Многолетние злаковые травы

3.1

Бекмания обыкновенная

(*Beckmannia eruciformis* (L.) Host.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M.), пырей ползучий (*Hitrikiya Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.2

Двукосточник тростниковый

(*Phalaris arundinacea* (L.))

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiya Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

240

320 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склеродий спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.3

Ежа сборная

(*Dactylis glomerata* (L.))

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

90,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

70

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.4

Кострец безостый, прямой

(*Bromus inermis* (Leys.) Holub., *Bromus erecta* Huds.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

1,5 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

240

320 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.5

Лисохвост луговой, вздутый

(*Alopekurus pratensis* L., *Alopekurus ventricosus* Pers.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85,0

80,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hordeum repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

70

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.6

Лисохвост тростниковый

(*Alopecurus arundinaceus* Poir.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85

80

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiа Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

70

60

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.7

Мятлик луговой

(*Poa pratensis* (L.))

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90,0

85,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,8

1,5 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrihia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

400

600 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

70

60

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.8

Мятлик болотный, обыкновенный

(*Poa palustris* L., *Poa trivialis* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85,0

85,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,6

0,6

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

1,0

1,5 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Heteropogon repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

350

400 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

60

50

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3,9

Овсяница бороздчатая, овечья

(*Festuca valesiaca* Cand., *Festuca ovina* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

90,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

-

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

-

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

-

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

-

50

Влажность

%, не более

-

15,0

3.10

Овсяница красная

(*Festuca rubra* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90,0

85,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

1,0 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

75

65

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.11

Овсяница луговая

(*Festuca pratensis* Huds.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Heteropogon repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

80

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.12

Овсяница тростниковая

(*Festuca arundinacea* Schred.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiya Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

200

300 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

70

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.13

Полевица гигантская

(*Agrostic gigantea* Roth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90,0

85,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hordeum repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

400

600 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.14

Райграс высокий

(*Arrhenatherum elatius* (L.) I. et S.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

95,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

240

320 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.15

Райграс многоукосный, многоцветковый

(*Lolium multiflorum* Lam.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,4

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiya Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

240

320 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

85

80

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.16

Райграс пастбищный, многолетний

(*Lolium perenne* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

0,8 <*>

в том числе:

наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

240

400 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.17

Тимофеевка луговая

(*Phleum pratense* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92,0

90,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,2

0,6 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

100

200 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

3.18

Фестулолиум

(Festulolium)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

Содержание семян других видов многолетних злаковых трав (не распространяется на семена, предназначенные для посева на кормовые цели)

%, не более

0,5

0,5

Содержание семян сорных растений, всего

%, не более

0,5

0,8 <*>

в том числе наиболее вредных (бодяк щетинистый (*Cirsium setosum* M. B.), пырей ползучий (*Hitrikiia Nevski repens* (L.)), клоповник крупковидный (*Lepidium draba* L.), вязель пестрый (*Coranilla varia* L.))

шт./кг, не более

250

400 <*>

Примесь:

%, не более

головневых мешочков и их частей

0,05

0,1

склероций спорыньи

0,05

0,2

Заселенность живыми вредителями и их личинками

шт./кг

0

0

Всхожесть

%, не менее

80

75

Влажность

%, не более

15,0

15,0

<*> Допускается превышение значений в семенах третьей и последующих репродукций до двух процентов, в том числе наиболее вредных сорных растений на 300 шт./кг.

Приложение 4 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства					
		оригинальные микрорастения в культуре in vitro	первое клубне поколение	питомник предварительно размножения	супер-элиты	элитные семена	репродукционные семена
Требования к сортовым качествам семян							
Сортовая чистота посадок	%, не менее	-	100	100	100	100	98,5
Наличие растений, пораженных болезнями (по внешним признакам), всего		-	0	0,4	0,4	4,0	10,0
в том числе:							
легкими вирусными болезнями (обыкновенная мозаика, мозаичное закручивание листьев)		-	0	0,4	0,4	3,0	-
тяжелыми вирусными болезнями (морщинистая мозаика, полосчатая мозаика, скручивание листьев)	%, не более	-	0	0	0	1,0	10,0
почвенными вирусами (раттл, моп-топ)		-	0	0	0	1,0	2,5
виroidными (готика-веретеновидность клубней)		-	0	0	0	0	0
бактериальными (черная ножка)		-	0	0	0	0	2,0
Наличие растений, пораженных вирусной и бактериальной инфекцией в скрытой форме, всего	%, не более	-	1,0	5,0	10,0	-	-
в том числе:							
вирусами X, S, M		-	1,0	4,5	9,0	-	-
вирусами Y, L, A		-	0	0,5	1,0	-	-
бактериальной инфекцией (черная ножка)		-	0	0	0	-	-
Требования к посевным качествам семян							
Размер клубней:	мм						
для сортов с удлинённой формой		-	7 - 55	28 - 55	28 - 55	28 - 55	28 - 55
для сортов с округло-овальной формой		-	9 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Наличие клубней, не соответствующих по размеру	%, не более	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Внешний вид		растения зеленой окраски с четырьмя и, с развитой	клубни целые, с окрепшей кожурой по форме и окраске типичные соответствующему ботаническому сорту, сухие, непроросшие (при весенней реализации с ростками длиной не более 5 мм)				

		корневой системой и листовым аппаратом					
Наличие растений, переросших с искривленными стеблями, других ботанических сортов	шт.	0	-	-	-	-	-
Наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легкообламываемыми наростами, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой более 1/3 поверхности клубня	%, не более	-	0	0	0	0	0
Наличие клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины тканей клубней глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм)	%, не более	-	5	5	5	5	5
Наличие клубней с повреждениями вредителями (проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками на площади более 1/3 поверхности клубня и глубиной более 5 мм без повреждения глазков)	%, не более	-	5	5	5	5	5
Наличие клубней, других ботанических сортов	%, не более	-	0	0	0	0	0,5
Наличие клубней, пораженных болезнями, всего в том числе:		-	0,5	6,0	6,0	8,0	12,0
мокрой гнилью		-	0	0	0	1,0	1,0
черной ножкой		-	0	0	0	0	1,0
фитофторозом		-	0	0,5	0,5	1,0	2,5
резиновой, сухими гнилями (фомоз, фузариоз, антракноз)	%, не более	-	0	0,5	0,5	1,0	2,0
стеблевой нематодой обыкновенной и серебристой паршой (поражение более 1/3 поверхности клубней)	%, не более	-	0	0	0	0	0,5
ризоктониозом (при поражении от 1/10 до 1/4 включительно поверхности клубней)		-	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Наличие земли и посторонних примесей	%, не более	-	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Наличие растений, клубней, пораженных вирусной и	%, не более	0	1,0	10	10	-	-

бактериальной инфекцией в скрытой форме, всего							
в том числе:							
вирусами X, S, M	0	1,0	9,0	9,0	-	-	
вирусами Y, L, A	0	0	1,0	1,0	-	-	
бактериальной инфекцией (черная ножка)	0	0	0	0	-	-	

Приложение 5 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

N п/п	Наименование сельскохозяйственного растения	Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единицы измерения	Допустимые значения признаков калиброванных семян						
				Базисная величина	некалиброванных семян	недражированные	дражированные	нешлифованные	шлифованные	
				перво	второ	перво	второ	перво	второ	
				го	го	го	го	го	го	
				класс	класс	класс	класс	класс	класс	
				а	а	а	а	а	а	
Требования к посевным качествам семян										
		Чистота семян	%, не менее	97,0	94,0	-	-	-	-	-
		Содержание трудноотделимых семян других растений (семена пшеницы, ржи, ячменя, гороха, овса, гречихи, вики, подсолнечника, членики дикой редьки, плоды просвирника, цикория, подмаренника), всего	%, не более	-	0,4	-	-	-	-	-
1	Диплоидная и полиплоидная односемянная, заготавливаемая заводами для подготовки к промышленным посевам	в том числе сорных		-	0,2	-	-	-	-	-
		Стебельки и плоды со стебельками, превышающим и по длине 1 см	шт./не более	-	100	-	-	-	-	-
		Всхожесть	%, не менее	70	65	-	-	-	-	-
		Влажность	%, не более	14,5	15,0	-	-	-	-	-
		Доброкачество	%, не менее	-	85,0	-	-	-	-	-
		Односемянность	%, не менее	-	80,0	-	-	-	-	-
		Одноростковость	%, не менее	-	80,0	-	-	-	-	-

	Содержание семян диаметром: до 3,25 мм	%, не более	-	15,0	-	-	-	-	-	-	
	более 5,5 мм		-	20,0	-	-	-	-	-	-	
	Требования к посевным качествам семян										
	Чистота семян	%, не менее	-	-	98,0	99,0	-	-	-	-	
2	Фабричная односемянная диплоидных сортов, диплоидных и триплоидных гибридов на основе цитоплазматической мужской стерильности	Содержание семян других растений, всего в том числе сорных	%, не более	-	-	0,2	-	-	-	-	
		Всхожесть	%, не менее	-	-	80	90	-	-	-	
		Влажность	%, не более	-	-	14,5	10,0	-	-	-	
		Одноростковость	%, не менее	-	-	85,0	95,0	-	-	-	
		Выравненность	%, не менее	-	-	85,0	94,0	-	-	-	
		Диаметр семян основной фракции	мм	-	-	3,5 - 4,75	3,5 - 4,75	-	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян										
	Чистота семян	%, не менее	-	-	-	97,0	-	97,0	99,0	99,0	
	Содержание семян других растений, всего в том числе сорных	%, не более	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	
			-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	
3	Диплоидная многосемянная, предназначенная для промышленных посевов	Всхожесть	%, не менее	-	-	-	-	85	75	80	75
		Влажность	%, не более	-	-	-	-	14,5	14,5	14,0	14,0
		Одноростковость	%, не менее	-	-	-	-	-	-	70,0	65,0
		Выравненность	%, не менее	-	-	-	-	85,0	80,0	90,0	85,0
		Стебельки и плоды со стебельками, превышающим и по длине 1 см	шт./кг, не более	-	-	-	-	20	20	10	10

Приложение 6 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства			
		оригинальные семена	элитные семена	репродукционные семена (первая -	гибридные семена

				третья)	
Требования к сортовым качествам семян					
Сортовая чистота:					
первая категория (семенные цели)	%, не менее	98	98	98	-
вторая категория	менее	-	-	95	-
третья категория		-	-	85	-
Содержание других сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории					
	%, не более	-	-	2	-
Сортовая принадлежность					
	%, не менее	-	-	-	85
Примесь родительских форм					
	%, не более	-	-	-	5
Общие требования к посевным качествам семян					
Содержание фрагментов стеблей свеклы и (или) семена с фрагментами стебля, превышающие по длине 1 см					
	шт./кг, не более	50	50	50	50
Влажность					
	%, не более	14	14	14	14
Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками					
	шт./кг	0	0	0	0
Дополнительные требования к посевным качествам семян многосемянная диплоидная					
Чистота семян					
	%, не менее	97	97	94	-
Содержание семян других видов растений, всего					
	%, не более	0,5	0,5	1	-
в том числе сорных					
		0,2	0,2	0,5	-
Содержание семян диплоидов					
	%, не менее	85	85	85	-
Размер фракции калиброванных или некалиброванных семян					
	мм	3,5 - 5,5	3,5 - 5,5	3,5 - 5,5	-
Наличие семян, не соответствующих установленному пределу					
	%, не более	10	10	10	-
Всхожесть					
	%, не менее	75	75	65	-
		80	80	70	-
многосемянная триплоидная или тетраплоидная					
Чистота семян					
	%, не менее	97	97	94	-
Содержание семян других видов растений, всего					
	%, не более	0,5	0,5	1	-
в том числе сорных					
		0,2	0,2	0,5	-
Содержание семян тетраплоидов					
	%, не менее	85	85	85	-
Размер фракции калиброванных или некалиброванных семян					
	мм	3,5 - 5,5	3,5 - 5,5	3,5 - 5,5	-
Наличие семян, не соответствующих установленному пределу					
	%, не более	10	10	10	-
Всхожесть					
	%, не менее	70	70	60	-
		75	75	70	-
многосемянная гибридная					
Чистота семян					
	%, не менее	97	97	94	-
Содержание семян других видов растений, всего					
	%, не более	0,5	0,5	1	-
в том числе сорных					
		0,2	0,2	0,5	-
Размер фракции калиброванных семян					
	мм	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	-
Наличие семян, не соответствующих установленному пределу					
	%, не более	5	5	5	-
Всхожесть					
	%, не менее	70	70	60	-
		75	75	70	-

односемянная диплоидная					
Чистота семян	%, не менее	98	98	94	-
Содержание семян других видов растений, всего	%, не более	0,5	0,5	1	-
в том числе сорных		0,2	0,2	0,3	-
Содержание семян диплоидов	%, не менее	85	85	85	-
Размер фракции калиброванных семян	мм	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	-
Наличие семян, не соответствующих установленному пределу	%, не более	5	5		-
Всхожесть					
шлифованные	%, не менее	85	85	80	-
нешлифованные		80	80	75	-
Одноростковость					
шлифованные	%, не менее	90	90	80	-
нешлифованные		85	85	75	-
односемянная тетраплоидная					
Чистота семян	%, не менее	98	98	94	-
Содержание семян других видов растений, всего	%, не более	0,5	0,5	1	-
в том числе сорных		0,2	0,2	0,5	-
Содержание семян тетраплоидов	%, не менее	85	85	85	-
Размер фракции калиброванных семян	мм	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	-
Наличие семян, не соответствующих установленному пределу	%, не более	5	5		-
Всхожесть					
шлифованные	%, не менее	80	80	70	-
нешлифованные		70	70	65	-
Одноростковость					
шлифованные	%, не менее	90	90	80	-
нешлифованные		85	85	75	-
односемянная гибридная (диплоидная, триплоидная или тетраплоидная)					
Чистота семян					
шлифованные, нешлифованные	%, не менее	97	97	-	94
дражированные		97	97	-	97
Содержание семян других видов растений (не распространяется на дражированные семена), всего	%, не более	0,5	0,5	-	1
в том числе сорных		0,2	0,2	-	0,5
Содержание семян диплоидов	%, не менее	85	85	-	85
Содержание семян тетраплоидов	%, не менее	85	85	-	85
Содержание семян триплоидов					
шлифованные, нешлифованные	%, не менее	-	-	-	75
дражированные		75	75	75	75
Размер фракции калиброванных семян	мм	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	-	3,5 - 4,5
Наличие семян, не соответствующих установленному пределу	%, не более	5	5	-	5
Всхожесть					
шлифованные	%, не менее	85	85	-	80
нешлифованные		80	80	-	75
дражированные		85	85	-	85
Одноростковость					
шлифованные	%, не менее	80	80	-	75
нешлифованные		75	75	-	70
дражированные		80	80	-	80

ТРЕБОВАНИЯ К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН ОВОЩНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Таблица 1

Требования к посевным и сортовым качествам семян овощных сельскохозяйственных растений (за исключением лука-севка и выборка, чеснока)

N Наименование п/сельскохозяйственного растения	Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства					
			оригинальные семена	элитные семена	первая репродукция	вторая репродукция	третья репродукция	последующие репродукции
Семейство яснотковые								
Требования к сортовым качествам семян								
Сортовая чистота:								
семеноводческие (первая категория)								
		%	90,0	90,0	90,0	-	-	-
товарные (вторая категория)								
		%, не менее	-	-	85,0	85,0	-	-
товарные (третья категория)								
			-	-	80,0	80,0	-	-
Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
		%, не более	-	-	10,0	10,0	-	-
Требования к посевным качествам семян <*>								
Чистота семян:								
семеноводческие								
		%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-
товарные								
			95,0	95,0	95,0	95,0	-	95,0
Содержание семян других растений:								
семеноводческие								
			0,2	0,2	0,2	-	-	-
товарные								
		%, не более	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,4
семян сорных растений:								
семеноводческие								
			0,1	0,1	0,1	-	-	-
товарные								
			0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2
Заселенность клещом, живыми вредителями и								
		шт./кг	0	0	0	0	-	0

		их личинками						
		Всхожесть:						
		семеноводческие	%, не менее	80	80	80	-	-
		товарные		60	60	60	60	-
		Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	9,0	-
		Требования к сортовым качествам семян						
		Сортовая чистота:						
		семеноводческие (первая категория)	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-
		товарные (вторая категория)		-	-	96,0	96,0	-
		товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-
		Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	-
		Требования к посевным качествам семян <*>						
		Чистота семян:						
		семеноводческие	%, не менее	97,0	97,0	97,0	-	-
		товарные		92,0	92,0	92,0	92,0	-
		Содержание семян других растений:						
		семеноводческие		0,1	0,1	0,1	-	-
		товарные в том числе	%, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	-
		семян сорных растений:						
		семеноводческие		0,05	0,05	0,05	-	-
		товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-
		Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-
		Всхожесть:						
		семеноводческие	%, не менее	70	70	70	-	-
		товарные		50	50	50	50	-
		Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	-
		Требования к посевным качествам семян <*>						
		Чистота семян:						
		семеноводческие	%, не менее	90,0	90,0	90,0	-	-
		товарные		85,0	85,0	85,0	85,0	-
		Содержание семян других растений:						
		семеноводческие	%, не более	0,7	0,7	0,7	-	-
		товарные в том числе		1,0	1,0	1,0	1,0	-
		семян сорных						
2	Душица (Origanum vulgare L.)							
3	Змееголовник (Dracoscephalum moldavica L.)							

	растений:							
	семеноводческие	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
	товарные	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
	Заселенность							
	клещом,							
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-
	вредителями и их личинками							
	Всхожесть:							
	семеноводческие	%, не менее	70	70	70	-	-	-
	товарные		60	60	60	60	-	-
	Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-
	14,0							14,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота:							
	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	90,0	90,0	90,0	-	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	85,0	85,0	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	80,0	80,0	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	10,0	10,0	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Чистота семян:							
	семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-
	товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-
Иссоп	Содержание семян других растений:							
4	растений:							
(<i>Hyssopus officinalis</i> L.)	семеноводческие		0,4	0,4	0,4	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
	в том числе							1,0
	семян сорных растений:							
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
	Заселенность							
	клещом,							
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-
	вредителями и их личинками							
	Всхожесть:							
	семеноводческие	%, не менее	80	80	80	-	-	-
	товарные		60	60	60	60	-	-
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-
	9,0							9,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота:							
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-
	(первая							
5	Котовник (<i>Nepeta transcaucasica</i> A. Grossh.)							

		клещом, живыми вредителями и их личинками							
		Всхожесть:							
		семеноводчески е	%, не менее	70	70	70	-	-	-
		товарные		50	50	50	50	-	50
		Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	-	14,0
		Требования к сортовым качествам семян							
		Сортовая чистота:							
		семеноводчески е (первая категория)		98,0	98,0	98,0	-	-	-
		товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	96,0	96,0	-	-
		товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-	-
		Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	3,0	-	-
		Требования к посевным качествам семян <*>							
		Чистота семян:							
		семеноводчески е	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-
1	Мята	товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	90,0
0	(Mentha spicata)	Содержание семян других растений:							
		семеноводчески е		0,2	0,2	0,2	-	-	-
		товарные в том числе	%, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
		семян сорных растений:							
		семеноводчески е		0,1	0,1	0,1	-	-	-
		товарные		0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,3
		Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками							
		шт./кг		0	0	0	0	-	0
		Всхожесть:							
		семеноводчески е	%, не менее	80	80	80	-	-	-
		товарные		65	65	65	65	-	65
		Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	9,0	-	9,0
		Требования к сортовым качествам семян							
		Сортовая чистота:							
1	Тимьян	семеноводчески е (первая категория)	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-
1	(Thymus vulgaris L.)	товарные (вторая категория)		-	-	95,0	95,0	-	-
		товарные		-	-	90,0	90,0	-	-

			в том числе						
			семян сорных						
			растений:						
			семеноводчески	0,1	0,1	0,1	-	-	-
			е						
			товарные	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
			Заселенность						0,2
			клещом,						
			живыми	шт./кг	0	0	0	0	-
			вредителями и						-
			их личинками						0
			Всхожесть:						
			семеноводчески	%, не	70	70	70	-	-
			е	менее					-
			товарные		60	60	60	60	-
									-
			Влажность	%, не	9,0	9,0	9,0	9,0	-
				более					-
									9,0
			Требования к сортовым качествам семян						
			Сортовая						
			чистота:						
			семеноводчески						
			е (первая	98,0	98,0	98,0	-	-	-
			категория)						-
			товарные	%, не					
			(вторая	менее	-	-	95,0	95,0	-
			категория)						-
			товарные						
			(третья						
			категория)						
			Примесь сортов						
			и резких						
			гибридов в						
			числе общей	%, не	-	-	2,0	2,0	-
			примеси в	более					-
			третьей						
			категории						
			Требования к посевным качествам семян <*>						
			Чистота семян:						
			семеноводчески	%, не	95,0	95,0	95,0	-	-
			е	менее					-
			товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-
			Содержание						-
			семян других						90,0
			растений:						
			семеноводчески						
			е	0,5	0,5	0,5	-	-	-
			товарные	%, не	1,0	1,0	1,0	1,0	-
			в том числе	более					-
			семян сорных						1,0
			растений:						
			семеноводчески						
			е	0,3	0,3	0,3	-	-	-
			товарные						
			Заселенность	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
			клещом,						0,5
			живыми	шт./кг	0	0	0	0	-
			вредителями и						-
			их личинками						0
			Всхожесть:						
			семеноводчески	%, не	80	80	80	-	-
			е	менее					-
			товарные		65	65	65	65	-
									-
			Влажность	%, не	13,0	13,0	13,0	13,0	-
				более					-
									13,0
			Семейство гречишные						
1	Шалфей		Требования к сортовым качествам семян						
3	(<i>Salvia officinalis</i>		Сортовая						
	L.)		%, не						

rhaponticum L.)	чистота: менее									
	семеноводческие (первая категория)	97,0	97,0	97,0	-	-	-	-		
	товарные (вторая категория)	-	-	95,0	95,0	-	-	-		
	товарные (третья категория)	-	-	85,0	85,0	-	-	-		
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	-	-	-	
	Требования к посевным качествам семян <*>									
	Чистота семян:									
	семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-	
	товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	
	Содержание семян других растений:									
	семеноводческие		0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	
	товарные	%, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	
	в том числе семян сорных растений:									
	семеноводческие		0,05	0,05	0,05	-	-	-	-	
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками									
	шт./кг		0	0	0	0	-	-	-	
	Всхожесть:									
	семеноводческие	%, не менее	85	85	85	-	-	-	-	
	товарные		55	55	55	55	-	-	-	
	Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-	
	Требования к сортовым качествам семян									
	Сортовая чистота:									
семеноводческие (первая категория)		97,0	97,0	97,0	-	-	-	-		
товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	95,0	-	-	-		
товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-		
Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	-	-	-		
Требования к посевным качествам семян <*>										
Чистота семян: % не семеноводчески менее										
		95,0	95,0	95,0	-	-	-	-		

Щавель
1 (Rumex acetosa
5 L. var. hortensis
Dierb.)

	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	80	80	80	-	-	-	-
	товарные		60	60	60	60	-	-	60
	Влажность	%, не более	13,0	13,0	13,0	13,0	-	-	13,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	95,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	90,0	90,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
		%, не более	-	-	2,0	2,0	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	97,0	97,0	97,0	-	-	-	-
	товарные		94,0	94,0	94,0	94,0	-	-	94,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
		шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	80	80	80	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	70	-	-	70
	Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	14,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	95,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	90,0	90,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких								
		%, не более	-	-	5,0	5,0	-	-	-

1
7
Свекла столовая
(Beta vulgaris L.
var. conditiva
Alef.)

1
8
Свекла столовая
одноростковая
(Beta vulgaris L.
var. conditiva
Alef.)

		Требования к посевным качествам семян <*>							
		Чистота семян:							
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	95,0	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0	0	0	-	-	-	-
	товарные	%, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0	0	0	-	-	-	-
	товарные		0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	80	80	80	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	70	-	-	70
	Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	11,0
Семейство мальвовые									
		Требования к сортовым качествам семян							
		Сортовая чистота:							
	семеноводческие		98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные (первая категория)	%, не менее	-	-	95,0	95,0	-	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	3,0	3,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-
	товарные		96,0	96,0	96,0	96,0	-	-	96,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
	товарные	%, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0	0	0	-	-	-	-
	товарные		0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1
	Заселенность клещом,								
		шт./кг	0	0	0	0	-	-	0

2 Бамя
2 (Hibiscus
oesculentus L.)

		живыми вредителями и их личинками							
		Всхожесть: семеноводческие	%, не менее	90	90	90	-	-	-
		товарные		75	75	75	75	-	75
		Влажность	%, не более	13,0	13,0	13,0	13,0	-	13,0
Семейство портулаковые									
		Требования к посевным качествам семян <*>							
		Чистота семян:							
		семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-
		товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	90,0
		Содержание семян других растений:							
		семеноводческие		0,3	0,3	0,3	-	-	-
		товарные	%, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
		в том числе семян сорных растений:							
		семеноводческие		0,1	0,1	0,1	-	-	-
		товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2
		Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками							
			шт./кг	0	0	0	0	-	0
		Всхожесть: семеноводческие	%, не менее	60	60	60	-	-	-
		товарные		50	50	50	50	-	50
		Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	10,0
Семейство лютиковые									
		Требования к посевным качествам семян <*>							
		Чистота семян:							
		семеноводческие	%, не менее	90,0	90,0	90,0	-	-	-
		товарные		85,0	85,0	85,0	85,0	-	85,0
		Содержание семян других растений:							
		семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-
		товарные	%, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
		в том числе семян сорных растений:							
		семеноводческие		0,1	0,1	0,1	-	-	-
		товарные		0,3	0,3	0,3	0,3	-	0
		Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками							
			шт./кг	0	0	0	0	-	0
		Всхожесть: семеноводческие	%, не менее	70	70	70	-	-	-
		товарные		60	60	60	60	-	60
		Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	11,0	-	11,0

2 Портулак
3 (Portulaca oleraceae L.)

2 Нигелла
4 (Nigella sativa L.)

Семейство рутовые		Требования к посевным качествам семян <*>							
Чистота семян:									
семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-	-
товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	90,0
Содержание семян других растений:									
семеноводческие		0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-
товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
в том числе семян сорных растений:									
семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)									
		0	0	0	0	-	-	-	0
Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками									
	шт./кг	0	0	0	0	-	-	-	0
Всхожесть:									
семеноводческие	%, не менее	70	70	70	-	-	-	-	-
товарные		60	60	60	60	-	-	-	60
Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	11,0
Семейство амарантовые		Требования к посевным качествам семян <*>							
Чистота семян:									
семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-	-
товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	90,0
Содержание семян других растений:									
семеноводческие		0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-
товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
в том числе семян сорных растений:									
семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)									
		0	0	0	0	-	-	-	0
Заселенность клещом, живыми вредителями и									
	шт./кг	0	0	0	0	-	-	-	0

2 Рута
5 (Ruta graveolens L.)

2 Амарант
6 (Amaranthus L.)

	их личинками									
	Всхожесть:									
	семеноводческие	%, не менее	90	90	90	-	-	-		
	товарные		75	75	75	75	-	75		
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	10,0		
Семейство капустные										
Требования к сортовым качествам семян										
Сортовая чистота:										
	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-		
	товарные (вторая категория)		-	-	95,0	95,0	95,0	95,0		
	товарные (третья категория)		-	-	88,0	88,0	88,0	88,0		
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0		
Требования к посевным качествам семян <*>										
Чистота семян:										
2 7	Брюква кормовая (Brassica napus var. rapifera Metz.)	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	98,0	98,0	-	-	
		товарные		96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
		Содержание семян других растений:								
		семеноводческие		0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	
		товарные	%, не более	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
		в том числе семян сорных растений:								
		семеноводческие		0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	
		товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
		Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
				шт./кг	0	0	0	0	0	0
	Всхожесть:									
	семеноводческие	%, не менее	90	90	90	90	-	-		
	товарные		70	70	70	70	70	70		
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0		
Требования к сортовым качествам семян										
Сортовая чистота:										
2 8	Брюква столовая (Brassica napus var. rapifera Metz.)	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-		
		товарные (вторая категория)		-	-	95,0	-	-		
		товарные (третья категория)		-	-	88,0	-	-		

	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	-	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		96,0	96,0	96,0	-	-	-	96,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	товарные		0,4	0,4	0,4	-	-	-	0,4
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,05	0,05	-	-	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
	шт./кг		0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	90	90	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		95,0	95,0	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	90,0	-	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
2	Горчица салатная (листовая)	%, не более	-	-	5,0	-	-	-	-
9	(Brassica juncea L Czern. et Cjss. In Czern.)								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	товарные		0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3
	в том числе семян сорных								

	растений:							
	семеноводческие	0,05	0,05	-	-	-	-	-
	товарные	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
	Заселенность клещом, живыми	шт./кг	0	0	0	-	-	0
	вредителями и их личинками							
	Всхожесть:							
	семеноводческие	%, не менее	80	80	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	70
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота:							
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	95,0	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	90,0	90,0	-	-
	родительских форм		100	100	100	100	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	-	-
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	5,0
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Чистота семян:							
	семеноводческие	%, не менее	96,0	96,0	-	-	-	-
	товарные		92,0	92,0	92,0	92,0	-	92,0
	Содержание семян других растений:							
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные в том числе семян сорных растений:	%, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0
	семеноводческие		0,1	0,1	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	0
	вредителями и их личинками							
	Всхожесть:							
	семеноводческие	%, не менее	85	85	-	-	-	-

3
0
Дайкон
(Raphanus sativus L var. Logipinnatus Bailey)

	товарные		75	75	75	75	-	-	75
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	-	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-	-
	родительских форм		100	100	100	-	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	3,0	-	-	-	-
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	-	5,0
3	Капуста белокочанная и краснокочанная								
1	(<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.)								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,5	0,5	-	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
	шт./кг		0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	85	85	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
3	Капуста брокколи								
2	(<i>Brassica oleracea</i> var. <i>cytosa</i> Ouch.)								
	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	95,0	-	-	-	-

	товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-	-
	родительских форм		100	1000	100	-	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	-	-	-	-
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	-	5,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,5	0,5	-	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
	шт./кг		0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	85	85	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	-	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-	-
Капуста брюссельская (Brassica oleracea var. gemmifera DC.)	родительских форм		100	100	100	-	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	-	-	-	-

	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	-	5,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,5	0,5	-	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
		шт./кг	0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	90	90	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	98,0	98,0	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	95,0	95,0	95,0	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	85,0	85,0	-
	родительских форм		100	100	100	100	100	100	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
		%, не более	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	-	5,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	98,0	98,0	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	Содержание	%, не							

Капуста
3 кольраби
кормовая
4 (Brassica
oleraceae L. var.
gongylodes L)

	семян других растений:	более						
	семеноводческие		0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
	товарные		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	в том числе семян сорных растений:							
	семеноводческие		0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
	товарные		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	0	0
	Всхожесть семеноводческие	%, не менее	85	85	85	85	-	-
	товарные		65	65	65	65	65	65
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота:							
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-
	родительских форм		100	100	100	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории							
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	3,0	-	-	-
Капуста кольраби	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	95,0
3 столовая	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	5,0
5 (Brassica oleraceae L. var. gongylodes L)	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Чистота семян:							
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:							
	семеноводческие		0,1	0,1	-	-	-	-
	товарные	%, не более	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3
	в том числе семян сорных растений:							
	семеноводческие		0,05	0,05	-	-	-	-
	товарные		0,1	0,1	0,1	-	-	0,1
	Заселенность	шт./кг	0	0	0	-	-	0

			клещом, живыми вредителями и их личинками						
			Всхожесть:						
		семеноводчески е	%, не менее	85	85	-	-	-	-
		товарные		70	70	70	-	-	70
		Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	9,0
			Требования к сортовым качествам семян						
			Сортовая чистота:						
		семеноводчески е (первая категория)		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-
		товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	85,0	85,0	-	-
		товарные (третья категория)		-	-	80,0	80,0	-	-
		родительских форм		100	100	100	100	-	100
			Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси:						
			в категории второй			3,0	3,0	-	-
			в категории третьей			10,0	10,0	-	-
		Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	95,0
		Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	5,0
3 6	Капуста кормовая (Brassica oleraceae L. var. gongylodes L)		Требования к посевным качествам семян <*>						
			Чистота семян:						
		семеноводчески е	%, не менее	98,0	98,0	98,0	98,0	-	-
		товарные		95,0	95,0	95,0	95,0	-	95,0
			Содержание семян других растений:						
		семеноводчески е		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
		товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0
			в том числе семян сорных растений:						
		семеноводчески е		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
		товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
			Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	-	0
			Всхожесть:						
		семеноводчески е	%, не менее	85	85	85	85	-	-
		товарные		70	70	70	70	-	70
		Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	9,0	-	9,0

		Требования к сортовым качествам семян							
		Сортовая чистота:							
		семеноводческие (первая категория)	98,0	98,0	-	-	-	-	-
		товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	-	-	-
		товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-
		родительских форм	100	100	100	-	-	-	100
		Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории							
		Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	95,0
		Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	5,0
3	Капуста листовая (Brassica oleraceae L. var. acephala DC)	Требования к посевным качествам семян <*>							
7		Чистота семян:							
		семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-
		товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	95,0
		Содержание семян других растений:							
		семеноводческие		0,5	0,5	-	-	-	-
		товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
		в том числе семян сорных растений:							
		семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-
		товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
		Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками							
			шт./кг	0	0	0	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	90	90	-	-	-	-	
	товарные		70	70	70	-	-	70	
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	9,0	
		Требования к сортовым качествам семян							
		Сортовая чистота:							
3	Капуста пекинская и китайская (Brassica oleraceae pekinensis Rupr.)	семеноводческие (первая категория)	98,0	98,0	-	-	-	-	
8		товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	-	-	
		товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	

	родительских форм		100	100	100	-	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	-	-	-	-
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	-	5,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	97,0	97,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,5	0,5	-	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность								
	клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	90	90	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	-	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-	-
3 9	Капуста савойская (Brassica oleraceae L. var. sabauda L.)	родительских форм	100	100	100	-	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	-	-	-	-
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание	%, не	-	-	-	-	-	-	5,0

	примеси родительских линий	более							
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводчески е	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводчески е	%, не более	0,5	0,5	-	-	-	-	-
	товарные		1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводчески е		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
		шт./кг	0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводчески е	%, не менее	90	90	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводчески е (первая категория)		98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	-	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	-	-	-	-
	родительских форм		100	100	100	-	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
Капуста цветная 4 (Brassica 0 oleraceae L. Alef. var. botrytis L.)		%, не более	-	-	3,0	-	-	-	-
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси родительских линий	%, не более	-	-	-	-	-	-	5,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводчески е	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводчески	%, не более	0,5	0,5	-	-	-	-	-

	семеноводчески менее	96,0	96,0	-	-	-	-	-
	товарные	92,0	92,0	92,0	-	-	-	92,0
	Содержание семян других растений:							
	семеноводчески менее	0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные % , не более	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	в том числе							
	семян сорных растений:							
	семеноводчески менее	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	товарные	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми	шт./кг	0	0	0	-	-	0
	вредителями и их личинками							
	Всхожесть:							
	семеноводчески % , не менее	85	85	-	-	-	-	-
	товарные	70	70	70	-	-	-	70
	Влажность % , не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота:							
	семеноводчески менее (первая категория)	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные % , не менее (вторая категория)	-	-	95,0	95,0	-	-	-
	товарные (третья категория)	-	-	85,0	85,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	% , не более	-	-	2,0	2,0	-	-
Редис (пересадочная культура)	Требования к посевным качествам семян <*>							
4 (Raphanus sativus L. var. sativus Mansf.)	Чистота семян:							
	семеноводчески % , не менее	96,0	96,0	-	-	-	-	-
	товарные	92,0	92,0	92,0	92,0	-	-	92,0
	Содержание семян других растений:							
	семеноводчески менее	0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные % , не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
	в том числе							
	семян сорных растений:							
	семеноводчески менее	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	товарные	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	0
	вредителями и их личинками							

	гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	в том числе								
	семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,1	0,1	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	95	95	-	-	-	-	-
	товарные		80	80	80	-	-	-	80
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	97,0	97,0	97,0	97,0	-	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	95,0	95,0	95,0	95,0	-
	товарные (третья категория)		-	-	87,0	87,0	87,0	87,0	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	98,0	98,0	-	-	-
	товарные		97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие	%, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
	товарные		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	в том числе								
	семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-

4 Турнепс
7 (Brassica rapa L.
var. rapa)

	товарные (вторая категория)	-	-	85,0	85,0	-	-	-
	товарные (третья категория)	-	-	80,0	80,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	5,0	5,0	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Чистота семян:							
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	95,0	-	95,0
	Содержание семян других растений:							
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-
	товарные	%, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
	семян сорных растений:							
	семеноводческие		0,1	0,1	0,1	-	-	-
	товарные		0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,3
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками							
	шт./кг		0	0	0	0	-	0
	Всхожесть:							
	семеноводческие	%, не менее	80	80	80	-	-	-
	товарные		60	60	60	60	-	60
	Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	11,0	-	11,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота:							
	семеноводческие (первая категория)		99,0	99,0	99,0	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	97,0	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	90,0	90,0	-	-
5 Лук-порей 0 (Allium porrum L.)	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	5,0	5,0	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Чистота семян:							
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	95,0	-	-
	Содержание семян других							
		%, не более						

	растений:							
	семеноводческие	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-
	в том числе							
	семян сорных							
	растений:							
	семеноводческие	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
	товарные	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
	Заселенность							
	клещом,							
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-
	вредителями и							
	их личинками							
	Всхожесть:							
	семеноводческие	%, не	80	80	80	-	-	-
	товарные	менее	60	60	60	60	-	-
	Влажность	%, не	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-
	более							
	Требования к сортовым							
	качествам семян							
	Сортовая							
	чистота:							
	семеноводческие							
	(первая	98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	категория)							
	товарные	%, не	-	-	95,0	95,0	-	-
	(вторая	менее						
	категория)							
	товарные		-	-	85,0	85,0	-	-
	(третья							
	категория)							
	Примесь сортов							
	и резких							
	гибридов в							
	числе общей	%, не	-	-	2,0	2,0	-	-
	примеси в	более						
	третьей							
	категории							
	Уровень	%, не	-	-	-	-	-	95,0
	гибридности	менее						
	Примесь	%, не	-	-	-	-	-	5,0
	родительских	более						
	линий							
	Требования к посевным							
	качествам семян <*>							
	Чистота семян:							
	семеноводческие	%, не	99,0	99,0	99,0	-	-	-
	товарные	менее	95,0	95,0	95,0	95,0	-	95,0
	Содержание							
	семян других							
	растений:							
	семеноводческие	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные	%, не	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
	в том числе	более						
	семян сорных							
	растений:							
	семеноводческие	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
	товарные	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3
	Заселенность							
	клещом,							
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	0
	вредителями и							
	их личинками							

5 Лук репчатый
1 (Allium cepa L.)

	семян других растений:	более							
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
	в том числе								
	семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
	товарные		0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3
	Заселенность								
	клещом,								
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
	вредителями и их личинками								
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	70	70	70	-	-	-	-
	товарные		60	60	60	60	-	-	60
	Влажность	%, не более	13,0	13,0	13,0	13,0	-	-	13,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		97,0	97,0	97,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	95,0	95,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	1,0	1,0	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
5	Любисток (Levisticum officinale Koch.)	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-
7		товарные		93,0	93,0	93,0	93,0	-	93,0
	Содержание								
	семян других растений:								
	семеноводческие		0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
	в том числе								
	семян сорных растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные		0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
	Заселенность								
	клещом,								
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
	вредителями и их личинками								
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	75	75	75	-	-	-	-
	товарные		55	55	55	55	-	-	55

	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	96,0	96,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	родительских форм		100	100	100	100	-	-	100
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0
	Содержание примеси материнской линии								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-
	товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	90,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
	товарные в том числе семян сорных растений:	%, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные		0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
	шт./кг		0	0	0	0	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	70	70	70	-	-	-	-
	товарные		60	60	60	60	-	-	60
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	97,0	97,0	97,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	95,0	95,0	-	-	-
	товарные		-	-	85,0	85,0	-	-	-

5
85
9

6 3 Укроп (Anethum graveolens L.)	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	98,0	-	-	-	-	
	товарные (вторая категория)		-	-	96,0	96,0	-	-	-	
	товарные (третья категория)		-	-	80,0	80,0	-	-	-	
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	-	-	-	
	Требования к посевным качествам семян <*>									
	Чистота семян:									
	семеноводческие	%, не менее	96,0	96,0	96,0	-	-	-	-	-
	товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	90,0
	Содержание семян других растений:									
	семеноводческие		0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-
	товарные	%, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1,0
	в том числе семян сорных растений:									
	семеноводческие		0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками									
		шт./кг	0	0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:									
	семеноводческие	%, не менее	85	85	85	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	13,0	13,0	13,0	13,0	-	-	-	13,0
	Требования к сортовым качествам семян									
Сортовая чистота:										
семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	98,0	-	-	-	-	-	
товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	96,0	96,0	-	-	-	-	
товарные (третья категория)		-	-	80,0	80,0	-	-	-	-	
Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	
Требования к посевным качествам семян <*>										
Чистота семян:										
семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-	-	

	е		50	50	50	50	-	-	50
	товарные								
	Влажность	%, не более	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	12,0
Семейство астровые									
Требования к сортовым качествам семян									
Сортовая чистота:									
семеноводческие (первая категория)									
	е		90,0	90,0	90,0	-	-	-	-
	товарные	%, не менее							
	(вторая категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	товарные								
	(третья категория)		-	-	80,0	80,0	-	-	-
Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории									
	е	%, не более	-	-	3,0	3,0	-	-	-
Требования к посевным качествам семян <*>									
Чистота семян:									
семеноводческие									
	е	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	95,0	-	-	95,0
Содержание семян других растений:									
6	Артишок	%, не более							
5	(Cynara scolymus L.)	семеноводческие	0	0	0	-	-	-	-
	товарные		0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
в том числе семян сорных растений:									
семеноводческие									
	е		0	0	0	-	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2
в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)									
	е		0	0	0	0	-	-	0
Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками									
	шт./кг		0	0	0	0	-	-	0
Всхожесть:									
семеноводческие									
	е	%, не менее	75	75	75	-	-	-	-
	товарные		65	65	65	65	-	-	65
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0
Требования к посевным качествам семян <*>									
Чистота семян:									
6	Овсяный корень	%, не менее	90,0	90,0	90,0	-	-	-	-
6	(Tragopogon porrifolius L.)	товарные	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	85,0
Содержание семян других									
	е	%, не более							

	растений:								
	семеноводческие	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	
	товарные	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	0,8	
	в том числе								
	семян сорных								
	растений:								
	семеноводческие	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	
	товарные	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4	
	в том числе								
	ядовитых								
	растений								
	(гелиотропа	0	0	0	0	-	-	0	
	волосистоплодного и								
	триходесмы								
	седой)								
	Заселенность								
	клещом,								
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
	вредителями и								
	их личинками								
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не	60	60	60	-	-	-	-
	товарные	менее	50	50	50	50	-	-	50
	Влажность	%, не	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	11,0
	более								
	Требования к сортовым								
	качествам семян								
	Сортовая								
	чистота:								
	семеноводческие								
	(первая	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-	-
	категория)								
	товарные	%, не							
	(вторая	менее	-	-	98,0	98,0	-	-	-
	категория)								
	товарные								
	(третья	-	-	95,0	95,0	-	-	-	-
	категория)								
	Примесь сортов								
	и резких								
	гибридов в								
	числе общей	%, не	-	-	5,0	5,0	-	-	-
	примеси в	более							
	третьей								
	категории								
	Требования к посевным								
	качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-
	товарные	менее	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	90,0
	Содержание								
	семян других								
	растений:	%, не							
	семеноводческие	более	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
	в том числе								
	семян сорных								
	растений:								
	семеноводческие								
	товарные	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	в том числе	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3
	ядовитых	0	0	0	0	-	-	-	0

6 Салат
7 (Lactuca sativa
L.)

	семеноводчески менее	70	70	70	-	-	-	-
	товарные	50	50	50	50	-	-	50
	Влажность %, не более	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	11,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота: семеноводчески менее (первая категория)	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-
	товарные (вторая категория)	-	-	95,0	95,0	-	-	-
	товарные (третья категория)	-	-	90,0	90,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	3,0	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Чистота семян: семеноводчески менее	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-
	товарные	93,0	93,0	93,0	93,0	-	-	93,0
	Содержание семян других растений: семеноводчески менее	%, не более	0,5	0,5	0,5	-	-	-
	товарные в том числе семян сорных растений: семеноводчески менее	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-	-
	Всхожесть: семеноводчески менее	%, не менее	80	80	80	-	-	-
	товарные	65	65	65	65	-	-	65
	Влажность %, не более	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	12,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота: семеноводчески менее (первая категория)	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-
	товарные	-	-	95,0	95,0	-	-	-

Цикорий салатный (Cichorium intybu L.)

7
0 Эндивий (Cichorium endivia L.)

	(вторая категория) товарные		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	(третья категория) Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	5,0	5,0	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие товарные	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	Содержание семян других растений:	%, не более	93,0	93,0	93,0	93,0	-	-	93,0
	семеноводческие товарные	%, не более	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
	в том числе семян сорных растений:		1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
	семеноводческие товарные		0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие товарные	%, не менее	90	90	90	-	-	-	-
	Влажность	%, не более	70	70	70	70	-	-	70
			12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	12,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория) товарные	%, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-	-
	(вторая категория) товарные		-	-	95,0	95,0	-	-	-
7	Эстрагон (Artemisia dracunculoides L.)		-	-	90,0	90,0	-	-	-
1	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	5,0	5,0	-	-	-

			Требования к посевным качествам семян <*>						
			Чистота семян:						
	семеноводческие	%, не менее	95,0	95,0	95,0	-	-	-	-
	товарные		90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	90,0
			Содержание семян других растений:						
	семеноводческие		0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
	товарные		1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
			в том числе семян сорных растений:						
	семеноводческие	%, не более	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5
			в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)						
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
			Всхожесть:						
	семеноводческие	%, не менее	70	70	70	-	-	-	-
	товарные		50	50	50	50	-	-	50
	Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	14,0
Семейство тыквенные									
			Требования к сортовым качествам семян						
			Сортовая чистота:						
	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	98,0	98,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	90,0	90,0	-	-	-
			Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории						
		%, не более	-	-	1,0	1,0	-	-	-
			Требования к посевным качествам семян <*>						
			Чистота семян:						
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-
	товарные		96,0	96,0	96,0	96,0	-	-	96,0
			Содержание семян других растений:						
	семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
	товарные		0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4

7 Арбуз кормовой
2 (Citrullus lanatus L.)

	в том числе семян сорных растений:	%, не семеноводчески более	0	0	0	-	-	-	-	
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	
	Заселенность клещом, живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0	
	вредителями и их личинками									
	Всхожесть:									
	семеноводчески	%, не менее	90	90	90	-	-	-	-	
	товарные		75	75	75	75	-	-	75	
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0	
	Требования к сортовым качествам семян									
	Сортовая чистота:									
	семеноводчески		99,0	99,0	99,0	-	-	-	-	
	категория)	%, не менее								
	товарные		-	-	98,0	98,0	-	-	-	
	(вторая категория)									
	товарные		-	-	90,0	90,0	-	-	-	
	(третья категория)									
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	1,0	1,0	-	-	-	
	Требования к посевным качествам семян <*>									
	Чистота семян:									
7	Арбуз столовый	семеноводчески	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	
3	(Citrullus lanatus Nakai.) (Thund.) Matsum. et	товарные		96,0	96,0	96,0	96,0	-	-	
	Содержание семян других растений:									
	семеноводчески		0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	
	товарные	%, не более	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4	
	в том числе									
	семян сорных растений:									
	семеноводчески		0	0	0	-	-	-	-	
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	
	Заселенность клещом, живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0	
	вредителями и их личинками									
	Всхожесть:									
	семеноводчески	%, не менее	92	92	92	-	-	-	-	
	товарные		80	80	80	80	-	-	80	
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0	
7	Дыня	Требования к сортовым качествам семян								
4	(Cucumis melo L)	Сортовая чистота:	%, не менее							

	семеноводческие (первая категория)		99,0	99,0	-	-	-	-	-	
	товарные (вторая категория)		-	-	97,0	-	-	-	-	
	товарные (третья категория)		-	-	92,0	-	-	-	-	
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	-	-	-	-	
	Требования к посевным качествам семян <*>									
	Чистота семян:									
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	-	-	-	-	-	
	товарные		97,0	97,0	97,0	-	-	-	97,0	
	Содержание семян других растений:									
	семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	-	-	-	-	-	
	товарные		0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2	
	в том числе семян сорных растений:									
	семеноводческие		0	0	-	-	-	-	-	
	товарные		0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками									
		шт./кг	0	0	0	-	-	-	0	
	Всхожесть:									
	семеноводческие	%, не менее	90	90	-	-	-	-	-	
	товарные		75	75	75	-	-	-	75	
	Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0	
	Требования к сортовым качествам семян									
	Сортовая чистота:									
	семеноводческие (первая категория)		99,0	99,0	99,0	-	-	-	-	
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	97,0	-	-	-	
	товарные (третья категория)		-	-	92,0	92,0	-	-	-	
7	Кабачок, цукини, патиссон (Cucurbita pepo L. var. gigaumonas Duch.)	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	3,0	-	-	
5		Требования к посевным качествам семян <*>								
		Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-	

	е								
	товарные		80	80	80	80	-	-	80
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		95,0	95,0	95,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	93,0	93,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	3,0	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
Тыква	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-
7 крупноплодная (Cucurbita maxima Duch.)	товарные		96,0	96,0	96,0	96,0	-	-	96,0
	Содержание семян других растений:	%, не более							
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные в том числе семян сорных растений:		0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
	семеноводческие		0	0	0	-	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	95	95	95	-	-	-	-
	товарные		80	80	80	80	-	-	80
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		95,0	95,0	95,0	-	-	-	-
Тыква мускатная	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	93,0	93,0	-	-	-
7 (Cucurbita moschata (Duch.) Poir.)	товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей	%, не более	-	-	3,0	3,0	-	-	-

	примеси в третьей категории								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-
	товарные		96,0	96,0	96,0	96,0	-	-	96,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные	%, не более	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0	0	0	-	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	95	95	95	-	-	-	-
	товарные		80	80	80	80	-	-	80
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		95,0	95,0	95,0	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	93,0	93,0	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	85,0	85,0	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	3,0	3,0	-	-	-
Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo L.)	7 (твердокорая, 9 голосемянная)								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-
	товарные		96,0	96,0	96,0	96,0	-	-	96,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие	%, не более	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	товарные		0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие	%, не более	0	0	0	-	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2

	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0	
	Всхожесть: семеноводческие товарные	%, не менее	95	95	95	-	-	-	-	
	Всхожесть: товарные	%, не менее	80	80	80	80	-	-	80	
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0	
	Требования к сортовым качествам семян									
	Сортовая чистота:									
	семеноводческие (первая категория)		98,0	98,0	98,0	-	-	-	95,0	
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	96,0	96,0	-	-	90,0	
	товарные (третья категория)		-	-	90,0	90,0	-	-	85,0	
	родительских форм		100	100	100	100	-	-	100	
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории	%, не более	-	-	2,0	2,0	-	-	-	
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	95,0	
	Содержание примеси материнской линии	%, не более	-	-	-	-	-	-	5,0	
8 0	Огурец (Cucumis sativus L.)	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:									
	семеноводческие товарные	%, не менее	99,0	99,0	99,0	-	-	-	-	
	Содержание семян других растений:									
	семеноводческие товарные	%, не более	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	
	в том числе семян сорных растений:									
	семеноводческие товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	
	семеноводческие товарные		0	0	0	-	-	-	-	
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	0	-	-	0	
	Всхожесть: семеноводческие товарные	%, не менее	90	90	90	-	-	-	-	
	Всхожесть: товарные	%, не менее	75	75	75	75	-	-	75	
	Влажность	%, не более	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	10,0	
8	Огурец	Требования к сортовым качествам семян								

	Содержание примеси материнской линии	%, не более	-	-	-	-	-	-	2,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
	Содержание семян других растений:	%, не более							
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0	0	-	-	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	75	75	-	-	-	-	-
	товарные		60	60	60	-	-	-	60
	Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	-	-	-	11,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)		99,0	99,0	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	98,0	-	-	-	-
	товарные (третья категория)		-	-	97,0	-	-	-	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
		%, не более	-	-	1,0	-	-	-	-
8 3	Физалис (Physalis L. Physalis ixocarpa Brot.)								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		96,0	96,0	96,0	-	-	-	96,0
	Содержание семян других растений:	%, не более							
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0	0	-	-	-	-	-

8 Перец
4 (Capsicum
annuum L.)

товарные		0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
Заселенность клещом, живыми шт./кг		0	0	0	-	-	-	0
вредителями и их личинками								
Всхожесть:								
семеноводчески е	%, не менее	85	85	-	-	-	-	-
товарные		65	65	65	-	-	-	65
Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	-	-	-	11,0
Требования к сортовым качествам семян								
Сортовая чистота:								
семеноводчески е (первая категория)		99,0	99,0	-	-	-	-	-
товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	97,0	-	-	-	-
товарные (третья категория)		-	-	96,0	-	-	-	-
родительских форм		100	100	100	-	-	-	100
Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории								
Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	98,0
Содержание примеси материнской линии	%, не более	-	-	-	-	-	-	2,0
Требования к посевным качествам семян <*>								
Чистота семян:								
семеноводчески е	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
товарные		95,0	95,0	95,0	-	-	-	95,0
Содержание семян других растений:								
семеноводчески е		0,2	0,2	-	-	-	-	-
товарные в том числе	%, не более	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
семян сорных растений:								
семеноводчески е		0	0	-	-	-	-	-
товарные		0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
Заселенность клещом, живыми шт./кг								
вредителями и их личинками		0	0	0	-	-	-	0
Всхожесть:								
семеноводчески е	%, не менее	80	80	-	-	-	-	-
товарные		65	65	65	-	-	-	65
Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	-	-	-	11,0

		Требования к сортовым качествам семян							
		Сортовая чистота:							
		семеноводческие (первая категория)	%, не менее	100	100	-	-	-	-
		товарные (вторая категория)		-	-	98,0	-	-	-
		родительских форм		100	100	100	-	-	100
		Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	98,0
		Содержание примеси материнской линии	%, не более	-	-	-	-	-	2,0
		Содержание гибридных семян:							
8 5	Перец сладкий (Capsicum annuum L.) тепличные сорта и тепличные гибриды	первая категория	%, не менее	-	-	-	-	-	98,0
		вторая категория		-	-	-	-	-	95,0
		Требования к посевным качествам семян <*>							
		Чистота семян:							
		семеноводческие	%, не менее	100	100	-	-	-	-
		товарные		99,0	99,0	99,0	-	-	99,5
		Содержание семян других растений:							
		семеноводческие	%, не более	0	0	-	-	-	-
		товарные		0	0	0	-	-	0
		Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками							
		шт./кг		0	0	0	-	-	0
		Всхожесть:							
		семеноводческие	%, не менее	90	90	-	-	-	-
		товарные		85	85	85	-	-	85
		Влажность	%, не более	9,0	9,0	9,0	-	-	9,0
		Требования к сортовым качествам семян							
		Сортовая чистота:							
		семеноводческие (первая категория)		99,0	99,0	-	-	-	-
		товарные (вторая категория)	%, не менее	-	-	98,0	-	-	-
8 6	Томат (Lycopersicon esculentum Milt.)	товарные (третья категория)		-	-	97,0	-	-	-
		родительских форм		100	100	100	-	-	100
		Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в третьей категории							
		%, не более		-	-	1,0	-	-	-

	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	98,0
	Содержание примеси материнской линии	%, не более	-	-	-	-	-	-	2,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	товарные		96,0	96,0	96,0	-	-	-	96,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	-	-	-	-	-
	товарные	%, не более	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,5
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводческие		0	0	-	-	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
		шт./кг	0	0	0	-	-	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводческие	%, не менее	85	85	-	-	-	-	-
	товарные		70	70	70	-	-	-	70
	Влажность	%, не более	11,0	11,0	11,0	-	-	-	11,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая чистота:								
	семеноводческие (первая категория)	%, не менее	100	100	-	-	-	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	98,0	-	-	-	-
	родительских форм		100	100	100	-	-	-	100
	Уровень гибридности	%, не менее	-	-	-	-	-	-	98
	Содержание примеси материнской линии	%, не более	-	-	-	-	-	-	2
Томат (Lycopersicon esculentum Milt.) 8 тепличных сорта и тепличные гибриды	Содержание гибридных семян:								
	первая категория	%, не менее	-	-	-	-	-	-	98,0
	вторая категория		-	-	-	-	-	-	95,0
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Чистота семян:								
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	-	-	-	-	-
	товарные		99,0	99,0	99,0	-	-	-	99,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводческие	%, не более	0	0	-	-	-	-	-

	е		0	0	0	-	-	-	0
	товарные								
	Заселенность								
	клещом,								
	живыми	шт./кг	0	0	0	-	-	-	0
	вредителями и								
	их личинками								
	Всхожесть:								
	семеноводчески	%, не	95	95	-	-	-	-	-
	е	менее							
	товарные		90	90	90	-	-	-	90
	Влажность	%, не	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,0
	более								
Семейство мятликовые									
Требования к сортовым качествам семян									
Сортовая									
типичность при									
апробации:									
	полевой (первая	%, не	99,5	99,5	99,5	99,5	-	-	-
	категория)	менее							
	амбарной		100	100	100	100	-	-	-
	(первая								
	категория)								
	Содержание								
	ксенийных зерен								
	при апробации								
	на 100 початков:	шт./кг,							
	полевой (первая	не	20	20	20	20	-	-	-
	категория)	более							
	амбарной		0	0	0	0	-	-	-
	(первая								
	категория)								
8	Кукуруза								
8	сахарная								
	(овощная) в								
	початках								
	(Zea mays L.								
	Коем.).								
	Сорта								
	Требования к посевным качествам семян <*>								
	Содержание								
	семян ядовитых								
	растений								
	(гелиотроп	%, не	0	0	0	0	-	-	-
	волосистоплодн	более							
	ый и								
	триходесма								
	седая)								
	Заселенность								
	клещом,								
	живыми	шт./кг	0	0	0	0	-	-	-
	вредителями и								
	их личинками								
	Всхожесть	%, не	94	94	94	94	-	-	-
	(семеноводческ	менее							
	ие)								
	Влажность	%, не	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
	(семеноводческ	более							
	ие)								
Требования к сортовым качествам семян									
Сортовая									
типичность при									
апробации:									
	полевой (вторая		-	-	98,0	98,0	98,0	98,0	-
	категория)								
	полевой (третья	%, не	-	-	95,0	95,0	95,0	95,0	-
	категория)	менее							
	амбарной		-	-	99,0	99,0	99,0	99,0	-
	(вторая								
	категория)								
	амбарной		-	-	98,0	98,0	98,0	98,0	-
	(третья								
	категория)								
	Содержание	шт./кг,							

	ксенийных зеренне при апробации более на 100 початков:							
	полевой (вторая категория)	-	-	50	50	50	50	-
	полевой (третья категория)	-	-	100	100	100	100	-
	амбарной (вторая категория)	-	-	3	3	3	3	-
	амбарной (третья категория)	-	-	5	5	5	5	-
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Содержание семян ядовитых растений (гелиотропный и триходесма седая)	% , не более	-	-	0	0	0	0
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	-	-	0	0	0	0
	Всхожесть (товарные)	% , не менее	-	-	86	86	86	86
	Влажность (товарные)	% , не более	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая типичность при апробации:							
	полевой (первая категория)	% , не менее	-	99,5	-	-	-	-
	амбарной (первая категория)		-	100	-	-	-	-
	Содержание ксенийных зерен при апробации на 100 початков:	шт./кг, не более	-	20	-	-	-	-
	полевой (первая категория)		-	0	-	-	-	-
	амбарной (первая категория)		-	0	-	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Содержание семян ядовитых растений (гелиотропный и триходесма седая)	% , не более	-	0	-	-	-	0
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	-	0	-	-	-	0
	Всхожесть: семеноводческие	% , не менее	-	88	-	-	-	-
	товарные		-	-	-	-	-	86

9
0
Кукуруза сахарная (овощная) в початках (Zea mays L. Коем.). Простые гибриды

	Влажность	%, не более	-	15,0	-	-	-	-	15,0
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая типичность при апробации:								
	полевой (первая категория)	%, не менее	99,5	99,5	99,5	99,5	-	-	-
	амбарной (первая категория)		100	100	100	100	-	-	-
	Содержание ксенийных зерен при апробации на 100 початков: шт./кг, полевой (первая категория)								
	амбарной (первая категория)	не более	20	20	20	20	-	-	-
	амбарной (первая категория)		0	0	0	0	-	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*>								
Кукуруза сахарная	Чистота семян	%, не менее	99,0	99,0	99,0	99,0	-	-	-
9 (овощная) в зерне	Содержание семян других растений в том числе семян сорных растений:								
(Zea mays L. Коем.). Сорта	в том числе	%, не более	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-
	растений (гелиотроп волосистоплодный и триходесма седая)		0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками								
	Всхожесть (товарные)	%, не менее	94	94	94	94	-	-	-
	Влажность (товарные)	%, не более	13,0	13,0	13,0	13,0	-	-	-
	Требования к сортовым качествам семян								
	Сортовая типичность при апробации:								
	полевой (вторая категория)	%, не менее	-	-	98,0	98,0	98,0	98,0	-
	полевой (третья категория)		-	-	95,0	95,0	95,0	95,0	-
	амбарной (вторая категория)		-	-	99,0	99,0	99,0	99,0	-
	амбарной (третья категория)		-	-	98,0	98,0	98,0	98,0	-
	Содержание ксенийных зерен при апробации на 100 початков: шт./кг, полевой (вторая категория)								
	полевой (третья категория)	не более	-	-	50	50	50	50	-
	полевой (третья категория)		-	-	100	100	100	100	-
Кукуруза сахарная (овощная) в зерне	Самоопыленные линии								
9 (Zea mays L. Коем.). Сорта									

	семеноводческие	-	0,05	-	-	-	-	-
	товарные	-	-	-	-	-	-	0,10
	в том числе семян ядовитых растений (гелиотроп волосистоплодный и триходесма седая)	-	0	-	-	-	-	0
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг	0	-	-	-	-	0
	Всхожесть: семеноводческие	%, не менее	88	-	-	-	-	-
	товарные	-	-	-	-	-	-	86
	Влажность	%, не более	13,0	-	-	-	-	13,0
Семейство мотыльковые								
Требования к сортовым качествам семян								
Сортовая чистота: семеноводческие								
	(первая категория)	%, не менее	99,5	99,5	99,5	99,5	-	-
	товарные (вторая категория)	-	-	99,0	99,0	99,0	-	-
	товарные (третья категория)	-	-	95,0	95,0	95,0	-	-
Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси:								
	в третьей категории	%, не более	-	-	5,0	5,0	5,0	-
	во второй категории	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
9	Бобы овощные							
4	крупносеменные (Vicia faba L.)							
Требования к посевным качествам семян <*>								
Чистота семян: семеноводческие								
	семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	99,0	-	-
	товарные	-	98,0	98,0	98,0	98,0	-	98,0
Содержание семян других растений:								
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
	в том числе семян сорных растений: семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
	товарные	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
	в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного)		0	0	0	0	-	0

	ого и триходесмы седой)							
	Всхожесть: семеноводческие	%, не менее	90	90	90	90	-	-
	товарные		80	80	80	80	80	-
	Влажность	%, не более	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг, не более	0	0	0	0	0	-
	Требования к сортовым качествам семян							
	Сортовая чистота: семеноводческие (первая категория)	%, не менее	99,5	99,5	99,5	99,5	-	-
	товарные (вторая категория)		-	-	99,0	99,0	99,0	-
	товарные (третья категория)		-	-	95,0	95,0	95,0	-
	Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси:	%, не более						
	в третьей категории		-	-	5,0	5,0	5,0	-
	во второй категории		-	-	1,0	1,0	1,0	-
	Требования к посевным качествам семян <*>							
	Чистота семян: семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	99,0	-	-
9	Бобы овощные		98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	-
5	мелкосеменные (Vicia faba L.)							
	Содержание семян других растений:							
	семеноводческие		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
	товарные		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
	в том числе семян сорных растений:							
	семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-
	в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)		0	0	0	0	0	-
	Всхожесть: семеноводческие	%, не менее	95	95	95	95	-	-
	товарные		85	85	85	85	85	-
	Влажность	%, не более	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-
	Заселенность	шт./кг,	0	0	0	0	0	-

	категория) товарные (вторая категория) товарные (третья категория) Примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси: в третьей категории во второй категории		-	-	99,0	99,0	99,0	-	-
			-	-	97,0	97,0	97,0	-	-
	Требования к посевным качествам семян <*> Чистота семян:								
	семеноводчески е	%, не менее	99,0	99,0	99,0	99,0	-	-	-
	товарные		98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	-	98,0
	Содержание семян других растений:								
	семеноводчески е		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
	товарные		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,4
	в том числе семян сорных растений:								
	семеноводчески е	%, не более	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
	товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2
	в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодн ого и триходесмы седой)		0	0	0	0	0	-	0
	Всхожесть:								
	семеноводчески е	%, не менее	90	90	90	90	-	-	-
	товарные		80	80	80	80	80	-	80
	Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	14,0
	Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг, не более	0	0	0	0	0	-	0
	Требования к сортовым качествам семян Сортовая чистота:								
	семеноводчески е (первая категория)		99,8	99,8	99,8	99,8	-	-	-
9 9	Фасоль овощная (Phaseolus vulgaris L.)	%, не менее	-	-	99,0	99,0	99,0	99,0	-
	товарные (вторая категория) товарные (третья категория)		-	-	97,0	97,0	97,0	97,0	-
	Примесь сортов и резких гибридов в	%, не более							

числе общей примеси:								
в третьей категории	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-
во второй категории	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
Требования к посевным качествам семян <*>								
Чистота семян:								
семеноводческие	%, не менее	99,0	99,0	99,0	99,0	-	-	-
товарные		98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Содержание семян других культурных растений:								
семеноводческие		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
товарные		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
в том числе семян сорных растений:								
семеноводческие	%, не более	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
товарные		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
в том числе ядовитых растений (гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой)								
		0	0	0	0	0	0	0
Всхожесть:								
семеноводческие	%, не менее	90	90	90	90	-	-	-
товарные		80	80	80	80	80	80	80
Влажность	%, не более	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Заселенность клещом, живыми вредителями и их личинками	шт./кг, не более	0	0	0	0	0	0	0

<*> Для дражированных семян и семян, размер партии которых менее установленного размера пробы семян, признаком посевных качеств семян является всхожесть согласно допустимым значениям.

Таблица 2

Требования к посевным качествам семян лука-севка и выборка

Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян

малогнездные сорта

средне-и многогнездные сорта

осенне-зимний период

весенний период

кубастой формы

других форм

осенне-

зимний период

весенний период

осенне-

зимний период

весенний период

Внешний вид

здоровые, чистые луковицы, с сухими кроющими чешуями, хорошо вызревшей шейкой, с остатками корней или без них, иметь окраску и форму, свойственную сорту

Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру

Севок:

мм

первая группа (не более 10% лука-севка других размеров и лука-выборка из севка)

10,0 - 15,0

10,0 - 15,0

15,0 - 25,0

15,0 - 25,0

15,1 - 22,0

15,1 - 22,0

вторая группа (не более 10% лука-севка диаметром ниже 1-й группы и лука-выборка из севка)

15,1 - 22,0

15,1 - 22,0

25,1 - 30,0

25,1 - 30,0

22,1 - 30,0

22,1 - 30,0

третья группа (не более 10% лука-севка диаметром ниже 10 мм и лука-выборка из севка)

-

-

-

-

10,0 - 15,0

10,0 - 15,0

Выборок:

мм

из лука-севка (не более 10% лука-севка всех размеров и лука-выборка диаметром выше установленного)

22,1 - 40,0

22,1 - 40,0

-

-

30,1 - 40,0

30,1 - 40,0

из лука репки (не более 10% лука других размеров)

20,0 - 40,0

20,0 - 40,0

20,0 - 30,0

20,0 - 30,0

20,0 - 40,0

20,0 - 40,0

Чистота семян

%, не менее

95,0

92,0

95,0

92,0

95,0

92,0

Наличие отхода и примеси, всего

%, не более

5,0

8,0

5,0

8,0

5,0

8,0

в том числе:

луковиц больных, поврежденных вредителями

1,3

2,0

1,3

2,0

1,3

2,0

высохших

0,7

1,0

0,7

1,0

0,7

1,0

луковиц с механическими повреждениями, проросших, оголенных (оголенные в отход включают только при осеннем использовании)

2,0

4,0

2,0

4,0

2,0

4,0

примеси (земля, чешуи и др.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Наличие живых клещей и поражение луковиц стеблевой нематодой

шт./кг, не более

0

0

0

0

0

0

Наличие подмороженных и запаренных луковиц

шт./кг, не более

0

0
0
0
0
0

Таблица 3

Требования к сортовым и посевным качествам семян чеснока (*Allium Sativum*)

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные семена

элитные семена

семена первой и второй репродукции

первый класс

первый класс

первый класс

второй класс

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

семеноводческие

99,0

99,0

98,0

-

товарные

-

-

-

96,0

Примесь других сортов в посадочном материале третьей категории

%, не более

-

-

-

4,0

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

цельные, незагрязненные луковицы. По форме и окраске свойственные ботаническому сорту. Не поврежденные вредителями и болезнями, с сухими общими кроющими чешуями, целым твердым донцем, с остатками корней или без них, сухой тонкой шейкой (у нестрелкующихся форм длиной до 50 мм, у стрелкующихся - до 20 мм)

Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру:

мм, не менее

для озимого чеснока:

стрелкующихся форм

30,0

30,0

30,0

25,0

нестрелкующихся форм

25,0

25,0

25,0

30,0

для ярового чеснока

30,0

30,0

30,0

25,0

однозубок (севка) чеснока, по наибольшему поперечному диаметру

мм

более 12,0

более 12,0

более 12,0

10,0 - 12,0

воздушных луковичек (бульбочек) чеснока

5,1 - 8,0

5,1 - 8,0

5,1 - 8,0

4,0 - 5,0

Наличие луковиц, однозубок, воздушных луковичек размером менее установленного, всего, к массе основной культуры

%, не более

3,0

3,0

3,0

5,0

Чистота семян:

%, не менее

семеноводческие

93,5

93,5

93,5

-

товарные

91,0

91,0

91,0

91,0

Наличие отхода и примеси в осенне-зимний период:

%, не более

для озимых форм

6,5

6,5

6,5

9,0

для яровых форм

2,5

2,5

2,5

4,0

в том числе:

луковиц, зубков, однозубок и воздушных луковичек больных, высохших, поврежденных вредителями

0,5

0,5

0,5

1,0

зубков, однозубок и воздушных луковичек с механическими повреждениями, оголенных (для озимых форм)

4,0

4,0

4,0

5,0

зубков, однозубок и воздушных луковичек проросших (для озимых форм)

1,0

1,0

1,0

2,0

зубков с механическими повреждениями (для яровых форм)

1,0

1,0

1,0

2,0

примеси (земля, чешуи и др.)

1,0

1,0

1,0

2,0

Наличие отхода и примеси в весенний период, всего:

%, не более

4,0

4,0

4,0

6,5

луковиц и зубков больных, высохших, поврежденных вредителями

1,0

1,0

1,0

1,5

зубков с механическими повреждениями, оголенных

1,5

1,5

1,5

3,0

луковиц проросших

0,5

0,5

0,5

1,0

примеси (земля, чешуи и др.)

1,0

1,0

1,0

1,0

Наличие здоровых зубков, отпавших от общего донца

%, не более

2,0

2,0

2,0

3,0

Наличие живых клещей и поражение луковиц стеблевой нематодой

%, не более

0

0

0

0

Наличие подмороженных и запаренных луковиц и однозубок

%, не более

0

0

0

0

Приложение 8 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Таблица 1

Требования к сортовым и посевным качествам саженцев семечковых, косточковых плодовых сельскохозяйственных растений и ореха грецкого, черенков семечковых, косточковых плодовых, ягодных сельскохозяйственных растений, ореха грецкого и

винограда (за исключением подвоев семечковых, косточковых плодовых сельскохозяйственных растений и ореха грецкого)

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные, элитные, репродукционные семена

класс А (оздоровленные)

класс Б (тестированные)

класс В

1. Саженцы абрикоса, алычи, вишни, груши, ореха грецкого, сливы, черешни, яблони и других плодовых сельскохозяйственных растений

1.1. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян

Общие требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

100

Общие требования к посевным качествам семян

Внешний вид

развитые, не подсохшие, без корнепорослевых побегов, подмерзания коры и камбия корней, поломки, пеньков, шипа на подвойной части, поросли на подвое, ожогов коры, достигающих до древесины, несовместимости привоя и подвоя, наличия конкурентов в центре кроны под углом 40 °, гибели почек в зоне кроны, распускания листьев, проявления розеточности, фитифторозной гнили корневой шейки, бактериального, обыкновенного европейского и корневого рака

Количество боковых побегов:

шт., не менее

однолетние разветвленные

2

2

2

двухлетние сильноветвящиеся

4

4

4

двухлетние слабоветвящиеся

2

2

2

Длина корневой системы:

см, не менее

однолетние и корнесобственные

20

20

20

двухлетние

25

25

25

Длина отводочной части клонового подвоя

см, не менее

35

35

35

Наличие саженцев с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

5

1.2.1. Абрикос

1.2. Дополнительные требования к посевным качествам семян

Количество корней:

шт., не менее

однолетние

3

3

3

двухлетние

5

5

5

Высота штамба:

см

однолетние

40 - 70

40 - 70

40 - 70

двухлетние

40 - 80

40 - 80

40 - 80

Высота надземной части:

см, не менее

однолетние

110

110

110

двухлетние

110

110

110

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

11

11

11

двухлетние

16

16

16

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

15

15

15

двухлетние

30

30

30

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

Заселенность корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

%, не более

2

2

2

1.2.2. Алыча

Количество корней:

шт., не менее

однолетние

3

3

3

двухлетние

3

3

3

Высота штамба:

см

однолетние

60 - 80

60 - 80

60 - 80

двухлетние

60 - 80

60 - 80

60 - 80

Высота надземной части:

см, не менее

однолетние

110

110

110

двухлетние

110

110

110

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

12

12

12

двухлетние

16

16

16

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

15

15

15

двухлетние

30

30

30

Заселенность вредителями:

%

тля

0

0

10

корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

2

2

2

Зараженность болезнями:

%

грибными:

парша, мучнистая роса, серебристость листьев

0

0

0

пятнистость листьев

0

0

20

вирусными:

ArMV, ACLSV, PDV, PNRSV, PPV

0

0

-

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

1.2.3. Вишня

Количество корней

шт., не менее

3

3

3

Высота штамба

см

60 - 80

60 - 80

60 - 80

Высота надземной части

см, не менее

100

100

100

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

10

10

10

двухлетние

16

16

16

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

15

15

15

двухлетние

30

30

30

Заселенность вредителями:

%

тля

0

0

10

корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

2

2

2

Зараженность болезнями:

%

грибными:

парша, мучнистая роса, серебристость листьев

0

0

0

пятнистость листьев

0

0

20

вирусными:

ApMV, ACLSV, PDV, PNRSV, RRV, PPV

0

0

-

CLRV

0

-

-

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

1.2.4. Вишня войлочная

Количество корней

шт., не менее

3

3

3

Высота надземной части

см, не менее

80

80

80

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

10

10

10

двухлетние

18

18

18

Высота штамба:

см, не менее

однолетние

-

-

-

двухлетние

60

60

60

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

-

-

-

двухлетние

50

50

50

Заселенность вредителями:

%

тля

0

0

10

корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

2

2

2

Зараженность болезнями:

%

грибными:

парша, мучнистая роса, серебристость листьев

0

0

0

пятнистость листьев

0

0

20

вирусными:

ArMV, ACLSV, PDV, PNRSV, RRV, PPV

0

0

-

CLRV

0

-

-

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

1.2.5. Груша

Количество корней

шт., не менее

3

3

3

Высота штамба

см

60 - 80

60 - 80

60 - 80

Высота надземной части у однолетних и двухлетних корнесобственных саженцев:

см, не менее

на сильнорослом подвое

120

120

120

на слаборослом со вставкой совместимого сорта

110

110

110

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

10

10

10

двухлетние:

на сильнорослом подвое

15

15

15

на слаборослом со вставкой совместимого сорта

14

14

14

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

15

15

15

двухлетние

20

20

20

Заселенность вредителями:

%

тля

0

0

10

корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

2

2

2

Зараженность болезнями:

%

грибными:

парша

0

0

20

мучнистая роса

0

0

10

серебристость, пятнистость листьев

0

0

0

вирусными:

ASGV

0

-

-

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

1.2.6. Орех грецкий

Количество корней:

шт., не менее

однолетние и корнесобственные

3

3

3

двухлетние

5

5

5

Высота надземной части

см, не менее

20

20

20

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

7

7

7

двухлетние

12

12

12

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

Заселенность корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

%, не более

2

2

2

1.2.7. Слива

Количество корней

шт., не менее

3

3

3

Высота штамба

см

60 - 80

60 - 80

60 - 80

Высота надземной части

см, не менее

110

110

110

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

12

12

12

двухлетние

16

16

16

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

15

15

15

двухлетние

30

30

30

Заселенность вредителями:

%

тля

0

0

10

корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

2

2

2

Зараженность болезнями:

%

грибными:

парша, мучнистая роса, серебристость листьев

0

0

0

пятнистость листьев

0

0

20

вирусными:

ArMV, ACLSV, PDV, PNRSV, PPV

0

0

-

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

1.2.8. Черешня

Количество корней

шт., не менее

3

3

3

Высота штамба

см

60 - 80

60 - 80

60 - 80

Высота надземной части

см, не менее

120

120

120

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

12

12

12

двухлетние

15

15

15

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

15

15

15

двухлетние

30

30

30

Заселенность вредителями:

%

тля

0

0

10

корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

2

2

2

Зараженность болезнями:

%

грибными (парша, мучнистая роса, серебристость, пятнистость листьев)

0

0

0

вирусными:

ApMV, ACLSV, PDV, PNRSV, RRV, PPV

0

0

-

CLRV

0

-

-

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

1.2.9. Яблоня

Количество корней

шт., не менее

3

3

3

Высота штамба

см

60 - 80

60 - 80

60 - 80

Высота надземной части:

см, не менее

однолетние:

на сильнорослом подвое и на сильнорослом со вставкой слаборослого подвоя

100

100

100

на слаборослом подвое

90

90

90

двухлетние:

на сильнорослом подвое, среднерослом и сильнорослом со вставкой карликового

100

100

100

на карликовом подвое

90

90

90

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние:

на сильнорослом подвое

10

10

10

на сильнорослом подвое со вставкой слаборослого и на слаборослом подвое

9

9

9

двухлетние:

на сильнорослом подвое

15

15

15

на среднерослом и сильнорослом подвое со вставкой карликового

14

14

14

на карликовом подвое

11

11

11

Длина боковых побегов:

см, не менее

однолетние

15

15

15

двухлетние:

на сильнорослом, среднерослом и сильнорослом подвоях со вставкой карликового

30

30

30

на карликовом подвое

20

20

20

Заселенность вредителями:

%

тля

0

0

10

корней галлицами, плодовыми мухами и другими зимующими вредителями

2

2

2

Зараженность болезнями:

%

грибными:

парша

0

0

20

мучнистая роса

0

0

10

серебристость, пятнистость листьев

0

0

0

вирусными:

ApMV, ASGV

0

0

-

ACLSV

0

-

-

Наличие свежих ранок от удаления побегов

шт., не более

2

2

2

2. Черенки алычи, винограда, вишни, груши, ореха грецкого, сливы, черешни, яблони и других плодовых сельскохозяйственных растений, ягодных сельскохозяйственных растений

2.1. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян

Общие требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

100

Общие требования к посевным качествам семян

Внешний вид

без морщинистости коры, повреждений механических, морозом и градом, вызревшие, без усиков и пасынков, с не поврежденными почками, находящимися в состоянии покоя, с живым камбием и лубом, древесиной и сердцевинной, не подсохшие, листья в состоянии тургора

Возраст

лет

1

1

1

Наличие черенков с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

5

2.2.1. Алыча, вишня, груша, слива, черешня, яблоня

2.2. Дополнительные требования к посевным качествам семян

Длина черенка:

см, не менее

одревесневшего

40

40

40

полуодревесневшего и однолетнего зеленого

20

20

20

Толщина черенка:

мм, не менее

одревесневшего

5

5

5

полудревесневшего и однолетнего зеленого

4

4

4

Количество живых глазков

шт., не менее

5

5

5

2.2.2. Алыча, слива

Заселенность тлей

%

0

0

0

Зараженность болезнями:

%

грибными (парша, мучнистая роса, серебристость, пятнистость листьев)

0

0

0

вирусными:

ArMV, ACLSV, PDV, PNRSV, PPV

0

0

-

2.2.3. Вишня, черешня

Заселенность тлей

%

0

0

0

Зараженность болезнями:

%

грибными (парша, мучнистая роса, серебристость, пятнистость листьев)

0

0

0

вирусными:

ApMV, ACLSV, PDV, PNRSV, RRV, PPV

0

0

-

CLRV

0

-

-

2.2.4. Груша

Заселенность тлей

%

0

0

0

Зараженность болезнями:

%

грибными (парша, мучнистая роса, серебристость, пятнистость листьев)

0

0

0

вирусными (ASGV)

0

-

-

2.2.5. Яблоня

Заселенность тлей

%

0

0

0

Зараженность болезнями:

%

грибными (парша, мучнистая роса, серебристость, пятнистость листьев)

0

0

0

вирусными:

ApMV, ASGV

0

0

-

ACLSV

0

-

-

3. Черенки ягодных сельскохозяйственных растений

Длина черенка:

см, не менее

одревесневшего

18

18

18

полуодревесневшего и однолетнего зеленого

20

20

20

Толщина черенка:

мм, не менее

одревесневшего

8

8

8

полуодревесневшего и однолетнего зеленого

4

4

4

Количество живых глазков:

шт., не менее

одревесневшего

3

3

3

полуодревесневшего и однолетнего зеленого

5

5

5

4. Черенки ореха грецкого

Длина черенка

см, не менее

40

40

40

Толщина черенка

мм, не менее

7

7

7

Количество живых глазков

шт., не менее

5

5

5

5. Черенки винограда

Длина черенка

см, не менее

20

20

20

Толщина черенка

мм, не менее

4

4

4

Количество живых глазков

шт., не менее

2

2

2

Таблица 2

Требования к сортовым и посевным качествам саженцев смородины черной, красной, белой, крыжовника, их гибридов и других видов, голубики, рассады земляники

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные, элитные, репродукционные семена

класс А (оздоровленные)

класс Б (тестированные)

класс В

закрытая корневая система

открытая корневая система

закрытая корневая система

открытая корневая система

закрытая корневая система

открытая корневая система

1. Смородина черная, красная, белая, крыжовник, их гибриды и другие виды

1.1. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян

Общие требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

100

100

100

100

Общие требования к посевным качествам семян

Внешний вид

не подсохшие, без листьев, поражений вредителями, развитые, с одревесневшей корневой системой от светло- до темно-коричневого цвета

Возраст

лет

-

1 - 2

-

1 - 2

-

1 - 2

Длина корневой системы:

см, не менее

разветвленная

-

15

-

15

-

15

мочковатая

-

10

-

10

-

10

Количество основных корней у разветвленной корневой системы

шт., не менее

-

3

-

3

-

3

Количество основных побегов:

шт., не менее

однолетние

-

1

-

1

-

1

двухлетние

-

2

-

2

-

2

Толщина стволика:

мм, не менее

однолетние

-

6

-

6

-

6

двухлетние

-

8

-

8

-

8

Высота надземной части

см, не менее

-

30

-

30

-

30

Заселенность вредителями (почковый клещ, стеклянница)

%

0

0

0

0

0

0

Зараженность мучнистой росой

%

0

0

0

0

5

5

супер-суперэлита

элита

первая репродукция

Зараженность вирусными болезнями:

%

RCRV реверсия

0

0

0

0

0

0

ArMV

0

0

0

0

-

-

RRV, SLRV, TBRV, TomRSV

0

0

-

-

-

-

СМV

0

0

0

0

-

-

Наличие саженцев с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

5

5

5

5

1.2.1. Смородина черная, красная, белая

1.2. Дополнительные требования к посевным качествам семян

Возраст

лет

1

-

1

-

1

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

10

-

10

-

Толщина стволика

мм, не менее

6

-

6

-

6

-

Высота надземной части

см, не менее

20

-

20

-

20

-

1.2.2. Крыжовник

Возраст

лет

1 - 2

-

1 - 2

-

1 - 2

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

10

-

10

-

Толщина стволика у корневой шейки:

мм, не менее

однолетний:

5

-

5

-

5

-

в том числе слаборослых сортов

4

-

4

-

4

-

двухлетний:

6

-

6

-

6

-

в том числе слаборослых сортов

5

-

5

-

5

-

Высота надземной части:

см, не менее

однолетний:

30

-

30

-

30

-

в том числе слаборослых сортов

20

-

20

-

20

-

двухлетний:

40

-

40

-

40

-

в том числе слаборослых сортов

30

-

30

-

30

-

Количество основных побегов:

шт., не менее

однолетний

1

-

1

-

1

-

двухлетний

2

-

2

-

2

-

2. Голубика

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

100

100

100

100

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

не подсохшие, развитые, без поражений болезнями, вредителями

Возраст

лет

-

1 - 3

-

1 - 3

-

1 - 3

Длина корневого пучка:

см, не менее

однолетние

-

5

-

5

-

5

двухлетние

-

10

-

10

-

10

трехлетние

-

15

-

15

-

15

Количество побегов:

шт., не менее

однолетние

-

1

-

1

-

1

двухлетние

-

2

-

2

-

2

трехлетние

-

3

-

3

-

3

Высота надземной части:

см, не менее

однолетние

-

10

-

10

-

10

двухлетние

-

25

-

25

-

25

трехлетние

-

35

-

35

-

35

Возраст

лет

1 - 3

1 - 3

1 - 3

Диаметр, высота кома корней:

см, не менее

однолетние

5

-

5

-

5

-

двухлетние

10

-

10

-

10

-

трехлетние

15

-

15

-

15

-

Количество побегов:

шт., не менее

однолетние

1

-

1

-

1

-

двухлетние

2

-

2

-

2

-

трехлетние

3

-

3

-

3

-

Высота надземной части:

см, не менее

однолетние

10

-

10

-

10

-

двухлетние

25

-

25

-

25

-

трехлетние

35

-

35

-

35

-

супер-суперэлита

элита

первая репродукция

Заселенность тлей

%

0

0

0

0

0

0

Зараженность болезнями:

%

грибными (серая плесень)

0

0

0

0

5

5

вирусными:

BLMV, BRRV, BBSSV, ToRSV

0

0

0

0

-

-

BlScV, BlShV

0

0

-

-

-

-

Наличие саженцев с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

5

5

5

5

3. Земляника

3.1. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян

Общие требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

100

100

100

100

Общие требования к посевным качествам семян

Внешний вид

без механических повреждений, неувядшая, с развитой верхушечной почкой, мочковатой корневой системой (у свежевыкопанной рассады - белого цвета или слегка потемневшей, после зимнего хранения - слегка потемневшей), с развитыми листьями, за исключением рассады земляники "фриго"

Возраст

лет

1

1

1

1

1

1

3.2.1. Земляника (за исключением земляники "фриго")

3.2. Дополнительные требования к посевным качествам семян

Диаметр рожка

мм, не менее

-

8

-

8

-

8

Длина корневой системы

см, не менее

-

5

-

5

-

5

Количество листьев при реализации:

шт., не менее

весной

-

1

-

1

-

1

осенью

-

2

-

2

-

2

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

5

-

5

-

5

-

Диаметр рожка:

мм, не менее

адаптивной (супер-суперэлита класса А)

3

-

3

-

3

-

остальные классы и категории

8

-

8

-

8

-

супер-суперэлита

элита

первая репродукция

Заселенность вредителями (клещ, тля)

%

0

0

0,1

0,1

5

5

Зараженность болезнями:

%

грибными (мучнистая роса, пятнистость)

0

0

0,5

0,5

5

5

вирусными:

ArMV, RRV, SLRV, TBRV

0

0

0

0

-

-

TomRSV

0

0

-

-

-

-

Наличие рассады с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

5

5

5

5

3.2.2. Земляника "фриго"

Количество листьев

шт., не менее

2

-

2

-

2

-

Диаметр рожка

мм, не менее

8

-

8

-

8

-

Длина корневой системы

см, не менее

5

-

5

-

5

-

Длина надземной части

см, не менее

3

-

3

-

3

-

Таблица 3

Требования к сортовым и посевным качествам подвоев семечковых и косточковых плодовых сельскохозяйственных растений и ореха грецкого

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные, элитные, репродукционные семена

класс А (оздоровленные)

класс Б (тестируемые)

класс В

первый сорт

второй сорт

первый сорт

второй сорт

первый сорт

второй сорт

1. Абрикос, алыча, вишня, груша, орех грецкий, слива, черешня, яблоня и другие плодовые сельскохозяйственные растения

1.1. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян

Общие требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

100

100

100

100

Общие требования к посевным качествам семян

Внешний вид

не подсохшие, развитые, с одним стволиком и корневой системой, сформированными почками, находящиеся в состоянии покоя, без листьев, механических повреждений, распускания почек, ожогов, подмерзаний, сморщенности, растрескивания, отслаивания коры от древесины, сухости древесины, поломки стволика, побурения камбия и древесины, плесневения, искривления корневой шейки, повреждений фитопфторозной гнилью корневой шейки, млечным блеском, бактериальным, обыкновенным европейским, корневым и черным раком, цитоспорозом

Заселенность тлей

%

0

0

0

0

0

0

Зараженность грибными болезнями (парша, мучнистая роса, серебристость листьев, пятнистость листьев)

%

0

0

0

0

0

0

Наличие подвоев с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

5

5

5

5

1.2.1. Груша, яблоня

1.2. Дополнительные требования к посевным качествам семян

Возраст

лет

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

Высота надземной части:

см, не менее

семенной

30

30

30

30

30

30

клоновый

50

50

50

50

50

50

Расстояние от корневой шейки до основания боковых побегов:

см, не менее

семенной

15

15

15

15

15

15

клоновый

30

30

30

30

30

30

Длина корневой системы:

см, не менее

семенной

15

15

15

15

15

15

клоновый

10

10

10

10

10

10

Количество основных корней

шт., не менее

3

2

3

2

3

2

Толщина стволика:

мм

семенной

7 - 10

5 - 7

7 - 10

5 - 7

7 - 10

5 - 7

клоновый

7 - 11

5 - 7

7 - 11

5 - 7

7 - 11

5 - 7

Зараженность вирусными болезнями (для груши):

%

ASGV

0

0

-

-

-

-

Зараженность вирусными болезнями (для яблони):

%

ApMV, ASGV

0

0

0

0

-

-

ACLSV

0

0

-

-

-

-

1.2.2. Алыча, вишня, слива, черешня

Возраст

лет

1

1

1

1

1

1

Высота надземной части:

см, не менее

семенной

30

30

30

30

30

30

клоновый

50

50

50

50

50

50

Расстояние от корневой шейки до основания боковых побегов:

см, не менее

семенной

15

15

15

15

15

15

клоновый

30

30

30

30

30

30

Длина корневой системы:

см, не менее

семенной

15

10

15

10

15

10

клоновый

10

10

10

10

10

10

Количество основных корней

шт., не менее

3

2

3

2

3

2

Толщина стволика:

мм

семенной

6 - 10

4 - 6

6 - 10

4 - 6

6 - 10

4 - 6

КЛООНОВЫЙ

7 - 11

5 - 7

7 - 11

5 - 7

7 - 11

5 - 7

Зараженность вирусными болезнями (алыча, слива):

%

ApMV, ACLSV, PDV, PNRSV, PPV

0

0

0

0

-

-

Зараженность вирусными болезнями (вишня, черешня):

%

ApMV, ACLSV, PDV, PNRSV, RRV, PPV

0

0

0

0

-

-

CLRV

0

0

-

-

-

-

1.2.3. Абрикос

Возраст

лет

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

Высота надземной части:

см, не менее

однолетний

30

30

30

30

30

30

двухлетний

140

110

140

110

140

110

Расстояние от боковой шейки до основания боковых побегов:

см, не менее

однолетний

15

15

15

15

15

15

двухлетний

30

30

30

30

30

30

Длина корневой системы:

см, не менее

однолетний

15

10

15

10

15

10

двухлетний

25

20

25

20

25

20

Количество основных корней:

шт., не менее

однолетний

3

2

3

2

3

2

двухлетний

5

3

5

3

5

3

Толщина стволика:

мм

однолетний

6 - 10

4 - 6

6 - 10

4 - 6

6 - 10

4 - 6

двухлетний

13

11

13

11

13

11

1.2.4. Орех грецкий

Возраст

лет

1 - 3

1 - 3

1 - 3

1 - 3

1 - 3

1 - 3

Высота надземной части:

см, не менее

однолетний

20

15

20

15

20

15

двухлетний

25

20

25

20

25

20

трехлетний

50

45

50

45

50

45

Расстояние от боковой шейки до основания боковых побегов:

см, не менее

трехлетний

30

30

30

30

30

30

Длина корневой системы:

см, не менее

однолетний

20

18

20

18

20

18

двухлетний

25

20

25

20

25

20

трехлетний

30

25

30

25

30

25

Количество основных корней:

шт., не менее

однолетний и двухлетний

5

3

5

3

5

3

трехлетний

7

5

7

5

7

5

Толщина стволика:

мм

однолетний

10 - 20

7 - 12

10 - 20

7 - 12

10 - 20

7 - 12

двухлетний

12 - 25

7 - 15

12 - 25

7 - 15

12 - 25

7 - 15

трехлетний

12 - 30

10 - 25

12 - 30

10 - 25

12 - 30

10 - 25

Таблица 4

Требования к сортовым и посевным качествам саженцев винограда, аронии, облепихи, жимолости, хеномелеса, актинидии, бузины, калины, малины, ежевики, шиповника и других ягодных сельскохозяйственных растений (кроме поименованных в таблицах 2 и 6 настоящего приложения)

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

репродукционные семена

класс В

закрытая корневая система

открытая корневая система

1. Виноград

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

развитые, без повреждений на побегах и корнях, вызревшие с сформированными глазками, расположением основных корней по окружности на нижнем узле (пятке), с срезами сочными, белого цвета, полностью одревесневшие от светло- до темно-коричневого цвета, однолетние побеги с шестью-восемью листьями для закрытой корневой системы

Возраст

лет

1 - 2

1 - 2

Количество побегов

шт., не менее

1

1

Количество сформированных глазков на одном побеге

шт., не менее

4

4

Длина вызревшей части побега:

см, не менее

однолетние

15

15

двухлетние

20

20

Диаметр основания побега:

мм, не менее

однолетние

3

3

двухлетние

5

5

Количество основных корней

шт., не менее

3

-

Длина корней

см, не менее

8

-

Толщина корней

мм, не менее

2

-

Размер земляного кома:

см, не менее

диаметр

8

-

высота

10

-

Заселенность вредителями (листогрызущие, филлоксера, тля, клещ)

%

0

0

Зараженность болезнями:

%

грибными:

милдью

5

-

оидиум

0

0

бактериальными, вирусными и вирусоподобными

0

0

Наличие саженцев с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

2. Арония, облепиха, жимолость, хеномелес, актинидия, бузина, калина и другие ягодные сельскохозяйственные растения (кроме поименованных в таблицах 2 и 6 настоящего приложения)

2.1. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян

Общие требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

Общие требования к посевным качествам семян

Внешний вид

не подсохшие, без повреждений на побегах и корнях, с сформировавшимися почками, находящимися в состоянии покоя, полностью одревесневшей корневой системой, от светло- до темно-коричневого цвета

Возраст

лет

-

2

Длина корневой системы

см, не менее

-

20

Количество основных корней

шт., не менее

-

3

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

-

6

Заселенность и зараженность вредителями и болезнями

%

0

0

Наличие саженцев с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

5

5

2.2.1. Арония

2.2. Дополнительные требования к посевным качествам семян

Количество основных побегов

шт., не менее

-

2

Высота надземной части

см, не менее

25

50

Возраст

лет

1

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

6

-

2.2.2. Хеномелес

Количество основных побегов

шт., не менее

-

3

Высота надземной части

см, не менее

20

35

Возраст

лет

1

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

6

-

2.2.3. Бузина

Количество основных побегов

шт., не менее

-

2

Высота надземной части

см, не менее

30

50

Возраст

лет

1

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

6

-

2.2.4. Калина

Количество основных побегов

шт., не менее

-

2

Высота надземной части

см, не менее

25

30

Возраст

лет

1

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

6

-

2.2.5. Облепиха

Количество основных побегов

шт., не менее

-

1

Возраст

лет

1 - 2

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

Толщина стволика у корневой шейки:

мм, не менее

однолетние:

5

-

в том числе слаборослые сорта

4

-

двухлетние:

6

-

в том числе слаборослые сорта

5

-

Высота надземной части:

см, не менее

однолетние:

30

50

в том числе слаборослые сорта

20

-

двухлетние:

40

50

в том числе слаборослые сорта

30

-

Количество основных побегов:

шт., не менее

однолетние

1

-

двухлетние

2

-

2.2.6. Жимолость

Количество основных побегов

шт., не менее

-

2

Высота надземной части

см, не менее

20

35

Возраст

лет

1

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

4

-

2.2.7. Актинидия (аргута, коломикта)

Количество основных побегов

шт., не менее

-

1

Возраст

лет

1

-

Диаметр и высота земляного кома

см, не менее

10

-

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

6

-

Высота надземной части:

см, не менее

аргута

25

30

коломикта

15

30

3. Малина, ежевика, шиповник

3.1. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян

Общие требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

Общие требования к посевным качествам семян

Внешний вид

не подсохшие, без листьев и механических повреждений, с одревесневшими побегами, развитой корневой системой

Возраст

лет

-

1

Длина корневой системы

см, не менее

-

15

Высота надземной части

см, не менее

-

40

Количество основных побегов

шт.

-

1

Толщина стволика у корневой шейки

мм, не менее

-

8

Заселенность вредителями (листогрызущие, тля, почковая моль, галлица)

%

-

0

Зараженность бактериальными, грибными, вирусными и вирусоподобными болезнями

%

-

0

Наличие саженцев с отклонением от допустимых значений признаков

%, не более

-

5

3.2.1. Малина

3.2. Дополнительные требования к посевным качествам семян

Количество основных скелетных корней

шт., не менее

-

3

3.2.2. Ежевика, шиповник

Количество основных скелетных корней

шт., не менее

-

2

Таблица 5

Требования к сортовым и посевным качествам микросаженцев голубики высокорослой

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные семена

класс А (оздоровленные)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид:

регенеранты

не укорененные растения, находящиеся в стерильных условиях *in vitro*, имеющие один и более сформированных побегов, состоящих не менее чем из трех метамеров каждый, с окраской листьев и побегов от светло-зеленой до антоцианово-зеленой, без повреждений: механических, вредителями, болезнями

витропланты

укорененные растения, находящиеся в стерильных условиях *in vitro*, имеющие один-два сформированных побега высотой до 10 см, состоящих не менее чем из трех метамеров каждый, с окраской листьев и побегов от светло-зеленой до антоцианово-зеленой, без повреждений: механических, вредителями, болезнями

первичные адаптанты

облиственные, укорененные растения, витропланты высотой до 13 см, в возрасте 15 - 30 дней после пересадки из стерильных условий *in vitro*, адаптированные к условиям роста *ex vitro* в верховом нераскисленном торфе либо в смеси песка и верхового нераскисленного торфа в соотношении 1:1, с окраской листьев и побегов от светло-зеленой до антоцианово-зеленой, без повреждений: механических, вредителями, болезнями

Высота побегов:

см, не более

регенеранты

8

витропланты

10

первичные адаптанты

13

Количество побегов:

шт., не менее

регенеранты

1

витропланты

1 - 2

первичные адаптанты

1 - 2

Таблица 6

Требования к сортовым и посевным качествам саженцев клюквы крупноплодной и брусники

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

репродукционные семена

класс В

первый сорт

второй сорт

1. Клюква крупноплодная

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

облиственные, с тремя и более побегами, корневой системой двух и более мочек, без поражения вредителями, болезнями

облиственные, с одним и более побегами, корневой системой из одной и более мочек, без поражения вредителями, болезнями

Возраст саженцев

лет

2 - 3

2 - 3

Высота побегов

см

12

4 - 6

Количество корневых мочек

шт.

3 - 4

1

2. Брусника

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%

100

100

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

облиственные, с двумя и более побегами, корневой системой из пяти и более мочек, без поражения вредителями, болезнями

облиственные, с одним и более побегами, корневой системой из трех и более мочек, без поражения вредителями, болезнями

Возраст саженцев

лет

1 - 2

1

Высота

см

7

4,0 - 6,9

Количество корневых мочек

шт.

5

3 – 5

Приложение 9 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН ЦВЕТОЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Таблица 1

Требования к сортовым и посевным качествам семян цветочных сельскохозяйственных растений (за исключением луковиц, клубнелуковиц, корневищ, клубней и других вегетативных частей, черенков, рассады, саженцев)

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их производства

оригинальные, элитные, репродукционные семена

первый класс

второй класс

третий класс

1. Семена однолетних и двухлетних растений

1.1

Агератум (Хоустона, мексиканский)

(*Ageratum houstonianum* Mill.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

75

75

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

70

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

9

9

9

1.2

Адонис летний

(*Adonis aestivalis* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

1.3

Амарант (Щирица)

(метельчатый, трехцветковый, хвостатый)

(*Amaranthus paniculatus* L., *trikolor* L., *caudatus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

97

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

13

13

13

1.4

Амбербоа мускусная (Василек мускусный)

(*Amberboa moschata* (L.) DC.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

92

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.5

Аммобиум крылатый крупноцветковый

(*Ammobium alatum* R. Br. var. *grandiflorum* hort.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

85

Всхожесть

%, не менее

80

70

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.6

Анхуза итальянская

(*Anchusa italica* Retz.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

93

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

10

10

10

1.7

Арктотис гибридный

(*Arctotis x hybridus hort.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

96

96

96

вторая категория

93

93

93

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85

70

70

Всхожесть

%, не менее

85

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.8

Астра однолетняя (Каллистефус китайский)

(*Callistephus chinensis* (L.) Nees)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

94

94

94

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.9

Бальзамин (Недотрога бальзаминовая)

(*Impatiens balsamina* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

97

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

10

10

10

1.10

Бархатцы (отклоненные, прямостоячие)

(*Tagetes patula* L., *erecta* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

92

92

92

вторая категория

88

88

88

Махровость:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.11

Бархатцы тонколистные

(*Tagetes tenuifolia* Cav. *signata* Bartl.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

92

92

92

вторая категория

88

88

88

Махровость:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

60

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.12

Бегония вечноцветущая

(*Begonia semperflorens* Link et Otto)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

70

70

70

вторая категория

60

60

60

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

80

60

30

Влажность

%, не более

10

10

10

1.13

Бегония клубневая гибридная

(*Begonia x tuberhybrida* Voss.)

Требования к сортовым качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

1.14

Брахикома иберисолистная

(*Brachycome iberidifolia* Benth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

80

80

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

9

9

9

1.15

Василек синий

(*Centaurea cyanus* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

92

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

12

12

12

1.16

Вербена гибридная

(*Verbena hybrida* Voss.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

50

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

1.17

Вечерница матроны (Ночная фиалка)

(*Hesperis matronalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

9

9

9

1.18

Вьюнок трехцветный

(*Convolvulus tricolor* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

80

40

Влажность

%, не более

7

7

7

1.19

Гайярдия (красивая, гибридная)

(*Gaillardia pulchella* Foug., hybrida hort.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

80

80

80

вторая категория

73

73

73

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85

75

60

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

9

9

9

1.20

Гацания гибридная

(*Gazania x hybrida hort.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

91

92

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

70

50

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.21

Гвоздика китайская

(*Dianthus chinensis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

80

80

80

вторая категория

70

70

70

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.22

Гвоздика садовая

(*Dianthus caryophyllus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

50

50

50

вторая категория

50

50

50

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.23

Гвоздика турецкая

(*Dianthus barbatus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Махровость:

%, не менее

первая категория

80

80

80

вторая категория

70

70

70

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.24

Гелиотроп древовидный (Гелиотроп перуанский)

(*Heliotropium arborescens* L. *peruvianum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

90

85

Всхожесть

%, не менее

50

40

25

Влажность

%, не более

12

12

12

1.25

Гелиптерум Менгеса

(*Helipterum manglesii* (Lindl.) Benth.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

75

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.26

Гелиптерум розовый (Акроклинум розовый)

(*Helipterum roseum* (Hook) Benth.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

85

Сортовая чистота

%, не менее

80

65

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.27

Гелихризум прицветниковый (Цмин, Бессмертник)

(*Helichrysum bracteatum* (vent.), Willd. Var. *monstrosum* hort.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

92

Всхожесть

%, не менее

85

70

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.28

Георгина культурная однолетняя

(*Dahlia x cultorum* Thorsr. et Reis.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

80

80

80

вторая категория

70

70

70

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

1.29

Гиляк трехцветная

(*Gilia tricolor* Benth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

13

13

13

1.30

Глауциум (желтый, рогатый)

(*Glaucium flavum* Crantz, *corniculatum* (L.) Curt.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.31

Годетия (крупноцветковая, прелестная)

(*Godetia grandiflora* Lindl., *amoena* (Lehm.) G. Don)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

93

93

93

вторая категория

88

88

88

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

80

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

8

8

8

1.32

Гомфрена шаровидная

(*Gomphrena globosa* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

80

60

50

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

14

14

14

1.33

Диморфотека (выемчатая, дождевая)

(*Dimorphotheca sinuata* DC., *D. pluvialis* (L.) Moench)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

1.34

Долихос лаблаб

(*Dolichos lablab* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

15

15

15

1.35

Доротеантус маргаритковидный

(*Dorotheanthus bellidiformis* (Burm. F.) N.E.B)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

12

12

12

1.36

Душистый горошек (Чина душистая)

(*Lathyrus odoratus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

93

Всхожесть

%, не менее

85

65

30

Влажность

%, не более

15

15

15

1.37

Желтушник Аллиони

(*Erysimum x allionii hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

10

10

10

1.38

Журавельник (Манескави, обыкновенный)

(*Erodium maneskavii Coss, gruinum (L.) Ait.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

70

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

1.39

Залужанския капская (Ночница капская)

(*Zaluzianskya capensis* (Benth.))

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.40

Иберис (Стенник) (горький, зонтичный)

(*Iberis amara* L., *umbellata* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

9

9

9

1.41

Календула лекарственная (Ноготки)

(*Calendula officina*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.42

Калоникцион шиповатый

(*Calonyction aculeatum* (L.) House)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

12

12

12

1.43

Капуста декоративная (Капуста огородная кудрявая)

(*Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. f. *crispa hort.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

93

93

93

вторая категория

87

87

87

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

93

Всхожесть

%, не менее

95

85

75

Влажность

%, не более

11

11

11

1.44

Качим изящный (Гипсофила)

(*Gypsophila elegans* Vieb.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

80

50

Влажность

%, не более

13

13

13

1.45

Квамочлит (огненно-красный, перистый)

(*Quamoclit coccinea* (L.) Moench, *coccinea* (L.)

Moench)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

93

93

93

вторая категория

87

87

87

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

12

12

12

1.46

Кермек (Лимониум) (Бондуелли, выемчатый)

(*Limonium bonduellii* (Lest.) Kuntze, *sinuatum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.47

Кларкия ноготковая, хорошенькая

(*Clarkia unguiculata*. Lindl. *pulchella* Pursh)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

8

8

8

1.48

Клеоме колючая

(*Cleome spinosa* Jacq.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

90

80

70

Влажность

%, не более

12

12

12

1.49

Клещевина обыкновенная

(*Ricinus communis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

97

96

Всхожесть

%, не менее

95

90

85

Влажность

%, не более

8

8

8

1.50

Коллинсия разнолистная

(*Collinsia heterophylla* Grah.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

80

70

35

Влажность

%, не более

10

10

10

1.51

Колокольчик средний

(*Campanula medium* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

90

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

30

Влажность

%, не более

9

9

9

1.52

Конопля посевная китайская

(*Cannabis sativa* L. var. *sinensis* (Delile) A.D.C.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

1.53

Кореопсис (Друммонда, красильный)

(*Coreopsis basalis* (Dietr.) Blake, *drummondii*

(D. Don) Torr. et Gray, *tinctoria* Nutt.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

9

9

9

1.54

Космос (Космея) (дваждыперистый, серно-желтый)

(*Cosmos bipinnatus*. Cav., *sulphureus* Cav.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

93

93

93

вторая категория

88

88

88

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.55

Костер трясуновидный

(*Bromus briziformis* Fisch. et Mey.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

75

65

55

Влажность

%, не более

15

15

15

1.56

Кохия веничная волосистая

Требования к сортовым качествам семян

(*Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *trichophylla* (Voss.) Boom)

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

8

8

8

1.57

Крестовник приморский (Цинерария приморская)

(*Senecio cineraria* DC. *Cineraria maritima* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

1.58

Ксерантемум однолетний

(*Xeranthemum annuum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

75

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.59

Куколь обыкновенный

(*Agrostemma githago* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

12

12

12

1.60

Кукуруза обыкновенная

(*Zea mays* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

95

90

85

Влажность

%, не более

15

15

15

1.61

Лакфиоль

(*Cheiranthus cheiri* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Махровость:

%, не менее

первая категория

50

50

50

вторая категория

50

50

50

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

11

11

11

1.62

Лебеда садовая

(*Atriplex hortensis* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

85

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.63

Левкой (Маттиола седая)

(*Matthiola incana* (L.) R. Br.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Махровость:

%, не менее

первая категория

50

50

50

вторая категория

50

50

50

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.64

Лен крупноцветковый

(*Linum grandiflorum* Desf.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

10

10

10

1.65

Лобелия эринус

(*Lobelia erinus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

6

6

6

1.66

Лобулярия приморская (Алиссум приморский)

(Бентама, распростертая)

(*Lobularia maritima* (L.) Desv. var. *benthamii*

(Voos) Bailey, var. *procumbens* (Bailey) Boom)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

92

92

92

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

9

9

9

1.67

Лунник однолетний

(*Lunaria annua* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

13

13

13

1.68

Львиный зев (Антиринум большой)

(*Antirrhinum majus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

70

35

Влажность

%, не более

8

8

8

1.69

Льнянка (марокканская, двураздельная)

(*Linaria maroccana* Hook. F., *bipartita* (Vent.) Willd.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

75

60

40

Влажность

%, не более

8

8

8

1.70

Люпин (переменчивый, Хартвега, гибридный однолетний)

(*Lupinus mutabilis* Sweet, *hartwegii* Lindl, *hybridus* hort.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

98

97

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

12

12

12

1.71

Мак самосейка

(*Paraver rhoeas* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Махровость:

%, не менее

первая категория

97

97

97

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

80

65

40

Влажность

%, не более

6

6

6

1.72

Мак снотворный

(*Papaver somniferum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Махровость:

%, не менее

первая категория

97

97

97

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

85

70

40

Влажность

%, не более

6

6

6

1.73

Малопе трехнадрезная (Дыравка)

(Malope trifida)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

1.74

Малькольмия приморская

(*Malcolmia maritima* (L.) R. Br.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

95

84

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.75

Маргаритка многолетняя

(*Bellis perennis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

92

92

92

Махровость:

%, не менее

первая категория

80

80

80

вторая категория

70

70

70

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

9

9

9

1.76

Маттиола двурогая

(*Matthiola bicornis* DC.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

9

9

9

1.77

Мезембриантемум хрустальный

(*Mesembryanthemum crystallinum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

12

12

12

1.78

Мирабилис ялапа (Ночная красавица)

(*Mirabilis jalapa* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

15

15

15

1.79

Молочай окаймленный

(*Euphorbia marginata* Pursh)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

95

90

85

Влажность

%, не более

10

10

10

1.80

Наперстянка пурпурная

(*Digitalis purpurea* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

92

92

92

вторая категория

89

89

89

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

7

7

7

1.81

Настурция (большая, культурная)

(*Tropaeolum majus* L., cultorum hort.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

87

87

87

вторая категория

82

82

82

Махровость:

%, не менее

первая категория

50

50

50

вторая категория

40

40

40

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

75

50

30

Влажность

%, не более

14

14

14

1.82

Незабудка садовая

(*Myosotis sylvatica* (Ehrh.) Hoffm. f. *culta* Voss.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

10

10

10

1.83

Немезия (гибридная, зобовидная, разноцветная)

(*Nemesia x hybrida hort., strumosa Benth., versicolor E. Mey.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

1.84

Немофила (Менциса, пятнистая)

(*Nemophila menziesii* Hook. et Arn., *maculata* Lindl.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.85

Остеоспермум Эклона

(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Nerl.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

1.86

Перец однолетний

(*Capsicum annuum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.87

Перилла кустарниковая нанкинская

(*Perilla frutescens* (L.) Britt var. *nankinensis* (Lour.) Bailey)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

95

Всхожесть

%, не менее

85

75

50

Влажность

%, не более

10

10

10

1.88

Петуния гибридная

(*Petunia x hybrida* Vilm.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

30

Влажность

%, не более

9

9

9

1.89

Пиретрум (девичий, золотистый)

(*Pyrethrum parthenium* L., *parthenium* (L.), Smith

Matricaria eximia hort. P. pf. *aureum* hort.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

85

Всхожесть

%, не менее

70

40

30

Влажность

%, не более

11

11

11

1.90

Подсолнечник

(*Helianthus* sp.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

87

87

87

вторая категория

82

82

82

Махровость:

%, не менее

первая категория

50

50

50

вторая категория

40

40

40

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

8

8

8

1.91

Полевица ажурная

(*Agrostis nebulosa* Boiss. et Reut.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

75

70

60

Влажность

%, не более

15

15

15

1.92

Полевичка (волосовидная, изящная)

(*Eragrostis capillaris* (L.) Nees, *elegans* Nees)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

70

60

50

Влажность

%, не более

15

15

15

1.93

Портулак крупноцветковый

(*Portulaca grandiflora* Hook.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

70

70

70

вторая категория

60

60

60

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

85

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

11

11

11

1.94

Резеда душистая

(Reseda odorata L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.95

Рудбекия (волосистая, двухцветная)

(*Rudbeckia hirta* L., *bicolor* Nutt.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

91

91

91

Махровость:

%, не менее

первая категория

70

70

70

вторая категория

60

60

60

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.96

Сальпиглоссис выемчатый

(*Salpiglossis sinuata* Ruiz et Pav.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

6

6

6

1.97

Санвиталия распростертая

(*Sanvitalia procumbens* Lam.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

92

80

70

Влажность

%, не более

10

10

10

1.98

Скабиоза темно-пурпурная

(*Scabiosa atropurpurea* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

93

93

93

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85

75

70

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

12

12

12

1.99

Смолевка небесная роза

(*Silene coeli-rosa* (L.) Gord.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

85

85

85

вторая категория

75

75

75

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

1.100

Смолевка повислая

(*Silene pendula* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

85

85

85

вторая категория

75

75

75

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.101

Схизантус перистый

(*Schizanthus pinnatus* Ruiz et Pav.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

8

8

8

1.102

Табак (крылатый (душистый) крупноцветковый)

(*Nicotiana glauca* Link et Otto var. *grandiflora* Comes)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

75

50

Влажность

%, не более

10

10

10

1.103

Титония круглолистная

(*Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

85

Всхожесть

%, не менее

75

60

50

Влажность

%, не более

10

10

10

1.104

Трясунка (Бриза большая)

(*Briza maxima* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

75

65

60

Влажность

%, не более

15

15

15

1.105

Тыква фигурная

(*Cucurbita pepo* L. var. *ovifera* (L.) Alef.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

95

80

50

Влажность

%, не более

13

13

13

1.106

Урсиния (разноцветная, укропная)

(*Ursinia versicolor* (DC.) N.E.Br., *anethoides* (DC.) N.E.Br.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

75

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

9

9

9

1.107

Фарбитис (красно-голубой, нил, плющевидный)

(*Pharbitis rubrocaerulea* (Hook.) Choisy, nil. (L.) Choisy, *hederacea* (L.) Choisy)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

99

99

99

вторая категория

97

97

97

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

12

12

12

1.108

Фарбитис пурпурный (Ипомея пурпурная)

(*Pharbitis purpurea* (L.) Voigt)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

99

99

99

вторая категория

97

97

97

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

12

12

12

1.109

Фасоль огненно-красная (Турецкие бобы)

(*Phaseolus coccineus* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

95

90

70

Влажность

%, не более

15

15

15

1.110

Фацелия (колокольчатая, пижмолистная)

(*Phacelia campanularia* A. Gray, *tanacetifolia* Benth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

93

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.111

Фиалка Витрокка (Анютины глазки)

(*Viola x wittrockiana* Gams)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

8

8

8

1.112

Флокс Друммонда

(*Phlox drummondii* Hook.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

75

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.113

Хатьма трехмесячная (Лаватера)

(*Lavatera trimestris* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

1.114

Хмель лазающий

(*Humulus scandens* (Lour.) Merr.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

85

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

1.115

Хризантема (килеватая, увенчанная)

(*Chrysanthemum carinatum* Schousb, *coronarium*. L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.116

Целозия (серебристая гребенчатая, серебристая перистая)

(*Celosia argentea* L. f. *crinata* (L.) Kuntze, *argentea* L. f. *plumosa* Voss.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

11

13

13

1.117

Цинния изящная

(*Zinnia elegans* Jacq.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

85

85

85

вторая категория

78

78

78

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

1.118

Чернушка дамасская (Девушка в зелени)

(*Nigella damascena* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

80

80

80

вторая категория

70

70

70

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

10

10

10

1.119

Шалфей сверкающий (Сальвия)

(*Salvia splendens* Sello ex Nees)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

60

40

Влажность

%, не более

12

12

12

1.120

Шпорник (Аяксов, полевой)

(*Delphinium ajacis* L., *consolida* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

9

9

9

1.121

Шток-роза розовая (Мальва)

(*Alcea rosea* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

1.122

Эмилия ярко-красная (Какалия ярко-красная)

(*Emilia coccinea* (Sims) G. Don)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

60

45

Влажность

%, не более

10

10

10

1.123

Эшшольция калифорнийская (Калифорнийский мак) (*Eschscholzia californica* Cham.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

9

9

9

1.124

Ячмень гривастый

(*Hordeum jubatum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

90

80

70

Влажность

%, не более

15

15

15

2. Семена многолетних растений

2.1

Абутилон гибридный (комнатный клен)

(*Abutilon x hybridum hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

12

12

12

2.2

Адонис весенний

(*Adonis vernalis L.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.3

Акант мягкий

(*Acanthus mollis* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

87

Всхожесть

%, не менее

90

85

70

Влажность

%, не более

12

12

12

2.4

Аконит (Арендса, клубочковый)

(*Aconitum x arendsii hort., napellus L.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к сортовым качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

80

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.5

Антуриум гибридный

(*Anthurium* x *hybridum hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

87

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

-

-

-

2.6

Армерия приморская

(*Armeria maritima* (Mill.) Willd.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

80

Всхожесть

%, не менее

50

40

20

Влажность

%, не более

13

13

13

2.7

Артишок колючий

(*Cynara scolymus* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

92

90

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

12

12

12

2.8

Астильбе Давида

(*Astilbe davidii* (Franch) Henry)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

12

12

12

2.9

Астра альпийская

(*Aster alpinus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

94

94

94

вторая категория

90

90

94

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.10

Астрагал узколистный

(*Astragalus angustifolius* Lam.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

14

14

14

2.11

Бадан толстолистный

(*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.12

Болтония астровидная

(*Boltonia asteroides* L'Her.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

60

55

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.13

Борщевик Мантегации

(*Heracleum mantegazzianum* Somm, et Lev)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

92

90

Всхожесть

%, не менее

85

50

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.14

Бурачок (горный, серебристый)

(*Alyssum montanum* L., *argenteum* Vinm.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.15

Василек (восточный, горный, русский)

(*Centaurea orientalis* L., *montana* L., *ruthenica* Lam.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

92

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.16

Василистник (водосборолистный, прекрасный)

(*Thalictrum aquilegifolium* L., *Speciosissimum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.17

Вероника (большая, горечавковая)

(*Veronica teucrium* L., *gentianoides* Vahl)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

80

50

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.18

Ветреница корончатая

(*Anemone coronaria* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

10

10

10

2.19

Водосбор гибридный

(*Aquilegia x hybrida hort.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

95

90

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.20

Водосбор (голубой, обыкновенный)

(*Aquilegia caerulea* James, *vulgaris* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

90

90

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.21

Гайлардия остистая

(*Gaillardia aristata* Pursh)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

94

94

94

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

70

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.22

Гвоздика перистая

(*Dianthus plumarius* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.23

Гелениум (гибридный, осенний)

(*Helenium x hybridum hort., autumnale L.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.24

Гелиопсис шереховатый

(*Heliopsis scabra* Dun.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

12

12

12

2.25

Гербера Джемсона

(*Gerbera jamesonii* Bolus ex Hook. f.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.26

Гнафалиум Хоппе

(*Gnaphalium horreanum* W.D.J.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

85

75

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

13

13

13

2.27

Гониолимон татарский

(*Goniolimon tataricum* Boiss.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

80

Всхожесть

%, не менее

50

40

20

Влажность

%, не более

13

13

13

2.28

Горец многоколосый

(*Polygonum polystachyum* Meissn.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

13

13

13

2.29

Гравилат (гибридный, ярко-красный)

(*Geum x hybridum hort., coccineum Sibth. et Smith*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

12

12

12

2.30

Девясил крупноцветковый (Инула)

(*Inula grandiflora* Willd.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

12

12

12

2.31

Дороникум восточный

(*Doronicum orientale* Hoffm. g. g., *caucasioum* Vieb.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

85

75

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

13

13

13

2.32

Зорька (Хаге, халцедонская) (Лихнис)

(*Lychnis x haageana* Regel, *chalconica* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

80

50

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.33

Иберис вечнозеленый (Стенник)

(*Iberis sempervirens* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

10

10

10

2.34

Инкарвиллея плотная

(*Inkarvillea compacta* Maxim)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

80

60

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.35

Ирис (германский, сибирский, гибридный)

(Касатик)

(*Iris germanica* L., *sibirica* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

14

14

14

2.36

Каланхое Блоссфельда

(*Kalanchoe blossfeldiana* Poelnitz.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

75

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.37

Кальцеолярия гибридная

(*Calceolaria x hybrida hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.38

Канна гибридная

(*Canna x hybrida hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

14

14

14

2.39

Качим метельчатый (Перекасти-поле, Гипсофила)

(*Gypsophila paniculata* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

94

94

94

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.40

Кентрантус красный

(*Centranthus ruber* (L.) DC.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92

90

85

Всхожесть

%, не менее

75

70

50

Влажность

%, не более

11

11

11

2.41

Колеус Блюма

(*Coleus blumei* Benth.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

85

85

85

вторая категория

75

75

75

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

75

50

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.42

Колокольчик (карпатский, персиколистный, широколистный)

(*Campanula carpatica* Jacq., *persicifolia* L. *latifolia* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

80

60

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.43

Кордилине южная (Драцена нераздельная)

(*Cordyline australis* Hook. f.)

(*Dracaena indivisa* hort.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

12

12

12

2.44

Кореопсис крупноцветковый

(*Coreopsis grandiflora* Hogg)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

12

12

12

2.45

Коровяк гибридный

(Verbascum x hybridum hort.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

13

13

13

2.46

Лапчатка гибридная

(*Potentilla x hybrida hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

75

60

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.47

Лен (желтый, нарбонский)

(*Linum flavum* L., *narbonense* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

60

Влажность

%, не более

10

10

10

2.48

Лилия (белоснежная, Давида, Кессельринга, миловидная, однобратственная, карликовая, тайваньская, царственная)

(*Linum candidum* L., *l. davidii* Duchartre, *speciosum* Thund, *kesselrindianum* Misch, *monadelphum* Bieb., *pumilum* Delile, *formosanum* Wallece, *regale* Wils)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

93

90

Всхожесть

%, не менее

70

60

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.49

Лук (Моли, неаполитанский, однолистный)

(*Allium moly* L., *neapolitanum* Cyr., *unifolium* Keiiog.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

93

90

Всхожесть

%, не менее

95

90

80

Влажность

%, не более

12

12

12

2.50

Люпин (многолетний, многолистный)

(*Lupinus perennis* L., *polyphyllus* Lindl.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

98

97

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

14

14

14

2.51

Лютик (азиатский, борцелистный)

(*Ranunculus asiaticus* L. R., *aconitifolius* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

90

85

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.52

Мак восточный

(*Papaver orientale* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

85

Всхожесть

%, не менее

90

80

80

Влажность

%, не более

10

10

10

2.53

Мелколепестник альпийский (Эригерон)

(*Erigeron alpinus* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.54

Молочай многоцветковый

(*Euphorbia polychroma* Kerner)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

12

12

12

2.55

Монарда гибридная

(*Monarda M. x hybrida hort., didyma L.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

10

10

10

2.56

Морозник (гибридный, черный)

(*Helleborus x hybridus hort., niger L.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

93

Всхожесть

%, не менее

90

80

70

Влажность

%, не более

10

10

10

2.57

Мыльнянка лекарственная (Сапонария)

(*Saponaria officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92

90

85

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.58

Недотрога Уоллера

(*Impatiens walleriana* Hook. f.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

97

95

Всхожесть

%, не менее

65

60

45

Влажность

%, не более

12

12

12

2.59

Нивяник (наибольший, обыкновенный) (Ромашка крупноцветковая, луговая)
(Поповник)

(*Leucanthemum maximum* (Ramond) DC)

(*L. vulgare* Lam.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.60

Обриета культурная

(*Aubrieta x cultorum* Bergmans)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.61

Овсяница (аметистовая, пепельно-серая)

(*Festuca amethystina* L., *F. cinerea* Vill)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

80

Всхожесть

%, не менее

70

60

50

Влажность

%, не более

15

15

15

2.62

Очиток видный

(*Sedum spectabile* Boreau)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

40

30

20

Влажность

%, не более

10

10

10

2.63

Паслен перечный

(*Solanum capsicastrum* Link)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.64

Пеларгония садовая (Герань зональная)

(*Pelargonium x hortorum* L.H.Benth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

13

13

13

2.65

Пенстемон (бородатый, голый, Хартвега)

(*Penstemon barbatus* Nutt., *glaber* Pursh, *hartwegii* Benth.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.66

Пенстемон гибридный

(*Penstemon x hybridus* hort.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

85

70

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.67

Первоцвет (весенний, кортузовидный, мелкозубчатый, обыкновенный, ушковатый)

(*Primula veris* L., *cortusoides* L., *denticulata* Smith, *vulgaris* Huds., *auriculata* Lam.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.68

Первоцвет (китайский, нежный, обратноконический)

(*Primula sinensis* Lindl., *malacoides* Franch., *obconica* Hance)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.69

Переступень (белый, двудомный) (Бриония)

(*Bryonia alba* L., *B. dioica* Jacq.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

14

14

14

2.70

Пиретрум гибридный

(*Pyretrum* x *hybridum hort.*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.71

Повой заборный (Калистегия)

(*Calystegia serium*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

13

13

13

2.72

Пупавка красильная

(*Anthemis tinctoria* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

11

11

11

2.73

Резуха (альпийская, кавказская) (Арабис)

(*Arabis alpina* L., *caucasica* Schlecht)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

50

Влажность

%, не более

10

10

10

2.74

Рудбекия (блестящая, гибридная, глянцевая, рассеченная)

(*Rudbeckia fulgida* Ait., *R. x hybrida hort.*, *nitida* Nutt., *laciniata* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.75

Рута душистая

(*Ruta graveolens* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92

88

80

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

14

14

14

2.76

Сенполия гибридная (Узумбарская фиалка)

(*Saintpaulia* x *hybrida hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

65

45

25

Влажность

%, не более

10

10

10

2.77

Синеголовник Оливера

(*Eryngium* x *oliverianum Delar*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

70

60

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.78

Синнингия гибридная (Глоксиния)

(*Sinningia x hybrida hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.79

Смолевка шафта

(*Silene schafta* Hohen)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

95

95

95

вторая категория

90

90

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

93

Всхожесть

%, не менее

70

60

50

Влажность

%, не более

10

10

10

2.80

Солнцецвет (апеннинский, гибридный)

(Гелиантемум)

(*Helianthemum apenninum* Mill., *H. x hybridum hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

2.81

Спаржа (лекарственная, перистая, Шпренгера) (*Asparagus officinalis* L., *plumosus* Baker, *sprengeri* Regel)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

98

98

98

вторая категория

95

95

95

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

90

80

70

Влажность

%, не более

10

10

10

2.82

Стрептокарпус гибридный

(*Streptocarpus x hybridus*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

70

50

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.83

Трахикарпус Форчуна

(*Trachycarpus fortunei* H.Wendl.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

95

90

70

Влажность

%, не более

15

15

15

2.84

Туника камнеломка

(*Tunica saxifraga* Scop.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

90

70

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.85

Тысячелистник (войлочный, обыкновенный, таволговый, чихательный) (Чихотная трава)

(*Achillea tomentosa* L., *millefolium*, *filipendulina* Lam., *ptarmica* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

92

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

50

Влажность

%, не более

12

12

12

2.86

Фиалка рогатая

(*Viola cornuta* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

70

60

50

Влажность

%, не более

12

12

12

2.87

Физостегия виргинская (Змееголовник виргинский)

(*Physostegia virginiana*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

95

80

60

Влажность

%, не более

13

13

13

2.88

Финик канарский

(*Phoenix canariensis* Chabaud)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

95

90

70

Влажность

%, не более

15

15

15

2.89

Флокс метельчатый

(*Phlox paniculata* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

92

90

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

13

13

13

2.90

Фрезия гибридная

(*Freesia x hybrida hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

80

70

50

Влажность

%, не более

14

14

14

2.91

Хамеропс низкий

(*Chamaerops humilis* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

99

97

95

Всхожесть

%, не менее

95

90

70

Влажность

%, не более

15

15

15

2.92

Хойхера (гибридная, кроваво-красная)

(*Heuchera* x *hybrida hort.*, *sanguinea engelm*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

12

12

12

2.93

Цикламен персидский

(*Cyclamen persicum* Mill.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

97

95

Всхожесть

%, не менее

85

70

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.94

Цинерария

(*Senecio cruentus* (Masson) DC., *Cineraria x hybrida hort.*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

8

8

8

2.95

Чистец (византийский, шерстистый)

(*Stachys byzantina* С.Кoch)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

96

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

11

11

11

2.96

Ширококолокольчик крупноцветковый

(*Platycodon grandiflorus*)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

-

-

-

Всхожесть

%, не менее

80

60

30

Влажность

%, не более

10

10

10

2.97

Шпорник (крупноцветковый, культурный)

(*Delphinium grandiflorum* L., х *cultorum* Voss.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

85

85

85

Махровость:

%, не менее

первая категория

90

90

90

вторая категория

80

80

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

60

40

30

Влажность

%, не более

11

11

11

2.98

Энотера (кустарниковая, четырехугольная)

(Ослинник)

(*Oenothera fruticosa* L. *tetragona* Roth)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

95

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.99

Эхинацея пурпурная (Рудбекия пурпурная)

(*Echinacea purpurea* Moench)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.100

Ясенец (белый, кавказский)

(*Dictamnus albus* L. *caucasicus* Fisch. et Mey.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92

88

80

Всхожесть

%, не менее

60

50

30

Влажность

%, не более

14

14

14

2.101

Ясколка войлочная

(*Cerastium tomentosum* L.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

92

90

Всхожесть

%, не менее

80

60

40

Влажность

%, не более

10

10

10

2.102

Ясменник голубой

(*Asperula azurea* Jaub. Et Spach.)

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

90

90

Всхожесть

%, не менее

70

50

40

Влажность

%, не более

12

12

12

Таблица 2

Требования к сортовым и посевным качествам луковиц и клубнелуковиц цветочных сельскохозяйственных растений

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства

оригинальные, элитные, репродукционные семена

размер

первый

второй

третий

четвертый

пятый

шестой

седьмой

1

Луковицы и клубнелуковицы

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

окраска, форма характерна признакам данного вида и сорта, здоровые, очищены от земли, остатков листьев, отмирающих чешуй и других примесей

Наличие вредителей, признаков болезней и механических повреждений

шт.

0

0

0

0

0

0

0

Отношение наименьшего диаметра к наибольшему на уровне наибольшего поперечного сечения для луковиц тюльпанов

не менее

0,61

0,66

0,66

-

-

-

-

Вес для:

г, не менее

тюльпанов

40

30

-

-

-

-

-

нарциссов

80

70

-

-

-

-

-

Высота для гладиолусов, крокусов и монбреции

не менее

2/3 диаметра

Форма и количество вершин для нарциссов:

трубчатые, крупнокорончатые, тацетовидные, махровые, разрезно-корончатые

многовершинные

двухвершинные

одновершинные

одновершинные

одновершинные

плоские

-

мелкокорончатые, поэтические и другие группы

многовершинные

двухвершинные

одновершинные

плоские

-

-

-

Наличие в высшем размере низшего

%, не более

5

5

5

5

5

5

5

1.1

Амариллис беладонна

(*Amaryllis belladonna* L.)

Длина окружности в наибольшем поперечном сечении

см

22 и более

18 - 22

14 - 18

10 - 14

6 - 10

3 - 6

-

1.2

Ацидантера двухцветная

(*Acidanthera bicolor* Hochst.)

см

8 и более

6 - 8

5 - 6

3 - 5

-

-

-

1.3

Безвременник (осенний, великолепный)

(*Colchicum autumnale, speciosum* Stev.)

см

24 и более

12 - 24

5 - 12

2 - 6

-

-

-

1.4

Белоцветник весенний

(*Leucojum vernum* L.)

см

8 и более

5 - 8

2 - 5

-

-

-

-

1.5

Блетилла полосатая (Блеция)

(*Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f.)

см

19 и более

13 - 19

9 - 13

7 - 9

3 - 7

-

-

1.6

Гальтония беловатая

(*Galtonia candicans* (Baker) Decne)

см

10 и более

6 - 10

5 - 6

2 - 5

-

-

-

1.7

Гиацинт восточный

(*Hyacinthus orientalis hybridum hort.*)

см

18 и более

16 - 18

14 - 16

10 - 14

6 - 10

4 - 6

4 и менее

1.8

Гиппеаструм садовый

(*Hippeastrum hybridum hort.*)

см

25 и более

19 - 25

13 - 19

7 - 13

3 - 7

3 и менее

-

1.9

Гладиолус гибридный

(*Gladiolus hybridus hort.*)

см

10 и более

8 - 10

5 - 8

3 - 8

3 - 5

1 - 3

-

1.10

Зефирантес килеватый

(*Zephyranthes carinata Herb.*)

см

5 и более

3 - 5

3 и менее

-

-

-

-

1.11

Иксия гибридная

(*Ixia x hybrida hort.*)

см

6 и более

5 - 6

3 - 5

3 и менее

-

-

-

1.12

Камассия Кузика

(*Camassia cusickii S. Wats.*)

см

12 и более

9 - 12

5 - 9

3 - 5

3 и менее

-

-

1.13

Крокус весенний

(*Crocus vernus* Mill.)

см

8 и более

6 - 8

6 - 4

2 - 4

2 и менее

-

-

1.14

Крокус (золистый, Томазини, узколистный)

(*Crocus chrysanthus* Herb., *tomasinianus* Herb., *angustifolius* Herb.)

см

6 и более

4 - 6

2 - 4

2 и менее

-

-

-

1.15

Ксифиум:

(*Xiphium* Mill.)

см

широколистные сорта гибриды (*Xiphium latifolium* Mill.)

9 и более

8 - 9

6 - 8

4 - 6

2 - 4

2 и менее

-

узколистные сорта гибриды

(*Xiphium filifolium* (Boiss) Klatt)

8 и более

7 - 8

6 - 7

4 - 6

2 - 4

2 и менее

-

1.16

Ликорис (желтый, лучистый)

(*Lycoris aurea* Herb., *radiata* Herb.)

см

12 и более

3 - 12

3 и менее

-

-

-

-

1.17

Лилии трубчатые, их гибриды и сорта (длинноцветковая, королевская, белоцветковая, Саргент, тайваньская, филиппинская, Генри)

(*Lilium longiflorum* Thunb, *regale* Wils, *leucanthum* Backer, *sargentiae* Wils, *formosanum* Wallace, *philippinense* Baker, *henryi* Baker)

см

20 и более

18 - 20

16 - 18

14 - 16

12 - 14

9 - 12

9 и менее

1.18

Лилии азиатские крупнолуковичные, их гибриды и сорта (Даурская, тигровая, луковиценосная, Тунберга, Вильмт, оранжевая, ложнотигровая, приятная)

(*Lilium pensylvanicum* Ker-Gawl, *lancifolium* Thunb, *aurantiacum*,

thubergianum Schult et Scult, *wilmottiae* Wils, *aurantiacum* West, *pseudotigrinum* Carriere, *amaible* Palil)

см

16 и более

14 - 16

12 - 14

10 - 12

8 - 10

5 - 8

5 и менее

1.19

Лилии азиатские мелколуковичные (Буша, карликовая, кудреватая, мозолистая, модеолевидная)

(*Lilium buschianum* Lodd, *pumilum* Delile, *martagon*, *callosum* Sieb et Zucc, *medeoloides* A. Gray)

см

11 и более

8 - 11

6 - 8

5 - 6

2 - 5

2 и менее

-

1.20

Лилии кавказские и европейские (однобратственная, Кессельринга, Совича, пиренейская, белоснежная)

(*Lilium monadelphum*, *Kesselringianum* Misex, *zovitsianum* Fisch et Ave-Lall, *pyrenaicum* Grouan, *candidum*)

см

22 и более

19 - 22

14 - 19

9 - 14

6 - 9

6 и менее

-

1.21

Лилии восточные (прекрасная, золистая)

(*Lilium speciosum* Thunb, *auratum* Lindl.)

см

16 и более

11 - 16

8 - 11

6 - 8

4 - 6

4 и менее

-

1.22

Лилии Северной Америки (леопардовая, великолепная, канадская)

(*Lilium pardalium* Kologg, *superbum*, *canadense*)

см

13 и более

10 - 13

7 - 10

5 - 7

3 - 5

3 и менее

-

1.23

Лук гигантский и другие крупнолуковичные виды

(*Allium giganteum*)

см

12 и более

9 - 12

6 - 9

2 - 6

-

-

-

1.24

Лук (белоголовый, беловатый, белоцветный, Христофа)

(*Allium leucosephalum*, *alnidum* Fisch ex ess, *Leucantheum* C Koch, *chrystophii* Trautv)

см

9 и более

3 - 9

3 и менее

-

-

-

-

1.25

Лук Моля и другие мелколуковичные луки

(*Allium moly* L.)

см

6 и более

5 - 6

4 - 6

2 - 4

-

-

-

1.26

Монтбреция крокосмоцветная

(*Monbretia crocosmiflora* Lemoine)

см

6 и более

5 - 6

4 - 5

4 и менее

-

-

-

1.27

Мускари (армянский, гроздевидный и другие виды)

(*Muscari armeniacum* Baker, *botryoides* Mill.)

см

8 и более

6 - 8

4 - 6

4 и менее

-

-

-

1.28

Нарциссы (трубчатые, крупнокорончатые, тацетовидные, махровые, разрезаннокорончатые)

(*Narcissi trumpet*, *Large-cupped*, *Tazetta*, *Duble*, *Split-Corona*)

см

16 и более

13 - 16

10 - 13

8 - 10

6 - 8

4 - 6

-

1.29

Нарциссы (мелкокорончатые, поэтические и другие)

(Narcissi Small-cupped, Poeticus)

см

8 и более

6 - 8

4 - 6

4 и менее

-

-

-

1.30

Нерина Боудена и гибриды

(Nerine bowdenii Wats.)

см

13 и более

11 - 13

8 - 11

5 - 8

3 - 5

3 и менее

-

1.31

Нерина гернсийская и гибриды

(*Nerine sarniensis* (L.) Herb.)

см

10 и более

8 - 10

6 - 8

5 - 6

3 - 5

3 и менее

-

1.32

Подснежник (кавказский, снежный, широколистный, складчатый)

(*Galanthus caucasicus* (Backer) Grgssh, *nivalis*, *platyphyllus* Traub et Mold, *plicatus* Biebl.)

см

5 и более

4 - 5

2 - 4

2 и менее

-

-

-

1.33

Пролеска (двулистная, сибирская, испанская, Тубергена)

(*Scilla bifolia*, *sibirica* Haw, *Hyacinthoides hispanica*, *tubergeniana* Hoog)

см

8 и более

7 - 8

5 - 7

3 - 5

-

-

-

1.34

Птицемлечник (баланский, широколистный, поникший, пиренейский)

(*Ornithogalum balansae* Boiss

umbellatum, *platyphyllum* Boiss, *pyrenaicum* auct.)

см

8 и более

3 - 8

3 и менее

-

-

-

-

1.35

Пушкиния пролесковидная

(*Puschkinia scilloides* Adams.)

см

3 и более

2 - 3

2 и менее

-

-

-

-

1.36

Рябчик императорский

(*Fritillaria imperialis* L.)

см

19 и более

13 - 19

9 - 13

4 - 9

4 и менее

-

-

1.37

Рябчик шахматный

(*Fritillaria meleagris* L.)

см

9 и более

6 - 9

3 - 6

3 и менее

-

-

-

1.38

Тубероза

(*Polianthes tuberosa* L.)

см

11 и более

8 - 11

5 - 8

5 и менее

-

-

-

1.39

Тюльпаны

(простые ранние, махровые ранние, триумф, Дарвиновы гибриды, простые поздние лилиецветные, бахромчатые, Рембрант, попугайные, махровые поздние, зеленоцветковые)

(*Tulips single early, double early, triumph, Darwin Hybrid, single late, lily-flowered, fringed, Rembrant, Parrot, Double Late, viridiflora*)

Тюльпан разновидности и гибриды (Кауфмана, Фостера, Грейга)

(*Kaufmanniana, varieties and hybrids, Fosteriana, varieties and hybrids, Greigii, varieties and hybrids*)

см

13 и более

12 - 13

11 - 12

9 - 11

7 - 9

5 - 7

-

1.40

Тюльпаны видовые

(Other species and their varieties and hybrids)

см

10 и более

8 - 10

6 - 8

5 - 6

3 - 5

-

-

1.41

Фрезия гибридная

(*Freesia x hybrida hort.*)

см

9 и более

7 - 9

5 - 7

2 - 5

-

-

-

1.42

Хионодокса Люсили

(*Chionodoxa luciliae Boiss.*)

см

5 и более

3 - 5

3 и менее

-

-

-

-

Таблица 3

Требования к сортовым и посевным качествам корневищ, клубней и других вегетативных частей (за исключением луковиц и клубнелуковиц), черенков и рассады цветочных сельскохозяйственных растений

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их производства

оригинальные, элитные, репродукционные семена

1

Корневища, клубни и другие вегетативные части растений (за исключением луковиц и клубнелуковиц)

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

здоровые, окраска соответствует характерным признакам вида и сорта

Наличие вредителей, признаков болезней и механических повреждений

шт.

0

Наличие посадочного материала с отклонением от допустимых значений

%, не более

5

1.1

Альстремерия, сорта и гибриды

(*Alstroemeria* L.)

Количество почек на корнеклубне

шт., не менее

7

1.2

Антуриум Андре

(*Anthurium* x *cultorum* Birdsey)

Высота надземной части

см

10

Количество листьев

шт., не менее

3

1.3

Антуриум Шерцера

(*Anthurium* x *hortulanum* Birdsey)

Высота надземной части

см

70

Количество листьев

шт., не менее

5

1.4

Армерия

(*Armeria Willd. (Statice L. p. p.)*)

Часть растения с развитой розеткой листьев

-

-

1.5

Астильба Арендса

(*Astilbe x arensii Arends*)

Количество почек на части куста

шт., не менее

3

1.6

Астры, виды и сорта

(*Aster L.*)

Количество стеблей осенью

шт.

2 - 3

Количество побегов отрастания весной

шт.

3 - 4

1.7

Бадан толстолистный

(*Bergenia crassifolia (L.) Fritsch*)

Количество почек на корневище (осенью)

шт.

2 - 3

1.8

Барвинок (большой, малый)

(*Vinca major* L., *minor* L).

Побег с хорошо развитой корневой системой и почками возобновления

шт., не менее

2

1.9

Бегония клубневая

(*Begonia tuberhybrida* hort.)

Диаметр клубня

см, не менее

2

1.10

Белокрыльник (Калла эфиопская)

(*Zantedeschia aethiopica* Spreng.)

Диаметр верхней части корневища:

см

I категория

1,5 - 2,7

II категория

0,5 - 1,4

1.11

Бруннера крупнолистная

(*Brunnera macrophylla* (Adam) Johnst.)

Количество почек возобновления на корневище

шт.

2 - 3

1.12

Василек

(*Centaurea* L.)

Количество почек возобновления на корневище

шт., не менее

3

1.13

Василистник водосборолистный

(*Thalictrum aquilegifolium* L.)

Деленная часть растения с почками

шт., не менее

3

1.14

Вероника альпийская

(*Veronica alpina* L.)

Количество стеблей осенью

шт.

2 - 3

Количество побегов отрастания весной

3 - 4

1.15

Ветреница, ее гибриды и сорта (Анемона)

(*Anemone x hybrida* Paxt.)

Диаметр клубня (включая сморщенные клубни):

см

I категория

1 - 3

II категория

1 и менее

1.16

Водосбор гибридный

(*Aquilegia hybrida hort.*)

Количество стеблей осенью

шт.

2 - 3

Количество побегов отрастания весной

3 - 4

1.17

Волжанка двудомная

(*Aruncus diocus* (Walt) Fern.)

Количество почек возобновления на корневище

шт.

2 - 3

1.18

Гайярдия гибридная

(*Gaillardia hybrida hort.*)

Количество розеток на корневом отпрыске весной

шт.

1 - 2

1.19

Гвоздика перистая

(*Dianthus plumarius* L.)

Часть растения с развитыми почками и побегами

шт.

2 - 4

1.20

Гелениум осенний

(*Helenium autumnale* L.)

Количество побегов весной с развитой корневой системой

шт.

1 - 2

1.21

Георгина культурная однолетняя

(*Dahlia x cultorum* Thorsr et Reis)

Количество почек на корнеклубне с хорошо развитой корневой шейкой

шт., не менее

3

1.22

Гербера гибридная

(*Gerbera x hybrida hort.*)

Наличие листьев в розетке на растении или части его

шт., не менее

3

1.23

Горец и его виды

(*Polygonum L.*)

Количество почек возобновления на корневище

шт.

2 - 3

Количество побегов

2 - 3

1.24

Гравилат, виды и сорта

(*Geum L.*)

Укорененная розетка листьев

шт.

3 - 4

1.25

Дицентра (великолепная, красивая) (Диклитра)

(*Dicentra spectabilis Lem. formosa (Haw.) Walp.*)

Количество почек возобновления на отрезке корневища (конец лета)

шт.

2 - 3

1.26

Дороникум

(*Doronicum L.*)

Часть корневища с побегами

шт.

2 - 3

Часть корневища с почками

2 - 3

1.27

Живучка ползучая

(*Ajuga reptans* L.)

Розетка листьев с корнями

шт.

1 - 2

1.28

Золотарник (Солидаго)

(*Solidago* L.)

Количество побегов на корневище

шт.

3 - 4

1.29

Зорька халцедонская (Лихнис, Горицвет)

(*Lychnis chalcidonica* L.)

Количество почек на части растения весной и осенью

шт.

2 - 3

1.30

Иберис, садовые формы и сорта

(*Iberis* L.)

Количество стеблей

шт.

2 - 3

1.31

Инкарвиллея

(*Incarvillea* Juss.)

Розетка листьев с корнями и почками

шт.

1 - 2

1.32

Ирис германский (касатик)

(*Iris germanica* L. (x *hybrida hort.*))

Годичное корневище с пучком корней:

см, не менее

Группа сортов:

высокие бородатые, средние

длина

4

толщина

3

низкие бородатые

длина

2

толщина

1,5

1.33

Ирис (сибирский, мечевидный, Кемифера)

(*Iris sibirica* L., *ensata* Thunb, *kaempferi* Sieb. ex. Lem)

Годичное корневище с пучком корней:

длиной

см, не менее

2

листьями

шт.

2 - 3

1.34

Камнеломка

(*Saxifraga* L.)

Розетка листьев с корнями

шт.

2 - 3

1.35

Канна садовая

(*Canna* x *hybrida* hort.)

Количество почек на корневище

шт.

2 - 3

1.36

Кермек

(*Limonium* Mill.)

Количество листьев в розетке

шт.

3 - 4

1.37

Книпхофия

(*Kniphofia* Moench.)

Количество стеблей на корневище весной и осенью

шт.

2 - 3

1.38

Колокольчик (карпатский, персиколистный)

(*Campanula carpatica* Jacq., *persicifolia* L.)

Количество почек на корневище или отпрыске

шт.

2 - 3

1.39

Кореопсис крупноцветковый

(*Coreopsis grandiflora* Hogg)

Деленная часть растения с почками

шт.

3 - 4

1.40

Крестовник изящный

(*Senecio elegans* L.)

Деленная часть растения с почками

шт.

3 - 4

1.41

Кровохлебка (лекарственная, белая, другие виды)

(*Sanguisorba officinalis* L., *alba*)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.42

Купальница (азиатская, европейская, Ледебура)

(*Trollius asisticus* L., *europaeus* L., *Ledebourii* Reichb.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.43

Лабазник (обыкновенный, камчатский)

(*Filipendula vulgaris* Moench., *kamtschatica* (Pall.) Maxim)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.44

Ландыш майский

(*Convallaria majalis* L.)

Отрезок корневища с корнями и почкой; длина корневища

см, не менее

6

1.45

Лапчатка (белая, темнокрасная, серебристолистная и другие виды)

(*Potentilla alba* L., *atrosanguinea* Wall. *argyrophylla* Wall.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.46

Лиатрис пленчатая

(*Liatris scariosa* (L.) Willd.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

1 - 2

1.47

Лилейник (Красоднев), его виды и сорта

(*Neemerocallis x hybrida hort.*)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.48

Люпин многолетний

(*Lupinus perennis* L.)

Побег с корневищем, количество почек возобновления

шт.

2 - 3

1.49

Мак восточный

(*Papaver orientale* L.)

Побег с корневищем и почками (середина лета)

шт.

2 - 3

1.50

Маклейя (Боккония)

(*Macleya cordata* (Willd.) R. Br. (*Bacconia cordata* Willd.))

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

3

1.51

Мелколепестник (красивый, альпийский, кавказский)

(*Erigeron speciosus* (Lindl.) DC., *alpinus* L., *caucasicum* Stev.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками:

шт.

весной

1 - 2

осенью

2 - 3

1.52

Молодило

(*Sempervivum* L.)

Розетка листьев диаметром

см, не менее

2

1.53

Молочай (миртолистный, кипарисовый, многоцветный)

(*Euphorbia mursinites* L., *cyparissias* L. *polychroma* Kerner.)

Деленная часть растения с корнями и побегами

шт.

2 - 3

1.54

Монарда двойчатая

(*Monarda didyma* L.)

Деленная часть растения с корнями и побегами

шт.

3 - 4

1.55

Морозник гибридный

(*Helleborus x hybridus hort.*)

Деленная часть растения с побегами

шт.

2 - 3

1.56

Мшанка шиловидная

(*Sagina subulata* (Sw) Presl)

Размер дернинки

см², не менее

4

1.57

Мыльнянка лекарственная

(*Saponaria officinalis* L.)

Деленная часть растения с корнями и побегами

шт.

2 - 3

1.58

Нивяник обыкновенный (Поповник, Ромашка луговая)

(*Leucanthemum vulgare* Lam. (*ircutianum* DC.))

Деленная часть растения с корнями и побегами

шт.

2 - 3

1.59

Обриета дельтовидная

(*Aubrieta deltoidea* (L.) DC.)

Количество побегов осенью

шт.

3 - 4

1.60

Овсяница

(*Festuca* L.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

3 - 4

1.61

Очитки

(*Sedum* L.)

Дернинка размером

см², не менее

4

1.62

Папоротник (Нефролепис возвышенный)

(*Nephrolepis exaltata* Schott.)

Количество почек возобновления на корневище

шт.

2 - 3

1.63

Пенстемон бородатый

(*Penstemon barbatus* (cav.) Nutt.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.64

Первоцвет, виды и сорта

(*Primula* L.)

Розетка листьев с хорошо развитой корневой системой

шт.

1 - 3

1.65

Пион травянистый, виды и сорта

(*Paeonia anomala* L.)

Деленное корневище с корнями и почками:

почек

шт., не менее

3

длина корней

см

10 - 15

1.66

Пиретрум гибридный

(*Pyrethrum hybrida* hort.)

Деленная часть растения с корнями и почками:

шт.

весной

1 - 2

осенью

2 - 3

1.67

Полынь

(*Artemisia L. Oligosporus Cass. Seriphidium (Bess.) Poljak.*)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

3 - 5

1.68

Роджерсия (перистая, подофилловая и другие виды)

(*Rodgersia pinnata Franch.*) *R. podophylla A.*

Отрезок корневища с корнями и почками

шт.

1 - 2

1.69

Рудбекия и ее гибридные формы

(*Rudbeckia L.*)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.70

Резуха альпийская и сорта

(*Arabis alpina* L.)

Количество побегов

шт.

4

1.71

Скабиоза кавказская

(*Scabiosa caucasica* Vieb.)

Часть куста с розетками листьев весной

шт.

2

1.72

Спаржа аптечная

(*Asparagus officinalis* L.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

1 - 2

1.73

Тимьян

(*Thymus* L.)

Дернинка размером

см², не менее

4

1.74

Тысячелистник (обыкновенный, Птармика и другие виды)

(*Achillea millefolium* L., *ptarmica* L.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 3

1.75

Фиалка душистая

(*Viola odorata* L.)

Укорененная розетка листьев: осенью без бутонов, весной с бутонами

шт.

-

1.76

Физалис обыкновенный

(*Physalis alkekengi* L.)

Отрезок корневища с побегами или почками (весной)

шт.

2 - 3

1.77

Флокс метельчатый и другие виды

(*Phlox paniculata* L.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

2 - 4

1.78

Хоста ланцетолистая и другие виды (Функия)

(*Hosta lacifolia* Engl.)

Часть корневища с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

3 - 4

1.79

Хойхера гибридная

(*Heuchera x hybrida hort.*)

Количество розеток листьев весной и осенью

шт.

2 - 3

1.80

Хризантема мелкоцветная (Дендрантема)

(*Chrysanthemum indicum L. (Dendranthema indicum L.)*)

Количество стеблей осенью

шт.

1 - 2

Количество побегов отрастания весной

шт.

3 - 4

1.81

Хризантема китайская крупноцветковая (Дендрантема)

(*Chrysanthemum sinense Sabine (Dendranthema morifolium Ramat)*)

Количество стеблей осенью

шт.

1 - 2

Количество побегов отрастания весной

3 - 4

1.82

Цимицифуга (американская, сердцелистная, кистевидная) (Клоноген)

(*Cimicifuga americana Michx., cordifolia Pursh., facemosa L. Nutt., facemosa (L.) Nutt.*)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками

шт.

3 - 5

1.83

Шпорник, виды и сорта (Живокость, Дельфиниум)

(*Delphinium* L.)

Деленная часть растения с хорошо развитой корневой системой и почками:

шт.

весной

1 - 2

осенью

2 - 3

1.84

Энотера

(*Oenothera* L. (*Onagra* Mill.))

Количество стеблей осенью

шт.

1 - 2

Количество побегов отрастания весной

3 - 4

1.85

Эремурус (мощный, Ольги и другие виды) (Ширяш)

(*Eremurus robustus* Regel, *olgae* Regel)

Количество почек на корнеклубне

шт.

1 - 2

1.86

Ясколка

(*Cerastium L.* - *Dichodon (Bartl.) Reichenb.*)

Дернинка размером

см², не менее

4

2

Черенки

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

здоровые, чистые, равномерно облиственные, обладающие типичными морфологическими признаками, присущими виду, с хорошо развитой корневой системой, длиной не менее 3 см, а для азалии - не менее 2 см

Наличие вредителей, признаков болезней и механических повреждений

шт.

0

Наличие посадочного материала с отклонением от допустимых значений (для гвоздики ремонтантной, хризантемы)

%, не более

5 (10)

2.1

Азалия

(*Azalea L.*, *Rhododendron x Addy Wery*)

Длина

см, не менее

5

Диаметр корневой системы

1,5

2.2

Альтернантера (красивая, приятная)

(*Alternanthera amoena* Voss., *amabilis* Lem.)

Длина

см

5 - 10

2.3

Бегония, виды и сорта

(*Begonia*)

Длина

см

6 - 8

2.4

Гелиротроп древовидный

(*Heliotropium peruvianum* L.)

Длина

см

6 - 10

2.5

Георгина культурная

(*Dahlia Cav. x cultorum* Thorsr. et Reis)

Количество пар листьев

шт.

1 - 2

2.6

Гербера Джемсона

(*Gerbera jamesonii* H. Bolux ex Hook.)

Количество листьев

шт., не менее

2

Количество почек

1

2.7

Гнафалиум

(*Gnaphalium, Omalotheca* Cass.)

Длина

см

5 - 8

2.8

Гортензия метельчатая

(*Hydrangea paniculata* Sieb)

Длина

см, не менее

10

Количество междоузлий

шт.

1 - 2

2.9

Ирезине Диндена

(*Iresine Lindenii* Van Houtte)

Длина

см

8 - 12

2.10

Ирезине Хербста

(*Iresine herbstii* Hook.)

Длина

см

8 - 12

2.11

Качим метельчатый (Перекасти-поле)

(*Gypsophila paniculata* L.)

Длина

см

6 - 8

2.12

Колеус Блюма

(*Coleus blumei* Benth.)

Длина

см

5 - 10

Количество пар листьев

шт., не менее

2

2.13

Клематис

(*Clematis*)

Количество пар листьев

шт.

1 - 2

2.14

Крестовик

(*Senecio aticulatus* (L. f.) Sch. Bip. *Senecio kleinia* (L.) Less.)

Длина

см

8 - 10

2.15

Мезембриантемум хрустальный

(*Mesembrianthemum crystallium* L.)

Длина

см

4 - 6

2.16

Овсяница овечья

(*Festuca ovina* L.)

Длина

см

8 - 10

2.17

Очиток, все виды

(*Sedum* L.)

Длина

см

4 - 6

2.18

Пахистахис желтый

(*Pachistachys lutea* Nees.)

Длина

см

5 - 8

2.19

Пеларгония

(*Pelargonium* L'Her.)

Длина

см

8 - 12

Количество листьев

шт.

2 - 3

2.20

Петуния садовая

(*Petunia x hybrida* Vilm.)

Длина

см

6 - 10

2.21

Портулак крупноцветковый

(*Portulaca grandiflora* Hook.)

Длина

см

4 - 6

2.22

Пуансеттия красивая

(*Euphorbia pulcherrima* Willd.)

Длина

см

8 - 12

2.23

Сантолина (кипарисовиковидная, зеленоватая)

(*Santolina chamaecyparissus* L. *virens* Mill.)

Длина

см

6 - 8

Количество листьев

шт.

3 - 4

2.24

Сушеница

(*Gnaphalium* L.)

Длина

см

8 - 10

2.25

Флокс метельчатый

(*Phlox peniculata* L.)

Длина

см

4 - 6

Количество пар листьев

шт., не менее

2

2.26

Фуксия гибридная

(*Fuchsia x hybrida hort.*)

Длина

см

6 - 7

2.27

Гвоздика ремонтантная

(*Dianthus caryophyllus semperflorens*)

Длина

см, не более

12

Количество междоузлий

шт.

2 - 3

Диаметр мочки корней

см, не менее

2

2.28

Хризантема

(*Chrysanthemum*)

Длина

см, не более

15

Количество развитых листьев

шт., не менее

4

Диаметр мочки корней

см, не менее

2

3

Рассада

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

здоровая, чистая, равномерно облиственная, форма растений, окраска побегов и листьев характерна для вида и сорта

Наличие вредителей, признаков болезней и механических повреждений

шт.

0

Наличие посадочного материала с отклонением от допустимых значений

%, не более

5

3.1

Агератум мексиканский

(*Ageratum mexicanum* Sims)

Высота

см, не менее

6

3.2

Антиринум большой (Львиный зев)

(*Antirrhinum maius* L.)

Высота

см, не менее

6

3.3

Армерия обыкновенная

(*Armeria (DC.) vulgaris Willd.*)

Наличие развитой розетки листьев

–

–

3.4

Аспарагус (Спаржа)

(*Asparagus L.*)

Количество побегов

шт., не менее

2

Высота

см, не менее

10

3.5

Бархатцы отклоненные

(*Tagetes patula L. Cav.*)

Высота

см, не менее

8

3.6

Бархатцы прямостоячие

(*Tagetes erecta L.*)

Высота

см, не менее

7

3.7

Бархатцы тонколистные

(*Tagetes tenuifolis* Cav.)

Высота

см, не менее

6

3.8

Бегония вечноцветущая

(*Begonia semperflorens* cultorum hybr.)

Компактно развитое растение

Высота

см, не менее

6

3.9

Бегония изящная (низкорослые формы)

(*Begonia gracilis* H. B. K.)

Высота

см, не менее

7

3.10

Бегония клубневая

(*Begonia x tuberhybrida* Voss.)

Количество листьев с бутонами

шт.

4 - 5

3.11

Вербена гибридная

(*Verbena x hybrida hort.*)

Количество листьев

шт.

4 - 5

Высота

см, не менее

8

3.12

Вечерница матроны (Ночная фиалка)

(*Hesperis matronalis L.*)

Высота

см, не менее

8

3.13

Вероника

(*Veronica L.*)

Количество листьев

шт.

6 - 7

Диаметр розетки

см, не менее

10

3.14

Водосбор обыкновенный (Орлик обыкновенный)

(*Aquilegia vulgaris* L.)

Высота

см, не менее

8

3.15

Гайярдия гибридная

(*Gaillardia* x *hybrida* hort.)

Количество листьев

шт.

4 - 6

Высота

см, не менее

6

3.16

Гвоздика садовая

(*Dianthus caryophyllus* L.)

Высота

см, не менее

4

3.17

Гвоздика (бородатая, турецкая, китайская, Гренадин, Геддевига)

(*Dianthus barbatus* L., *chinensis* L., *grenadin* L., *chinensis* var. *heddewigii* Regel. (*D. heddewigii* hort.))

Высота

см, не менее

6

3.18

Гелиптерум розовый (Акроклиnum розовый)

(*Helipterum roseum* (Hook.) Benth.)

Высота

см, не менее

8

3.19

Георгина перистая

(*Dahlia pinnata* Cav.)

Количество листьев

шт.

7 - 9

3.20

Георгина культурная

(*Dahlia x cultorum* Thorsr. et Reis.)

Высота

см, не менее

5

3.21

Гравилат гибридный

(*Geum x hybridum hort.*)

Высота

см, не менее

5

3.22

Годеция крупноцветковая

(*Godetia grandiflora* Lindl.)

Высота

см, не менее

7

3.23

Гомфрена шаровидная

(*Gomphrena globosa* L.)

Высота

см, не менее

6

3.24

Горец

(*Polygonum* L.)

Количество листьев

шт.

2 - 3

3.25

Диморфотека (дождевая, выемчатая)

(*Dimorphotheca pluvialis, sinuata*)

Высота

см, не менее

8

3.26

Иберис горький

(*Iberia amara* L.)

Высота

см, не менее

5

3.27

Инкарвиллея

(*Incarvillea* Juss.)

Высота

см, не менее

7

3.28

Календула лекарственная (Ноготки)

(*Calendula officinalis* L.)

Количество листьев

шт., не менее

4

Высота

см, не менее

7

3.29

Каллистефус китайский (Астра однолетняя)

(*Callistephus chinensis* (L.) Ness)

Количество листьев

шт., не менее

4

Высота

см, не менее

7

3.30

Капуста декоративная

(*Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. f. *crispa hort.*)

Количество листьев

шт.

4 - 5

Высота

см, не менее

7

3.31

Качим изящный

(*Gypsophilla elegans* Bieb.)

Высота

см, не менее

5

3.32

Квамоклит перистый

(*Quamoclit pennata* (Desr.) Wojer)

Высота

см, не менее

7

3.33

Кермек (Лимониум)

(*Limonium* Mill.)

Количество листьев в розетке

шт.

5 - 7

3.34

Космос серножелтый

(*Cosmos sulphureus* Cav.)

Высота

см, не менее

5

3.35

Клещевина обыкновенная

(*Ricinus communis* L.)

Высота

см, не менее

8

3.36

Книпхофия

(*Kniphofia* Moench.)

Высота

см, не менее

10

Количество листьев в розетке

шт., не менее

4

3.37

Колокольчик средний

(*Campanula medium* L.)

Развитая розетка листьев и высотой

см, не менее

8

3.38

Крестовник изящный

(*Senecio elegans* L.)

Высота

см, не менее

8

3.39

Крестовник приморский (Цинерария приморская)

(*Senecio cineraria* DC. (*Cineraria maritima*))

Количество листьев

шт.

4 - 5

Высота

см, не менее

6

3.40

Кларкия изящная

(*Clarkia elegans* Dougl.)

Высота

см, не менее

7

3.41

Кореопсис красильный и другие виды

(*Coreopsis tinctoria* Nutt. etal.)

Высота

см, не менее

8

3.42

Кохия (веничная, волосистая)

(*Kochia scoparia* (L.) Schrad, var. *trichophylla* (Voss.) Boom)

Высота

см, не менее

8

3.43

Левкой летний

(*Mattiola incana* var. *annua*)

Количество листьев

шт.

4 - 5

Высота

см, не менее

7

3.44

Лиатрис пленчатая

(*Liatris scariosa* (L.) Willd.)

Высота

см, не менее

6

3.45

Лобелия эринус

(*Lobelia erinus* L.)

Высота

см, не менее

5

3.46

Лобулярия морская (Бурачок морской)

(*Lobularia maritima* (L.) Desv. (*Alissym maritimum* Lam.))

Высота

см, не менее

6

3.47

Лунник однолетний

(*Lunnaria annua* L. (*Lunnaria biensis* Moench))

Количество листьев

шт.

4 - 5

Высота

см, не менее

8

3.48

Люпин многолистный

(*Lupinus polyhyllus* Lindl.)

Высота

см, не менее

10

3.49

Мак восточный

(*Рарaver orientale* L.)

Высота

см, не менее

7

3.50

Маргаритка многолетняя

(*Bellis perennis* L.)

Развитая розетка листьев с корнями высотой

см, не менее

5

3.51

Мирабилис ялапа (Ночная красавица)

(*Mirabilis jalapa* L.)

Высота

см, не менее

7

3.52

Мордовник (Эхинопсис)

(*Echinops* L.)

Количество листьев

шт., не менее

2

Высота

см, не менее

7

3.53

Наперстянка пурпурная

(*Digitalis purpurea* L.)

Развитая розетка листьев с корнями высотой

см, не менее

8

3.54

Настурция большая

(*Tropaeolum majus* L.)

Количество листьев

шт.

3 - 5

Высота

см, не менее

8

3.55

Недотрога бальзаминовая (Бальзамин)

(*Impatiens balsamina* L.)

Высота

см, не менее

8

3.56

Незабудка альпийская

(*Myosotis alpestris* F. W.Schmidt.)

Количество побегов

шт.

2 - 3

Высота

см, не менее

5

3.57

Немезия зобовидная

(*Nemesia strumosa* Benth.)

Высота

см, не менее

8

3.58

Нивяник обыкновенный (Поповник, Ромашка луговая)

(*Leucanthemum vulgare* Lam.)

Высота

см, не менее

7

3.59

Овсяница (все виды)

(*Festuca* L.)

Высота

см, не менее

8

3.60

Пенстемон

(*Penstemon* Schmidel.)

Высота

см, не менее

8

3.61

Первоцвет, все виды и сорта (Примула)

(*Primula* L.)

Розетка листьев с корнями высотой

см, не менее

5

3.62

Перилла кустарниковая нанкинская

(*Perilla flutescens* var. *nankinensis* (Lour)

Bailey (*P. nankinensis* Lour.) Decne.)

Высота

см, не менее

7

3.63

Петуния садовая

(*Petunia x hybrida* Wilm.)

Количество листьев

шт., не менее

4

Высота

см, не менее

6

3.64

Пиретрум девичий

(*Pyrethrum parthenium* (L.) Smith)

Высота

см, не менее

6

3.65

Подсолнечник однолетний и его гибридные формы

(*Helianthus annuus* L.)

Высота

см, не менее

10

3.66

Портулак крупноцветковый

(*Portulaca grandiflora* Hook.)

Высота

см, не менее

4

3.67

Резеда душистая

(*Reseda odorata* L.)

Высота

см, не менее

8

3.68

Рудбекия

(*Rudbeckia* L.)

Количество пар листьев

шт., не менее

4

Высота

см, не менее

7

3.69

Сальпиглоссис выемчатый

(*Salpiglossis sinuata* Ruiz et Pav.)

Высота

см, не менее

5

3.70

Смолка

(*Viscaria Roehl.*)

Высота

см, не менее

8

3.71

Синеголовник (альпийский, Оливера)

(*Eryngium alpinum L., alpinum*)

Высота

см, не менее

8

3.72

Скабиоза темно-пурпурная

(*Scabiosa atropurpurea L.*)

Высота

см, не менее

8

3.73

Схизантус перистый

(*Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.*)

Высота

см, не менее

4

3.74

Табак крылатый крупноцветковый

(*Nicotiana alata var. grandiflora Comes*)

Количество листьев

шт., не менее

3

Высота

см, не менее

10

3.75

Торения Фурнье

(*Torenia fournieri* Linden)

Количество листьев

шт., не менее

4

Высота

см, не менее

7

3.76

Фарбитис пурпурный

(*Pharbitis purpurea* (L.) Voigt)

Количество листьев

шт., не менее

4

Высота

см, не менее

8

3.77

Фасоль огненно-красная

(*Phaseolus coccineus* L.)

Количество листьев

шт., не менее

3

Высота

см, не менее

8

3.78

Фиалка трехцветная

(*Viola tricolor* L.)

Развитые растения высотой (осенью без бутонов, весной с бутонами (не менее 50%))

см, не менее

5

3.79

Флокс Друммонда

(*Phlox drummondii* Hook.)

Количество пар листьев

шт., не менее

3

Высота

см, не менее

8

3.80

Хризантема килеватая

(*Chrysanthemum carinatum* Schousb.)

Количество листьев

шт., не менее

3

Высота

см, не менее

8

3.81

Целозия серебристая гребенчатая (Петуший гребешок)

(*Celosia argentea* L. f. *crinata* (L.) Kuntze)

Количество листьев

шт., не менее

2

Высота

см, не менее

8

3.82

Цинния изящная

(*Zinnia elegans* Jacq.)

Количество пар листьев

шт., не менее

3

Высота

см, не менее

8

3.83

Чина душистая (Горошек душистый)

(*Lathyrus odoratus* L.)

Количество побегов

шт.

2 - 3

Высота

см, не менее

8

3.84

Шалфей сверкающий

(*Salvia splendens* Sello ex Nees)

Высота

см, не менее

10

низкорослые формы

7

3.85

Шток-роза розовая

(*Alcea rosea* L.)

Количество листьев

шт., не менее

3

Высота

см, не менее

10

3.86

Шпорник (Живокость, Дельфиниум)

(*Delphinium* L.)

Высота

см, не менее

8

3.87

Щирица (Амарант хвостатый)

(*Amaranthus caudatus* L.)

Высота

см, не менее

10

3.88

Эризимум Перовского (Желтушник Перовского)

(*Erysimum perovskianum* Fisch. et Mey.)

Высота

см, не менее

8

Таблица 4

Требования к сортовым и посевным качествам саженцев цветочных сельскохозяйственных растений

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их производства

оригинальные, элитные, репродукционные семена

саженцы товарного сорта

сеянцы

первого класса

второго класса

1

Лаванда настоящая (*Lavandula angustifolia*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

100

100

100

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

окраска типичная для сорта, здоровые, без видимых повреждений (механических, морозом, вредителями и болезнями)

Количество скелетных побегов

шт., не менее

3

2

2

Толщина корневой шейки

мм, не менее

8

4

3

Высота надземной части

см, не менее

15

12

10

Длина корневой системы

см

15

12

10 - 14

Наличие саженцев в первом классе второго класса, во втором классе - не соответствующих допустимым значениям

%, не более

10

10

10

2

Герань эфиромасличная

(*Geranium Pratense*)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

99,9

99,0

-

Требования к посевным качествам семян

Внешний вид

без повреждений (механических, морозом, вредителями и болезнями)

-

Высота стебля

см

22 - 26

22 - 26

-

Количество боковых побегов

шт., не менее

3

2

-

Толщина корневой шейки

мм, не менее

8

6

-

Количество скелетных корней

шт.

4 - 8

2 - 3

-

Длина корневой системы

см, не менее

5

5

-

Наличие саженцев в первом классе второго класса, во втором классе - не соответствующих допустимым значениям

%, не более

10

10

-

3

Роза эфиромасличная

(Rose Pratense)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чиста

%, не менее

100

100

Требования к посевным качествам семян <*>

Внешний вид

без повреждений (механических, морозом, вредителями и болезнями)

-

Количество скелетных побегов

шт., не менее

3

2

-

Толщина корневой шейки

мм, не менее

10

7

-

Количество основных корней

шт., не менее

3

2

-

Толщина основных корней у основания

мм, не менее

3

2

-

Длина корневой системы

см, не менее

15

12

-

Наличие саженцев в первом классе второго класса, во втором классе - не соответствующих допустимым значениям

%, не более

10

10

-

<*> Для закладки маточников (оригинальных и элитных) качество семян должно соответствовать допустимым значениям признаков первого класса.

Приложение 10 к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

29.10.2015 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН ДРУГИХ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Таблица 1

Требования к сортовым и посевным качествам семян лекарственных, эфиромасличных и ароматических сельскохозяйственных растений

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их производства

оригинальные семена

элитные семена

репродукционные семена

первая - третья репродукции

последующие репродукции

1

Алтей лекарственный

(*Althaea officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

97

93

87

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

92

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 800

2 000

2 600

3 600

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

9

9

9

9

2

Амми большая

(*Ammi majus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

95

92

87

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

91

86

Содержание семян других растений

шт./кг, не более

2 800

3 000

3 600

4 000

Всхожесть

%, не менее

75

70

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8

8

8

8

3

Амми зубная

(Виснага марковевидная)

(*Ammi visnaga* (L.) Lam.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

95

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

92

86

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

500

600

1 000

1 400

Всхожесть

%, не менее

75

70

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

4

Анис обыкновенный

(*Anisum vulgare* Gaertn)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

97

95

85

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

94

91

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 400

1 800

2 000

2 600

Всхожесть

%, не менее

80

75

70

55

Влажность

%, не более

13

13

13

13

5

Астрагал шерстистоцветковый

(*Astragalus dasyanthus*)

Рал.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

84

80

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 200

1 400

1 800

2 400

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

6

Базилик евгенольный

(*Ocimum gratissimum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

91

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 400

1 600

2 000

2 600

Всхожесть

%, не менее

70

65

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

7

Белена черная

(*Hyoscyamus niger* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

92

88

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

93

90

86

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 000

3 200

3 600

4 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

8

Белладонна (Красавка)

(*Atropa belladonna* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

97

93

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

200

300

400

500

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

9

Бессмертник песчаный

(*Helichrysum arenarium* (L.) Moench)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85

80

73

70

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

6 000

6 800

8 000

10 400

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

6

6

6

3 - 6

10

Валериана лекарственная

(*Valeriana officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

87

84

80

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 000

3 200

3 600

4 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

11

Гомфокарпус кустарниковый (*Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

92

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

400

500

600

700

Всхожесть

%, не менее

80

75

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

12

Горечавка желтая

(*Gentiana lutea* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

97

94

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

85

82

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 400

2 800

3 200

3 600

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

13

Горец почечуйный

(*Poligonum persicaria* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

87

85

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

400

500

600

700

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8,5

8,5

8,5

8,5

14

Горицвет (адонис) весенний

(*Adonis vernalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

94

92

89

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

91

88

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

600

800

1 000

1 200

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

13

13

13

13

15

Горицвет (адонис) однолетний

(*Adonis annua* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

94

91

89

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

91

87

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

500

600

800

1 000

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

13

13

13

13

16

Датиска коноплевая

(*Datisca cannabina* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

93

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

92

90

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

600

800

1 000

1 400

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

17

Девясил высокий

(*Inula helenium* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

88

86

84

82

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 000

2 200

2 600

2 800

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8

8

8

8

18

Десмодиум канадский

(*Desmodium canadense* DC.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

85

82

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 800

2 000

2 400

3 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

65

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8

8

8

8

19

Дурман индейский

(*Datura innoxia* Mill.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

96

94

92

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

100

200

400

600

Всхожесть

%, не менее

70

60

50

45

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

9

9

9

9

20

Дурман обыкновенный

(*Datura stramonium* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

94

93

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

94

92

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

400

600

700

800

Всхожесть

%, не менее

85

80

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

9

9

9

9

21

Душица обыкновенная

(*Origanum vulgare* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

92

90

84

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

800

1 000

1 200

1 600

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

22

Женьшень настоящий

(*Panax ginseng* С. А. Мей.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

98

95

92

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

100

200

300

500

Всхожесть

%, не менее

90

85

75

60

Доброкачественность свежесобранных семян

%, не менее

90

85

75

60

Влажность

%, не более

13

13

13

13

23

Желтушник раскидистый (серый)

(*Erysimum diffusum* L)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

91

88

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

4 000

6 000

8 000

10 000

Всхожесть

%, не менее

85

75

65

55

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

24

Зайцегуб опьяняющий (Лагохилус опьяняющий)

(*Lagochilus inebrians* Bunge)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

89

87

84

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 300

1 400

1 800

2 000

Всхожесть

%, не менее

75

60

50

45

Влажность

%, не более

13

13

13

13

25

Зверобой продырявленный

(*Hypericum perforatum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

93

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92

90

87

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

5 000

6 000

7 000

8 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

55

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

26

Змееголовник молдавский

(*Dracoscephalum moldavica* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

94

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

93

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 800

4 000

4 200

4 600

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

60

Влажность

%, не более

13

13

13

13

27

Иссоп лекарственный

(*Hyssopus officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

92

90

86

80

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

92

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 600

1 800

2 200

2 800

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

28

Кассия остролистная

(*Cassia acutifolia* Delie)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

92

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 600

4 000

4 200

4 400

Всхожесть

%, не менее

90

85

70

60

Влажность

%, не более

13

13

13

13

29

Катарантус розовый

(*Catharanthus roseus* (L.) G. Don)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

94

92

89

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

350

500

800

1 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

30

Козлятник лекарственный

(*Galega officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

97

95

92

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

92

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

200

300

500

600

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

60

Влажность

%, не более

10

10

10

10

31

Копеечник альпийский

(*Hedysarum alpinum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

85

83

80

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 000

1 200

1 600

2 000

Всхожесть

%, не менее

90

85

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8

8

8

8

32

Кориандр посевной

(*Coriandrum sativum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

92

90

89

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 000

3 200

3 600

4 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

70

60

Влажность

%, не более

13

13

13

13

33

Крапива двудомная

(*Urtica dioica* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

92

90

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 800

2 000

2 400

2 800

Всхожесть

%, не менее

85

80

65

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

34

Крестовник плосколистный

(*Senecio platyphylloides* Som. et Lev.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

94

93

91

89

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

86

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 000

2 200

2 600

3 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

35

Левзея сафлоровидная (Маралий корень)

(*Leuzea carthamoides* DC. (*Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Pjin.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92

90

87

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

400

600

700

800

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

36

Марена красильная

(*Rubia tinctorum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

93

92

90

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

360

400

600

800

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

13

13

13

13

37

Мачок желтый

(*Glaucium flavum* Crantz.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

84

82

80

77

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

5 000

6 000

7 000

8 000

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

38

Мелисса лекарственная

(*Melissa officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

96

93

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

800

1 000

1 600

2 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

60

Влажность

%, не более

10

10

10

10

39

Наперстянка красная

(*Digitalis purpurea* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

94

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

94

91

88

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

500

600

800

1 000

Всхожесть

%, не менее

90

85

70

60

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

6,5

6,5

6,5

6,5

40

Наперстянка шерстистая

(*Digitalis lanata* Ehrb.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

91

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 000

2 200

2 600

3 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

6,5

6,5

6,5

6,5

41

Ноготки лекарственные

(*Calendula officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

90

89

86

83

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

93

92

90

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

500

600

1 000

1 600

Всхожесть

%, не менее

85

80

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8,5

8,5

8,5

8,5

42

Пажитник сенной

(*Trigonella foeci* Tim-graecum L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

96

93

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 000

1 200

1 600

2 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

43

Паслен дольчатый

(*Solanum laciniatum* Ait.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

93

91

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85

84

82

80

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

400

500

600

800

Всхожесть

%, не менее

75

70

55

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

44

Патриния средняя

(*Patrinia intermedia* (Hornem) Roem. Et Schult.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

92

90

88

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 000

2 200

2 400

2 800

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8

8

8

8

45

Пижма обыкновенная

(*Tanacetum vulgare* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

85

82

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

4 000

5 000

6 000

8 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

75

55

Влажность

%, не более

13

13

13

13

46

Подорожник блошный

(*Plantago psyllium* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

94

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

95

94

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 200

1 400

1 700

2 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

65

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

9

9

9

9

47

Подорожник большой

(*Plantago major* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

94

91

88

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

5 000

6 000

6 600

7 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7,5

7,5

7,5

7,5

48

Полынь цитварная

(*Artemisia cina* Berg.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

93

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

87

85

82

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

4 000

5 000

7 000

8 000

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

13

13

13

13

49

Пустырник сердечный (пятилопастной)

(*Leonurus cardiaca* L).

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

92

89

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

4 500

5 200

5 800

6 400

Всхожесть

%, не менее

80

75

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

50

Расторопша пятнистая

(*Silybum marianum* (L.) Gaertn.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

94

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

85

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

500

600

700

900

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

60

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

51

Ревень дланевидный тангутский

(*Rheum palmatum* L. var. *tanguticum* Maxim.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

95

93

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

90

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

300

400

600

800

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8

8

8

8

52

Родиола розовая

(*Rodiola rosea* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

85

82

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 000

3 200

3 800

4 600

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

13

13

13

13

53

Ромашка аптечная (ободранная)

(*Matricaria recutita* (L.) Raushert)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

88

87

85

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

8 000

9 000

10 000

12 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

12

12

12

12

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

54

Ромашка далматская (Пиретрум цинерариелистный)

(*Pyrethrum cinerariifolium* Trev.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

87

83

80

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 400

2 600

3 600

4 600

Всхожесть

%, не менее

75

70

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

55

Ромашка (кавказская, персидская) (Пиретрум розовый)

(*Pyrethrum roseum* (adam.) M. B.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

88

87

85

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

8 000

9 000

10 000

12 000

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

12

12

12

12

56

Рута душистая

(*Ruta graveolens* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

97

95

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

93

89

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

600

800

1 400

1 800

Всхожесть

%, не менее

80

75

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

57

Секуринега полукустарниковая (*Securinega suffuticosa* (Pfl.) Rehd.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

97

95

92

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

97

96

94

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 000

1 200

1 600

2 200

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

58

Синюха голубая

(*Polemonium coeruleum* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

92

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 400

1 600

2 000

2 600

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

60

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7,5

7,5

7,5

7,5

59

Стальник полевой

(*Ononis arvensis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

91

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 800

2 000

2 200

2 600

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

9

9

9

9

60

Термопсис ланцетный

(*Thermopsis lanceolata* R. Br.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

91

89

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 200

1 400

1 800

2 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

61

Термопсис очередноцветковый

(*Thermopsis alterniflora* Rgl. Et Schmalh.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

90

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 600

1 800

2 000

2 200

Всхожесть

%, не менее

85

80

65

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

62

Тимьян обыкновенный

(*Thymus vulgaris* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

88

87

85

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 600

4 000

4 400

4 800

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

60

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

6

6

6

6

63

Тмин обыкновенный

(*Carum carvi* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

94

91

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

89

87

84

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

600

800

1 200

1 800

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

13

13

13

13

64

Тысячелистник обыкновенный

(*Achillea millefolium* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

88

86

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

8 000

9 000

10 000

12 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

65

Фенхель обыкновенный

(*Foeniculum vulgare* Mill.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

98

97

95

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

95

93

90

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

600

700

900

1 200

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

12

12

12

12

66

Чабер садовый

(*Satureja hortensis* (L.))

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

90

85

82

75

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

94

93

90

87

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 800

2 000

2 400

3 000

Всхожесть

%, не менее

75

70

60

50

Влажность

%, не более

12

12

12

12

67

Черда трехраздельная

(*Bidens tripartita* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

94

92

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

88

87

85

83

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 000

2 500

2 800

3 200

Всхожесть

%, не менее

75

70

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

68

Чернушка дамасская

(*Nigella damascena* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

89

87

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

3 000

3 200

3 600

4 000

Всхожесть

%, не менее

85

80

65

55

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

69

Чистотел большой

(*Chelidonium majus* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

91

90

88

86

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 800

2 000

2 400

2 800

Всхожесть

%, не менее

75

70

60

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

70

Шалфей лекарственный

(*Salvia officinalis* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

94

91

89

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

200

300

600

800

Всхожесть

%, не менее

80

75

60

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

7

7

7

7

71

Шалфей мускатный

(*Salvia sclarea* L.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

96

95

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

95

94

92

85

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

300

400

800

1 200

Всхожесть

%, не менее

80

75

65

50

Влажность

%, не более

13

13

13

13

72

Шлемник байкальский

(*Scutellaria baicalensis* Georgi)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

96

94

91

88

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

1 000

1 200

1 800

2 400

Всхожесть

%, не менее

80

75

60

50

Влажность

%, не более

10

10

10

10

73

Эрва шерстистая

(*Aerva lanata* Juss)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

95

94

92

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

85

84

78

70

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

6 000

8 400

10 000

14 400

Всхожесть

%, не менее

70

65

55

45

Влажность

%, не более

10

10

10

10

74

Эхинацея пурпурная

(*Echinacea purpurea* (L.) Moench.)

Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота

%, не менее

97

96

93

90

Требования к посевным качествам семян

Чистота семян

%, не менее

90

89

87

84

Содержание семян других видов растений

шт./кг, не более

2 500

2 800

3 200

3 600

Всхожесть

%, не менее

85

80

70

55

Влажность

%, не более

13

13

13

13

для семян, упакованных в полиэтиленовые мешки

8

Таблица 2

Требования к посевным качествам саженцев декоративных деревьев в контейнерах

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для саженцев с различной формой кроны

типичная

пирамидальная

шаровидная (штамбовая)

показатели роста по группам

первая

вторая

третья

первая

вторая

третья

первая

вторая

третья

1

Лиственные деревья

Внешний вид

симметричная, развитая здоровая крона, прямой штамп, без внешних признаков повреждений вредителями и болезнями

Высота надземной части

м, не менее

1,5

2,0

3,0

1,5

2,0

2,5

1,8

2,0

2,5

Высота штамба

м, не более

1,3

1,5

1,8

0,2

0,2

0,2

1,5

1,5

1,5

Количество скелетных ветвей

шт., не менее

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Диаметр штамба:

см, не менее

на высоте 1,3 м от корневой шейки

1,5

2,0

3,0

-

-

-

1,5

1,5

2,0

под нижней

-

-

-

1,0

2,0

2,0

-

-

-

скелетной ветвью

Диаметр кроны

м, не менее

-

-

-

-

-

-

0,4

0,6

0,6

Размеры контейнера:

см, не менее

диаметр

20,0

20,0

30,0

20,0

30,0

30,0

20,0

20,0

30,0

высота

25,0

25,0

30,0

25,0

32,0

32,0

25,0

25,0

32,0

2

Хвойные и вечнозеленые деревья

Внешний вид

симметричная, развитая здоровая крона, прямой штамп, без внешних признаков повреждений вредителями и болезнями

Высота надземной части

м, не менее

0,40

0,80

1,20

0,40

0,60

0,80

0,30

0,60

0,70

Высота штамба

м, не более

-

-

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Диаметр кроны

м, не менее

0,30

0,50

0,80

-

-

-

-

-

-

Размеры контейнера:

см, не менее

диаметр

20

20

30

14

20

20

14

14

20

высота

25

25

32

20

25

25

20

20

25

Таблица 3

Требования к посевным качествам саженцев декоративных кустарников в контейнерах

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для саженцев с различной формой кроны

типичная

шаровидная (штамбовая)

пирамидальная (полуштамбовая)

высокорослые

среднерослые

низкорослые

1

Лиственные кустарники

Внешний вид

без внешних признаков повреждений: механических, вредителями и болезнями

Высота надземной части

м, не менее

0,7

0,5

0,3

0,8

0,5

Высота штамба

м, не более

-

-

-

0,1

0,1

Количество основных побегов

шт., не менее

5

4

3

4

4

Размеры контейнера:

см, не менее

диаметр

20

14

20

14

14

высота

25

20

25

20

20

2

Хвойные и вечнозеленые кустарники

Внешний вид

без внешних признаков повреждений: механических, вредителями и болезнями

Высота надземной части

м, не менее

0,4

-

0,2

0,2

0,4

Диаметр кроны

м, не менее

0,2

-

0,15

-

-

Размеры контейнера:

см, не менее

диаметр

14

-

14

14

14

высота

20

-

20

20

20

Таблица 4

Требования к посевным качествам саженцев декоративных деревьев лиственных пород для озеленения

Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для различных групп

первая

вторая

третья

четвертая

пятая

первый сорт

второй сорт

первый сорт

второй сорт

Внешний вид

симметричная, развитая здоровая крона, прямой штаб, без внешних признаков повреждений вредителями и болезнями

Высота надземной части

м

2,0 - 2,5

1,5 - 2,0

3,0 - 3,5

2,5 - 3,0

3,5 - 4,0

4,0 - 5,0

более 5,0

Высота штамба

м

1,0 - 1,3

-

1,3 - 1,8

1,3 - 1,8

1,5 - 2,0

1,8 - 2,2

1,8 - 2,2

Количество скелетных ветвей

шт., не менее

4

-

6

-

7

7

8

Диаметр штамба

см

2,0 - 2,5

-

3,0

2,5 - 3,0

4,5

5,0

7,0

Диаметр корневой системы

см, не менее

50,0

50,0

60,0

60,0

-

-

-

Длина корневой системы

см, не менее

35,0

35,0

40,0

40,0

-

-

-

Величина земляного кома

м

(длина, ширина, высота)

0,5 x 0,5 x 0,4

-

0,8 x 0,8 x 0,5

-

1,0 x 1,0 x 0,6

1,3 x 1,3 x 0,6

1,5 x 1,5 x 0,65

Искривление ствола

см, не более

-
5
-
5
-
-
-

Наличие в саженцах с оголенной корневой системой саженцев второго сорта, в саженцах второго сорта саженцев с отклонением от допустимых значений

%, не более

10
10
10
10
-
-
-

Таблица 5

Требования к посевным качествам саженцев декоративных кустарников лиственных и хвойных пород для озеленения

N

п/п

Наименование сельскохозяйственного растения

Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков для саженцев

высокорослые

среднерослые

низкорослые

прочие

первый сорт

второй сорт

первый сорт

второй сорт

первый сорт

второй сорт

первый сорт

второй сорт

1

Лиственные кустарники

Внешний вид

вызревшие почки, одревесневшая верхушечная часть побегов, без внешних признаков повреждений вредителями и болезнями, здоровая корневая система

Высота надземной части

см

для массовых посадок

не менее 70

60 - 70

не менее 50

40 - 50

не менее 30

20 - 30

-

-

для специальных посадок

не менее 100

100 - 110

не менее 90

80 - 90

не менее 60

50 - 60

-

-

Длина побега

см

для вертикального озеленения

-

-

-

-

-

-

50

30 - 50

Количество скелетных ветвей

шт., не менее

для массовых посадок

5

4

4

3

3

3

-

-

для специальных посадок

6

5

5

4

5

4

-

-

для вертикального озеленения

-

-

-

-

-

-

3

2

Длина корневой системы

см, не менее

для массовых посадок

25,0

25,0

20,0

20,0

20

20

-

-

для специальных посадок

30,0

30

25,0

25

25

25

-

-

для вертикального озеленения

-

-

-

-

-

-

25

20

Размер земляного кома

см, не менее

для специальных посадок:

диаметр

25

25

25

25

25

25

-

-

высота

20

20

20

20

20

20

-

-

Наличие саженцев в первом сорте второго сорта, во втором сорте саженцев, имеющих отклонение по высоте надземной части (длине побега)

%, не более

10

10

10

10

10

10

10

10

2

Хвойные кустарники

Внешний вид

вызревшие почки, одревесневшая верхушечная часть побегов, без внешних признаков повреждений вредителями и болезнями, здоровая корневая система

Высота надземной части

см

50

40 - 50

-

-

30

20 - 30

-

-

Диаметр кроны

см, не менее

30

20

-

-

20

15

-

-

Размер земляного кома

см, не менее

диаметр

20

20

-

-

20

20

-

-

высота

15

15

-

-

15

15

-

-

Наличие саженцев в первом сорте второго сорта, во втором сорте саженцев, имеющих отклонение по высоте надземной части

%, не более

10

10

-

-

10

10

-

-

Таблица 6

Требования к посевным качествам саженцев сортовых роз

Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков семян для различных форм

кустовые

полуштамбовые

штамбовые

привитые

корнесобственные

миниатюрные и почвопокровные

прочие

товарный сорт

первый

второй

первый

второй

первый

второй

первый

второй

первый

второй

Внешний вид

без механических повреждений, внешних признаков повреждения вредителями и болезнями

Диаметр штамба в месте прививки

см, не менее

0,5

0,5

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Количество основных побегов

шт., не менее

3

2

3

2

2

1

3

2

3

2

Количество основных корней для саженцев с оголенной корневой системой

шт., не менее

3

2

3

2

3

1

3

3

3

3

Длина каждого из основных корней для оголенной корневой системы

см, не менее

20

10

10

5

15

10

30

30

30

30

Высота штамба

м

-

-

-

-

-

-

0,4 - 0,8

0,4 - 0,8

не менее 0,8

не менее 0,8

Искривление штамба

см, не более

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

Размеры земляного кома:

м

диаметр

-

-

-

-

-

-

0,25

0,25

0,25

0,25

высота

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

Наличие в первом сорте саженцев второго сорта, в саженцах второго сорта саженцев с отклонением от допустимых значений

%, не более

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

Таблица 7

Требования к посевным качествам саженцев сортовых сиреней

Наименование признаков посевных качеств семян сельскохозяйственных растений

Единица измерения

Допустимые значения признаков семян для различных форм

кустовые

полуштаббовые

штаббовые

товарный сорт

первый

второй

первый

второй

первый

второй

для массовых

посадок

для специальных посадок

для массовых посадок

для специальных посадок

Внешний вид

без механических повреждений, внешних признаков повреждения вредителями и болезнями

Высота штабба

м

-

-

-

-

0,5 - 0,8

0,5 - 0,8

не менее 0,8

не менее 0,8

Высота надземной части

м

0,7 - 0,9

не менее 1,2

0,5 - 0,7

0,9 - 1,2

-

-

-

-

Искривление штамба

см, не более

-

-

-

-

4

4

4

4

Диаметр штамба в месте прививки

см, не менее

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

Количество основных побегов

шт., не менее

4

6

3

5

4

3

4

3

Длина каждого из основных побегов

см, не менее

-

-

-

-

30

20

30

20

Размеры корневой системы саженцев с оголенной корневой системой:

см, не менее

диаметр

25

20

20

15

30

30

30

30

длина

30

25

25

20

25

25

25

25

Размеры земляного кома для саженцев с закрытой корневой системой:

м

диаметр

-

-

-

-

0,25

0,25

0,25

0,25

высота

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

Наличие в первом сорте саженцев второго сорта, в саженцах второго сорта саженцев с отклонением от допустимых значений

%, не более

10