

关于发布《允许作饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定》的通知

农业部

关于发布《允许作饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定》的通知

(一九九七年九月一日农业部发布)

各省、自治区、直辖市农业(农牧、农林、畜牧)厅(局)、兽药监察所,中国兽药监察所:
为加强兽药使用的监督管理,指导农牧民正确使用兽药,控制兽药在动物性食品中的残留,我部制定了《允许作饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定》,现予以发布,请各地遵照执行。

凡在饲料或饲料产品中使用兽药的单位,均必须严格遵守本规定,科学、准确地使用兽药,各级兽药管理机关应加强兽药使用的监督管理工作。

本规定所指的饲料药物添加剂是指为预防动物疾病和促进动物生长、提高饲料转化率的需要,将兽药与适当的载体混合制成的剂型。本规定所列品种是指可用于制成饲料药物添加剂的兽药品种,除表中所列品种及农业部批准可用于制成饲料药物添加剂的兽药品种外,其他兽药均不得制成饲料药物添加剂用于饲料中。饲料中需要使用兽药时,只能添加饲料药物添加剂,不能添加原料药或其他剂型的兽药。含有兽药的商品饲料应在标签中标明所含兽药的法定名称、准确含量及停药期及注意事项等,水产用饲料药物添加剂和为治疗动物疾病的加药饲料未包括在本规定中。

本规定自发布之日起施行,我部1989年1月9日以(1989)农(牧)字第1号文发布的《饲料药物添加剂品种及使用规定》同时废止。

附件:允许作饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定

适用动物	最低用量	最高用量	停药期	品种	注意事项
种类	年龄上限	g / t 配合饲料	(天)		
1. 抗球虫类					
盐酸氨丙啉	鸡	62.5	125	0	维生素B1大于10g/t 明显拮抗
盐酸氨丙啉+乙氧酰胺苯甲酯	鸡	62.5+4	125+8	7	产蛋期禁用, 维生素B1大于10g / t 明显拮抗
盐酸氨丙啉+乙氧酰胺苯甲酯	鸡	100+5+60	7	7	产蛋期禁用, 维生素B1大于10g / t 明显拮抗
酯+磺胺喹恶啉(100:5:60)					10g / t 明显拮抗
硝酸二甲硫胺	鸡	62	3	3	产蛋期禁用, 维生素B1大于10g / t 明显拮抗
氯羟吡啶	鸡	16周	125	5	产蛋期禁用
尼卡巴嗪	鸡	100	125	4	产蛋期禁用, 高温季节慎用
尼卡巴嗪+乙氧酰胺苯甲酯	鸡	125+8	9	9	产蛋期禁用, 高温季节慎用, (125:8) 种鸡禁用
氢溴酸常山酮	鸡	3	5	5	产蛋期禁用, 水禽禁用

盐酸氯苯胍	鸡	30	36	7	产蛋期禁用	
	兔	50	66	7		
二硝托胺(球痢灵)	鸡	125			产蛋期禁用	
拉沙洛西钠	鸡	16周	75(7500)	125(12500)	5	产蛋期禁用。马属动物忌用，
			万单位)	万单位)		用后会致死
马杜拉霉素铵	鸡	5(500)	5(500)	5--7	产蛋期禁用。用量高于6g/t	
		万单位)	万单位)			时，明显抑制生长，与其他药
						物混用应慎重
莫能菌素钠	鸡	16周	90	110	3	产蛋期禁用。马属动物忌用，
			(9000)	(11000)		用后会致死，禁止与泰妙菌素
			万单位)	万单位)		或竹桃霉素同时使用
盐霉素钠	鸡	50	60	5	产蛋期禁用。马属动物忌用，	
			(5000)	(6000)		用后会致死，禁止与泰妙菌素
			万单位)	万单位)		或竹桃霉素同时使用
甲基盐霉素钠	鸡	60	70	5	产蛋期禁用。马属动物忌用，	
			(6000)	(7000)		禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同
			万单位)	万单位)		时使用
甲基盐霉素钠+尼卡巴嗪	鸡	40+40	50+50	7	产蛋期禁用。马属动物忌用，	
		(1:1)				禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同
						时使用，高温季节慎用

续表

适用动物	最低用量	最高用量	停药期	注意事项		
品种	种类	年龄上限	g / t 配合饲料	(天)		
海南霉素钠	鸡	5(500)	7.5(750)	7	产蛋期禁用。马属动物忌用，	
		万单位)	万单位)		禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同	
					时使用	
2. 驱虫类						
越霉素--A	猪	4个月	5(500)	10(1000)	3	
			万单位)	万单位)		
	鸡	5(500)	10(1000)	3	产蛋鸡禁用	
			万单位)	万单位)		
潮霉素--B	猪	4个月	10(1000)	13(1300)	15	
			万单位)	万单位)		
	鸡	8(800)	12(1200)	3	产蛋鸡禁用	
			万单位)	万单位)		
3. 抑菌类						
喹乙醇	猪	4个月	15	50	35	喹乙醇不能超过24个月，不

					能与抗生素同时使用			
	2个月	50	100	35	喹乙醇不能超过24个月,不			
					能与抗生素同时使用			
杆菌肽锌	猪	4个月	4	16	40	160	0	
	鸡	16周	4	16	20	80	0	
	牛	3个月	10	40	100	400	0	
		6个月	4	16	40	160	0	
硫酸粘杆菌素	猪	4个月	2	6000	20	60000	7	
		2个月	2	6000	40	12000		
	鸡	10周	2	6000	20	60000	7	产蛋期禁用

续表

适用动物	最低用量	最高用量	停药期		注意事项			
品种	种类	年龄上限	g / t	配合饲料	(天)			
	牛	3个月	20	60000	7			
杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素	鸡	10周	2	20	7	产蛋期禁用		
	猪	4个月	2	20	7			
		2个月	2	40	7			
黄霉素	鸡	肉鸡	1	100	5	500	0	
	猪	2个月	10	1000	25	2500		
		4个月	5	500	0			
	牛	肉牛	30mg /	50mg /	0			
			头 / 天	头 / 天				
北里霉素	猪	2个月	5	500	35	3500	3	
	鸡	10周	5	500	10	1000	2	产蛋期禁用

			万单位)	万单位)			
恩拉霉素	猪	4个月	2.5 (250	20 (2000			
			万单位)	万单位)			
鸡	10周	1 (100	10 (1000	7	产蛋期禁用		
			万单位)	万单位)			
金霉素	猪	4个月	25 (2500	75 (7500	7		
			万单位)	万单位)			
						高用量时, 低钙 (0.4-	
肉鸡	10周	20 (2000	50 (5000	7	0.55%)	饲料中连用不得超 5	
			万单位)	万单位)		天	
土霉素	猪	2个月	15 (1500	50 (5000	0		
			万单位)	万单位)			
		4个月	10 (1000	20 (2000	0		
			万单位)	万单位)			

续表

适用动物	最低用量	最高用量	停药期	注意事项		
品种	g / t 配合饲料		(天)			
鸡	5 (500	50 (5000	0	产蛋期禁用, 低钙 (0.18~		
	万单位)	万单位)		0.55%) 饲料中连用不得超 5		
				天		
磷酸泰乐菌素	猪	2个月	20 (2000	100 (10000	5	
			万单位)	万单位)		
		4个月	10 (1000	50 (5000	5	
			万单位)	万单位)		
鸡	4 (400	50 (5000	5	产蛋期禁用		
			万单位)	万单位)		
维吉尼霉素	猪		10 (1020	20 (2040	1	
			万单位)	万单位)		
鸡	16周	2 (204	5 (510	1	产蛋期禁用	
			万单位)	万单位)		

配伍禁忌: 下表中同一栏内两种或两种以上品种不能同时使用

盐酸氨丙啉, 盐酸氨丙啉+乙氧酰胺苯甲酯, 盐酸氨丙啉+乙氧酰胺苯甲酯+磺胺喹恶啉, 硝酸二

| 第一类 | 甲硫胺, 氯羟吡啶, 尼卡巴嗪, 尼卡巴嗪+乙氧酰胺苯甲酯, 氢溴酸常山酮, 盐酸氯苯胍, 盐霉素 |

| | 钠, 莫能菌素钠, 拉沙洛西钠, 甲基盐霉素钠, 甲基盐霉素钠+尼卡巴嗪, 马杜拉霉素铵, 二硝托

|

| | 胺, 海南霉素钠 |

|-----|-----

-----|

| 第二类 | 越霉素 A, 潮霉素 B |

|-----|-----

-----|

| | 杆菌肽锌, 恩拉霉素, 北里霉素, 维吉尼霉素, 黄霉素, 磷酸泰乐菌素, 金霉素, 土霉素, 杆菌肽

|

| 第三类 | |

| | 锌+硫酸粘杆菌素, 喹乙醇 |

|-----|-----

-----|

| 第四类 | 硫酸粘杆菌素, 金霉素, 土霉素, 杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素, 喹乙醇 |

|-----|-----
