

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

960

Na temelju članka 16. stavka 3., članka 21. stavka 3., članka 22. stavka 1. uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i stavka 4., članka 23. stavka 5., članka 24. stavka 5., članka 25. stavka 3., članka 28. stavka 6., članka 31. stavka 4., članka 34. stavka 3., članka 35. stavka 5., članka 38. stavka 3., članka 40. stavka 2. i članka 95. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 131/97, 163/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTEJEVIMA KAKVOĆE, NAČINU ISPITIVANJA, PAKIRANJU I DEKLARIRANJU SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 4/05) u članku 5. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Podnositelj zahtjeva za deklariranje sjemena obavezan je Zavodu za svaku partiju sjemena za koju je zatražio deklaraciju dostaviti uzorak iz stavka 1. ovog članka namijenjen post-kontroli iz članka 3. ovog Pravilnika istovremeno s dostavom izvješća o kakvoći, kao uvjet izdavanja deklaracije, izuzev za sjeme hibridnih sorti povrća, sjeme cvijeća i materijala koji biološki nisu sjeme za koje uzorak dostavlja po zahtjevu Zavoda.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza riječi »Obrascu« broj »10.14« zamjenjuje se brojem »10«.

U istom članku stavku 3. riječi: »osobi koja je sjeme deklarirala« zamjenjuju se riječima: »osobi koja je podnijela zahtjev za deklariranje«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 5. točki 4. riječi: »u sitnim pakiranjima« brišu se.

Članak 5.

U članku 21. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimka od odredbe stavka 2. točke 3. ovog članka i kod koje se prilaže izvješće o kakvoći sjemena izdano od laboratorija zemlje izvoznice primjenjuje se za sjemenski krumpir, lučice luka, češnjeve češnjaka i ostali reproduksijski materijal koji biološki nije sjeme, kategorije sjemena iz članka 7. stavka 1. točaka 10. i 11. Zakona te sjeme ukrasnih trava, travnih i djetelinsko travnih smjesa namijenjenih za podizanje travnjaka i igrališta čija je namjena navedena na pakiranju.«

Članak 6.

U članku 26. briše se stavak 2., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. broj: »24.« briše se.

Članak 8.

U članku 30. stavku 2. iza riječi: »kojoj« dodaju se riječi: »ističe ili«.

Članak 9.

U Dodacima uz Pravilnik rimski brojevi I., II., III. i IV. zamjenjuju se arapskim brojevima 1., 2., 3. i 4..

U Dodatku 1. u dijelu »Temeljni zahtjevi za kakvoću sjemena« poglavlje 1. Temeljni zahtjevi za kakvoću gomolja krumpira (*Solanum tuberosum* L.) briše se stavak 2. koji glasi: »Veličina gomolja: donja granica je 28 mm, gornja granica je 60 mm za okrugle gomolje, a za izdužene gomolje gornja granica je 65 mm. Izduženim se smatraju sorte kojima je prosječna duljina dva puta veća od širine.« ,

a točke 1.1., 1.2. i 1.3. mijenjaju se i glase:

»1.1. Sjemenski krumpir prije stavljanja u promet mora biti kalibriran i pakiran.

1.2. Gomolji sjemenskog krumpira koji prilikom kalibriranja padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 25 mm × 25 mm ne smiju biti stavljeni u promet. Kod gomolja koji ne padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 35 mm x 35 mm donja i gornja granična veličina gomolja u partiji izražava se višekratnicima broja pet. Najveća dozvoljena razlika između donje i gornje granične veličine gomolja u partiji ne smije bit veća od 25 mm.

1.3. Partija ne smije sadržavati više od 3% od ukupne težine gomolja koji su manji od navedene donje granične veličine gomolja i ne više od 3% ukupne težine gomolja koji su veći od navedene gornje granične veličine.« .

Članak 10.

U Dodatku 1. dodaje se Tablica 1. pod naslovom: »Najveća dozvoljena veličina partije i temeljni zahtjevi kakvoće sjemena u prometu« koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 11.

Riječi »Dodatak II.« u naslovu Tabele 14. brišu se, a riječ i broj »Tabela 14.« mijenjaju se i postaju »Tablica 15.« .

Iza Tablice 15. dodaje se Tumač znakova koji glasi:

»TUMAČ OZNAKA Temeljnih zahtjeva za kakvoću i uvjeta za klijanje sjemena

Veličina partije, masa uzorka, norme kakvoće i uvjeti za ispitivanje klijavosti sjemena

Objašnjenje oznaka za čitanje tablice:

1) *Podloge za klijanje*

IF – između filtrirnog papira odnosno bugačice;

NF – na filtrirnom papiru odnosno bugačici;

P – pijesak.

2) *Temperatura*

– jedan broj označava konstantnu temperaturu (npr. »20; 15«);

– dva broja razdvojena crticom označavaju izmjenične temperature (npr. »20 – 30«).

3) *Svjetlost*

S – biljne vrste koje se ispituju pri svjetlu;

T – biljne vrste koje se ispituju u tami.

4) *Postupak za prekidanje mirovanja i druge preporuke*

Ph – prethodno hlađenje;

PS – prethodno sušenje;

KNO₃ – 0,2 %-tna otopina kalijeva nitrata;

GA₃ – otopina giberelinske kiseline;

TT – tetrazolij-test.«

Članak 12.

U Dodatku 3. Obrasci broj 1., 3., 4., 4.a, 4.b, 6., 7. i 10. zamjenjuju se novim Obrascima 1., 3., 4., 4.a, 4.b, 6., 7. i 10. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 13.

U Dodatku 4. tablica pod naslovom: »Maksimalna težina malih pakiranja deklariranog sjemena« zamjenjuju se novom tablicom pod naslovom »Maksimalna težina sitnih pakiranja deklariranog sjemena« koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« .

Klasa: 320-11/04-01/16

Urbroj: 525-2-05-7

Zagreb, 23. ožujka 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

9. Ostali temeljni zahtjevi za kakvoću sjemena

1. Temeljni zahtjevi za kakvoću gomolja krumpira (*Solanum tuberosum* L.).

Veličina partije iznosi najviše 25 t.

1.1. Sjemenski krumpir prije stavljanja u promet mora biti kalibriran i pakiran.

1.2. Gomolji sjemenskog krumpira koji prilikom kalibriranja padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 25 mm × 25 mm ne smiju biti stavljeni u promet. Kod gomolja koji ne padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 35 mm x 35 mm donja i gornja granična veličina gomolja u partiji izražava se višekratnicima broja pet. Najveća dozvoljena razlika između donje i gornje granične veličine gomolja u partiji ne smije biti veća od 25 mm.

1.3. Partija ne smije sadržavati više od 3% od ukupne težine gomolja koji su manji od navedene donje granične veličine gomolja i ne više od 3% ukupne težine gomolja koji su veći od navedene gornje granične veličine.

1.4. Dopušta se 3% u težinskom omjeru »nepravilnih gomolja« (gomolji nepravilnih oblika i nasječeni).

1.5. Dopušta se 5% u težinskom omjeru gomolja sa simptomima obične krastavosti, *Streptomyces scabies* (to su gomolji kojima je više od 1/3 površine pokriveno krastavošću).

1.6. Dopušta se 5% u težinskom omjeru gomolja oboljelih od srebrnaste krastavosti (*Helminthosporium solani* syn. *Spondilocladium atrovirens*), ali da bolest ne uzrokuje gubitak turgora gomolja i da nije napadnuto više od jednog okca po jednom gomolju.

1.7. Do 31. siječnja sjemenski gomolji ne smiju imati klice, a nakon toga datuma dopušta se manje od 1/3 težinskog omjera gomolja s klicom od 10 mm (od 1. veljače do 15. ožujka) te do 15 mm nakon 15. ožujka. Partije sjemena ne smiju se tretirati sredstvima za sprečavanje ili kontrolu klijanja.

1.8. Dopušteno je 5% težinskog omjera »sklerotičnih« gomolja (*Rizoctonia solani*–sklerocij) s ne više od 10% inficirane površine.

1.9. Ukupna tolerantnost za suhu i mokru gnjiloću (točka 1.2.) i nepravilne gomolje (točka 1.3.), krastave gomolje (točka 1.4.) i srebroliku krastavost (točka 1.5.) ne smije biti veća od 6% u težinskom omjeru.

2. Norma za lukovice crvenog luka (*Allium cepa* L.)

Veličina partije iznosi najviše 20 t.

Lukovice crvenog luka dobivene iz sjemena (crvenog luka) koje služi kao sjemenski materijal za daljnju proizvodnju razstavljaju se sortiranjem lukovica prema krupnoći (promjeru) glavice u dvije kalibraže, i to:

– prva: promjera glavice od 6 do 22 mm (sitne lučice), s tolerancijama ± 3%;

– druga: promjera glavice većeg od 23 mm za luk (krupna lučica koja služi za proizvodnju mladoga zelenog luka za neposrednu potrošnju i za konzerviranje) s tolerancijama ± 3%

U sitnim lučicama prve skupine mogu se nalaziti glavice s mehaničkim oštećenjima, proključale glavice, glavice bez ovojne ljuske i stranih primjesa ukupno do 3%, a u srednjim lučicama druge skupine do 6%.

3. Norme za češnjeve češnjaka (*Allium schoenoprasum* L.)

Veličina partije iznosi najviše 20 t.

U češnjaku se mogu nalaziti češnjevi s mehaničkim oštećenjima, proključali češnjevi bez ovojne ljuske i stranih primjesa najviše do 3%.

Češnjak namijenjen sadnji može se pakirati i u glavicama.

4. Norme za kategorije sjemena strnih žita koje odstupaju od vrijednosti navedeni u tabeli 1.

4.1. U certificiranom sjemenu prve generacije (C1) strnih žita u uzorku od 1000 g dopušta se najviše pet zrna korova, bez primjesa drugih vrsta sjemena poljoprivrednog bilja.

4.2. U certificiranom sjemenu druge generacije (C2) strnih žita, u uzorku od 1000 g dopušta se najviše pet zrna korova i najviše 10 zrna drugih strnih žita.

4.3. U sjemenu strnih žita ne smije biti više od 3% sjemena koje prolazi kroz sita s pravokutnim otvorima kojima duljine strana iznose: za pšenicu i dvoredi ječam 2,2 x 25,0 mm; za ostali ječam 2,0 x 21,0 mm, a za raž i zob 1,8 x 21,0 mm.

5. U prosječnom uzorku ne smije biti ni jedno zrno:

- viline kosice (*Cuscuta* sp.) u uzorku svih vrsta djetelina, lucerne, smiljke, trava te u smjesama trava s tim biljnim vrstama;
- viline kosice (*Cuscuta* sp.) i volovoda (*Orobanch* spp.) u uzorku lana, grahorice, stočnog graška, smjese grahorica, zobi, grahorice sa stočnim graškom te u smjesama trava;
- divlje zobi (*Avena fatua*) u uzorku zobi i strnih žita;
- bunike (*Hyoscyamus niger*) u uzorku maka;

Ambrosia spp. i *Orobanch* spp. u uzorku konoplje.

6. Dopušta se u prosječnom uzorku prisutnost:

- do tri zrna dinjice (*Poterium sanguisorba*) u uzorku esparzete,
- do pet zrna *Lolium linicolum*, do 10 zrna *Lolium temulentum* i do 10 zrna *Camelina sativa* u uzorku lana;

do pet zrna *Rumex* spp. u uzorku djeteline i lucerne.

7. Posebne norme za sjeme šećerne repe

7.1. Jednoklično (monogermno) sjeme šećerne repe jest isključivo genetski jednoklično sjeme koje mora dati najmanje 90% pojedinačnih klijanaca.

7.2. Višeklično (multigermno) sjeme jest sjeme koje klijanjem daje više klica (najčešće 2–3).

7.3. Prema broju kromosoma može biti:

- diploidno sjeme kojemu klupka sadrže najmanje 85 % diploida;
- triploidno sjeme kojemu klupka sadrže najmanje 75 % triploida;
- tetraploidno sjeme kojemu klupka sadrže najmanje 85 % tetraploida;
- poliploidno sjeme kojemu smjesa diploida–triploida–tetraploida sadrži najviše 40 % diploida.

9.7.4. Prema stupnju dorade sjeme šećerne repe može biti:

- prirodno – nedorađeno čini smjesu kvržica veličine 3,25 – 6,25 mm;
- tehnički dorađeno sjeme jest polirano ili i segmentirano i na kraju kalibrirano. Segmentirano sjeme dobije se mehaničkim razbijanjem višekličnog sjemena na segmente da bi se povećao udjel jednokličnih segmenata;
- pilirano sjeme obloženo je sjeme kojemu se omotač nanosi radi postizanja okrugle forme sjemena i povećanja njegove apsolutne mase. Omotač čine inertne, hranjive, stimulirajuće i zaštitne tvari, a da bi se pilirano sjeme dobro uočavalo u tlu, boji se;
- inkrustirano sjeme jest sjeme prekriveno tankim slojem punila, zaštitnih sredstava, boje i sličnoga da bi se klice zaštitile i bolje uočavale u tlu.

7.5. Kalibriranje peleta počinje od 3,50 mm i obavlja se na sitima okruglih otvora. Raspon između donje i gornje granice smije iznositi 1 mm.

8. Temeljni zahtjevi kakvoće za sjeme kukuruza

8.1. Sjeme kukuruza može se kalibrirati, i to:

- po širini,
- po debljini,
- po duljini.

8.2. Kalibriranje sjemena obavlja se unutar ovih krajnjih dimenzija:

- širina zrna od 6 do 11 mm,
- debljina zrna od 3,5 do 9 mm,
- duljina zrna od 8 do 14 mm.

Dimenzije zrna u pojedinim frakcijama određuje dorađivač sjemena u sklopu propisanih dimenzija, ali raspon unutar barem dvije dimenzije ne može biti veći od 2 mm a odstupanje od dimenzije frakcije može imati najviše 5% sjemena. Nazivi frakcija ovisno o širini nose nazive malo (M), srednje (S), veliko (V),; ovisno o debljini plosnato (P), okruglo (O),; ovisno o duljini kratko (K), srenje (S), dugo (D).

9. Kalibrirano sjeme krastavca, paprike, cvjetače, kelja, kupusa, salate, luka i drugih povrtnarskih kultura mora biti izjednačeno po veličini i obliku, s najvećom tolerancijom od 2%.

10. U čistoću smjesa sjemena ubraja se zbroj postotka sjemena kultura koje ulaze u smjesu. U smjesi trava i smjesi trava s lucernom, djetelinom ili smiljkitom, čistoća mora iznositi najmanje 90%, a u ostalim smjesama – najmanje 95 %. Klijavost smjese sjemena ocjenjuje se posebno za svaku kulturu. Smjesa sjemena smatra se neispravnom ako sjeme jedne kulture ili više kultura koje čine smjesu i zastupljene su s više od 10% ne odgovara deklariranoj..

11. Pri ispitivanju klijavosti sjemena djeteline, lucerne, smiljkite, esparzete, grahorice, lupine, leće i pamuka, tvrda zrna ubrajaju se u klijavo sjeme.

DODATAK I

NAJVEĆA DOZVOLJENA VELIČINA PARTIJE I TEMELJNI ZAHTJEVI KAKVOĆE ZA SJEME U PROMETU

Tablica 1

Redni broj	Biljna vrsta (latinski naziv)	Velicina partije sjemena najviše kg	Čistoća najmanje %	Drugih vrsta najviše %	Korova najviše %	Klijavost najmanje %	Udio vlage najviše %	Dodatne norme i radni nalazi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Agropyron spp.	10000	90	3	1	65	13	–
2.	Agrostis canina L.	10000	90	2	1	75	12	–
3.	Agrostis gigantea Roth	10000	90	2	1	75	12	–
4.	Agrostis stolonifera L. sa	10000	90	2	1	75	12	–

5.	Allium cepa L.	10000	97	0,2	0,3	70	12	-
6.	Allium fistulosum L.	10000	96	0,3	0,2	65	12	-
7.	Allium porrum L.	10000	97	0,2	0,3	65	12	-
8.	Allium shoenoprasum L.	10000	96	0,2	0,3	65	12	-
9.	Alopecurus pratensis L.	10000	75	3	2	70	13	-
10.	Aethum graveolens L.	10000	90	0,5	0,5	60	13	-
11.	Anthoxanthum odoratum L.	10000	90	2	2	60	13	-
12.	Anthyllis vulneraria L.	10000	90	2	1	65	13	-
13.	Apium graveolens L.	10000	97	0,5	0,5	70	13	-
14.	Arachis hypogaea L.	25000	99	0	0	70	11	-
15.	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Pres	10000	90	3	2	75	13	-
16.	Asparagus officinalis L.	20000	96	0,5	0	70	13	-
17.	Avena sativa L.	25000	98	0	0	85	15	Ispitati masu 1000 sjemenki
18.	Beta vulgaris L. (svi varijeteti)	20000	97	0,2	0	73	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
19.	Beta vulgaris saccharifera lange multigermno (višećlično)	20000	97	0,2	0,2	80	15	Ispitati masu 1000
	segmentirano	20000	97	0,3	0,1	85	15	sjemenki za
	monogermno	20000	97	0,3	0,1	80	15	monogermne sorte kljalog, monokličnog sjemena mora biti najmanje 90%
20.	Borago officinalis L.	10000	97	0,2	0,1	75	13	-
21.	Brassica chinensis L.	10000	96	0,5	0,3	75	12	-
22.	Brassica napus L.	10000	98	0,5	0,3	80	12	-
	Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb.	10000	98	0,5	0,3	80	12	-
23.	Brassica nigra (L.) Koch.	10000	97	0,2	0,3	75	12	-
24.	Brassica oleracea L. (svi varijeteti)	10000	98	0,5	0,3	75	12	-
25.	Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.	10000	97	0,5	0,3	75	12	-
26.	Brassica rapa L. (uključujući B. campestris L.)	10000	97	0,5	0,3	80	12	Ispitati masu 1000 sjemenki
27.	Bromus arvensis L.	10000	90	3	1	65	13	-
28.	Bromus carinatus Hook et Arn	10000	90	3	1	65	13	-
29.	Bromus catharticus Vahl.	10000	97	3	1	75	13	-
30.	Bromus inermis Leysser i B. uniolloides	10000	97	3	1	75	13	-
31.	Bromus marginatus Nees ex Steudel	10000	97	3	1	75	13	-
32.	Bromus mollis L.	1000	97	3	1	75	13	-
33.	Bromus sitchensis Trin.	10000	97	3	1	75	13	-
34.	Camelina sativa (L.) Crantz	10000	95	0,2	0,5	70	14	-
35.	Cannabis sativa L.	10000	98	0,2	0,2	75	13	Ispitati masu 1000 sjemenki
36.	Capsicum spp.	10000	97	0	0	65	12	-
37.	Carum carvi L.	10000	97	0,5	0,5	70	12	-
38.	Cicer arietinum L.	20000	97	0	0	75	13	-
39.	Cichorium endivia L.	10000	95	0,5	0,5	65	14	-

40.	Cichorium intybus L.	10000	97	0,5	0,5	80	14	-
41.	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai	20000	98	0	0	75	14	-
42.	Coriandrum sativum L.	1000	90	0,2	0,2	65	12	-
43.	Coronilla varia L.	10000	95	3	1,5	65	13	-
44.	Cucumis melo L.	10000	98	0	0	75	14	-
45.	Cucumis sativus L.	10000	98	0	0	80	14	-
46.	Cucurbita maxima Duchesne i C. moschata (D.) D ex P.	20000	98	0	0	80	14	-
47.	Cucurbita pepo L.	20000	98	0	0	75	14	-
48.	Cuminum cyminum L.	10000	94	0,2	0,3	65	13	-
49.	Cynara scolymus L.	20000	94	2	2	70	13	-
50.	Cynodon dactylon (L.) Pera	10000	90	2	2	70	13	-
51.	Cynosurus cristatus L.	10000	94	2	2	70	13	-
52.	Dactylis glomerata L.	10000	90	2	2	80	13	-
53.	Daucus carota L.	10000	95	0,5	0,5	65	12	-
54.	Deschampsia spp.	10000	94	2	2	70	13	-
55.	Eragrostis curvula (schrader) Nees	10000	94	2	2	70	13	-
56.	Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter	10000	94	2	2	70	13	-
57.	Fagopyrum esculentum Monech	10000	97	1	1	80	14	Najviše 30 zrna E tataricum u 500 g ispitati masu 1000 sjemenki
58.	Festuca arundinacea Schreber	10000	95	3	1	80	13	-
59.	Festuca heterophylla Lam	10000	94	3	1	75	13	-
60.	Festuca ovina L.	10000	85	3	1	75	13	-
61.	Festuca pratensis Hudsom	10000	95	3	1	80	13	-
62.	Festuca rubra L.	10000	90	3	1	75	13	-
63.	Foeniculum vulgare Mill er	10000	96	0	0	70	13	-
64.	Glycine javanica L.	10000	96	0	0	75	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
65.	Glycine max (L.) Merr.		98	0	0	80	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
66.	Gossypium spp.	25000	98	0	0	80	12	-
67.	Helianthus annuuss L.	20000	98	0	0	85	11	Ispitati masu 1000 sjemenki
68.	Hibiscus esculentus L.	20000	94	1	0,2	65	12	-
69.	Holcus lanaatus L.	10000	90	3	2	65	13	-
70.	Hordeum vulgare L.	25000	98	0	0	85	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
71.	Lactuca sativa L.	10000	95	0,5	0,5	75	12	-
72.	Lagenaria-siceraria (Molina) Standley	20000	98	0	0	80	14	-
73.	Lathyrus hirsutus L.	10000	94	2	1	75	15	-
74.	Lathyrus sativus L.	20000	94	2	1	75	15	Ispitati masu 1000 sjemenki
75.	Lens culinaris Medikus	10000	96	0,5	0,2	75	15	-
76.	Lepidium sativum L.	10000	96	0,3	0,3	75	14	-
77.	Linum usitatissimum L.	10000	99	0,5	0,5	85	12	-
78.	Lolium X boucheanum Kunth.	10000	96	2	1	75	13	-
79.	Lolium multiflorum Lam.	10000	96	2	1	75	13	-
80.	Lolium perenne L.	10000	96	2	1	80	13	10% fluorescirajućih klica ubraja se u engleski ljulj
81.	Lotus corniculatus L.	10000	95	3	1	75	13	-

82.	Lotus uliginosus Schk.	10000	94	3	1	65	13	-
83.	Lupinus albus L.	25000	98	0,5	0,2	80	15	-
84.	Lupinus angustifolius L.	25000	98	0,5	0,2	75	15	-
85.	Lupinus luteus L.	25000	98	0,5	0,2	80	15	-
86.	Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten	10000	97	0	0	75	12	-
87.	Medicago lupulina L.	10000	97	3	1,5	80	13	-
88.	Medicago sativa L. M.X. varia T. Martyn	10000	97	2	0,5	80	13	-
89.	Melilotus alba Med. i M.officinalis (L.) pall.	10000	95	3	1	65	13	-
90.	Nicotiana tabacum L.	10000	97	0	0	70	10	-
91.	Ocimum basilicum L.	10000	90	0,3	0,2	65	12	-
92.	Onobryhis viciaefolia Scop. (plod/sjeme)	10000	95	0,5	0,5	75	13	-
93.	Origanum majoran L.	10000	95	0,2	0,2	65	12	-
94.	Ornithopus sativus Brot.	10000	96	2	1	65	13	-
95.	Oryza sativa L.	25000	98	0,5	0,2	80	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
96.	Panicum antidotale Retz.	10000	97	1	0,2	75	13	-
97.	Panicum coloratum L.	10000	97	1	0,2	75	13	-
98.	Panicum maximum Jacq.	10000	97	1	0,2	75	13	-
99.	Panicum miliaceum L.	10000	97	1	0,2	80	13	-
100.	Panicum ramosum L.	10000	97	1	0,2	75	13	-
101.	Panicum virgatum L.	10000	97	1	0,2	75	13	-
102.	Papaver somniferum	10000	98	0	0	80	10	-
103.	Pastinaca sativa L.	10000	95	0,5	60	65	12	-
104.	Petroselinum crispum (Miller) N.ex.A.W.Hill	10000	97	0,5	0,5	65	13	-
105.	Phacelia tanacetifolia Benth.	10000	94	2	1	65	13	-
106.	Phalaris arundinacea L.	10000	94	1	1	65	14	-
107.	Phalaris canariensis L.	10000	94	1	1	75	14	-
108.	Phaseolus coccineus L.	20000	98	0	0	80	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
109.	Phaseolus mungo L.	20000	97	0	0	75	14	-
110.	Phaseolus vulgaris L.	25000	98	0	0	75	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
111.	Phleum bertolonii DC	10000	96	1	1	80	13	-
112.	Phleum pratense L.	10000	96	1	1	80	13	-
113.	Physalis pubescens L.	10000	97	0	0	70	12	-
114.	Pimpinella anisum L.	10000	94	0,5	0,2	65	12	-
115.	Pisum arvense L.	25000	94	3	1	75	15	Ispitati masu 1000 sjemenki
116.	Pisum sativum L.	25000	98	0	0	80	15	Ispitati masu 1000 sjemenki
117.	Poa ampla Merr.	10000	90	2	1	65	12	-
118.	Poa annua L.	10000	85	2	1	75	12	-
119.	Poa bulbosa L.	10000	90	2	1	65	12	-
120.	Poa compressa L.	10000	90	2	1	65	12	-
121.	Poa nemoralis L.	10000	85	2	1	75	12	-
122.	Poa palustris L.	10000	85	2	1	75	12	-
123.	Poa pratensis L.	10000	85	2	1	75	12	-

124.	<i>Poa trivialis</i> L.	10000	85	2	1	75	12	-
125.	<i>Portulaca oleracea</i> L.	10000	94	0,5	0,2	60	12	-
126.	<i>Raphannus sativus</i> L.	10000	97	0,5	0,5	70	13	-
127.	<i>Rheum rhaponticum</i> L.	10000	95	0,5	0,1	75	13	-
128.	<i>Ricinus communis</i> L.	20000	97	0	0	75	11	-
129.	<i>Satureja hortensis</i> L.	10000	95	0,2	0,2	65	12	-
130.	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	10000	95	0	0,2	70	12	-
131.	<i>Secale cereale</i> L.	25000	98	0	0	85	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
132.	<i>Sesamum indicum</i> L. (S.orientale L.)	10000	97	0,3	0,3	75	10	-
133.	<i>Setaria italica</i> (L.)P.Beauv.	10000	94	2	1	70	13	-
134.	<i>Sinapis alba</i> L.	10000	98	0,5	0,5	85	12	-
135.	<i>Solanum melongena</i> L.	10000	96	0	0	65	13	-
136.	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers	10000	94	0,5	0,5	70	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
137.	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper)Stapf	10000	98	0,5	0,5	80	13	Ispitati masu 1000 sjemenki
138.	<i>Sorghum vulgare</i> (S.bicolor (L.)Moench)	10000	96	0,5	0,2	70	15	Ispitati masu 1000 sjemenki
139.	<i>Spinacia oleracea</i> L.	10000	97	0,2	0,5	75	13	-
140.	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas)Kuntze	20000	94	0,2	0,5	60	13	-
141.	<i>Thymus vulgaris</i> L.	10000	92	0,3	0,2	60	12	-
142.	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	10000	90	0	0,2	65	12	-
143.	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	10000	97	2	0,5	80	13	-
144.	<i>Trifolium campestre</i> Schreber	10000	94	2	0,5	70	13	-
145.	<i>Trifolium hybridum</i> L.	10000	97	2	0,5	80	13	Do 34% sjeme bijele djeteline ne uračunava se u druge vrste
146.	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	10000	97	2	0,5	75	13	-
147.	<i>Trifolium pratense</i> L.	10000	97	2	0,5	80	13	-
148.	<i>Trifolium repens</i> L.	10000	97	2	0,5	80	13	Do 3% hibridne djeteline ne uračunava se u druge vrste
149.	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	10000	97	2	0,5	80	13	-
150.	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	10000	96	2	0,5	70	13	-
151.	<i>Trisetum flavescens</i> (L. P.beauv.	10000	75	3	2	70	12	-
152.	<i>Triticum aestivum</i> Lemend.Fiori et.Paol., T.durum Desf., X Triticosecale Wittm i tritcale	25000	98	0	0	85	14	Ispitati masu 1000 sjemenki
153.	<i>Valerianella locusta</i> (L.). Laterr	10000	95	0,3	0,5	65	13	-
154.	<i>Vicia faba</i> L.	20000	98	0	0	80	15	Ispitati masu 1000 sjemenki
155.	<i>Vicia pannonica</i> Crantz	20000	98	3	1	85	14	Do 3% Vicia sativa ne uračunava se u druge vrste. Ispitati masu 1000 sjemenki

156.	Vicia sativa L. i V. angustifolia L.	25000	98	3	1	85	14	Do 3% Vicia panonica ne uračunava se u druge vrste. Ispitati masu 1000 sjemenki
157.	Vicia villosa Roth i V. dasycarpa Ten.	20000	98	3	1	85	14	–
158.	Vigna unguiculata (L. Walp.sa V. sinensis (L.)Savi ex.Hassk	20000	96	0	0	75	14	–
159.	Zea mays L.	40000	98	0	0	90	13	Ispitati masu 1000 sjemenki
	Sve vrste cvjeća i ljekovitog bilja	5000	90	/	/	50	/	

MAKSIMALNA TEŽINA »SITNIH PAKIRANJA« DEKLARIRANOG SJEMENA

DODATAK 3.

