

قرارات
وزارة الزراعة والأمن الغذائي
قرار وزارى رقم ٥٩٠ لسنة ١٩٨٤
في شأن المخصبات الزراعية

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ باصدار قانون الزراعة والقوانين
المعدلة له :

وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٦ بانشاء نقابة المهن الزراعية والقوانين المعدلة له :

وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٧ « قانوني » بشأن المخصبات الزراعية :

وعلى موافقة لجنة المخصبات الزراعية :

قرر :

(مادة ١)

يقصر تداول المخصبات الزراعية على الأنواع المدرجة بالملحق رقم (١) المرفق بعد تسجيلها في وزارة الزراعة ويستثنى من التسجيل المخصبات الواردة في الجدولين (د ، هـ) من الملحق المشار إليه .

(مادة ٢)

تقدم طلبات التسجيل على الاستمارة المعدة لذلك بوزارة الزراعة (مركز البحث الزراعية - معهد بحوث الأراضي والمياه) مصحوبه بعينة من المخصص المراد تسجيله تكفى لإجراء التحاليل والاختبارات البيولوجيـة والكمـاـرـيـة .

ويجب سداد مصاريف التحليل بالفئات المقررة بالنسبة لكل عنصر من العناصر المختلفة الداخلة في تركيب المخصص المطلوب تسجيله والمبينة بالجدول الوارد بالملحق رقم (٢) المرفق .

(مادة ٣)

يتم تسجيل المخصص الذي تثبت مطابقته للمواصفات وصلاحيـته بيـولـوجـيـاـ بعد موافـقة لـجـنـةـ المـخـصـبـاتـ الزـرـاعـيـةـ بـالـوـزـارـةـ وـيـعـطـىـ الطـالـبـ شـهـادـةـ تـفـيدـ تسـجـيلـ المـخـصـبـ وـذـلـكـ بـعـدـ أـدـاءـ رـسـمـ تسـجـيلـ قـدـرـهـ خـمـسـ جـنيـهـاتـ .

ويـسـرـىـ التـسـجـيلـ لـمـدـةـ خـمـسـ سـنـوـاتـ وـيـجـبـ تـجـديـدـهـ عـلـىـ أـنـ يـقـدـمـ طـلـبـ التـجـديـدـ قـبـلـ

نهاية مدة التسجيل بستة أشهر على الأقل .

(مادة ٤)

لا يجوز تصنيع أي من المضببات الزراعية أو تجهيزها لغرض الاتجارة بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويحظر طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعده لذلك بمذكرة الاتجارة (مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث الأراضي والبياه) على أن تسدد مصاريف معاينة براقة عشرين جنية مصرية وذلك مع عدم الأخذ بحكم القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والمعجب بالحصول على تراخيص من الجهات أخرى .

ويجب أن يرفق بالطلب رسم هندسي معتمد وصورة من الترخيص الصادر إلى المالك من وزارة الصناعة وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري والإيصال الدال على سداد مصاريف المعاناة ورسم الترخيص بواقع خمسة جنيهات ويصدر الترخيص بالتصنيع أو التجهيز بعد موافقة لجنة المضببات الزراعية بالوزارة .

ويكون الترخيص بالتصنيع أو التجهيز شخصيا فلا يجوز التنازل عنه إلى الغير حتى في حالة بيع المعنث أو تأجيره ويعين تجديد الترخيص كل خمس سنوات بذات الإجراءات المشار إليها يقدم طلب التجديد قبل موعد انتهاء الترخيص بيستة أشهر على الأقل .

ولا يجوز تداول المضببات المصنعة أو المجهزة إلا بعد تسجيلها وفقاً لهذا القرار وثبت مطابقه كل تشغيله للمواصفات بموجب شهادة معتمدة تصدر عن وزارة الزراعة بعد أداء مصاريف التحليل المقترنة بالجبل المرفق .

ويجب على إدارة المصنوع أن تمسك سجلًا رقمًا مخترباً من وزارة الزراعة يوضح فيه أرقام التشفيلات وتاريخ تصنيعها أو تجهيزها وحركة توزيعها فضلًا عن السجل الخاص بالاتجارة المنصوص عليه في المادة (١) ويجب على إدارة المصنوع تقديم هذين السجلين عند طلبهما والاحتفاظ بهما لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها .
(مادة ٥)

لإيجوز الاتجارة في المضببات الزراعية الأربع الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة

بعد موافقة لجنة المضببات الزراعية وفي محل معد لهذا الغرض مستوف لا شتراء مال الصناعية والتجارية ويقدم طلب الترخيص بالاتجارة على النموذج المعده ذلك من معهد بحوث الأراضي و العباية بمركز البحوث الزراعية ويكون مصححها بمحاصيف معاييرها عشرين جنيها عن كل محل يطلب الترخيص به ويجب أن يرفق الطلب ما يدل على قيد الطالب بالسجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية وما يدل على ملكيته أو استئجاره للعين الكائن بها المتجر وصورة الترخيص الصادر بادارته كمحل تجاري .

تاجيرة .

وتكون مدة الترخيص خمس سنوات ويتعين تجديده بطلب يقدم قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل طبقاً للشروط والإجراءات المشار إليها في هذه المادة .
ويجب أن يكون للمتجر مدير مسؤول من المهندسين الزراعيين المقيدين بجدول نقابة المهن الزراعية .

(مادة ٦)

على كل من رخص له بالاتجار في المخصصات الزراعية أن يمسك سجلاً مرقماً ومختماً بخاتم وزارة الزراعة يقيد فيه حركة التداول ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه وعلى المرخص له في الاتجار أن يعطي المشترى فاتورة يبين فيها اسم المخصص وكيفيته ونسبة مكوناته السعادية وأن يحتفظ بصورة منها وذلك لتقديمها عند الطلب .

(مادة ٧)

يجب اخطار الوزارة (مركز البحوث الزراعية - معهد بحوث الأراضي والمياه) كتابة عن كل تغيير يحصل في أي بيان من البيانات الخاصة بترخيص التصنيع أو الاتجار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير ويكون التبليغ بكتاب موصى عليه مصحوباً بالمستندات المؤيدة له على أن يرفق بها أصل الترخيص لإثبات التعديل به والا اعتبر الترخيص لاغياً .

(مادة ٨)

يقصر تداول المخصصات الزراعية المدعمة من الدولة وغيرها من المخصصات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة على البنك الرئيسي للتنمية والادتمان الزراعي وفروعه وبنوكه بالمحافظات والجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها من الجهات التي يحددها وزير الزراعة .

(مادة ٩)

لايجوز نقل الأسمدة المدعمة من الدولة وغيرها من الأسمدة المقصورة توزيعها على البنك الرئيسي وفروعه ومن محافظة إلى أخرى أو داخل المحافظة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك الرئيسي للتنمية والادتمان او فروعه بالمحافظات ويبين في هذا الترخيص اسم الجهة أو المخزن المصدر منه والية المخصص وكيفية و تاريخ التصدير.

(مادة ١٠)

لايجوز بيع أي مخصص مدرج بالجداول أ، ب ، ج من الملحق رقم (١) المرفق أو عرضه للتداول الا في عبوات مفلقة بكيفية تضمن سلامة المخصص والمحافظة على نقاطه وعدم التلاعب في محتوياته كما يجب أن توضح على العبوات البيانات الآتية باللغة العربية

بخط واضح لا يسهل محوه :

- (أ) اسم المصنوع المنتج للمخصص والبلد الوارد منه اذا كان مستوراً.
- (ب) الاسم التجارى للمخصص وعلامته التجارية ورقم وتاريخ تسجيله .
- (ج) النسبة المئوية للمكونات السمادية مكتوبة بأرقام لا يقل ارتفاعها عن ٥ سم .
- (د) الوزن القائم مكتوباً بأرقام لا يقل ارتفاعها عن ١٠ سم .

أما العبوات التي لا يزيد وزنها القائم على ٥٥ كيلو جرام فيجب كتابة البيانات المتقدمة عليها دون التقيد بالارتفاعات المبينة بالبندين ج ، د من هذه المادة .

(مادة ١١)

لا يجوز الإفراج عن المخصصات المستوردة المدرجة بالجدول أ ، ب ، ج ، هـ من الملحق رقم (١) المشار إليه الا بعد أن تثبت نتائج تحليل العينات المأخوذة منها ومطابقتها للمواصفات الواردة بذلك الملحق .

ويجوز للجنة المخصصات الزراعية السماح بتداول مخصوصاً تغير مطابقة تماماً للمواصفات وبشرط صلاحيتها للاستعمال وعلى أن يعدل ثمنها بما يتاسب مع مكوناتها السمادية .

(مادة ١٢)

تؤخذ عينات المخصصات الزراعية لتحليلها بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه ويجب إثبات حضوره أو مندوبيه أو امتناعه عن الحضور رغم اخطاره في محضر يتضمن البيانات الآتية :

- ١- اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته .
- ٢- تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات .
- ٣- اسم صاحب الشأن أو من ينوب عنه ولقب كل منها وصناعته ومحل إقامته .
- ٤- سبب أخذ العينات والكمية التي تمثلها العينة .
- ٥- عدد العبوات الموجودة وكل بيان آخر يمكن الانتفاع به لتمييز العينات وإثبات حالة المخصصات .

(مادة ١٣)

تؤخذ عينات المخصصات الزراعية بالطرق الآتية :

(١) بالنسبة للمخصصات القابلة للتقطيع :

يستعمل في أخذ العينة مجس معدنى طوله ٦٠ سم على الأقل بخلاف المقاييس وقطره الخارجي ١٧ م على الأكثر - تفتح العبوة من أحد طرفيها العلويين فقط وتؤخذ العينة بالمجس من هذا الطرف في الاتجاه الأسفل المقابل له ثم تغلق العبوة بأحكام وتحتم ثانية

بكلية ملائمة على أن تتم هذه العملية بسرعة المحافظة على المخصوص من التبيير.

ويتكرر هذه العملية على عدد معين من العبوات بطريقة عشوائية في حدود النسب المشار إليها في المادة (١٤) وتوضع العينات فوراً في زجاجة كبيرة ذات فتحة واسعة وسادة زجاجية حيث ينخلط بعضها بعضها البعض بغير زجاجة وتقليل الزجاجة فوراً عقب الدخال كل كمية في زجاجة تنظيف جانة وترتبط سدادة الزجاجة بالعبارات ب بحيث تلف حول عقبها بطرق الزجاجة والبطاقة الملصقة بها حسبما هو منصوص عليه في المادة (١٥) من هذا القرار . وعلى أن تختتم جميعها بالجمع الأحمر على كل من الزجاجة والبطاقة كما تختتم الدوبارة أيضاً فوق السدادة ويستعمل في ذلك خاتم أخذ العينة وخاتم صاحب الشأن .

(ب) بالنسبة للمخصوصيات غير الطابلة للتبيير:

تؤخذ العينات بداخل العبوس في العبوة في أربعة جهات على الأكثر ويكرر هذا في عدد معين من الاكياس في حدود النسب المشار إليها في المادة (١٥) وتوضع هذه العينات على قطعة من القماش أو الورق وتختلط بعضها البعض خالطاً جيداً باليد أو بملوك خشبي أو معدني حتى تصبع متباينة تماماً وتؤخذ من هذا المخلوط خمسة أجزاء لا يزيد الجزء منها عن ٢٥ جم (مائتي وخمسين جراماً) .

ثم يوضع كل جزء من الأجزاء الخمسة في زجاجة وترتبط بالدوبارة بنفس الطريقة العينية في القراءة (أ) من هذه المادة .

(ج) بالنسبة للمخصوصيات في كمية:
تؤخذ العينات في هذه الحالة بحسب مناسب بادخالة في نواحي مختلفة من الكلمة ثم تختلط بعضها البعض على قطعاتمن القماش . وتتبيير فيها نفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة

(ب) من هذه المادة .

(مادة ١٤)

(١) تؤخذ العينات من العبوات بالنسبة الأكتية :

- ١-إذا كان عدد العبوات لا يزيد على خمس عبوات فتؤخذ العينة منها جمعياً .
- ٢-إذا كان عدد العبوات يزيد على خمسة ولا يجاوز ٢٠ فتؤخذ العينة بنسبة ١٠٪ منها على لا يقل المدعى ٦ عينات .
- ٣-إذا كان عدد العبوات يزيد على ٢٠ ولا يجاوز ٦٠ فتؤخذ العينة بنسبة ٢٠٪ على لا العددن ٨ عينات .
- ٤-إذا كان عدد العبوات يزيد على ٦٠ ولا يجاوز ٢٠٠ فتؤخذ العينة بنسبة ١٠٪ على لا يقل العدد عن ١٠ عينات .

- ٥- اذا كان عدد العبوات يزيد على ٢٠٠ ولا يجاوز ٥٠٠ فتؤخذ العينة بنسبة ٤٪ منها وعلى الا يقل العدد عن ١٥ عينة .
- ٦- اذا كان عدد العبوات يزيد على ٥٠٠ ولا يجاوز ١٠٠٠ فتؤخذ العينة بنسبة ٤٪ منها على ان لا يقل العدد عن ٢٥ عينة .
- ٧- اذا كان عدد العبوات يزيد على ١٠٠٠ فتؤخذ العينة بنسبة ٣٪ منها وعلى ان لا يقل العدد عن ٤٠ عينة .

(ب) عدد الأجزاء التي تؤخذ من الكرومة :

- ١- ٢٥ جزءا اذا كانت الكمية لا تتجاوز ١طن .
- ٢- ٣٠ جزءا اذا كانت الكمية أكثر من ١-٢ طن .
- ٣-٣٥ جزءا اذا كانت الكمية أكثر من ٢-٥ طن .
- ٤- ٤٠ جزءا اذا كانت الكمية أكثر من ٥-١٠ طن .
- ٥- ٤٥ جزءا اذا كانت الكمية أكثر من ١٠-٢٥ طن .
- ٦- ٥٠ جزءا اذا كانت الكمية أكثر من ٢٥-٥٠ طن .
- ٧- ٦٠ جزءا اذا كانت الكمية أكثر من ٥٠-١٠٠ طن .
- ٨- يؤخذ جزءا من زيادة عما تقدم من كل عشرة أطنان أو كسر منها اذا تجاوزت الكمية مائة طن .

(مادة ١٥)

تلصق بطاقة لكل زجاجة معدة لأخذ العينات يبين فيها اسم المخصوص وتركيبة وتاريخ اخذ العينة والكمية التي تمثلها واسم وتوقيع اخذ العينة وصاحب الشأن او من ينوب عنه . ويرسل محضر اخذ العينات وزجاجاتان منها الى معامل التحليل المختصة بوزارة الزراعة خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة لإجراء التحاليل على احدهما والاحتفاظ بالثانية للرجوع اليها في حالة وجود نزاع وتحفظ الزجاجتان الآخريان لدى صاحب الشأن .

(مادة ١٦)

تتولى وزارة الزراعة تحليل عينات المخصوصات الزراعية بالطرق الفنية المبينة بالملحق رقم ٢ المرفق وترسل نتيجة التحليل الى صاحب الشأن خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وصول العينة الى المعامل ويعتبر التحفظ على المخصوصات كأن لم يكن اذا لم يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل خلال المدة المذكورة ، ما لم تخطره الوزارة خلال تلك المدة باستمرار التحفظ حتى الانتهاء من التحليل اذا رأت ضرورة زيادة المدة المقررة للتحليل .

(مادة ١٧)

لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل ويطلب اعادته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالنتيجة والا سقط حقه في التظلم واعتبرت النتيجة نهائية ويقدم التظلم من نتيجة التحليل إلى وزارة الزراعة (معهد بحوث الأراضي والمياه) بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون الطلب مصحوباً بما يلى :

١- شهادة التحليل .

٢- أحدي العينتين المحفوظتين لدى المتظلم .

٣- رسم نظر التظلم وقدره خمسة جنيهات أو ايصال يثبت أداء هذا المبلغ في أقرب خزينة تابعة لوزارة الزراعة .
كما يقدى المتظلم مصاريف اعادة التحليل وفقاً للجدول المرفق وترد هذه المصاريف إلى المتظلم اذا ثبت من اعادة التحليل مطابقة المختبر للمواصفات .

(مادة ١٨)

تبعد عند اعادة تحليل العينات الاجراءات الآتية :

١- تتولى اعادة تحليل العينة لجنة مشكلة من ثلاثة اعضاء من هيئة البحث أو الاخصائين بمعهد بحوث الأراضي والمياه يحددهم مدير المعهد ويكون أحدهم من مراقبة التحاليل الزراعية ويجوز للمتظلم أن يطلب حضور عملية التحليل بنفسه أو بمندوب عنه .
٢- تسلم الى اللجنة العينة المحفوظة بالمعهد والعينة المقدمة من المتظلم وذلك لفحص الاختام وتقرير سلامتها وأثبات ذلك في محضر يحرر لهذا الغرض .

٣- تتبع في اعادة التحليل ذات الطريقة التي اتبعت في التحليل الأول المتظلم منه ويجرى التحليل أولاً على العينة المقدمة من المتظلم فإذا اختلفت نتائج هذا التحليل عن تحليل الوزارة يجري التحليل على العينة المحفوظة لدى الوزارة وتكون نتيجة تحليل هذه العينة نهائية

وعلي اللجنة أن تصدر قرارها بنتيجة التحليل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها العينة موضوع النزاع ويكون قرارها نهائياً .

(مادة ١٩)

لا تخل نسب التجارب في التحليل الكيماوي المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالشروط الخاصة بالمحاسبة على نسب العجز في المواد الفعالة التي قد تتضمنها العقود أو الاشتراطات الخاصة بعمليات استيراد الأسمدة من الخارج .

(مادة ٢٠)

تستثنى من أحكام هذا القرار المختبرات الزراعية التي تستورد لأغراض التجارب العلمية

للجامعات ومراكز البحث والمعاهد العلمية الرسمية ولا يخل هذا بشرط الحصول على ترخيص سابق بالاستيراد من لجنة المختبرات الزراعية . وعلى هذه الجهات موافاة لجنة المختبرات الزراعية بتقارير عن نتائج التجارب التي أجرتها على المختبرات المشار إليها . ويجوز للجنة المختبرات الزراعية الموافقة على استيراد عينات بالكميات التي تحددها لغير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ، على أن يتم استخدامها واجراء التجارب عليها بالمزارع الخاصة بتلك الجهات تحت اشراف مركز البحث الزراعي .

(مادة ٢١)

لا يجوز الإفراج عن المختبرات المستوردة من الأسمدة العضوية أو اللقحات البكتيرية إلا بعد التحقق من خلوها من الأمراض والحيشات الضارة بالتربيه أو بالانسان أو النبات وبعد موافقة لجنة المختبرات الزراعية .

(مادة ٢٢)

يجب إعادة تسجيل جميع المختبرات المسجلة حالياً وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به والا سقط تسجيبلها بفواید هذه المدة أو بانتهاء مدة تسجيبلها الحالى أيهما أقرب .

ويتعين تجديد جميع تراخيص التصنيع والتجار وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة سنة من تاريخ العمل به والا اعتبار الترخيص لاغياً بفواید هذه المدة أو بانتهاء مدة الترخيص الحالية أيهما أقرب .

(مادة ٢٣)

يلغى القرار الوزارى رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٧ (قانوني) المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(مادة ٢٤)

ينشر القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره *
١٩٨٤/٦/٢١

وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائي
دكتور / يوسف أمين والي

* نشر هذا القرار بالوقائع المصرية - العدد ٢١٨ في ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٨٤

ملحق رقم (١)
الجدول (أ)
الأسمدة البسيطة

أولاً- الأسمدة الأزوتية :

(أ) نتراتية :

- ١- نترات الجير .
- ٢- نترات الصودا .

(ب) نشادية :

- ١- سلفات النشادر .

(ج) نتراتية نشادية :

- ١- نترات النشادر .
- ٢- نترات النشادر الجيري
- ٣- نترو سلفات النشادر .

(د) أممية :

- ١- الباوريا .

ثانياً - أسمدة فوسفاتية :

(أ) قابلة للذوبان في الماء :

- ١- سوبر فوسفات الجير .
- ٢- سوبر فوسفات الجير المركز .

(ب) غير قابلة للذوبان في الماء :

- ١- خبث الحديد (توماس فوسفات) .

ثالثاً- أسمدة بوتاسيه :

(أ) سلفات بوتاسيوم .

(ب) كلورو البوتاسيوم .

الجدول (ب)

الأسمدة المركبة والمخلوطة

(أ) الأسمدة المركبة.

(ب) الأسمدة المخلوطة.

الجدول (ج)

أسmedة تحتوي عناصر سمية صغرى :
مركبات التسميد بالرش .

الجدول (د)

الأسmedة العضوية المحددة العناصر السمية

- (أ) الدم المجفف .
- (ب) اللحم المجفف .
- (ج) القرون والحوافز .
- (د) مسحوق العظام .
- (ه) مسحوق السمك (جواكو الأسماك) .
- (و) كسب بذرة القطن غير المقشور مركب بذرة القطن المقشور .
- (ز) كسب بذرة الخروع .

طرق تداول الأسmedة المدرجة بهذا الجدول .

الجدول (هـ)

الأسmedة العضوية والطبيعية غير المحددة العناصر السمية

الجدول (ز)

المواد التي تستعمل لصلاح التربة (المحسنات)

- أولاً - الجبس الزراعي .
- ثانياً - محسنات ومخصبات أخرى .

الجدول (ز)

المواد البيكتيرية والهرمونية

- أولاً- المواد البيكتيرية :
- ١- لقاحات المحاصيل البقولية .
- ٢- لقاحات أخرى .
- ثانياً - لقاحات أخرى .

ملحق رقم (٢)

طرق تحليل الأسmedة

لولاً - الأسmedة الأزوتية :

- (أ) تقدير الأزوت في حالة وجودة على حالة نترات فقط .

(ج) تقدير الأذن في حالة وجوده على صودة نشادر فقط .
(د) تقدير الأذن في حالة وجوده على صودة نشادر ونشادر معا .

ثانياً : الأسمدة الفوسفاتية :

- (أ) سوبر فوسفات الحديد .
- (ب) سعاد خبيث الحديد (توماس فوسفات) .
- (ج) تقدير حمض الفوسفوريك الذائب في حمض الستريك ٢٪ .
- ثالثاً - الأسمدة البوتاسية:
 - (أ) سلسلات البوتاسيوم .
 - (ب) كلوريد البوتاسيوم .
 - (ج) تقدير الكبريتات .
 - (د) تقدير الكالسيوم .
 - (ه) تقدير كلوريد الصوديوم .
 - (ز) تقدير النحومية .
 - (و) تقدير العناصر المغذية .
 - * جدول بالتجارزات المسماة بها في التحليل .
 - * هنات المصاريف الخاصة بالتحليل .
- محلق رقم (١)
- البعول (١)
- الأسعدة البسيطة
- أولاً- أسمدة أذنية:
 - (أ) نشارات:
 - ١- نشارات العين:
هي عبارة عن محل نشارات الكالسيوم وهو سعاد قابل للتمعيم لا تتلف نسبة التترجين الكلي
الذائب في الماء به عن ٥٠ ١٥٪ / معظمه على صودة نتراتية .
ولا تزيد نسبة التترجين النشاري ب على ٥٪ / بالذئن .
ويجب أن يعبأ فى عبوات عازلة للرطوبة مفتلة قفلام محكما وأن تتحمل العبوات ظروف النقل
والتداول .

٢- نترات الصوديوم :

هو عبارة عن ملح نترات الصوديوم .

لا تقل نسبة التتروجين الذائب في الماء به عن ١٦٪ وجمعة على صورة نتراتية .

يستورد هذا السماد صب ويعباً في أجولة على أن تغفل قفلاً محكماً بكيفية تضمن نقاهة المادة وسلامتها وعدم امكان التلاعب في محتوياتها .

(ب) نشاردية :

١- سلفات النشار:

هو عبارة عن ملح متبلور من كبريتات الأمونيوم .

لاتقل نسبة التتروجين عن ٦٪ ٢٠٪ وجمعيه على صورة نشاردية .

ويعباً السماد المنتج محلياً في عبوات يجب أن تتحمل ظروف النقل والتداول .

ومقفلة قفلاً محكماً بكيفية تضمن نقاهة المادة وسلامتها وعدم امكان التلاعب في محتوياتها كما يستورد هذا السماد صب ويعباً في أجولة يجب أن تغفل قفلاً محكماً بكيفية تضمن نقاهة المادة وسلامتها وعدم امكان التلاعب في محتوياتها .

(ج) نتراتية نشاردية :

١- نترات النشار:

هو عبارة عن ملح نترات الأمونيوم المحبب والمصنع بطريقة تقلل من قابليته الشديدة للتجميع لا تقل نسبة التتروجين الكلى الذائب في الماء به عن ٥٪ ٣٣٪ نصفه على صورة نشاردية .

ويعباً السماد في عبوات عازلة للرطوبة مقفلة قفلاً محكماً على أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتداول .

٢- نترات النشار الجيري:

هو عبارة عن مخلوط متجانس من نترات الأمونيوم وكربونات الكالسيوم وهو سماد قابل للتجميع وتتراوح نسبة التتروجين الذائب في الماء ما بين ٥٪ ٢٠٪ إلى ٣١٪ - وتكون كمية التتروجين النتراتي والتتروجين النشاري في السماد متساوية . ويعباً هذا السماد في عبوات عازلة للرطوبة ومقفلة قفلاً محكماً ويجب أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتداول .

٣- نتروسلفات النشار:

هو عبارة عن سماد مكون من ملحى سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم وهو قابل للتجميع ثلاثة أرباع التتروجين على وجه التقرير في صورة نشاردية والباقي في صورة نتراتية .

لاتقل نسبة التتروجين الكلى الذائب في الماء به عن ٦٪ ٢٦٪ (١٩٪ أزوت نشاردي ٧٪

أزوت نتراتي) .

ويجب أن يعبأ السماد في عبوات عازلة الرطوبة مغلقة قفلًا محكمًا ويجب أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتداول .

(د) أميدية :

١- البيوريا :

هي عبارة عن مركب عضوي قابل للذوبان في الماء يحتوى على التروجين في صورة أميدية وهو سماد قابل للتجميع .

لا تقل نسبة التروجين الكلى الذائب في الماء به عن ٤٦ % .

ويجب ألا تزيد نسبة البايوريت به عن ٩٪ .

ويجب أن يعبأ هذا السماد في عبوات عازلة للرطوبة مغلقة قفلًا محكمًا .

كما يجب أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتداول .

ثانياً - أسمدة فوسفاتية :

(أ) قابلة للذوبان في الماء :

١- سوبر فوسفات الجير:

أهم مكونات هذا السماد هو فوسفات أحادي الكالسيوم لا تقل نسبة حمض الفوسفوريك (فو ٢٥) الذائب في الماء به عن ١٥ % .

يجب أن يكون في حالة من الجفاف تمنع تكتله بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة به عند التداول على ١٠ % .

ويعبأ السماد في عبوات مغلقة جيداً بكيفية تضمن نقاوة المادة وسلامتها وعدم امكان التلاعيب في محتوياتها كما ويجب أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتداول كم ويجوز تخزين هذا السماد أو استيراده صب على أن يعبأ في الوقت المناسب في عبوات مغلقة قفلًا محكمًا .

٢- سوبر فوسفات الجير المركز:

أهم مكونات هذا السماد هو فوسفات أحادي الكالسيوم ويحتوى على ٤٥ % (فو ٢٥) ذائب في الماء على أن تقل نسبة (فو ٢٥) عن ٤٢٪ حمض فوسفوريك قابل للذوبان في الماء ولا تزيد نسبة الرطوبة به على ٤٪ ويجب أن يكون السماد محبباً ويمر ٩٥٪ من الحبيبات من منخل سعه ثقوبة ٥ ملليمتر ولا تقل عن ١ ملليمتر ويجب ألا يكون السماد متكللاً أو متوجراً أو متبعيناً وأن يكون صالحًا للاستخدام كسماد .

ويعبأ السماد في عبوات مغلقة قفلًا جيداً بكيفية تضمن نقاوة المادة وسلامتها وعدم امكان التلاعيب في محتوياتها كما يجب أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتداول .

(ب) غير قابل للزيان في الدام:

حيث العدید : (تعماص فوسيطات) :

موعيارة عن مخلوط من فرسفات رباعى الكالسيوم مع شرابن .
لا تقل نسبة حمض الفوسفوريك (فو ١٥) التابل للزيان فى حمض الستريك (٢٪)

عن ٥٪ .

يجب أن يكون السماد ناعما بحيث يمر ٨٠٪ على الأقل منه من مدخل فيه ١٠٠٪ تقب
في البريمة المربعة لأن يمر ٩٨٪ منه من مدخل طول ضلع كل فتحة من فتحاته ٣٠،٠ ملليمتر
يعبا فى عبارات مختلفة قدلا محكما بكيفية تضمن سلامة السماد وتقاربه وعدم التلاعب فى
محطويات العبارات كما يجب أن تتحمل العبارات ظرف النقل والتداول ويجد أن يخزن صبا
في إكرام بالمخزن على أن تغطى هذه الأكرام بعريقة تمنع تطاير السماد بالهوا لغيرته .

ثالث - الأسمدة البوتاسيية :

(أ) سلطات بوتاسيوم :
يكون السماد على صوره بلورات أرجحيات صافية أو مسحوق جاف غير متكتل يحتوى

على الأقل على ٨١٪ أكسيد بوتاسيوم (بو ٢٪) قابل للزيان فى الدام .

نسبة الرطوبة فى السماد لا تزيد عن ٥٪ .

لا تزيد نسبة الكلور فى السماد عن ٥٪، ويجب لا يكنى السماد متكتلا أو متجررا .

(ب) كلوريد البوتاسيوم :

هو عبارة عن ملح كلوريد البوتاسيوم .

تتراوح نسبة أكسيد البوتاسيوم (بو ٢٪) الذائب فى الدام ما بين ٥٠٪ إلى ٦٢٪ - كما

يجب لا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم به عن ٥٪ .

وتعينا هذه الأسمدة فى عبارات مختلفة قنلا محكما على أن تتحمل العبارات ظرف النقل
والداول .

البعول (ب)

الأسمدة العرقيبة والمخلطة :

١- الأسمدة العرقيبة :

تتكون الأسمدة العرقيبة من عنصرتين غذائيتين أو أكثر وهن إما فى حالة صلبية أو سائلة
وفى حالة الأسمدة الصلبية تحتوى الحبيبة الواحدة فيها على جميع مكونات السماد من
العناصر الغذائية وينفس النسب فى السماد .
وفى الأسمدة المعلقة والسائلة تحتوى أى عينة منها على جميع العناصر الموجودة فى
السماد وينفس النسب التى بها .

٢- الأسمدة المخلوطة :

وهي مخاليط من أملاح سعادية في حالة صلبة أو سائلة وفي حالة الأسمدة الصلبة تحتوى على عنصرين أو أكثر متجانسة تماماً وبحيث لا تؤثر مكونات أحد الأسمدة بها على الخواص الكيميائية للأسمدة الأخرى الداخلة في تكوينها .

الجدول (ج)

أسمدة تحتوى عناصر سعادية صفرى :

وهي اما فى صورة أملاح معدنية أو مركبات مخلبية فى صورة صلبة أو سائلة قابلة للذوبان فى الماء قد تحتاج اليها النباتات بكميات قليلة ويعتمدفى اضافتها على تحديد مركز هذه العناصر فى كل من التربة والنبات ويتم تسجيل هذه الأسمدة على أساس محتواها من العناصر السعادية ونتائج الاختبارات والتقييم البيولوجي لها .

وينبغي توضيح مكوناتها من العناصر السعادية وصورها ومقادير وطريقة استخدامها بالنسبة للمحاصيل والأراضي المختلفة .

مركبات التسميد بالرش :

هي مركبات سعادية فى صورة محاليل مرکزة - أو مواد صلبة قابلة للذوبان فى الماء أو معلقة فى الماء وفي جميع الحالات لا يصح وجود رواسب عند التخفيف بالماء . وتحتوى هذه المركبات على عنصر أو أكثر من العناصر الصفرى وخاصة الزنك والمنجنيز وال الحديد وقد تحتوى بجانب العناصر الدقيقة على عنصر أو أكثر من العناصر السعادية الكبرى وينبغي أن توضح مواصفات السماد على الوجه التالي بالنشرة الفنية الخاصة بالمركب : اسم المركب - النسب المئوية لمكوناته الذائبة فى الماء من العناصر الصفرى والكبرى وصورها ونوع المحصول المزمع تسميده بها والجرعات اللازمة ومواعيد وضعها ومدى امكانية خلط هذا المركب مع غيره من الأسمدة مع معرفة أنواع الزسيدة التي يمكن خلطها بالمركب ونسبها .

وفي حالة المادة السائلة أو المعلقة يعرف الوزن المقابل للحجم - كما تعرف الكثافة .

كما يعرف تاريخ تصنيع المركب وندة صلاحية .

ويجب أن يصاحب المركب شهادة بخلوه من أي مادة ضارة بالبيئة -(التربة أو النبات أو الإنسان أو الحيوان) .

طرق تداول الأسمدة المدرجة بهذه الجداول :

١- يجب أن تكون الأسمدة المدرجة في هذه الجداول معبأة عند التداول في عبوات سليمة خالية من التمزق أو التأكل مستوفاة للاشتراطات المبينة لكل نوع من هذه الأسمدة .

٢- يجب أن يكتب على العبوات التي يزيد وزن كل منها عن خمسة كيلو جرامات البيانات الآتية :

(أ) اسم المصنع المنتج للسماد والبلد الوارد منه السماد اذا كان مستوردا .

(ب) الاسم التجارى للسماد وعلامته التجارية .

(ج) النسبة المئوية للعناصر السمية في السماد مكتوبة بأرقام لا يقل ارتفاعها عن ٥ سم .

(د) الوزن القائم مكتوبا بأرقام لا يقل ارتفاعها عن ١٠ سم . أما العبوات التي يكون وزنها القائم ٥ كيلو جرامات فاقل فترتوضع عليها هذه البيانات دون التقيد بالارتفاع المشار اليه . كما يجوز كتابة هذه البيانات على بطاقة تلصق أو تثبت على العبوة اذا تعذر الكتابة على العبوة ذاتها .

٣- يجب أن تخزن الأسمدة القابلة للتجميع في مخازن جافة أرضيتها من الأسمنت أو ما يماثلها وأن تكون محكمة الفلق .

٤- في حالة ورود أى مركب سمادى محلى على عناصر سمية كبيرة أو صغرى ووجود أن نسب العناصر المكونة له تختلف عن النسب المسجل عليها هذا السماد يعرض موضوعه على لجنة المختربات الزراعية قبل الإفراج عنه وتداؤله بالأسواق للبت في هذا الموضوع .

الجدول (د)

الأسمدة العضوية المحدة العناصر السمية

(أ) الدم المجهف :

لا تقل نسبة الأزوت الكلى عن ٨٪ مع تجاوز مقداره ٥٪ .

لا تقل نسبة المادة العضوية بـ عن ٧٠٪ مع تجاوز مقداره ٤٪ .

يجب الا تقل درجة نعومته عن درجة التحبب .

(ب) اللحم المجهف :

لا تقل نسبة الأزوت الكلى عن ٦٪ مع تجاوز مقداره ٥٪ .

لا تقل نسبة المواد العضوية عن ٥٥٪ مع تجاوز مقداره ٣٪ .

لا تقل درجة نعومته عن درجة التحبب .

(ج) القرعون والحوالن :

لا تقل نسبة الأزوت الكلى عن ٨٪ مع تجاوز مقداره ٥٪ .

لا تقل نسبة المادة العضوية بـ عن ٧٠٪ مع تجاوز مقداره ٤٪ .

يجب أن تكون في حالة مسحوق تام النعومة .

(د) مسحوق النظام:

لا تقل نسبة حامض الفوسفديك الكلي فر ٢١٥ عن ٢٠٪ مع تجاوز مقداره ١٪ .

لا تقل نسبة المادة المضوية به عن ٢٠٪ مع تجاوز مقداره ١٪ .

لا تزيد نسبة الدهن عن ١٠٪ مع تجاوز مقداره ٥٪ .

يجب أن يكون ناعماً بحيث يقذ ٦٪ منه من تقارب منفذ ١ ملليتر .

(هـ) مسحوق السلك (جيوك الأسسال):

لا تقل نسبة الأزوت الكلي به عن ٥٪ مع تجاوز مقداره ٥٪ .

لا تقل نسبة حامض الفوسفديك الكلي (فر ٢١٥) عن ١٢٪ مع تجاوز مقداره ١٪ .

لا تقل نسبة المادة المضوية به عن ٤٪ مع تجاوز مقداره ٢٪ .

لا تقل درجة نعومته عن درجة التجفيف .

(م) كسب بذرة اللعن غير المشود وكسب بذرة اللعن المقشيد:

تستعمل كسماد عضوي إذا كانت غير صالحة للتغذية للحيوان بسبب تعفنها أو اختلطها بالأتربة أو الشرائب وتحسب قيمتها السمادية حسب ما تحوية من الأزوت الكلي والمادة المضوية .

(ن) كسب بذرء الفرع:

لا تقل نسبة الأزوت الكلي به عن ٤٪ مع تجاوز مقداره ٥٪ .

لا تقل نسبة المادة المضوية به عن ٨٪ مع تجاوز مقداره ٤٪ .

لا تزيد نسبة الزيت به عن ٦٪ مع تجاوز مقداره ٢٪ .

لا تقل درجة نعومته عن حالة الجرش العادي .

طرق تداول الأسمدة المسدبة المدرج بهذه الجدول:

يجب أن تكون الأسمدة المسدبة في هذا الجدول معبأة عند التداول في عبوات مغلقة تماماً وبياناً عليها البيانات الآتية:

(أ) اسم المصنف المنتج .

(ب) اسم السماد المضوى .

(ج) النسبة المئوية للعناصر السمادية في السماد مكتوبة بأرقام لا تقل عن ٥ سم .

(د) الوزن القائم مكتوباً بأرقام لا يقل ارتفاعها عن عشرة سنتيمترات .

(هـ) النسبة المئوية للمادة المضوية مكتوبه بأرقام لا يقل ارتفاعها عن ٥ سم .

الجدول (هـ)

الأسمدة العضوية والطبيعية غير المحددة العناصر السمية .

السماد البلدى (بما فيه من سماد الاسطبلات وكل أنواع الروث) السماد البلدى الصناعى - زبل الحمام - زرق الطيور - المواد البرازية كسماد المجارى والبودريت ومخلفات مصانع البيرة - أعشاب البحر - مخلفات المذايحة ما عدا الدم والقرون والظامان والحوالف - وكل أنواع الرماد .

الجدول (و)

المواد التي تستعمل لصلاح التربة (المحسنات)

أولاً - الجبس الزراعى :

هو عبارة عن ملح كبريتات الكالسيوم الأيدراتية يوجد عادة بصورة طبيعية فى طبقات بالمحاجر أو كمنتج ثانوى لبعض الصناعات وتختلف نسبة كبريتات الكالسيوم الأيدراتية من طبقة لأخرى .

يجب ألا تقل نسبة كبريتات الكالسيوم الأيدراتية عن ٨٠ % .

التجاوز المسموح به فى التحليل ومقداره ٢٪ (من كبريتات الكالسيوم الأيدراتية) .

يجب ألا تزيد نسبة كلورو الصوديوم عن ٣٪ .

يجب ألا تقل نسبة ما يمر منه فيمنخل سعة ثقوبها ٢ ملليمتر مربع عن ٩٠ % على أن يمر ٥ % منها على الأقل من منخل سعة ثقوبها ١ ملليمتر مربع .

يجب ألا يحتوى على عناصر أو مركبات ضارة بالتربة أو النبات أو الحيوان (رصاص - نيكل - زرنيخ) .

طرق تداول الجبس الزراعى

ينقل الجبس الزراعى مباشرة من اماكن انتاجه صبا بالسكة الحديد او السيارات بمعرفة البنك الرئيسي للتنمية والاتمان الزراعى والتعاونى وذلك بناء على طلب الجمعيات التعاونية الزراعية او المزارعين او الهيئات .

ثانياً — محسنات ومخضبات أخرى :

لا يتم تسجيلها الا بعد تحليلها واختبارها في تجارب معملية أو خضرية أو حقلية لمدة لا تقل عن ستين حتى يتسلى تقرير مدى صلاحيتها وتدارها .

ينطبق ذلك على اللقاحات البكتيرية .

الجدول (ن)
المواد البكتيرية والهرمونية

أولاً - المواد البكتيرية

١- لقاحات المحاصيل البقولية :

هي عبارة عن مزارع بكتيرية محملة على حامل من المواد المائمة الصلبة أو السائلة.
ويجب أن تكون اللقاحات داخل عبوات محكمة الفلق إلى حد يحول دون تسرب الهواء
الملوث إليها .

يجب الا يقل عدد البكتيريا الحية في الجرام الواحد في أي وقت من الأوقات عن مائة مليون وذلك اذا كان الوزن الصافي للعبوة الواحدة ٤٠٠ جرام وكان الحد الأقصى ل المساحة
التي تقع بها هي ثلاثة اف دنة .

ويجوز أن يكون الوزن الصافي للعبوة الواحدة أقل من ٤٠٠ جرام بما يتفق مع الزيادة في
الحد الأدنى بعد البكتيريا الحية بكل جرام .

يجب ألا يزيد عدد الفطر والأكتينو ميسيتش وغيرها من الميكروبات الملوثة للحامل عن ١٠٪ من العدد الكلي للميكروبات في هذا الحامل .

ويجب أن تكون البكتيريا العقدية الموجودة بالعامل ذات فاعلية من حيث تكون العقد
الجذرية وتثبتت آزوت الهواء الجوى وذلك بناء على الاختبارات الحيوية التي تجريها المعامل
الحكومية المختصة .

يجب أن يوجد على عبوات اللقاحات البيانات الآتية :
الجهة القائمة بصنع اللقاحات .

نوع المحصول الخاص بها .
الوزن الصافي لكل عبوة .

طريقة الاستخدام :

عدد البكتيريا العقدية في كل جرام من اللقاح والحد الأقصى ل المساحة التي تقع بها العبوة
الواحدة .

تاريخ انتهاء صلاحيتها .

٢- لقاحات أخرى :

مثل الطحلب الأخضر العرق وخلافه وينبغي أن ينطبق عليها الشروط السابق ذكرها فيما
يختص بتقييمها وخلوها من الأمراض الفطرية أو الحشرية مما قد يسبب أضراراً للبيئة.

ثانياً - المواد الهرمونية :

لا يجوز تداول أي مادة من المواد الهرمونية والمواد الشبيهة لها والتي لها أثر في تكثيف نمو النباتات إلا في النطاق التجاري فقط وفي حالة توصية وزارة الزراعة باستعمال أي مادة من هذه المواد تحديد مواصفاتها بما وطرق تداولها .

ملحق رقم (٢)

طرق تحليل الأسمدة

تستعمل الطرق التالية في التحليل أو الطرق المقابلة المنشورة في A,O,A,C أو الـ F,A,O

أولاً - الأسمدة الأزوتية :

(أ) تقدير الأزوت في حالة وجودة على حالة نترات فقط :
مثل سماد نترات الجير ونترات الصودا .

يوزن حوالي ١٠ جم بالضبط من السماد في زجاجة وزن ذات غطاء سبق وزنها تنقل كميا إلى بورق عيارى سعة ٥٠٠ ملليتر وترج جيدا حتى يتم نوبانه وتكميل للعلامة بالماء المقطر -
ترج حتى يتجانس محلول - يؤخذن بورق التقطر ٥٠ ملليمتر من محلول ويضاف إليها ٢٠٠ ملليمتر ماء مقطر ثم ٥ جم من سبيكة الديفاردا ثم ٤٠ ملليمتر من محلول الصودا الكاوية ٤٠٪

بحيث تضاف تدريجيا على جدار البورق - يركب البورق بجهاز التقطر الذي ينتهي بزجاجة مخروطية بها ٢٥ ملليمتر من حامض الكبرتيك $\frac{3}{2}$ بالضبط
يترك الجهاز مدة $\frac{1}{2}$ ساعة حتى يهدأ التفاعل الناتج عن اختزال الأزوتات ثم يغلى على لهب ضعيف أولا ثم ترفع الحرارة حتى يتم الحصول على ١٥٠ ملليمتر تقريبا من محلول المقطر .

تعادل الزيادة من الحامض الموجود ببورق الاستقبال بالصودا الكاوية $\frac{3}{2}$ واستعمال دليل أحمر الميثايل .

ومن حجم ايدروكسيد الصوديوم المستعمل في التعادل يمكن معرفة حجم الحامض الذي استنفد في معادلة النشادر المقطر من السماد ومنه تحسب النسبة المئوية للأزوتاني في السماد .

علما بأن ١ ملليمتر من الحامض العياري يعادل ١٤ ، ٥٠ جم أزوت .

(ب) تقدير الأزوت في حالة وجودة على صورة نشادر فقط :
مثل سماد سلفات البوتاسيوم .

يقدر الأزوت النشادرى الذائب في الماء في هذه الأسمدة بنفس الطريقة السابق ذكرها في تقدير الأزوت النتراتى مع عدم اضافة مسحوق سبيكة الديفاردا لبورق التقطر على أن تؤخذ

كميات مناسبة من الحامض $\frac{3}{2}$ بدورق الاستقبال تتناسب مع نسبة الأزوت النشادري بالسماد

(ج) تقدير الأزوت في وجوده على صورتي نترات ونشادر معاً :

مثلاً نترات النشادر الجيري ونترات النشادر ويتراو سلفات النشادر ويقدر الأزوت الكلى الذائب في الماء على هذه الأسمدة بنفس الطريقة السابق ذكرها في تقدير الأزوت التتراتي مع استعمال حجم مناسب من محلول الرائق أو المترشح للتقطير على أن تؤخذ كميات مناسبة من الحامض $\frac{3}{2}$ بدورق الاستقبال تتناسب مع نسبة الأزوت النشادري بالسماد .

(د) تقدير الأزوت في حالة وجوده على صورة أميدية :

مثل سماد البيريا ك ١ (زيد ٢)

يوزن ١ جم من السماد وينتقل إلى زجاجة كذاهل ويضاف إليه ٢٠ ملليمتر من حامض الكبريتيك المركز ٢ جم من مخلوط كبريتات البوتاسيوم وكبريتات النحاس تركب بجهاز الهضم حتى يتم هضم السماد ويتتحول إلى سلفات نشادر ثم يقدر فيه الأزوت كما في سماد سلفات النشادر مع استعمال كمية مناسبة من حامض الكبريتيك $\frac{3}{2}$ حيث أن نسبة الأزوت بالسماد ٤٦٪ .

ثانياً - الأسمدة الفوسفاتية :

(أ) سوبر فوسفات الجير :

تقدير حامض الفوسفوريك الذائب في الماء :

يوزن ٢٠ جم من السماد وينقل إلى زجاجة رج سعة لتر ويضاف إليها ٨٠٠ ملليمتر ماء مقطر وترج لمدة $\frac{1}{2}$ ساعة بجهاز الرج بسرعة ٤٠ - ٣٠ دورة في الدقيقة تكمل الزجاجة إلى العلامة وترج جيداً ثم ترشح - يؤخذ من المترشح ٢٥ ملليمتر فيكزس سعة ٢٥٠ ملليمتر ويضاف إليها ٥ ملليمتر حامض نيتريك مركز .

يسخن على درجة ٩٥° م ثم يضاف إليه ٨٠ ملليمتر من محلول مولبيدات الأمونيوم مع التقليل جيداً ويوضع على حمام مائي على درجة ٩٥° م لمدة $\frac{1}{4}$ ساعة مع تغطية الكأس بزجاجة ساعة ثم يترك ليبرد .

يرشح بطريقة الترويق مع غسل الراسب بحامض نيتريك ١٪ حوالي ٥ مرات يذاب الراسب في نحو ١٠٠ ملليمتر من الأمونيا ٢,٥٪ ويستقبل المذاب في نفس الكأس السابق الترسيب فيها - يضاف ١٥ ملليمتر من مزيج المغنسيا نقطة نقطة مع التقليل المستمر حتى يتم ترسيب الفسفور على صورة فوسفات الأمونيوم والمغنسيوم ويترك لثاني يوم - يرشح الراسب ويغسل بمحلول الأمونيا ٢,٥٪ بعد نقله كمياً الورقة الترشيح حتى يصبح الترشح

كميات مناسبة من الحامض $\frac{3}{2}$ بدوره الاستقبال تناسب مع نسبة الأزوت النشادرى

(ج) تقدير الأزوت في وجوده على صورته تراث ونشادر معاً :
مثل تراث النشادر الجيري وتراث النشادر وتراث سلفات النشادر ويقدر الأزوت الكلى
الذائب في الماء على هذه الاصمدة بنفس الطريقة السابقة ذكرها في تقدير الأزوت النتراتى
مع استعمال حجم مناسب من محلول الرائق او المترشح التقطير على أن تخذ كعبات
 المناسبة من الحامض $\frac{1}{2}$ ببوري الاستقبال تناسب مع نسبة الأزوت النشادرى بالسماد .

(د) تقدير الأزوت في حالة وجود على صورة أمبية :

مثل سعاد اليودي (أ) (رتبة ١) يعنى ١ جم من السعاد وينتقل الى زجاجة كلامل ويضاف اليه ٢٠ ميليلتر من حامض الكبريتيك المركب و ٢ جم من مخلوط كبريتات البوتاسيوم وكبريتات النحاس ترتكب بجهاز الهضم حتى يتم هضم السعاد وينتقل الى سلفات نشادر ثم يقدر فيه الازوت كما في سعاد سلفات النشادر مع استعمال كمية مناسبة من حامض الكبريتيك (٣) حيث ان نسبة الازوت بالسعاد ٤٦٪.

(١) سید بنیانوں الجبر:

गांडे तालि। नियमित। लाग्ने ५।

مقدار وترجع لمدة $\frac{1}{2}$ ساعة بجهاز الرفع بسرعة ٣٠، تدور في الدقيقة تكمل الزجاجة إلى
النهاية وترجع جديداً ثم ترشنع - يؤخذ من المترشع ٥٠ ملليغرام فيكتوكس سعة ٥٠ ملليغرام

التقليل جيداً يوضع على حمام مائي على درجة ٣٠° م لعدة ساعتين مع تغطية الكأس

بنجاجة ساعة ثم يترك ليبرد .

يرش بطريقة الترويق مع غسل الراسب بحامض تترك ١٪ حوالي ٥ مرات يذاب الراسب في نحو ١٠٠٠ مليметр من الأمونيا ٥٪ ويسقبل المذاب في نفس الكأس السابقة الترسيب فيها - يضاف ٥٠ مليметр من مزيج المغسليا نقطة نقطة مع التقليب المستمر حتى يتم ترسيب الفسفود على صودة فوسفات الأمونيوم والمغسيوم ويترك لثاني يوم - يرش الراسب ويغسل بمحلول الأمونيا ٥٪ بعد نقله كميا اليورقة الترشيع حتى يصبح الترشيع

من الغسيل خاليا من آثار الكلوريد (يستعمل للتتأكد من خلوها من الكلوريدات محلول نترات مع حامض نتريك مخفف) .

يجف الراسب ويحرق أولاً بلهب خفيف ثم على درجة ٨٠٠ - ٩٠٠ م تقريراً حتى ثبوت الوزن - يبرد الراسب في مجف ثم يوزن على صورة بيروفسفات المغنيسيوم مع ٢ فو ٧١٢ ولحساب وزن الراسب على صورة حمض فوسفوريك فو ١٢٥ يضرب وزن الراسب × ٦٣٨ ، ومنه تحسب النسبة المئوية لحمض الفوسفوريك القابل للذوبان في الماء على صورة فو ١٢٥ في السماد .

(ب) سعاد خبث الحديد :

(توماس فوسفات) :

تقدير حمض الفوسفوريك الذائب في حمض الستريك ٢٪ .

يوزن ٥ جم من السماد وتوضع في زجاجة رج سعة ٥٠٠ ملليمتر ويضاف إليها ٥ ملليمتر من الكحول لمنع تعجن السماد وسهولة اختلاطه بحمض الستريك ويضاف محلول حامض الستريك ٢٪ على دفعات مع التقليب حتى العلامة - تغلف الزجاجة جيداً وتثبت بجهاز الرج حيث ترج لمدة ١/٢ ساعة بمعدل ٤٠-٣٠ دورات في الدقيقة يرشح ويؤخذ من المترشح الرائق ٥ ملليمتر في كأس سعة ٢٥٠ ملليمتر ويضاف ٨٠ ملليمتر من محلول مولادات الأمونيوم وتوضع على الحمام المائي على درجة ٦٥ م لمنتهى ١/٤ ساعة ويكملا التقدير بعد ذلك كما في السوبر فوسفات وتحسب النسبة المئوية لحمض الفوسفوريك القابل للذوبان في حمض الستريك ٢٪ على صورة فو ١٢٥ في السماد .

(ج) تقدير حمض الفوسفوريك الكلى :

يوزن ٥ جم من العينة وتوضع في بورق مخروطي سعة ٢٥٠ ملليمتر ويضاف إليه ٤٠ ملليمتر من حامض الكلوريديك ، ٥ ملليمتر من حامض النتريك - يسخن على نار هادئة لمدة ١/٢ ساعة أخرى .

ينقل إلى بورق عياري سعة ٢٥٠ ملليمتر باستعمال الماء الساخن ويكملا للعلامة بعد أن يبرد .

يرشح ويؤخذ من المترشح ٢٥ ملليمتر في كأس وتبخر للجفاف من آثار الحامض ثم يذاب في ٢٥ ملليمتر من الماء ويضاف إليه ١٠ ملليمتر من حامض النتريك ويُسخن لدرجة ٦٥ م ويضاف إليه من ٨٠ - ١٠٠ ملليمتر من محلول مولادات الأمونيوم وتكملا الطريقة كما سبق ذكره في حمض الفوسفوريك الذائب في حمض الستريك ٢٪ في خبث الحديد .

ثالثاً - الاسعدة البوتاسيية :

(أ) سلفات البوتاسيوم :

يوزن ٥ جم من السماد في بورق عيارى ٥٠٠ ملليمتر وتغلى مع ٣٠٠ ملليمتر من الماء و٢٠ ملليمتر من حامض الكلوريديك المركز - يضاف محلول كلوريد الباريوم ١٠٪ نقطة نقطة باستعمال السحاحة مع الرج باستمرار الى محلول بعد تسخينة للفليان حتى يرسب كل الكبريتات دون زيادة ثم يضاف أقل كمية ممكنة من حامض الكبريتيك المخفف جداً بواسطة الماصة مع الرج للتخلص من الزيادة الطفيفة من الباريوم .

يبرد البورق ويكمel للعلامة - يرشح ويؤخذ من الترشيح ٢٥ ملليمتر في طبق زجاجي ويبيخر قرب الجفاف ثم يضاف بعض نقاط من حامض الكلوريديك المخفف ١٥ ملليمتر من حامض بيروكلوريك ٢٠٪ وتقلب جيداً ثم توضع على حمام مائي لتركيز محلول ثم يوضع على نار هادئة (لهب الأرجون) ويقلب باستمرار حتى تبدأ الأبخرة البيضاء والكتيفة في التصاعد - يترك ليبرد ويضاف اليه ١٠ ملليمتر من الكحول المطلق وتقلب جيداً مع تكسير الراسب بمحرك زجاجي يرشح في بودقة جوتش بها طبقة سميكة من الاستبس ومفسوطة جيداً بالكحول سبق وزتها بعد تجفيفها على درجة ١٢٠° م على أن يرشح الرانق أولاً ثم ينقل الراسب إلى البوقة ويفسّل عدة مرات بالكحول المطلق - تجفف على درجة ١٢٠° م وتبرد وتوزن والفرق بين الوزنتين هو وزن بيروكلورات البوتاسيوم في الحجم المستعمل ويضرب في ٤٠ . ينتج أكسيد البوتاسيوم ومنه تحسب النسبة المئوية لأكسيد البوتاسيوم في السماد .

(ب) كلوريد البوتاسيوم :

يوزن ٥ جم من السماد في بورق عيارى سعة ٥٠٠ ملليمتر ويذاب السماد في الماء ويكمel للعلامة - يرشح اذا لزم الأمر - يؤخذ ٢٥ ملليمتر من المترشح فيطبق زجاجي ويبيخر الى قرب الجفاف ثم يضاف بعض نقط من حامض الكلوريديك المخفف + ١٥ ملليمتر من حامض البيروكلوريك ٢٠٪ ويكمel بنفس الطريقة المذكورة سابقاً في سلفات البوتاسيوم .

رابعاً - الجبس الرذاعي

(أ) تقدير الكبريتات :

يوزن ٥ جم من العينة في زجاجة مخروطية سعة ٥٠٠ ملليمتر ويضاف إليها ملليمتر حامض كلوريديك مخفف ١ : ١ وتغطى بكرة زجاجية وتغلى على نار هادئة لمدة ١/٢ ساعة . ويضاف إليها ١٠٠ ملليمتر ماء ساخن وتترك لتتبلق ساعة أخرى حتى ينوب الجبس جمعية يبرد وينقل كمياً إلى بورق عيارى سعة ٥٠٠ ملليمتر وتكمel للعلامة بعد أن يبرد - يرشح ويؤخذ من المترشح ٢٥ ملليمتر في كأسوتتحف بالماضم يسخن وترسب الكبريتات باضافة

٢٥ ملليمتر من محلول ١٠٪ من كلوريد الباريوم الساخن نقطة نقطة مع التقليب المستمر ثم يغلى على نار هادئة ١/٤ ساعة يرشح في اليوم التالي ويغسل بالماء الساخن حتى يتم التخلص من آثار الكلوريد - تحرق ورقة الترشيح مع الراسب في بودقة من البلاتين سبق تثبيت وزنها وفرق الوزنين هو وزن سلفات الباريوم يضرب وزن الراسب × ٧٣٧٥ ، . تنتج كمية كبريتات الكالسيوم الايدراتية (كا كب ٤٠٢ يد ١٢) في الحجم المستعمل ومنه تحسب النسبة المئوية للجبس في العينة .

(ب) تقدير الكالسيوم :

يؤخذ ٢ ملليمتر من محلول السابق تحضيره في كأس ويضاف إليه ١٠ ملليمتر من محلول ١٠٪ من كلوريد الأمونيوم ثم نقطتين من دليل ميثايل أورنج يغلى محلول ويضاف إليه ٢،٥ ملليمتر من محلول مشبع من اكسالات الأمونيوم نقطة نقطة مع التقليب ثم محلول ايذروكسيد الأمونيوم باحتراس حتى يتعادل ويصبح قلوي خفيف - يغلى ٥ دقائق مع تنطية الكأس ثم يترك لثاني يوم حيث يرشح ويغسل الراسب ^{ببما} بماء مقطر وساخن حتى يتخلص من الكلوريد - تتبقي ورقة الترشيح بعد وضع نفس الكأس السابق الترسيب فيه أسفل قمع الترشيح حيث يتم نقل الراسب للكأس مع غسل ورقة الترشيح جيداً بحامض كبريتيك ١:٤:٤:٤ ساخن . يسخن حتى بداء الغليان ثم يعدل بمحلول منبرمنجنات البوتاسيوم ثم توضع ورقة الترشيح داخل الكأس وتقلب جيداً ويعاد التنظيف بالبرمنجنات اذا احتاج الأمر حتى يظهرلون بنفسجي خفيف لا يزول - بالتقليب - يقدر الكالسيوم بضرب بضربي رقم التعادل × ٠٠٢ . ومنه تحسب النسبة المئوية ويجب أن تغطي كمية الكالسيوم الموجودة كمية الكبريتات الموجودة بالجبس .

(ج) تقدير كلوريد الصوديوم :

يوزن ٥ جم من العينة ويضاف إليها ١٠٠ ملليمتر ماء مقطر وترج جيداً ثم يقدر فيها الكلوريد باستعمال محلول عياري من نترات الفضة مع استعمال كرومات البوتاسيوم كدليل

(د) تقدير النعومة :

تقدر النعومة في الجبس بوزن العينة كلها ثم امرارها من منخل سعة ثقوبه ٢ مم ٢ ثم منخل سعة ثقبه ١ مم ٢ وتقدر منها النسبة المئوية للنعومة بالنسبة لما يمر من كلا المنخلين من الجبس .

(هـ) تقدير العناصر الصغرى :

يتم تقدير العناصر الصغرى بأحدى الطرق المعتمدة .

جدول بالتجاوزات المسموح بها في التحليل

التجاوز	السماد
٠٠,٥٪ آنوف	نترات الجير
٠٠,٣٪ آنوف	نترات الصودا
٠٠,٣٪ آنوف	سلفات النشادر
٠٠,٧٥٪ آنوف	نترات النشادر
٠٠,٧٥٪ آنوف	نترات النشادر الجيري
٠٠,٧٥٪ آنوف	نترو سلفات النشادر
١٪ آنوف	اليوريا
١٢٪ فو٢	سوبر فوسفات الجبس العادي
١٪ فو١٥	سوبر فوسفات الجير العادي
٥٪ فو٢٥	خبث الحديد
٥٪ بو٢٥	سلفات البوتاسيوم
٥٪ بو٢٥	كلوروبوتاسيوم
٠٠,٥٪ آنوف (إذا كانت نسبته لا تزيد عن ٪٢٠)	
٠٠,٧٥٪ آنوف (إذا كانت نسبته لا تزيد عن ٪٢٠)	
٠٠,٥٪ فو٢٥ (إذا كانت نسبته في السماد لا تزيد عن ١٥٪)	الأسمندة المركبة
٠٠,٧٥٪ فو٢٥ (إذا كانت نسبته في السماد لا تزيد عن ١٥٪)	والأسمندة المخلوطة
٥٪ بو٢٥ (إذا كانت نسبته في السماد تزيد عن ٤٠٪)	وأسمندة الرش
±٢٪ كبريتات كالسيوم وعلى ألا تزيد كلوريد الصوديوم عن ٪٣ ±٠,٣	الجبس الزداعى (لا يقل عن ٪٧٥ كبريتات كالسيوم ايدراتيه)

ملحق رقم (٣)

جدول فئات المصاريف الخاصة بالتحليل

(١) الأسمدة العضوية والبلدية :

جنيه

* تقدير الرطوبة ٥ * فقد بالحريق (مادة عضوية) ٥

١٥ * أزوت كلى ١٥

٥ * الكثافة الظاهرية ٥

٥ * كلوريد الصوديوم ٥

(٢) الأسمدة الكيماوية :

(١) الأسمدة الازوتية :

- تقدير الأزوت الذائب الكلى ١٥

١٠ - تقدير الأزوت النشادرى ١٠

١٥ - تقدير الأزوت التتراتى ١٥

١٠ - تقدير الصفات الطبيعية ١٠

١٠ - تقدير حامض مفرد ١٠

(٢) الأسمدة الفوسفاتية :

٥ - تقدير الرطوبة ٥

١٥ - حمض الفوسفوريك الذائب فو ١٢ ١٥

١٥ - حمض الفوسفوريك الذائب في حامض الستريك فو ١٢ ١٥

١٥ - حمض الفوسفوريك الكلى ١٥

(٢) الأسمدة البوتاسية :

١٥ - تقدير البوتاسا الذائبة بو ١٢ ١٥

١٠ - تقدير الكبريتات ١٠

١٠ - تقدير الكلوريدات ١٠

(٢) الأسمدة الورقية :

١٥ - تقدير عنصر ما ١٥

١٠ - تقدير الكثافة ١٠

٢٥ - تقدير المادة المخلية ٢٥