

ACUERDO N° 842

San Salvador, 20 de septiembre de 2010

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

Vista la solicitud presentada por el Ingeniero **CARLOS ROBERTO OCHOA CORDOVA**, Director Ejecutivo del **CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONACYT**, relativa a que se apruebe la **NORMA SALVADOREÑA OBLIGATORIA, "PRODUCTOS PESQUEROS. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA FRESCURA DE PRODUCTOS DE LA PESCA"**, NSO 67.32.06:09; Y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Directiva de la citada Institución, ha adoptado la Norma antes relacionada, mediante el Punto Número SIETE, literal "B" del Acta Número SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS, de la Sesión celebrada el siete de julio del año dos mil diez.

POR TANTO:

De conformidad al Artículo 36 Inciso Tercero de la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,

ACUERDA:

- 1) **APRUEBASE** la **NORMA SALVADOREÑA OBLIGATORIA, "PRODUCTOS PESQUEROS. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA FRESCURA DE PRODUCTOS DE LA PESCA"**, NSO 67.32.06:09 de acuerdo a los siguientes términos:

**NORMA
SALVADOREÑA**



NSO 67.32.06:09

PRODUCTOS PESQUEROS.

**EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA FRESCURA DE
PRODUCTOS DE LA PESCA.**

CORRESPONDENCIA: Esta norma no tiene correspondencia con ninguna norma internacional.

ICS 67.120.30

Editada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Colonia Médica, Avenida Dr. Emilio Álvarez, Rodríguez Pacas, y Pasaje Dr. Guillermo Rodríguez Pacas # 51, San Salvador, El Salvador, Centro América. Tel: 2226 2800, 225 6222; Fax. 225 6255; e-mail: infoq@conacyt.gob.sv.

Derechos reservados

INFORME

Los Comités Técnicos de Normalización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, son los organismos encargados de realizar el estudio de las normas. Están integrados por representantes de la Empresa Privada, Gobierno, Organismos de Protección al Consumidor y Académico Universitario.

Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por los Comités se someten a un período de consulta pública durante el cual puede formular observaciones cualquier persona.

El estudio elaborado fue aprobado por el Comité Técnico N° 32. COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS como NSO 67.32.06:09 PRODUCTOS PESQUEROS EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA FRESCURA DE PRODUCTOS DE LA PESCA.

La oficialización conlleva la ratificación por Junta Directiva y el Acuerdo Ejecutivo del Ministerio de Economía.

Esta norma está sujeta a permanente revisión con el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la técnica moderna. Las solicitudes fundadas para su revisión merecerán la mayor atención del Organismo del Consejo: Departamento de Normalización, Metrología y Certificación de la Calidad.

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL COMITÉ 32

Luis Enrique Parada	Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal.
Luis Ernesto Blanco	DIA-UCP-MAG
Ever Ivan Reyes	DIA-DGSVA-MAG
Salvador Siu	CENDEPESCA-MAG
Zobeyda Valencia de Toledo	PESQUERA DE SUR S.A de C.V.
Gloria A. Montoya	CALVO CONSERVAS EL SALVADOR S.A.
Claudia Reyes de López	Defensoría del Consumidor
Saúl Ovidio González	Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador
Ricardo Harrison Parker	CONACYT

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

1. OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer las evaluaciones organolépticas en la categoría de fresca de los productos de la pesca.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma aplica a todos los productos de la pesca que se comercialicen, importen, exporten y donaciones hechas al país.

Nota 1: Los exportadores de productos de la pesca deberán cumplir con los requerimientos especificados en la legislación del país de destino.

3. DEFINICIONES

3.1 Comercialización: la primera puesta a la venta de un producto de la pesca con destino al consumo humano.

3.2 Lote: cierta cantidad de productos de una misma especie, que haya sido objeto del mismo tratamiento y que puedan proceder de la misma zona de pesca y del mismo buque.

3.3 Modo de presentación: la forma en que se comercializa el producto de la pesca.

3.4 Parásito visible: un parásito o grupo de parásitos que por sus dimensiones, color o textura se distingue claramente en los tejidos del pescado y que puede ser visto sin medios ópticos de aumento en condiciones de iluminación adecuadas para la visión humana.

3.5 Zona de pesca: denominación utilizada para profesionales de la pesca, del lugar que se efectúan las capturas.

4. CATEGORÍAS DE FRESCA

4.1 Las categorías de fresca de los productos y de determinados requisitos adicionales en el Anexo "A" serán determinados en cada lote previamente identificado de acuerdo a la legislación vigente.

4.2 La categoría de fresca será definida mediante los parámetros de clasificación específicos por tipos de productos que figuran en el Anexo "A".

4.3 Sobre la base de los parámetros contemplados en el Anexo "A" se clasificarán en uno de las siguientes categorías de fresca:

Extra, A ó B para pescados, elasmobranchios, crustáceos y cefalópodos.

NORMA SALVADOREÑA**NSO 67.32.06:09**

4.4 Los pescados, elasmobranquios, crustáceos y cefalópodos de la categoría de fresca "Extra" deberán estar desprovistos de señales de presión o desolladuras, manchas o decoloración.

4.5 Los pescados, elasmobranquios, crustáceos y cefalópodos de la categoría de fresca "A" deberán estar desprovistos de manchas y decoloraciones. Se tolerará una cantidad mínima que presente ligeras señales de presión y desolladuras superficiales.

4.6 Los pescados, elasmobranquios, crustáceos y cefalópodos de la categoría de fresca "B" se tolerará una pequeña cantidad que presente señales de presión y desolladuras superficiales más significativos. El pescado deberá estar desprovisto de manchas y decoloraciones.

4.7 Para la clasificación de los productos en las distintas categorías de fresca, sin perjuicio de la normativa aplicable en materia sanitaria, se tomará también en consideración la presencia de parásitos visibles y su posible influencia negativa en la calidad del producto, habida cuenta de su naturaleza y de su presentación.

5. APENDICE**5.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Reglamento de la Comunidad Europea (CE-No. 2406/96).

Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros. Primera Edición. OMS-FAO 2009.

6. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN

La vigilancia y verificación de esta norma corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la División de Inocuidad de Alimentos.

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

ANEXO NORMATIVO "A"
LISTA DE PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN DE FRESCURA

Los parámetros de este anexo serán aplicables a los siguientes productos o grupos de productos, en función de criterios de evaluación específicos. ESTOS GRUPOS DE PRODUCTOS PUEDEN VERSE EN EL ANEXO "B"

- A. Pescado blanco o pescado magro
- B. Pescado azul o pescado graso
- C. Elasmobranquios
- D. Crustáceos
- E. Cefalópodos

A. PESCADO BLANCO O PESCADO MAGRO

Criterios				
Categorías de frescura				
	Extra	A	B	No admitidos
Piel	Pigmento vivo y tornasolado (excepto gallineta) u opalescente; sin decoloración	Pigmentación viva pero sin brillo	Pigmentación en fase de decoloración y apagada	Pigmentación apagada
Mucosidad cutánea	Acuosa, transparente	Ligeramente turbia	Lechosa	Gris amarillenta, opaca
Ojo	Convexo (abombado); pupila negra y brillante	Convexo, ligeramente hundido; pupila negra apagada; córnea ligeramente opalescente	Plano; córnea opalescente; pupila opaca	Cóncavo en el centro, pupila gris; córnea lechosa
Branquias	Color rojo vivo y sin mucosidad	Menos coloreadas, mucosidad transparente	Color marrón/gris; decolorándose; mucosidad opaca y espesa	Amarillentas; mucosidad lechosa
Peritoneo (en el pescado eviscerado)	Liso; brillante; difícil de separar de la carne	Un poco apagado; puede separarse de la carne	Grumoso, fácil de separar de la carne	No adherente
Olor de las branquia y de la cavidad abdominal- pescado blanco excepto platija o acedia	Algas marinas a aceite fresco; a pimienta; olor a tierra	Ausencia de olor a algas, olor neutro a aceite; a algas marinas o ligeramente dulzón	Fermentado; ligeramente agrio; a aceite fermentado; mohoso, un poco rancio	Agrio

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

Carne	Firme y elástica; superficie lisa	Menos elástica	Ligeramente blanda (flácida), menos elástica; superficie cerosa aterciopelada opaca	Blanda (flácida); las escamas se desprenden fácilmente de la piel, superficie algo arrugada
-------	-----------------------------------	----------------	---	---

Criterios adicionales para el rape descabezado

Vasos sanguíneos (músculos ventrales)	Claramente definido de color rojo vivo	Claramente definido color más oscuro de la sangre	Difuminados de color marrón	Totalmente difuminados, de color marrón. Carne amarillenta
---------------------------------------	--	---	-----------------------------	--

B. PESCADO AZUL O PESCADO GRASO

Criterios				
Categorías de frescura				
	Extra	A	B	No admitidos
Piel	Pigmentación tornasolada, colores vivos y brillantes con irisaciones; clara diferencia entre superficie dorsal y ventral	Pérdida de resplandor y de brillo; colores más apagados; menor diferencia entre superficie dorsal y ventral	Apagada, sin brillo, colores diluidos; piel doblada cuando se curva el pez	Pigmentación muy apagada; la piel se desprende de la carne
Mucosidad cutánea	Acuosa, transparente	Ligeramente turbia	Lechosa	Mucosidad gris amarillento, opaca
Consistencia de la carne	Muy firme, rígida	Bastante rígida, firme	Un poco blanda	Blanda (flácida)
Opérculos	Plateados	Plateados, ligeramente teñidos de rojo o marrón	Parduscos y con extravasaciones sanguíneas amplias	Amarillentos
Ojo	Convexo abombado; pupila azul negrusca brillante, párpado transparente	Convexo y ligeramente hundido; pupila oscura; córnea ligeramente opalescente	Plano; pupila borrosa; extravasaciones sanguíneas alrededor del ojo	Cóncavo en el centro, pupila gris; córnea lechosa
Branquias	Color rojo vivo a púrpura uniforme; sin mucosidad	Color menos vivo, más pálido, en los bordes; mucosidad transparente	Engrosándose y decolorándose; mucosidad opaca	Amarillentas; mucosidad lechosa

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

Olor de las branquias	Fresco a algas marinas; picante; a yodo	Ausencia de olor a algas; olor neutro	Olor graso un poco a sulfuroso, a tocino rancio o fruta descompuesta	Agrio descompuesto
-----------------------	---	---------------------------------------	--	--------------------

C. ELASMOBRANQUIOS

C-1 Tiburones

Criterios				
Categorías de frescura				
	Extra	A	B	No admitidos
Ojo	Convexo, muy brillante e irisado; pupilas pequeñas	Convexo, ligeramente hundido; pérdida de brillo e irisación, pupilas ovaladas	Plano, sin brillo	Cóncavo amarillento
Aspecto	Con rigor mortis o parcialmente rígido; presencia de poco de mucosidad clara sobre la piel	Pasada la fase de rigor mortis; ausencia de mucosidad sobre la piel y especialmente en la boca y en las aperturas branquiales	Algo de mucosidad en la boca y en las aperturas branquiales; mandíbulas ligeramente aplanadas	Mucosidad abundante en la boca y en las aperturas branquiales
Olor	Olor a algas	Sin olor o con un ligero olor pasado, pero no amoniacal	Leve olor amoniacal; acidez	Olor amoniacal penetrante

C-2 Rayas

Criterios				
Categorías de frescura				
	Extra	A	B	No admitidos
Piel	Pigmentación viva, irisada y brillante, mucosidad acuosa	Pigmentación viva, mucosidad acuosa	Pigmentación que va tornándose decolorada y sin brillo, mucosidad opaca	Decoloración, piel arrugada, mucosidad espesa.
Consistencia de la carne	Firme y elástica	Firme	Blanda	Flácida
Aspecto	Borde de las aletas traslúcido y curvo	Aletas rígidas	Blando	Flácido

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

Ventre	Blando brillante con un borde malva alrededor de las aletas	Blanco y brillante con manchas rojas únicamente alrededor de las aletas	Blancas y sin brillo con numerosas manchas rojas o amarillas	Amarillo a verdoso, manchas rojas en la propia carne
--------	---	---	--	--

D. CRUSTÁCEOS

D-1 Cangrejos

Criterios				
Categorías de frescura				
	Extra	A	B	No admitido
Ojos	Brillantes con reflejos (cuando aplique)	Negros brillantes	Negros turgentes	Decolorado
Musculatura	No aplica	Con firmeza característica	Blanda	Muy blanda
Olor ¹⁾	Característico, fresco a mar	Olor a crustáceo suave	Olor a crustáceo fuerte	Rancio a descomposición con olor amoniacal
Sabor ¹⁾	Sabor dulce, agradable a marisco fresco	Sabor normal, específico a marisco	Sabor alterado, perdura en el paladar, en algunos casos amargo	Sabor desagradable, descompuesto, amargo
Carne (en la cola)	Brillante, con pigmentación natural, transparencia característica	Carne brillante, conserva su pigmento natural	Carne opaca y sin brillo	Carne opaca

¹⁾ La apariencia, el olor y sabor de las especies utilizadas deben ser indicadores de la frescura del producto en su captura y procesamiento. No debe haber olores ni sabores no característicos.

D-2 Quisquillas (Ejemplo: camarones y gambas)

Criterios		
Categorías de frescura		
	Extra	A
Características mínimas	Superficie del caparazón húmeda y reluciente. En caso de transvase, las quisquillas deben caer separadas. Carne sin olores extraños. Libres de arena, moco u otras materias extrañas	Igual para la categoría Extra

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

Aspecto:		
1) Quisquilla con caparazón	Color definido rosa-rojo, con pequeñas motas blancas; parte pectoral del caparazón predominantemente clara	Color que varía desde rosa-rojo azulado con motas blancas; parte pectoral del caparazón debe ser de color claro algo grisáceo
2) Camarón boreal	Color rosado uniforme	Color rosado pero con un posible principio de ennegrecimiento de la cabeza
Estado de la carne durante y después del descascarillado	Se descascarilla fácilmente, sólo con pérdidas de carne técnicamente inevitables. Firme, pero no correosa	Se descascarilla menos fácilmente con pequeñas pérdidas de carne. Menos firme ligeramente correosa.
Fragmentos	Se admiten fragmentos aislados de quisquillas	Se admite una pequeña cantidad de fragmentos de quisquillas.
Olor	Olor a algas frescas, ligeramente dulzón	Acidulado; ausencia de olor a algas

D-3 Cigalas (Ejemplo: langostinos)

Criterios			
Categorías de frescura			
	Extra	A	B
Caparazón	Color rosado pálido o rosa a rojo anaranjado	Color rosa pálido o de rosa a rojo anaranjado; sin mancha negra	Ligeramente descolorido; ligera mancha negra y color tirando a gris, especialmente sobre el caparazón y entre los segmentos de la cola.
Ojo y branquias	Ojo negro brillante; branquias de color rosa	Ojo sin brillo de color negro grisáceo; branquias tirando a gris.	Branquias de color gris oscuro, o color verde en la superficie dorsal del caparazón

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

Olor	Característico de los crustáceos suaves	Pérdida del color característico de los crustáceos; sin olor a amoníaco	Ligeramente agrio
Carne (en la cola)	Carne transparente, de color azul tirando a blanco	La carne pierde su transparencia pero no descolorida	Carne opaca sin brillo

E. CEFALÓPODOS (Ejemplo: calamares)

Criterios			
Categorías de frescura			
	Extra	A	B
Piel	Pigmentación viva, piel adherente a la carne	Pigmentación apagada; piel adherente a la carne	Piel decolorada; se separa con bastante facilidad de la carne
Carne	Muy firme; color blanco nacarado	Firme; color blanco de cal	Ligeramente blanda; color blanco rosado o ligeramente amarillenta
Tentáculos	Resistente al arranque	Resistente al arranque	Se arranca con más facilidad
Olor	Fresco, a algas marinas	Escaso o nulo	Olor a tinta

ANEXO NORMATIVO "B"
ESPECIES DE PESCADO

PESCADO BLANCO (Pescado magro) Contiene menos del 2 % de grasa en el tejido orgánico.

Eglefino, Bacalao, Carbonero, Abadejo, Gallineta Nórdica, Merlán, Maruca, Merluza, Japuta, Rape, Faneca y Capellán, Boga, Caramel, Congrio, Rubio, Lisa, Sollas, Gallo, Lenguado, Limanda, Mendo Limón, Platija, Peces cinto, Escorpión, Bagre, Agujones, Cabrilla, Mero, Sapo, Corvina, Macabi, Sábalo, Merlusa, Mojarra, Ojotón, Pámpano, Pargo, Dorado, Pez Puerco, Róbalo, Roncador, Anguilas, Burritas, Lora, Perico, Mariposa, Chopas, Sardinas.

Grupo	Nombre común	Nombre científico	Familia
Peces varios	Solla	<i>Pleuronectes plateas</i>	<i>Pleuronectidae</i>
	Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<i>Gadidae</i>
	Bacalao de la especie <i>Gadus morhua</i>	<i>Gadus morhua</i>	<i>Gadidae</i>
	Carbonero	<i>Pollachius virens</i>	<i>Gadidae</i>
	Abadejo	<i>Pollachius pollachius</i>	<i>Gadidae</i>
	Gallineta nórdica	<i>Sebastes spp.</i>	<i>Escorperidae</i>
	Merlán	<i>Merlangius merlangus</i>	<i>Gadidae</i>
	Maruca	<i>Molva spp.</i>	<i>Gadidae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

	Merluza	<i>Merluccius</i>	<i>Merlucciidae</i>
	Japuta	<i>Brama spp.</i>	<i>Bramidae</i>
	Solla	<i>Pleuronectes plateas</i>	<i>Pleuronectidae</i>
	Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<i>Gadidae</i>
	Carbonero	<i>Pollachius virens</i>	<i>Gadidae</i>
	Abadejo	<i>Pollachius pollachius</i>	<i>Gadidae</i>
	Gallineta nórdica	<i>Sebastes spp.</i>	<i>Gadidae</i>
	Merlán	<i>Merlangius merlangus</i>	<i>Gadidae</i>
	Maruca	<i>Molva spp.</i>	<i>Gadidae</i>
	Japuta	<i>Brama spp.</i>	<i>Gadidae</i>
	Capellán	<i>Trisopterus minutus</i>	<i>Gadidae</i>
	Boga	<i>Boops boops</i>	<i>Esperidae</i>
	Rape	<i>Lophius spp.</i>	<i>Lophiidae</i>
	Faneca	<i>Trisopterus luscus</i>	<i>Gadidae</i>
	Caramel	<i>Maena smarís</i>	<i>Centracanthidae</i>
	Congrio	<i>Conger coger</i>	<i>Congridae</i>
	Rubio	<i>Trigla spp.</i>	<i>Triglidae</i>
	Gallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	<i>Scophthalmidae</i>
	Lisa	<i>Mugi spp.</i>	<i>Mugilidae</i>
	Platija	<i>Platichthys flesus</i>	<i>Pleuronectidae</i>
	Peces cinto	<i>Lepidopus caudatus y Aphanopus carbo</i>	<i>Trichiuridae</i>
	Estornio de la especie Scomber japonicus	<i>Lepidorhombus spp.</i>	<i>Scophthalmidae</i>
	Mendo limón	<i>Microstomus kil)</i>	<i>Pleuronectidae</i>
Escorpión	Escorpión	<i>Pontinus dubius</i>	<i>Scorpaenidae</i>
	Escorpión	<i>Pontinus sierra</i>	<i>Scorpaenidae</i>
	Escorpión	<i>Prionotus horrens</i>	<i>Frigilidae</i>
	Escorpión	<i>Prionotus quiescens</i>	<i>Frigilidae</i>
	Escorpión	<i>Prionotus ruscarius</i>	<i>Frigilidae</i>
	Escorpión	<i>Prionotus sp.</i>	<i>Frigilidae</i>
	Escorpión	<i>Prionotus stephanophys</i>	<i>Triglidae</i>
	Escorpión	<i>Prionotus synnosteus</i>	<i>Triglidae</i>
	Escorpión	<i>Scorpaena histrio</i>	<i>Scorpaenidae</i>
Bagre	Bagre	<i>Arius platypogon</i>	<i>Ariidae</i>
	Bagre	<i>Arius seemanii</i>	<i>Ariidae</i>
	Guichos	<i>Arius troscheli</i>	<i>Ariidae</i>
	Bagre	<i>Bagre panamensis</i>	<i>Ariidae</i>
	Bagre, tacazonte	<i>Bagre pinnimaculatus</i>	<i>Ariidae</i>
	Bagre	<i>Bagre sp</i>	<i>Ariidae</i>
	Guichos	<i>Galeichthys jordani</i>	<i>Ariidae</i>
	Guichos	<i>Galeichthys spp</i>	<i>Aiidae</i>
	Bagre	<i>Galeichthys peruvianus</i>	<i>Ariidae</i>
	Bagre galiciano	<i>Sciades troschely</i>	<i>Aiidae</i>
Agujones	Gorrión, aguja	<i>Belonia spp</i>	<i>Belonidae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

	Gorrion	<i>Hyporhamphus unifasciatus</i>	<i>Hemirhamphidae</i>
	Machorra	<i>Lepisosteus tropicus</i>	<i>Lepisosteidae</i>
	Barracuda	<i>Sphyræna ensis</i>	<i>Sphyrænidae</i>
	Aguja	<i>Strongylura exilis</i>	<i>Belonidae</i>
	Aguja	<i>Strongylura scapularis</i>	<i>Belonidae</i>
	Aguja	<i>Tylosurus acus pacificus</i>	<i>Belonidae</i>
	Aguja	<i>Tylosurus crocodilus fodiator</i>	<i>Belonidae</i>
Cabrilla	Cabrilla rosada, mero	<i>Epinephelus acanthitis</i>	<i>Serranidae</i>
	Mero, cherna, cabrilla	<i>Paralabrax loro</i>	<i>Serranidae</i>
	Cabrilla, mero, cherna	<i>Epinephelus analagus</i>	<i>Serranidae</i>
Mero	Cabrilla gris	<i>Epinephelus itajara</i>	<i>Serranidae</i>
	Cabrilla gris	<i>Epinephelus nigritus</i>	<i>Serranidae</i>
	Mero, cabrilla	<i>Epinephelus niveatus</i>	<i>Serranidae</i>
Sapo	Sapamiche	<i>Bathygobius sp.</i>	<i>Gobiidae</i>
	Sapamiche	<i>Batrachoides boulengeri</i>	<i>Batrachoididae</i>
	Sapamiche	<i>Batrachoides waltersi</i>	<i>Batrachoididae</i>
	Sambo	<i>Dormitator latifrons</i>	<i>Gobiidae</i>
	Pez sapo	<i>Gobiesox daedaleus boreus</i>	<i>Gobiesocidae</i>
	Frayle, luminoso	<i>Porichthys nautopaedium</i>	<i>Batrachoididae</i>
	Sapo, tamboriles	<i>Sphoeroides annulatus</i>	<i>Tetraodontidae</i>
	Tamboriles	<i>Sphoeroides sp.</i>	<i>Tetraodontidae</i>
	Sapos, tamboriles	<i>Sphoeroides tricocephalus</i>	<i>Tetraodontidae</i>
	Sapos	<i>Symphurus leei</i>	<i>Cynoglossidae</i>
	Sapos	<i>Symphurus sp.</i>	<i>Cynoglossidae</i>
Corvina	Corvina blanca	<i>Cynoscion albus</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Pinchada	<i>Cynoscion phocephalus</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Pancha rayada, corvina	<i>Cynoscion reticulatus</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Corvina babosa	<i>Cynoscion squamipinnis</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Corvina babosa, amarilla	<i>Cynoscion stolzmanni</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Pinchada, corvinillas	<i>Larimus spp</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Pancha	<i>Micropogonias altipinnis</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Guabina, pinchada	<i>Nebris occidentalis</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Ratón	<i>Paralichthys dumerlii</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Pinchada	<i>Umbrina xanti</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Corvinilla	<i>Bairdiella chrysopleura</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Corvina	<i>Cynoscion altipinnis</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Corvina	<i>Cynoscion sp.</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Corvina	<i>Isopisthus altipinnis</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Guabina	<i>Larimus acclivis</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Corvina	<i>Larimus argenteus</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Guabina	<i>Larimus effulgens</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Berrugata	<i>Menticirrhus nasus</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Siete ranchos, ratón	<i>Menticirrhus spp</i>	<i>Sciaenidae</i>
	Ratón	<i>Paralichthys petersi</i>	<i>Sciaenidae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

	Corvina	<i>Stellifer ericymba</i>	Sciaenidae
	Corvina	<i>Stellifer furthii</i>	Sciaenidae
	Corvina	<i>Stellifer sp.</i>	Sciaenidae
	Corvina	<i>Stellifer zosterocarus</i>	Sciaenidae
Cabrilla camitillo	Camotillo	<i>Diplectrum euryplectrum</i>	Serranidae
	Camotillo	<i>Diplectrum eutelum</i>	Serranidae
	Camotillo	<i>Diplectrum labarun</i>	Serranidae
	Cabrilla, camotillo	<i>Diplectrum macropoma</i>	Serranidae
	Camotillo	<i>Diplectrum maximus</i>	Serranidae
	Camotillo	<i>Diplectrum pacificum</i>	Serranidae
	Camotillo	<i>Diplectrum sp.</i>	Serranidae
	Mero, cherna, cabrilla	<i>Epinephelus labriformis</i>	Serranidae
	Camotillo	<i>Pronotogrammus multifasciatus</i>	Serranidae
	Camotillo	<i>Serranus huascari</i>	Serranidae
	Garrobos	<i>Synodus evermanni</i>	Synodontidae
	Garrobos	<i>Synodus lacertinus</i>	Synodontidae
Lenguado	Caite	<i>Achirus spp</i>	Bothidae
	Lenguado	<i>Ancylopsisella dendritica</i>	Bothidae
	Caite	<i>Citharichthys gilberti</i>	Bothidae
	Lenguado	<i>Citharichthys stigmaeus</i>	Bothidae
	Lenguado aleta manchada	<i>Cyclopsetta chittendeni</i>	Bothidae
	Lenguado, caite	<i>Cyclopsetta querna</i>	Bothidae
	Caite	<i>Etropus crossotus</i>	Bothidae
	Caite	<i>Monolena maculipinna</i>	Bothidae
	Lenguado	<i>Symphurus elongatus</i>	Bothidae
Lisa	Lisa, lebrancha	<i>Mugil curema</i>	Mugilidae
	Lisa, chimberas, lebrancha	<i>Mugil thuborni</i>	Mugilidae
	Lisa	<i>Mugil cephalus</i>	Mugilidae
Macabí, sabalo	Macabí, sabalo	<i>Albula vulpes</i>	Abulidae
	Mariposa	<i>Elops saurus</i>	Elopidae
	Salmonetes, macabí	<i>Pseudupeneus grandisquamis</i>	Mullidae
Merluza	Merluza	<i>Merluccius angustimanus</i>	Merlucciidae
Mojarra	Mojarra, salpucana, pichinchas	<i>Diapterus aureolus</i>	Gerreidae
	Mojarra, huesuda	<i>Diapterus peruvianus</i>	Gerreidae
	Mojarrita plateada	<i>Eucinostomus argenteus</i>	Gerreidae
		<i>Eucinostomus californiensis</i>	Gerreidae
	Viejita, pijiriche	<i>Eucinostomus currani</i>	Gerreidae
	Viejita, pijiriche	<i>Eucinostomus gracilis</i>	Gerreidae
	Viejita, pijiriche, pichinchas	<i>Eucinostomus spp</i>	Gerreidae
	Viejita, pijiriche	<i>Gerres cinereus</i>	Gerreidae
Ojotón	Chuchas sierra	<i>Selar crumenophthalmus</i>	Crangidae

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

Pámpano	Tilosa, pajarita	<i>Peprilus medius</i>	<i>Stromateidae</i>
	Tilosa, pajarita	<i>Peprilus ovatus</i>	<i>Stromateidae</i>
	Tilosa, pajarita	<i>Peprilus synideri</i>	<i>Stromateidae</i>
	Pámpano rayado, palometa	<i>Trachinotus rhodopus</i>	<i>Carangidae</i>
	Pámpano, palometa	<i>Trachinotus spp</i>	<i>Carangidae</i>
Pargo	Pargo jilguero, manglareño	<i>Lutjanus aratus</i>	<i>Lutjanidae</i>
	Pargo cola amarilla, guacamayo	<i>Lutjanus argentiventris</i>	<i>Lutjanidae</i>
	Pargo rojo	<i>Lutjanus colorado</i>	<i>Lutjanidae</i>
	Pargo lunarejo, de la mancha	<i>Lutjanus guttatus</i>	<i>Lutjanidae</i>
	Pargo	<i>Lutjanus inermis</i>	<i>Lutjanidae</i>
	Pargo dientón	<i>Lutjanus novemfasciatus</i>	<i>Lutjanidae</i>
	Pargo sardo, rayado	<i>Hoplopagrus guntheri</i>	<i>Lutjanidae</i>
	Pargo sardo	<i>Lobotes pacificus</i>	<i>Lobotidae</i>
	Pargo colorado, Guachinango	<i>Lutjanus peru</i>	<i>Lutjanidae</i>
Dorado	Dorado	<i>Coryphaena hippurus</i>	<i>Coryphaenidae</i>
Pez puerco	Unicornio	<i>Alutera monoceros</i>	<i>Monacanthidae</i>
	Pez puerco, tunco	<i>Balistes polylepis</i>	<i>Balistidae</i>
	Tunco	<i>Pseudobalistes naufragium</i>	<i>Balistidae</i>
	Tunco	<i>Sufflamen verres</i>	<i>Balistidae</i>
Robalo	Robalo, robalito	<i>Centropomus armatus</i>	<i>Centropomidae</i>
	Robalo	<i>Centropomus medius</i>	<i>Centropomidae</i>
	Robalo, robalito	<i>Centropomus nigresceus</i>	<i>Centropomidae</i>
	Robalo, robalito	<i>Centropomus pectinatus</i>	<i>Centropomidae</i>
	Robalo, robalito	<i>Centropomus robalito</i>	<i>Centropomidae</i>
	Robalo	<i>Centropomus sp</i>	<i>Centropomidae</i>
	Robalo blanco	<i>Centropomus undecimalis</i>	<i>Centropomidae</i>
			<i>Centropomidae</i>
	Robalo	<i>Centropomus unionensis</i>	
Roncador	Ruco fageado	<i>Anisotremus dovii</i>	<i>Haemulidae</i>
	Roncador, ruco	<i>Anisotremus interruptus</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Roncador	<i>Anisotremus pacific</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Ruco, melón	<i>Anisotremus taeniatus</i>	<i>Haemulidae</i>
	Roncador, ruco	<i>Haemulon maculicanda</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Roncador, ruco	<i>Haemulon sccuden</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Roncador, ruco	<i>Haemulon sp</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Ruco manchado	<i>Orthopristis chalceus</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Ruco manchado	<i>Orthopristis sp</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Ruco, roncador	<i>Pomadasydys panamensis</i>	<i>Pomadasydae</i>
	Ruco	<i>Pomadasydys sp.</i>	<i>Pomadasydae</i>
Sardina	Sardina, arenque	<i>Opisthonema bulleri</i>	<i>Chupeidae</i>
	Sardina, arenque	<i>Opisthonema libertate</i>	<i>Chupeidae</i>
	Sardina, arenque	<i>Opisthonema mediatrastrae</i>	<i>Chupeidae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

	Sardina	<i>Anchoa argentivitata</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina, ilusión	<i>Anchoa exigua</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina, ilusión	<i>Anchoa ischana</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina bocona	<i>Anchoa lucida</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina bocona	<i>Anchoa nasus</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina pequeña (anchoa)	<i>Anchoa spp</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina	<i>Anchoa starkii</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina argentina	<i>Argentina aliciae</i>	<i>argentinidae</i>
	Sardina pequeña	<i>Lile stolifera</i>	<i>Clupeidae</i>
	Sardina jibada	<i>Lysengraulis poeyi</i>	<i>Engraulidae</i>
	Sardina plástica	<i>Neopisthopterus tripicus</i>	<i>Pristigasteridae</i>
	Sardina plástica	<i>Opisthopterus dovii</i>	<i>Pristigasteridae</i>
	Sardina plástica	<i>Opisthopterus equatorialis</i>	<i>Clupeidae</i>
	Sardina plástica	<i>Pliosteostoma lutipinnis</i>	<i>Pristigasteridae</i>
Anguilas	Anguilas, culebras	<i>Conger sp</i>	<i>Congridae</i>
	Culebra	<i>Echidna nocturna</i>	<i>Muraenidae</i>
	Morena	<i>Gymnothorax equatorialis</i>	<i>Muraenidae</i>
	Culebra	<i>Ophichthus zophochir</i>	<i>Ophichthyidae</i>
	Culebra	<i>Paraconger similis</i>	<i>Congridae</i>
	Cintas, sables	<i>Trichiurus nitens</i>	<i>Trichiuridae</i>
Burrita	Burrita	<i>Abudefduf concolor</i>	<i>Pomacentridae</i>
	Burrita	<i>Abudefduf troschellii</i>	<i>Pomacentridae</i>
	Burrita bicolor	<i>Microspathodon bairdii</i>	<i>Pomacentridae</i>
Lora, perico	Navajones	<i>Acanthurus triostegus</i>	<i>Acanthuridae</i>
	Navajones	<i>Acanthurus xanthopterus</i>	<i>Acanthuridae</i>
	Perico	<i>Pseudojulis notospilus</i>	<i>Labridae</i>
	Lora	<i>Scarus perico</i>	<i>Scaridae</i>
	Pichel	<i>Sectator ocyurus</i>	<i>Kyphosidae</i>
	Doncella arco iris	<i>Thalassoma lucasanum</i>	<i>Labridae</i>
Mariposa, chopas	Chopas	<i>Chaetodipterus zonatus</i>	<i>Ephippidae</i>
	Chopas	<i>Parapsettus panamensis</i>	<i>Ephippidae</i>
	Mariposa	<i>Chaetodon humeralis</i>	<i>Chaetodontidae</i>
	Mariposa	<i>Elops saurus</i>	<i>Elopidae</i>

PESCADO AZUL (Pescado Graso) Contiene más del 2 % de grasa en el tejido orgánico.

Atún blanco, Atún rojo, Atún aleta amarilla, Atún listado, Patudo, Bacaladilla, Arenque, Sardina, Caballa, Jurel, Boquerón/Anchoa, Espadín y Espadachín, Barrilete, Bonito, Jurel, Caballo, Chucha, Marlin, Pez Espada y Sierra

Grupo	Nombre común	Nombre científico	Familia
Atún	Atún blanco	<i>Thunnus alalunga</i>	<i>Escombridae</i>
	Atún rojo	<i>Thunnus Thynnus</i>	<i>Escombridae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

	Patudo	<i>thunnus o Parathunnus obesus</i>	<i>Escombridae</i>
	Bacaladillas	<i>Micromesistius poutassou o Gadus poutassou</i>	<i>Gadidae</i>
	Arenque de la especie <i>Clupea harengus</i>	<i>Clupea harengus</i>	<i>Clupeidae</i>
	Sardina de la especie <i>Sardina pilchardus</i>	<i>Sardina pilchardus</i>	<i>Clupeidae</i>
	Caballa de la especie <i>Scomber scombrus</i>	<i>Scomber scombrus</i>	<i>Escombridae</i>
	Jurel	<i>Trachurus spp.</i>	<i>Carangidae</i>
	Boquerón/ Anchoa	<i>Engraulis spp.</i>	<i>Engraulidae</i>
	Atún aleta amarilla, albacora	<i>Thunus albacares</i>	<i>Escombridae</i>
	Ojo grande, patudo	<i>Thunus obesus</i>	<i>Escombridae</i>
Barrilete	Barrilete negro, bonito	<i>Euthynnus lineatus</i>	<i>Escombridae</i>
Bonito	Barrilete blanco	<i>Katsuwonus pelamis</i>	<i>Escombridae</i>
	Botellita, bules	<i>Auxis spp</i>	<i>Escombridae</i>
	Bonito	<i>Auxis thazard</i>	<i>Escombridae</i>
	Atún negro	<i>Euthynnus alletteratus</i>	<i>Escombridae</i>
	Botellita, bules	<i>Euthynnus spp</i>	<i>Escombridae</i>
	Bonito	<i>Sarda chiliensis</i>	<i>Escombridae</i>
	Botellita, bules	<i>Sarda spp</i>	<i>Escombridae</i>
Jurel	Pampano	<i>Carangoides macarellus</i>	<i>Carangidae</i>
	Pampano	<i>Carangoides ortyutar</i>	<i>Carangidae</i>
	Pampano	<i>Carangoides vinctus</i>	<i>Carangidae</i>
	Jurel, caballo	<i>Caranx caballus</i>	<i>Carangidae</i>
	Caballo	<i>Caranx caninus</i>	<i>Carangidae</i>
	Jurel	<i>Caranx hippos</i>	<i>Carangidae</i>
	Jurel pequeño (papelillo)	<i>Chiroscorbrus orqueta</i>	<i>Carangidae</i>
	Pampano	<i>Decapterus macrosoma</i>	<i>Carangidae</i>
	Jurel	<i>Hemicaranx atrimanus</i>	<i>Carangidae</i>
	Pampano	<i>Hemicaranx leuciscus</i>	<i>Carangidae</i>
	Nauhilla, palometa	<i>Hemicaranx spp</i>	<i>Carangidae</i>
	Pampano, palometa	<i>Hemicaranx zelote</i>	<i>Carangidae</i>
	Palometa	<i>Selene oerstedii</i>	<i>Carangidae</i>
	Gallo, palometa	<i>Alectis ciliaris</i>	<i>Carangidae</i>
	Gallo, palometa	<i>Nematistius pectoralis</i>	<i>Nematistidae</i>
Caballo,	Caballo	<i>Selene brevorti</i>	<i>Carangidae</i>
	Caballo	<i>Selene peruvianus</i>	<i>Carangidae</i>
Chucha	Chucha	<i>Decapterus hypodus</i>	<i>Carangidae</i>
	Chuchas sierra	<i>Oligoplites saurus</i>	<i>Carangidae</i>
Marlín	Merlín	<i>Makaira mazara</i>	<i>Istiophoridae</i>
	Vela	<i>Makaira spp</i>	<i>Istiophoridae</i>
	Marlín rosado	<i>Tetrapturus audax</i>	<i>Istiophoridae</i>
	Marlín blanco	<i>Tetrapturus angustirostris</i>	<i>Istiophoridae</i>
Pez espada	Espada	<i>Xiphias gladius</i>	<i>Istiophoridae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

Pez vela	Pez vela	<i>Istiophorus albicans</i>	<i>Istiophoridae</i>
	Vela	<i>Istiophorus platypterus</i>	<i>Istiophoridae</i>
Sierra	Macarela, Sierra	<i>Scomberomorus sierra</i>	<i>Scombridae</i>

ELASMOBRANQUIOS:

Galludo, Atilán/Pintaroja, Raya, Tiburón, Cazón y Tiburón Martillo

Grupo	Nombre común	Nombre científico	Familia
Galludo y Pinta roja	Galludo y Pinta roja	<i>Squalus acanthias</i> y <i>Scyliorhinus spp.</i>	
Cazón	Volador, huisisi	<i>Rhizoprionodon lungurio</i>	<i>Carcharinidae</i>
Tiburón,	Tiburón martillo	<i>Sphyrna corona</i>	<i>Spyrniidae</i>
martillo	Tiburón martillo	<i>Sphyrna media</i>	<i>Spyrniidae</i>
	Tiburón martillo	<i>Sphyrna lewini</i>	<i>Spyrniidae</i>
	Tiburón martillo	<i>Sphyrna mokaran</i>	<i>Spyrniidae</i>
	Tiburón martillo	<i>Sphyrna tiburo</i>	<i>Spyrniidae</i>
	Cornuda, martillo	<i>Sphyrna zygaena</i>	<i>Spyrniidae</i>
Tiburón	Tiburón mono	<i>Alopias superciliosus</i>	<i>Allopiidae</i>
	Tiburón mamón	<i>Mustelus lunulatus</i>	<i>Triakidae</i>
	Tiburón puntas negras	<i>Carcharhinus brevipinna</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón volador	<i>Carcharhinus falciformis</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón ñato, punta zapato	<i>Carcharhinus leucas</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón punta negra	<i>Carcharhinus limbatus</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón oscuro, arenero	<i>Carcharhinus obscurus</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón cazón	<i>Carcharhinus porosus</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón tigre, tintorera	<i>Galeocerdo cuvieri</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón blanco	<i>Prionace glauca</i>	<i>Carcharinidae</i>
	Tiburón mono	<i>Alopias vulpinus</i>	<i>Allopiidae</i>
	Tiburón gata tonta	<i>Gymnlimnodynastes cirratum</i>	<i>Orectolobidae</i>
	Tiburón blanco	<i>Nasolania velox</i>	<i>Carcharinidae</i>
Raya	Raya	<i>Raja spp.</i>	
	Raya, chucho, obispo	<i>Aetobatus narinari</i>	<i>Myliobatidae</i>
	Raya con espinas	<i>Dasyatis brevis</i>	<i>Dasyatidae</i>
	Raya	<i>Dasyatis longus</i>	<i>Dasyatidae</i>
	Raya	<i>Dasyatis sabina</i>	<i>Dasyatidae</i>
	Raya	<i>Dasyatis sp</i>	<i>Dasyatidae</i>
	Raya, mantarraya	<i>Manta hamiltoni</i>	<i>Mobulidae</i>
	Manta	<i>Mobula lucasana</i>	<i>Mobulidae</i>
	Torpedo	<i>Narcine entemedor</i>	<i>Torpedinidae</i>
	Torpedo	<i>Narcine vermiculatus</i>	<i>Torpedinidae</i>
	Raya	<i>Pristis zephyreus</i>	<i>Tristidae</i>
	Guitarra	<i>Torpedo sp</i>	<i>Torpedinidae</i>
	Raya	<i>Urolophus halleri</i>	<i>Urolophidae</i>
	Raya	<i>Urotrygon spp</i>	<i>Urolophidae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

CRUSTÁCEOS:

Quisquilla, Cigala, Buey de mar, Camarón, Cangrejo, Jaiba, Langosta, Langostino)

Grupo	Nombre común	Nombre científico	Familia
Camarón	Camarón cabezón armado	<i>Heterocarpus affinis</i>	<i>Pandalidae</i>
	Camarón cabezón	<i>Heterocarpus vicarius</i>	<i>Pandalidae</i>
	Camarón conchudo	<i>Sicyonia spp</i>	<i>Sicyoniidae</i>
	Camarón rojo	<i>Penaeus brevirostris</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camarón café	<i>Penaeus californiensis</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camarón blanco	<i>Penaeus occidentalis</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camarón blanco	<i>Penaeus stylirostris</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camarón blanco	<i>Penaeus vannamei</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camarón conchudo	<i>Sicyonia brevirostris</i>	<i>Sicyoniidae</i>
	Camarón rojo, fidel	<i>Solenocera agassizi</i>	<i>Solenoceridae</i>
	Chacalín	<i>Plesionika sp.</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camaroncillo, carabali, titi	<i>Trachypenaeus byrdi</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camaroncillo, titi, cebra	<i>Trachypenaeus faoea</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camaroncillo, titi, chacalín	<i>Trachypenaeus similis p.</i>	<i>Penaeidae</i>
	Camaroncillo, titi, chacalín	<i>Niphopenaeus riveti</i>	<i>Penaeidae</i>
Cangrejo	Candado, baúl	<i>Calappa spp</i>	<i>Gecarcinidae</i>
	Cangrejo azul	<i>Cardisoma crasus</i>	<i>Gecarcinidae</i>
	Cangrejo azul	<i>Cardisoma spp</i>	<i>Gecarcinidae</i>
	Cangrejo apretador	<i>Menippes spp</i>	<i>Xanthidae</i>
	Cangrejo de profundidad	<i>Mursia gaudichaudii</i>	<i>Calappidae</i>
	Cangrejo profundidad	<i>Mursia spp</i>	<i>Calappidae</i>
	Violinistas	<i>Uca spp</i>	<i>Gecarcinidae</i>
	Punches	<i>Ucides occidentalis</i>	<i>Gecarcinidae</i>
	Tihuacal	<i>Ucides spp</i>	<i>Gecarcinidae</i>
Jaiba	Jaiba	<i>Callinectes acuminatus</i>	<i>Portunidae</i>
	Jaiba	<i>Callinectes arcuatus</i>	<i>Portunidae</i>
	Jaiba	<i>Callinectes similis</i>	<i>Portunidae</i>
	Jaiba	<i>Callinectes spp</i>	<i>Portunidae</i>
	Jaiba	<i>Callinectes toxotes</i>	<i>Portunidae</i>
	Jaiba	<i>Ephylas spp</i>	<i>Portunidae</i>
	Jaiba	<i>Portunus sp</i>	<i>Portunidae</i>
Langosta	Langosta, cuca	<i>Evibacus spp</i>	<i>Scyoniidae</i>
	Langosta	<i>Panulirus gracilis</i>	<i>Palinuridae</i>
Langostino	Langostino chileno, langostilla	<i>Pleurocondes planipes</i>	<i>Galateidae</i>
	Alacranes, langostino	<i>Squilla sp.</i>	<i>Squillidae</i>

NORMA SALVADOREÑA

NSO 67.32.06:09

CEFALÓPODOS:

Jibias, Calamar, Pulpo, Caracol

Grupo	Nombre común	Nombre científico	Familia
Calamar	Calamar gigante	<i>Dosidicus gigas</i>	<i>Loliginidae</i>
	Calamar	<i>Loliolopsis diomedae</i>	<i>Loliginidae</i>
	Calamar	<i>Lolliguncula panamensis</i>	<i>Loliginidae</i>
Pulpo	Pulpo	<i>Octopus chierchiae</i>	<i>Octopodidae</i>
	Pulpo	<i>Octopus selene</i>	<i>Octopodidae</i>
	Pulpo	<i>Octopus spp</i>	<i>Octopodidae</i>
	Pulpo	<i>Octopus vulgaris</i>	<i>Octopodidae</i>
	Pulpo	<i>Octopus zonatus</i>	<i>Octopodidae</i>
	Pulpo sarpeteado	<i>Scherdidae</i>	<i>Octopodidae</i>
Caracol	Caracol negro	<i>Melongena patula</i>	<i>Buccinidae</i>
	Caracol gigante	<i>Pseudostrogus spp</i>	<i>Strombidae</i>
	Jutes	<i>Rhinocoryne humboldti</i>	<i>Batillariidae</i>

--FIN DE NORMA--

- 2) El presente Acuerdo entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, de acuerdo a la Conferencia Ministerial de la OMC, Cuarto Período, DOHA, 9-14 de Noviembre de 2001. COMUNIQUESE. HÉCTOR MIGUEL ANTONIO DADA HIREZI, MINISTRO DE ECONOMÍA