

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-29

2020 წლის 14 იანვარი

ქ. თბილისი

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე

„პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-12 მუხლის მე-10 პუნქტის, 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

დამტკიცდეს თანდართული საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანება.

მუხლი 3

ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის მინისტრი

ლევან დავითაშვილი



**საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული
პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი**

თავი I. საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდები

**მუხლი 1. პირველ დანართში გამოყენებული ტერმინების და პირობითი აღნიშვნების
განმარტებები**

1. ა-აირი.
2. აგპ – აირგამომყოფი პროდუქტი.
3. აბი – აბი.
4. ადპ – აპკწარმომქნელი დენადი პასტა.
5. აპ-აორთქლებადი პროდუქტი.
6. ბრ – ბრიკეტი.
7. ბრკგფ-ბუნებრივი წითელი რეზინის კაპსულა გაჟღენთილი ფერომონით.
8. ბრ პარაფ - ბრიკეტი პარაფინის.
9. გრ – გრანულები.
10. გლ – გელი.
11. დკ - დისპერსიული კონცენტრატი.
12. დკთშ – დენადი კონცენტრატი თესლის შესაწამლად.
13. დფ – დენადი ფხვნილი.
14. დპ – დენადი პასტა.
15. დკს – დენადი კონცენტრატი სუსპენზიის.
16. დფ – დუსტისებრი ფხვნილი.
17. ე-ემულსია.
18. ეზკ – ემულსიის ზეთოვანი კონცენტრატი.
19. ეკ – ემულსიის კონცენტრატი.
20. ზდ – ზეთოვანი დისპერსია.
21. ზე – ზეთოვანი ემულსია.
22. ზსკ – ზეთოვან-სუსპენზიური კონცენტრატი.
23. ზან – ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება.
24. ზკ – ზეთოვანი კონცენტრატი.
25. ზს – ზეთოვანი სუსპენზია.
26. ზწე – ზეთოვან-წყლიანი ემულსია.
27. კაპს – კაპსულირებული სუსპენზია.
28. კოლ – კოლოიდური.
29. კოლხ – კოლოიდური ხსნარი.
30. კბკ – კოლოიდური ხსნარის კონცენტრატი.
31. კფ – კრისტალური ფხვნილი.
32. კს – კონცენტრატი სუსპენზიის.
33. მბრ – მყარი ბრიკეტები.
34. მდს – მშრალი დენადი სუსპენზია.
35. მე – მიკროემულსია.
36. მის – მისატყუარი.
37. მის ბლ - მისატყუარის ბლოკი.
38. მის მწ – მისაზიდი მწერმჭერი.
39. მმის – მარცვლოვანი მისატყუარი.

40. მკგრ – მიკროგრანულები.
41. მაგრ – მაკროგრანულები.
42. მზე – მინერალურ ზეთოვანი ემულსია.
43. მზს – მინერალურ ზეთოვანი სუსპენზია.
44. მნ – მოქმედი ნივთიერება.
45. მკს – მიკროკაპსულირებული სუსპენზია.
46. მფ – მშრალი ფხვნილი.
47. კს – კაპსულირებული სუსპენზია.
48. კსკნ – კაპსულირებული სუსპენზიისა და სუსპენზიური კონცენტრატის ნარევი.
49. ნსლ-ნემატოდური სუსპენზიის ღრუბელი.
50. პ – პასტა.
51. პილ – პილეტები.
52. რბრ – რბილი ბრიკეტები.
53. რსგფ-რეზინის სეპტა გაჟღენთილი ფერომონით.
54. ს – სითხე.
55. სზკ – სუსპენზიურ-ზეთოვანი კონცენტრატი.
56. სე – სუსპენზიური ემულსია.
57. სკ – სუსპენზიური კონცენტრატი.
58. სკ-მ – სუსპენზიური კონცენტრატი ზეთოვანი.
59. სფ – სველებადი ფხვნილი.
60. სწკ – სუსპენზიის წყლიანი კონცენტრატი.
61. სდკ – სუსპენზიის დენადი კონცენტრატი.
62. ტექ – ტექნიკური.
63. უმშ – ულტრამცირემოცულობიანი შესხურება.
64. ფ – ფხვნილი.
65. ფან – ფანქარი.
66. ფირ – ფირფიტა.
67. ფთშ – ფხვნილი თესლის შესაწამლად.
68. ფლო – დენადი, სუსპენზიური კონცენტრატი თესლის შესაწამლად.
69. ცნწკ – ცხელი ნისლის წარმოქმნილი კონცენტრატი.
70. წზგრ – წყალხსნადი გრანულები.
71. წზხ – წყალგლიკოლიანი ხსნარი.
72. წდგრ – წყალში დისპერსირებადი გრანულები.
73. წდფ – წყალში დისპერსირებადი ფხვნილი.
74. წე – წყლიანი ემულსია.
75. წზე – წყლიან ზეთოვანი ემულსია.
76. წპ – წყლიანი პასტა.
77. წს – წყლიანი სუსპენზია.
78. წსკ – წყლიანი სუსპენზირებადი კონცენტრატი.
79. წხ – წყალხსნარი.
80. წზკ – წყალხსნადი კონცენტრატი.
81. წზკრ – წყალხსნადი კრისტალები.
82. წზფ – წყალში ხსნადი ფხვნილი.
83. წდფთშ – წყალში დისპერსირებადი ფხვნილი თესლის შესაწამლად
84. ხ – ხსნარი.
85. ხფ – ხსნადი ფხვნილი.

86. ხეწხში – ხსნადი ფხვნილი წყალხსნად შეფუთვამი.
87. ჰმ – ჰაერმშრალი მასა.
88. (თ) – პრეპარატის გამოყენების აკრძალვა თევზსამეურნეო წყალსატევების სანიტარიულ ზონაში არანაკლებ 200 მეტრი ნაპირიდან.
89. (ა) – ავიაშესხურება დაშვებულია მითითებული გამოყენების ნორმით მითითებულ კულტურაზე.
90. პრეპარატის რეგისტრაციის შემოკლებული ვადა.
91. კგ/ჰა-ზე – ხარჯვის ნორმა მყარი და ფხვნილისებური პრეპარატის მიხედვით.
92. ლ/ჰა-ზე – ხარჯვის ნორმა თხევადი პრეპარატის მიხედვით.
93. კგ/ტ-ზე – ხარჯვის ნორმა მყარი და ფხვნილისებური თესლის შესაწამლი პრეპარატის მიხედვით.
94. ლ/ტ-ზე – ხარჯვის ნორმა თხევადი თესლის შესაწამლი პრეპარატის მიხედვით.
95. ხარჯვის ნორმა – სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა მითითებული მე-5 გრაფაში.
96. ლოდინის პერიოდი – დრო ბოლო დამუშავებიდან მოსავლის აღებამდე (დღეებში).

მუხლი 2. ინსექტიციდები და აკარიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	მავნებელი	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	აგრომინერალ ოილი, ზაფხულის ზეთი 800 გ/ლ (თითისტარა ზეთი) (თ), (1)	12-18 12-18	ვაშლი, მსხალი ქლიავი, ატამი	ფარიანების, ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრების, ფსილების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები	შესხურება ზაფხულში როცა გამოჩნდება მოხეტიალე მატლები, შესამღებელია რომელიმე ფოსფოროგული პრეპარატის შერევა. ხარჯვა-1200-1500 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
	„აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 747/15	25-30	ციტრუსები	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფრთათეთრა	შესხურება ზაფხულში. ხარჯვა-2000-2500 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		10	ვაზი	ფარიანების და ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრების მოზამთრე ფაზები	შესხურება ზაფხულში. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		12-18	ჩაი	ფარიანები	შესხურება ზაფხულში. ხარჯვა-2000 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
2	აგროპლანი 20 ხვ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3)	0,2 0,25 0.15-0.3	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღჩის ბუგრი ბამბის ხვატარი ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
	„უპლ ზირაატ ვე ქიმიკი სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 1153	0.15-0.3	პამიდორი, კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(1)	1(-)
		0,15	წიწაკა	ატმის ბუგრი	„	20(1)	1(-)
		0,15	საზამთრო	ატმის ბუგრი	„	10(1)	1(-)
		0,05	თამბაქო	ატმის ბუგრი	„	10(1)	1(-)

		0,25-0,3	ვაშლი	ბუგრები	„	28(1)	-(-)
		0.05--0,075	ხორბალი	ბადლინჯო, მავნე კუსებურა	ადმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0,15-0,35		პურის ბზუალა		14(1)	
		0.04-0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		-					
		0.06-0,1	სამოვრები, კალიებით დასახლებული მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მავნებლის მატლის განვითარების სტადიაში	28(1)	3(3)
3	ადმიტი, ეკ 16 გ/ლ+30 გ/ლ (აცეტამიპრიდი+ ლამბდა- ციგალოტრინი) (თ), (1) „ლიიდს ლაიფსაენს ლიმიტედ“	0.5-0.6	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
	დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1118/19	0.45 0.3-0,4	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები		20(2)	10(4)
		0.3-0,4	კიტრი	ბუგრები		20(1)	10(4)
		0.45 0.3-0,4	პამიდორი	ბამბის ხვატარი ბუგრები		20(1)	10(4)
		0.5-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევები		30(2)	10(4)
4	ავაკანტი, სკ 150 გ/ლ (ინდოქსაკარბი)	0.25	ვაზი	ყურძნის ჭია ფოთლიხვევები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	15(2)	10(4)
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1310	0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია		15(4)	10(4)
		0,45	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა		15(4)	10(4)
		0,35-0,4	პამიდორი (დახურული და ღია გრუნტი)	ბამბის ხვატარი პამიდორის მენაღმე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(3)	10(4)
		0.35	სიმინდი	სიმინდის ხერხია სიმინდის ფარვანა		10(3)	10(4)
5	ავანტი, ეკ 150 გ/ლ (ინდოქსაკარბი)	0.25	ვაზი	ყურძნის ჭია ფოთლიხვევები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.025 %- იანი სამუშაო ხსნარით	10(2)	10(4)
	„ფმს ინტერნეიშნლ სვიტზერლანდ სარლ..“ შვეიცარია 497/09/14/19	0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.03 %- იანი სამუშაო ხსნარით	7(4)	10(4)
		0.25	პამიდორი	კოლოფის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(3)	10(4)

				ცხვირგრძელა	ნიადაგის დამუშავება თესლის თესვისწინა შეწამვლა მშრალი მეთოდით ან პრეპარატის ხსნარში ჩასველების მეთოდით		
		300-400 გ/10 კგ ღერდილზე	მზესუმზირა	შემოდგომის ხვატარი, ხვატარი იპსილონ	მისატყუებლის მო მზადება : 300 -400 გ პრეპარატი შეერევა 10 კგ ღერდილს, დაემატება წყალში გახსნილი 500 გ მაქარი. მისატყუებელს განალაგებენ მზესუმზირის მცენარეების ახლოს: 50-60 კგ/ჰა	-(1-3)	7(3)
		4 2	მარცვლოვნები	ხოჭოები პურის ბზუალა	ნიადაგის დამუშავება თესლის თესვისწინა შეწამვლა მშრალი მეთოდით ან პრეპარატის ხსნარში ჩასველების მეთოდით	-(1) -(1)	7(3) 7(3)
9	ალბანი 4 ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოს-ეთილი) (თ), (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1279	1, 5-1, 8	ზეთისხილი	ზეთისხილის ცხვირგრძელა ზეთისხილის ჩრჩილი, ზეთისხილის ბუგრები, ზეთისხილის ბუზი თუთის მოყვითალო ჭიჭინოზელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (1)	10(4)
		1-1.5	სიმინდი	სიმინდის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		1	1.5
		1-1.5	მარცვლეული	მარცვლეულის მენაღმე ჩრჩილი, პურის ბზუალა, ბელის ცხვირგრძელა, მანე კუსებურა, ჭიანჭურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		0.5-1, 5	სამარცვლე პარკოსნები	ბამბის ხვატარი, ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		1, 5	მზესუმზირა	ბამბის ხვატარი		20(1)	10(4)
		2-2.5 1.5-2 0.8	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, ხვატარები მდელოს ფარვანა ბუგრი		30 (2)	13 (4)
10	ალექსანდერ, ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1)	0.15 0.32	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
	„პარიჯატ ინდასტრის პეტ. ლტდ“ ინდოეთი 541/10/15	0.2	ხორბალი	ბუგრები, მანე კუსებურა, ჭიანჭურბელა, რწყილები, თრიფსები		20(2)	-(3)

		0.4	შაქრის ჭარხალი	მომღრღნელი ხვატრები		-(4)	7(3)
		0.15-0.2		მდელოს ფარვანა		20(1)	7(3)
		0.5	შაქრის ჭარხალი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები		-(4)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი კარტოფილის ჭიამაია		20(2)	7(3)
		0.16					
		0.5	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები		7(3)	7 (3)
		0.35	სოიო	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია		20(2)	-(3)
		0.15-0.25	ჯვარყვავი -ლოვანი კულტურები (სათესლე ნაკვეთები)	რაფსის ყვავილჭამია		-(3)	-(3)
		0.15-0.2	რაფსი, მდოგვი	რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვავილოვანთა რწყილები ბაღლინჯოები, თეთრულეები, ბუგრები		-(3)	-(3)
		0.16	კომბოსტო	თეთრულეები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(3)	7(3)
		0.25	იონჯა	ფიტონომუსი		20(2)	-(3)
		1.2-1.6	კიტრი	ფრთათეთრა		3(2)	2(-)
		0.65-0.8	პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ბუგრები, თრიფსები			
		0.26-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები		25(3)	7(3)
		0.16-0.35	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები		25(3)	7(3)
		0.24-0.32	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები	შესხურება გაზაფხულზე	20(1)	7(3)
		0.06	ნესვი	ბახჩეულის ჭიამაია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.5	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები	“	20(2)	7(3)
		0.5 მლ/მ2	შამპინიონი	სოკოს კოლონები და ბუზები	სუბსტრატის შესხურება	25(2)	7 (3)
		0.2	სამკურნალო მცენარეები (შავბალახა	ჭიჭინობელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	7(3)
		0.3	ყაყაჭურა	ბუგრები		-(1)	7(3)
		0.2	ასკილი)	მავნებლების კომპლექსი	შესხურება კოკრების ფაზაში	90(1)	7(3)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროკუდა, ფოთლის და წიწვის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდეულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	-(-)

		0.01-0.05	მუხა	არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევები, მზომელები		-(1)	-(-)
		0.05	ნაძვი	ჩვეულებრივი ნაძვის ხერხია		-(1)	1(1)
		0.08	ფიჭვი	ფიჭვის მეფისე		-(1)	1(1)
		0.016	ფიჭვი	ფიჭვის წითური ხერხია		-(1)	1(1)
		0.04	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)		-(1)	1(1)
		0.04-0.1	ფიჭვი	ფიჭვის დიდი ცხვირგრძელა	ნერგების შესხურება დარგვის წინ	-(1)	-(-)
		2-4 მლ/მ2	წიწვოვნები	მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები	შესხურება შტაბელგად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	-(-)
		3 მლ/მ2	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მერქნის მავნებლები	ინიექცია ქერქის ქვეშ (ნაჩვენებია 1 მ2 ქერქის ზედაპირისათვის საჭირო დოზა)	-(1)	-(-)
		0.05-0.1	ქალაქის მწვანე ნარგავი	არაფარდი პარკხვევია, ჩრჩილები, მღრღნელი მავნებლები	მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.01% სამუშაო ხსნარით	7(1)	-(-)
		0.1-0.15	სადოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენის პერიოდში	20(1)	-(3)
		0.8 მლ/მ2	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობა-ნაგებობები და მარცვალ-გადასამუშავებელი მანქანა-იარაღები	მავნებლები შენახვის პირობებში, ტკიპების გარდა	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე. საწყობების ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება 1 დღე-ღამის შემდეგ დამუშავებიდან	-(1)	1(1)
		1.6 მლ/მ2	სასაწყობო და მარცვალგადასამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-(1)	1(1)
		24 მლ/ტ	მარცვლოვნების მარცვალ, სამარცვლე პარკოსნების თესლი		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 500 მლ 1 ტ მარცვალზე. მარცვლის გამოყენება სასურსათე ან საფურაჟე მიზნით	-(1)	1(1)
11	ალპაკი 100 ეკ 100 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0.1-0.15	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭრიჭინოებები, თრიფსები, რწყილები, ჭიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	-(4)
	“საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი	0.1 0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები კარტოფილის ჩრჩილი		15(2)	-(4)
	498 /09/15/19	0.25-0.36	ვაზი	ფოთლიხვევები		15(2)	-(4)
		0.2-0.35	ვაშლი	ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევები ამერიკული თეთრი პეპელა		50(2)	10(4)
		0.1	ბარდა, ლობიო	ბუგრები, მემარცვლიები	შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ	20(1)	10(4)
		0.1	ტყის ფოთლო-	ოქროვკუდა,	შესხურება. მეწველი	-(1)	1(1)

			ვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ფოთლიხვევები	პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს		
		0.05-0.1		არაფარდი პარკხვევია, ხერხიები და სხვ. ფოთლის მღრღნელი მავნებლები		-(1)	1(1)
		0.01	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)		-(1)	1(1)
		2.5-5 მლ/მ ²	წიწვოვნები	მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები	შესხურება შტაბელგად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	1(1)
		3 მლ/მ ²		მერქნის მავნებლები	ინიექცია ქერქის ქვეშ	-(1)	1(1)
		0.1-0.15	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები უმცროსი ასაკის მატლები, არაჯოგური ფორმები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	1+0(4)
		0.2-0.35		უფროსი ასაკის მატლები და იმაგო, ჯოგური ფორმები		20(1)	1+0(4)
12	ალპგორი, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	1.5-2.5 2.5	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ფსილები, ჭრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	40(2) 40(1)	10(4) 10(4)
	თურქეთი 961/18	2.5	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		1.2 1.3	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2) 30(2)	10(4)
		1.3-1.5	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბადლინჯოები		30(2) 30(2)	10(4)
		0.8-1.1	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	შაქრის ჭარხალი, სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		2.0-2.5	ვაზი	კოქციდები, ტკიპები, ფოთლიხვევები,		20(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)

		1,0-1,5	ზეთისხილი	ჩრჩილები, ფსილები, ცხვირგრძელები, ნაყოფის ბუჩხები		30(2)	10(4)
		0,75	ვარდი	ბუგრები, ხერხები		-(2)	7(3)
		0,75-1,0	დეკორატიული კულტურები	ბუგრები, ტკიპები		-(2)	7(3)
		4	ალვის ხე	ვერხვის პატარა ხარაბუხა		-(2)	7(3)
13	ალსისტინი სკ 480 გ/ლ (ტრიფლუმერონი) (თ) „ბაიერ აგ“ გერმანია 1176	0., 25-0, 375	ვაშლი, მსხალი	ვაშლის ნაყოფჭამია, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევები, ჩრჩილები, მსხლის ფსილა, კუნელის რგოლურა მენადმე ჩრჩილი, პატარა ტირიფის მჭრელი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (კვერცხდება-მატლების გამოჩეკვის დაწყება) ყოველი თაობის წინააღმდეგ. არ გამოიყენოთ ყვავილობის პერიოდში. ხარჯვა – 1000-1500 ლ/ჰა	40(2)	7(3)
		0., 25-0, 375	წაბლი	ველური წაბლის რგოლურა ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 04%-იანი სუსპენზიით (10-20 ლ/ხეზე), მავნებლის არსებობის შემთხვევაში. ხარჯვა – 500-1000 ლ/ჰა	30(2)	7(3)
		0., 25-0, 375	ჭადარი	ჭადრის ბაღლინჯო	„	30(2)	7(3)
14	ალფა-ლაიფი, ეკ 100 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1) „აგრო ლაიფ საიენს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1399	0,2	ხორბალი, ქერი	პურის ბუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10- დღიანი ინტერვალით	20(2)	10(4)
		0,3	პამიდორი	ბამბის ხვატარი ბახჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	10(4)
		0,3	კიტრი	ბახჩის ბუგრი	„	15(1)	10(4)
		0,2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	„	15(2)	10(4)
		0.4-0.5	ვაზი	ფოთლიხვევები		25(2)	10(4)
		0.4-0.5	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15 დღიანი ინტერვალით	25(2)	10(4)
15	ალფამილინი 17,6 % სკ 176 გ/ლ (დიფლუმენზურონი 96 გ/ლ +ალფა-ციპერმეტრინი 80 გ/ლ) (თ), (1)	0.1-0.15	საგაზაფხულო ხორბალი	პურის ბაღლინჯოები, ბუგრები, ჭრიჭინოებები, თრიფსები, რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
	„არისტა ლაიფსაენს ბენილუკს სპრლ“ ბელგია 1275	0.1-0.15	სამოვრები, სათიბები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკისა და განვითარებისას, კალიების დაფრთიანებამდე. ხარჯვა- 200-400 ლ/ჰა	-(1)	-(4)
		0.2-0.3	ვაზი	ფოთლიხვევები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.2-0.3	ვაშლი	ნაყოფჭამიები ფოთლიხვევები		30(2)	7(3)

16	ამპლიგო 150, მკს 150 გ/ლ (ქლორანტრანილიპროლი ი 100 გ/ლ+ლამბდა- ციგალოტრინი 50გ/ლ) (თ), (1) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1022/18	0.3-0,4	თესლოვნები	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი ქერცლფრთიანი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევას) ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	25 (3-4)	10(4)
		0.3-04	კურკოვნები	”	”	25 (2-3)	10(4)
		0.3-0,4	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევას) ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	25(2-3)	10(4)
		0,4- 0,6	თხილი კაკალი	თხილის ნაყოფჭამია ვაშლის ნაყოფჭამია ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევას) ხარჯვა-1000-1700 ლ/ჰა	25(2-3)	10(4)
		0,25-0,4	ბოსტნეული (პამიდორი, წიწკა, კომბოსტო)	კოლორადოს ხოჭო ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევას) ხარჯვა-500-800 ლ/ჰა	25(2)	10(4)
		0,25 -0,4	სიმინდი	შვედური ბუზი სიმინდის ფარვანა შემოდგომის ნათესების ხვატარი ბამბის ხვატარი	”	25(2)	10(4)

		0,2-0,3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500 ლ/ჰა	25(2-3)	10(4)
		0,2-0,3	კომბოსტო	კომბოსტოს თეთრულა ხვატრები	„	25(2)	10(4)
17	ანტიკლუშჩ მაქსი, ეკ (პირიმიფოს-მეთილი 200 გ/ლ+პირიდაზენი 150 გ/ლ+აცეტამიპრიდი 50 გ/ლ) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 1215	1, 3	პამიდორი, (ღია გრუნტი)	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	10(4)
		1, 3	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		1, 2	ვაზი	ფოთლიხვევები ტკიპები	„	30(2)	10(4)
		1, 2	ვაშლი	მწაფოჭამიები ბუგრები ტკიპები	„	30(2)	10(4)
		1, 3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		1, 0	დეკორატიული კულტურები	ტკიპები	„	3(2)	1 (-)
18	ანტიკოლორადი, სკ 200 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი 150გ/ლ+ლამბდა- ციგალოტრინი 50გ/ლ) (თ), (1)	0.3-0.5	ხორბალი, ქერი, შვრია	პურის ბზუალა პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინოზელები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ბუზები, ჭიაწურბელა ბაღლინჯოები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-400 ლ/ჰა	20(1)	-(3)
	შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა	0.2	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა	„	20(1)	-(3)
	შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 898/17	0.25-0.35	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი , ბუგრები	„	20(2)	10(4)
		0.3-0,5	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევები, ვაშლის კოკრიჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	20 (1)	10(4)
		0.3-0,35	ვაზი	ფოთლიხვევები, ტკიპები , ჭიჭინოზელები, ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	10(2)	10(4)
		0,15-0,2	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო , ბამბის ხვატარი, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-500 ლ/ჰა	14(1)	10(4)
		0,15-0,2	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა, ბუგრები	„	3(1)	10(4)
		0,1-0,15	კიტრი	სათბურის ფრთათეთრა,	„	3(1)	10(4)

			(დახურული გრუნტი)	ბუგრები,			
		0,22-0,25	კიტრი	ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები	„	10(1)	10(4)
		0,12	ბარდა	ბარდის მემარცვლეა, ნაყოფჭამია, ცხვირგრძელები, ბუგრები, თრიფსები		14(2)	10(4)
		0,15	რაფსი	ბაღლინჯოები, რაფსის კოკრიჭამია		14(2)	10(4)
		0,1-0,12	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, რწყილები, ბუგრები		20 (1)	10(4)
19	ანტიბრუში , კს 200 გ/ლ (ბიფენტრინი 100 გ/ლ+იმიდაკლოპრიდი 100 გ/ლ)	0.8-1,0	კომბოსტო, პამიდორი, კარტოფილი კიტრი	მაისის ხოჭოს მატლები, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭიები, ცრუმავთულა ჭიები, ზვატრები, პურის ზზულა	შესხურება და ნიადაგში შეტანა კულტურის დათესვამდე (დარგვამდე)	-(1)	7(3)
	(1) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 893/17	1ლ/100ლ წყალზე	კომბოსტო, პამიდორი, კარტოფილი კიტრი	მაისის ხოჭოს მატლები, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭიები, ცრუმავთულა ჭიები, ზვატრების მატლები, ბუგრები, თრიფსები, ფრთათეთრა (დახურულ გრუნტში), ტკიპების ძირითადი სახეობები	ჩითილების ფესვთა სისტემის დასველება 1%-იან სამუშაო ხსნარში 1 საათის განმავლობაში გრუნტში დარგვამდე	-(1)	7(3)
		1,0-1,5	ბოსტნეული	მავთულა ჭიები, ჭრჩილი, ბუგრი, მაისის ხოჭოს მატლები, კოლორადოს ხოჭო, ბოსტანა	წვეთობრივი მორწყვა	20(2)	7(3)
		0.8-1,0	ვაშლი, მსხალი ატამი	მაისის ხოჭო, ბუგრები, ჭრჩილები, ფოთოლხვევიები, ნაყოფჭამიები, მწუწნი მავნებლები ტკიპები (ირიბი ზემოქმედება) , ყავისფერი მარმარილოს სუნინი ბაღლინჯო	შესხურება პროფილაქტიკური და ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისას	30(2)	7(3)
		1,0	ვაზი	ყურძნის ჭია, ფოთოლხვევიები, ფილოქსერა, რწყილები, ტკიპები (ირიბი ზემოქმედება) , ყავისფერი მარმარილოს სუნინი ბაღლინჯო	„	30(2)	7(3)
		0,2-0,4	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ფარვანა, ბუგრები, სიმინდის დასავლეთის ხოჭო, ზოზინები, ყავისფერი მარმარილოს სუნინი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისას	30(2)	7(3)
		0,5-0,8	ციტრუსები	ციტრუსების წითელი ტკიპა, ნარინჯოვანთა ყვითელი ფარიანა, ბუგრები, ციტრუსების ფრთათეთრა,		20(2)	7(3)

				ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო			
		0,3-0,5	თხილი	ამერიკული თეთრი პეპელა, თხილის ცხვირგრძელა, კვირტის ტკიპა, ხარაბუზა, ბუგრები, ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო		20(2)	7(3)
20	აპლაუდი 25 სკ 250 გ/ლ (ბუპროფეზინი)	1-1,5	ვაზი	ვაზის ცრუფარიანა ჭიჭინობელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21 დღის ინტერვალით პირველი ფოთლის გამოჩენიდან მარცვლის სიმწიფეში შესვლამდე	25(1-2)	7(3)
	„ნიჩინო იუროპ კო, ლტდ“ დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1185	1.5-2,4	ვაშლი, მსხალი, კომში	კალიფორნიის ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყოველი თაობის 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ ყვავილობიდან ნაყოფის სიმწიფემდე ხარჯვა-1500 ლ/ჰა	20(2)	7(3)
		2	ატამი ვაშლატამა გარგარი ბალი ქლიავი	ატმის თეთრი ფარიანა თუთის ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21 დღის ინტერვალით 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ ყვავილობიდან სიმწიფის დასაწყისამდე	20(1-2)	7(3)
		2-3	ციტრუსები	ციტრუსოვანთა ფარიანები ციტრუსოვანთა ჭიჭინობელა ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ ყვავილობიდან ნაყოფის სიმწიფემდე	25(1)	7(3)
		1.5-2	კივი	ფარიანები ატმის თეთრი ფარიანა თუთის ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21 დღის ინტერვალით პირველი ფოთლის გამოჩენიდან ნაყოფის ზრდის დასრულებამდე	45(1-2)	7(3)
		2	ზეთისხილი	ზეთისხილის ცრუფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	45(1-2)	7(3)
		0.5-1	პომიდორი, კიტრი, წიწკა, ბადრიჯანი, სალათა, ყაბაყი (დახურული გრუნტი	სათბურის ფრთათეთრა ბამბის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ ყვავილობიდან სიმწიფის დასაწყისამდე- ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	7(2)	3(3)
		1,5-2	დეკორატიული მცენარეები	ფარიანები ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(2)	7(3)
21	აპოლოლო, სკ 500 გ/ლ	0.4-0.6	ვაშლი, მსხალი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ადრე გაზაფხულზე	30(2)	7(3)
	(კლოფენტიზინი) (2)	0.24-0.36	ვაზი ატამი, ქლიავი			60(2) 40(2)	7(3)
	„ადამა აგრიქალა ბ.ვ.“	0.4-0.6	გარგარი			30(2)	
	ნიდერლანდები 005/10/15/19	0.3-0.4	კენკროვნები (სანერგე)			-(2)	7(3)

		0.2-0.6	ციტრუსები			30(2)	7(3)
22	არმორი, სკ 350 გ/ლ (აცეტამიპრიდი 200 გ/ლ+ლამბდა- ციგალოტრინი 150 გ/ლ) (თ), (1) „ დვა აგრო გმბხ“ გერმანია 1145	0.35-0.45	ჰამიდორი კიტრი(დახურული გრუნტი)	სათბურების ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(1-2)	1(-)
		0,3-0,4 0,45	ჰამიდორი (ღია გრუნტი)	ბუგრები ბამბის ხვატარი	„	30(1)	10(4)
		0,3-0,4	კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრები		20(1)	
		0,35-0,45	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ფოთლიხვევები ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		0,35-0,45	ვაზი	ფოთლიხვევები	„	30 (2)	10 (4)
		0,45 0,3-0,4	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	„	20 (2)	10 (4)
		0,3-0,4	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა ჭია წურბელა პურის ბზუალა ბუგრები თრიფსები	„	30(2)	10(4)
23	აქტარა, წდგრ 250 გ/კგ (თიამეთოქსამი) (თ), (1) „სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ“ შვეიცარია 077/05/10/15	0.06-0.08	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიკური ზღვარის მიღწევისას. ხარჯვა 200- 400 ლ/ჰა	14(1)	7(3)
		0.3-0.6		მავთულა ჭიები	კვალის შესხურება დარგვის დროს.ხარჯვა 70- 120 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		0.08-0,12	ჰამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიკური ზღვარის მიღწევისას. ხარჯვა 200- 400 ლ/ჰა	20(2)	7(3)
		0.4-0.8		ბუგრები, ფრთათეთრა, თრიფსები	ფესვებში შეტანა წვეთოვანი მორწყვისას, მცენარეთა სიმაღლე 1 მ-ზე ნაკლები ან მეტი	3(1)	3(-)
		0.1-0.6	კიტრი, ჰამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,01-0,02% ხსნარით	3(1)	3(-)
		0.4-0.8		ბუგრები, ფრთათეთრა, თრიფსები	ფესვებში შეტანა წვეთოვანი მორწყვისას, მცენარეთა სიმაღლე 1 მ-ზე ნაკლები ან მეტი	3(1)	3(-)
		0.3-0.4	კომბოსტო	მზუზები, რწყილები	ჩითილების მორწყვა კასეტებში დარგვამდე 1-2 დღით ადრე. არ დაიშვება ზედმეტი დატენიანება ხარჯვა 10000 ლ/ჰა	60(1)	-(3)

		0.06-0.08		ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.1-0.4	ვარდი	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	7(3)
		0.8-1.6		თრიფსები		3(2-3)	-(-)
		0.06-0.1	ხორბალი, ქერი	ჭიაჭურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭო, მავნე კუსებურა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიური ზღვარის მიღწევას. ხარჯვა 200-400 ლ/ჰა	30(1)	7(3)
		0.1-0.15		პურის ბზუალა	ადმონაცენის შესხურება	-(1)	7(3)
		0.9	ყვავილოვანი კულტურები	ბუგრები, ფრთათეთრა, თრიფსები, ფარიანები და ცრუფარიანები	ნიადაგის მორწყვა მცენარეების ქვეშ, 30-40 სმ სიმაღლისას	20(1)	-(-)
		0.1	სამარცვლე პარკოსნები	მემარცვლეები, ბუგრები, ბარდას ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიური ზღვარის მიღწევას. ხარჯვა 200-400 ლ/ჰა	15(1)	7(3)
		0.14	ვაშლი	ვაშლის კოკრიჭამია ცხვირგრძელა, ხერხიები, ბუგრები, ძოწული წითელი რინქიტი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ. ხარჯვა 800-1200 ლ/ჰა	60(1)	7(3)
		0.2-0.3		ფსილები			
		0.3-0.4	მსხალი	ფსილები	„	60(2)	7(3)
		0.3-0.4	თხილი , კაკალი	კაკლის ჩრჩილი, ბუგრები, ტკიპები, კაკლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(1)	7(3)
		0.1-0.3	ვაზი	ჭიჭინოხელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა 600-1000 ლ/ჰა	60(1)	7(3)
		0.15-0.2	მოცივი, ჟოლო	ბუგრები	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა 800-1200 ლ/ჰა	60(2)	7(3)
		0.3-0.4 0.2-0.4	ხახვი ნიორი	ხახვის ბუზი თამბაქოს თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა 200-400 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
24	აქტელიკი 500 ეკ 500 გ/ლ (პირიმიფოს-მეთილი) (1) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 012/04/09/14/19	0.4 მლ/მ ²	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობა-ნაგებობები და მარცვალ-გადასამუშავებელი მანქანა-იარაღები	მავნებლები შენახვის პირობებში	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 50 მლ 1 მ ² -ზე. საწ-ყოების ჩატვირთვა და მომ-სახურე პერსონალის დამშვება 1 დღე-ღამის შემდეგ დამუშავებიდან	-(1)	1(1)
		0.8 მლ/მ ²	სასაწყობო და მარცვალ გადასამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ ² -ზე	-(1)	-(-)
		16 მლ/ტ	სასურსათო, სათესლე და საფურაჟე მარცვალი		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 500 მლ 1 ტ მარცვალზე. მარცვლის გამოყენება სასურსათე	-(1)	1(1)

					ან საფურაჟე მიზნით მხოლოდ ნაშთების განსაზღვრის შემდეგ, რაც არ უნდა აღემატებოდეს მაქსიმალურად დასაშვებ დონეს		
25	ბაიტი100, ეკ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1) „აგრო ლაიფ საიენს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1396	0.5-0,6	პამიდორი კიტრი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამონასკვამდე)	7(1-2)	10(4)
26	ბალისტა, ეკ 100 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0.15-0.45	ხორბალი, ქერი	მაენე კუსებურა, ზუგრები, ჭიჭინოზებლები, თრიფსები, რწყილები, ჭიაწურბელა, ცხვირგრძელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10- დღიანი ინტერვალით	15(2)	-(4)
	„ერთარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალელტერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“	0.4	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ფარვანა, ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 -დღიანი ინტერვალით	15(3)	-(4)
	თურქეთი 1260	0.5	პამიდორი	ბამბის ხვატარი ზუგრები		15(2)	-(4)
		0,15-0,2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		10(4)	10(4)
		0.3-0.35	ვაზი	ფოთლიხვევიები ცხვირგრძელები		15(2)	-(4)
		0.2-0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15 დღიანი ინტერვალით	30(3)	10(4)
		0,4	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა		30(2)	10(4)
		0,25-0,3	ზეთისხილი	ზეთისხილის ზუზი		30(2)	10(4)
		0.2-0.3 0,4-0,5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, ფაროსნები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით	45(1)	10(4)
		0,15-0,25	სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულები	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები, არაჯოგური ფორმები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	10(4)
27	ბატალიონი 100 ეკ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0.25	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.025 - 0.05%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
	„ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ას. თურქეთი 1289	0.25-0.35 0,5-0,6	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.5	პამიდორი	ბამბის ხვატარი,	შესხურება ვეგეტაციის	15(1)	10(4)

		0,35-0,5	ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფრთათეთრა ტკიპები ბუგრები	პერიოდში (ნაყოფების გამონასკვამდე) 0,05%-იანი სამუშაო ხსნარით		
		0,7-1	სოია	ტკიპები, ბამბის ხვატარი თამბაქოს ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	10(4)
		0,6	თხილი	მარმარა ყავისფერი სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	21(2)	10(4)
		0,7-1	ციტრუსი	ყავისფერი მარმარა სუნიანი ბაღლინჯო	„	30(2)	10(4)
		0,3	სიმინდი	ყავისფერი მარმარა სუნიანი ბაღლინჯო	„	21(2)	10(4)
28	ბელტი 480 კს 480 გ/ლ (ფლუბენდიამიდი) (თ)	0.1-0,15	კომბოსტო	კომბოსტოს თეთრულა კომბოსტოს ჩრჩილი ხვატრები	ნათესების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა	10(3)	7(3)
	„ბაიერ აგ.“ გერმანია 954/17	0,1 -0,15	პამიდორი	პამიდორის ჩრჩილი ხვატრები	„	10(3)	7(3)
		0,3-0,4	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჰამია ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	25(2)	7(3)
		0,3-0,4	ვაზი	ყურძნის ჭია ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	25(2)	7(3)
		0,1-0,15	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ფარვანა, მდელოს ფარვანა, ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0,1-0,15	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა, ბამბის ხვატარი	„	30(2)	7(3)
		0,1-0,15	სოია	აკაციის ალურა, გამა ხვატარი, იონჯას ხვატარი	„	30(2)	7(3)
29	ბელტი ექსპერტი 480 კს 480 გ/ლ +240 გ/ლ (ფლუბენდიამიდი+თიაკ ლოპრიდი) (თ)	0.3-0.4	ვაშლი მსხალი	ვაშლის და ქლიავის ნაყოფჰამიები, ფოთლიხვევიები ატმის ბუგრი	ნათესების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მასობრივი კვერცხდების ფაზაში, ხარჯვა-800-1000 ლ/ყა	21(3)	7(3)
	„ბაიერ აგ.“ გერმანია 1280	0,3-0,4	ატამი	ვაშლის და ქლიავის ნაყოფჰამიები, ფოთლიხვევიები ატმის ბუგრი	„	21(2)	7(3)
		0,3-0,4	ვაზი	ყურძნის ჭია ფოთლიხვევიები	„	21(2)	7(3)
30	ბესტ ალფა 100 ეკ 100 გ/ლ (ალფა- ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0.15-0.45	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიჭინობელები, თრიფსები, რწყილები, ჭიაწურბელა, ცხვირგრძელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით	15(2)	-(4)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ.	0.4	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ფარვანა, ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 -დღიანი ინტერვალით	15(3)	-(4)
	იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	0.1 0.1-0.2	კარტოფილი პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		15(2)	-(4)

	თურქეთი 852/17	0, 5		კარტოფილის ჩრჩილი ბამბის ხვატარი			
		0.3-0.35	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ცხვირგრძელები		15(2)	-(4)
		0.2-0.35 0.4	ვაშლი თხილი	ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები ამერიკული თეთრი პეპელა, თხილის ცხვირგრძელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15-დღიანი ინტერვალით	30(2)	10(4)
		0.2-0.3	შაქრის ქარხალი	ცხვირგრძელები, ფარსნები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-დღიანი ინტერვალით	45(1)	10(4)
		0.1 0, 05-0, 1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროკუდა, ფოთლიხვევიები არაფარდი პარკხვევია, ფიჭვის პარკხვევია ხერხიები და სხვ. ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდულის – 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	1(1)
31	ბესტგოლი 20 ეკ 200 გ/ლ (ესფენვალერატი) (თ), (1) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1198	0.6	პამიდორი	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		0.75	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	10(4)
		0.75	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	45(1)	10(4)
		0.2	თხილი	თხილის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (1)	10(4)
		0.3	სიმინდი	სიმინდის ტაროს ნემატოდა სიმინდის ფარვანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღის ინტერვალით	30 (3)	10(4)
32	ბესტ სიპერი 25 , ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1177	0.3 0.4	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღის ინტერვალით	20(3)	-(3)
		0.2-0,3	ხორბალი	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.4 0.5 0.15-0.2	შაქრის ქარხალი	მომღრღნელი ხვატრები მავთულა ჭიები ბუგრები		-(4) 20(1)	7(3) 7(3)

				მდელის ფარვანა			
		0.1-0.2 0.16	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი კარტოფილის ჭიამაია		20(2)	7(3)
		0.16	კომბოსტო	თეთრულები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(3)	7(3)
		1.2-1.6 0.65-0.8	კიტრი პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა ბუგრები, თრიფსები		3(2)	2(-)
		0.5	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები	“	20(2)	7(3)
		0.24-0.32	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები	შესხურება გაზაფხულზე	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(3)	7(3)
		0.25-0.35	ვაშლი მსხალი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევები მსხლის ფსილა		25(3)	7(3)
		0,1	ბალი	კომენილი		25(3)	7(3)
		0,4	მზესუმზირა	ბამბის ხვატარი			
		0,4	დეკორატიული კულტურები	ჭრიჭინა		7(1)	7(3)
33	ბი 58 ტოპი, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) “კემინოვა ა/ს” დანია 1285	1.0-1.9 1.5	ვაშლი, მსხალი ვაშლი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილქამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	40(2) 35(1)	10(4) 10(4)
		1.0-1.9	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	35(1)	10(4)
		0.5-1,0 2,0	პამიდორი	ტკიპები, ხვატარი, თრიფსები, ბუგრები, ჭრიჭინოხელები ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღის ინტერვალით	28(2)	10(4)
		2,0	ხახვი	ხახვის ბუზი		20(2)	10(4)
		0.7-1.1 1.4-1.9	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)
		1,2-2,0	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები,		30(2)	10(4)

				თრიფსები, ბაღინჯოები, ტკიპები, ჭიჭნობელები			
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლისმწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		28(1)	10(4)
		1.0-2.0	ვაზი	ტკიპები, ფოთლისხვე- ვიები, კოქციდები,		20(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1,2-1,5	რაფსი	ბუგრები, ტკიპები, ხერხიები		28(1)	10(4)
		3 1-2	საძოვრები, ველური მცენარეულობა	მავნებელთა კომპლექსი კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირეტროიდებთან ერთად კომბინირებული ნაზავით	30(1)	10(4)
34	ბოიკოტი, ეკ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი)	1.5	ვაშლი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლისხვევიები, ჭრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	10(4)
	(თ), (1) „მაკკინილი ტრედიგ- ლპ“ ირლანდია 1451	0.75-1.0 0.5-0.75	ხორბალი ქერი	ჭია წურბელა, პურის ბზუალა, მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო	„	30(1)	10(4)
		0,75-1, 0	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-დღიანი ინტერვალით	30 (2-3)	10(4)
		0.5-1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	10(4)
		1,5-2	ციტრუსები	ფარიანები, ცრუფარიანები მენადმე ჩრჩილი	„	40(1)	10(4)
		1.5	ვაზი	ფარიანები, ცრუფარიანები	„	40(1)	10(4)
		1,2	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	„	30(1)	10(4)
		0,3-0,5	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები (მატლების განვითარების პერიოდში)	„	20(1)	10(4)
		1-1,5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, რწყილები	„	30(2)	10(4)
35	ბოლდისტ დელუქსი 2,5 ეკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1447	0.3-0,5	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.5	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.35	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)

		0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
		0.5	ლობიო	მემარცვლიები, ზუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0,3-0,5	ოსპი, მუხუდო	ბამბის ხვატარი ცხვირგრძელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.5	პამიდორი	ბამბის ხვატარი		30(1)	7(3)
		0.5	ბადრიჯანი	თამბაქოს ფრთათეთრა		30(1)	7(3)
		0.5-0,6 0,5	ვაშლი მსხალი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ვაშლის ჩრჩილი მსხლის ფოთოლრწყილი		30(2)	7(3)
		0.4-0.5	ვაზი	ყურძნის ჭია, ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0,25-0.3	ალუბალი	ალუბლის ბუჩი		30(2)	7(3)
		0,25-0.3	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუჩი, ზეთისხილის ჩრჩილი, ზეთისხილის ცრუფარიანა		30(2)	7(3)
		0,3-1 0.5	თხილი	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	ნორმალური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თერმული ნისლის ტექნოლოგიის გამოყენებით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 0,5 ლ პრეპარატი იხსნება 2,5 ლ დიზელში.	30(2)	7(3)
		0.3	ფსტა	ფსტის ფოთოლრწყილი		30(2)	7(3)
		0,5	გოგროვნები	თამბაქოს ფრთათეთრა		30(1)	7(3)
36	ბორეი ნეო , სკ 275 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი 125გ/ლ+ იმიდაკლოპრიდი 100 გ/ლ + კლოთიანიდინი 50 გ/ლ) დსს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 1358	0,15-0,2 0,15-0,2(A)	ხორბალი, ქერი	ბუგრები, პურის ხოჭოები, ბუგრები, ჭიაწურბელა, თრიფსები, ბუზები, მავნე კუსებურა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა. საავიაციო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა-25-5- ლ/ჰა	20(2)	-(3)
		0,15-0,2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,15-0,2	კომბოსტო	თეთრულები, ჩრჩილები, ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)

		0,2-0,25	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, მწუწნი მაგნებლების კომპლექსი(ბუგრები ი, კალიფორნიის ფარიანა და სხვ.)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,2-0,25	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,2	თხილი	თხილის ცხვირგამელა, მწუწნი მაგნებლების კომპლექსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,15-0,2	პომიდორი	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,1-0,2	ატამი	აღმოსავლური ნეყოფჭამია, მენადმე ჩრჩილი, მწუწნი მაგნებლების კომპლექსი (ბუგრები, ფარიანები და სხვ.)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,1-0,2	სიმინდი	შვედური ბუზი, ბუგრები, ჭიჭინოზელები, მდელოს ფარვანა, ველის ჭრიჭინა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,1-0,2 0,1-0,2 (A)	სამოვრები, კალიებით დასახლებული მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა -200- 400 ლ/ჰა. საავიაციო შესხურება მატლების განვითარების პერიოდში, ხარჯვა-25-50 ლ/ჰა	20(2)	-(3)
		0,1-0,2	რაფსი	ჯვარყვავილოვანთ არყილები	აღმონაცენების შესხურება, ხარჯვა 100-200 ლ/ჰა	20(2)	-(3)
				რაფსის ყვავიჭამია, რაფსის ფარულხოროთუმა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა200-400 ლ/ჰა		
		0,1-0,2	ბარდა	ბარდის ნაყოფჭამია, ბარდის მემარცვლია, ბუგრები,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)

				ცხვირგრძელა			
		0,1-0,2	სოიო	ბამბის ხვატარი, მდელოს ფარვანა, სოიოს ნაყოფჭამია, ბარდის ალურა, ბუგრები, თრიფსები, ცხვირგრძელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,1-0,2	შაქრის ჭარხალი	ჭარხლის რწყილები, ცხვირგრძელები	აღმონაცენების შესხურება	20(2)	-(3)
		0,1-0,15		ჭარხლის ფოთლის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		
		0,1-0,2		მდელოს ფარვანა			
37	ბრენდ დ 550 ეკ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი) (თ), (1) “აგრიკო გრუპ ლტდ” ბულგარეთი 933/17	1-1,5	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფის ხერხია, ვაშლის ნაყოფჭამია, კალიფორნიის ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7.(3)
		1-1,5	ვაზი	ყურძნის ჭია, ფილოქსერა	„	30(1)	10(4)
38	ბუფალო, ეკ 420 გ/ლ (ქლორპირიფოსი 400+ბიფენტრინი 20) (თ), (1) „ინტერნასიონალ ქლიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 1267	0.75-1.0	ხორბალი ქერი	მაგნე კუსებურა ჭიაწურბელა პურის ბზუალა პურის ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა	20 (1)	-(4)
		0,5	რაფსი	რაფსის ყვავილჭამია თესლის ფარულხოტუმბა გვარყვავილოვანი რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა	20 (1)	-(4)
		1-1,25	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები ფოთლიხვევიები ბუგრები ჩრჩილები ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-800-1500 ლ/ჰა	30 (2)	10(4)
		1.5					
		1-1,25 1.5	ვაზი	ყურძნის ჭია ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	30(2)	7(3)
		0.8-1.0	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები	აღმონაცენების შესხურება.	20(2)	10(4)

				რწყილები	ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა		
39	გლადიუსი, ეკ 100 გ/ლ (ზიფენტრინი) (თ), (1)	0,4	ჰამიდორი ზადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	ტკიპები ზუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1-2)	15(1)
	„მანდონგ ვეიფანგ რეინზოუ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1389	0,3-0,4	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ტკიპები ზუგრები		7(1-2)	10(4)
		0,2-0,3	კომბოსტო (დახურული გრუნტი)	კომბოსტოს თეთრულა ჩრჩილი		7(1-2)	10(4)
40	გოლდპლანი 20 წზვ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“	0,3 0,25	ჰამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღჩის ზუგრი ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
	თურქეთი 992/18	0,3	ჰამიდორი, კიტრი წიწკა (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(1)	1(-)
		0,25-0,3	ვაშლი	ზუგრები	„	28(1)	-(-)
		0,05-0,075	ხორბალი	ბალინჯო, მავნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0,15-0,35		პურის ზზუალა		14(1)	-(-)
		0,06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		0,06-0,1	სამოვრები, კალიებით დასახლებუ- ლი მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეუ- ლობა	კალიები	შესხურება მავნებლის მატლის განვითარების სტადიაში	14(1)	3(3)
		0,1	თამბაქო	ზუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	3(3)
41	გრანდი 5, ეკ 50 გ/ლ (ლამბდა-ციპალოტრინი) (თ), (1) „ქროუნზბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ“ კანადა 618/14/19	0,4-0,8	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიზვევები, ტკიპები, ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	10(4)
		0,3-0,4	ვაზი	ფოთლიზვევები, ტკიპები		20(2)	10(4)
		0,1-0,2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0,1	ჰამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		30 (1)	10(4)

42	დ66 2,5 კვ 25 გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „ინდასტრიალ ქუიმიკა ქეი ს.ა.“	0.15-0,25	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
	ესპანეთი 1290	0.5-0.7 0,15-0,25	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა ბუგრები, თრიფსები		20(2)	-(3)
		0.15 0.25	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო , ბუგრები კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.25-0.4	ბოსტნეული კულტურები	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო, ფრთათეთრა, ბუზები, ბუგრები		30(1)	7(3)
		0,15 0.25-0.5	შაქრის ჭარხალი	ბუგრები , ცხვირგრძელა მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ხვატარები		30(2)	7(3)
		0,25- 0.5	თამბაქო	ბუგრები , თრიფსები		20(1)	10(3)
		0.5-1.0	იონჯა	ბაღლინჯო, ბუგრები, ცხვირგრძელეები, სქელფება		30(2)	7(3)
		0,15-25	რაფსი	რაფსის ღეროს ცხვირგრძელა, ბუგრები, ხოჭოები		20(2)	7(3)
		0,15-0,25	სოია	ბაღლინჯოები, ბუგრები		30(2)	7(3)
		0.6-0,8 0,4-0,6	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია. კალიფორნიის ფარიანა მენადმე ჩრჩილი ბუგრები, თრიფსები		20(2)	7(3)
		0,4-0,6	ზეთისხილი	კოქციდები		30(2)	7(3)

		0,5		ზეთისხილის ბუზი, ჩრჩილი, თრისფსები			
		0,8-1,2	ციტრუსები	კოქციდები, ფრთათეთრა, ბუგრები		40(2)	7(3)
		0,15-0,25	მარწყვი	ფოთლიჭამია, ბუგრები		20(1)	10(3)
43	დეგემ პლეიტ, ფირ 56% (მაგნიუმის ფოსფიდი) (თ), (1) “დეტია დეგიში გმზ” გერმანია 1323	1 ფირფიტა/ 30 მ3	ხოლბლის, სიმინდის, მზესუმზირას მარცვლეული	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5-200C-ის ზემოთ ფუმიგაცია 5-200C-ზე ფუმიგაცია 5-200C-ის ზემოთ ექსპოზიცია 2,5-5 დღე. დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	14(1)	7(3)
		1 ფირფიტა/ 30 მ3	სიმინდის, მზესუმზირის, ლობოს, ბარდას, სელის, მდოგვის მარცვალი ტომრებში	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5-200C-ზე ფუმიგაცია 5-200C-ის ზემოთ ექსპოზიცია 2,5-5 დღე . დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა ,ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	14(1)	-(-)
		1 ფირფიტა/ 30 მ3	პარკოსანი კულტურების მარცვალი	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5- 200C-ზე ფუმიგაცია 200C-ის ზემოთ ექსპოზიცია 2,5-5 დღე. დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	14(1)	-(-)
		2 ფირფიტა/ტ	ხოლბლის ფქვილი ტომრებში	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5-200C-ზე . ფუმიგაცია 200C ზემოთ ექსპოზიცია 2,5-5 დღე. დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	14(1)	7(3)

		1 ფირფიტა/ 33 მ3	ხახვი ხმელი	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5-200C-ზე ფუმიგაცია 5-200C-ის ზემოთ , ექსპოზიცია 2,5-5 დღე. დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	7(1-)	-(-)
		1 ფირფიტა/ 33 მ3	ობრაზუმის ფოთლები ხმელი	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5-200C-ზე ფუმიგაცია 5-200C-ის ზემოთ , ექსპოზიცია 2,5-5 დღე. დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	7(1)	7(3)
		1 ფირფიტა/ 33 მ3	ობრაზუმის, ნიახურის, ლირთეთრას ხმელი ფესვები	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5-200C-ზე ფუმიგაცია 5-200C-ის ზემოთ , ექსპოზიცია 2,5-5 დღე. დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	7(1)	7(3)
		2 ფირფიტა/ 30 მ3	ყავის მარცვლები	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 5-0C-ქვემოთ, ექსპოზიცია 15 დღე ფუმიგაცია 5-200C-ზე ფუმიგაცია 5-200C-ის ზემოთ , ექსპოზიცია 2,5-5 დღე. დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა. ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, რეალიზაცია მოხდება როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს..	7(1)	-(-)
44	დეგემ მატოქსინი, აბი 66% (მაგნიუმის ფოსფიდი) (თ), (1) “დეტია დეგიში გმზხ” გერმანია 1324	1 აბი/მ3	ჩაუტვირთავი მარცვალსაცა ვები, ბელელი, წისქვილი, სასილოსე სადგური	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია ექსპოზიცია 10 დღე. პერსონალის დაშვება მოხდება მხოლოდ განიავების შემდეგ, როცა ფოსფინის შემცველობა სამუშაო ზონის ჰაერში არ აღემატება ზდკ-ს.	-(1)	7(3)
		5 აბი/ტ 3-4 აბი/ტ	ხოლბლის, სიმინდის,	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 200C-ის ქვემოთ ფუმიგაცია 200C-ის ზემოთ	14(1)	7(3)

			მზესუმზირას მარცვლეული		დეგაზაცია, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფორის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.		
		2 აბი/ტ	სიმინდის, მზესუმზირის, ლობიოს, ბარდას, სელის, მდოგვის მარცვალი ტომრებში	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია , დეგაზაცია, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფორის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	14(1)	-(-)
		4 -3 აბი/ტ	ხორბლის ფქვილი ტომრებში	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 10-150C . ფუმიგაცია 150C ზემოთ დეგაზაცია , რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფორის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	14(1)	7(3)
		2აბი/მ3	ვაშლის, ალუბლის ჩირი, სტაფილო გამომრალი	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია , დეგაზაცია, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფორის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	7(1)	7(3)
		3-4 აბი/ტ	პარკოსანი კულტურების მარცვალი	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 200C-ის ქვემოთ ფუმიგაცია 200C-ის ზემოთ დეგაზაცია, რეალიზაცია მოხდება როცა ფოსფორის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	14(1)	-(-)
45	დეკაგარდი 25 ეკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „დოგალ კიმივეი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.« თურქეთი 1065/19	0.25-0,5	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები, პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.5-0.6	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(3)	-(3)
		0.15-0,45	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა ბამბის ხვატარი		20(2)	7(3)
		0.2 0.2-0,3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.3-0,5	სოია, ლობიო, ბარდა	შემარცვლიები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.4-0,5 1,0	ბოსტნეული	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო, ჩრჩილები, თეთრულები ბუგრები, რწყილები ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები ფსილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევები		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	ადმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0,4-0,5	თხილი	არაფარდი პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (1)	7(3)

		0,15-0,45	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ჩრჩილი ზეთისხილის ცხვირგრძელა		20(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	15(1)	7(3)
		0,25-0,4	შაქრის ჭარხალი	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
46	დეღა 12,5 გ (დეღამეტრინი) (თ), (2) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 619/13/19	0.1-0.14	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	-(-)
		0.05	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.03-0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.04	ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.05-0.08	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.03-0.06		კოლორადოს ხოჭო			7(3)
		0.06	კომბოსტო	ხვატრები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები		20(2)	
		0.06-0.1	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკვისას	20(1)	7(3)
		0.06-0.1	გვარყვავილოვანი კულტურები	რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.05-0.07	ვაშლი	ნაყოფჰამიები ¹ ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ბუგრები		30(2)	7(3)
		0.12	მსხალი	მსხლის ფსილა		30(2)	7(3)
		0.1-0.15	ვაზი	ფოთლიზვეციები		30(2)	7(3)
		0.06	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი		20(1)	7(3)
		0.1	თამბაქო	ბუგრები		20(1)	7(3)
		0.1	იონჯა	ბაღლინჯო, ბუგრები, ცხვირგრძელები		30(1)	7(3)
		0.1	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჰამია		20(2)	
		0.05-0.1	საზამთრო	მღრღნელები, ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		0,1	ნესვი				
		0.1	ჩაი	ჩაის ბუგრი	შესხურება იმ პლანტაციებში სადაც არ იკრიფება ფოთოლი	-(2)	7(3)
		0.04-0.06	სამკურნალო მცენარეები (ასკილი, მაღლყურძენა, ლენცოფა, ლავანდა, შმაგა, მრავალპარღვა, ბაყაყურა, ბარამბო	ფოთლებისა და ღეროების მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
47	დეღარინი 2,5 გ/ლ	0.25	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიანჭურბელა, ბუგრები,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)

	(დელტამეტრინი) (თ), (2) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 601/13/18			თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები			
		0.5-0.7	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.15					
		0.2	ლობიო, ბარდა	მემარცვლები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.3	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები		20(2)	7(3)
		0.25-0.5	შაქრის ჭარხალი	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.4	სამოვრები	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)		20(1)	7(3)
		0,5		(უფროსი ასაკის მატლები)			
		0.3-0,5	ჯვარყვავილო- ვანი კულტურები	რწყილები		30(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევები		30(2)	7(3)
		0.3	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი		20(1)	7(3)
		0.5	თამბაქო	ბუგრები		20(1)	10(3)
		0.5-1.0	იონჯა	ბაღლინჯო, ბუგრები, ცხვირგრძელები, სქელფეხა		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	ადმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		3-4	ჩაი	ჩაის ბუერი	შესხურება იმ პლანტაციებში სადაც არ იკრიფება ფოთოლი	-(2)	7(3)
		0.2	ფიჭვი	ფიჭვის ქერქის ბაღლინჯო	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდეულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს	-(1)	7(3)
		0.4-0.8	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მავნებლების კომპლექსი (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	7(3)
48	დეღფოსი 5 გ 50 გ/კგ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) „ინდუსტრიალ კუიმიკა ქეი ს.ა.“ ესპანეთი	8-10 კგ/ჰა	სიმინდი მზესუმზირა კარტოფილი ბადრიჯანი	ნიადაგის მავნებლები სამხრეთის რუხი ცხვირგრძელა	პრეპარატის მოზნევა ნიადაგზე თესვისას	-(1)	10(4)

	1246						
49	დემეტრა, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) „პლატინ ქიმია მუმესსილიკ ვე დის ტიკ- ს. ს.“ თურქეთი 677/17	1.4-2.1 2.1	ვაშლი, მსხალი ვაშლი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	40(2) 40(1)	10(4) 10(4)
		2.1	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდეები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		1.2 1.3	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2) 30(2)	10(4)
		1.3-1.5	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუხები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოლები		30(2)	10(4)
		0.8-1.1	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	შაქრის ჭარხალი სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		1.0	კომბოსტო	ფოთლისმწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		2.0 2.5	ვაზი	კოქციდეები ტკიპები. ფოთლიხვევიები,		20(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
50	დეცის პროფი წდგრ 25 250 გ/კგ (დელტამეტრინი) (თ), (2)	0, 04-0, 1	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ყურძნის ჭიის მატლების მიმართ	30(2)	7(3)
		0.05-0, 1	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფჭამიას მატლების მიმართ	30(4)	7(3)
	„ბაიერ აგ“ გერმანია 544/10/15	0.05-0, 1	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ატმის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
		0, 1-0.2	ციტრუსები	ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა		30(4)	7(3)
		0, 2		ორანჟერეის (ჩაის ბუგრი)		30(2)	7(3)
		0.025-0, 05	პომიდორი (ღია გრუნტი)	ბამბის ხვატარი, ბუგრები		20(1)	7(3)
		0.025-0, 04	კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრები		20(1)	7(3)
		0.025-0, 05	საზამთრო	ბუგრები		20(2)	7(3)
		0, 05	ვარდი	ბუგრები		20(1)	-(3)
		0.01-0.05	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
		0.02-0.05	სამოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკის პერიოდში	20(1)	7(3)

			ნაკვეთები				
51	დეცის ფლუქსი ეკ 25 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) “ბაიერ აგ” გერმანია 881/16	0,3-0,8	ხორბალი	მაწვე კუსებურა, მარცვლოვანთა ბუზები, ჭიაწურბელა ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,3	მარცვლოვნებ ი	ჭიაწურბელა	„	20(2)	-(3)
		0,3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	„	20(2)	7(3)
		0,2-0,25	პარკოსნები	ბუგრები სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0,2	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, კომბოსტოს თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები	„	20(2)	7(3)
		0,7	შაქრის ქარხალი	აღმონაცენების მიავენებლები, მდელოს ფარვანა ცხვირგრძელები	„	20(2)	7(3)
		0,375-0,45 0,25 0,5-1	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ვაშლის ფოთლის მენადმე ჩრჩილი, კუნელის რგოლურა ჩრჩილი, ვაშლის ციცქნა ჩრჩილი, ფოთოლხვევიები ბუგრები არაფარდი და რგოლური პარკიხვევიები, მეზამთრე და ცქვლეფია მზომელები, ამერიკული თეთრი პეპელა, ცხვირგრძელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა- 1500 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა- 2000 ლ/ჰა	30(2)	7(3)
		025-0,3 0,5-1	ქლიავი	ქლიავის ნაყოფჭამია, ქლიავის სქელფეხა, ქლიავის ბუგრი არაფარდი და რგოლური პარკიხვევიები, მეზამთრე და ცქვლეფია მზომელები, ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	20(2)	7(3)
		0.25-0,3	ბალი, ალუბალი	ალუბლის ბუზი, ალუბლის ბუგრი	„	20(2)	7(3)
		0,2	ვაზი	ფოთოლხვევიები, მზომელები	„	30(2)	7(3)
		0.3	იონჯა	მაწვენელთა კომპლექსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში.	30(2)	7(3)

		0,4-0,8	სიმინდი	მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსი		20(2)	7(3)
		0,25-1	თხილი	მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსი		20(2)	7(3)
		0,25-1	ციტრუსი	მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსი		20(2)	7(3)
		0.2-2	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მოზამთრე ყლორტიხვევია, ფიჭვის დიდი ცხვირგრძელა, ოქროკუდა, ქერქიჭამია ტიპოგრაფი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს	-(1)	7(3)
52	დიმევიტი, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა	1,5-2	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის- მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	40(2)	10(4)
	შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 900/17	1,5-2	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		1,5-3	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვევები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		3	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1-1.5	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		0.5-1.5	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.5-1	მაქრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინოხელები		30(2)	10(4)
		1.9-2.4 1.4-1.9	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლები კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1,5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	„	20(1)	10(4)
53	დინგო 40 ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) „ინტერნასიონალ ქიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა	1.1-1.9	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და რუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის- მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდგომ	40(2)	7(3)

	499/09/13/18						
		1.1-1.9	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ზერხები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(2)	10(4)
		0.5-0.9	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინოზები		30(2)	10(4)
		0.8-0.9	თამბაქო	ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		2-3	თუთა	ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება თუთის აბრეშუმხვევიას გამოკვების დამთავრების შემდეგ, ნაყოფის საკვებად გამოყენება არ დაიშვება	30(2)	10(4)
		1.9-2.4 1.4-1.9	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლები კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		0.8-1.2	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.5-1	შაქრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1.1-2.8	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვე-ვიები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
54	დუმბლე 40 ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოათი) (1) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1165	1,5-2	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ზოჭოები, მსხლის მემაქმანე ბაღლინჯო, მაჭაურა ბურტყელა ბუგრი პეწიანა	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	30(2)	10(4)
		1,5-2	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ზერხები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	30(1)	10(4)
		1,5-1,8	ზეთისხილი	ზეთისხილის ცხვირგრძელა ბუგრები ზეთისხილის ბუზი თუთის მოყვითალო ჭიჭინოზებელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (1)	10(4)
		1,5-3	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვევიები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		3	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1-1.5	ხორბალი, ჭვავი, მავნე კუსებურა,			30(2)	10(4)

			ქერი, შვრია	ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუჩქები, ბუგრები, თრიფსები			
		0.5-1,5	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.5-1	შაქრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1,5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		20(1)	10(4)
		0,75-1	დეკორატიული მცენარეები	ბუგრები		7(1)	10(4)
		0,75-1	ვარდი	ვარდის ბუგრი ვარდის ხერხია		7(1)	10(4)
		2,5-3	ალვის ხე	ვერხვის პატარა ხარაბუზა		7(1)	10(4)
55	დურსბანი, ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი)	0.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულები	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
	(თ), (1) “დაუ აგროსაიენსი, ექსპორტ ს.ა.ს.” საფრანგეთი 033/08/13/19	2	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვე-ვიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები		40 (2)	7 (3)
		1.5-2	ვაზი	ცრუფარიანები, ტკიპები		40 (2)	7 (3)
		2	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები		40 (2)	7 (3)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		40 (2)	7 (3)
		2-2.5 1.5-2 0.8	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, ხვატარები მდელოს ფარვანა ბუგრი		30 (2)	13 (4)
		1.5	იონჯა	ფიტონომუსი		25 (1)	- (4)
56	ეკო ოილ სპრეი, წზე 820 გ/ლ (პარაფინის მინერალური ზეთი 820 გ/ლ) „ადამა აგრიქალაზ ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 1064	18-24 25-30	ვაშლი, მსხალი, კომში	ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები, ცრუფარიანები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი) 10-12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარ/ვა-1200 ლ/ჰა პრეპარატის გამოყენება არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარ/ვა-1000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)
		18-24 25-30	ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი, ალუბალი, გარგარი	ფარიანები, ტკიპები, ფსილები, ბუგრები, რწყილები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი) 10-12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარ/ვა-1200 ლ/ჰა შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარ/ვა-1000	20(1-2)	7 (3)

					ლ/ჰა		
		10-15 15	ვაზი	ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები, რწყილები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარჯვა-800 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)
		30-35	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები, ბუგრები, თრიფსების, მენადმე ჩრჩილების	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა -2000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)
		18-24 25-30	ხურმა, მოცხარი კაკალი, თხილი, ნუში	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი) 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა - 1200 ლ/ჰა შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარჯვა -1000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)
		18-24 25-30	ზეთისხილი	ცრუფარიანები, ჩრჩილები	„	20(1-2)	7 (3)
		12 -15	დეკორატიული მცენარეები, ტყის ჯიშები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10-დღიანი ინტერვალით ხარჯვა -800-1000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)
57	ენვიდორი სკ 240 240 გ/ლ	0.4-0.6	ვაშლი	მხილის წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება კვირტის გახსნის და ვარდისფერი კონუსის სტადიაში	14(2)	7(3)
	(სპიროდიკლოფენი)	0.4-0.6	მსხალი	მსხლის ჩვეულებრივი ფსილა		14(2)	7(3)
	(თ) „ბაიერ აგ“ გერმანია 545/10/15	0.4-0.6	ატამი, ვაშლატამა	ხეხილის წითელი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას, სიმწიფეში შესვლისას	14(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება კვირტის გახსნისა, ყვავილობისა და მისი დასრულებისას	14(1)	7(3)
		0.4-0., 8	ფორთოხალი, მანდარინი	აბლაბუდიანი ტკიპა, ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას და სიმწიფეში შესვლისას	14(2)	7(3)
		0, 2-0.4	პომიდორი	აბლაბუდიანი ტკიპა, ჟანგა ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	7(3)
		0, 2-0.4	კიტრი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა		14(1)	7(3)

		0, 2-0.4	საზამთრო, ვარდი	ტკიპები		14(1) -(1)	7(3) -(3)
58	ენიგმა 20 სფ 200გ/კგ (პირიდაბენი) (3) „მენტა ტარიმ ტარიმ ილკ. სან.ვე ტიკ. ლტდ“ თურქეთი 1439	0.6-0.9	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		1,1-1.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა		30(2)	7(3)
		0,4-0,5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	წითელი ტკიპა		10(2)	7(3)
59	ეფდალ ალფატრინი 100 გ/ლ 100 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0.15-0, 45	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიჭინოზელები, თრიფსები, რწყილები, ჭიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(4)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 878/17	0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები კარტოფილის ჩრჩილი	„	21(2)	-(4)
		0, 5	პამიდორი	კოლოფის ჭია	„	20(1-2)	-(4)
		0.36	ვაზი	ფოთლიხვევიები	„	15(2)	-(4)
		0.2-0.35	ვაშლი	ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები ამერიკული თეთრი პეპელა	„	50(2)	10(4)
		0, 4	კაკალი	ცხვირგრძელები	„	20(1)	10(4)
		0.1	ბარდა, ლობიო	ბუგრები, მემარცვლიები	შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ	20(1)	10(4)
		0, 4	სიმინდი	ხვატრები, ღეროს ფარვანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	10(4)
		0.2	იონჯა	ცხვირგრძელები, ბაღლინჯოები, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	10(1)
		0.1-0.15	რაფსი	რაფსის ყვავილჭამია, რწყილები	„	48 (2)	10(1)
		0.2-0.5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები	„	45(1)	10(4)
		0.3-0.35	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები	„	20(1)	10(4)
60	ეფდალ აფიტრიდი 20 წხფ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 996/18	0,3 0,25	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღის ბუგრი ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
		0.3	პამიდორი, კიტრი წიწკა (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(1)	1(-)
		0,3-0,4	ვაშლი	ბუგრები	„	28(1)	-(-)
		0,5-0,6	ციტრუსი	ბუგრები	„	30(1)	-(-)

		0.05-0,075	ხორბალი	ბაღლინჯო, მავნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0.15-0,35		პურის ზეჟალა		14(1)	-(-)
		0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
61	ევდალ დელმეტრინი 25 მკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1010/18	0.25-0,35	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიანჭურბელა, ზუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.5-0.7	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
		0.2		კარტოფილის ჩრჩილი			
		0.3-0,4	სოია, ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ზუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.3-0,4	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ზუგრები, რწყილები		20(2)	7(3)
		0.3-0,5	ჯვარყვავილო-ვანი კულტურები	რწყილები		30(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ზუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0,5	თხილი	არაფარდი პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (1)	7(3)
		0,6-0,9	ჩაი	ფოთლის მჭუწნი მავნებლები		30(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		0.5	თამბაქო	ზუგრები		20(1)	10(3)
62	ევდალ კემიდონი 40 მკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 958/18	1.2-2,5	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ზუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	40(2)	7(3)
		1.2-2,5	ქლიავი, ატამი	ზუგრები, კოქციდები,	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(2)	10(4)

				ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები			
		1.9-2.4	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლები კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		0.8-1.2	მარცვლოვნები	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.5-1	შაქრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1.1-2.8	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვევიები, კოქციდეები		20(2)	10(4)
		2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1,2-1,5	ზეთისხილი	ჩრჩილები, ცხვირგ რმელები, ფსილები, ბუზები, ფრთათეთრა		30(1)	10(4)
		0,8-1	ვარდი	ბუგრები, ხერხიები		7 (1)	10(4)
63	ევდალ კიმეტრინი 25 მკ 250 გ/ლ (დიპერმეტრინი) (თ) (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1053/18	0.35	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	-(3)
		0.2-0,3	ხორბალი	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0,3-0.4	შაქრის ჭარხალი	მომღრღნელი ხვატრები მდელოს ფარვანა ბუგრები		-(4)	7(3)

		0.2-0.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი ბუგრები		20(2)	7 (3)
		0.35	სოიო	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჰამია, მრავალჰამია ფოთოლჰამია		20(2)	-(3)
		0,4-0,5	მზესუმზირა	ხარაბუზა მზესუმზირას ალურა		20(2)	-(3)
		0,2 1.2-1.6 0.8 0.5	კომბოსტო კიტრი, პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი) სტაფილო	თეთრულეები, ჩრჩილები, ხვატრები ფრთათეთრა ბუგრები, თრიფსები სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები		25(3) 3(2) 20(2)	-(3) 7(3) -(-)
64	ეფდალ კიმტოქსი, გრ 50 გ/კგ (მეტალდეჰიდი) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1146/17	40-50 კგ	ბოსტნეულ- ბაღჩეული, კიტრი- პამიდორი დაცულ გრუნტში, ხეხილი, ტყის ჯიშები, ციტრუსები, კენკროვანები, ვაზი, თამბაქო, დეკორატიული მცენარეები, საჩითილე და სანერგეები	ლოფორთქინები და ლოკოკინები	გაფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე, რიგთაშორის და ბილიკებზე, მავნებლის გამოჩენისას	20(1)	10(4)
65	ეფდალ ლამტორინი 5 კგ 50 გ/ლ (ლამბდა- ციპლოტრინი)	0.4-0.8	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჰამია, ფოთლისხვევიები, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (2)	
	(თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 947/18	0.3-0.4	ვაზი	ყურძნის ჭია, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.4-0,8	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი		30(2)	10(4)
		0.4-0.8	ფისტა	ფოთლის ფსილები		30(2)	10(4)
		0,4-0,8	თხილი	თხილის ცხვირგრეელა		30(2)	10(4)
		0.1-0.2 0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)

		0.1-0,2	პამიდორი	კოლორადოს ხაჭო, კოლოფის ჭია		30 (1)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		30(1)	10(4)
		0.2	სიმინდი	სიმინდის ფარვანები		30(1)	10(4)
		0.2 0.15-0.2	ხორბალი ქერი	პურის ხოჭოები, პურის ბზულა, მავნე კუსებურა, თრიფსები, ჭიჭინობელები, რწყილები, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა		20(1)	10(4)
		0.4	სოია	ბამბის ხვატარი, აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)
		0,2-0,3	შაქრის ჭარხალი	ჭარხლის ფაროსანა		20(1)	10(4)
66	ეფდალ პირდენი 20 სვ 200გ/კგ (პირიდაბენი) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 976/18	0.5-0.9	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.5-0.75	ვაზი	ტკიპები		30(2)	7(3)
		0.75-1.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა		30(2)	7(3)
		0,4-0,5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	წითელი ტკიპა		10(2)	7(3)
67	ეფდალ პირინოსი 25 სვ 250 გ/კგ (ქლორპირიფოს-ეთილი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1186/18	300-400 გ/10 კგ ღერლილზე	ბოსტნეული სიმინდი მზესუმზირა	მახრა მღრნელი ხვატარები	მისატყუებლის მომზადება : 300 -400 გ პრეპარატი შეერევა 10 კგ ღერდის, დაემატება წყალში გახსნილი 500 გ შაქარი. მისატყუებელს განალაგებენ მცენარეების ახლოს: 50-80 კგ/ჰა ბოსტნულში, 50-60 კგ/ჰა სიმინდში და მზესუმზირაში.	-(1)	7(3)
		300 გ/1/2კგ ღერლილზე	ვაზი	შემოდგომის ხვატარი	მისატყუებლის მომზადება : 300 - გ პრეპარატი შეერევა 1/2 კგ ღერდის, დაემატება წყალში გახსნილი 10 კგ შაქარი.	-(1)	7(3)
68	ეფდალ პრომითე 570 ეკ 570 გ/ლ (პროპარგითი) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი	1.2-1.8	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	10(4)

	997						
		1.5-3	ვაშლი	„	„	30(2)	7(3)
		1.6-2.4	ალუბალი, ბალი	„	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(2)	7(3)
		4.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლის ფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	7(3)
		2.2-4.3	თხილი	„	„	60(2)	-(3)
		3	მიხაკი, ვარდი	„	„	3-5(1)	7(3)
69	ეფდალ სუნოლი 70 ზწე, ზაფხულის ზეთი 700 გ/ლ (მინერალური ზეთი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 957/18	18-22,5 18-22,5 12.0-15.0	ვაშლი, მსხალი ქლიავი, ატამი თუთა	ფარიანების, ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრე- ბის, ფსილების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები	შესხურება ზაფხულში როცა გამოჩნდება მოხეტიალე მატლები, შესაძლებელია რომელიმე ფოსფორორგული პრეპარატის შერევა. ხარჯვა-1200-1500 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		30-37	ციტრუსები	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფრთათეთრა	შესხურება ზაფხულში. ხარჯვა-2000-2500 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		10	ვაზი	ფარიანების და ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრების მოზამთრე ფაზები	შესხურება ზაფხულში. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		12-18	ზეთისხილი	ფარიანები	შესხურება ზაფხულში. ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	21(1)	
70	ეფდალ სულფური 80, სფ 800 გ/კგ (გოგირდი)	4-5	ვაზი	გალებიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა – 1000 ლ/ჰა	1(1-2)	-(-)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 875/17	5-6	ხეხილი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა კუნელის ტკიპა ხეხილის წითელი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში,	1(1-2)	-(-)
		12-15	ციტრუსები	ხეხილის წითელი ტკიპა ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	„	1(1-2)	-(-)
71	ეფდალ ტეზუსაი, სფ 200 გ/კგ (ტეზუფენპირადი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	0,75-1,5 0,6-1,2	 ვაშლი	ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა ობობა ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩენისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)

	თურქეთი						
	1011/18						
		1,2-1.5	მსხალი	მსხლის ფსილა	„	14 (2)	7(3)
		1,0	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ვაზის ქერის ტკიპა	„	14 (2)	7(3)
		0.5-0.6	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		1,2-1,6	ციტრუსები	ტკიპები	„	20 (2)	7(3)
		0.5-1,0	ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა	ტკიპები	„	- (2-3)	7(3)
72	ევდალ ფოსფორი 550 გკ 500+50 გ/ლ	1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფქამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	10(4)
	(ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 880/17	0.75-1.0 0.5-0.75	ხორბალი ქერი	ჭია წურბელა, პურის ბზუალა, პურის ხოჭო	„	30(1)	10(4)
		1, 0	სიმინდი	სიმინდის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-დღიანი ინტერვალით	30 (2-3)	
		0.5-1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	10(4)
		2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები, გრუფარიანები მენალმე ჩრჩილი	„	40(1)	10(4)
		1.5	ვაზი	ფარიანები, გრუფარიანები	„	40(1)	10(4)
73	ევდორ ილი , სკ (იმიდაკლოპრიდი 4 გ/ლ+მინერალური ზეთი 704 გ/ლ) (თ), (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 962/18	2.5-3/100 ლ წყალი	ატამი, ქლიავი ვაშლი, მსხალი	კალიფორნიის ფარიანა, ატმის ბუგრი, ვაშლის ბუგრი, მენალმე ჩრჩილი, ვაშლის ნაყოფქამია, აღმოსავლური ნაყოფქამია	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 2% სამუშაო ნაზავით. ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	90 (1)	-(-)
		1,5/100 ლ წყალი	ზეთისხილი	ზეთისხილის გრუფარიანა	„	30(1)	-(-)
74	ეგორია 247 კს	0.1-0.5	მარცვლოვანი	პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის	40(1-2)	-(3)

	247 გ/ლ (ლამბდა-ციგალოტრინი 106 გ/ლ+თიამეთოქსამი 141 გ/ლ) (თ), (1) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“		თავთავიანი კულტურები: ხორბალი, ქერი, შვრია	პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჰიპინოზები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხები, ბუზები, ჰიაწურბელა ბაღლინჯოები	პერიოდში (მავნეობის ეკონომიკური ზღვრის გათვალისწინებით)		
	შვეიცარია 1375	0.1-0.5	სიმინდი	ბამბის ხვატარი სიმინდის ფარვანა	„	40(1)	-(3)
		0.1-0.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი	„	20(2)	10(4)
		0.1-0.5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა, ბუგრები	„	3(1)	10(4)
		0.1-0.5	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები	„	3(1)	10(4)
		0.1-0.5	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები	„	30 (2)	10(4)
		0.1-0, 5	ვაშლი, მსხალი	ვაშლის კოკრიჭამია ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები	„	30 (2)	10(4)
		0.1-0.5	თხილი	ბაღლინჯოები ფოთლიხვევიები ბუგრები ქერლცფრთიანები	„	30 (2)	10(4)
75	ექსიტოქსი, სფ 100 გ/კგ (ჰექსითიაზოქსი) (თ) „ინდუსტრიალ კუიმიკა ქეი ს.ა.“ ესპანეთი 1243	0.5-0.8	თესლოვანი ხეხილი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0, 5-0.8	ვაზი	ტკიპები	„	30(2)	7(3)
		1, 2-1., 8	ციტრუსი	აბლაბუდიანი ტკიპა, ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა	„	45(1)	7(3)
		1, 0	გოგროვნები (დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	15(1)	7(3)
			კენკროვნები (მაყვალ ჟოლო)	ტკიპები	„	7(1)	7(3)
			პამიდორი ბადრიჯანი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ტკიპები	„	7(1)	7(3)
		1, 0	მარწყვი	ტკიპები	„	7(1)	7(3)
		0, 5-0, 8	დეკორატიუ ლი კულტურები	ტკიპები	„	-(1)	7(3)
76	ეპედი, ეკ	0.7-0, 8	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია,	შესხურება ვეგეტაციის	25(2)	7 (3)

	16 გ/ლ+72 გ/ლ (აცეტამიპრიდი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) „ლიიდს ლაიფსაენს ლიმიტედ“			ფოთლიხვევიები	პერიოდში		
	დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1120/19	0, 8-0.9	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები		25(2)	7(3)
		0, 7-0, 8	კიტრი პამიდორი	ბამბის ხვატარი ბუგრები		20(2)	7(3)
		0.7-0.8	ვაზი	ფოთლიხვევიები		25(2)	7(3)
77	ვალსამბა, ევ 50 გ/ლ (ლამბდაციპა-ლოტრინი) (თ), (1) „ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 058/05/10/16	0.25-0.4	ხორბალი, ქერი	პურის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიანჭურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		0.25-0.4	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
		0.6	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)
		0.8-1.5	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)
		0.6-0.8	კურკოვნების და თესლოვნების სანერგეები	ფოთლის ვევიები, ბუგრები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.2-0.4	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0.4	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		30(1)	10(4)
		0.4	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.4-0.6	ახალგაზრდა, არამსხოიარე ბაღები, ქალაქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.6-0.8	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.4-0.6	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები (არაჯოგური ფორმები)		30(1)	10(4)
		0.6-0.8		კალიები ჯოგური ფორმები (ზრდასრული მატლები და იმაგო)		30(1)	10(4)
78	ვალსარელი, ევ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) „ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა	1-1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	7(3)

	480/05/10/13/18						
		0.75-1.0	ხორბალი	ჭია წურბელა, პურის გზულა		30(1)	10(4)
		0.5-0.75	ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო		30(1)	-(4)
		1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	-(4)
		0.8-1.5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელა, რწყილები		40(1)	10(4)
		0.4	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები		20(1)	7(3)შ
		2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები, ცრუფარიანები, მენადმე ჩრჩილი		40(1)	10(4)
79	ვალსაციპერი 250 ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ), (1) “ „ინტერნასიონალ ქიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 500/09/13/18	0.26-0.32	ვაზი	ფოთლივცვეიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(2)	10(4)
		0.16-0.32	ვაშლი	ნაყოფჭამია, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები		25(2)	7(3)
		0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
80	ვენტო, ეკ 100 გ/ლ (პირიპროქსიფენი) (3) „ლიიდს ლაიფსაენს ლიმიტედ“	1.5	ვაშლი, მსხალი	კალიფორნიის ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის მოხეტიალე მატლების წინააღმდეგ.	21(2)	7(3)
	დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1121/150	1.5	ვაშლი, მსხალი ატამი, ქლიავი	ფარიანები	„	21(2)	7(3)
		0.9-1,0	პამიდორი ბადრიჯანი წიწაკა კომბოსტო	სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ზღვრის მიხედვით.	14(2)	7(3)
81	ზონდერი 100, ეკ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0.25 0.45	ვაზი	ყურძნის ჭია ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.02 - 0.04%-იანი საშუალო ხსნარით	30(2)	10(4)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1239	0.35-0.45	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ 0.045 %-იანი საშუალო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.6	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.06 %-იანი საშუალო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.35-0.45	ვაშლი	ბუგერები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04-0.05%-იანი	30(2)	10(4)

					სამუშაო ხსნარით		
		0,6-0,75	ატამი	ატმის ბუგრი	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0,5	პამიდორი ბადრიჯანი (ღია გრუნტი) კიტრი (ღია გრუნტი)	ტკიპები ბამბის ხვატარი ბუგრები ტკიპები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამოწვამდე) 0.09 %-იანი სამუშაო ხსნარით	15(1)	10(4)
		0,7 1	სოია	ტკიპები ბამბის ხვატარი თამბაქოს ფრთათეთრა	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	10(4)
		0,6	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	21(2)	10(4)
		0,7-1	ციტრუსი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	"	21(2)	10(4)
		0,3	სიმინდი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	"	21(2)	10(4)
82	თეიქოვ 100 კვ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0.25 0.45	ვაზი	ყურძნის ჭია	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.025 - 0.05%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
	„საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1261	0.35-0.0,6	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია წითელი ხეხილის ტკიპა	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ 0.045 %-0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0,6	ატამი	ატმის მწვანე ბუგრი	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.5-0,6	პამიდორი ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ბამბის ხვატარი ტკიპები ატმის მწვანე ბუგრი	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამოწვამდე) 0,06%-იანი სამუშაო ხსნარით	15(1)	10(4)
		0,4	კომბოსტო	თრიფსები ჭრჩილები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	10(4)
		0,2-0,3	მარცვლოვნები	პურის ხოჭო	"	21(2)	10(4)
		0,7-1	სოია	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა ბამბის ხვატარი თამბაქოს ფრთათეთრა	"	15(1)	10(4)
		0,6	თხილი	მარმარა ყავისფერი სუნიათი ბაღლინჯო	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	21(2)	10(4)
		0,7-1	ციტრუსი	მარმარა ყავისფერი სუნიათი ბაღლინჯო	"	21(2)	10(4)
		0,3	სიმინდი	მარმარა ყავისფერი სუნიათი ბაღლინჯო	"	21(2)	10(4)
83	თიოვიტ ჯეტი 80 წდგრ 800 გ/კგ (გოგირდი) (3) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 442/04/09/14/19	3-4	ვაზი	ტკიპები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა - 1000 ლ/ჰა	1(1)	-(-)

84	იმედაგოლდი 350 სკ 350 გ/ლ (იმედაკლოპრიდი) (1) „უპლ ზირაატ ვე ქიმია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 1157	0.3-0.5	ვაშლი	ბუგრები, ფსილეები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0,5	მსხალი	ფსილეები		30(2)	7(3)
		0,5	ატამი	ატმის ბუგრი, აღმოსავლური ნაყოფჰამია		20(2)	7(3)
		0.3-0.4	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ვირუსების გადამტანი მწერები		20(2)	7(3)
		0.2-0.3 0,25	პამიდორი , ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ბუგრები, პამიდორის ხვატარი, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 300 ლ/ჰა	15(1)	7(3)
		0,15-0.2	ლობიო	ბუგრები		15(1)	7(3)
		0.6-0.75	ციტრუსები	ბუგრები, ცრუფარიანები, ფარიანები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით. ხარჯვის ნორმა 2000-2500 ლ/ჰა	30(1-4)	7(3)
85	იმედორ დ წდგრ 700 გ/კგ (იმედაკლოპრიდი) (1) „აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 1257	0, 15-0, 35	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
86	იმედორი მაქსი, წდგრ 700 გ/კგ (იმედაკლოპრიდი) (1)	0,25	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყურძნის ჭიის მატლების მიმართ	30(2)	7(3)
	„ნინგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ“ ჩინეთი 679/15	0,15-0.25	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჰამია ვაშლის ბუგრი კალიფორნიის ფარიანა, მენადმე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მატლების მიმართ.	30 (4) 30 (2) 30(1) 30 (2)	7(3)
		0.15-0.25	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჰამია ატმის ბუგრი		20(1-2)	7(3)
		0.25-0.35	ციტრუსები	ციტრუსო ვანთა ფრთათეთრა ნარინჯისფერი (ჩაის) ბუგრი		30(4) 30(2)	7(3)
		0.12 0.08-0.12	პომიდორი კიტრი	ბამბის ხვატარი, ბაღის ბუგრი		15(1)	7(3)
		0.15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ვირუსების გადამტანები		20(2)	7(3)
87	ინსაკარი, ეკ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0.25 0.45	ვაზი	ყურძნის ჭია ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.02 - 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით შესხურება ვეგეტაციის	30(2)	10(4)

		0,3-0,6		ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბაღლინჯო	პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ		
	“პარიჯატ ინდასტრის პვტ ლტდ” ინდოეთი 680/15	0.35-0.45 0,3-0,6	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ 0.045 %-იანი სამუშაო ხსნარით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	30(2)	10(4)
		0.6	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.35-0.45	ვაშლი	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04-0.05%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0,3-0,4 0,3-0,6	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია ატმის ცრუფარიანა ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	30(2)	10(4)
		0.45 0,4	პამიდორი (ღია გრუნტი) კიტრი (ღია გრუნტი)	ტკიპები ბუგრები ტკიპები ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამონასკვამდე) 0.09 %-იანი სამუშაო ხსნარით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	20(1) 20(2)	10(4)
		0.25-0.35 0,3	კომბოსტო	ბუგრები თეთრულა, ჩრჩილები. ტკიპები ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თავის ჩახვევამდე 0.25 -0.35 %-იანი სამუშაო ხსნარით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	20(1) 20(2)	10(4)
		0.15-0.35 0,3-0,4	ხორბალი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭოები, ბუგრები, თრიფსები,ჭრიჭინოებ ლები, ჭიაწურბელა ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.05-0.07 %-იანი სამუშაო ხსნარით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	20(1) 20(2)	10(4)

		0,3-0,4	სიმინდი	ბამბის ხვატარი სიმინდის ფარვანა ყავისფერი მარმარილოს სუნიაწი ბაღლინჯო	ყავისფერი მარმარილოს სუნიაწი ბაღლინჯო	20(1) 20(2)	10(4)
		0,3-0,6	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიაწი ბაღლინჯო თხილის ცხვირგრძელა თხილის ნაყოფჭამია აღმოსავლური ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	30(2)	10(4)
		0,6-1,0	ციტრუსები	ყავისფერი მარმარილოს სუნიაწი ბაღლინჯო ტკიპები ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	30(2)	10(4)
88	ინსექტოიდ ქეი, ეკ (პარაფინის ზეთი 79%) “ინდუსტრიალ ქუიმიკა ქეი ს.ა.” ესპანეთი 1363	9,5--19	ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ვაშლატამა ვაშლი, მსხალი	ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილეები ცრუფარიანები, ფოთლიხვევები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1200-1800 ლ/ჰა პრეპარატის გამოყენება .არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს	20(1-2)	7(3)
		10,5-16	ვაზი	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზამთრის ბოლომდე 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		21-39	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა- 1200-2500 ლ/ჰა	20(1-2)	7(3)
		26-31,5	კაკალი, თხილი, ნუში	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		13-28	დეკორატიული მცენარეები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		13-28	ზეთისხილი	კოქციდები	„	20(1-2)	7(3)
89	ინტეგრალი 5 ეკ 50 გ/კგ (ლამბდა-ციპლოტრინი) (თ), (1) „მენტა ტარიმ კო ლტდ“ თურქეთი 1417	0.4-0.8	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევები, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები,		30(2)	10(4)

				ტკიპები			
				ხვატრები, ღრაქა			
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0.2-0,4	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო, კოლოფის ჭია		30 (1)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, კომბოსტოს თეთრულა კომბოსტოს ჩრჩილი, რწყილები		30 (1)	10(4)
				ჭიჭინობელები			
		0.2	ხორბალი, ქერი	ხორბლის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიჭინობელები, ხერხიები, ჭიაწურბელა		20(1)	-(-)
		0.25	სიმინდი	ხვატრები, სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
		0.4-0,6	სოიო, ბარდა, ლობიო	აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)
				ბამბის ხვატარი			
		0.2-0.3	ჭარხალი	ჭარხლის ფაროსანა		20(1)	10(4)
		0.4-0.8	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი		30(2)	10(4)
		0.4-0,8	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა		30(2)	10(4)
			ფსტა	ფოთლის ფსილა			
90	იონგფოსი, აბი 570 გ/კგ (ალუმინის ფოსფიდი) (თ), (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ.	3-12 გ/მ3 (1-4 აბი)	ჩაუტვირთავი მარცვალსაცავები	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 150C-160C-ის დროს ექსპოზიცია 5 დღე. პერსონალის დაშვება მოხდება მხოლოდ განიავების შემდეგ, როცა ფოსფინის შემცველობა სამუშაო ზონის ჰაერში არ აღემატება ზღვ-ს.	-(1)	
	იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 963/18	3-12 გ/მ3 (1-4 აბი)	მარცვალი (სასურსათო, სათესლე, საფურაჟე)	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 10 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1-)	-(-)
		3-6 გ/მ3 (1-2 აბი)	ფქვილი, ბურღული საწყობში ან პოლიეთილენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		3-6 გ/მ3 (1-2 აბი)	მშრალი ხილი, ბოსტნეული საწყობში ან პოლიეთილენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 5 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		3-6 გ/მ3 (1-2 აბი)	მარცვლოვანი ან პარკოსანი კულტურების მარცვალი გემისა და ტანკერების ტრიუმებში,	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 15-160ჩ-ის დროს, ექსპოზიცია ფიტოექსპოფუმი-გაციის” ტექნო-ლოგიის გამოყენებით-16 დღე; რეცირკულაციის	-(1)	-(-)

			ნავსადგურ-ბში		მეთოდით 1 დღე. დეგაზაცია რეისის დროს და დრეიფის დროს; მარცვლის დათვალიერება და დატვირთვა მოხდება მაშინ, როცა ფოსფინის შემცველობა მარცვლის ზედაპირიდან 0,5-1 მ სიმაღლეზე 0,1 მგ/მ3-ია. დეალიზაცია მოხდება როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს. ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, როცა ჰაერში ფოსფინის შემცველობა არ აღემატება მდდ-ს.		
		3 გ/მ3 (1აბი)	თამბაქოს საწყობები	მავენებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 5 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
91	კაიზერი, სკ 150 გ/ლ (ინდოქსაკარბი)	0,3-0,4	ვაზი	ყურმნის ჭია ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(2)	10(4)
	„ლიიდს ლაიფსაენს ლიმიტედ“ დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1122/19	0,45-0,55	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(4)	10(4)
		0,45-0,55	პამიდორი	ბამბის ხვატარი ბუგრები კოლოფის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(3)	10(4)
		0,45-0,55	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი კოლორადოს ხოჭო	„	7(1)	10(4)
92	კაიზო, წებრ 50 გ/კგ (ლამბდა-ციპლოტრინი) (თ), (1) „ნუფარმი გმბხ და კო კგ“ ავსტრია 597/13/18	0.4-0.8	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ტკიპები, ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0.1	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		30 (1)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი,კომბოსტოს თეთრულა კომბოსტოს ჩრჩილი ჭიჭინოხელები		30 (1)	10(4)
		0.2	ხორბალი, ქერი	ხორბლის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, მავენე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	-(-)

				ჭიაჭურბელა			
		0.2	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
		0.4	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)
		0.3-0.4	კურკოვნების და თესლოვნების სანერგები	ფოთლიხვევები, ბუგრები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.2-0.4	ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ბაღები, ქალა-ქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.1-0.15	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულე-ბის მიწები	კალიები (არაჯოგური ფორმები, ჯოგური ფორმების უმცროსი ასაკის მატლები)		30(1)	10(4)
		0.4		კალიები (ჯოგური ფორმები, ზრდასრული მატლები და იმაგო)		30(1)	10(4)
			სამკურნალო მცენარეები				
		0.1-0.12	(ბელადონა (შმაგა)	კოლორადოს ხოჭო		20(1)	10(4)
		0.1-0.12	შავბალახა (სათესლე ნაკვეთები)	ჭიჭინოხელები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.1-0.15	ასკილი (ნერგები)	ცხვირგრძელები, ჭიჭინოხელები, ტკიპები და სხვ.	შესხურება ნერგებზე	-(2)	10(4)
		0.15	ხბოშუბლა	ცხვირგრძელები, რწყილები		-(1)	10(4)
		0.1-0.15	ალპური კრიალოსანა	ცხვირგრძელები, რწყილები		-(1)	10(4)
		0.4	ლავანდა	ჭიჭინოხელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	10(4)
		0.3	ხარისვარდა	ცხვირგრძელები		30(2)	10(4)
		2.5-5 მლ/მ2	წიწვოვან ბის მერქანი	მერქნის მავნებლების მატლების წინააღმდეგ	დამზადებულ მერქნის დამუშავება (შტაბელების)	-(1)	10(4)
		0.4 გ/მ2	ჩაუტვირთ ავი სასაწყობო შენობები და მარცვალ გადასამუ შავებული მანქანა- ია რადები	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება. ხარჭვის ნორმა 50 მლ 1 მ2-ზე. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მე-3 დღეს.	-(-)	-(-)
		0.8 გ/მ2	საწყობების და მარცვალ გადასამუ შავებული საწარმოე ბის ტერიტორია		შესხურება. ხარჭვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-(-)	3(3)
93	კალიბრი, ვვ 100 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0.4-0.45	პამიდორი	კოლოფის ჭია ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	10(4)
	„შანდონგ ვეიფანგ რეინზოუ ქემიკალ კო ლტდ“	0.25-0.35	ვაზი	ფოთლიხვევები	„	15(2)	10(4)
	ჩინეთი	0.2-0.35	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამია,	შესხურება ვეგეტაციის	25(2)	10(4)

	1390	0,35-0.4	თხილი	ფოთლიხვევები ამერიკული თეთრი პეპელა, თხილის ცხვირგრძელა	პერიოდში 10-15 დღიანი ინტერვალით	15(2)	
		0,1-0,15	სადოვრები ველური მცენარეულობა	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	10(4)
94	კალიფსო სკ 480 480 გ/ლ (თიაკლოპრიდი) (თ), (1)	0.08-0.10	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II ასაკის მატლების წინააღმდეგ მავნებლის 2 თაობაში (ივნისი-ივლისი). ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	20(2)	4(1)
	„ბაიერ აგ“ გერმანია 443/04/09/14/19	0.06	კომბოსტო	კომბოსტოს ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	20(1-2)	7(3)
		0.06	კიტრი	ბუერების კომპლექსი		20(1)	7(3)
		0.2	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა	30(1-2)	7(3)
		0.2-0.25 0.3-0.45 0.18-0.3	ვაშლი	ნაყოფჭამია ფოთლიხვევია ყვავილჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (მაისი- ივლისი), ხარჯვის ნორმა 800-1200 ლ/ჰა შესხურება კოკრების განცალკევების ფაზაში	30(-2) 28(2) -(1)	7(3)
		0.4-0.5	ციტრუსები	ბუერები, ცრუფარიანები ფარიანები ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით. ხარჯვის ნორმა 2000-2500 ლ/ჰა	30(1-4)	7(3) 7(3) 7(3)
95	კარატე 5 ეკ 50 გ/ლ (ლამბდაციგალოტრინი) (თ), (1) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 048/04/09/14/19	0.2 0.15-0.2	ხორბალი, ქერი	პურის ხოჭოები თრიფსები, ჭრიჭინოებები, რწყილები კუსებურა, ბუერები ხერხები, ჭიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		0.2	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
		0.4	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)
		0.4-0.8	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)
		0.3-0.4	კურკოვანების და თესლოვნების სანერგები	ფოთლიხვევები ბუერები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.1-0.2 0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი თეთრულა, ჩრჩილი რწყილები		30(1)	10(4)
		0.1	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.4	ჟოლო (სადედეები)	აბლაბუდიანი ტკიპა ბუერები ფოთლიხვევები		-(2)	10(4)
		0.5	მარწყვი (სადედეები)			-(2)	10(4)
		0.3-0.4	მოცხარი (სადედეები)			-(2)	10(4)

		0.2-0.4	ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ბადები, ქალაქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.1-0.15	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები (არაჯოგური ფორმები)		30(1)	10(4)
		0.2-0.4		კალიები ჯოგური ფორმები (ზრდასრული მატლები და იმაგო)		30(1)	10(4)
			სამკურნალო მცენარეები				
		0.1-0.12	(ბელადონა (შმაგა)	კოლორადოს ხოჭო		20(1)	10(4)
		0.1-0.12	შავბალახა (სათესლე ნაკვეთები)	ჭრიჭინოებლები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.1-0.15	ასკილი	ცხვირგრძელები ჭრიჭინოებლები ტკიპები და სხვ.	შესხურება ნერგებზე	-(2)	10(4)
		0.1-0.15	რევანდი (სამკურნალო)	რწყილები	შესხურება აღმოცენების პერიოდში, პირველი წლის ვეგეტაცია	-(1)	10(4)
		0.15	ხბოშუბლა	ცხვირგრძელები რწყილები		-(1)	10(4)
		0.1-0.15	ალპური კროალოსანა	ცხვირგრძელები რწყილები		-(1)	10(4)
		0.4	ლავანდა	ჭრიჭინოებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	10(4)
		0.3	სალბი (ხარისვარდა))	ცხვირგრძელები		30(2)	10(4)
		2.5-5 მლ/მ ²	წიწვოვნების მერქანი	მერქნის მავნებლების მატლების წინააღმდეგ	დამზადებული მერქნის დამუშავება (შტაბელების)	-(1)	10(4)
		0.4 მლ/მ ²	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობები და მარცვალგადასამუშავებელი მანქანა-იარაღები	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 50 მლ 1 მ ² -ზე. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მე-3 დღეს.	-(-)	-(-)
		0.8 მლ/მ ²	საწყობების და მარცვალგადასამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ ² -ზე	-(-)	3(3)
96	კარატე ზეონი 050 მკს 50 გ/ლ (ლამბდაციგალოტრინი) (თ), (1)	0.2	ხორბალი, ქერი	ხორბლის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	-(-)
	“სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ”	0.2	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
	შვეიცარია 490/08/12/17	0.4	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)

		0.4-0.8	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)
		0.3-0.4	კურკოვნების და თესლოვნების სანერგეები	ფოთლიხვევები, ბუგრები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		30(1)	10(4)
		0.1	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.2-0.4	ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ბაღები, ქალაქის მწვანე ნარგავი, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.1-0.15	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები (არაჯოგური ფორმები, ჯოგური ფორმების უმცროსი ასაკის მატლები)		30(1)	10(4)
		0.2-0.4	“	კალიები (ჯოგური ფორმები, ზრდასრული მატლები და იმაგო)		30(1)	10(4)
			სამკურნალო მცენარეები				
		0.1-0.12	(ბელადონა (შმაგა)	კოლორადოს ხოჭო		20(1)	10(4)
		0.1-0.12	შავბალახა (სათესლე ნაკვეთები)	ჭიჭინობელები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.1-0.15	ასკილი (ნერგები)	ცხვირგრძელები, ჭიჭინობელები, ტკიპები და სხვ.	შესხურება ნერგებზე	-(2)	10(4)
		0.15	ხბოშუბლა	ცხვირგრძელები, რწყილები		-(1)	10(4)
		0.1-0.15	ალპური კრიალოსანა	ცხვირგრძელები, რწყილები		-(1)	10(4)
		0.4	ლავანდა	ჭიჭინობელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	10(4)
		0.3	ხარისვარდა	ცხვირგრძელები		30(2)	10(4)
		2.5-5 მლ/მ2	წიწვოვნების მერქანი	მერქნის მავნებლების მატლების წინააღმდეგ	დამზადებული მერქნის დამუშავება (შტაბელების)	-(1)	10(4)
		0.4 მლ/მ2	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობები და მარცვალგადასამუ შა-ვებელი მანქანა- იარაღები	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება. ხარჭვის ნორმა 50 მლ 1 მ2-ზე. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მე-3 დღეს.	-()	-()
		0.8 მლ/მ2	საწყობების და მარცვალგადასამუ შა-ვებელი საწარმოების ტერიტორია		შესხურება. ხარჭვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-()	3(3)
97	კომფიდრიდი, წზგრ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1)	0,12-0,15	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(2)	7(3)
	“შენზენ კინგ ქუენსონ	0,12-0,15	კიტრი	სათბურის ფრთათეთრა	„	7(2)	7(3)

	ინდასტრი კო ლტდ” ჩინეთი 1395		(დახურული გრუნტი)	ბუგრები			
98	კონტიერი, სკ 240 გ/ლ (სპიროდიკლოფენი) (თ) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ლაკლარი ტოპ. იმლ.იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.” თურქეთი 1234	0.5-0.6	ვაშლი მსხალი	ხილის წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა, კუნელის ტკიპა მსხლის ჩვეულებრივი ფსილა	შესხურება კვირტის გახსნის და ვარდისფერი კონუსის სტადიაში	14(2)	7(3)
		0.4-0.5	ბალი, ალუბალი	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას, სიმწიფეში შესვლისას	14(2)	7(3)
		0.3-0.5	ვაზი	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება კვირტის გახსნისას, ყვავილობისა და მისი დასრულებისას	14(1)	7(3)
		0.5-0., 8	ციტრუსი	აბლაბუდიანი ტკიპა, ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას და სიმწიფეში შესვლისას	14(2)	7(3)
99	კონფიდორი წზკ 200, 200 გ/ლ (იმიდოკლოპრიდი)	0.2-0.3	ვაშლი	ბუგრები, ფსილები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
	(1) „ბაიერ აგ”	0.15-0.2	ვაზი	ყურმწის ჭია, ჭიჭინობელები	“	25(2)	7(3)
	გერმანია 460/04/12/16	0.15-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ვირუსების გადამტანი მწერები	“	30(2)	7(3)
		0.2-0.5	დეკორატიული კულტურე ბი (ვარდი)	ბუგრები, ჭიჭინობელები, ცხვირგრძელები	“	5(2)	7(3)
		0.2-0.3	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები (უფროსი ასაკის მატლები)	“	25(1)	1(-)
		0.05-0.1	“	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ლენტისებური მეთოდით	25(1)	1(-)
		0.2-0.25	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ბუგრები, პამიდორის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 300 ლ/ჰა	15(1)	10(3)
		0.2-0.5 0.2-0.25	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, კომბოსტოს თეთრულა ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	15(1)	7(3)
		0.2-0.25	კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრები	“	20(1)	7(3)
		0.5-1.25	ციტრუსები	ბუგრები, ცრუფარიანები, ფარიანები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით. ხარჯვის ნორმა 2000-2500 ლ/ჰა	30(1-4)	7(3)
100	კონფიდორ მაქსი წდგრ 70 700 გ/კგ	0, 1	ვაზი	ყურმწის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყურმწის ჭიის მატლების მიმართ	25(2)	7(3)

	(იმიდაკლოპრიდი) (1)						
	„ბაიერ აგ“ გერმანია 546/10/15	0.07-0, 1	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფჭამიას მატლების მიმართ.	20(4)	7(3)
		0.07-0.1		ვაშლის ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მიმართ	20(1-2)	7(3)
		0.1		კალიფორნიის ფარიანა, მენადმე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.07-0.1	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0.07-0.1	ატამი	ატმის ბუერი		20(1)	7(3)
		0.2	ციტრუსები	ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა		25(4)	7(3)
		0.2	ციტრუსები	ნარინჯისფერი (ჩაის) ბუერი		25(2)	7(3)
		0.04-0.05	პომიდორი	ბამბის ხვატარი, ბაღის ბუერი		20(1)	7(3)
		0.04-0.05	კიტრი	ბაღის ბუერი		20(1)	7(3)
		0.04-0.05	საზამთრო	ბუერები		20(1-2)	7(3)
		0.04-0.05	ვარდი	ბუერები		25(1-2)	7(3)
		0.04-0.05	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		25(1-2)	7(3)
101	კორაგენი, სკ 200 გ/ლ (ქლორანტრანილიპრო ლი) (თ) ფმს ინტერნეშნლ სვიტზერლანდ სარლ..” შვეიცარია 1033/18	0.15-0,3	ვაშლი , მსხალი	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი ქერცლოფრთიანი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას) ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	14 (2)	7(3)
		0.15-0,2	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას) ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
		0,2-0,6	თხილი კაკალი	თხილის ნაყოფჭამია, ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას) ხარჯვა-1000-1700 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
		0,25-0,55	ფოთლოვანი ბოსტნეული (არაჯვარყვავილოვ ანი)	კომბოსტოს ჩრჩილი ბამბის ხვატარი, კარადრინა, კომბოსტოს ხვატარი, ჭარხლის ალურა, თამბაქოს ფოთლისხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას) ხარჯვა-400 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
		0,04-0,06	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ხვატარები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400-	14(2)	7(3)

					500 ლ/ჰა		
		0,04-0,06 0,10-0,15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400- 500 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
		0,15-0,4 0,25-0,4 0,4-0,5	ნესვი, გოგრა, საზამთრო	ალურები ხვატარი კარადრინა, კომბოსტოს ხვატარი, ჭარხლის ალურა ციცქნა- ჩრჩილები, თამბაქოს ფრთათეთრა	„	7(2)	7(3)
		0,1-0,2	მზესუმზირა	მომღრნელი ხვატრები, მზესუმზირას ალურა მდელოს ფარვანა მზესუმზირას ხარაბუზა მზესუმზირას ქაცვფხა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 200- 700 ლ/ჰა	20(2)	7(3)
		0,1 -0,2	სიმინდი	შვედური ბუზი სიმინდის ფარვანა შემოდგომის ნათესების „ ხვატარი ბამბის ხვატარი	„	7(2)	7(3)
		0,25-0,4	სამკურნალო მცენარეები	ბამბის ხვატარი, ხვატარი კარადრინა, კომბოსტოს ხვატარი, ბალახის ხვატარი, სამხრეთის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400- 500 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
102	კრალი, ვკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი)	0.15-0.35	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(32)	-(3)
	(თ) (1) საფა ტარიმ ა.ს, “ თურქეთი 828/16	0.2-0, 3	ხორბალი. ქერი	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიჭურბელა, რწყილები, თრიფსები		20(2)	-(3)
		0, 3-0.4 0.15-0.2	შაქრის ჭარხალი	მომღრნელი ხვატრები მდელოს ფარვანა		-(4) 20(1)	7(3)
							7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი კარტოფილის ჭიამაია		20(2)	7(3)
		0.5	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები		7(3)	7 (3)
		0.4 0, 3	სოიო ლობიო ბარდა	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია მემარცვლია		20(2)	-(3)
		0.15-0.25	ჯვარყვავილოვანი კულტურები (სათესლე ნაკვეთები)	რაფსის ყვავილჭამია		-(3)	-(3)
		0.15-0.2	რაფსი	რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვავილოვან-თა რწყილები ბაღლინჯოები, თეთრულეები, ბუგრები		-(3)	-(3)
		0.2	კომბოსტო	თეთრულეები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(3)	7(3)

		0.25	იონჯა	ფიტონომუსი		20(2)	-(3)
		1.2-1.6 0.65-0.8	კიტრი პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა ბუგრები, თრიფსები		3(2)	2(-)
		0.25-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები [^] ყურძნის ჭია		25(3)	7(3)
		0.2-0.35	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფქამიები, ფოთლიხვევები [^] მსხლის ფსილა		25(3)	7(3)
		0, 8-1, 0	ალუბალი, ბალი	ცრუფარიანა		20(2)	
		0.25-0.35	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები	შესხურება გაზაფხულზე	20(1)	7(3)
		0.5	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები	“	20(2)	7(3)
		0, 2	მზესუმზირა	ბამბის ხვატარი	„	20(2)	7(3)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროკუდა, ფოთლის და წიწვის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდეულის – 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიშვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	-(3)
		0.01-0.05	მუხა	არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევები, მზომელები		-(1)	-(3)
		0.05	ნაძვი	ჩვეულებრივი ნაძვის ხერხია		-(1)	1(1)
		0.08 0.016 0.04	ფიჭვი	ფიჭვის მეფისე ფიჭვის წითური ხერხია ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)		-(1)	1(1)
		0.04-0.1	ფიჭვი	ფიჭვის დიდი ცხვირგარძელა	ნერგების შესხურება დარგვის წინ	-(1)	-(3)
		0.05-0.1	ქალაქის მწვანე ნარგობა	არაფარდი პარკ-ხვევია, ჩრჩილები, მღრღნელი მავნებლები	მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.01% სამუშაო ხსნარით	7(1)	-(3)
		0.1-0.2	სამოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენის პერიოდში	20(1)	-(3)
103	კუმულუსი დფ, წდგრ 800 გ/კგ (გოგირდი) (3) “ზასფი სე” გერმანია 026/08/12/18	3-5	ციტრუსები	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(2)	4(1)
104	კუნგ - ფუ, კვ 50 გ/ლ (ლამბდა- ციგალოტრინი) (თ), (1)	0.2 0.15-0.2	ხორბალი ქერი	პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭრიჭინოებლები, რწყილები, კუსებურა, ბუგრები, ხერხები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)

	“აგრიკო გრუპ ლტდ”			ჭიაწურბელა			
	ბულგარეთი 729/14/19	0.2	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
		0.4	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)
		0.4-0.8	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)
		0.3-0.4	კურკოვანების და თესლოვნების სანერგები	ფოთლიხვევები, ბუგრები ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.1-0.2 0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი რწყილები		30(1)	10(4)
		0.1	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.25-0.45	ახალგაზრდა, არამსხოიარე ბაღები, ქალაქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები	ფოთლის მღრღნელი მავნებლები		-(2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.25-0.45	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები ჯოგური ფორმები (ზრდასრული მატლები და იმაგო)		30(1)	10(4)
		2.5-5 მლ/მ2	წიწვოვნების მერქანი	მერქნის მავნებლების მატლების წინააღმდეგ	დამზადებულ-მერქნის დამუშავება (შტაბელების)	-(1)	10(4)
		0.4 მლ/მ2	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობები და მარცვალგადასამუ შავებელი მანქანა- იარაღები	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება. ხარჭვის ნორმა 50 მლ 1 მ2-ზე. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მე-3 დღეს.	-(-)	-(-)
		0.8 მლ/მ2	საწყობების და მარცვალგადასამუ შავებელი საწარმოების ტერიტორია		შესხურება. ხარჭვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-(-)	3(3)
105	კუპპონ 800, ეკ (პარაფინის ზეთი 800 გ/ლ) (1) “ვეფა ტარიმ ილაკლარი ქიმიკა ვე სიდა სან. ტიკ. ა.ს.” თურქეთი 1421	30-36 15-18	ატამი ვაშლი, მსხალი	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ჩრჩილები ფსილები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) და ზაფხულში . ხარჯვა- 1200- 1500 ლ/ჰა	-(1-2) 21(1)	7(3)
		22,5-30	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა- 1500-2000 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
106	კურუ - კურა 100 ეკ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0.25 0.45	ვაზი	ყურმნის ჭია ტკიპები ფოთლიხვევები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.025 - 0.05%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)

	„ერტარ ქიმია ტარიმ ერნ. ალელტერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1286	0.35-0.0,5	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ტკიპები ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ 0.045 %-0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0,6	ატამი	ატმის მწვანე ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.5 0,7	პამიდორი ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ბამბის ხვატარი, ფრთათეთრა ტკიპები ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამონასკვამდე) 0,05- 0,07%-იანი სამუშაო ხსნარით	15(1)	10(4)
		0,25-0,35	კომბოსტო	ბუგრები, ჩრჩილები, თეთრულა		15 (1)	10 (4)
		0,7-1	სოია	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა ბამბის ხვატარი თამბაქოს ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	10(4)
		0.15-0.3 0.2-0.35	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭოები, ბუგრები, თრიფსები,ჭრიჭინოებელ ები, ჭიაწურბელა პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.05 %-იანი სამუშაო ხსნარით აღმონაცენების შესხურება	20(1) -(1)	10(4)
		0,6	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	21(2)	10(4)
		0,7-1	ციტრუსი	ყავისფერი მარმარილოს სუნნიანი ბაღლინჯო	„	21(2)	10(4)
		0,3	სიმინდი	ყავისფერი მარმარილოს სუნნიანი ბაღლინჯო	„	21(2)	10(4)
107	ლავანტე 20 სგ 200 გ/კგ (პირიდაბენი) (3) „სანსეტ ქიმია ტარიმ ურუნლერი ვე ალელტერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1147	0.5-0.9	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.5-0.75	ვაზი	„		30(2)	7(3)
		0.75-1.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა		30(2)	7(3)
		0,45-0,6	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა ჟანგა ტკიპა		10(2)	7(3)
108	ლამბდა CY, კკ 50 გ/ლ (ლამბდაციპა- ლოტრინი) (თ), (1) „უპლ ზირაატ ვე ქიმია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 1220	0.3	ხორბალი, ქერი	პურის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)

		0.3	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა	„	30(1)	10(4)
		0, 7-0.8	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ბუგრები	„	25(2)	10(4)
		0.4	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	„	20(2)	10(4)
		0.3	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი,	„	30(1)	10(4)
		0.4	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		0.7-0.8	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები, ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		0, 3	ჭარხალი	ხვატრები, ბუგრები, ცხვირგრძელები	„	25(2)	10(4)
		0, 3	ლობიო	მემარცვლელები ბუგრები	„	30(1)	10(4)
109	ლამდექსი, მკს 50 გ/ლ (ლამბდაციპა-ლოტრინი) (თ), (1) „ადამა აგრიკალჩერ ზვ“ ნიდერლანდები 1328	0,15-0,2	ხორბალი	პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინობელები, მავნე კუსებურა, ბუგრები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1-2)	10(4)
		0, 4-0.5	ვაშლი, მსხალი	ვაშლის ნაყოფჭამია ბუგრები, ფოთლიხვევიები, მოწეული წითელი რინქიტი, ფოთლის რინქიტი, ყვავილჭამიები	„	25(2)	10(4)
		0.4-0.5	თხილი, კაკალი	მავნებლების კომპლექსი	„	30(1-2)	10(4)
		0,2-0.3	ხახვი სტაფილო	ხვატრები, თრიფსები, ბუზები, რწყილები ჩრჩილი,	„	30(1-2)	10(4)
		0.35-0.4	ვაზი	ყურძნის ჭია	„	30(3)	10(4)
		0, 2-0,4	ჟოლო (სადედეები)	მავნებლების კომპლექსი	„	-(1-2)	10(4)
		0,2-0, 3	ხურტკმელი (სადედეები)	მავნებლების კომპლექსი	„	-(1-2)	10(4)
110	ლანატი 20 ს 200 გ/ლ (მეთომილი)	1-1,2	ვაზი	ფოთლიხვევიები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	20 (3)	7(3)
	„დიუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ.“	1,8-2,2	ატამი	ატამის ნაყოფჭამია ატამის მწვანე ბუგრი	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	20 (3)	7(3)
	შვეიცარია 547/10/16	1,8-2,2	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები, ბუგრები	„	20 (3)	7(3)
		0,8-1,2	სიმინდი	მომღრნელი ხვატრები სიმინდის ღეროს ფარვანა, ბამბის ხვატარი	მესხურება აღმოცენების პერიოდში. ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მავნეობის ეკონომიკური ზღვარის მიღწევისას. ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა	7 (1)	7(3)
		0,8-1,2	მზესუმზირა	მომღრნელი ხვატრები	მესხურება აღმოცენების	20 (1)	7(3)

				ცხვირგრძელები (ჭარხლის რუხი და სხვ.) მდელოს ფარვანა მზესუმზირას ალურა	პერიოდში მავნებლის მავენობის ეკონომიკური ზღვარის მიღწევისას. ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მავენობის ეკონომიკური ზღვარის მიღწევისას. ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა მესხურება მატლების გამოჩევისას (ყვავილობის პერიოდში)		
		2.5-3.0	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		1.25	თამბაქო	თამბაქოს თრიფსი, ბუგრები, ბამბის ხვატარი	მესხურება მავნებლის გამოჩენის პერიოდში ხარჯვა- 300-600 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		1.25	პომიდორი	მწუწნი და მჩხვლეტმწუწნი მავნებლები (ბამბის ხვატარი, ბუგრები)	მესხურება მავნებლის გამოჩენის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე. ხარჯვა- 500-1000 ლ/ჰა	7(1-2)	7(3)
		1.25	კიტრი	მწუწნი და მჩხვლეტმწუწნი მავნებლები (ქერცლოფრთიანები ბაღის ბუგრი)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 500-1000 ლ/ჰა	7(1-2)	7(3)
		1.25	ყაბაყი	მწუწნი და მჩხვლეტმწუწნი მავნებლები (ქერცლოფრთიანები ბაღის ბუგრი)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-500- 1000 ლ/ჰა	7(1-2)	7(3)
		1.25	ისპანახი	ფარვანები, ხვატრები კოლოფის ჭია ბუგრები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა- 500-1000 ლ/ჰა	21 (1-2)	7 (3)
		1.25	სალათი	ქერცლოფრთიანები ბუგრები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა-300- 800 ლ/ჰა	21(1-2)	7(3)
		1.25	ნესვი	მწუწნი და მჩხვლეტმწუწნი მავნებლები (ქერცლოფრთიანები ბუგრები)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა- 300- 600 ლ/ჰა	14(1-2)	7(3)
		1.25	საზამთრო	მწუწნი და მჩხვლეტმწუწნი მავნებლები (ქერცლოფრთიანები ბუგრები)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა-500- 1000 ლ/ჰა	14 (1-2)	7(3)
		1.25	ბადრიჯანი	მწუწნი და მჩხვლეტმწუწნი მავნებლები (ქერცლოფრთიანები ბუგრები)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა-500- 1000 ლ/ჰა	7 (1-2)	7(3)
		1.25	მწვანე ლობიო ბარდა	ბამბის ხვატარი, ფარვანები, ბუგრები, ტილები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვა-500- 600 ლ/ჰა	10 (1-2)	7(3)
111	ლოკ-5, ეკ 50 გ/ლ (ლამბდა- ციპალოტრინი)	0.6	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფქამია, ბუგრები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	10(4)

	(თ), (1) „ალფა ლაიფ საიენს კორპორეიშენს“ ინდოეთი 1402						
		0.5	ვაზი	ყურნის ჭია, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.6	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა		20(2)	10(4)
		0.4	პამიდორი (ღია გრუნტი)	კოლორადოს ხოჭო		20 (2)	10(4)
		0.4	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		20 (2)	10(4)
		0.3-0.4	ხორბალი	პურის ბზუალა		20(1)	-(-)
		0.4	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(3)	10(4)
		0.4	ლობიო	მემარცვლიები, ბუგრები		30(1)	10(4)
112	ლოკოციდი, გრ მის 60 გ/კგ (მეტალდეჰიდი) (თ) „ერთარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალელერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“ თურქეთი 1300	15 კგ	კიტრი, პამიდორი, ცერეცო, კენკროვნები, საზამთრო, ვაზი, დეკორატიული მცენარეები,	ლოკოკინები და ლოფორთქინები	გაფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე, რიგთაშორის და ბილიკებზე, მავნებლის გამოჩენისთანავე	20(1)	10(4)
113	ლორკანი, ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1) „მაკკინლი ტრეილინგ ლკ“ ირლანდია 1450	0.15	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.2	ხორბალი. ქერი, შვრია	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები		20(2)	-(3)
		0.3-0.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი კარტოფილის ჭიამაია ბუგრები		20(2)	7(3)
		0.3	სოიო	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია		20(2)	-(3)
		0.15-0.2	რაფსი	რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვავილოვანთა რწყილები ბაღლინჯოები, თეთრულები, ბუგრები		-(3)	-(3)
		0.15	კომბოსტო	თეთრულები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(3)	7(3)
		0.2	იონჯა	ფიტონომუსი		20(2)	-(3)
		1-1.6	კიტრი პამიდორი წიწკა	ფრთათეთრა ბუგრები, თრიფსები		15(2)	2(-)
		0.2-0.3	ვაზი	ფოთლიხვევიები		25(3)	7(3)

		0.15-0.3	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევები		25(3)	7(3)
		0.2-0.3	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები ბახჩელის ჭიამაია	შესხურება გაზაფხულზე	20(1)	7(3)
		0.4	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები	“	20(2)	7(3)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროკუდა, ფოთლის და წიწვის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	-(-)
		0.01-0.05	მუხა	არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევები, მზომელები		-(1)	-(-)
		0.05	ნაძვი	ჩვეულებრივი ნაძვის ხერხია		-(1)	1(1)
		0,015-0.08	ფიჭვი	ფიჭვის მეფისე ფიჭვის წითური ხერხია ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)		-(1)	1(1)
		2-4 მლ/მ2	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები	შესხურება შტაბელეზად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	-(-)
		0.05-0.1	ქალაქის მწვანე ნარგავი	არაფარდი პარკხვევია, ჩრჩილები, მღრღნელი მავნებლები	მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.01% სამუშაო ხსნარით	7(1)	-(-)
		0.1-0.15	საძოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკის პერიოდში	20(1)	-(3)
114	ლოქსლი 240 უმშ 240 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) “პარიჯატ ინდასტრის პეტ ლტდ” ინდოეთი 1272	1,0	საძოვრები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები (უფროსი ასაკის მატლები და იმაგო)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
115	ლოქსლი, ხ-უმშ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) “პარიჯატ ინდასტრის პეტ. ლტდ” ინდოეთი 548/10/15	0,5	საძოვრები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები (არაჯოგური)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
116	ლუფოქსი 105 ვკ 30 გ/ლ+75 გ/ლ (ლუფენურონი+ფენოქსი კარბი) (თ), (3) „სინგენტა კროპ	1	ვაზი	ფოთლიხვევები	პროფილაქტიკური შესხურება თითოეული თაობის კვებების გადაფრენის დაწყებიდან კვერცხების დადებამდე: მე-2 თაობის წინააღმდეგ 1	21 (1-2)	7(3)

	პროტექშნ აგ“ შვეიცარია 1159				დამუწავება, ხოლო მე-3 თაობის წინააღმდეგ 2 დამუშავება 21 დღიანი ინტერვალით		
117	მავრიკი , წე 240 გ/ლ (ტაუ-ფლუვალინატი) (თ), (3)	0.8-1.6 0.6-1.2 0.25-0.4	ვაშლი ვაზი	ნაყოფჭამია ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2) 30(2)	7(3) 7(3)
	„ადამა აგრიქალზა ბ.ვ.“	0.1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	“	30(2)	7(3)
	ნიდერლანდები 784/15	0.2	ხორბალი, ქერი	ბუგრები, ჭიაწურბელა, მავნე კუსებურა, მარცვლოვნების ბუზები, შვედური ბუზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	-(-)
		0.1	სამოვრები და ველურად მოზარდი მცენარეები	კალიები	შესხურება ახალგაზრდა მატლების მასობრივი გამოჩევის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.1	ახალგაზრდა ხეხილის ბაღები, ქალაქის პარკებისა და სკვერების მცენარეულობა	ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყოველი გენერაციის მატლების წინააღმდეგ	30(2)	7(3)
		0.5	ვარდი ეთერზეთოვანი	ბუგრები მზომელა, ოქროკუდა, ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0.1	ფიჭვი	წითურა ფიჭვის ხერხია	ავიაშესხურება. დაშვებულია მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდულის-3 დღეში. ბალახის გათიბვის შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	1(1)
118	მაიტ - კილერი, სფ 200გ/კგ (პირიდაბენი) (თ),(3) “აგრიკო გრუპ ლტდ” ბულგარეთი 730/14/19	0.5-0.9 0.5-0.75 0.75-1.5	ვაშლი ვაზი ციტრუსები	ტკიპები წითელი ტკიპა ვერცხლისფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1) 30(2) 30(2)	7(3) 7(3) 7(3)
119	მალათიონი 65% ემ, ეკ 650 გ/ლ (მალათიონი) (თ), (1) “კორუმა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს” თურქეთი 1265	1,2-1,5 1,5	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი ვაზი	ბუგრები, ფოთლიხვევიები, ხეხილები, მზომელები, ჩრჩილები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები, ცხვირგრძელები, ნაყოფჭამიები, ალუბლის ბუზი, ოქროკუდა, მსხლის (ვაშლის) ბაღლინჯო, რგოლურა პარკხვევია ვაზის ფეკილისებრი ცრუფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2) 20(2)	10(4) 10(4)

		1,7-2,0 4,5 200 მლ/100 მ2	ბოსტნეული	თეთრულები, კომბოსტოს მორთული ბადლინჯო, ხვატარი, ჩრჩილი, ბუზები, თრიფსები, ფრთათეთრა, ფარვანა ტკიპები შესანახი საწყობის დამუშავება		20(2)	10(4)
		0,6-1,2	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ტკიპები, ბუგრები, ფრთათეთრა, ყლორტის ბუზი, თრიფსები,		20(2)	10(4)
		1,7-2,5	სოიო, ლობიო	ბუგრები, ტკიპები, ფოთოლ ჭამიები, ხვატრები, მდელოს ფარვანა, მემარცვლები, პარკოსანთა (აკაციის) ალურა, ბედლის მავნებლები ბოსტნეულის მწვანე ფაროსანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		0,85	დეკორატიული მცენარეები	ბუგრები		7(1)	10(4)
		0,5	ვარდი ეთერზეთოვანი	ბუგრები		7(1)	10(4)
		1,2	ყაყაჩო	ფესვის ცხვირგრძელა		7(1)	10(4)
		2 200 მლ/100 მ2	სიმინდი	კარადრინა ბედლის მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტერიტორიის დამუშავება	20(2)	10(4)
		200 მლ/100 მ2	მარცვლეული	შენახული მარცვლისა და მარცვალპროდუქტების მავნებლები	ტერიტორიის დამუშავება	7(1)	10(4)
120	მალაფოსი, ეკ 500 გ/ლ (მალათიონი) (თ), (1) “პარიჯატ ინდასტრის პვტ.	1	ვაშლი, მსხალი, კომში	ბუგრები, ფოთლისხვევიები, ხერხიები, მზომელები, ჩრჩილები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
	ლტდ” ინდოეთი 549/10/15	1	ბალი, ალუბალი, ქლიავი	ბუგრები, ცხვირგრძელები, ნაყოფჭამიები, ხერხიები, ალუბლის ბუზი		20(2)	10(4)
		0,6-1,2	კომბოსტო	თეთრულები, ხვატარი, ჩრჩილი, ბუზები, თრიფსები, ფრთათეთრა		20(2)	10(4)
		0,6-1,2	კიტრი (ღია გრუნტი)	ტკიპები, ყლორტის ბუზი, თრიფსები, ბუგრები, ფრთათეთრა,		20(2)	10(4)
		0,6-1,2	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები, ბუგრები, ფრთათეთრა		20(2)	10(4)
		0,4	ნესვი, საზამთრო	ნესვის ბუზი, ბალის ჭიამაია, ბუგრები, ტკიპები		20(2)	10(4)
		1-1,8	თამბაქო	ბადლინჯოები, ბუგრები, ტრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(2)	10-13 (4)

		0,2-0,6	იონჯა (სათესლე ნაკვეთები) სამყურა (სათესლე ნაკვეთები)	ბაღლინჯოები, ბუგრები, სქელფეხები, ცხვირგრძე-ლები, მდელოს ფარვანა, ხვატარები, ალურები, მეგალები		30(2)	-(4)
		0,6-0,8	შხესუმზირა	ბაღლინჯოები, ბუგრები		20(2)	10(4)
		0,6-1	სოიო, არახისი, ქინძი	ბუგრები, ტკიპები, ფოთოლ ჭამიები, ხვატარები, მდელოს ფარვანა		20(2)	10(4)
		2-3	სადოვრები (კალიებით დასახლებული ნაკვეთები), ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მეორე თაობის მატლების განვითარებისას	20(2)	10(4)
		1-2,6	კენკროვნები (ჟოლო, ქაცვი)	მავნე მწერები, ტკიპები	ნერგების, მწვანე კალმების ჩაძირვა ერთი წუთით 0,3% სამუშაო ნაზავში	-(1)	10(4)
		0,5-მლ/მ2	ქამა სოკო (სამსხმოიარო კამერები)	სოკოს ბუზები, კოლონები, ტკიპები	სამსხმოიარო კამერებში კედლებისა და იატაკის პერიოდული შესხურება	1(-)	10(4)
		1,5-1,6	მწვანე ნარგაობა, ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	წიწვებისა და ფოთლების მღრნელი მავნებლები, (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (მეწევი პირუტყვის დაშვება 10 დღის შემდეგ)	1(-)	1(1)
		0,6-0,9	ფიჭვი, ლარიქსი	ხერხიები		1(-)	1(1)
		0,8 მლ/მ2	ჩაუტვირთავი სასაწყობე შენობები, მარცვალგა-დამამუშავებელ საწარმოთა მოწყობილობა	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება, (ადამიანების დაშვება და საწყობების დატვირთვა 24 სთ განიავების შემდეგ)	-(-)	1(1)
		1,6 მლ/მ2	მარცვალგა-დამამუშავებელ საწარმოთა და მარცვალშემ ნახავი მეურნეობების ტერიტორია			-(-)	1(1)
		12-30 მლ/მ2	სასურსათო პურული, მარცვალი, პარკოსანი კულტურების თესლი	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება, (ადამიანების დაშვება 24 სთ განიავების შემდეგ) თესლის სასურსათოდ გაცემა დაშვებულია როცა პრეპარატის ნაშთი არ აღემატება მმდ-ს	-(-)	-(-)
		0,6 მლ/მ2	ფქვილი, ბურღული ტომრებში	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება, (ადამიანების დაშვება და საწყობების დატვირთვა 24 სთ განიავების შემდეგ)	-(-)	-(-)
121	მასაი, წზფ 200 გ/კგ (ტებუფენპირადი) (თ), (3)	0.375-0.5	ვაშლი	ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში-გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამორეკისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)

	“ზასფი აგრო ბვ” შვეიცარია 589/13/18						
		0.25-0.375 0.375-0.5	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ვაზის ქერის ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
		0.25-0.375	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში-	10 (2)	7(3)
		0.4	კიტრი პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ტკიპები		5 (2)	7(3)
		0.6-0.8	ციტრუსები	ტკიპები		20 (2)	7(3)
		0.375	ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა	ტკიპები		- (2-3)	7(3)
122	მატადორი 250 ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი)	0.35	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-დღიანი ინტერვალით	20(3)	-(3)
	(თ), (1) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1137	0.2-0,3	ხორბალი	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები		20(2)	-(3)
		0,3-0.4	შაქრის ჭარხალი	მომღრღნელი ხვატრები მდელოს ფარვანა, ბუგრები		20(1)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.3-0,4	სოიო, ბარდა, ოსპი	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია მემარცვლეები		20 (2)	7(3)
		0.25	მზესუმზირა	ჩრჩილები		20 (2)	7(3)
		0.16	კომბოსტო	თეთრულები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(2)	7(3)
		1.2-1.6	კიტრი პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა ბუგრები, თრიფსები		3 (2)	2 (-)
		0.25-0.4	ვაზი	ყურძნის ჩია		25(3)	7(3)
		0,25-0.35	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები ამერიკული თეთრი პეპელა		25(3)	7(3)
		0.25-0.35	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები	შესხურება გაზაფხულზე	20 (1)	7(3)
		0.5	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები	“	20 (2)	7(3)
		0.4	სამოვრები, ველური	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკის	20(1)	7(3)

			მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები		პერიოდში		
		0,4	დეკორატიული მცენარეები	ბოლქვის ბუჩი		-(2)	-(3)
123	მგფოს ალ აბი 56% 560 გ/კგ (ალუმინის ფოსფიდი) (თ), (1) „ნინგბო ჯენერიკ ქემიკალ კო. ლტდ“ ჩინეთი 1369	5გ/მ³ (2აბი)	ჩატუტვირთავი მარცვალსაცავები	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიაგაცია 15-160C-ის დროს ექსპოზიცია 5 დღე. პერსონალის დაშვება მოხდება მხოლოდ განიავების შემდეგ, როცა ფოსფინის შემცველობა სამუშაო ზონის ჰაერში არ აღემატება ზღვ-ს.	-(1)	7(3)
		9გ/მ³ (3აბი)	მარცვალი (სასურსათო, სათესლე, საფურაჟე)	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 10 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1-)	-(-)
		6 გ/მ³ (2აბი)	ფქვილი, ბურღული საწყობში ან პოლიეთილენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		5 გ/მ³ (2აბი)	მშრალი ბოსტნეული საწყობში ან პოლიეთილენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 5 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		2,4 გ/მ³ (1აბი)	მარცვლოვანი ან პარკოსანი კულტურების მარცვალი გემისა და ტანკერების ტრიუმებში, ნავსადგურებში	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიაგაცია 15-160C-ის დროს, ექსპოზიცია ფიტოექსპოფუმი-გაციის" ტექნო-ლოგიის გამოყენებით-16 დღე; რეცირკულაციის მეთოდით 1 დღე. დეგაზაცია რეისის დროს და დრეიფის დროს; მარცვლის დათვალიერება და დატვირთვა მოხდება მაშინ, როცა ფოსფინის შემცველობა მარცვლის ზედაპირიდან 0,5-1 მ სიმაღლეზე 0,1 მგ/მ³-ია. დეალიზაცია მოხდება როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს. ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, როცა ჰაერში ფოსფინის შემცველობა არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	-(-)
124	მედალ გოლდი , სკ 247 გ/ლ (თიამეთოქსამი 141 გ/ლ+ ლამბდა-ციგალოტრინი 106 გ/ლ)	0.2	ხორბალი, ქერი	პურის ხოჭოები, თრიფსები, , ბუგრები, ბაღლინჯოები, ბუზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-600 ლ/ჰა	30(2)	7(3)

	(თ), (1) „პარიჯატ ინდასტრიზ(ინდოეთი) პვტ ლტდ“ ინდოეთი 1303						
		0, 2-0.3	სიმინდი	ბუგრები	„	30(2)	7(3)
		0,2	კარტოფილი	ბუგრები, კოლორადოს ხოჭო	„	14(2)	7(3)
		0,2	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ფრთათეთრა, ბუგრები		14(2)	7(3)
		0,2	კიტრი	ბუგრები	„	14(2)	7(3)
		0.2-0,3	ვაშლი	ნაყოფჭამიები ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-1000-15200 ლ/ჰა	20(3)	7(3)
		0,6	პამიდორი კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(2)	7(3)
125	მედალი, წდგრ 250 გ/კგ (თიამეთოქსამი) (თ), (1)	0.06-0.08	კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიური ზღვარის მიღწევას	14(1)	7(3)
	“პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 502/09/15	0.1-0.6	კიტრი, პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ბუგრები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,01-0,02% ხსნარით	3(1)	7(3)
		0.1-0.4	ვარდი (ღია გრუნტი)	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	7(3)
		0.8-1.6		თრიფსები		14(1)	7(3)
		01-04	ვარდი (დახურული გრუნტი)	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(3)	-(-)
		1.6		თრიფსები		3(3)	-(-)
		0.1-0.5	დეკორატიული ყვავილოვანი კულტურები	ბუგრები, ფრთათეთრა, ფარიანები		3(3)	-(-)
		0.06-0.08	ხორბალი, ქერი	ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, მავნე კუსებურა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიური ზღვარის მიღწევას აღმონაცენების შესხურება	30(1)	-(-)
		0.1-0.15		პურის ხოჭო		-(1)	7(3)
		0.1	სამარცვლე პარკოსნები	მემარცვლეები, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	7(3)
126	მენსზანი 4 კვ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოს- ეთილი) (1) „მენტა ტარიმ ილაკლარი სან ვე ტიკ ლტდ სტი.“ თურქეთი 1205	1, 5-2, 5	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები, მსხლის მემკჰმანე ბაღლინჯო, მაჟაურა	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	30(2)	10(4)

				ბურტყლა ბუგრი, პეწიანა			
		1, 5-2, 5	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	30(1)	10(4)
		1, 5-1, 8	ზეთისხილი	ზეთისხილის ცხვირგრძელა ზეთისხილის ჩრჩილი, ზეთისხილის ბუგრები, ზეთისხილის ბუზი თუთის მოყვითალო ჭიჭინოზელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (1)	10(4)
		1, 5-3	ვაზი	ყურჯნის სია, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		1-1.5	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მარცვლეულის მენადმე ჩრჩილი, პურის ბზუალა, ბელლის ცხვირგრძელა, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		1-1.5	სიმინდი	სიმინდის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		1	1.5
		0.5-1, 5	სამარცვლე პარკოსნები	ბამბის ხვატარი, ალურები, მემარცვლეები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.6-1.0	ბოსტნეული	ბამბის ფრთათეთრა, კომბოსტოს თეთრულა, ბამბის ხვატარი, კოლორადოს ხოჭო, ხახვის ფსილა, ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
		1, 5	მზესუმზირა	ბამბის ხვატარი		20(1)	10(4)
		0.5-1	შაქრის ჭარხალი	ბოლოფეხიანები, ტუჩფეხიანები, ტკაცუნა, ხვატარი, ჭარხლის ბაღლინჯო, ნიადაგის მავნებლები, ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
127	მენსპანი , ეკ 500 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) „რაისტარ კროპპროტექშენ პტი ლტდ“ ავსტრალია 1420	1,5-2	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ბუგრები, ტკიპები, ცრუფარიანები,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40 (2)	10(4)
		1.5-2	ვაზი	ყურმნის ჭია, ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის 1 თაობის წინააღმდეგ. ხარჯვის ნორმა 800-1200 ლ/ჰა	40 (2)	10 (4)
		1-1.2	პამიდორი	ბუგრები კოლოფის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	10 (4)

		0,9-1,2	კარტოფილი	ხვატრები		30 (2)	10 (4)
128	მერთონი, წდგრ (გოგირდი 800 გ/კგ) (3) „მაკკინლი ტრედიინგ ლპ“ ირლანდია 1483	3.0-5.0	ვაზი	გალეზიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(1-2)	-(-)
		3.0-5.0	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, კუნელის ტკიპა, ხეხილის წითელი ტკიპა	„	1(1-2)	-(-)
129	მისტი, წდგრ 250 გ/კგ (თიამეთოქსამი) (თ), (1) აგრო ლაიფ საიენს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1397	0.4-0.5	კიტრი, პამიდორი, (დახურული გრუნტი)	სათურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(2)	3(-)
130	მოვენტო სკ 100 100 გ/ლ	0.75-1, 5	ვაზი	ვაზის ფქვილისებრი ცრუფარიანა ვაზის ფილოქსერა თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(2)	7(3)
	(სპიროტეტრამატი) (თ) “ზაიერ აგ” გერმანია 956/16	0,75-1 1-2,25	ვაშლი	ვაშლის ფსილა, ბუგრები (ვაშლის მწვანე ბუგრი, ვაშლმარცვლოვანთა ბუგრი, ვაშლის ხოლგზიანი ბუგრი) ფარიანები (მათ შორის კალიფორნიის ფარიანა) და ცრუფარიანები, ტკიპები		21(2)	7(3)

		0,75-1 1-2,25	მსხალი	მსხლის ფსილა, ბუგრები (ვაშლის მწვანე ბუგრი, ვაშლმარცვლოვანთა ბუგრი, მსხლის ფოთლმზვიარა ბუგრი) ბურტყლა ბუგრი ფარიანები (მათ შორის კალიფორნიის ფარიანა) და ცრუფარიანები, ტკიპები		21(2)	7(3)
		1 1-2,25	ქლიავი გარგარი, ალუბალი, ალუჩა	ბუგრები ბუგრები ფარიანები		21(2)	7(3)
		1, 75-2, 25	ციტრუსი	ვაზის ფქვილისებრი ცრუფარიანა, ციტრუსის წითელი ფარიანა, ციტრუსის მწვანე ბუგრი, ბაღის ბუგრი		14(2)	7(3)
		0, 5-1.0	პამიდორი წიწკა	ორანჟერეის ფრთათეთრა ტკიპები თამბაქოს ფრთათეთრა		3(2)	7(3)
		0,5-1,0	კიტრი	ბუგრები, თრიფსები, ტკიპები	“	7(2)	7(3)
		0,5-1,0	ხახვი	ხახვის თრიფსი	“	3(2)	7(3)
		0.5-1.0	კომბოსტო (ყველა სახეობა)	ბუგრები, თრიფსები, ფრთათეთრა	“	7(2)	7(3)
		0,5-1,0	სალათა (ყველა სახეობა)	ატმის ბუგრი, სალათის მწვანე ბუგრი, ბაღის ბუგრი	“	7(2)	7(3)
131	მოსეტამი 20 წზფ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3) “ საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 659/14/19	0,2	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
		0,25		ბამბის ხვატარი		20(1)	1(-)
		0.15-0.3	პამიდორი,	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(1)	1(-)

			კიტრი (დახურული გრუნტი)				
		0.05-0,075	ხორბალი	ბაღლინჯო, მავნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0.15-0,35		კურის ბზუალა		14(1)	-(-)
		0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		0.1-0.125		კარტოფილის ჭიამაია		14(1)	3(3)
		0.06-0,1	საძოვრები კალიებით დასახლებულ-ლი მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეუ-ლობა	კალიები	შესხურება მავნებლის მატლის განვითარების სტადიაში	28(1)	3(3)
132	ნემასოლი, წხ 510 გ/ლ (მეტამსოდიუმი) “ტამინვო ზვბა” ბელგია 560/10/15	60-120 გ/კვ.მ.	კიტრი, პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი), დეკორატიული კულტურები	ნიადაგის მავნებლების კომპლექსი	მექანიზებული შეტანა 20 სმ სიღრმეზე და ნიადაგის დაფარვა ცელოფანის აპკით. თესვა ან რგვა 30 დღის შემდეგ	-(1)	30(30)
		80-120 გ/მ2	მრავალწლიანი კულტურების სანერგეები	“	“	-(1)	30(30)
133	ნივათიონი 60 კვ 650 გ/ლ (მალათიონი) (თ), (1) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ.იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.”	1, 2-1, 5	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	ბუგრები, ფოთლიხვევიები, ხერხიები, მზომელები, ჩრჩილები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები, ცხვირგრძელები, ნაყოფჭამიები, ალუბლის ბუზი, ოქროკუდა, მსხლის (ვაშლის) ბაღლინჯო, რგოლურა პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
	თურქეთი 1255	1, 5	ვაზი	ვაზის ფქვილისებრი ცრუფარიანა		20(2)	10(4)
		0, 6-1, 2	კომბოსტო	თეთრულეები, კომბოსტოს მორთული ბაღლინჯო, ხვატარი, ჩრჩილი, ბუზები, თრიფსები, ფრთათეთრა, ფარვანა		20(2)	10(4)
		0, 6-1, 2	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ტკიპები, ბუგრები, ფრთათეთრა, ყლორტის ბუზი, თრიფსები,		20(2)	10(4)
		0, 4	ნესვის, საზამთრო	ნესვის ბუზი, ბაღის ჭიამაია, ბუგრები, ტკიპები, ხოჭოები		20(2)	10(4)
		0, 6-1 1, 7	სოიო, ლობიო	ბუგრები, ტკიპები, ფოთოლ ჭამიები, ხვატრები,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)

				მდელის ფარვანა, მემარცვლები, პარკოსანთა (აკაციის)ალურა, ბელის მავნებლები ბოსტნეულის მწვანე ფაროსანა			
		0, 85	დეკორატიული მცენარეები	ბუგრები		7(1)	10(4)
		0, 5	ვარდი ეთერზეთოვანი	ბუგრები		7(1)	10(4)
		1, 2	ყაყაჩო	ფესვის ცხვირგრძელა		7(1)	10(4)
		2 200 მლ/100 მ2	სიმინდი	კარადრინა ბელის მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტერიტორიის დამუშავება	20(2)	10(4)
		200 მლ/100 მ2	მარცვლეული	შენახული მარცვლისა და მარცვალპროდუქტების მავნებლები	ტერიტორიის დამუშავება	7(1)	10(4)
134	ნომოლტი, კს 150 გ/ლ (ტეფლობენზურონი) “ზასფი აგრო ზ.ვ.” შვეიცარია 848/17	0.5-0.75	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფაძიები, ბუგრები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები, არაფარდი პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.5	ვაზი	ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ზრდასრული მატლების ბუდიდან გამოსვლის 8-10 დღის შემდეგ	30(2)	7(3)
		0.3	კომბოსტო	ხვატრები, თეთრულები, ჩრჩილები, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი თაობის წინააღმდეგ	30(2)	7(3)
		0.15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი და მეორე თაობის წინააღმდეგ	30(2)	7(3)
135	ნუპრიდი 200 წზკ, 200 გ/ლ (იმიდო კლოპრიდი)	0.2-0.3	ვაშლი	ბუგრები, ფსილები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
	(1) „ნუფარმი	0.15-0.2	ვაზი	ყურძნის ჭია, ჭიჭინობლები	“	25(2)	7(3)
	გმზხ და კო კვ“ ავსტრია 1190	0.15-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ვირუსების გადამტანი მწერები	“	30(2)	7(3)
		0.2-0.5	დეკორა ტიული კულტურე ბი (ვარდი)	ბუგრები, ჭიჭინობლები, ცხვირგრძელები	“	5(2)	7(3)
		0.2-0.3	არასასოფლო- სამეურნეო დანამუშავების მიწები	კალიები (უფროსი ასაკის მატლები)	“	25(1)	1(-)
		0.05-0.1	“	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ლენტისებური მეთოდით	25(1)	1(-)
		0.2-0.25	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ბუგრები, პამიდვრის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 300 ლ/ჰა	15(1)	10(3)
		0,5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ბუგრები სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 1000-3000 ლ/ჰა	10(3)	10(3)

		0.2-0.5 0.2-0.25	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, კომბოსტოს თეთრულა ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	15(1)	7(3)
		0.2-0.25	კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრები	“	20(1)	7(3)
		0.2-0.75	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ბუგრები	“	1(3)	7(3)
		0.5-1.25	ციტრუსები	ბუგრები, ცრუფარიანები, ფარიანები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით. ხარჯვის ნორმა 2000-2500 ლ/ჰა	30(1-4)	7(3)
136	ნურელ-დ, ეკ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ციპერ მეტრინი) (თ), (1) “დაუ აგროსაიენსესი, ვმზხ.” ავსტრია 396/08/13/18	1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფქამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლისხვევები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	7(3)
		0.75-1.0	ხორბალი	ჭია წურბელა, პურის ბზულა		30(1)	10(4)
		0.5-0.75	ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.5-1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		40(2)	10(4)
		1-1.5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელა, რწყილები		30(2)	10(4)
		0.3-0.5	არასასო ფლო-სამეურნეო დანიშნულე-ბის მიწები	კალიები (მატლების განვითარების პერიოდში)		20(1)	10(4)
		1.5 2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები, ცრუფარიანები მენადმე ჩრჩილი		40(1)	10(4)
		1.5	ვაზი	ფარიანები, ცრუფარიანები		40(1)	10(4)
137	ობერონი სკ 240 240 გ/ლ (სპირომესიფენი) “ზაიერ აგ” გერმანია 648/14/18	0.5	პამიდორი კიტრი წიწაკა ლობიო	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის გამოჩენისას 10-დღიანი ინტერვალით	3(2-4)	7(3)
		0.5	საზამთრო, ნესვი	ტკიპები		-(2-4)	7(3)
		0.5	მარწყვი	ტკიპები		-(2-4)	7(3)
		0.5	ხეხილი	ტკიპები		-(2-4)	
138	ობერონ რაპიდი სკ 240 228, 6+11, 4 გ/ლ (სპირომესიფენი + აბამექტინი) “ზაიერ აგ” გერმანია 1210	0.6-0, 8	ხეხილი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(2)	7(3)
139	ოვიპრონი 2000 , ეკ	25-30	ვაშლი, მსხალი,	ფარიანები, ტკიპების და	შესხურება შემოდგომიდან	20(1-2)	7(3)

	80% (პარაფინის მინერალური ზეთი 800 გ/ლ) „უპლ ზირაატ ვე ქიმიკა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 797/18		ატამი, ქლიავი, ალუბალი, გარგარი	ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები ცრუფარიანები	ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით პრეპარატის გამოყენება .არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს		
		10-15	ვაზი	ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები	შესხურება ზამთრის ბოლომდე 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		30-35	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2)	20(1-2)	7(3)
		25-30	კაკალი, თხილი, ნუში	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		15	დეკორატიული მცენარეები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
140	ოლეოლუკი, ეკ (პარაფინის ზეთი 830 გ/ლ) „ლერიდა იუნიონ ქუიმიკა .ა. ს“ ესპანეთი 1422	25-30 25-30	ატამი, გარგარი, ვაშლი, მსხალი	ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები ცრუფარიანები ცხვირგრძელები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1200-1800 ლ/ჰა	-(1-2)	7(3)
		10-15	ვაზი	ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები	შესხურება ზამთრის ბოლომდე 10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	7(3)
		30-35	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა- 1500-2000 ლ/ჰა	20(1-2)	7(3)
		20-25	კაკალი, თხილი,	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	7(3)
141	ორდუსი 5 % სკ, 50 გ/ლ	0.5-0.75	ვაშლი	აბლაბუდიანი და წითელი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7 (3)
	(ფენპიროქსიმატი) (თ)	0.6-0.9	ვაზი	ვაზის აბლაბუდიანი ტკიპა		30(2)	7 (3)
	„აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 658/14/19	1-1.5	ციტრუსები	ციტრუსების ბეწვიანი წითელი ტკიპა ვერცხლისფერი ტკიპა		30(2)	7 (3)
142	ორიონი, სკ 159 გ/ლ (ემამექტინ ბენზოატი 53	0,3-0,45	ვაშლი, მსხალი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, ბუგრები, ფოთლის	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(3)	10(4)

	გ/ლ + ინდოქსკარბი 106 გ/ლ) „მაკვილნლი ტრედიინგ ლპ“ ირლანდია 1488			მენადმეები, არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევები, ვაშლის ნაყოფჟამია			
		0,3-0,45	ვაზი	ყურძნის ჭია, ფოთლიხვევები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წიანააღმდეგ	15(2)	10(4)
		0,15-0,3	პამიდორი, კიტრი, კარტოფილი, კომბოსტო, ბადრიჯანი, წიწაკა	ჩრჩილი, კოლორადოს ხოჭო, თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი, ფოთლის მენადმეები, ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა, ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ნიშნებისა და კვერცხდების	15(2)	10(4)
		0,3-0,45	სიმინდი	მარცვლეულის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(3)	10(4)
143	ორტუსი 5 სკ 51,2 გ/ლ (ფენპიროქსიმატი) (3)	0,6-0,9	ვაზი	ვაზის აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-800- 1200 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
	„ნიჩინო იუროპ კო, ლტდ“ დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1188	0,5-0,75	ვაშლი, მსხალი	აბლაბუდიანი და წითელი ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-1200-1500 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
		0,5-0,6	ატამი ვაშლატამა გარგარი ქლიავი	აბლაბუდიანი და წითელი ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-1200-1500 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
		1	ციტრუსები	ციტრუსოვნების ბეწვიანი წითელი ტკიპა ვერცხლისფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა 2000- 2500 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
		0,5-0,75	თხილი	დიდი კვირტის ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-1200-1500 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
		0,5-0,7	პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი წიწაკა (დახურული გრუნტი	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-600 ლ/ჰა	7(2)	7(3)
		0,5	სოია	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-200- 400 ლ/ჰა	35 (1)	10(4)
		0,3	დეკორატიული მცენარეები ყვავილები	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში .	2(1)	10(4)
144	პასკალი 20 ხგ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3)	0,2	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)

	„ერტარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალელერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“ თურქეთი 1111/19	0,25		ბამბის ხვატარი		20(1)	1(-)
		0,15	საზამთრო	მწვანე ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	1(-)
		0.15-0.3	პამიდორი, კიტრი, წიწაკა (დახურული გრუნტი)	მწვანე ბუგრი ფრთათეთრა	„	1(1)	1(-)
		0.05-0,075	ხორბალი	ბაღლინჯო, მაგნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0.15-0,35		პურის ზუალა		14(1)	-(-)
		0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		0.1-0.1.25		კარტოფილის ჭიამაია		14(1)	3(3)
		0.06-0,1	სამოვრები კალიებით დასახლებული მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მაგნეზის მატლის განვითარების სტადიაში	28(1)	3(3)
145	პერფექტო 17,5 სკ 175 გ/ლ (იმდაკლოპრიდი 125 გ/ლ+ ლამბდა- ციგლოტრინი 50 გ/ლ) (თ), (1) „დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 901/17	0.3-0.35 0.25	ხორბალი, ქერი, შვრია	პურის ზუალა პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინოზები, რწყილები, მაგნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ბუზები, ჭიჭურბელა ბაღლინჯოები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-400 ლ/ჰა	30(1)	-(3)
		0,16-0.2	სიმინდი	ბამბის ხვატარი სიმინდის ფარვანა	„	30(1)	-(3)
		0.25-0.35	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი , ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		0,15-0,2	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო , ბამბის ხვატარი, ბუგრები		14(1)	10(4)
		0,15-0,2	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა,, ბუგრები	„	3(1)	10(4)
		0,1-0,15	კიტრი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა,, ბუგრები	„	3(1)	10(4)
		0,22-0,25	კიტრი	ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები	„	10(1)	10(4)
		0.25-0,3	ვაზი	ფოთლიხვევები, ტკიპები , ყურძნის ჭია, ჭიჭინოზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	10(2)	10(4)
		0,25-0,3 0,15	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევები, ვაშლის კოკრიჭამია ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
146	პეტრა 5 ეკ	0, 25-0, 5	ხორბალი, ქერი	პურის ხოჭოები,	შესხურება ვეგეტაციის	20(1)	10(4)

	50 გ/ლ (ლამბდაციგა- ლოტრინი) (თ), (1) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ.იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1237			თრიფსები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები	პერიოდში		
		0, 3-0.5	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა	„	30(1)	10(4)
		0, 3-0.7	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ბუგრები	„	25(2)	10(4)
		0.4	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	„	20(2)	10(4)
		0, 25-0.3	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი,	„	30(1)	10(4)
		0.5	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		0.2-0.3	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები, ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		0, 25-0, 3	შაქრის ჭარხალი	ხვატრები, ბუგრები, ცხვირგრძელები	„	25(2)	10(4)
		0, 15-0, 3	ლობო	მემარცვლიები ბუგრები		30(1)	10(4)
		0, 3	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი		25 (1-2)	10(4)
		0, 5	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა		25 (1-2)	10(4)
		0, 5	ნუში	ნუშის თესლიჭამია		25 (1-2)	10(4)
147	პირატი, სფ 200 გ/კგ (ტებუფენპირადი) „მაკკინლი ტრეიდიგ ლპ“ ირლანდია 1489	0,6-1,5	ვაშლი, მსხალი	ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა, ობობა ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში - გაზაფხულზე, 70-80 % მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში	14(2)	7(3)
		0,5-1,0	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, ვაზის ქეჩის ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში - გაზაფხულზე, 70-80 % მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში	14(2)	7(3)
		0,5-1,6	პომიდორი, კიტრი	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(2)	7(3)
		1,2-1,6	ციტრუსები	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0,5-1,0	ვარდი	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(2-3)	7(3)
		0,5-1,0	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, ვაზის ქეჩის ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში - გაზაფხულზე, 70-80 % მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში	14(2)	7(3)
148	პირინექსი , ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) „ადამა აგრიქალა ზ.ვ.“ ნიდერლანდები 738/15/19	2	ვაშლი ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები, ფარიანები, ბუგრები, ტკიპები, ცრუფარიანები,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40 (2)	10(4)
		1.2-1.8	ვაზი	მტევნის ფოთლიხვევია,	შესხურება ვეგეტაციის	60 (1)	10 (4)

				ცრუფარიანები, ტკიპები	პერიოდში 0.15%-იანი სამუშაო ხსნარით მავნებლის 1 თაობის წინააღმდეგ. ხარჯვის ნორმა 800-1200 ლ/ჰა		
		2.0-2.5 1.5 0.8 1.5-2	მაქრის ჭარხალი	ჩვეულებრივი ცხვირგრძელა ხვატრები, ციცქნა ჯვაროსნები რწყილები ფოთლის ზუგრი მდელის ფარვანა ლემიჭამიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40 (2) -(1) 30(2) 30(2)	10 (4)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები		30 (2)	10 (4)
		0.5	სამოვრები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	არაჯოგური კალიებრნი		20(1)	10(4)
		1.0-1.2 0.75-1	საშემოდგომო ხორბალი საგაზაფხულო ხორბალი	პურის ბაღლინჯოები, თრიფსები, ბუგრი, ჭიაწურბელა, პურის ბზულა, შემოდგომის პურელის ხვატარი, მარცვლოვანთა ბუხები პურის ბაღლინჯოები ჭიაწურბელა		30(1)	10(4)
149	პირინექს სუპერი , ეკ 420 გ/ლ (ქლორპირიფოსი 400+ბიფენტრინი 20) (თ), (1) „ადამა აგრიქალჩა ზ.ვ.“ ნიდერლანდები 613/13/18	0.8-1	ხორბალი	ჭიაწურბელა პურის ბზულა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-20 დღიანი ინტერვალით	20 (1)	-(4)
		1.0	ქერი	მავნე კუსებურა პურის ხოჭო		20 (1)	-(4)
		0.4-0.5	კიტრი ჰამიდორი გოგრა ბადრიჯანი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა ბუგრები		3 (1)	3(-)
		0.4-0.5	ნესვი	ტკიპები		20(2)	10(4)
		0.4-0.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20 (2)	10(4)
		0.7-1,25	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები ბუგრები ტკიპები ფოთლიხვევიები ჩრჩილები		30 (2)	10(4)
		0.7-1,25	ატამი, გარგარი ქლიავი	ნაყოფჭამიები ბუგრები ტკიპები ფოთლიხვევიები ჩრჩილები		30(2)	10(4)
		0.6 1,25	ვაზი	ყურძნის ჭია ტკიპები		30(2)	7(3)

		0.8-1.0	მაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები რწყილები		20(2)	10(4)
150	პირიფოსი 48, ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1)	0.5	არასასოფლო- სამეურნეო დანამშენებ-ბის სავარგულები	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10 (4)
	“აიკუვი ს. ა.” ესპანეთი 889/17	2	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები		40 (2)	7(3)
		1.5-2	ვაზი	ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები		40 (2)	7(3)
		2	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები		40 (2)	7(3)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		40 (2)	7(3)
		2-2.5 1.5-2 0.8	მაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, ხვატრები მდელოს ფარვანა ბუგრი		30 (2)	13 (4)
		1.5	იონჯა	ფიტონომუსი		25 (1)	-(4)
		1.0-1.2 0.75-1	საშემოდგომო ხორბალი საგაზაფხულო ხორბალი	პურის ბაღლინჯოები, თირიფსები, ბუგრი, ჭიაწურბელა, პურის ბზუალა, შემოდგომის პურეულის ხვატარი, მარცვლოვანთა ბუზები პურის ბაღლინჯოები, ჭია წურბელა		30(1)	10(4)
151	პიროელექტრა 48 ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) „ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ“ კანადა 621/14/19	2	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები		40 (2)	10(4)
		1.5-2	ვაზი	ცრუფარიანები, ტკიპები		40 (2)	7 (3)
		2	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები		40 (2)	7 (3)
		2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		30 (2)	7 (3)
152	პლენუმი 50 წდგრ 500 გ/კგ (პიმეტროზინი) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1233	0, 3	კარტოფილი	ჩვეულებრივი კარტოფილის ბუგრი, სათბრის დიდი ბუგრი, ატმის მწვანე ბუგრი,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიკური ზღვრის მიღწევისას. ხარჯვა 200- 400 ლ/ჰა	7(3)	7(3)
		0, 2-0, 3	ჰამიდორი წიწკა ზადრიჯანი კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრები, სათბურის დიდი ბუგრი, ატმის მწვანე ბუგრი, კომბოსტოს ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა 1000- 3000 ლ/ჰა	15(3)	7(3)
		0, 4-0, 8	ჰამიდორი	სათბურის ფრთათეთრა	წვეთოვანი მორწყვა	3(3)	7(3)

		0, 4-0, 6	წიწაკა კიტრი (დახურული გრუნტი)		ვეგეტაციის პერიოდში		
		0, 4	კომბოსტო	ატმის მწვანე ზუგრი, კომბოსტოს ზუგრი	„	10(1)	7(3)
		0.15	რაფსი	რაფსის ყვავილჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა 200-400 ლ/ჰა	30(1)	7(3)
		0, 3	ატამი ვაშლატამა	ატმის მწვანე ზუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში.	14(1)	7(3)
153	პოლიგორი, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 602/13/18	1.1-1.9	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილეები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავი-ლობამდე და ყვავილობის შემდეგ	40(2)	10(4)
		1.1-1.9	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		0.5-0.9	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინობელები		30(2)	13(4)
		0.8-0.9	თამბაქო	ბუგრები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.7-1.1	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ		20(2)	10(4)
		0.5-0.9	იონჯა (სათესლე ნაკვეთები)	ბადლინჯოები, ბუგრები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბადლინჯოები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	შაქრის ჭარხალი, სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		0.6-1.1	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1.1-2.0	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვევიები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		1.1-1.5	შავი მოცხარი (სანერგები, სადედეები)	ფოთლიხვევიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.6-1.1	მარწყვი (სადედეები)	ტკიპები, ბუგრები, ჭიჭინობელები		30(2)	10(4)

		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1-2	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირეტროიდებთან ერთად კომბინირებული ნაზავით	30(1)	10(4)
154	პოლიმეტრინი 10 უმშ 10 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	1,5 1,3	ხორბალი, ქერი	პურის ბაღლინჯოები ცხვირგრძელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1,2,3 გენერაციის მატლებზე და ახალი ფაობის იმაგოებზე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში იმაგოებზე	15(1)	7(3)
	თურქეთი 1309	2 + 0,8 ლ/ჰა 85%-იანი ცილოვანი ჰიდროლიზატი	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლებზე	15(1)	7(3)
155	პოტეგონი 20 სგ 200 გ/ჰა (აცეტამიპრიდი) (თ), (3) „ასტრანოვა ტარ. ტიკ. ვე სან. ა.ს.« თურქეთი 1419	0,3	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	თამბაქოს ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
		0.3	პამიდორი, (დახურული გრუნტი) კიტრი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა თამბაქოს ფრთათეთრა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(1)	1(-)
		0,25	საზამთრო	ატმის მწვანე ბუგრი	„	7 (1)	1(-)
		0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	„	14(1)	3(3)
		0,2	ვაშლი	ვაშლის მწვანე ბუგრი	„	25(1)	3(3)
		0,2	ფსტა	ფსტის ფოთოლრწყილი	„	14(1)	3(3)
156	პრიზანი 4, ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოს-ეთილი) (თ), (1) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 603/13/18	0.3 0.5	სამოვრები, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებების სავარგულები	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები) (უფროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10 (4)
		2	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ლეშიჭამიები, ფოთლიხვევიები, ჭრჩილები,		40 (2)	10 (4)

				ფარიანები, ბუგრები, ტკიპები			
		2	ატამი	ცრუფარიანები		60 (1)	10 (4)
		1.2-1.8	ვაზი	ყურძნის ჭია, ცრუფარიანები, ტკიპები		60 (2)	10 (4)
		2	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები		40 (2)	10 (4)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		30 (2)	13 (4)
		2-2.5		ცხვირგრძელები, ზვატარები, ციცქნა, ფაროსნები			
		1.5-2	შაქრის ჭარხალი	მდელოს ფარვანა, რწყილები		30 (2)	- (4)
		0.8		ბუგრი			
		1.5	იონჯა	ფიტონომუსი		25 (1)	10(4)
157	პრიბანი 25 სგ 250 გ/კგ (ქლორპირიფოს- ეთილი) (თ), (1) “პექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 748/15	300-400 გ/10 კგ ღერდილზე	ბოსტნეული სიმინდი მზესუმზირა	მახრა მმღრნელი ხვატრები	მისატყუებლის მომზადება : 300 -400 გ პრეპარატი შეერევა 10 კგ ღერდილს, დაემატება წყალში გახსნილი 500 გ შაქარი. მისატყუებელს განალაგებენ მცენარეების ახლოს: 50-80 კგ/ჰა ბოსტნეულში, 50-60 კგ/ჰა სიმინდში და მზესუმზირაში.	-(1)	7(3)
158	პროტეუსი ზდ 110 110 გ/ლ (თიაკლოპრიდი 100 + დელტამეტრინი 10)	0.5-0.7	პამიდორი	მომღრმნელი ხვატრების მატლები კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (2)	7(3)
	(თ), (1) “ბაიერ აგ” გერმანია 683/14/19	0.5-0.75	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ბაღლინჯო, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზი, რწყილები, ბუგრები თრიფსები, ქიაწურბელა		30 (1)	7 (3)
		0.75	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		30 (1)	7 (3)
		0.75- 1	შაქრის ჭარხალი	მდელოს ფარვანა ცხვირგრძელები ჭარხლის რწყილები		14 (2)	7(3)
		0.75	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		14 (3)	7(3)
		0.75	ბარდა	ბუგრები		7(1)	7(3)
159	რეგენტი 20 გ გრ	5	კარტოფილი, პამიდორი, შაქრის	ნიადაგის მავნებლების	ნიადაგში შეტანა რიგებში დოზატორებით დარგვის	28 (1)	-(-)

	20 გ/კგ (ფიპრონილი) (თ),(1) “ბასფი აგრო ბ.ვ.” შვეიცარია 761/16	10	ჭარხალი, მზესუმზირა, სიმინდი	კომპლექსი, მ.შ. მავთულა ჭიები	დროს ან ბარტყობის დროს მოლიანი გაფანტვა ნიადაგზე		
160	რენოვა 25 წდგრ 250 გ/კგ (თიამეთოქსამი) (თ), (1) „უპლ ზირატ ვე ქიმი სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 1219	0, 1 0.08-0, 1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიკური ზღვრის მიღწევისას. ხარჯვა 200-400 ლ/ჰა	20(1)	7(3)
		0, 1 0.08-0, 1	კამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიკური ზღვრის მიღწევისას. ხარჯვა 200-400 ლ/ჰა	20(2)	7(3)
		0.08-0, 1	კიტრი	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.2	ხორბალი, ქერი	ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭო, მავნე კუსებურა პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მავნეობის ეკონომიკური ზღვრის მიღწევისას. ხარჯვა 200-400 ლ/ჰა ადმონაცენის შესხურება	30(1) -(1)	7(3)
		0.15-0, 2	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფქამია ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა 800-1200 ლ/ჰა	30(1)	7(3)
		0, 3-0, 4	მსხალი	ფსილეები	„	60(2)	7(3)
		0, 3-0, 35	ვაზი	ფოთლიხვევიები ჭიჭინობელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა 600-1000 ლ/ჰა	60(1)	7(3)
161	რიგომეტრინი 25, გგ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 604/13/18	0.15 0.32	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.2	ხორბალი	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები		20(2)	7(3)
		0.4	მაქრის ჭარხალი	მომღრღნელი ხვატრები		-(4)	7(3)
		0.15-0.2		მდელოს ფარვანა		20(1)	7(3)
		0.5	მაქრის ჭარხალი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები		-(4)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო,		20(2)	7 (3)

		0.16		კარტოფილის ჭიამაია კარტოფილის ჩრჩილი			
		0.5	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები		7(3)	-(3)
		0.35	სოიო	მდელის ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთლოჭამია		20(2)	-(3)
		0.15-0.25	ჯვარყვაკი -ლოვანი კულტურები (სათესლე ნაკვეთები)(	რაფსის ყვავილჭამია		-(3)	-(3)
		0.15-0.2	რაფსი, მდოგვი	რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვაკილოვან-თა რწყილები ბაღლინჯოები, თეთრულეები, ბუგრები		-(3)	7(3)
		0.16	კომბოსტო	თეთრულეები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(3)	-(3)
		0.25	იონჯა	ფიტონომუსი		20(2)	2(-)
		1.2-1.6	კიტრი პამიდორი	ფრთათეთრა		3(2)	7(3)
		0.65-0.8	წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ბუგრები, თრიფსები			
		0.26-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები		25(3)	7(3)
		0.16-0.35	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევები		25(3)	7(3)
		0.24-0.32	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები	შესხურება გაზაფხულზე	20(1)	7(3)
		0.06	ნესვი	ბახჩელის ჭიამაია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.5	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები	„	20(2)	-(3)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროკუდა, ფოთლის და წიწვის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ. ხოლო მოზარდეულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	-(3)
		0.01-0.05	მუხა	არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევები, მზომელები		-(1)	1(1)
		0.05	ნამვი	ჩვეულებრივი ნამვის		-(1)	1(1)

				ბერხია			
		0.08	ფიჭვი	ფიჭვის მეფისე		-(1)	1(1)
		0.016	ფიჭვი	ფიჭვის წითური ბერხია		-(1)	1(1)
		0.04	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)		-(1)	-(-)
		0.04-0.1	ფიჭვი	ფიჭვის დიდი ცხვირგრძელა	ნერგების შესხურება დარგვის წინ	-(1)	-(-)
		2-4 მლ/მ2	წიწვოვნები	მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები	შესხურება შტაბელეზად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	-(-)
		3 მლ/მ2	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მერქნის მავნებლები	ინიექცია ქერქის ქვეშ (ნაჩვენებია 1 მ2 ქერქის ზედაპირისათვის საჭირო დოზა)	-(1)	-(-)
		0.05-0.1	ქალაქის მწვანე ნარგავი	არაფარდი პარკხვევია, ჭრჩილები, მღრღნელი მავნებლები	მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.01% სამუშაო ხსნარით	7(1)	-(3)
		0.1-0.15	სამოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენის პერიოდში	20(1)	1(1)
		0.8 მლ/მ2	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობა-ნაგე- ბოხები და მარცვალ- გადასამუშა ვებელი მანქანა- იარაღები	მავნებლები შენახვის პირობებში, ტვიპების გარდა	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე. საწყობების ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება 1 დღე-ღამის შემდეგ დამუშავებიდან	-(1)	1(1)
		1.6 მლ/მ2	სასაწყობო და მარცვალგადა სამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-(1)	1(1)
		24 მლ/ტ	მარცვლოვ ნების მარცვალი, სამარცვლე პარკოსნების თესლი		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 500 მლ 1 ტ მარცვალზე. მარცვლის გა-მოყენება სასურსათე ან საფურაჟე მიზნით	-(1)	

162	რიტმუსი, ეკ 25 გ/ლ (დელტამეტრინი) „პრობელტე ს.ა.“ ესპანეთი 1330	0,075-0,25	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭია წურბელა, ზუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	-(3)
		0,5	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ღეროს ფარვანა, თრიფსები, ბუგრები	„	30(2)	-(3)
		0,18-0,5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები, ხვატრები, კარტოფილის ჩრჩილი	„	20(2)	7(3)
		0,4-0,6	ვაზი	ფოთლისვევეები, ბუგრები, ხვატრები	„	30(2)	7(3)
		0,3-0,5	თხილი, კაკალი, ნუში	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, მაჟაურა, ჩრჩილი	„	30 (2)	7(3)
		0,3-0,5	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილეები, ფო თოლრწყილები, მინაფ რთიანა, მაჟაურა, ჩრჩილები, მზომელები	„	30 (2)	7(3)
		0,3-0,5	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ჩრჩილი, ზეთისხილის ჭიჭინოზელა, ბუგრები	„	30(2)	7(3)
		0,3-0,5	სატაცური	ბუგრები , ფოთოლჭამია	„	-(2)	7(3)
		0,09-0,3	მზესუმზირა	ბუგრები, ხვატრები, მზესუმზირის ჩრჩილი	„	60(1)	7(3)
		0,15-0,25	მარწყვი	ბუგრები, ხვატრები	„	20(1)	7(3)
		0,15-0,5	თამბაქო	ბუგრები, თრიფსები	„	20(1)	7(3)
		0,15-0,5	ვამიდორი, ბადრიჯანი	ბუგრები, ხვატრები, თრიფსები, ბოსტნეულის მწვანე ფაროსანა	„	30(2)	7(3)
		0,09-0,3	რაფსი	ბუგრები, ფოთოლჭამია, ხოჭოები	„	45(2)	7(3)
		0,12-0,5	კომბოსტო	ბუგრები, ხვატრები, კომბოსტოს ჩრჩილი, ჯვაროსანთა ბადლინჯო	„	20(2)	7(3)
		0,5	სტაფილო	ბუგრები, ხვატრები,	„	20(1)	7(3)
		0,15-0,5	გოგროვნები	ბუგრები, ხვატრები	„	20(2)	7(3)
		0,5	ბოლოკი	ბუგრები, ხვატრები	„	20(2)	7(3)
		0,15-0,5	პრასი	ბუგრები, ხვატრები, პრასის ჩრჩილი	„	20(2)	7(3)

		0,5	ხახვი, წიორი	ბურგები, თრიფსები	„	20(2)	7(3)
163	როკეტი 20 ხგ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3)	0,3	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ფრთათეთრა ბამბის ხვატარი ბადჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	14(1)	1(-)
	„დოგალ კიმივევი მადდეღერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.« თურქეთი 1136	0.15-0.3	პამიდორი, კიტრი, წიწაკა (დახურული გრუნტი)	მწვანე ბუგრი ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(1)	1(-)
		0,25	საზამთრო	მწვანე ბუგრი	“	20(1)	1(-)
		0.25-0.3	ვაშლი	ბურგები	“	25(1)	
		0.05-0,075	ხორბალი	ბაღლინჯო, მავნე კუსებურა	ადმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0,15-0,35		კურის ბზუალა		14(1)	-(-)
		0,06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
164	როკიფსო, ზდ 240 გ/ლ (თიაკლოპრიდი) (თ), (1)	0. 5	პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	თამბაქოს ფრთათეთრა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(1-2)	7(3)
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1411	0.5	ფსტა	ფსტის ფოთლწყილი ფსტის შავი პეწიანა	„	21(1-2)	7(3)
		0.4-0,5	ვაშლი მსხალი ალუბალი	ვაშლის ნაყოფჭამია მწვანე ბუგრი ფოთლწყილი ალუბლის ბუზი ფოთლიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (მაისი-ივლისი)	30(1-2)	7(3)
		0.4	ბროწეული	ბურგები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1-2)	7(3)
165	საგა 480, ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1)	2	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბურგები, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40 (2)	7(3)
	„ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1132	1.5-2	ვაზი	ყურმის ჭია, ბურგები ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები		40 (2)	7(3)
166	საირუქსი 25 ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1)	0.35	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	-(3)

	„უპლ ზირაატ ვე ქიმია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 841/17	0.2-0, 3	ხორბალი	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ქიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0, 3-0.4	შაქრის ჭარხალი	მომღრღნელი ხვატრები მდელოს ფარვანა ბუგრები		-(4)	7(3)
		0.2-0.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი ბუგრები		20(2)	7 (3)
		0.35	სოიო	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია		20(2)	-(3)
		0, 4-0, 5	მხესუმზირა	ხარაბუზა მხესუმზირას ალურა		20(2)	-(3)
		0, 2 1.2-1.6 0.8 0.5	კომბოსტო კიტრი, პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი) სტაფილო	თეთრულეები, ჩრჩილები, ხვატრები ფრთათეთრა ბუგრები, თრიფსები სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები		25(3) 3(2) 20(2)	-(3) 7(3) -(-)
		0.25-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი დამუშავება პეპლის აქტიურობის პერიოდში ან დაზიანების პირველი ნიშნების აღმოჩენისას	25(3)	7(3)
		0.2-0.4	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(3)	7(3)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროკუდა, ფოთლის და წიწვის მღრღნელი მავნებლები არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევიები, მხომელები ჩვეულებრივი ნამვის ხერხია	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდეულის – 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	-(3)
		0.1-0, 25	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ამერიკული თეთრი პეპელა, არაფარდი პარკხვევია, ჩრჩილები, მღრღნელი მავნებლები	მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1)	-(3)
		0, 2-0.4	საძოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩევის პერიოდში	20(1)	1(1)
167	სამმაიტი, სფ 200გ/კგ	0.5-0.9	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვე გეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)

	(პირიდაბენი) (3) ინტერნასიონალ ქიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 503/09/13/18						
		0.5-0.75	ვაზი			30(2)	7(3)
		0.75-1.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა		30(2)	7(3)
168	სარბანი 48 უმშ, ეკ უმშ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 674/15	0.5 0.7	სამოვრები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები არაჯოგური ფორმები კალიები ჯოგური ფორმები (ზრდასრული მატლები და იმაგო)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
169	სარბანი 24 უმშ 240 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 1232	1, 0	სამოვრები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისას 1 ლ პრეპარატი იხსნება 17, 8 ლ დიზელში	20(1)	10(4)
170	საფაგორი 40 ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 504/09/15	1.1-1.9	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ფსილეები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	40(2)	7(3)
		1.1-1.9	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, ადმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		0.5-0.9	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭრიჭინოებლები		30(2)	10(4)
		0.8-0.9	თამბაქო	ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		2-3	თუთა	ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება თუთის აბრეშუმხვევიას გამოკვეთის დამთავრების შემდეგ, ნაყოფის საკვებად გამოყენება არ დაიშვება	30(2)	10(4)
		1.9-2.4	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		0.8-1.2	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)

		0.5-0.9	შაქრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლისმწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1.1-2.8	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვევიები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1-2	საძოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირეტროიდებთან ერთად კომბინირებული ნაზავით	30(1)	10(4)
171	საპები, ეკ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი) (თ), (1) „აგრო ლაიფ საიენს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1400	2	ვაშლი	ნაყოფჭამიები ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	„	30(2)	10(4)
		1.5	კომბოსტო	თეთრულუბი ჩრჩილები ხვატრები	„	30(1)	7(3)
		1.2	ხორბალი	პურის ბზუალა	„	30(1)	7(3)
172	სელდონი 20 სგ 200 გ/კგ (ტებუფენპირადი) (თ), (3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1277	0,6-1,2	ვაშლი	ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა, ობოზა ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩევისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
		1,2	მსხალი	მსხლის ფსილა	„	14 (2)	7(3)
		0,5-0,6	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ვაზის ქეჩის ტკიპა	„	14 (2)	7(3)
		0.4	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		0,8-1	ციტრუსები	ტკიპები	„	20 (2)	7(3)
		0.35	მარწყვი	ტკიპები	„	10 (2)	7(3)
		0,4	ლობიო	ტკიპები		20 (2)	7(3)
173	სელესტ ტოპი 312.5 კს 312.5 გ/ლ (თ) (თიამეთოქსამი 262.5+ფლუღდიოქსანილი	1.6-1.8	კარტოფილი	მავთულა ჭიები, კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები, ჭიჭინობელები	ნიადაგში შეტანა დარგვის დროს. ხარჯვის ნორმა 50 ლ/ჰა	-(1)	-(-)

	25+ დიფენოკონა-ზოლი 25) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 755						
174	სივანტო პრაიმი 200 წზ 200 გ/ლ (ფლუპირადიფურონი) (თ)	0, 25-0, 5	ვაზი	ჭიჭინოზლები ფევილისებრი ფარიანა თრიფსები ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
	“ბაიერ აგ” გერმანია 2011	0, 6-0, 9	ვაშლი მსხალი	კალიფორნიის ფარიანა ფოთოლრწყილები ხერხიები ბუგრები მსხლის ფსილა	„	14(2)	7(3)
175	სილტაკი, ეკ 750 გ/ლ (3-(პოლიოქსიეთილენ) პროპილჰეფტა მეთილ- ტრისილოქსანი) (თ),(3) „იგზ ფარმა ტომამ სვეტოსლავსკი, პაველ სვეტოსლავსკი“ პოლონეთი 1463	0.75-1,2	ხეხილი თხილი კენკროვნები	ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა, ბუგრები, ფარიანები, ცრუფარიანები, თრიფსები, ფსილები	ვეგეტაციის პერიოდში შესხურების და მავნებელზე ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება წებოვანი თხელი აპკი, რომელიც ახდენს მის იმობილიზაციას და შემდგომ დაუყოვნებელ სიკვდილს. გამოიყენება მავნებლის გამოჩენისას, ცხელ ამინდში (დღისით), როცა მავნებელზე შესხურებული ხსნარი სწრაფად შრება. საჭიროებისას-2-ჯერ 7-14 დღიანი ინტერვალით. არ გამოიყენოთ ყვავილობის დროს. ხარჯვა 500-800 ლ/ჰა. სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია უნდა შეადგენდეს 0,12% - 0,15% (120 - 150 მლ სილტაკი ეკ 100 ლ წყალზე)	2 (1-2)	5(3)
		0.2-0,3	ჰამიდორი, ტკბილი წიწაკა, ბადრიჯანი	აბლაბუდასებრთა ტკიპები, ბუგრები, ფრთათეთრა, თრიფსები	ვეგეტაციის პერიოდში შესხურების და მავნებელზე ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება წებოვანი თხელი აპკი, რომელიც ახდენს მის იმობილიზაციას და შემდგომ დაუყოვნებელ სიკვდილს. გამოიყენება მავნებლის გამოჩენისას, ცხელ ამინდში (დღისით), როცა მავნებელზე შესხურებული ხსნარი სწრაფად შრება. საჭიროებისას-2-ჯერ 7-14 დღიანი ინტერვალით. არ გამოიყენოთ ყვავილობის დროს. ხარჯვა 400-600 ლ/ჰა. სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია უნდა შეადგენდეს 0,05% - 0,07% (50 - 70 მლ სილტაკი ეკ 100	2 (1-2)	5(3)

					ლ წყალზე)		
		0,4-0.6	გოგროვნები (კიტრი, ნესვი)	აბლაბუდასებრნთა ტკიპები ბუგრები ფრთათეთრა ცრუფარიანები თრიფსები ფოთოლრწყილები	ვეგეტაციის პერიოდში მესხურების და მავნებელზე ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება წებოვანი თხელი აპკი, რომელიც ახდენს მის იმობილიზაციას და შემდგომ დაუყოვნებელ სიკვდილს. გამოიყენება მავნებლის გამოჩენისას, ცხელ ამინდში (დღისით), როცა მავნებელზე მესხურებული ხსნარი სწრაფად შრება. საჭიროებისას-2-ჯერ 7-14 დღიანი ინტერვალით. არ გამოიყენოთ ყვავილობის დროს. ხარჯვა 400-600 ლ/ჰა. სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია უნდა შეადგენდეს 0,1% (100 მლ სილტაკი ეკ 100 ლ წყალზე)	2 (1-2)	5(3)
		0,2-1,2	ვარდი დეკორატიული მცენარეები	ტკიპები	ვეგეტაციის პერიოდში მესხურების და მავნებელზე ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება წებოვანი თხელი აპკი, რომელიც ახდენს მის იმობილიზაციას და შემდგომ დაუყოვნებელ სიკვდილს. გამოიყენება მავნებლის გამოჩენისას, ცხელ ამინდში (დღისით), როცა მავნებელზე მესხურებული ხსნარი სწრაფად შრება. საჭიროებისას-2-ჯერ 7-14 დღიანი ინტერვალით. არ გამოიყენოთ ყვავილობის დროს. ხარჯვა 400-800 ლ/ჰა. სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია უნდა შეადგენდეს 0,1% - 0,15% (100 – 150 მლ სილტაკი ეკ 100 ლ წყალზე)	2 (1-2)	7(3)
		0,45 – 0,6	მარცვლეული	ბუგრები	ვეგეტაციის პერიოდში მესხურების და მავნებელზე ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება წებოვანი თხელი აპკი, რომელიც ახდენს მის იმობილიზაციას და შემდგომ დაუყოვნებელ სიკვდილს. გამოიყენება მავნებლის გამოჩენისას, ცხელ ამინდში (დღისით), როცა მავნებელზე მესხურებული ხსნარი სწრაფად შრება. საჭიროებისას-2-ჯერ 7-14	2 (1-2)	5(3)

					დღიანი ინტერვალით. არ გამოიყენოთ ყვავილობის დროს. ხარჯვა 300-400 ლ/ჰა. სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია უნდა შეადგენდეს 0,15% (150 მლ სილტაკი ეკ 100 ლ წყალზე)		
176	სიკამოლი ე, ზე (პარაფინის ზეთი 80%) “სიკამ ოქსონი სპა” იტალია 796/16	25-30	ვაშლი, მსხალი ატამი, ქლიავი, ალუბალი, გარგარი	ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები ცრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10- დღიანი ინტერვალით პრეპარატის გამოყენება .არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს	20(1-2)	7(3)
		10-15	ვაზი	ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები	შესხურება ზამთრის ბოლომდე 10-დღიანი ინტერვალთ	20(1-2)	7(3)
		30-35	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2)	20(1-2)	7(3)
		25-30	კაკალი, თხილი, ნუში	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10- დღიანი ინტერვალთ	20(1-2)	7(3)
		15	დეკორატიული მცენარეები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10- დღიანი ინტერვალთ	20(1-2)	7(3)
177	სიტრინი 50 %, ეკ 500 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1) „არისტა ლაიფსაენს ბენელუქს სპრლ ბელგია 1247	0, 1-0, 15	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი, დასავლეთის სიმინდის ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 300- 500 ლ/ჰა	20(2)	7(3)
		0, 05-0, 1	პურეული მარცვლოვნები (ხორბალი, ქერი, შვრია, , ქვავი)	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ქიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 250- 400 ლ/ჰა	28(2)	7(3)
		0, 05	რაფსი, მდოგვი	ბუგრები, რაფსის ყვავილქამია, ცხვირგრძელები, ხერხიები, რაფსის ფოთოლქამია	„	49(2)	7 (3)
		0, 05	შაქრის, სუფრის ქარხალი	კოლონები, ქარხლის ცხვირგრძელა, ბუგრები, ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 400- 600 ლ/ჰა	15(2)	7(3)
		0, 06-0, 08	კარტოფილი	ბუგრები	„	15(2)	7 (3)
		0, 05	პარკოსნები ხმელი და ახალი (ლობიო, ბუგრები, ბამბის	ცხვირგრძელები, ბუგრები, ბამბის	„	15(2)	7(3)

			ბარდა, ცერცვი)	ხვატარი, თრიფსები			
		0, 05	სტაფილო, ოხრახუმი, ნიახური	ბუგრები	„	15(2)	7 (3)
		0, 05	ბოლოკი	რწყილები, კომბოსტოს ბუზი	„		
		0, 05	სალათა	ხვატრები, ბუგრები		15(2)	7 (3)
		0, 05	ხახვი ნიორი	ხახმის ჩრჩილი, თამბაქოს თრიფსი, ხახვის ბუზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-500 ლ/ჰა	15(2)	7(3)
		0, 05	კომბოსტო ყველა სახის	ხვატრები, მავნე მატლები, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-800 ლ/ჰა	15(2)	7(3)
		0, 05	სანელებლები	მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები	„	10(2)	7 (3)
		0, 03-0, 15	დეკორატიული მცენარეები	მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-1500 ლ/ჰა	-(2)	7 (3)
178	სნაიპერი, სკ 240 გ/ლ (სპიროდიკლოფენი) „მაკკინლი ტრეიდიგ ლპ“	0,4-0,7	ვაშლი	ხეხილის წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა, კუნელის ტკიპა	შესხურება კვირტის გახსნის და ვარდიფერი კონუსის სტადიაში	14(2)	7(3)
	ირლანდია 1477	0,4-0,7	მსხალი	მსხლის ჩვეულებრივი ფსილა	„	14(2)	7(3)
		0,4-0,7	ატამი, ვაშლატამა, ალუბალი, ბალი	ხეხილის წითელი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას, სიმწიფეში შესვლისას	0,4-0,7	7(3)
		0,4-0,7	ვაზი	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება კვირტების გახსნისას, ყვავილობისას და მისი დასრულებისას	0,4-0,7	7(3)
		0,4-0,7	ციტრუსები	აბლაბუდიანი ტკიპა, ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას და სიმწიფეში შესვლისას	0,4-0,7	7(3)
		0,4-0,7	კაკლოვნები	ტკიპები	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას	14(2)	7(3)
179	სნეილ გრანულს გრ 60 გ/კგ (მეტალდეჰიდი)	6	ბოსტნეულ-ბაღჩეული, ხეხილი,	ლოფორთქინები და ლოკოკინები	გაფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე, რიგთაშორის და ბილიკებზე	20(1)	10(4)

	(თ), (4) “დეტია დეგიშ გმზ” გერმანია 673/17		ციტრუსები, კენკროვანები, ვაზი, თამბაქო, დეკორატიული კულტურები				
180	სპრეი ოილი 11 E, ეკ (პარაფინის ზეთი 848 გ/ლ) „პეტრონას ლუმბრიკანტს ბელგიუმ ნვ“ ბელგია 1252	25-30	ვაშლი, მსხალი ატამი, ქლაივი, ალუბალი, გარგარი, ვაშლატამა	ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები ცრუფარიანები, ფოთლიხვევიები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10- დღიანი ინტერვალით პრეპარატის გამოყენება. არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს	20(1-2)	7(3)
		30-35	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2)	20(1-2)	7(3)
		30	კაკალი, თხილი, ნუში	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10- დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		16	დეკორატიული მცენარეები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10- დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
181	სტარკლი , წზგრ 200 გ/კგ (დინოტეფურანი) (თ), (1)	0.5-0.7	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას და 14 დღის ინტერვალით. ხარჯვა-1200- 1500 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
	“მიცუი ქემიკალს აგრო, ინკ” იაპონია 1266	0,5-0,7	ატამი	ფოთლის მენადმე ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას და 14 დღის ინტერვალით. ხარჯვა-1200 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
		0,7-1	თხილი	მარმარილოს ყავისფერი სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას და 21 დღის ინტერვალით ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	14(3)	7(3)
		0,7-1	ციტრუსი	მარმარილოს ყავისფერი სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას და 21 დღის ინტერვალით ხარჯვა-2000-2500 ლ/ჰა	21(4)	7(3)
		0,35-0,5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფრთათეთრა ბუგრები პამიდორის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში გამოჩენისას და 7 დღის ინტერვალით ხარჯვა-500 ლ/ჰა	5(2)	5(3)
		0.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ფრთათეთრა ბუგრები თრიფსები	„	5(2)	5(3)
		0,5	საზამთრო	ბუგრები	„	5(2)	5(3)
		0,7	სიმინდი	მარმარილოს ყავისფერი სუნიანი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას და 14 დღის	14(2)	5(3)

					ინტერვალით ხარჯვა-500 ლ/ჰა		
182	სულთანი, წზკ 200 გ/ლ (იმიდოკოლოპრიდი) (1) "პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ" ინდოეთი 505/09/15	0.5	ვაშლი	ბუგრები, ფსილეები, ფოთლიხვევები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	1(-)
		0.5	ვაზი	ყურძნის ჭია, ჭრიჭინობელები		25(2)	1(-)
		0.1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მასობრივი გამოჩენისას	20(1)	1(-)
		0.25	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას	-(3)	1(-)
		0.2-0.5	დეკორატიული კულტურე ბი (ვარდი)	ბუგრები, ჭიჭინობელები, ცხვირგრძელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(2)	1(-)
		1-3	ვარდი (დახურული გრუნტი)	ბუგრები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მასობრივი გამოჩენისას	1(2)	1 (-)
		0.25-0.3	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ბუგრები, პამიდორის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 300 ლ/ჰა	15(1)	1(-)
		0.5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(1)	1(-)
		0.25-0.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრები		20(1)	1(-)
		0.5 0.15-0.75	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(1)	1(-)
		0.25-0.5	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, კომბოსტოს თეთრულა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	15(1)	1(-)
		0.1-0.25	კომბოსტო	ბუგრები		15(1)	1(-)
		0.2-0.3	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულე-ბის მიწები	კალიები		25(1)	1(-)
		0.5-1.25 1-2	ციტრუსები	ბუგრები, ფრთათეთრა ცრუფარიანები, ფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით. ხარჯვის ნორმა 2000-2500 ლ/ჰა	30(1-4)	1(-)
183	სულფოლაკი 80 წდგრ 800გ /კგ (გოგირდი)	3-5	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4)	7(3)
		3-6	ვაშლი	ნაცარი	"	1(4)	7(3)
	"აგროშტულნი გმზ" გერმანია 646/14/19	3-5	თესლოვანი ხეხილი	ტკიპები	"	1(4)	7(3)

		2-3	კიტრი, პამიდორი, კარტოფილი	ალტერნარიოზი, სილ აქვეები, ანთრაქნოზი	„	1(4)	7(3)
		4-5	კურკოვანი ხეხილი	ტკიპები	„	1(4)	7(3)
		3-6	ციტრუსი	ტკიპები	„	1(4)	7(3)
		2	ვარდი	ტკიპები	„	1(4)	7(3)
		5	თხილი	ტკიპები	„	8(7-10)	7(3)
184	სულფური, წდგრ 800 გ/კგ (გოგირდი)	4-5	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, 7-10 დღიანი ინტერვალით	1(2-3)	4(1)
	„იოგლილა სულფურ ენდ აგემ ინდ.პვტ., ლტდ“	5-8	თხილი თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	“	“	1(3-5)	4(1)
	ინდოეთი 1334	2,5-3	ბოსნეული და ბახჩეული კულტურები	„	„	1(2-3)	4(1)
		0,8-1	ბარდა			1 (1-2)	4(1)
185	სუმი-ალფა 5 ეკ 50 გ/ლ (ესფენვალერატი) (თ), (1) “სუმიტომო ქემიკალ	0.3	ბარდა, ლობიო	ბუგრები, მემარცვლები	შესხურება ყვავილობის წინ, ნედლი პარკის გამოყენება არ შეიძლება	20(1)	10(4)
	აგრო იუროპ სას „ საფრანგეთი	0.5-1	ვაშლი	ფოთლიხვევები, ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	-(4)
	463/04/12/18	0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევები	“	45(1)	10(4)
		0.15-0.25	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	“	20(2)	10(4)
		0.2	კომბოსტო	თეთრულები, ხვატრები, ჩრჩილები	“	30(1)	10(4)
		0,1-0,2	ხახვი, ნიორი	მომღრნელი ხვატრები, ხახვის ბუზი, ჩრჩილები	„	20(2)	10(4)
		0,3-0,5	სტაფილო	მომღრნელი ხვატრები, ჩრჩილები, ბუზები	„	20(2)	10(4)
		0.3 0.2-0.25	ხორბალი, ქერი	მარცვლოვანთა ბუზები ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭო, მავნე კუსებურა	“	15(2)	10(4) -(4)
		0.2-0.25	საძოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლე ბული ნაკვეთები	კალიები	“	20(1)	-(4)
		0.7-1 1.25-2.5	ციტრუსები	ფრთათეთრა ბუგრები ფარიანები, ცრუფარიანები	“	45(2-3)	10(4)
		0,1-0,3	კაკლოვნები	მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები	„	20(2)	10(4)
186	სუპერკილი ფორტე 550	1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები,	შესხურება ვეგეტაციის	40(2)	10(4)

	მკ (ქლორპირიფოსი 500+ ციპერმეტრინი 50 გ/ლ)			ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	პერიოდში		
	(თ), (1) „ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1131	0.75-1.0 0.5-0.75	ხორბალი ქერი	ჭიაჭურბელა, პურის ზუზალა, პურის ხოჭო მავნე კუსებურა ბაღლინჯოები ბუგრები	„	30(1)	10(4)
		1, 0-1, 5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელელები, მდელოს ფარვანა ხვატრები რწყილები ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-დღიანი ინტერვალით	30 (2-3)	10(4)
		0.5-1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	10(4)
		1, 5 2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები მენადმე ჩრჩილი ბუგრები	„	40(1)	10(4)
		1.5	ვაზი	ფარიანები, ყურძნის ჭია ცრუფარიანები ბუგრები	„	40(1)	10(4)
187	სუპერ ჰექტამეტრინი 100 გკ 100 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0.1-0.15	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიჭინობელები, თრიფსები, რწყილები, ჭიაჭურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(4)
	„ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 801/16	0.1 0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები კარტოფილის ჩრჩილი		21(2)	-(4)
		0.25-0.36	ვაზი	ფოთლიხვევიები		15(2)	-(4)
		0.2-0.35	ვაშლი	ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები ამერიკული თეთრი პეპელა		50(2)	10(4)
		0.1	ბარდა, ლობიო	ბუგრები, მემარცვლიები	შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ	20(1)	10(4)
		0.1 0.05-0.1 0.01	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები ფიჭვი	ოქროკულა, ფოთლიხვევიები არაფარდი პარკხვევია, ხერხიები და სხვ. ფოთლის მღრღნელი მავნებლები ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)	შესხურება. მწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდეულის – 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	1(1)
		2.5-5 მლ/მ2	წიწვოვნები	მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები	შესხურება შტაბელებად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	1(1)
		3 მლ/მ2		მერქნის მავნებლები	ინიექცია ქერქის ქვეშ	-(1)	1(1)
		0.2	იონჯა	ცხვირგრძელელები, ბაღლინჯოები, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	10(1)

		0.1-0.15	რაფსი	რაფსის ყვავილჭამია, რწყილები		48 (2)	10(1)
		0.2-0.3	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები		45(1)	10(4)
		0.1-0.2	საძოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები უმცროსი ასაკის მატლები, არაჯოგური ფორმები		20(1)	10(4)
		0.3-0.35		უფროსი ასაკის მატლები და იმაგო, ჯოგური ფორმები		20(1)	10(4)
188	ტალავი 20 სვ 200 გ/კგ (ტებუფენპირადი) (თ), (3) „საფა ტარიმ ა.ს. თურქეთი 799/16	0.45-06 0, 35-0.45	ვაშლი	ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა ობობა ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩენისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
		1, 2-1.5	მსხალი	მსხლის ფსილა	„	14 (2)	7(3)
		0.5	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაზუდიანი ტკიპა ვაზის ქერის ტკიპა	„	14 (2)	7(3)
		0.25-0.375	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		0.6-0.8	ციტრუსები	ტკიპები	„	20 (2)	7(3)
		0.375	ვარდი, მიხაკი, კრიზანტემა	ტკიპები	„	- (2-3)	7(3)
		0, 3	ლობიო	წითელი აბლაზუდიანი ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		0.25	მარწყვი	კუნელის ტკიპა	„	10 (2)	7(3)
189	ტალდექს ექსტრა, პილ მის 60 გ/კგ (მეტალდეპიდი) (თ) საფა ტარიმ.ა.ს.“ თურქეთი 1251	15 კგ/ჰა	ბოსტნეულ- ბაღჩეული, კიტრი- პამიდორი დაცულ გრუნტში, ხეხილი, ტყის ჯიშები, ციტრუსები, კენკროვანები, ვაზი, თამბაქო, დეკორატიული მცენარეები, საჩითილე და სანერგეები	ლოფორთქინები და ლოკოკინები	გაფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე, რიგთაშორის და ბილიკებზე, მავნებლის გამოჩენისას	20(1)	10(4)
190	ტალსტარი 10 ეკ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0.2	ვაზი	ყურმის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.02 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	-(-)
	“ფმს ქემიკალ ს.პ.რ.ლ.” ბელგია 506/09/15/18	0.4	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ 0.04 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(4)	10(4)
		0.6	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)

		0.3-0.4	ვაშლი	ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.4	პამიდორი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამონასკვამდე) 0.04-0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	20(1)	10(4)
		0.3-0.4	კიტრი	ბუგრები ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამოჩენამდე) 0.04 - 0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	20(1)	10(4)
		0.2-0.3	კომბოსტო	ბუგრები თეთრულა, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თავის ჩახვევამდე 0.04 -0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.1-0.3 0.2-0.3	ხორბალი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭოები, ბუგრები, თრიფსები,ჭრიჭინოზ ელები, ჭიჭურბელა პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.05 %-იანი სამუშაო ხსნარით აღმოცენების შესხურება	20(1) -(1)	10(4) -(4)
		0,4-1,1	სიმინდი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას	30 (1)	10(4)
		0,55-2,25	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით	21 (2)	10(4)
		0,6	ციტრუსები	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ეკონომიკური ზღვრის მიღწევისას 14 დღიანი ინტერვალით	21(2)	10(4)
191	ტეზკარპი 150 სკ 150 გ/ლ (ინდოქსაკარბი)	0.25	ვაზი	ყურძნის ჭია ფოთლივკვეციები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.025 %-იანი სამუშაო ხსნარით ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	10(2)	10(4)
	„აგროტეზ ტარიმ სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1249	0.42	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.035 %-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა – 1200 ლ/ჰა	14(4)	10(4)
		0, 45	კაკალი	კაკლის ცხვირგრძელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	14(4)	10(4)
		0.25 0, 4	პამიდორი (დახურული გრუნტი) პამიდორი (ღია გრუნტი)	ეგვიპტური ხვატარი კოლოფის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(3)	10(4)
		0, 3	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ხერხია სიმინდის ფარვანა	„	3(3)	10(4)
192	ტემპი, წზფ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3)	0, 2	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღრის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
	“პლატინ ქიმიკ მუმესსილიკ ვე დის ტიკ. ა.ს.“	0, 25		ბამბის ხვატარი		20(1)	1(-)

	თურქეთი 684/17						
		0.15-0.3	პამიდორი, კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(1)	1(-)
		0.05-0, 075	ხორბალი	ბალღინჯო, მავნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0.15-0, 35		პურის ბზუალა		14(1)	-(-)
		0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		0.1-0.125		კარტოფილის ჭიამაია		14(1)	3(3)
		0.06-0, 1	სამოვრები კალიებით დასახლებული მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მავნებლის მატლის განვითარების სტადიაში	28(1)	3(3)
193	ტენჩანტი, ეკ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) “პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 507/09/15	1-1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	10(4)
		0.75-1.0	ხორბალი	ჭიჭურბელა, პურის ბზუალა		30(1)	10(4)
		0.5-0.75	ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო		30(1)	-(4)
		1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	-(4)
		0.8-1.5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელა, რწყილები		40(1)	10(4)
		0.4	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	კალიები		20(1)	7(3)შ
		2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები, ცრუფარიანები, მენადმე ჩრჩილი		40(1)	10(4)
194	ტენჩანტ პლიუსი, ეკ 400+20 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) “პარიჯატ ინდასტრის (ინდოეთი) პვტ. ლტდ” ინდოეთი 1304	1-1.5	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
		1.5	ვაზი	ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-800 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
		1.0-1,2	კარტოფილი პომიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-500 ლ/ჰა	20(2)	10(4)
		1.0-1,2	კიტრი	ბუგრები		20(1)	10(4)
		0,8	პამიდორი კიტრი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7 (1-2)	3(-)
195	ტრინოლ -2, მზე 700 გ/ლ (პარაფინის მინერალური ზეთი) (თ), (1)	25-30	ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ატამი	ფარიანების, ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრე-ბის, ფსილების, ჩრჩილების	შესხურება კვირტების გახსნამდე გაზაფხულზე, ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 4°C დაბალი	-(1)	3(1)

				მოზამთრე ფაზები			
	“საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 576/13/18	30-45	ციტრუსები	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფრთათეთრა	შესხურება მცენარის მოსვენების სტადიაში. ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 4°C დაბალი, 3- 4% კონცენტრაციით	-(1)	3(1)
		10-15	ვაზი	ფარიანების და ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრების მოზამთრე ფაზები	შესხურება გაზაფხულზე კვირტების გახსნამდე	-(1)	7(3)
		20-30 10-25	ვაშლი, მსხა-ლი, დეკორა-ტიული მცენარეები	ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულში როცა გა-მოჩნდება მოხეტიალე მატლები, შესაძლებელია რომელიმე ფოსფორორგული პრეპარატის შერევა	21(1)	
196	ტუნჩი, სკ 150 გ/ლ (ინდოქსაკარბი)	0.25	ვაზი	ყურძნის ჭია ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	10(2)	10(4)
	„ასტრანოვა ტარ. ტიკ. ვე სან. ა.ს.“ თურქეთი 1414	0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	14(4)	10(4)
		0.45	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	14(4)	10(4)
197	ულტიმატუმი, ვე 500+50 გ/ლ (კლორპირიფოსი+ციპერ მეტრინი) (თ), (1) „ დევა აგრო გმზხ“ გერმანია 1161	1.5	ვაშლი, ატამი. ქლიავი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	4 0(3)	7(3)
		1.5	ვაზი	ყურძნის ჭია ფოთლიხვევიები ფარიანები, ცრუფარიანები	„	40(2)	10(4)
		1,3	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო, ჭია წურბელა, ბუგრები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 600 ლ/ჰა	30(2)	10(4)
		1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	„	30(2)	10(4)
		1,2	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბუგრები	„	30(1)	10(4)
198	ულტრატოქსი, სკ 480 გ/ლ (თიაკლოპრიდი) (თ), (1)	0.15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II ასაკის მატლების წინააღმდეგ მავნებლის 2 თაობაში (ივნისი-ივლისი). ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	20(2)	4(1)
	“პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ”	0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	20(1-2)	7(3)
	ინდოეთი 685/15	0.15	კიტრი პამიდორი	ბუგრების კომპლექსი		20(1)	7(3)
		0.4	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა	30(2)	7(3)
		0.4-0.5	ვაშლი	ნაყოფჭამია ფოთლიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (მაისი-ივლისი),	30(1-2)	7(3)

				ყვავილჭამია	ხარჯვის ნორმა 800-1200 ლ/ჰა შესხურება კოკრების განცალკევების ფაზაში		
		0.5-0.6	ციტრუსები	ბუგრები, ცრუფარიანები, ფარიანები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით. ხარჯვის ნორმა 2000-2500 ლ/ჰა	30(1-4)	7(3) 7(3) 7(3)
199	ფაინსულფური 80 წდგრ 800 გ/კგ	6-7,5	თესლოვანი ხეხილი	ტკიპები	„	7(2)	4(1)
	(გოგირდი) (3)	12-15	ციტრუსი		„	7(2)	4(1)
	“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 1050						
200	ფასი, სკ 100 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0.25	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, პურის დიდი ხოჭო, ჭიჭინოზელები, თრიფსები, რწყილები, ჭიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
	შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 1214	0.25	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)
		0.25	პამიდორი	ბამბის ხვატარი ბუგრები		15(2)	10(4)
		0,15	კომბოსტო	ხვატრები, კომბოსტოს ბუზი, ჩრჩილი, თეთრულები		30(2)	10(4)
		0.3-0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები		25(2)	10(4)
		0.15	რაფსი	რაფსის ყვავილჭამია, რწყილები		30 (2)	10(1)
201	ფასტაკი, კვ 100 გ/ლ (ალფაციპერმეტრინი)	0.1-0.15	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭრიჭინოზელები, თრიფსები, ჭიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	10(4)
	(თ), (1) “ზასფი აგ”	0.07-0.1 0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		15(2)	-(4)
	გერმანია 073/04/09/15	0.25-0.35	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	-(4)
		0.2-0.3	ვაშლი	ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები ამერიკული თეთრი პეპელა		50(2)	10(4)
		0.1	ბარდა, ლობიო	ბუგრები, მემარცვლიები	შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ	20(1)	10(4)
		0.1	შაქრის და სუფრის ქარხალი	ქარხლის ფოთლის ბუგრი, ქარხლის მენადმე ბუზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	45(2)	10(4)
		0.1	თამბაქო	ბუგრები		14(1)	10(4)
		0.15-0.2	იონჯა (სათესლე ნაკვეთები)	ცხვირგრძელები, ბაღლინჯოები, ბუგრები	შესხურება კოკრების ფაზაში	-(1)	-()

			სამკურნალო მცენარეები				10(4)
		0.3	(ასკილი	ცხვირგრძელები	შესხურება ყვავილობის დაწყებისას	-(1)	
		0.2	სამკურნალო ტუხტი	ფოთლიხვევები	შესხურება აღმოცენებისა და ზრდის აქტიური დაწყებისას	30(1)	10(4)
		0.2	შავბალახა	ჭრიჭინოებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	10(4)
		0.5	ლავანდა	დუჟიანა ჭრიჭინოებელა		30(2)	10(4)
		0.4	სალბი (ხარისვარდა)	სალბის ცხვირგრძელები, ჭრიჭინოებლები		30(1)	10(4)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვიანი ჯიშები	ოქროვუდა, ფოთლიხვევები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდეულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	10(4)
		0.05-0.1		არაფარდი პარკ-ხვევია, ხერხიები და სხვ. ფოთლის მღრღნელი მაწებლები		-(1)	1(1)
		0.01	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)		-(1)	1(1)
		2.5-5 მლ/მ ²	წიწვოვნები	მერქნისა და ტექნიკური მაწებლები	შესხურება შტაბელებად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	1(1)
		3 მლ/მ ²		მერქნის მაწებლები	ინიექცია ქერქის ქვეშ	-(1)	1(1)
		0.2 მლ/მ ²	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობები და მარცვალგადასამ უშავებელი მოწყობილობა	მაწებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 50 მლ 1 მ ² -ზე. საწყობების დატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება 20 დღის შემდეგ	-(1)	1(1)
		0.4 მლ/მ ²	მარცვალგადასამ უშავებელი და მარცვალ- საცავი მეურნეობე ბის ტერიტორია		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ ² -ზე	-(1)	20(20)
		16 მლ/ტ	სათესლე მარცვალი	მაწებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 500 მლ 1 ტ მარცვალზე. მარცვლის სასურსათედ ან საფურაჟედ გამოყენება არ შეიძლება	-(1)	1(-)
		0.1-0.15	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები უმცროსი ასაკის მატლები, არაჯოგური ფორმები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	20(20)
		0.15-0.2		უფროსი ასაკის მატლები და იმაგო, ჯოგური ფორმები		20(1)	10(4)
202	ფენდი , კვ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0,5-0,6 0,25-0,35	ვაზი	ყურძნის ჭია ფოთლიხვევები ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	30(2)	10(4)
	„ინდასტრიალ ქუიმიკა ქეი ს.ა.“ ესპანეთი 1299	0.35-0.45 \	თესლოვნები	ვაშლის ნაყოფჭამია, კუნელის რგოლურა მენადმე ჩრჩილი, ფსილები, ბუგრები		30(2)	10(4)

		0,7-0,9		ტკიპები			
		0,6-0,8 0,3-0,4	კურკოვნები	ტკიპები ნაყოფქამიები ბუგრები		30(2)	10(4)
		0,45-0,65 0,25-0,3 0,6-1,0	თხილი	ტკიპები ბუგრები, ცხვირგრძელა, მაჭაურა ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ	21(2)	10(4)
		1,2-1,6 0,75-1 0,6-1	ციტრუსი	ტკიპები ბუგრები ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო	„	30(2)	10(4)
		0,3-0,4 0,3-0,6	სიმინდი	ტკიპები მარმარა ყავისფერი სუნიათი ბაღლინჯო	„	15(1) 15(2)	10(4)
		0,3-0,4 0,15-0,2	პამიდორი	ტკიპები ბამბის ხვატარი ბუგრები ფრთათეთრა		15(1)	10(4)
		0,25-0,35 0, 1-0,15	ბარდა	ტკიპები თამბაქოს ფრთათეთრა		15(1)	10(4)
		0,15-0,2	ბროკოლი, ბრიუსელის კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, კომბოსტო	ბუგრები ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	10(4)
		0,3-0,4 0,15-0,2	ბადრიჯანი გოგრა მწვანე ლობიო წიწაკა	ტკიპები ფრთათეთრა ბუგრები		15(1)	10(4)
		0,1-0,15	სალათი	ბუგრები ხვატრები		15(1)	10(4)
		0,25-0,35	მარწყვი	ტკიპები		15(1)	10(4)
			სვია	ბუგრები		21 (1)	10(4)
		0,5-0,6 0,25-0,3	დეკორატიული მცენარეები	ტკიპები ბუგრები		-(2)	10(4)
		0,75-1,5	ფიჭვი	პარკიხვევია		21 (1)	10(4)
		0,35-0,5	ხეხილის ნერგები	მწუწნი მწერები		-(2)	10(4)
203	ფენდონა 15 სკ 15 გ/ლ (ალფა-ციპერმეტრინი) (თ),(1) „ბასფი აგრო ზ.ვ.“ შვეიცარია 762/16	100 მლ/20 კვ.მ.	სასოფლო- სამეურნეო დანამუშავების შენობები, მ.შ. ელევატორები, წისქვილკომბინა ტები, ბელბები, საწყობები, საწარმოო და კვების ობექტები, გადამამუშავებ ლი ცეხები	მფრინავი და მცოცავი მავნებელთა კომპლექსი (გარდა ბუზებისა), ბელბის მავნებლები, ცხვირგრძელედი, რწყილები, ხოჭოები, კოლოები, ქინქლები	ზედაპირის შესხურება მავნებლების გამოჩენისას. 100 მლ იხსნება 4.9 ლიტრ წყალში	-(1)	-(-)

204	ფიბულა, გრ 60 გ/კგ (მეტალდეჰიდი) (თ) „მენტა ტარიმ ტარიმ ილკ. სან.ვე ტიკ. ლტდ“ თურქეთი 1440	15 კგ	ბოსტნეულ- ბალჩეული, კიტრი- პამიდორი დაცულ გრუნტში, ხეხილი, ტყის ჯიშები, ციტრუსები, კენკროვანები, ვაზი, თამბაქო, დეკორატიული მცენარეები, საჩითილე და სანერგეები	ლოფორთქინები და ლოკოკინები	გაფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე, რიგთაშორის და ბილიკებზე, მავნებლის გამოჩენისას	20(1)	10(4)
205	ფიური 10 წე 100 გ/ლ (ზეტა-ციპერმეტრინი) (1)	0.1	სამოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული მიწები	კალსებრნი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით	20(2)	7(3)
	“ფმს ქემილ სპრლ” ბელგია 470/04/09/18	0.1	ხორბალი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭოები, ბუგრები, ჭიაწურბელა, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.015%-იანი სამუშაო ხსნარით, 7 დღიანი ინტერვალით	20(2)	10(4)
		0.1-0,15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჭიამაია კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.03%-იანი სამუშაო ხსნარით,	30(2)	-(3)
		0.2-0.36	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ 0.02%- იანი სამუშაო ხსნარით, 7-10 დღიანი ინტერვალით	30(2)	7(3)
		0.2-0.3	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.03%-იანი სამუშაო ხსნარით, 7-10 დღიანი ინტერვალით	25 (2)	7(3)
		0.1	კომბოსტო	თეთრულა, ჩრჩილები, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თავის ჩახვევამდე 0.02%-იანი სამუშაო ხსნარით, 7 დღიანი ინტერვალით	25(2)	7(3)
		0,3-0,4	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო, ამერიკული თეთრი პეპელა, თხილის ცხვირგრძელა, თხილის ხარაბუჯა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, 7 დღიანი ინტერვალით	25(4)	7(3)
		0,15-0,2	სიმინდი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო, ბამბის ხვატარი,, ფარვანა		20(2)	10(4)
		0,4-0,5	ციტრუსები	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო		25(4)	7(3)
		0,2-0,3	კივი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო, ამერიკული თეთრი პეპელა, თრიფსები		25(2)	7(3)
		0,15-0,2	პომიდორი	ბამბის ხვატარი, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში(ნაყოფის	20(2)	7(3)

					ფორმირებამდე), 7 დღიანი ინტერვალთ		
206	ფორსი 1,5 გ, გრ 15 გ/კგ (ტეფლუტრინი) (თ)(3)	10-15	კარტოფილი	ნიადაგის მავნებლების კომპლექსი (მავთულა და ცრუმავთულა ჭიები)	ნიადაგში შეტანა (მწკრივებში) რგვის დროს ან დარგვის შემდეგ	-(1)	7(3)
	„სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ“ შვეიცარია 810/16	10-15	სიმინდი	ნიადაგის მავნებლების კომპლექსი ხოჭო დიაბროტიკა	ნიადაგში შეტანა (მწკრივებში) თესვასთან ერთად ან დარგვის შემდეგ	-(1)	7(3)
207	ფოს-ბი, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოათი) (1) “ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ” კანადა 972/18	1.5-2.1	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები, ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	40(2)	10(4)
		1.5-2.1	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		1,9-2,4 1,4-1,9	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)
		0,8-1,2	ბოსნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინებლები		30(2)	10(4)
		1.3-1.5	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიჭურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლეები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	შაქრის ჭარხალი სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1,5-2.5	ვაზი	კოქციდები ტკიპები, ფოთლიხვევიები,		20(2)	10(4)
		2.5-3	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
208	ფოსტოქსინი, აბი, გრ 560 გ/კგ (ალუმინის ფოსფიდი) (თ), (1) “დეტა დეგიში გმზხ” გერმანია	5გ/მ3 (2აბი)	ჩაუტვირთავი მარცვალსაცავები	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმিგაცია 15-160C-ის დროს ექსპოზიცია 5 დღე. პერსონალის დაშვება მოხდება მხოლოდ განიავების შემდეგ, როცა ფოსფინის შემცველობა სამუშაო ზონის ჰაერში არ აღემატება	-(1)	7(3)

					ზდკ-ს.		
	შპს „გორდი“ საქართველო 458/05/10/16	9 გ/მ3 (3აბი)	მარცვალ (სასურსათო, სათესლე, საფურაჟე)	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 10 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	-(-)
		6 გ/მ3 (2აბი)	ფქვილი, ბურღული საწყობში ან პოლიეთილენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		5 გ/მ3 (2აბი)	მშრალი ბოსტნეული საწყობში ან პოლიეთილენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 5 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		2,4 გ/მ3 (1აბი)	მარცვლოვანი ან პარკოსანი კულტურების მარცვალ გემისა და ტანკერების ტრიუმებში, ნავსადგურებში	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 15-160C-ის დროს, ექსპოზიცია ფიტოექსპოზი- მის ტექნოლოგიის გამოყენებით-16 დღე; რეცირკულაციის მეთოდით 1 დღე. დეგაზაცია რეისის დროს და დრეიფის დროს; მარცვლის დათვალიერება და დატვირთვა მოხდება მაშინ, როცა ფოსფინის შემცველობა მარცვლის ზედაპირიდან 0,5-1 მ სიმაღლეზე 0,1 მგ/მ3-ია. დეალიზაცია მოხდება როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს. ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, როცა ჰაერში ფოსფინის შემცველობა არ აღემატება მდდ- ს.	-(1)	-(-)
209	ქლორპირიფიტი-აგრო, მკ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი)	1-1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	7(3)
	(თ), (1) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა	1.5 2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები, ცრუფარიანები მენადმე ჩრჩილი		40(1)	10(4)
	შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 902/17	1.5-2	ვაზი	ყურძნის ჭია, ფარიანები, ცრუფარიანები		40(1)	10(4)
		0.75-1.0	ხორბალი	ჭია წურბელა, პურის ბზუალა		30(1)	10(4)
		0.5-0.75	ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.8-1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		40(2)	10(4)
		1-1.5	შაქრის ჭარბალი	ცხვირგრძელა, რწყილები		30(2)	10(4)
		1-1,5	რაფსი	რაფსის კოკრიჭამია, ხვატრები, თეთრულები		30(1)	10(4)
		1.5	არასასოფლო- სამეურნეო დანამუშავების მიწები	კალიები (მატლების განვითარების პერიოდში)		20(1)	10(4)

210	ცეზარი, ეკ 100 გ/ლ (ბიფენტინი) (თ), (1)	0.2	ვაზი	ფოთლიხვევიები ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
	„ადამა აგრიკალჩერ ზვ“ ნიდერლანდები 1329	0.4-0,5	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ტკიპები ბუგრები ჩრჩილები	„	30(2)	10(4)
		0.4-0,5	კაკალი თხილი	მავნებლების კომპლექსი	„	30(2)	10(4)
211	ციპერსანი, ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (3) „აგრიკო გრუპ ოოდ“ ბულგარეთი 412/08/12/17	0.16-0. 32	ვაშლი	ნაყოფჭამია, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(2)	7(3)
		0.26-0. 32	ვაზი	ფოთლიხვევიები		25(2)	7(3)
		0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
212	ციპრინი, ეკ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1) „ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ“	0.15 0.35	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.2	ხორბალი	ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები		20(2)	-(3)
	კანადა 973/18	0.4 0.15-0.2 0,5	შაქრის ჭარხალი შაქრის ჭარხალი (სათესლე ნაკვეთები)	მომღრღნელი ხვატრები მდელოს ფარვანა ბუგრები		-(4)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჭიაძია კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7 (3)
		0.5	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები			
		0.35	სოიო	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია		20(2)	-(3)
		0.15-0.25	ჯვარყვავი -ლოვანი კულტურები (სათესლე ნაკვეთები)(	რაფსის ყვავილჭამია		-(3)	-(3)
		0.15-0.2	რაფსი, მდოგვი	რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვავილოვან-თა რწყილები ბადლინჯოები, თეთრულეები, ბუგრები		-(3)	7(3)
		0.16-0,2	კომბოსტო	თეთრულეები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(3)	-(3)
		0.25	იონჯა	ფიტონომუსი		20(2)	2(-)
		1.2-1.6	კიტრი	ფრთათეთრა		3(2)	7(3)

		0.65-0.8	პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ბუგრები, თრიფსები			
		0.25-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები		25(3)	7(3)
		0.2-0.4	ვაშლი ატამი	ნაყოფქამიები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები		25(3)	7(3)
		0.24-0.32	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები	შესხურება გაზაფხულზე	20(1)	7(3)
		0.5	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები	“	20(2)	-(-)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროკუდა, ფოთლის და წიწვის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდეულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	-(-)
		0.01-0.05	მუხა	არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევები, მზომელები		-(1)	1(1)
		0.05	ნაძვი	ჩვეულებრივი ნაძვის ხერხია		-(1)	1(1)
		0.08-0.016 0.04-0.1	ფიჭვი	ფიჭვის მეფისე ფიჭვის წითური ხერხია ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები) ფიჭვის დიდი ცხვირგრძელა		-(1)	1(1)
		0,04	ფიჭვი	ფიჭვის დიდი ცხვირგრძელა	ნერგების შესხურება დარგვის წინ	-(1)	-(-)
		2-4 მლ/მ2	წიწვოვნები	მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები	შესხურება შტაბელგად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	-(-)
		3 მლ/მ2	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მერქნის მავნებლები	ინიექცია ქერქის ქვეშ (ნაჩვენებია 1 მ2 ქერქის ზედაპირისათვის საჭირო დოზა)	-(1)	-(-)
		0.05-0.1	ქალაქის მწვანე ნარგობა	არაფარდი პარკხვევია, ჩრჩილები, მღრღნელი მავნებლები	მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.01% სამუშაო ხსნარით	7(1)	-(3)
		0.1-0.15	სამოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩევის პერიოდში	20(1)	1(1)
		0.8 მლ/მ2	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობა-ნაგე- ბობები და მარცვალ- გადასამუშა ვებელი მანქანა- იარაღები	მავნებლები შენახვის პირობებში, ტკიპების გარდა	შესხურება. ხარჯის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე. საწ-ყოების ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება 1 დღე- ღამის შემდეგ დამუშავებიდან	-(1)	1(1)
213	ჯეტისი 2,5 ეკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი)	0.25-0,5	მარცვლოვნები	მავნე კუსებურა, ჭიჭურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)

	(თ), (2) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1311/18			ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუხები, ცხვირგრძელები, პურის ბზუალა			
		0.5-0.7	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა, სიმინდის ხერხია		20(2)	-(3)
		0.15-0,45	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა, ბამბის ხვატარი		20(2)	7(3)
		0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.2-0,5	ლობიო, ბარდა	ცხვირგრძელები , იონჯის ხვატარი, მემარცვლიები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.5 0,4 1,0	ბოსტნეული	მომღრღნელი ხვატარები, მწვანე ფაროსანა, თრიფსები, ბუგრები, ჰიპინობლები მემარცვლიები, ბუგრები, ბამბის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0.25-0.5	შაქრის ჭარხალი	ხვატრები, რწყილები, ჭარხლის ფაროსანა,მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.45-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ხერხიები, ჩრჩილები, ფოთლის მენადმე ჩრჩილი, კვირტის ფოთლიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.3-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევები, ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების ყოველი თაობის წინააღმდეგ	30(2)	7(3)
		02-0,45	ზეთისხილი	ზეთის ხილის ბუზი, ჩრჩილი, ცრუფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0,25-0,4	თხილი	არაფარდი პარკიხვევია		20(2)	7(3)
214	ჰაბლა 100, გვ 100 გ/ლ (ბიფენტრინი) (თ), (1)	0.25 0.45	ვაზი	ყურძნის ჭია ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების მიმართ 0.02 -0.04%- იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
	„აგროტეზ ტარიმ სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1253	0.35-0.45	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია წითელი ხეხილის ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I და II თაობის მატლების წინააღმდეგ 0.045 %- იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)
		0.6	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.06 %-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	10(4)

		0, 6 0, 75	ატამი	ატმის მწვანე ბუგრი ატმის ჩრჩილი წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.5-0, 6 0, 4	პამიდორი ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ბამბის ხვატარი ტკიპები ატმის მწვანე ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ნაყოფების გამონასკვამდე) 0.09 %-იანი სამუშაო ხსნარით	15(1)	10(4)
		0, 7-1	სოია	ტკიპები ბამბის ხვატარი თამბაქოს ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1)	10(4)
215	ჰეროლდი, წსკ 240 გ/ლ (დიფლუბენზურონი) (2)	0.05-0,15	სამოვრები, სათიბები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენისა და განვითარებისას, კალიების დაფრთიანებამდე. ხარჯვა-200- 400 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
	დს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 903/18	0,1-0,2	არამსხმოიარე ბაღები, დეკორატიული ნარგავები, ქარსაფარი ზოლები	ფოთლის მღრღნელი მავნებლები ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მატლების გამოჩენისას. ხარჯვა- 1000-1500 ლ/ჰა	-(2)	7(3)
		0,2-1	ვაშლი	პარკიხვევიები, ოქროკუდა, კუნელის თეთრულა, ციცკნა ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კვერცხების დასაწყისში ან უმცროსი ხნოვანების მატლების გამოჩენისას	30 (2)	7(3)
		0.15	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი,თეთრულები, კომბოსტოს ჩრჩილი	შესხურება მავნებლის მატლების გამოჩენის პერიოდში. ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა	30(1)	7(3)
		4-6 მლ/მ2	ქამა-სოკო	სოკოს ბუზები კოლონები	სოკოს მიცელიუმის შემცველი სუბსტრატის მორწყვა 14 დღის ინტერვალით. ხარჯვა 2,5 ლ/მ2	25(2)	7(3)
216	ჰექტამ დელტარინი 12.5	0.6-0.7	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
	უმმ 12.5 გ/ლ	0,6	მარცვლოვნები	მარცვლოვნების ბუზები მავნე კუსებურა		20(2)	7(3)
	(დელტამეტრინი) (თ), (1) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“	0.5-1.0	ხეხილი, თხილი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები		20(2)	7(3)
	თურქეთი 943/18/18	(ა) 0,4+0,4 პროტეინის ჰიდროლიზა ტი 1,0	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 1 ლ პრეპარატი იხსნება 16 ლ დიზელში	20(2)	7(3)
		0.08-0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი კულტურები	ფოთლიხვევიები, მზომელები, ოქროკუდა, ხერხიები და სხვ. მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. დასვენება მე-5 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს	-(1)	7(3)
		1	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენისას	20(1)	7(3)
217	ჰექტამ დელტარინი 25	0,3-0,35	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის	20(2)	7(3)

	უმშ				პერიოდში		
	25 გ/ლ	0,3	ხორბალი, ქერი	მარცვლოვნების ბუჩები მავნე კუსებურა		20(2)	7(3)
	(დელტამეტრინი) (თ), (1) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“	0,25-0,5	ხეხილი	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი მავნებლები		30(2)	7(3)
	თურქეთი 1348	(ა) 0,2+0,2 პროტეინის ჰიდროლიზა ტი 0,5	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუჩი ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 1 ლ პრეპარატი იხსნება 5 ლ დიზელში	20(2)	7(3)
		0,3-1 0,5	თხილი	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	ნორმალური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თერმული ნისლის ტექნოლოგიის გამოყენებით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 0,5 ლ პრეპარატი იხსნება 2,5 ლ დიზელში.	30(2)	7(3)
		0,05	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი კულტურები	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდეულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. დასვენება მე-5 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს	-(1)	7(3)
		0,5	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკვისას	20(2)	7(3)
218	ჰექტამ პრიზანი 240 უმშ, 240 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 942/18	1,0	სამოვრები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისას 1 ლ პრეპარატი იხსნება 17,8 ლ დიზელში	20(1)	10(4)
219	ჰექტოლინეუმი, მზე 700 გ/ლ (მინერალური ზეთი) (თ), (1) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 605/13/18	25-30	ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ატამი	ფარიანების, ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრე-ბის, ფსილეების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები	შესხურება კვირტების გახსნამდე გაზაფხულზე, ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 4°C დაბალი	-(1)	3(1)
		30-45	ციტრუსები	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფრთათეთრა	შესხურება მცენარის მოსვენების სტადიაში. ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 4 °C დაბალი, 3-4% კონცენტრაციით	-(1)	3(1)
		10-15	ვაზი	ფარიანები და ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრების მოზამთრე ფაზები	შესხურება გაზაფხულზე კვირტების გახსნამდე	-(1)	7(3)
		20-30	ვაშლი, მსხალი,	ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულში როცა გა- მოჩნდება მოხეტიალე მატლები, შესაძლებელია რომელიმე ფოსფოროვანი პრეპარატის შერევა	21(1)	7(3)

		10-25	დეკორა-ტიული მცენარეები				
220	პირო 70 წდგრ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1) “აგრო ლაიფ საინს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1398	0, 15	პამიდორი კიტრი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1-2)	7(3)

მუხლი 3. როდენტიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატიული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტისახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა	დასამუშავებელი ობიექტი	მავნებელი	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება
N	1	2	3	4	5
1	დეტია მაუს გიფტკორნერი, მის 30,4 გ/კგ (თუთიის ფოსფიდი 3,04%) “დეტია დეგიშ გმზ“ გერმანია 1325	0,6-1,5 კგ/3ა 6-15 გ/100 მ	მახრას გავრცელების ადგილები ბაღები	მახრა	შეიტანენ 2-3 გრანულას ხვერლის შესასშვლელში თბილ ტენიან ნიადაგზე (წვიმის ან უხვი მორწყვიდან 2 დღის შემდეგ, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე. შემდგომ ხვერლი დაიტკეპნოს. შეტანა განმეორდეს 8-10 დღის შემდეგ
		0,6-1,5 კგ/3ა 6-15 გ/100 მ2	დაუმუშავებელი მიწები, მღრნელებით დაბინძურებული ტერიტორია ბაღები	მინდვრის თავგები	შეიტანენ 2-3 გრანულას “აქტიურ” სოროში, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე . ცხოველების შეშვება მოწამლულ ტერიტორიაზე დაუშვებელია 14 დღის განმავლობაში.
2	თუთიის ფოსფიდი, ფ 800 გ/კგ (თუთიის ფოსფიდი) “პარიჯატ ინდასტრის პეტ ლტდ” ინდოეთი 190/05/10/15	თუთიის ფოსფიდის შემცველობ ა მისატყუე ბელში 2,5%-5%-ია	საშემოდგომო ხორბალის ნათესები, მრავალწლიანი ბალახები	ჩვეულებრივი და საზოგადოებრივი მემინდვრები, ქარცი მემინდვრია	შეტანა ბადის მეთოდით, ყოველ 5-10 მეტრში. იყენებენ სპეციალურ გრძელტარაიან კოვზს ან სპეციალურ გამფანტველებს. “აქტიურ” სოროში შეიტანენ 5-10 გ მზა მისატყუებელს ფრინველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე, შემდეგ სოროს მიწას მიაყრიან. საჭიროების შემთხვევაში შეტანას იმეორებენ ყოველ მეცხრე დღეს (მხოლოდ სამჯერ), დამუშავების დროა სექტემბერი - მაისი.
		თუთიის ფოსფიდის შემცველობ ა მისატყუე ბელში 2,5%-5%-ია	დაუმუშავებელი მიწები, საძოვრები, სათიბები, მინდვრები, ბაღები, თხილისა და ციტრუსების, ტყის ნარგავები, კენკროვნები,	მინდვრის და ტყის თავგები	მისატყუებელს განალაგებენ 5 მეტრის სიგანის ზოლებად და შეიტანენ 2-3 გ “აქტიურ” სოროში, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე გრძელტარაიანი კოვზით, შემდეგ კი სოროს მიტკეპნიან. შეტანას იმეორებენ საჭიროების

			ბოსტნეული კულტურები, სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო შენობები, საწყობები		მიხედვით (არა უმეტეს 3 დამუშავებისა).
		თუთიის ფოსფიდის შემცველობა ა მისატყუებელ- ში 2,5%- 5%-ია	შენობებისაგან თავისუფალი ტერიტორიები, საწარმოო ობექტები და საწყობები, საცავები, პორტების მეურნეობა, გემები, რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწორვ, მცხოვრელების მეურნეობა	მაღი და რუხი ვირთაგვები	მისატყუებელს განალაგებენ 5 მეტრის სიგანის ზოლებად და შეიტანენ 15 გ „აქტიურ“ სოროში, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე გრძელტარაიანი კოვზით, შემდეგ კი სოროს მიტკეპნიან. ან შეტანა კონტეინერებში - 30 გ, სოროს შემდგომი მიტკეპნით. შენობების ახლოს მისატყუებელი გამოიყენება მხოლოდ სადერატიზაციო ყუთებში. შეტანას იმეორებენ საჭიროების მიხედვით
3	რატიციდი, ფ 800 გ/კგ (თუთიის ფოსფიდი) „უპლ ზირაატ ვე ქიმია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 847/17	თუთიის ფოსფიდის შემცველობა ა მისატყუებელ- ში 2, 5%-5%-ია	საშემოდგომო ხორბლის ნათესები, მრავალწლიანი ბალახები	ჩვეულებრივი და საზოგადოებრივი მემინდვრები, ქარცი მემინდვრია	შეტანა ბადის მეთოდით, ყოველ 5-10 მეტრში. იყენებენ სპეციალურ გრძელტარაიან კოვზს ან სპეციალურ გამფანტველებს. „აქტიურ“ სოროში შეიტანენ 5-10 გ მზა მისატყუებელს ფრინველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე, შემდეგ სოროს მიწას მიაყრან. საჭიროების შემთხვევაში შეტანას იმეორებენ ყოველ მეცხრე დღეს (მხოლოდ სამჯერ), დამუშავების დროა სექტემბერი – მაისი.
		თუთიის ფოსფიდის შემცველობა ა მისატყუებელ- ში 2, 5%-5%-ია	დაუმუშავებელი მიწები, საძოვრები, სათიბები, მინდვრები, ბაღები, თხილისა და ციტრუსების, ტყის ნარგავები, კენკროვნები, ბოსტნეული კულტურები, სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო შენობები, საწყობები	მინდვრის და ტყის თაგვები თხუნელა	მისატყუებელს განალაგებენ 5 მეტრის სიგანის ზოლებად და შეიტანენ 2-3 გ „აქტიურ“ სოროში, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე გრძელტარაიანი კოვზით, შემდეგ კი სოროს მიტკეპნიან. შეტანას იმეორებენ საჭიროების მიხედვით (არა უმეტეს 3 დამუშავებისა).
		თუთიის ფოსფიდის შემცველობა ა მისატყუებელ- ში 2, 5%- 5%-ია	შენობებისაგან თავისუფალი ტერიტორიები, საწარმოო ობექტები და საწყობები, საცავები, პორტების მეურნეობა, გემები, რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწორვ, მცხოვრელების მეურნეობა	მაღი და რუხი ვირთაგვები	მისატყუებელს განალაგებენ 5 მეტრის სიგანის ზოლებად და შეიტანენ 15 გ „აქტიურ“ სოროში, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე გრძელტარაიანი კოვზით, შემდეგ კი სოროს მიტკეპნიან. ან შეტანა კონტეინერებში - 30 გ, სოროს შემდგომი მიტკეპნით. შენობების ახლოს მისატყუებელი გამოიყენება მხოლოდ სადერატიზაციო ყუთებში. შეტანას იმეორებენ საჭიროების მიხედვით
4	სუპერ ცინკი, ტექ. ფ 800 გ/კგ (თუთიის ფოსფიდი) „აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 749/15	თუთიის ფოსფიდის შემცველობა ა მისატყუებელ- ში 2,5%- 5%-ია	საშემოდგომო ხორბლის ნათესები, მრავალწლიანი ბალახები	ჩვეულებრივი და საზოგადოებრივი მემინდვრები, ქარცი მემინდვრია	შეტანა ბადის მეთოდით, ყოველ 5-10 მეტრში. იყენებენ სპეციალურ გრძელტარაიან კოვზს ან სპეციალურ გამფანტველებს. „აქტიურ“ სოროში შეიტანენ 5-10 გ მზა მისატყუებელს ფრინველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე, შემდეგ სოროს მიწას მიაყრან. საჭიროების შემთხვევაში შეტანას იმეორებენ ყოველ მეცხრე დღეს (მხოლოდ სამჯერ), დამუშავების დროა სექტემბერი - მაისი.
		თუთიის	დაუმუშავებელი	მინდვრის და ტყის	მისატყუებელს განალაგებენ 5 მეტრის სიგანის

		ფოსფიდის შემცველობა მისატყუებელში 2,5%-5%-ია	მიწები, საძოვრები, სათიბები, მინდვრები, ბაღები, თხილისა და ციტრუსების, ტყის წარგავები, კენკროვნები, ბოსტნეული კულტურები, სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო შენობები, საწყობები	თაგვები	ზოლებად და შეიტანენ 2-3 გ „აქტიურ“ სოროში, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე გრძელტარბიანი კოვზით, შემდეგ კი სოროს მიტკეპნიან. შეტანას იმეორებენ საჭიროების მიხედვით (არა უმეტეს 3 დამუშავებისა).
		თუთიის ფოსფიდის შემცველობა მისატყუებელში 2,5%-5%-ია	შენობებისაგან თავისუფალი ტერიტორიები, საწარმოო ობექტები და საწყობები, კორტების მეურნეობა, გემები, რკინიგზის საავტომობილო გზების გასწვრივ, მეცხოველეობის მეურნეობა	შავი და რუხი ვირთაგვები	მისატყუებელს განალაგებენ 5 მეტრის სიგანის ზოლებად და შეიტანენ 15 გ „აქტიურ“ სოროში, ფრინველების და სხვა ცხოველებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეზე გრძელტარბიანი კოვზით, შემდეგ კი სოროს მიტკეპნიან. ან შეტანა კონტეინერებში - 30 გ, სოროს შემდგომი მიტკეპნით. შენობების ახლოს მისატყუებელი გამოიყენება მხოლოდ სადერატიზაციო ყუთებში. შეტანას იმეორებენ საჭიროების მიხედვით
5	შტორმი, ბრ 0.05 გ/კგ (ფლოკუმაფენი) (თ) “ბასფი აგ” გერმანია 191/04/09/15	-	საწყობები, სათავსოები, სარდაფები, კომბსაკვების ცეხები, დახურული გრუნტი, სამეურნეო შენობები, მარცვალგადასამუშავებელი საწარმოები	ბინის თაგვი	1 ბრიკეტი განლაგდება მისატყუარის დამცველ ყუთებში. მას განალაგებენ როგორც შენობის იატაკზე, ისე მის სხვადასხვა სიმაღლეზე. განლაგებულ წერტილებს შორის მინიმალური დაშორება 2 მ-ია. შეჭმულ მისატყუარის განახლება ხდება სამჯერ 2 კვირის განმავლობაში
		-	“	რუხი ვირთაგვები	ყოველ დამცველ ყუთში მოთავსდება 2 ბრიკეტი, არა ნაკლებ 4 ნაკვეთურში, რომლის ფართი 50მ2-მდეა. შედარებით დიდი ფართობის სათავსოების გარეთა მხარეზე განლაგებულ წერტილებს შორის ინტერვალი 10-15 მ-ია. შეჭმულ მისატყუარის განახლება ხდება 2-ჯერ 10 დღის განმავლობაში
		-	“	შავი ვირთაგვა	“ შეჭმულ მისატყუარის განახლება ხდება 3-ჯერ 14 დღის განმავლობაში

მუხლი 4. ნემატიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	მავნე ობიექტი	დამუშავების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1.	ფენდალ ფენოსი 400 , კგ 400 გ/ლ (ფენამიფოსი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	7,5	ხახვი	ნემატოდები (გარდა კოლუმბიის გალებიანი ფესვის ნემატოდის	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე ან დარგვამდე მექანიკურად (ზედაპირული დადისკვით) . ხარჯვა 250 ლ/ჰა	80(1)	10(3)

	თურქეთი 1035/18			ა)			
		4,0	ბარდა	ნემატოდები (გარდა კოლუმბიის გაღებებიან ფესვის ნემატოდისა)	ნიადაგის შესხურება პირდაპირ დათესვის შემდეგ, მაგრამ კულტურის აღმოცენებამდე. ხარჯვა 250 ლ/ჰა	90(1)	10(3)
		3,0	თამბაქო	ფესვის გალიანი ნემატოდები თამბაქოს ტკიპა	მიმართული ფოთლოვანი შესხურება მცენარეების ზრდის წერტილის ქვემოთ დარგვიდან 3 კვირის შემდეგ, განმეორებითი შესხურება 5-6 კვირის შემდეგ. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	42(2)	10(3)
2	ვიდატი, 10 ლ, წზკ 100 გ/ლ (ოქსამილი) (თ), (I) "დიუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ." შვეიცარია 1099/19	10-20 10 (ჯამურად არაუმეტეს 50 ლ/ჰა)	პამიდორი (მ.შ. ჩერი) ბადრიჯანი, (დახურული გრუნტი)	გალიანი ნემატოდები	გამოიყენება წვეთოვანი მორწყვის მეთოდით ჩითილების დარგვისთანავე წვეთოვანი მორწყვა ჩითილების დარგვის შემდეგ (პირველი ნამდვილი ფოთლის ფაზიდან ჩითილების დარგვიდან 42 დღის განმავლობაში) 10-14 დღის ინტერვალით	- (1) 28(1-3)	1(1)
		10-20 10 (ჯამურად არაუმეტეს 40 ლ/ჰა)	წიწკა (დახურული გრუნტი)		გამოიყენება წვეთოვანი მორწყვის მეთოდით ჩითილების დარგვისთანავე წვეთოვანი მორწყვა ჩითილების დარგვის შემდეგ (პირველი ნამდვილი ფოთლის ფაზიდან ჩითილების დარგვიდან 28 დღის განმავლობაში) 10-14 დღის ინტერვალით	-(1) 35 (1-2)	1(1)
		10-20 10 (ჯამურად არაუმეტეს 30 ლ/ჰა)	კიტრი (დახურული გრუნტი)		გამოიყენება წვეთოვანი მორწყვის მეთოდით ჩითილების დარგვისთანავე წვეთოვანი მორწყვა ჩითილების დარგვის შემდეგ (პირველი ნამდვილი ფოთლის ფაზიდან ჩითილების დარგვიდან 14 დღის განმავლობაში) 10-14 დღის ინტერვალით	-(1) 50(1-2)	1(1)
3	ნემასოლი, წზ 510 გ/ლ (მეტამ-სოდიუმი) "ტამინკო ზეზა" ბელგია 560/10/15/19	60-120 გ/მ2	კიტრი, პამიდორი (ლია და დახურული გრუნტი), დეკორატიულ	გალეზიანი ნემატოდები	მექანიზებული შეტანა 20 სმ სიღრმეზე და ნიადაგის დაფარვა ცელოფანის აპკით. თესვა ან რგვა 30 დღის შემდეგ	-(1)	30(30)

			ი კულტურები				
		80-120 გ/მ2	მრავალწლიანი ი კულტურების სანერგეები	“	“	-(1)	30(30)

მუხლი 5. ფუნგიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატი ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	დაავადება	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	აზიგა-პიკი, წხ 400 გ/ლ (სპილენძის ქლორჟანგი) (4)	2.3-3	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5%- იანი სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
	შპს ტორგოვი დომ „სელხოზქიმია“	2.2-3.75	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
	რუსეთი 509/10/15	2.5-3..5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5%- იანი სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		3.5-5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5%- იანი სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		2.3-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5%- იანი სამუშაო ხსნარით	20(3)	3(1)
		3.5-5	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5%- იანი სამუშაო ხსნარით	20(3)	3(1)
		2.3-2.5	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		5.5-7.5	სვია	“	“	20(4)	3(1)
		3.75-7.5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.5%- იანი სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		11.5-15	“	“	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1.5-2 %- იანი სამუშაო ხსნარით	- (1)	3(1)
		3.75-7.5	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		11..5-15	“	“	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1.5-2 %- იანი სამუშაო ხსნარით	- (1)	3(1)
		4.8-6.2	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის	30(6)	3(1)

					პერიოდში 0.5%-იანი სამუშაო ხსნარით		
			სამკურნალო მცენარეები				
		1.9-3.5	ლავანდა	სექტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.25-0,3% სამუშაო ხსნარით	20(3)	3(1)
		1.8-2.8	ძაღლყურძენა	ფიტოფთოროზი	“	20(2)	3(1)
		1.9-2..3	ფუტკარა	სექტორიოზი	“	35(2)	3(1)
		2.2-2.3	მრავალმარღვა)	ნაცარი	“	40(2)	3(1)
		0.4-1 1.5--3.5	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგე)	აღმონაცენთა ჩაწოლა, ნერგების ფესვის სიდამპლე, ყლორტების ფუზარიოზი, ბაქტერიოზი	აღმონაცენთა და ნერგების შესხურება 0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	-(3)	3(1)
		2.0-4.5	თუთა (ახალგაზრდა პლანტაციები)	“	“	-(4)	3(1)
		1.25-2	დეკორატიულ ი კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 0.5%-იანი სამუშაო ხსნარით	-(2)	3(1)
		12.5-15	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.5%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(3)	3(1)
		1.9-7.75	წიწვოვანი და ფოთლოვანი ჯიშები	ჟანგა, ციტოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.5-1%-იანი სამუშაო ხსნარით	-(1)	3(1)
2	ავალონი 250, წე 250 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი) (3) „ქემია ს.პ.ა.“ იტალია 1430	0.5 0,5-0,8	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი ყავისფერი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პროფილაქტიკური დამუშავება ყოველ 6-8 დღეში ეთხელ კაკლის ზომის მიღწევამდე და შემდეგ ყოველ 10-15 დღეში	40(1-2)	7(3)
		0,5-0,8 0,5	გარგარი, ატამი, ნეკტარინი	მონილიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 10-14 დღის ინტერვალით	20 (2-3)	7(3)
		0,5	კაკლოვნები	ანთრაქნოზი ფომოფისი	პროფილაქტიკური დამუშავება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღის ინტერვალით	20 (2-3)	7(3)
		0,4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში სხვა მექანიზმის მქონე პრეპარატების მონაცვლეობით: პროფილაქტიკური დამუშავება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 10-14 დღის ინტერვალით	35 (2-3)	7(3)

		0,4-0,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, ჭვავი	ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, მურა, ყვითელი, ღეროს ჟანგა, ნაცარი სექტორიოზი ფუზარიოზი, ბადისებრი ლაქიანობა	შესხურება : ყლორტების ზრდის პერიოდში ყვავილობის პერიოდში ზრდის დაწყების ფაზაში სრული ყვავილობის დროს	35(1-2)	7(3)
		0,5	კარტოფილი	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2-3)	7(3)
		0,2-0,3	პამიდორი	ალტერნარიოზი	„	15(2-3)	7(3)
		0,5-0,8	წიწაკა	ნაცარი	„	15(2-3)	7(3)
		0,4-0,5	გოგროვნები	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	15(2-3)	7(3)
		0,3	ნორი	ჟანგა	„	21(1-2)	7(3)
		0,5	ხახვი	სკლეროტინია	„	15(2-3)	7(3)
3	ავანგარდი, სფ 600 + 90 გ/კგ (მანკოცები + დიმეთომორფი) (4) „პარიჯატ ინდასტრის ჰვტ. ლტდ“ ინდოეთი 510/09/15	2-2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		2	კიტრი (სათესლე ნაკვეთები)	პერონოსპოროზი	“	-(5)	7(3)
		2	ვაზი	ჭრაქი	“	40(3)	7(3)
		2	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	40(3)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)

		2-2.5	თამბაქო	პერონოსპოროზი	“	20(3)	7(3)
4	აზობინი, სკ 250 გ/ლ (აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „მაკკინლი ტრედიინგ ლპ „ ირლანდია 1457	0.4	ჰამიდორი, კიტრი (დია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16 დღიანი ინტერვალით. საშუაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	10(2)	5(3)
		0,25-1	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ჭრაქის წინააღმდეგ, ისვრილობის პერიოდში და სიმწიფის დაწყებისას ნაცრის წინააღმდეგ. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	25(2)	7(3)
		0,3-0,6	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი რიზოქტონიოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ზუტონიზაციის ფაზაში და ყვავილობის შემდეგ	15(2)	7(3)

		0,6	ხახვი	ჭრაქი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15 სანტიმეტრის ზომის ფოჩების გამოსვლიდან და 14 დღის ინტერვალით.	15(2)	7(3)
		0.8-1.2	გოგრისებრნი	ჭრაქი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფინგიციდებთან მონაცვლეობით.	10(2)	3(3)
		0.75	საზამთრო	ალტერნარიოზი	”	10(2)	3(3)
		0.6	წიწკა	ნაცარი	”	10(2)	3(3)
5	აზოქსი, წდგრ 500 გ/კგ (აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „ დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 1162	0.3	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ნაცარი,	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16 დღიანი ინტერვალთ. საშუალო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)	5(3)
		0.4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპსისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის	25(2)	7(3)

					პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ჭრაქის წინააღმდეგ, ისვრიშობის პერიოდში და სიმწიფის დაწყებისას ნაცრის წინააღმდეგ. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.		
		0,35	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ზუტონიზაციის ფაზაში და ყვავილობის შემდეგ	15(2)	7(3)
		0,3	ხახვი	ჭრაქი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15 სანტიმეტრის ზომის ფოჩების გამოსვლიდან და 14 დღის ინტერვალით.	15(2)	7(3)
6	ათლეტი, წდგრ 750 გ/კგ (ციპროდინილი) (თ)	0, 2 0.25	ვაშლი	ქევი, ნაცარი მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	28(4)	7(3)
	„ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1126/19	0, 2 0.25-0.3	მსხალი	ქევი, ალტერნარიოზი მონილიოზი	“	28(4)	7(3)
		0, 15-0, 2 0.2-0.3	ატამი	ნაცარი მონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი	“	25(4)	7(3)
		0.2-0.3	გარგარი	მონილიოზი,	“	28(4)	7(3)

			ქლიავი ტყემალი	კლასტეროსპორიოზი			
		0, 15-0, 2 0.25-0.3	ალუბალი, ბალი	მონილიოზი კოკომიკოზი კლასტეროსპორიოზი	“	28(4)	7(3)
		0.5-0.7	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი	“	20(3)	7(3)
		1.2-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით	20(2)	5(3)
		1.2-2	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	15(2)	5(3)
7	აირონი, წდგრ 280 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი 140+სპილენძის ქლორჟანგი 140) (თ), (3) “იზაგრო სპა” იტალია 649/14/19	2-4	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე	პროფილაქტიკური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით	25 (4)	3(1)
		2-5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“	25(3)	3(1)
		6-8	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1)	3(1)
		4.5-10.5	ატამი გარგარი ქლიავი ალუბალი	ფოთლის სიხუჭუჭე ბაქტერიული სილაქავე ბაქტერიული ნეკროზი	”	-(1)	3(1)
		1,2-3,2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	პროფილაქტიკური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით	15(4)	3(1)
		1,2-3,2	კიტრი	პერონოსპოროზი	“	15(4)	3(1)
		2,0-4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი	“	20 (4)	3(1)
		3.5-4	ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	“	21(3)	3(1)
		3	ხახვი	პერონოსპოროზი	”	15 (3)	3(1)
8	აკრობატი მც, წდგრ 600 + 90 გ/კგ (მანკოცები + დიმეტომორფი) (4) “ბასფი აგრო ბ.ვ.” შვეიცარია 511/08/12/18	2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		2	კიტრი (სათესლე ნაკვეთები)	პერონოსპო-როზი	“	-(5)	7(3)
		2	ვაზი	ჭრაქი	“	40(3)	7(3)
		2	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	40(3)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპო-როზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპო-როზი	“	15(3)	7(3)

9	აკრობატი ტოპი, წდგრ 150+ 350 გ/კგ (დიმეტომორფი+დიტიან ონი) (თ),(4) “ბასფი აგრო ბ.ვ.” შვეიცარია 764/16	1.5-2	ვაზი	ჭრაქი წითურა შავი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით	30(2-3)	7(3)
10	ალგაკოლი 70 % სფ 700 გ/კგ (პროპინები) „აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი	2-3	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	30(3)	7(3)
	939/18	1,5-2,5	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	„	30(4)	7(3)
11	აკრომენი , სფ 600 + 90 გ/კგ (მანკოცები+ დიმეტომორფი) (4) „შენზენ კინგ კუენსონ ინდასტრი კო, ლტდ“ ჩინეთი 1343	2-2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
		2	საზამთრო, ნესვი	პერონოსპო-როზი	“	15(5)	7(3)
		2-2,5	ვაზი	ჭრაქი	“	30(3)	7(3)
		2	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
		2-2,5	ხახვი	პერონოსპო-როზი	“	15(3)	7(3)
12	ალექტო, წდგრ 618 გ/კგ (მეთირამი 570 + ციმოქსალინი 48 გ/კგ) (თ) „საფა ტარიმი ა.ს.“	2.0	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით. გამოიყენება სხვა ქიმიური კლასის ფუნგიციდებთან მორიგეობით		
		1.0-1,2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი			
	თურქეთი 1005/18	1.0-1,2	კიტრი, გოგრა, ნესვი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით.		
		1,0-1,2	საზამთრო	ალტერნარიოზი	„		
		1.0-1,2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“		
13	ალიეტი სფ 80 800 გ/კგ	1, 5-3	ვაშლი, მსხალი, კომში	ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი		

	(ალუმინის ფოსფატილი) (თ), (3) „ბაიერ აგ.“ გერმანია 1090/19				ფოთლების მთლიანად გაშლისას და არანაკლები 4 კვირის შემდეგ. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა		
		0, 5% – იანი ხსნარის 0, 5 – 1, 0 ლ / ხეზე	ვაშლი მსხალი (მხოლოდ დაავადების კერებში)	ფესვის ფიტოფტოროზული სიდამპლე	მორწყვა 0, 5% ხსნარით ორჯერ სეზონის განმავლობაში: ყვავილობის შემდეგ და ხელმეორედ 1 თვის შემდეგ. ამუშავდება დაზიანებული ხის ტანი და შტამბის ფუძე		
		1, 2-1, 5	მზესუმზირა	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. აკრძალულია ცხოველების საკვებად გამოყენება		
		1, 2-1, 8	რაფსი (საგაზაფხულო) რაფსი (საშემოდგომო)	პერონოსპოროზი	„		
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	„		
		2	ხახვი (მწვანე ხახვის გარდა)	პერონოსპოროზი	„		
		4	მარწყვი (სადედეები)	ნაყოფების ფიტოფტოროზული სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. აკრძალულია ნაყოფის გამოყენება		
14	ალიგატორი, წდგრ 750 გ/კგ (დითიანონი) „მაკკინლი ტრეიდინგ ლპ“ ირლანდია 1497	0.5-0.7	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- პროფილაქტიკის მიზნით, როცა ფოთლები გახდება 7-10 სმ. მაღალი ტენიანობის დროს შემდეგი წამლობები ტარდება 10 დღის ინტერვალით, შშრალ ამინდში კი ინტერვალი შეიძლება გაიზარდოს 21 დღემდე.	21(2-5)	7(3)
		0.3-0.7	თესლოვნები (ვაშლი, მსხალი)	ქეცი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, ჟანგა, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღის ინტერვალთ, სანამ არის ინფექციის საშიშროება და ასკოსპორების ფრენამდე და შემდეგ.	21(2-5)	7(3)
		0.5-0.7	კურკოვნები (ატამი, გარგარი, ბალი, ალუბალი	ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- ყვავილობის შემდეგ, წამლობები გრძელდება 10-14 დღის ინტერვალთ სანამ არის ინფექციის	21(3)	7(3)

					საშიშროება		
15	ალტო სუპერი 330 ეკ 250+80 გ/ლ (პროპიკონაზოლი+ ციპროკონაზოლი) (თ), (3) „სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ“ შვეიცარია 471/08/12/17	0.4-0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	ნაცარი, მურა, ყვითელი და ღეროს ჟანგა, ჰელმინთოსპოროზული სილაქავე, სეფტორიოზი, თავთავის ფუზარიოზი, ცერკოსპორელოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დროშა- ფოთლის ფაზაში და დათავთავების დასაწყისში. სამუშაო ხსნარის ხარჯვა – 300 ლ/ჰა		
		0.4-0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ქერი	ჰელმინთოსპოროზული სილაქავე, ნაცარი, ჯუჯა და ღეროს ჟანგა, რონოსპოროზი, ცერკოსპორელოზი, თავთავის ფუზარიოზი	“		
		0.4-0.5	საშემოდგომო ჭვავი	ნაცარი, მურას და ღეროს ჟანგა, რინქოსპორიოზი, სეფტორიოზი, თავთავის ფუზარიოზი, კლადოსპორიოზი, ალტერნარიოზი (ნაწილობრივი მოქმედება)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა-300 ლ/ჰა		
		0.4-0.5	შვრია	გვირგვინის ჟანგი, მურაწითელი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში.: პირველი- დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას, მეორე-10-14 დღეში (საჭიროებისას). ხარჯვის ნორმა-300 ლ/ჰა		
		0.4-0.5	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი, ნაცარი, ჟანგა (ინტენსიური განვითარებისას)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		
		0.5	ვარდი ეთერზეთოვანი	ჟანგა, ნაცარი	“		
		0.4	სამკურნალო მცენარეები (პიტნა ბალის შავბალახა (სათესლე ნაკვეთები)	ჟანგა	“		
		0.5	ასკილი	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ		
		0.4	ბარდა	ჟანგა	შესხურება ჟანგას ერთეული პუსტულების ან ნაცრის პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 7 დღის შემდეგ		
16	ანტალია 250 ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) (თ) “ ასტრანოვა ტარიმ ტიკ. ვე სან. ა.ს. თურქეთი 1465	0,15-0,2	ვაშლი, მსხალი	ქევი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების და გავარდისფერების ფაზებში, როცა ყვავილების 70-80% ცვივა და 10-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	20(3-4)	7(3)
		0,3-0,4	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი ნაცარი	შესხურება იწყება დაავადების სიმპტომების	20 (2-3)	7(3)

					5% გამოჩე-ნისთანავე და გრძელდება 15-20 დღიანი ინტერვალით		
17	ანტრაკოლი სფ 70 700 გ/კგ (პროპინები) (თ), (1)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	“		
	“ზაიერ აგ” გერმანია 445/04/09/14/19	2-3	ვაშლი	ქეცი	“		
		1.5-2	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ფიტოფტორა	“		
		1.5-.2.5	ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი	“		
		5-6	ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ოზი	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამდე და მეორე ვეგეტაციის დასაწყისში.		
		1.5- 6.25	ჩაი	ანთრაქნოზი, ცერკოსფტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყების წინ იმ პლანტაციებში, სადაც ფოთოლი არ იკრიფება		
		1.5-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		
18	აპლორი 25 ცკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი)	0, 15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალთ	20(4)	7(3)
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ.	0, 3-0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	“	20(2)	7(3)
	იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 853/17	0.5-0.6	ციტრუსები	სკები (ქეცი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გავრცელების კერებში	20(2)	7(3)
19	აპრონი XL 350 წე 350 გ/ლ (მეფენოქსამი) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 754/15	2-4	კიტრი, პამიდორი კომბოსტო, წიწაკა ბადრიჯანი საზამთრო	ფესვის და ღეროს სიდამპლები	ნიადაგის მორწყვა 0,2% სამუშაო ხსნარით დათესვამდე და დათესვის შემდეგ		
20	არბალეტი 75 წდგრ 750 გ/კგ (ტებუკონაზოლი) (3) „დვა აგრო გმზბ“ გერმანია 904/18	0,2-0.35	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში,		
		0,35	ვაშლი	ნაცარი	„		
21	არევა გოლდი, წზგრ 90+ 600 გ/კგ (დიმეთომორფი+ მანკოცები)	2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალთ		

	“ადამა აგროქალაზა ბ.ვ.”	2.5	ვაზი	ჭრაქი	“		
	ნიდერლანდები 1317	2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“		
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	“		
22	არმეთილი მ, სვ 640+80 გ/კგ (მანკოცები + მეტალაქსილი) (3)	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ყვავილობის შემდეგ 7-14 დღიანი ინტერვალებით		
	”აიკუვი სა” ესპანეთი 937/17	2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ბუტონების გამოჩენიდან 7-14 დღიანი ინტერვალებით		
23	აფეტი, სკ 200 გ/ლ (პენთიოპირადი) (თ), (3) „მიცუი ქემიკალს აგრო, ინკ“ იაპონია 1184	1-1,5	ვაზი (სუფრის ყურძენი)	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალთ		
		0,75-1	ვაშლი	ქეცი	“		
		1-1,5	ატამი	მონილიოზი კლადოსპოროზი	”		
		1,75	პამიდორი	ალტერნარიოზი ნაცრისფერი სიდამპლე ნაცარი	”		
		1,5-1,75	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე ნაცარი	“		
		1,75-2,0	კომბოსტო	თეთრი სიდამპლე შავი სიდამპლე ნაცრისფერი სიდამპლე	“		
		1,5-1,75	სალათა	ნაცრისფერი სიდამპლე ნაცარი	“		
		1,75	ხახვი	ნაცრისფერი სიდამპლე ყელის სიდამპლე მეწამული ლაქიანობა	”		
24	აფფიქსი 250 სკ 250 გ/ლ (აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „უპლ ზირაატ ვე ქიმი სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 1221	0.6	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ნაცარი,	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა – 3-4 მტევანი 14-16-დღიანი ინტერვალთ. სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა		
		0.75	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპსისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა		

					ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ჭრაქის წინააღმდეგ, ისრიმობის პერიოდში და სიმწიფის დაწყებისას ნაცრის წინააღმდეგ. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.		
		0, 4-0, 6	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ბუტონიზაციის ფაზაში და ყვავილობის შემდეგ		
		0, 3	ხახვი	ჭრაქი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15 სანტიმეტრის ზომის ფოჩების გამოსვლიდან და 14 დღის ინტერვალით.		
25	აქსიომა 300 სკ 300 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი 225+ფლუტრიაფოლი 75 გ/ლ) (3)	0.6-1,0	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	ნაცარი, ჟანგა, სეფტორიოზი, ფუზარიუმი, ალტერნარიოზი,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	30(2)	7(3)
	„ფადერ ალიანს ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1374	1,0	სოიო	ასკოქიტოზი, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	30(2)	7(3)
26	აქტორმენი მც, სფ 600 + 90 გ/კგ (მანკოცები + დიმეთომორფი) „მენტა ტარიმ ილაკლარი სან ვე ტიკ ლტდ სტი.“ თურქეთი 1167	2, 5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველივე ნიშნების გამოჩენისას და 10-დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)

		2	ვაზი	ჭრაქი	“	25(3)	7(3)
		2	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3) 7(3)	7(3)
		1, 5-2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
		1, 5-2	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
27	ბაიომკა, ეკ 250 გ/ლ (ტრიადიმენოლი) (თ) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1194	0,5	მარცვლეული	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	35(1)	7(3)
		0,2	ვაზი	ნაცარი	“	30(2-3)	7(3)
		0,2	კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ნაცარი		20 (2)	7(3)
		0,4-0,5	პამიდორი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ნაცარი		10 (2)	7(3)
28	ბამპერი 25 ეკ 250 გ/ლ (პროპიკონაზოლი) (3) „ადამა აგრიქალჩა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 739/15	0.25-0.4	ვაშლი, მსხალი	ჟანგა ნაყოფების ღვინა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში“	30(2)	7(3)
		0.25-0.3	ვაზი	ნაცარი, ანთრაქნოზი ნაცრისფერი სიდამპლე	”	30 (2)	7(3)
		0.25-0.3	ბოსტან-ბაღჩეული	ნაცარი, ანთრაქნოზი	“	30 (2)	7 (3)
		0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი შვრია	ნაცარი, მურა ჟანგა ღეროს ყვითელი ჰელმონტოსპორიოზული ლაქიანობა სეპტორიოზი ბადისებური ლაქიანობა „გვირგვინა ჟანგა მურა წითელი ლაქიანობა	“	40(1-2)	-(3)
		0.5-1.5	ვარდი ეთერზეთოვანი	ჟანგა, ნაცარი	“	20(2)	7(3)
		0.5	სამკურნალო მცენარეები (პიტნა ბადის)	ჟანგა	“	30(2)	7(3)
		0.5	კოინდარი	ჰელმონტოსპორიოზი	სათესლე ნაკვეთების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	1(3)
		1.5	შავი მოცხარი (სადედეები სანერგეები)	ამერიკული ნაცარი ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	7(3)
29	ბანჯო, სკ 500 გ/ლ (ფლუზინამი) (თ), (3) „ადამა აგრიქალჩა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 1362	0,3-0,4	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველივე სიმპტომების გამოჩენისთანავე	20(4)	7(3)
		0.4	ხახვი	პერენოსპოროზი	„	20 (3)	7(3)

		0,3-0,4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	20 (4)	7(3)
30	ბანჯო ფორტე , სკ (დიმეტომორფი 200 გ/ლ+ ფლუაზინამი 200 გ/ლ) (თ), (3) „ადამა აგრიქალჩა ბ.ვ.“	0,8-1,0	ჰამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველივე სიმპტომების გამოჩენისთანავე	20(4)	7(3)
	ნიდერლანდები 1361	0.8-1,0	ხახვი (მწვანე ხახვის გარდა)	პერენოსპოროზი	„	20 (3)	7(3)
		0,8-1,0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	20 (4)	7(3)
31	ზარონი, სფ (სპილენძის ჰიდროქსიდი , 770 გ/კგ) „მაკკინლი ტრეიდინგ ლპ“ ირლანდია 1479	2.0	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(3)	3(1)
		1,5	ხეხილი თესლოვანი ვაშლი კომში	ქეცი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული ლაქიანობა	„	15(3)	3(1)
		2.0	ხეხილი კურკოვანი ქლიავი, ატამი გარგარი,ალუ-ბალი, ბალი	მონილიოზი ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული ლაქიანობა, ნეკროზი	„	15(2)	3(1)
		2.0	კაკლოვნები (კაკალი, თხილი)	მურა ლაქიანობა, ნეკროზი ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი	„	21(3)	3(1)
		1.5-2.0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	14(3)	7(3)
		1.5-2.0	ჰომიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	„	7(3)	7(3)
32	ბელისი, წდგრ 252+128 გ/კგ (ბოსკალიდი+პირაკლოს ტრობინი) (თ) „ბასფი სე“	0,8	ვაშლი	ქეცი ნაცარი დაავადებები შენახვის პირობებში	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დასაწყისში და ყვავილობის შემდეგ 14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500-1000 ლ/ჰა	20(3)	7(3)

	გერმანია 1469						
33	ბენელუსი, ეკ 125+187,5 გ/ლ (ტეპუკონაზოლი + ციპროდინილი) (თ)	1,0-1,2	ვაშლი	ქეცი, ნაცარი, მურა ლაქიანობა, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	30(2)	7(3)
	„ადამა აგრიკალჩერ ზვ“ ნიდერლანდები 1339	1,0-1,2	ატამი	ნაცარი მონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე	“	30(2)	7(3)
		0.8-1,6	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამძლე, ჭრაქი, ნაცარი	“	30(2)	7(3)
34	ბესტ ბაკირი 50 სვ 500 გ/კგ (სპილენძის ქლორფანგი, 500 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	2,5 -3,2	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი) სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-600 ლ/ჰა	20(4-5)	3(1)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1195	3,2-4	ლობიო	ანთრაქნოზი	”	20(3)	3(1)
		2.5-3.2	ჰამიდორი ბადრიჯანი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა ბაქტერიოზი	“	20(4)	3(1)
		2.5-3	კიტრი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		2,5-4	ბოსტნეულის ჩითილეები	პიტიუმი, რიზოქტონიოზი, ფუზარიოზი, სკლეროტინიოზი ალტერნარიოზი	“	14(3)	3(1)
		3-4	მზესუმზირა	ალტერნარიოზი	“	20(3)	3(1)
		5-10	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, მონილოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დამთავრების შემდეგ	21(4)	3(1)
		5-6 12-15	ქლიავი, ატამი, გარგარი	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში შესხურება გვიან შემოდგომაზე. ხარჯვა- 1500 ლ/ჰა	21(4)	3(1)
		3-6	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(5)	3(1)
		5-6	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი, მალსეკო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-2500 ლ/ჰა	35(3)	3(1)

		4	ზეთისხილი	ციკლოგონიუმ ოლეაგინუმ	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში.	21(3)	3(1)
		4	სვია	პერონოსპორზი	“	20(3)	3(1)
35	ბესტკური 25 ეკ 250 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი)	1-1,5	ციტრუსი	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე	35 (2-3)	7(3)
	(3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1312	0,4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და 10 დღიანი ინტერვალით	30 (3)	7(3)
		0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მურა, ყვითელი, ღეროს ჟანგა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ფუზარიოზი, ბადისებრი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე	30(1)	7(3)
		0,3	კამიდორი	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე 10-14 დღიანი ინტერვალით	15(2)	7 (3)
36	ბიონი 50 წდგრ 500 გ/კგ (აციბენზოლარ-ს- მეთილი) (თ), (3) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ.“ შვეიცარია 1376	0,1	თხილი	ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში :პროფილაქტიკური და კულტურის განვითარების ადრეულ სტადიებზე	30(4)	7(3)
37	ბლუ ბორდო დისპერს, წდგრ 200 გ/კგ (სპილენძის სულფატი+კალციუმის	3,5-4,5	ვაზი	ჭრაქი, წითურა	შესხურება გაზაფხულზე 7-10 დღიანი ინტერვალით და შემოდგომაზე ხარჯვა - 1000 ლ/ჰა	30 (3)	7(3)
	ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით 20 %) (თ) „უპლ ლიმიტედ“ ინდოეთი 940/18	5,0	ვაშლი, მსხალი, კომში	ტოტების ბაქტერიული ნეკროზი, მონილიოზური სიდამწვრე, ქეცი, ფოთლების სილაქავე, ალტერნარიოზი, სეპტორიოზი, ნაყოფების სიდამპლე	„	25(2-3)	7(3)
		5,0	ატამი	ფოთლების სიხუჭუჭე, ტოტების ბაქტერიული ნეკროზი, ვერტიცილიოზური და ციტოსპორიოზული ხმოზა	„	30 (2-3)	7(3)
		5,0	ქლიავი, ალუბალი	ბაქტერიული ნეკროზი, ბაქტერიული მუქი სილაქავე	შესხურება გაზაფხულზე 7-10 დღიანი ინტერვალით და შემოდგომაზე ხარჯვა - 800-1500 ლ/ჰა	30(2)	7(3)
		5,0	ბალი, გარგარი	კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, ფოთლების	„	30(2)	7(3)

				წითელი სილაქავე, აპიოგნომონიოზი			
		3,5-4,5	ბოსტნეული	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი ასკობიტოზი პერონოსპოროზი ჟანგა ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 400-1000 ლ/ჰა	20 (2-3)	7(3)
		4,0-5,0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 400-600 ლ/ჰა	20(2)	7(3)
		4,0-5,0	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი, ჟანგა, ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
38	ბლუფოქსი, სფ (სპილენძის ჰიდროქსიდი 350გ/კგ + მეტალაქსილი 150გ/კგ) „მაკკინლი ტრეიდინგ ლპ“ ირლანდია 1480	1.0-1.5	ვაზი	ჭრაქი	წესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(4)	7(3)
		2.5	თხილი	ფიტოფტორა, ვარჯის კიბო, ფესვის ხმოზა	”	28(4)	7(3)
		2.0	ნესვი	ჭრაქი	”	8(3)	7(3)
		2.0	კიტრი	ჭრაქი	”	3(3)	7(3)
		2.0	ხახვი	ჭრაქი	”	14(3)	7(3)
		2.0	კარტოფილი	ფიტოფტო-როზი	”	7(3)	7(3)
		2.0	პომიდორი	ფიტოფტოროზი	”	3(3)	7(3)
39	ბორდო კაფარო ბლუ, სფ 200 გ/კგ (სპილენძის მიხედვით)	7-10	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
	(ბორდოს ნარევი-სპილენძის სულფატი+)	2.4-3.2	პომიდორი	“	“	8(4)	3(1)
	კალციუმის ჰიდროქსიდი (თ), (1) „იზაგრო ს.პ.ა.“	7-10	შაქრის, სუფრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)

	იტალია 555/10/15	7-10	თამბაქო	პერონოსპო როზი	“	15(3)	3(1)
		2.4-3.2	ხახვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		2.4-3.2	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		2.4-3.2	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფე-რი ლაქიანოზა, ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
		8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		8-12	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, ფოთლების სიხუჭუჭე, კლას- ტეროსპოროზი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	15(4)	3(1)
		20-25	ციტრუსები	მეჭექიანოზა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-2000-2500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		7-10	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	25(6)	3(1)
		2.8-4	მოცხარი, ხურტკმელი	ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		2.8-4	იონჯა	მურა ლაქიანოზა	“	15(2)	3(1)
		4.2-10	ქალაქის მწვანე ნარგავები	ქეცი, ლაქიანოზები, სეპტორიოზი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	3(2)	3(1)
		2.1-4	დეკორატიული კულტურები და ყვავილები	ჟანგა, ლაქიანოზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	-(2)	3(1)
		2.1-2.8	სამკურნალო მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-400 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		0.7-1.4 3.5-6	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	ცილინდროს პოროზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა და 500-600 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
		4.2-8	თუთის საკვები პლანტაციები	“	შესხურება აზრეშუმის ქიის გამოკვებამდე 30 დღით ადრე და გამოკვების შემდეგ ხსნარის ხარჯვა-600-800 ლ/ჰა	30(4)	3(1)
		20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა- 1000-1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი,	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების	-(1)	3(1)

			ბალი	პორიოზი, მონილიოზი	დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა		
		15-18	მოცხარი, ხურტკმელი, ყოლო, მარწყვი	ჟანგა, ქეცი, ლაქიანობები, სეპტორიოზი, ანთრაქნოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხსნარის ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		0.5-1	წიწვიანი და ფოთლოვანი ჯიშები	ჟანგა, წიწვის და ფოთლის ლაქიანობა	სანერგეების და შიშის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2-0,5% სამუშაო ხსნარით, ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		15-20	თუთის პლანტაციები (სადედეები)	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით. ხსნარის ხარჯვა-600-800 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
40	ბორდოს ნარევი, 20 სვ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)	20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
	(თ), (1) შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“ საქართველო 867/17	20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
		4-6	პამიდორი	“	“	8(4)	3(1)
		4-6	შაქრის, სუფრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ხახვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფე-რი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
		8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		8-10	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		5	დეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-500 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
41	ბორდოს ნარევი, 15% სვ (150 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის	20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-	-(1)	3(1)

	სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)				1000-1500 ლ/ჰა		
	(თ), (1) შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“ საქართველო 1425	20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
		4-6	პამიდორი	“	“	8(4)	3(1)
		4-6	შაქრის, სუფრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ხახვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
		8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		8-10	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		5	დეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-500 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
42	ბორდოს ნარევი მაქსი, 20 სგ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)	6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
	(თ), (1)	4-6	პამიდორი	“	“	8(4)	3(1)
	“პარიკ ენტერპრაიზეს პეტ. ლტდ.” ინდოეთი 686/15	4-6	შაქრის, სუფრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ხახვი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
		8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის	15(6)	3(1)

					ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა		
		8-10	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		5 20-25	დეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები ქეცი და სხვა მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-500 ლ/ჰა შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	-(3) (1)	3(1)
			ვაშლი, მსხალი, კომში				3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
43	ბორდო სალდეკო 20 სფ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის სულფატი-ცალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) „სალეს უაი დერივადოს დე კობრე ს.ა.“ პერუ 1020/18	20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		5-20	ციტრუსი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-2500 ლ/ჰა	20 (4)	3(1)
		3-6	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
		4-6	პამიდორი, ბადრიჯანი	“	“	10(4)	3(1)
		4-6	შაქრის, სუფრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ხახვი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)

		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	7(3)	3(1)
		8-15	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		6-8	კურკოვანი ხეხილი		”		3(1)
		8-10	ვაზი	კრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		5	დეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-500 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
44	ბორდოტან 20 სფ (ბორდოს ნარევი , 200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) სპილენძის სულფატი- კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) „ტან ტარიმ ზირაატ ილაკლარი სან. ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1403	15-18	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-1200 ლ/ჰა	14 (3-4)	3(1)
		12,5-15	გარგარი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი ბაქტერიოზი	შესხურება მოსვენების პერიოდში	-(1)	3(1)
		6,5-7,5			შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-1200 ლ/ჰა	15(2-3)	
		15	ატამი	ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		15 10-12	ზეთისხილი	ფოთლების ლაქიანობა	პირველი შესხურება შემოდგომით (ნოემბერ- დეკემბერში) შესხურება მარტი- აპრილში. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	-(1) 15(2)	3(1)
		6 8 10	ვაზი	კრაქი	შესხურებები ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-800 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		20 4		ფომოფისისი	შესხურება ზამთრის პერიოდში შესხურება ზაფხულის პერიოდში	-(1) 15(1)	
45	ბორდოფლო ნიუ, სკ	7-10	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი,	შესხურება ვეგეტაციის	15(5)	3(1)

	124 გ/ლ (სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის სულფატი+ კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) “მანიკა ს.პ.ა.” იტალია 765/16			ალტერნატიული (მაკროსპო რიოზი)	პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა		
		2.4-3.2	პამიდორი	“	“	8(4)	3(1)
		7-10	შაქრის, სუფრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		7-10	თამბაქო	პერონოსპო როზი	“	15(3)	3(1)
		2.4-3.2	ხახვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		2.4-3.2	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		2.4-3.2	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
		8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		8-12	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, ფოთლების სიხუჭუჭე, კლას- ტეროსპორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	15(4)	3(1)
		20-25	ციტრუსები	მეჭექიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ღებობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-2000-2500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		7-10	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	25(6)	3(1)
		2.8-4	მოცხარი, ხურტმელი	ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		2.8-4	იონჯა	მურა ლაქიანობა	“	15(2)	3(1)
		4.2-10	ქალაქის მწვანე ნარგავები	ქეცი, ლაქიანობები, სეპტორიოზი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	3(2)	3(1)
		2.1-4	დეკორატიული კულტურები და ყვავილები	ჟანგა, ლაქიანობები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	-(2)	3(1)
		2.1-2.8	სამკურნალო მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-400 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		0.7-1.4 3.5-6	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	ცილინდროს პოროზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა და 500-600 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
		4.2-8	თუთის საკვები პლანტაციები	“	შესხურება აზრეშუმის ჭიის გამოკვებამდე 30 დღით ადრე და გამოკვების შემდეგ	30(4)	3(1)

					ხსნარის ხარჯვა-600-800 ლ/ჰა		
		20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		15-18	მოცხარი, ხურტკმელი, ყოლო, მარწყვი	ჟანგა, ქეცი, ლაქიანობები, სეპტორიოზი, ანთრაქნოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხსნარის ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		0.5-1	წიწვიანი და ფოთლოვანი ჯიშები	ჟანგა, წიწვის და ფოთლის ლაქიანობა	სანერგების და შიშის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2-0,5% სამუშაო ხსნარით. ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		15-20	თუთის პლანტაციები (სადედეები)	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხსნარის ხარჯვა-600-800 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
46	ბორეკაფი 20 სვ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	3-6	კარტოფილი, პამიდორი, წიწკა, ბადრიჯანი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	(ბორდოს ნარევი 20% - სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)	3-6	კიტრი	პერონოსპოროზი სეპტორიოზი ანთრაქნოზი	“	10(4)	7(3)
	(თ), (1) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1196	2-3	ხახვი, ნიორი	პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი	“	15 (3)	7(3) 7(3)
		2.8-5	კენკროვნები	ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი	“	15(3)	7(3)
		10-16	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, ნაყოფის სიდამპლე, სეპტორიოზი, მონილიოზი, ტოტების კიბო, ალტერნარია	“	15(4)	7(3)
		7,5-12,5	ვაზი	ჭრაქი, ესკოროიზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, ყვავილობის შემდეგ , მტევნების შეკვრისას	25(3-4)	7(3)
		8-15	კურკოვანი ხეხილი	ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	7(3)
		15-25	ციტრუსი	მეჭექიანობა, მალსეკო,	“	25(4)	7(3)

				ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა			
		12-15	ზეთისხილი		„	20(2)	7(3)
47	ბოტრინი, წხვ 722 გ/ლ	2.5-5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7 (2)	7(3)
	(პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი) (4) „პარიჯატ ინდასტრის პვტ.	2-4	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500- 1500 ლ	3(2)	7(3)
	ლტდ” ინდოეთი 687/15	2-4 ლ/ მ ²	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის „დროს 0.25% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2-4 ლ/ მ ²	კიტრი, პამიდორი კომბოსტო წიწკა ბადრიჯანი საზამთრო	ფესვის და ღეროს სიდამპლეები	ჩითილების მორწყვა 0,15% სამუშაო ხსნარით 3-4 კვირის ინტერვალით	3(2)	7(3)
48	ბრავო, 500 კს 500 გ/ლ (ქლოროტალონილი)	2.2-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3%-იანი სამუშაო ხსნარით	10(3)	7(3)
	(თ) (4) „სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 134/08/12/17	2.2-3	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	სეპტორიოზი მურა, ღეროს და ყვითელი ჟანგა სუსტი და საშუალო ინტენსივობის განვითარებისას	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		2.4-4.8	სვია	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3-0.4%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		2.2-2.7	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3%-იანი სამუშაო ხსნარით	3(3)	3(3)
		3	ხახვი (სათესლე ნაკვეთები)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(3)	3(3)
		3	პამიდორი (სათესლე ნაკვეთები)	ფიტოფტოროზი, მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(3)	3(3)
		2-3	ვაზი	ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტ. პერიოდში	30(3-4)	7(9)
49	ბროდერი 30 ეკ 300 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი 150 გ/ლ+პროპიკონაზოლი 150 გ/ლ)	0, 4-0.5	ხორბალი, ქერი	ნაცარი, ღეროს, მურა, ყვითელი ჟანგა, სეპტორიოზი, ჰელმინტოსპოროზი, პირენოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	21 (1-2)	-(3)
	(თ) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	0.25-0, 4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14-დღიანი ინტერვალთ	30(4)	7(3)
	თურქეთი 854/17	1, 5	ციტრუსები	სკები, ლაქიანობები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (4)	7(3)
		0, 3	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-20-დღიანი ინტერვალთ	21(1-3)	7(3)
		0, 5	საზამთრო	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15-დღიანი	21(2)	7(3)

					ინტერვალით		
50	ბურჟუა, წზგრ 225 + 300 გ/კგ (ფამოქსადონი + ციმოქსანილი) (3)	0.4	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, მეორე დამუშავება დაყვავილების შემდეგ, ა მესამე - 14 დღის ინტერვალით	30(3)	7(3)
	“სანსეტ კიშია ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”	0.4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში:	20(4)	7 (-)
	თურქეთი 1150	0,4	კიტრი, პომიდორი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი, ფიტოფ ტოროზი, ალტერნარიოზი	“	10(4)	7 (-)
		0,4	საზამთრო	ალტერნარიოზი	„	10(4)	7 (-)
51	განზო, კვ 125 გ/ლ (მიკლობუტანილი)	0,2-0,3	ვაზი	ნაცარი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დასრულებამდე 14 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
	„ქემია ს.პ.ა.“ იტალია 1431	0,4-0,5	ატამი, ვაშლატამა	მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	15(3)	7(3)
		0,3-0,4	ვაშლი, მსხალი, ალუბალი	ნაცარი, ქევი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
		0,4-0,5	გარგარი, ქლიავი	მონილიოზი	„	15(3)	7(3)
		0,3-0,4	გოგროვნები	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-10 დღიანი ინტერვალით	10 (3)	7(3)
		0,2-0,3	პამიდორი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	10 (3)	7(3)
		0,2-0,3	მარწყვი	ნაცარი, ფოთლების ლაქიანება, ფიტოფტოროზი	„	10 (2-3)	7(3)
		0,2-0,4	მაცვალი, ჟოლო	ნაცარი, ყვითელი ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველივე სიმპტომების გამოჩენისას	15(2-3)	7(3)
		0,15-0,3	კაკლოვნები	ანთრაქნოზი ქერქის დაზიანება	2-3 პროფილაქტიკური დამუშავება 10-12 დღეში, და შემდეგ საჭიროებისას	15(2)	7(3)
52	გარტი. სფ 770 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“	3	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების ფაზიდან 8-10 დღიანი ინტერვალით	30(7)	3(1)
	უკრაინა შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 905/17	4	ვაშლი	ქევი მონილიოზი კიბო	პირველი შესხურება გავარდისფერების ფაზაში, შემდგომი 7-10 დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით	25(7)	3(1)
		5-7	ატამი	ფოთლის სიხუტუჭე, ბაქტერიული სიდამწვრე, ბაქტერიული ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1)	3(1)

		0,4		კლასტეროსპორიოზი კოკომიკოზი	შესხურება ვეგეტაციის დროს	30(4)	
		2,5-3	ჰამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ბაქტერიული სილაქავე	შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 8-10 დღიანი ინტერვალით	10(4)	3(1)
		2-3	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი, ბაქტერიული სილაქავე	პირველი წამლობა 2-3 ნამდვილი ფოთლის ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 8-10 დღიანი ინტერვალით	15(4)	3(1)
		2-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, დანარჩენი სამი წამლობა 8-10 დღიანი ინტერვალით	15(4)	3(1)
		2-2,5	ხახვი	პერონოსპოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის დროს	15(4)	3(1)
53	გეოფიტი, წხკ 745 გ/ლ (ფოსფოროვანი მჟავას მონო +ფოსფოროვანი მჟავას დიკალიუმის მარილები 53% წონის მიხედვით (ფოსფოროვანი მჟავას მიხედვით -33,9%, საერთო ფოსფორზე გადაანგარიშებით 12,2%+საერთო კალიუმზე გადაანგარიშებით 20,7%) (თ) „ჯიეიზ ბიოტექ ინკ“ ს.შ.შ 1100/19	3-5 ლ/ჰა 1000 ლ წყალზე	ვაზი, კივი, ნუში, კაკალი, თხილი, ციტრუსები, კენკროვნები, კურკოვნები, ზეთის ხილი, თესლოვნები, ყველა სახის კომპოსტო, მარცვლოვანი კულტურები, გოგრისებრნი, მწვანელები, სურნელოვანი მცენარეები, პარკოსნები, ბოსტნეული (პომიდორი, წიწაკა ყველა სახის, ბადრიჯანი, სტაფილო, ხახვი, ნიორი, ჭარხალი, შაქრის ჭარხალი, ბოლოკი, ისპანახი, სალათები, სატაცური, კარტოფილი, ჯანჯაფილი, თაღამი), თამბაქო, სიმინდი ყველა სახის, დეკორატიული მცენარეები, ერთწლიანი ყვავილები და მცენარეები, წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხეები, გაზონები	ჭრაქი, ნაცარი ფიტოფტორა, ფიტიუმი, ფუზარიოზი, ფესვის სიდამკლე (რიზოქტონია) ბაქტერიული დამწვრობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-21 დღის ინტერვალით	-(2-4)	-(-) 7(3)
		დაწვიმება: 5-10ლ 1000ლ წყალზე	ვაზი, კივი, ნუში, კაკალი, თხილი, ციტრუსები, კენკროვნები, კურკოვნები, ზეთის ხილი, თესლოვნები,	ფიტოფტორა, ფიტიუმი, ფუზარიოზი, ფესვის სიდამკლე (რიზოქტონია) ბაქტერიული დამწვრობა	მორწყვის ჩვეულებრივი გრაფიკი. არანაკლებ 3 დღის ინტერვალით	-(3-4)	7(-(-)

		წვეთოვანი: 5-7ლ 1000ლ წყალზე	ყველა სახის კომბოსტო, მარცვლოვანი კულტურები, გოგრისებრნი, მწვანელები, სურნელოვანი მცენარეები, პარკოსნები, ბოსტნეული (პომიდორი, წიწაკა ყველა სახის, ბადრიჯანი, სტაფილო, ხახვი, ნიორი, ჭარხალი, შაქრის ჭარხალი, ბოლოკი, ისპანახი, სალათები, სატაცური, კარტოფილი, ჯანჯაფილი, თაღვაში), თამბაქო, სიმინდი ყველა სახის				
		დაწვიმება: 5-7ლ 1000ლ წყალზე	გაზონები		10-21 დღის ინტერვალით. არ მოთიბოთ და არ მორწყათ ნაკვეთი სრულ გამოშრობამდე	- (საჭიროებ ს მიხედვით	-(-)
		15 მლ ნაზარდის გრძ.მ. ან შტამბის დიამეტრის ყოველ 5სმ- ზე (ოზომება ნიადაგის ზედაპირიდან ნ 1.2მ სიმაღლეზე)	ვაზი, კივი, ნუში, კაკალი, თხილი, ციტრუსები, კურკოვნები, ზეთის ხილი, თესლოვნები, დეკორატიული მცენარეები, წიწვოვნები და ფოთლოვნები		პირდაპირი ინექცია მერქანში, ინექტორის ინსტრუქციის თანახმად	-(2-4)	-(-)
		5 ლ 1000 ლ წყალზე	ვაზი, კივი, ნუში,კაკალი, თხილი, ციტრუსები, კენკროვნები, კურკოვნები, ზეთის ხილი, თესლოვნები, ბოსტნეული (პომიდორი, წიწაკა ყველა სახის, ბადრიჯანი, სალათები), თამბაქო, წიწვოვნები და ფოთლოვნები		ნერგების და ჩითილების გადარგვის წინ ფესვთა სისტემის 15-30 წუთით სამუშაო ხსნარში მოთავსება და შემდეგ 24 საათის განმავლობაში დარგვა	-(1)	-(-)
		2,5 ლ 1000 ლ წყალზე	ყველა სახის კომბოსტო		ჩითილების გადარგვის წინ ფესვთა სისტემის 15- 30 წუთით სამუშაო ხსნარში უშუალოდ დარგვის წინ	-(1)	-(-)
		1 - 2 ლ 1000 ლ წყალზე	დეკორატიული მცენარეები, ერთწლიანი ყვავილები და მცენარეები		გამოიყენეთ ნიადაგის კარგად დასასველებლად საკმარისი ნარევის რაოდენობა. გამოიყენეთ 2-3 კვირის ინტერვალით.	-(2)	-(-)
		300-600 მლ ნიადაგის 1			ნიადაგის მომზადება უშუალოდ ქოთანში	-(1)	-(-)

		კუბურ მეტრზე			ჩარგვის წინ		
		100 - 200 მლ/ლ წყალზე გახსენით 1:20 შეფარდებით დასამუშავებ ლად საჭირო წყლის რაოდენობაშ ი	კარტოფილის დამუშავება მოსავლის აღების შემდეგ	ფიტოფტოროზი, ვარდისფერი სიდამპლე	ბოლქვების შესხურება უმშ აპარატით (1-2 ლ/ტონა ბოლქვზე), გარეცხვა ან დამატენიანებელ წყალში შერევა შენახვის წინ ან შენახვის დროს შესანახი საცავების, სამრეცხაოების და საოპერაციო ხაზების , ტევადობების დამუშავება	-(1-2)	-(-)
54	გეოქსი 500 წდგრ 500 გ/კგ (ფლუდიოქსანილი) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1368	0,4	ვაშლი, მსხალი	სიდაპლეები შენახვის პერიოდში (მონილია, ქეცი, ფუზარიუმი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში და მოსავლის აღების წინ	7(2)	7(3)
		0,1-0,3	ვაზი (სუფრის ჯიშები)	სიდაპლეები შენახვის პერიოდში (ბოტრიტისი, პენიცილიუმი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	7(3)
55	გოგირდ პლიუსი, წდგრ 800 გ/კგ (გოგირდი) (3)	3-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4-6)	4(1)
	„პლატინ ქიმია მუმესსილიკ ვე დის ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 688/17	2-3	კიტრი, პამიდორი	“	“	1(1-5)	1(1)
		2-3	ვარდი	“	“	1(2-4)	4(1)
56	გრავიტონი, ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) „მაკკინლი ტრეიდიზ ლპ“ ირლანდია 1454	0,2-0.3	ვაშლი მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გაშლის და გავარდისფერების ფაზებში, როცა ყვავილების 70-80% ცვივა და 10-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	20(3-4)	7(3)
		0,2	კურკოვნები	ქეცი, კლასტეროსპორიოზი, კოკკომიკოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(2)	7(3)
		0,5-0,6	ციტრუსები	ალქტერნარიოზი ქეცი		20(2)	7(3)
		0,3-0.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალქტერნარიოზი		14(4)	7(3)
		0,3-0.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალქტერნარიოზი		14(4)	7(3)
		0,3-0,5	სტაფილო	ალქტერნარიოზი ცერკოსპორიოზი		10(4)	7(3)
		0.5	თხილი, მიწის- თხილი	ლაქიანოზა		20(4)	7(3)

		0,4	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი ანუ ფოთლის მურა ლაქიანობა, ნაცარი	შესხურება იწყება დაავადების სიმპ-ტომების 5% გამოჩენისთანავე და გრძელდება 15-20 დღიანი ინტერვალით	20(2)	7(3)
57	გრანდ მდ 69 სვ 90+ 600 გ/კგ (დიმეტომორფი 90 გ/კგ+ მანკოცები 600გ/კგ) „აგროსაგრო ლტდ“ ბულგარეთი 1425	2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
		2	ვაზი	ჭრაქი	“	40(3)	7(3)
		2	ვამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	40(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
58	გურადორი წხგრ 500 გ/კგ (ტრიფლოქსისტრობინი) (თ), (3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმპ.იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1235	0, 15-0, 25	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი, შავი (მურა) ლაქიანობა	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9- 10- დღიანი ინტერვალთ. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14- დღიანი ინტერვალთ. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.	14(2-3)	7(3)
		0, 15-0, 3 0, 15-0, 2	გარგარი, ვაშლატამა ატამი ქლიავი ალუბალი ბალი	ნაცარი ნაცარი ფოთლის ლაქიანობა	”	14(2-3)	7(3)
		0.1-0, 15 0.14	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი, შავი სიდამპლე	”	35(2-3)	7(3)
		0, 4-0, 5	ციტრუსები	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როცა ყლორტი 5-10 სმ სიგრძეს მიაღწევს	30 (3-4)	

					და ახალ ფოთლებზე დაავადების სიმპტომების გამოვლინებისას და 12-14-დღიანი ინტერვალით		
		0, 08	ვიტრინისვი	ჭრაქი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების სიმპტომების გამოვლინებისას, და 7- 10-დღიანი ინტერვალით	5 (2-3)	
		0, 1	საზამთრო	ალტერნარიოზი	„	5 (2-3)	
59	დანონი 70 წზგრ 700 გ/კგ (დითიანონი) (თ) „ დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 1207	1, 0	ვაშლი, მსხალი	ქევი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ასკოსპორების ფრენამდე და ასკოსპორების ფრენის შემდეგ	25(2-4)	7(3)
		1, 0	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2-4)	7(3)
		1, 0	ატამი, გარგარი	ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კლატოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა -1000 ლ/ჰა	25(2-4)	7(3)
60	დელაიტი, კს 350 გ/კგ (დითიანონი) (თ), (4) შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“	1,5-2 + ზახვატ ოილი 0,75-1 ლ/ჰა	ვაშლი, მსხალი	ქევი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ასკოსპორების ფრენამდე და ასკოსპორების ფრენის შემდეგ	20(5)	7(3)
	შპს „გეოუკრაიტი“ საქართველო 1275	1,5-2 + ზახვატ ოილი 0,75-1 ლ/ჰა	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(6)	7(3)
		1,5-2 + ზახვატ ოილი 0,75-1 ლ/ჰა	ატამი, გარგარი	ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კლატოსპორიოზი	„	15(3)	7(3)
		1,5-2 + ზახვატ ოილი 0,75-1 ლ/ჰა	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	„	15(3)	7(3)
61	დელანი 70, წდგრ 700 გ/კგ (დითიანონი) (თ), (4) “ზასვი აგრო ზ.ვ.”	0.5-0.7	ვაშლი, მსხალი	ქევი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა	შესხურება 0,05% სამუშაო ხსნარით ვეგეტაციის პერიოდში ასკოსპო-რების ფრენამდე და 0,03% სამუშაო ხსნარით ასკოსპო-რების ფრენის შემდეგ	20(5)	7(3)
	შვეიცარია 108/08/12/18	0.5-0.7	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით	30(6)	7(3)
		0.5-0.7	ატამი, გარგარი	ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კლატოსპო-რიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით (1000 ლ/ჰა)	15(3)	7(3)
62	დითანი მ-45, სვ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ), (4)	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური,	20(5)	7(3)

	“დაუ აგროსაინსესი ექსპორტი				შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით		
	ს.ა.ს.” საფრანგეთი 111/08/12/18	2.0-3.0	ვაზი	ჰრაქი	„შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქეცი	“	40 (2)	7(3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი, (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპო-როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7(3)
		0.3-0.6 1.2-2.0	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	აღმონაცენების ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლე, ცილინდროსპოროზი, ფუზარიოზი	აღმონაცენთა და ნერგების შესხურება 0,3% სამუშაო ხსნარით	-(3-4)	7(3)
63	დითიმეგა 75 წზგრ 750 გ/კგ (დითიანონი) (თ) „ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ“ კანადა 623/14/19	0.5-0.7	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა	შესხურება 0,05% სამუშაო ხსნარით ვეგეტაციის პე- რიოდში ასკოსპო-რების ფრენამდე და 0,03% სამუშაო ხსნარით ასკოსპო-რების ფრენის შემდეგ	20(2-5)	7(3)
		0.5-0.7	ვაზი	ჰრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით	30(2-66)	7(3)
		0.5-0.7	ატამი, გარგარი	ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კლათოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით (1000 ლ/ჰა)	15(3)	7(3)
64	დიმანკო 9+60 სგ 90+ 600 გ/კგ (დიმეტომორფი+ მანკოცები)	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
		2	ვაზი	ჰრაქი	“	40(3)	7(3)
	„ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ“ კანადა 624/14/19	2	ჰამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	40(3)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
65	დიმეკური 500 სკ 500 გ/ლ (დიმეთომორფი)	0,2-0,4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით	7(3)	7(3)
	„შანდონგ ვეიფანგ რაინზოვ ქემიკალ კო., ლტდ“ ჩინეთი 1382	0,3-0,6	ვაზი	ჰრაქი	“	30(3-5)	7(3)
		0,2-0,4	ჰამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	7(3)	7(3)
66	დინალი 90 დკ 90 გ/ლ	0,7-0,9	ვაზი	ნაცარი , ფომოფისი, წითურა, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების	20(3-4)	7(3)

	(ციფლუფენამიდი 30 გ/ლ+დიფენოკონაზოლი 60 გ/ლ) (თ) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ"				გავარ-დისფერების ფაზაში- ყვავილობაში, მარცვლის შეკვრამდე და 10-15 დღიანი ინტერვალით		
	შვეიცარია 906/15	0,7-0,9	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (4)	7(3)
67	დომარკი 10 ეკ 100 გ/ლ (ტეტრაკონაზოლი) (თ) (3) "იზაგრო ს.პ.ა." იტალია 513/09/15	0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.025%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობის წინ, დაყვავილებისას და 10-14 დღის ინტერვალით	20(3)	7(3)
		0.5	ვაშლი, მსხალი	"	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.05%-იანი სამუშაო ხსნარით: პირველი კოკრების დავარდისფერებისას, დაყვავილებისას და 10-14 დღის ინტერვალით	20 (3)	7(3)
		0.5	ატამი	"	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.05%-იანი სამუშაო ხსნარით 10-14 დღის ინტერვალით	20 (3)	7(3)
		0.25	კიტრი (ღია გრუნტი)	"	"	20 (2)	7(3)
		0.25-0.3	ვარდი	"	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღის ინტერვალით	- (2)	7(3)
68	დორისი, სკ 250 გ/ლ (აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1142	0.6	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16 დღიანი ინტერვალთ. სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)	5(3)
		0,6	წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	"	3(2)	3(3)
		0.5-0.6	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 14-16 დღიანი	3(2)	3(3)

					ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა		
		0,75	საზამთრო	ალტერნარია	„	3(2)	3(3)
		0.8	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპსისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ, ისვრილობის პერიოდში, სიმწიფის დაწყებისას. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურიზატორიდან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	25(2)	7(3)
69	დრაკო ბლუ სფ 80 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) „აიკუვი ს.ა.	1.6-2	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მკროსპორიოზი ალტერნირიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 8-12 დღის ინტერვალით	20(5)	7 (3)
	ესპანეთი 890/17	2.0-3.0	ვაზი	ჭრაქი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-14 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქეცი	“	40 (2)	7(3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი, (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		2-2,5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (3)	7 (3)
		2-2,5	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	20 (3)	7 (3)
70	დრენჯი, წდგრ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ მეთილი) (თ), (3) “პლატინ ქიმიკ მუშესსილიკ ვე დის ტიკ. ა.ს.” თურქეთი 859/17	0.25 მცენარის სიმაღლე 3-4 მ-მდე 0.3-0, 35 მცენარის სიმაღლე 4 მ	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, მურა სოკოები, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლევები	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა ან 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურიზატორიდან	35(3)	7(3)

					განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი		
		0.25	გოგროვნები (კიტრი, ყაბაყი, ნესვი, საზამთრო)	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	10(2)	2(2)
		0.3 0, 25	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი შავი სიდამპლე	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	35(3)	7(3)
		0, 65-0, 75	ციტრუსი	ალტერნარიოზი	„	35(3)	7(3)
71	დრიბლინგი, სფ (სპილენძის ქლორფანგი 877 გ/კგ, სპილენძის მიხედვით 500 გ/კგ) (თ),(1) „მაკკინლი ტრეიდიנג ლპ“ ირლანდია 1482	2.0	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(3)	3(1)
		1,5-2.0	ხეხილი თესლოვანი ვაშლი კომში ხეხილი კურკოვანი ქლიავი, ატამი გარგარი, ალუ-ნეკროზი ბალი, ბალი	ქეცი, მონილიოზი ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული ლაქიანობა,	„	14(3)	3(1)

		2.0	პარკოსნები (ბარდა, ლობიო)	ჟანგა, ანთრაქნოზი	„	3(3)	3(1)
		2.0	კაკლოვნები (კაკალი, თხილი)	მურა ლაქიანობა, ნეკროზი ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი	„	20(3)	3(1)
		1.5-2.0	ციტრუსი	ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი	„	14(3)	3(1)
		1.5-2.0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	14(3)	7(3)
		1.5-2.0	პომიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი) (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	14(3) 7(3)	7(3) 7(3)
72	დუეტ ფორტე 650 წზგრ 150+ 500 გ/კგ (დიმეტომორფი+ფოლპე ტი), (4) „ დვა აგრო გმბზ“ გერმანია 1208	2	ვაზი	ქრაქი წითურა შავი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14-დღიანი ინტერვალით	30(3-5)	7(3)
		2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი		25 (2-3)	7(3)
		2	პომიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი		20 (2-3)	7(3)
		2	კიტრი	პერონოსპოროზი ნაცარი		20 (2-3)	7(3)
73	ევაკური, წზ 722 გ/ლ (პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი) (თ)	7.5 მლ/მ2	თამბაქო	ფესვის სიდამპლეები (პითიუმის გვარის სოკოებით გამოწვეული)	ნიადაგში შეტანა დათესვის წინ და 30 დღის შემდეგ. ხარჯვა – 3-4 ლ/მ2	14(2)	7(3)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლი.იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1178	2, 5 2, 0	გოგროვნები კიტრი (ღია გრუნტი)	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა – 500- 1500 ლ	3(2)	7(3)
		300 მლ/მცე ნარე	“	ფესვის სიდამპლეები ქრაქი	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ 0.25% სამუშაო ხსნარით	-(1)	-(3)
		2-4 ლ/ მ2	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფესვის სიდამპლეები ქრაქი	ნიადაგის შესხურება დათესვის „დროს 0.25% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2.5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3 (2)	7(3)
		2, 5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 25% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა – 500 ლ	3(2)	7(3)
		0, 5 ლ/100 კგ თესლზე	მზესუმზირა	ქრაქი	თესლის დამუშავება თესვამდე	- (1)	-(3)

74	ემბრელია 140 სკ 140 გ/ლ (იზოპირაზამი 100 გ/ლ+დიფენოკონაზოლი 40 გ/ლ) (თ), (3) „ადამა აგრიქალჩა ბვ“ ნიდერლანდები 1096/19	1, 2-1, 5	ვაშლი მსხალი	ქეცი, ნაცარი ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალით	21(3)	-(15)
75	ეფდალ აკრობოტი მც, სფ 600 + 90 გ/კგ (მანკოცები + დიმეთომორფი) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 873/17	2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველივე ნიშნების გამოჩენისას და 10-დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
		2	ვაზი	ჭრაქი	“	30(3)	7(3)
		2	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
76	ეფდალ ბაქსული 20 სფ (ბორდოს ნარევი , 20% სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის (II) სულფატი-კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1378	20-25	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე	* -(1)	3(1)
		15	გარგარი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი ბაქტერიოზი	პირველი შესხურება შემოდგომით ფოთლების ჩამოცვენის შემდეგ მეორე შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე მესამე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როდსაც ნაყოი ჯამის ფოთოლი და მტვრიანას გარსი გამოსცდება ნაყოფის წვეროს	-(1) -(1) 14(1)	3(1)
		7,5					
		18-22,5	ატამი	ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე	-(1)	3(1)

		18,0-22,5 10	ზეთისხილი	ფოთლების ლაქიანობა	პირველი შესხურება შემოდგომით (ნოემბერ- დეკემბერში) მეორე-მარტი-აპრილში	-(1) 14(1)	3(1)
		4-6	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 10 დღიანი ინტერვალით	14(2)	3(1)
		4,5-5 3,5-5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფსისი ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პირველი- გვერდითი შტოების სიგრძე 25-30 სმ, დანარჩენი 7-10 დღიანი ინტერვალით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პირველი- გვერდითი შტოების სიგრძე 2-3 სმ, მეორე- გვერდითი შტოების სიგრძე 8-10 სმ, მესამე-- გვერდითი შტოების სიგრძე 25-30 სმ	15(3) 15(3)	3(1)
77	ეფდალ ბაკიროქსი 50 წზგრ 500 გ/კგ (სპილენძის ოქსიქლორიდი) (თ), (1)	2.5-3	კარტოფილი პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ბაქტერიული ჭკნობა ბაქტერიული ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-600 ლ/ჰა	15(3-4)	3(1)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1379	2.5-3	პამიდორი ბადრიჯანი კარტოფილი	ალტერნარიოზი	“	15(4)	3(1)
		2.5-3	კიტრი	ფოთლის კუთხოვანი ლაქიანობა	“	15(3)	3(1)
		2.5-3	ლობიო	ანთრაქნოზი ფოთლის, ფესვის სიდამპლე	„	15(2-3)	3(1)
		9 4.5	ვაშლი, მსხალი,	ქეცი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თუ მცენარის ტოტემი დაზიანებულია შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თუ მცენარის ტოტემი არ არის დაზიანებული .ხარჯვა-1200 ლ/ჰა	21(3-5)	3(1)
		8	ქლიავი, ატამი, გარგარი	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის	შესხურება გვიან შემოდგომაზე. ხარჯვა- 1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)

		4		სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	
		2,5-4	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(3-4)	3(1)
		8	ციტრუსები	მალსეკო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-2000 ლ/ჰა	30(2)	3(1)
		4	ზეთისხილი	ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	21(2-3)	3(1)
		2.5	თამბაქო	ჩითილების ხმოზა (პითიუმი, რიზოქტონია, ალტერნარია, ფუზარიუმი, სკლეროტინია)	კვალის მორწყვა. ხარჯვა 800ლ/ჰა	15(1-2)	3(1)
		2,5-4	ბოსტნეულის ჩითილები	ჩითილების ხმოზა (პითიუმი, რიზოქტონია, ალტერნარია, ფუზარიუმი, სკლეროტინია)	„	15(1-2)	3(1)
78	ეფდალ ბაროქსი 77% სფ (770 გ/კგ) (სპილენძის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1380	5,0	ციტრუსები	ალტერნარიოზი ბაქტერიული ლაქიანობა	შესხურება დაავადებების პირველი ნიშნების გამოვლინებისთანავე 2-3 ჯერ 10 დღიანი ინტერვალით	25 (2)	3(1)
		5	გარგარი	კლასტეროსპორიოზი	პირველი შესხურება შემოდგომით ფოთლების ჩამოცვენის შემდეგ	-(1)	3(1)
		2,5			მეორე შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების გაშლამდე და 10 დღიანი ინტერვალით	14(2)	
		3,5	ატამი	ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი	პირველი შესხურება შემოდგომით ფოთლების ჩამოცვენის შემდეგ შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების გაშლამდე	10(3-4)	3(1)
		18,0-22,5	ზეთისხილი	ლაქიანობა	პირველი შესხურება როდესაცც ნაყოფი		3(1)

		10			ნორმალურ ზომას მიაღწევს და მწვანეა (ოქტომბერი) მეორე-გაზაფხულზე ხეების აყვავებამდე (აპრილი)	14(3)	
		2	პამიდ	ალტერნარიოზი ბაქტერიული დაქიანობა	შესხურება ციის პერიოდში ფეხის პირველი გამოჩენისას 2-3 მ 10 დღიანი ტერვალით	14	3(1)
		2	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ციის პერიოდში, ლი-გვერდითი სიგრძე 25-30 სმ, ინფექციისათვის რელი პირობების ადგომისას	25	3(1)
79	ფეხდალ გოსტაშიმ 25% სფ (სპილენძის სულფატი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1381	10-15	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე 2 %-იანი ბორდოს ნარევის სახით კვირტების გახსნამდე 3-5 დღით ადრე,თუ მცენარის ტოტები დაზიანებულია შესხურება გაზაფხულზე 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით კვირტების დაბერვისას, თუ მცენარის ტოტები არ არის დაზიანებულია შესხურება გაზაფხულზე 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით კვირტების გასკდომის მომენტში	21(2-3)	3(1)
		15	ვაშლი	ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება 2 %-იანი ბორდოს ნარევის სახით დასვენების პერიოდში	21(1)	
		10-15	გარგარი	ტოტების ბაქტერიული ნეკროზი	პირველი შესხურება 3%- იანი ბორდოს ნარევის სახით შემოდგომით ფოთლების ჩამოცვენისას,	-(1)	3(1)

				კლასტეროსპორიოზი, ნაყოფის ლაქიანობა	მეორე შესხურება 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით გაზაფხულზე ვარდისფერი კოკრების ფაზაში პირველი შესხურება 2%-იანი ბორდოს ნარევის სახით შემოდგომით ფოთლების ჩამოცვენისას, მეორე შესხურება 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით გაზაფხულზე კვირტების გამოსვლის პერიოდში ვარდისფერი კოკრების ფაზაში	21(2)	
		10-15	ალუბალი	ტოტების ბაქტერიული ნეკროზი	პირველი შესხურება 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით მეორე შესხურება 0,6%-იანი ბორდოს ნარევის სახით	21(2)	3(1)
		10-15	ატამი	ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე კლასტეროსპორიოზი ნაყოფის ლაქიანობა	შესხურება 3%-იანი ბორდოს ნარევის სახით კვირტების დაბერვისას პირველი შესხურება 3%-იანი ბორდოს ნარევის სახით შემოდგომით ფოთლების ჩამოცვენისას მეორე შესხურება 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით გაზაფხულზე ვარდისფერი კოკრების ფაზაში	-(1) 21(2)	3(1)
		15	მუშმულა	ქეცი	შესხურება 1,5%-იანი ბორდოს ნარევის სახით შემოდგომით ყვავილების გახსნამდე	21(1)	3(1)

		10-15	ნუში	ტოტების ბაქტერიული კიბო	პირველი შესხურება 3%-იანი ბორდოს ნარევის სახით შემოდგომით ფოთლების ჩამოცვენისას მეორე შესხურება 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით გაზაფხულზე კვირტების გამოსვლისას	21(2)	3(1)
		10-15	ციტრუსები	ყავისფერი ლაქიანობა და ღეროს ფიტოფტოროზი ყლორტების ბაქტერიული ჭკნობა	პირველი შესხურება 2%-იანი ბორდოს ნარევის სახით ღეროსა და მსხვილი ტოტების ინფექციისას შესხურება 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით ნაყოფის ინფექციის დროს მეორე შესხურება 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით პირველი ორი თვის განმავლობაში შესხურება პირველ ეტაპზე 2%-იანი ბორდოს ნარევის სახით და მეორე ეტაპზე 1,5%-იანი ბორდოს ნარევის სახით	21(2)	
		10	ზეთისხილი	ფოთლების ლაქიანობა ყლორტების ბაქტერიული კიბო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი-1,5%-იანი ბორდოს ნარევის სახით, მეორე-1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით. პირველი, მეორე და მეოთხე წამლობა -2 %-იანი ბორდოს ნარევის სახით. მესამე წამლობა-1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით	21(2) 21(4)	3(1)

		10	თხილი	ბაქტერიული ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით. წებოვნებისათვის ემატება 0,3%-იანი ნიგროზინი	21(1)	3(1)
		10	კომბოსტო	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 10 დღიანი ინტერვალით	21(1-2)	3(1)
		5-10	ვაზი	ჭრაქი ვაზის რქის ჭკნობა (ფომოფისი) ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი-0,5%-იანი ბორდოს ნარევის სახით, მეორე 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით, მესამე-1,5%-იანი ბორდოს ნარევის სახით სეტყვის შემდეგ 2%-იანი ბორდოს ნარევის სახით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, 0,5%-იანი ბორდოს ნარევის სახით, მეორე -ზაფხულში 1%-იანი ბორდოს ნარევის სახით,	21(1) 21(3) 21(3)	3(1)
80	ეფდალ დონაზოლი 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი)	0,15-0.2	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	0,15-0.2	მსხალი	“	“	14(4)	7(3)
	თურქეთი 948/18	0,3-0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	“	20(2)	7(3)
81	ეფდალ ექსალილი 50 გ/ლ (იმაზალილი)	6-8	ციტრუსი	ლურჯი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15-დღიანი ინტერვალთ სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	25(4)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1406						

		1,8	ჰამიდორი (ღია გრუნტში)	ალტერნარიოზი ნაცრისფერი სიდამპლე	„	10(2)	7(3)
82	ეფდალ ექსპუმი 450 გ/კ 450 გ/ლ (პროქლორაზი) (თ) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა თურქეთი 1408	1,25 გ/მ² (1-2 ლიტრა	კულტივირებული	Cladobotrium dendroides- იოზი Dactilium dendroides P>Infestans	სუბსტრატის დამუშავება დღიანი ინტერვალით 3 აშ). ხარჯვა-500-1500 ლ	10(2)	7(3)
		1	ხორბალი, ქერი	ფესვის ყელისა და ფესვის ცერკოსპორელოზული სიდამპლე რიზოქტონიოზი ფესვის ფუზარიოზული სიდამპლე, ფუზარიოზული ჭკნობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ბარტყობისა და მილში გასვლის შორის	35(1)	7(3)
		1	მარცვლოვნები	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	35(1)	7(3)
83	ეფდალ კაპტანიმი 50 სგ 500 გ/კგ (კაპტანი) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1013/18	3-5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14-დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)
		3-4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)
		3-4	ატამი, გარგარი, ალუბალი, ნუში,	ფოთლის სიხუჭუჭე ანთრაქნოზი,	“	30(3)	7(3)
		2.5-3	კიტრი, ჰამიდორი, წიწაკა (ღია გრუნტში)	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
84	ეფდალ კრესდითი 50 წზგრ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ მეთილი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1028/18	0.3-0,5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლეები	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა ან 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	35(3)	7(3)

		0.2-0.3 0.3	კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ ნაკვეთზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2) 2(2)	2(2)
		0,3	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის მანძილზე 7-14 დღიანი ინტერვალით	2(2)	2(2)
85	ეფდალ ლოქსბინი წდგრ 500 გ/კგ (ტრიფლოქსისტრობინი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1029/18	0,15-0,25	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი, შავი (მურა) ლაქიანობა	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.	14(2-3)	7(3)
		0,15-0,3	გარგარი, ვაშლატამა ატამი ქლიავი	ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი	10(2-3)	7(3)

		0,15-0,2	ალუბალი ბალი	ნაცარი ფოთლის ლაქიანობა	ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.		
		0.25-0.3 0.14	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი, შავი სიდამპლე	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, არ უნდა აღემატებოდეს სამს	35(2-3)	7(3)
86	ეფდალ მაკო მ-45, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ)	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით	28(5)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 934/18	2.0-3,0	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ვაშლი	ქეცი, ჟანგა	“	30 (2)	7(3)
		1.2-1.6	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის	14 (3)	7 (3)

			კიტრი (ღია გრუნტი)		პერიოდში		
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		1.0-1.2	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ჰრაქი რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		1.2-1.6	ხახვი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	28(3)	7(3)
		1.2-1.6	საზამთრო, ნესვი	ანთრაქნოზი	„	10 (3)	7(3)
		1.2-1.6	ბარდა, ცერცვი	ანთრაქნოზი	„	28(3)	7(3)
87	ეფდალ მანტალაქსი, სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2- 2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1012/18	2.5	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(4)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჰრაქი	“	10(3)	7(3)
88	ეფდალ მოკანი, სფ 697,4+42 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი 697,4- სპილენძის მიხედვით 397,5 + ციმოქსანილი 42) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1034/18	2-3	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
		2.5	კიტრი	პერონოსპოროზი	„	5(3)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	“	5(3)	7(3)
		2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“	5(3)	7(3)
89	ეფდალ პეკოზოლი 100 ეკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 874/17	0.25-0.4	კიტრი, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	„	20(4)	7(3)
		0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 025% სამუშაო ხსნარით 14-დღიანი ინტერვალით	21(3-4)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი, ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 5-1%	-(3-4)	3(-)

					სამუშაო ხსნარით 14- დღიანი ინტერვალით		
90	ეფდალ პროკარი 722 წბ 722 გ/ლ (პროპმოვარბი ჰიდროქლორიდი) (თ)	7.5 მლ/მ ²	თამბაქო	ფესვის სიდამ-პლეები (პითიუმის გვარის სოკოებით გამოწვეული)	ნიადაგში შეტანა დათესვის წინ და 30 დღის შემდეგ. ხარჯვა-3-4 ლ/მ ²	14(2)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1036/18	2,5 2,0	გოგროვნები კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500-1500 ლ	3(2)	7(3)
		300 მლ/მცე ნარე	“	ფესვის სიდამპლეები ჭრაქი	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ 0.25% სამუშაო ხსნარით	-(1)	-(3)
		300 მლ/მცენარე	“	“	მორწყვა ჩითილების გადარგვის შემდეგ 0,15% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2-4 ლ/ მ2	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის “დროს 0.25% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2	საზამთრო ნესვი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500-1500 ლ	3(2)	7(3)
		2-4 ლ/ მ2	კიტრი, პამიდორი კომბოსტო წიწაკა ბადრიჯანი საზამთრო	ფესვის და ღეროს სიდამპლეები	ჩითილების მორწყვა 0,15% სამუშაო ხსნარით 3-4 კვირის ინტერვალთ	3(2)	7(3)
		0,5 ლ/100 კგ თესლზე	მზესუმზირა	ჭრაქი	თესლის დამუშავება თესვამდე	- (1)	-(3)
91	ეფდალ პრონები 70 სვ 700 გ/კგ (პროპინები) (თ), (1)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 949/18	2-3	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“	30(3)	7(3)
		1,5	ფსტა	სერტორიოზი	“	30 (2)	7(3)
		5-6	ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ობი	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამდე და მეორე ვეგე- ტაციის დასაწყისში.	40(4)	10(3)
		1.5-2	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ფიტოფტორა, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალთ	20(3)	7(3)
		1.5-2	კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		1,0-1,5	ხახვი	პერონოსპოროზი		20(2)	7(3)

		1,0-1,5	კომპოსტო	პერონოსპოროზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	ბოსტნეული	ფესვის ფუზარიოზული სიდამპლე,რიზოქტონიოზი, პიტიუმი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	ნესვი, საზამთრო	ანთრაქნოზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	ბარდა, ლობიო	ანთრაქნოზი, ჟანგა, ასკობიტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		1,0-1,5	ვარდი, მიხაკი	ჟანგა		- (3)	- (3)
92	ეფდალ სულფური 80, სფ 800 გ /კგ (გოგირდი)	4-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით	1(-3)	4(1)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 875/17	5-6	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	ნაცარი	“	14-5)	4(1)
		2, 5-3	გოგროვნები	ნაცარი	“	1(2-3)	4(1)
		1, 8-2	ლობიო, ბარდა	ანთრაქნოზი	„	1(2-5)	4(1)
				ჟანგა			
		1, 8-2	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	1(3-5)	4(1)
		2, 5	ბადრიჯანი	ნაცარი	„	1(3-5)	4(1)
		3-4	ვარდი	ნაცარი	“	-(4-6)	4(1)
93	ეფდალ ფენდორი სკ 500 500 გ/ლ (ფენქესამიდი) (თ) (4) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1388	0.8-1.0	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას 10- 14 დღიანი ინტერვალით	30 (3)	7)(3)
		0.4-0,5	პამიდორი	ნაცრისფერი სიდამპლე	„	20 (3)	7(3)
		0,5	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (1)	7(3)
94	ეფდალ ციმოქსაზები 50 სგ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ)	3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 935/18	3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		3	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
95	ექსპერტ ტიმი, სფ 439.5 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი)	2-3	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)

	397,5 + ციმოქსანილი 42) "ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს." თურქეთი 637/13/18						
		2.5-3	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(3)	7(3)
		2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	"	5(3)	7(3)
		2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	"	5(3)	7(3)
96	ვალბონი, წდგრ 17,5+700 გ/კგ (ბენტიავალიკარბ- იზოპროპილი + მანკოცები)	1,6-1,8	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში სხვა მოქმედების მექანიზმის მცონე ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	7(4)	7(3)
	(თ) "კუმიაი ქემიკალ ინდასტრი კო, ლტდ "	1,8-2	ვაზი	ჭრაქი	"	28(4)	7(3)
	იაპონია 1276	1,6-1,8	პამიდორი კიტრი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	"	7(4)	7(3)
97	ვალისი მ , წდგრ 600 + 60 გ/კგ (მანკოცები+ ვალიფენალატი) „ბელქიმ კროპ პროტექშენ ნვ/სა“ ბელგია 1371	2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 5 დღიანი ინტერვალით	20(3)	
		2	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	30(3)	
		2,5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით	20(3)	
		2-2,5	ხახვი	პერონოსპოროზი	"	28(3)	
98	ვალისი ფ , წდგრ 480 + 60 გ/კგ (ფოლპეტი+ ვალიფენალატი) „ბელქიმ კროპ პროტექშენ ნვ/სა“ ბელგია 1372	2	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	30(3)	
99	ვალსაზები, სვ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ), (4)	1.2-1.6	კარტოფილი, პამიდორი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით	20(5)	7(3)
	„ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა	2.0-3.0	ვაზი	ჭრაქი	"	30(6)	7(3)
	514/09/13/18	2-2.5	კარტოფილი, (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		0.3-0.6 1.2-2.0	თუთა (სათესი ნაკვეთები და	ადმონაცენების ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლე,	ადმონაცენთა და ნერგების შესხურება 0,3% სამუშაო	-(3-4)	7(3)

			სანერგეები)	ცილინდროსპოროზი, ფუზარიოზი	ხსნარით		
100	ვალსალაქსილი, სფ 80+640 გ/კგ	2,5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
	(მეტალაქსილი+ მანკოცები)	2,5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ქრაქი	“	20(3)	7(3)
	„ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 482/05/10/13/18	2,5	ხახვი	ქრაქი	“	20(3)	7(3)
		2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი	“	20(3)	7(3)
		2,5	თამბაქო	ქრაქი	“	20(3)	7(3)
		2,5-3	ვაზი	ქრაქი	“	20(4)	7(3)
		3-4	ციტრუსი	ანთრაქნოზი, მექიქიანობა,	“	20(3)	7(3)
		0,3-0,6	თუთის ნათესები და სანერგეები	ფესვის სიდამპლე	“	-(3-4)	7(3)
		1,2-2	“	ცილინდროსპორიოზი, ფუზარიოზი	“	-(3-4)	7(3)
101	ვალსალაქსილი C პლუსი, სფ 400+40 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი ი) (თ) (3) „ინტერნასიონალ კუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა	2.5-3	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალთ	30(4)	7(3)
	638/13/18	2.5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	20(4)	7(3)
		2.5-3	კიტრი	პერენოსპოროზი	“	20(3)	7 (3)
		2.5-3	პომიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი სეპტორიოზი ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალთ	20(4)	7(3)
		2.5-3	ხახვი	პერენოსპოროზი	“	30(4)	7 (3)
		2.5-3	წიწაკა	ანთრაქნოზი სიდამპლე	“	30(4)	7 (3)
		1.5-4	თამბაქო	პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალთ	30(4)	7 (3)
102	ვივანდო, კს 500 გ/ლ (მეტრაფენონი) “ბასფი სე” გერმანია 766/16	0.2-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და დაყვავილებისას 7-14 დღიანი ინტერვალთ	50 (2-3)	7(3)
103	ვიოლეტი 72 სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2.5	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
	(4)	2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი,	“	10(4)	7(3)

	“მენტა ტარიმ ილაკლარი სან ვე ტიკ ლტდ სტი.” თურქეთი 1160		(ღია გრუნტი)	ალტერნარიოზი			
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი	“	20(3)	7(3)
104	ვიქტორი, წზგრ 80 გ/კგ+640 გ/კგ (მეტალაქსილი+მანკოცებ ი)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, კოკრების დაბერვის ფაზიდან	4(20)	7 (3)
	„პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ“ ინდოეთი 556/10/15	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(20)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი	“	4(10)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი	“	4(3)	7(3)
		2-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი (ცრუ ნაცარი) ასკორიოზი	“	3(20)	7(3)
		2-2.5	კიტრი (დახურული გრუნტი)		“	3(8)	7(3)
		2-2.5	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	3(20)	7(3)
		0,3-0,6	თუთის ნათესები და სანერგეები	ფესვის სიდამპლე	“	-(3-4)	7(3)
		1,2-2	“	ცილინდროსპორიოზი, ფუზარიოზი	“	-(3-4)	7(3)
105	ზატო წზგრ 50 500 გ/კგ (ტრიფლოქსისტრობინი) (თ), (3) “ზაიერ აგ” გერმანია 516/09/14/19	0.14	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი შავი (მურა) ლაქიანობა, ფილოსტიქტოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დამეტრისას 9- 10- დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დამეტრისას 12-14- დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	14(2-3)	7(3)

					დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.		
		0.15	ვაშლი მსხალი	დაავადებები შენახვის პირობებში (ობის სოკოები, მონილიოზის ლატენტური ფორმა)	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.015%-იანი სამუშაო ხსნარით მოსავლის აღებამდე 28, 14 დღით ადრე. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავებები დაავადებების წინააღმდეგ ვეგეტაციის პერიოდში არ უნდა აღემატებოდეს სამს	14(2-3)	7(3)
		0.25-0.3 0.14	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9- 10- დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14- დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, არ უნდა აღემატებოდეს სამს	28(2-3)	7(3)
106	ზატო სტარი 520 სკ 520 გ/ლ (ტრიფლოქსისტრობინი	0.4-0.6	ვაშლი, მსხალი	ქევი ნაცარი მონილიოზური სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (3)	7(3)

	120+პირიმეტანილი 400) (4)						
	“ბაიერ აგ” გერმანია 590/12/17	0.5	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე ნაცარი ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (3)	7(3)
107	ზახისნიკი, სვ 500 გ/ლ (თიოფანატ-მეთილი) (თ), (3) შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 1216	2	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (3)	7(3)
		2,5-3	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ნაცარი მონილიოზი	“	25 (3)	7(3)
		3,9	ატამი	მონილიოზი ფოთლის სიხუჭუჭე ნაცარი	„	25 (1)	7(3)
		2	პომიდორი	ფიტოსპოროზი	„	15 (2)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერენოსპოროზი	„	15(2)	7(3)
		1,5	ხახვი	ფუზარიოზი, ალტერნარიოზი, ნაცარი, სიდამპლეები,		30(2)	7(3)
108	ზახისტი, სვ 350 გ/კგ (ციმოქსანილი 250 გ/კგ+მეტალაქსილი 100 გ/კგ)	0.5-0,6	ვაზი	ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	30 (3)	7 (3)
	(თ), (3) შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 908/17	0,6-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი მაკროსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : რიგების შეკვრის დასაწყისში, კოკრების ფაზაში, ყვავილობის ბოლოს და ტუბერების ზრდის დროს. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	20 (2)	7 (3)
		0,6-2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 8-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	14 (3)	7 (3)
109	ZZ კუპროტან 700 სვ (სპილენძის ქლორჟანგი, 700 გ/ლ სპილენძის მიხედვით) (თ), (1) ატან ტარიმ ზირაატ ილაკლარი სან. ვე	2	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	15(3)	

	ტიკარეტ ა.ს. «თურქეთი 1435						
		0,8 0,7	პამიდორი	ფიტოსპოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-500 ლ/ჰა	15(2-3)	3(1)
110	ზირაფლო, წდგრ 760 გ/კგ (ცირამი) (თ) (3)	2.5-4	ვაშლი ატამი	ქეცი ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	30(2)	7(3)
	„საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 788/16	1.2-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მკეროსპოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(2)	5(3)
		1.2-2	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	15(2)	5(3)
111	ზორგეკ ვინაზელი, სე 700 გ/კგ (ოქსათიაპიპროლინი 40 გ/ლ+ზოქსამიდი 300 გ/ლ) (თ),(3) „დიუპონ ინტერნეიშენალ ოპერეშინს სარლ“ შვეიცარია 1384	0.4-0.5	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მე-5 ფოთლის გაშლის ფაზაში და მტევნის მარცვლების უმრავლესობის შეკვრისას	28 (2)	7(3)
112	თიოვიტ ჯეტი, წდგრ კგ (გოგირდი)	3-4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4-6)	4(1)
	(3) “სინგენტა აგრო აგ”	3-8	ვაშლი, მსხალი	“	“	1(1-6)	4(1)
	შვეიცარია 442/04/09/14/19	2-3	კიტრი, პამიდორი	“		1(1-5)	1(1)
		2-3	ყაზაყი	“	“	1(1-3)	4(1)
		2-3	ვარდი	“	“	1(2-4)	4(1)
113	თირამ გრანუფლო, წდგრ 800 გ/კგ (თირამი) (თ) (3)	2-3	ვაშლი, მსხალი	ქეცი A	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 800-1500 ლ/ჰა	35(4)	7(3)
	“ ტამინკო ზება.” ბელგია 879/15/18	2-3	ატამი	ატმის ფოთლების სიხუჭუჭე	შესხურება შემოდგომაზე ფოთოლცვენის შემდეგ და გაზაფხულზე 7-10-დღიანი ინტერვალით ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა	42(3)	7(3)
		3-4	ყურძენი	ნაცრიფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა	35(3)	7(3)

		2-3	მარწყვი	ნაცრიფერი სიდამპლე, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 500-600 ლ/ჰა		7(3)
114	იგლი, სფ 120+630 გ/ჰგ (კარბენდაზიმი + მანკოცები)	2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(4)	7(3)
	„ლიიდს ლაიფსაენს ლიმიტედ“	2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
	დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1123	2.5	ვაშლი	ქევი	“	30(4)	7(3)
		2.5	ვაზი	ქრაქი	„	30(4)	7(3)
115	ინდაზოლი, ეკ 500 გ/ლ (კარბენდაზიმი)	0.3-0.6	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ფესვის სიდამპლე, ჩაწოლა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	-(7)
	“პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 557/10/15	0.5-0.6		ნაცარი, ჰელმინ-თოსპორიოზი, სეპტორიოზი, ფუზარიოზი და სხვა	“	30(2)	-(7)
		0.6-0.8	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, 0,25-0,3% სამუშაო ნაზავით	20(3)	7 (3)
		0.25-0.4	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	აღმონაცენის ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლე,	“	-(3-4)	3(7)
		0.9-1.5		ღეროს ფუზარიოზი, ცილინდრო-სპორიოზი	“	-(3-4)	3(7)
		1.25-2.4	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ტყის ჯიშების სანერგე	ჩვ. თოვლის ოზი, სხვადასხვა ლაქიანობები, ფუზარიოზი და სხვა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, 0,25-0,4% სამუშაო ნაზავით	-(1-2)	3(1)
116	ინდოფილი 72 სფ ლურჯი 720 გ/ჰგ (მანკოცები) (თ), (4) „ინდოფილ ინდასტრიზ ლიმიტედ“ ინდოეთი 1295	2.0-3.,0	ვაზი	ქრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალთ	30(6)	7(3)
		2.5-3	ვაშლი, მსხალი	ქევი	“	30 (5)	7(3)
		2-3	ატამი, გარგარი	მონილიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე		20 (4)	7(3)
		2,5-3	ციტრუსი	ანთრაქნოზი		40 (4)	7(3)
		2-2,2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპო-როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15 (3)	7 (3)
		2-2,2	პამიდორი	ფიტოფტორა მაკროსპორიოზი	„	20 (4)	7 (3)
		2-2,5	კარტოფილი	ფიტოფტორა	„	20(5)	7(3)
		2-2,5	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ქრაქი რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-()

117	ინტერკაპტანი 50 სვ 500 გ/კგ (კაპტანი) „ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 1268	3-5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)
		3-4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)
		3-4	ატამი, გარგარი ალუბალი	ქეცი ნაცრისფერი სიდამპლე ფოთლის სიხუჭუჭე ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)
		2,5-3	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტში)	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი	“	20(2)	7(3)
118	იროკო 40 წდგრ 400 გ/კგ	1. 5-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში .	15(5)	7(3)
	(სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით)	2.5-3.0	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	“აიკუვი სა” ესპანეთი 647/14/18	1.2-2.7	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		1.2-2.7	კიტრი	პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		1.2-2.7	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		3-4	ატამი	ჟანგა. სიდამპლეები. ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(2)	7(3)
		4-5	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		1,2-2,8	მბოსტნეული კულტურები	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
119	ინფერნო, წდგრ 800გ /კგ (გოგირდი)	5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	3(2-3)	4(1)
		6	ვაშლი	ნაცარი	“	3(2-3)	4(1)
	მპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა მპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო	5	თხილი	ნაცარი	“	3(3-5)	4(1)

	1366						
		3	კიტრი	ნაცარი	„	3(1-2)	4(1)
120	ინფინიტო 687, 5 სკ 687.5 გ/ლ (ფლუოპიკოლიდი 62.5+ პროპამო კარბიდიდროქლორიდი 625) (3)	1.2-1.6	კარტოფილი პამოდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველი სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით	14 (2-4)	10(3)
	„ბაიერ აგ“ გერმანია 650/14/18	1.2-1.6	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით	10 (2-3)	10(3)
		1.6	კომბოსტო	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალით	14 (2)	10(3)
		1.2	ხახვი	პერონოსპოროზი		14 (3)	10(3)
121	კაბრიო ტოპი, წდგრ 550+50 გ/კგ (მეთირამი+პირაკლოსტრ ობინი) (თ) (3) “ბასფი სე” გერმანია 579/10/16	2	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე, შავი ლაქიანობა, წითურა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის წინ, დაყვავილებიდან მტევნის შეკვრამდე 0.2%- იანი კონცენტრაციით 7-14 დღიანი ინტერვალით	40 (2-3)	7(3)
		2	პამიდორი (ღია გრუნტი) პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი, ლაქიანობები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დასაწყისში და 10-12 დღიანი ინტერვალით	25(2-3) 14(2-3)	7(3)
122	კამბიტი, წდგრ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ- მეთილი) (თ), (3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.” თურქეთი 1179	0.3-0,4	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლეები	პრეპარატი გამოიყენება ლონისმიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა ან 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	35(3)	7(3)
		0,2-0,3	ვაზი	ნაცარი	ლონისმიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 1000ლ/ჰა	35(3)	7(3)
			გოგროვნები გოგრა ნესვი	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ლონისმიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან	5(2)	2(2)

		0.2-0.3	საზამთრო კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)		მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ ნაკვეთზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	2(2)	
		0.3					
		0,5	ციტრუსი	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35(2)	2(2)
123	კანტუსი, წდგრ 500 გ/კგ (ბოსკალიდი) (თ) “ზასფი სე” გერმანია 767/16	1-1,2	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით მტევნის შეკვრამდე	30 (2)	10(4)
		0,4	მსხალი	ალტერნარიოზი სტემფილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით ნაყოფის ფორმირებიდან დამწიფებამდე	7(3)	10(4)
		0,4	ატამი გარგარი ალუბალი	მონილიოზი	„	3(3)	10(4)
124	კაპტანლი , წდგრ 900გ/კგ (კაპტანი) „მაკკინლი ტრეიდიზე ლპ „ ირლანდია 1458	1,1	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14-დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)
		1,1	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე შავი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	30(4)	7(3)
		1,1	ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ნუში	ფოთლის სიხუჭუჭე ანთრაქნოზი ნაცრისფერი სიდამპლე, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)
		1,1	პომიდორი, კიტრი	ანთრაქნოზი ალტერნარიოზი პერენოსპოროზი	„	20(3)	7(3)

				ფიტოფტოროზი			
		1,1	ვარდი	შავი ლაქიანობა	„	-(3-4)	7(3)
		1.1	მარწყვი	ანთრაქნოზი ნაცრისფერი სიდამპლე, ლაქიანობა, ნაცარი, სიდამწვრე, სეპტორიოზი	„	20(3)	7(3)
		1.1	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	„	20(3)	7(3)
		1.1-1.8	ციტრუსები	ნაცრისფერი სიდამპლე, ფიტოფტო-როზი	„	30(3-4)	7(3)
		1.1	საჩითილე და სანერგეები	ყელის სიდამპლე	„	-(3-4)	7(3)
125	კარზეები 50 სვ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ)	3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტივ. ლტდ. სტი.“ თურქეთი 982/18	3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		3	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
126	კარმენი მც, სვ 90+ 600 გ/კგ (დიმეთომორფი+ მანკოცები) (4)	2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2-3)	7(3)
	„დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტივ. ა.ს.“ თურქეთი 1141	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	30(3)	7(3)
		2-2,5	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	15(3)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპო-როზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპო-როზი	“	15(2)	7(3)
127	კარნავალი 50 სვ 500 გ/კგ	1, 5-1, 8	კურკოვნები (გარგარი,	მონილიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი	25 (3)	7(3)

	(იპროდიონი) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”		ქლიავი, ატამი, ბალი, ალუბალი)	ალტერნარიოზი	ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ნაყოფის შეფერადების პერიოდში. ხარჯვა – 800-1200 ლ/ჰა		
	თურქეთი 876/17	1-1, 5 1, 2	კენკროვნები მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ, სანერგეებში და სადედეგებში შეზღუდვის გარეშე ხარჯვა – 800-1200 ლ/ჰა	15 (2-3)	7(3)
		0, 8-1, 5	ყურძენი	ნაცრისფერი სიდამპლე ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება დაწყების პერიოდში. ხარჯვა – 800- 1200 ლ/ჰა	30 (3)	7(3)
		0, 5-1	ხახვი, წიორი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი, თეთრი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ღეროს 50%- იანი დახრის პერიოდში. ხარჯვა – 800-1200 ლ/ჰა	21 (3)	7(3)
		0, 5-0, 6	პამიდორი	ნაცრისფერი სიდამპლე ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ნაყოფის ზრდის დამთავრებისას. ხარჯვა – 400-600 ლ/ჰა	15 (2-3)	7(3)
		0, 45	კიტრი	თეთრი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალთ	15(2-3)	7(3)
		0.15 1-1.5	სტაფილო	თეთრი, შავი, მურა სიდამპლეები, ფუზარიოზი, თესლის ოზი, ფომოზი მურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ცერკოსპოროზი, ალტერნარიოზი	ძირხვეწების დამუშავება შენახვამდე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ფესვის ზრდის დამთავრების პერიოდში. ხარჯვა – 400- 600 ლ/ჰა	-(2) 21(2)	7(3)
		1.2	ტიტა	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 2% სამუშაო ხსნარით	-(4)	7(3)
		0.4-0.8 1.2-2.1	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	აღმონაცენთა ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლე, ცილინდროსპო-როზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი	აღმონაცენთა და ნერგების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 4% სამუშაო ხსნარით	-(3-4)	7(3)
128	კარნეოლი , სკ (კაპტანი 360 გ/ლ +კალიუმის ფოსფიტი 660 გ/ლ, ეკვივალენტი ფოსფოროვანი მჟავის 440 გ/ლ) (თ), (3) „ადამა აგრიქალა ბ.ვ.“	2.0-2,5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	40(4)	7(3)

	ნიდერლანდები 1340						
129	კვარტეტი 70 სგ 700 გ/კგ (თიოფანატ-მეთილი) (თ),(3) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 1047/18	1	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით	21 (2)	7(3)
		1-2	ვაშლი, მსხალი	ქევი ნაცარი მონილიოზი	“	20 (5)	7(3)
		1	ალუბალი გარგარი	კოკომიკოზი სკლეროტინია	„	20(4)	7(3)
		0,8-1	შავი მოცხარი	ნაცარი, ანთრაქნოზი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,1% სამუშაო ხსნარით. სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე	-(2)	7(3)
		2,9	ატამი	ნაცარი, ქევი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3% სამუშაო ხსნარით	30 (1)	7(3)
		0,8-1	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით	7(4)	-(3)
		1-1,2	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,6-0,8	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	„	20(3)	7(3)
130	კობუზი 100 ეკ, ეკ 100 გ/ლ (კენკონაზოლი)	0.15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2)	7(3)
	(თ), (2) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 665/14/19	0.25-0.4	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	“	3(3)	7(3)
		0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)

		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ალუბალი (სადედე)	კოკომიკოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	შავი მოცხარი (სადედეები სანერგეები)	ნაცარი	“	-(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	3(3-4)	3(-)
		0.15-0.2	სამკურნალო მცენარეები (ფუტკარა)	“	სათესლე ნაკვეთების შესხურება	-(2)	7(3)
							7(3)
131	კოლისი, სკ 100 გ/ლ + 200 გ/ლ (კრეზოქსიმ-მეთილი + ბოსკალიდი) (თ) “ზასფი სე” გერმანია 592/13/18	0.4	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	50(3)	7(3)
132	კონსენტო 450 სკ 450 გ/ლ (ფენამიდონი 75+ პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი 375) (თ) “ბაიერ აგ” გერმანია 651/14/18	1.5-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით	7(3)	7(3)
133	კორზ სუპერი 50 სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ)	2.5-3	ვაზი	ჰრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	“აგრიკო გრუპ ოოდ” ბულგარეთი 645/13/18	2.5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2.5-3	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
134	კორიტუსი , წზგრ 500 გ/კგ	0.4-0,5	ვაშლი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილის	28(4-5)	7(3)

	(ციპროდინილი) (თ)		მსხალი	ქევი	დაბერვისას, ვარდისფერი კვირტის პერიოდში, როცა ყვავილების 70-80% დაცვივდება, დანარჩენი 12-14 ინტერვალით		
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1410	0.3	ატამი გარგარი	მონილიოზი, ნაცარი, კლასტეროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობის დაწყებისთანავე (5-10%), ყვავილობის ეტაპზე (90- 100%)	25(3)	7(3)
135	კორუსი 75 წდგრ, 750 გ/კგ (ციპროდინილი) (თ)	0,2-0,3 0.35-0,4	ვაშლი	ქევი, ნაცარი მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)
	„დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 909/18	0,2 0.25-0.3	მსხალი	ქევი, ალტერნარიოზი მონილიოზი	“	28(2)	7(3)
		0,15-0,2 0.3-0.35	ატამი	ნაცარი მმონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი	“	28(2)	7(3)
		0.3-0.35	გარგარი ქლიავი	მმონილიოზი, კლასტეროსპორიოზი, კარპოფილიუმ	“	28(2)	7(3)
		0,15-0,2 0.25-0.3	ალუბალი, ბალი	მონილიოზი კოკომიკოზი კლასტეროსპორიოზი	“	28(2)	7(3)
		0.5-0.7	ვაზი	ნაცარისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი	“	28(3)	7(3)
136	კორსები, სფ 680+45 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილ ი) (თ) 4)	2.5-3	ვაზი	ჭრაქი შავი სიდამპლე ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 7-12- დღიანი ინტერვალთ	24 (3-5)	7 (3)
	“ ინდოფილ ინდასტრის ლიმიტედ” ინდოეთი 1106/19	2,5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12-დღიანი ინტერვალთ	14 (2-5)	7 (3)
		2,5-3	პამიდორი გოგრა	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალთ	14 (3)	7(3)
		2,5-3	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალთ	14 (3)	7(3)
		4,0-5,0	ხახვი ნიორი	პერონოსპოროზი ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალთ	14 (3)	7(3)
137	კოსავეტი 80 წდგრ 800გ /კგ (გოგირდი) (4)	3-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4)	4(1)
	“სულფურ მილს	5-8	თესლოვანი და კურკოვანი	ნაცარი	“	1(4)	4(1)

	ლიმიტედ” ინდოეთი 725/15		ხეხილი				
		3	კიტრი, პამიდორი	ალტერნატიოზი, სილაქავეები, ანთრაქნოზი	“	1(2)	4(1)
		2-3	ვარდი	ამერიკული ნაცარი	“	1(3)	4(1)
138	კოსაიდი 2000 წდგრ 538 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი) „კოსაიდ ლლკ..“	2,5-3	ვაზი	ჭრაქი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების ფაზიდან 8-10-დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით, ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	21(7)	3(1)
	აშშ 521/09/14/19	3-4	ვაშლი	ქეცი მონილიოზი	პირველი შესხურება გავარდისფერების ფაზაში, შემდგომი 7-10- დღიანი ინტერვალთ 0.2% სამუშაო ხსნარით, ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	15(7)	3(1)
		2.5-3	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნატიოზი ბაქტერიოზები	შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 8-10-დღიანი ინტერვალთ 0.2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	10(4)	3(1)
		2.5-3	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	პირველი წამლობა 2-3 ნამდვილი ფოთლის ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 8-10- დღიანი ინტერვალთ 0.1- 0.5% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	15(4)	3(1)
		2-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპოროზი ალტერნატიოზი	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში დანარჩენი 3 წამლობა 8- 10-დღიანი ინტერვალთ 0.2% სამუშაო ხსნარით	7(4)	3(1)
		4-6	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე ბაქტერ ოზები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა	- (1)	3(1)
		2,5	კენკროვნები (მაყვალი, მოცი, ჟოლო, მარწყვი)	ანთრაქნოზი, ალტერნატიოზი ფოთლის ბაქტერიული ლაქიანოზა ბაქტერიოზები ნაცრისფერი სიდამპლე ფომოფისი ყვითელი ჟანგა	პირველი შესხურება იანვრის ბოლოს- თებერვლის დასაწყისში, შემდეგი ორი-მარტში 20 დღის ინტერვალთ. ხარჯვა-700-800 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		3-4	ნუში	ბაქტერიოზები ფოთლის ლაქიანოზა ბაქტერიული წყლული მონილიოზი	პირველი შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას, შემდეგი ორი-20 დღის ინტერვალთ., ბოლო შესხურება- მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	20 (3-4)	3 (1)
		3-4	თხილი	ბაქტერიოზები	პირველი შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას, მეორე - ყვავილობის დასრულებიდან 1-1,5	20 (4-5)	3 (1)

					თვეში, შემდეგი -20 დღის ინტერვალით, ბოლო შესხურება- მოსავლის აღების შემდეგ. რეკომენდებულია დამატებითი შესხურება გვიან შემოდგომაზე, დამტვერვამდე. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა		
		3-5	კაკალი	კაკლის სიდამწვრე, ბაქტერიოზები	პირველი შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას, შემდეგ ყვავილობამდე 15-20 დღით ადრე , მესამე წამლობა ყვავილობის შემდეგ, შემდეგი ორი-20 დღის ინტერვალით. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	20 (5)	3 (1)
		3-4	კივი	ბაქტერიული სიდამწვრე, ბაქტერიოზები	პირველი შესხურება დეკემბერში , მოსავლის აღების შემდეგ, შემდეგი 2 შესხურება 20-25 დღიანი ინტერვალით კვირტის გახსნამდე. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	20 (3)	3 (1)
139	კუმულუსი დგ, წდგრ 800 გ/კგ (გოგირდი)	3-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4-6)	4(1)
	(3) “ბასფი სე”	3-8	ვაშლი, მსხალი	“	“	1(1-6)	4(1)
	გერმანია 026/08/12/18	2-3	კიტრი, პამიდორი	“	“	1(1-5)	1(1)
		2-3	ყაზაყი	“	“	1(1-3)	4(1)
		3-4	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურულ გრუნტში)	“	“	1(2-4)	4(1)
		2-3	ვარდი	“	“	1(2-4)	4(1)
		2-3	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	“	1(1-3)	4(1)
140	კუპერ 88 სგ 887 გ/კგ (სპილენძის ოქსიქლორიდი, სპილენძის მიხედვით 500 გ/კგ) (თ), (1)	0,45-085 0,8-1,6	ლობიო, ბარდა	ჟანგა, ანთრაქნოზი , ფესვის სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ინფექციის გამოჩენიდან მოსავლის აღებამდე ხარჯვა-350-700 ლ/ჰა	3(3)	3(1)
	„ცინკარნა მეტალურგიკალ ენდ ქემიკალ ინდასტრი ცელჯ ინკ“ სლოვენია 1418	1,1-2,1	ვაშლი, მსხალი,	ქეცი	შესხურება ზამთრის პერიოდში და გაზაფხულზე ყვავილობამდე ხარჯვა-700-1000 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
		1,1-2,1	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობის შემდეგ, ნაყოფის განვითარებიდან მოსავლის აღებამდე, მოსავლის აღების შემდეგ	21(3)	3(1)

					და ადრეულ გაზაფხულზე ხარჯვა-700-1000 ლ/ჰა		
		0,75-1,5	ზეთისხილი	ზეთისხილის ფოთლების ლაქიანობა	შესხურება შემოდგომაზე, ზამთარში მოსვენების პერიოდში და გადაფხულზე ხარჯვა-700-1000 ლ/ჰა	14(3)	3(1)
		0,75-1,5	კაკალი, თხილი	ბაქტერიოზი (შავი ჭირი)	შესხურება გაზაფხულზე ყვავილობამდე , შემოდგომაზე მოსავლის აღების შემდეგ და ზამთარში გასხვლის შემდეგ. ხარჯვა-700-1000 ლ/ჰა	- (3)	3(1)
141	კუპერგალი 20 სფ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	2,4-6	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	(სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)	4-6	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში“	15(4)	7(3)
	(თ), (1) “აიკუვი სა.” ესპანეთი 648/14/18	2,4-6	კიტრი	პერონოსპო	“ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		7-15	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი,ნაყოფის სიდამპლე,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		7-10	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4)	7(3)
		6-7,2	კურკოვანი ხეხილი	ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	7(3)
		5-20	ციტრუსი	ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4)	7(3)
142	კუპერვალ ზღუ, სფ 200 გ/კგ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	2,4-6	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	(ზორდოს ნარევი, სპილენძის სულფატი+ კალციუმის ჰიდროქსიდი)	4-6	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	„	15(4)	7(3)
	(თ), (1) “აიკუვი სა.” ესპანეთი 692/14/19	2,4-6	კიტრი	პერონოსპო	„	10(4)	7(3)
		7-15	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი ნაყოფის სიდამპლე	„	15(4)	7(3)
		7-10	ვაზი	ქრაქი	„	25(4)	7(3)
		6-7,2	კურკოვანი ხეხილი	ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი	„	15(2)	7(3)
		5-20	ციტრუსი	ანთრაქნოზი	„	25(4)	7(3)
143	კუპერ სულფატ პენტაჰიდრატი, კგ 980-990 გ/კგ	15-20	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი, სილაქვეები, ფიოლსტიქტოზი, ხმობა	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხარჯვა 1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
	(25% Cu მიხედვით)	10-15	გარგარი,	სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი,	შესხურება ადრე	-(1)	3(1)

	(სპილენძის სულფატი) (თ), (1)		ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი-ზი, მონილიოზი	გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხარჯვა 1500 ლ/ჰა		
	„მანიკა ს.პ.ა.“ იტალია 839/17	8-10	მოცხარი, ხურტკმელა	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1% სამუშაო ხსნარით	-(1)	3(1)
		-	ქალაქის მწვანე ნარგობა	ძირის და ტოტების სიდამპლეები	გადანაჭრების, ჭრილობების, ფულუროების დეზინფექცია 3-5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	3(1)
		10 ბორდოს ხსნარის სახით	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი ლაქიანოზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალით. ბორდოს ხსნარის დასამზადებლად ემატება 6-7 კგ კირი	203)	3(1)
		10 ბორდოს ხსნარის სახით	ატამი	სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი	„	203)	3(1)
		10 ბორდოს ხსნარის სახით	ვაზი	ჭრაქი	„	20(4)	3(1)
		10-20 ბორდოს ხსნარის სახით	ციტრუსი	სკები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალით. ბორდოს ხსნარის დასამზადებლად ემატება 6-12 კგ კირი	30 (4)	3(1)
		5 -6 ბორდოს ხსნარის სახით	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალით. ბორდოს ხსნარის დასამზადებლად ემატება 4-5 კგ კირი	20(4)	3(1)
		6-7 ბორდოს ხსნარის სახით	პამიდორი	მურა კუთხოვანი ლაქიანოზა ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი	“	15(3) 15(4)	3(1)
		6 -7 ბორდოს ხსნარის სახით	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, როზოქტონიოზი	„	20(3)	3(1)
		7-10 ბორდოს ხსნარის სახით	დეკორატიულ ი კულტურები	ტოტების სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალით. ბორდოს ხსნარის დასამზადებლად ემატება 5 კგ კირი	20(4)	3(1)
144	კუპერტინ სუპერი, სვ 255 გ/კგ (ციმოქსანილი 30 + ბორდოს ნარევი, სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი, 225 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	3.5-4.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი-ზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(2)	3(1)
	(თ), (4) “აიკუვი სა.” ესპანეთი 693/14/19	3.5-4.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი) მურა ლაქიანოზა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(2)	3(1)
		3.5	კიტრი	ჭრაქი, ანტრაქნოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	3(1)
		4	ვაზი	ჭრაქი, ანტრაქნოზი შავი სიდამპლე	“	30(3-4)	3(1)

145	კუპერ ჩემპიონი, სფ 770 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით 550 გ/კგ) (თ), (3) „შენზენ ქინგ ქუენსონ ინდასტრი კო., ლტდ“ ჩინეთი 1316	2.0-3.0	ვაზი	ჭრაქი, სიწითლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიდებთან მონაცვლეობით	30(5-6)	3(1)
		4.0	ვაშლი	ქეცი	პირველი შესხურება გავარდისფერე-ბის ფაზაში, შემდგომი 7-10- დღიანი ინტერვალით	20(5-6)	3(1)
		5.0-7.0	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული სილაქავე და ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1)	3(1)
		2.0-3.0	პომიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, ბაქტერიული სილაქავე	შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 7-10-დღიანი ინტერვალით	10(3-4)	3(1)
		2.0-3.0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი,	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, დანარჩენი სამი წამლობა 7-10-დღიანი ინტერვალით	10(2-3)	3(1)
		2.0-3.0	კიტრი	პერენოსპოროზი	პირველი წამლობა 2-3 ნამდვილი ფოთლის ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 7-10- დღიანი ინტერვალით	10(3-4)	3(1)
146	კუპრაბლუ, წდგრ 614 გ/კგ (სპილენძის ოქსიჰლორიდი, სპილენძის მიხედვით 350 გ/კგ) (თ), (1)	1.7-1.9	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7-10(6)	3(1)
	„ცინკარნა მეტალურგიკალ ენდ ქემიკალ ინდასტრი ცელჯ ინკ“ სლოვენია 1423	1.6-2.175	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე	„	7-10(1)	3(1)
		1.4-2.3	მუშმალა	ქეცი	„	7-10(1)	3(1)
		1.6-2.05	ატამი, გარგარი, ალუბალი, ქლიავი	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, ბაქტერიული	„	7-10(3)	3(1)

				დაავადებები			
		1.4-2.1	ციტრუსი	ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიული დაავადებები	„	7-10(3)	3(1)
		1.6-2.2	ზეთისხილი	ფოთლის ლაქიანობა და ბაქტერიული დაავადებები	„	7-10(3)	3(1)
		2.1	კივი	ფოთლის ლაქიანობა, სიდამპლეები და ბაქტერიული დაავადებები	„	7-10(1)	3(1)
		1.6-1.7	კაკლოვნები (კაკალი, თხილი, წაბლი)	ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებები (ნაცრის გარდა)	„	7-10(4)	3(1)
		1.6-2.05	ნუში	ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებები (ნაცრის გარდა)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7-10(4)	3(1)
		1.3-1.7	კენკროვნები (მოცვი, მოცხარი, ჟოლო, მაყვალი, ხურტკმელი)	ფოთლის ლაქიანობა	„	7-10(2)	3(1)
		1.4-1.6	პომიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი, მურა ლაქიანობა	„	7-10(2)	3(1)
		1.1-1.5	ბადრიჯანი	ანთრაქნოზი	„	7-10(2)	3(1)
		0.9-1.5	გოგრა, კიტრი, ყაბაყი, საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	„	7-10(2)	3(1)
		0.65-1.5	წიორი, ხახვი	ჭრაქი	„	7-10(5)	3(1)
		0.65-1.5	სალათი, ისპანახი და სხვა.	ჭრაქი, ბაქტერიული დაავადებები	„	7-10(5)	3(1)
		0.65-1.5	კომბოსტოსე ბრნი	ჭრაქი, ფოთლის შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე, პერონოსპოროზი, ბაქტერიული დაავადებები	„	7-10(5)	3(1)
		0.65-1.5	პარკოსნები	ანთრაქნოზი, ჭრაქი,	„	7-10(5)	3(1)

			(ლობიო, მწვანე ლობიო, ბარდა)	ბაქტერიული დაავადებები			
		0.65-1.5	ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები	ჭრაქი, ჟანგა, სილაქეები, ბაქტერიული დაავადებები	„	7-10(2)	3(1)
		2.3-3.6	წიწვოვნები	სოკოვანი დაავადებები	„	7-10(3)	3(1)
		1.7-2.1	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, ბაქტერიული დაავადებები	„	7-10(4)	3(1)
		1.4-1.8	თამბაქო	სოკოვანი დაავადებები	„	7-10(2)	3(1)
147	კუპრექს, სფ 439.5 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი 350 + მეტალაქსილი 150 გ/კგ) (თ) „მაკვილნი ტრეიდიგ ლპ“ ირლანდია 1441	1-1,5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	28(4)	7(3)
		2,5	თხილი	ფიტოფტოროზი ვარჯის კიბო ფესვის ხმოზა	„	28(4)	7(3)
		2	კიტრი ნესვი	პერონოსპოროზი	„	5(3) 10(3)	7(3)
		2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	“	5(3)	7(3)
		2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი			15(3)	7(3)
148	კუპროფლო, სკ 661,38 გ/ლ (სპილენძის ქლორჟანგი, სპილენძის მიხედვით 377,5 გ/ლ) (4)	3.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(5)	3(1)
	“იზაგრო ს.პ.ა.” იტალია 478/08/13/18	2.5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(4)	3(1)
		1.75-2.1	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, მაკროსპოროზი, მურა ლაქიანობა	“	20(4)	3(1)
		1.75-2.1	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		3,5	ვაშლი ატამი	ქევი ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	3(1)

		5.5-7			7-10 დღიანი ინტერვალით შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე.	-(1)	
149	კუპროფიქსი 30 დისპერს, წდგრ 761, 6 გ/კგ (ბორდოს ნარევი 461, 6 გ/კგ (სპილენძის მიხედვით 120 გ/კგ)+ მანკოცები 300 გ/კგ)	3, 0	ვაზი	ჭრაქი ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (3)	7(3)
	(თ) „უპლ ზირაატ ვე ქიმი სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“	3, 5-4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“	30	3(1)
	თურქეთი 842/17	3, 0	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	“	20	7(3)
		4, 0-5	ციტრუსი	ალტერნარიოზი	“	30	7(3)
		3, 5-4	ბროწეული	ალტერნარიოზი	“	30	7(3)
150	კუპროქსატი, სკ 345 გ/ლ (სამფუძიანი სპილენძის სულფატი, სპილენძის მიხედვით 190 გ/ლ) (თ), (1)	4-5	ვაშლი	ქეცი ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა- 800-1000 ლ/ჰა შესხურება ყვავილობამდე ხარჯვა- 300-1500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
	“ნუფარმი გმზხ და კო. კ.გ.” ავსტრია 1115/19	4-5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა- 800-1200 ლ/ჰა	20(4)	3(1)
		4-5 6-8	გარგარი, ატამი ბალი ალუბალი ქლიავი ატამი	მონილიოზი, ტოტების ბაქტერიული ნეკროზი ტოტების სოკოვანი ნეკროზი ფოთლის ლაქიანობა ფოთლის სიხუჭუჭე, ფოთლის მურა ლაქიანობა-გნომონიოზი ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა- 800-1000 ლ/ჰა ფოთლის ჩამოცვენის შემდეგ	20(2)	3(1)
		4-5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-300- ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-5	კიტრი, წიწკა, პამიდორი	ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 300-400 ლ/ჰა	20(2)	3(1)
		4-5	მწვანე ლობიო მწვანე ბარდა, გოგროვნები ხახვი	ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 400-1000 ლ/ჰა		
		4-5	შაქრის ჭარხალი	სოკოვანი დაავადებები (გარდა ჭრაქის)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)

151	კურზატი რ, სფ 689,5 + 42 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი + ციმოქსანილი)	2-3	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
	(4) “დუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ..”	2.5-3	კიტრი	პერონოსპო-როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(3)	7(3)
	შვეიცარია 097/04/09/14/19	2-2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	“	5(3)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი	“	“	5(3)	7(3)
152	კურზები 50, სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი ი) (თ) 4)	3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 580/13/18	3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		3	კიტრი	პერონოსპო-როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
153	კუსტოდია, სკ 200+120 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი + აზოქსისტრობინი) (თ), (3)	1.0-1,2	კაკალი	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	7(3)
	„ადამა აგრიკალჩერ ზგ“ ნიდერლანდები 1327	1.0-1,2	პამიდორი სტაფილო ხაზვი	ალტერნარიოზი ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფომოზი თეთრი სიდამპლე, პერონოსპოროზი, ჟანგა	“	20(2)	7(3)
154	ლაიფსული, წდგრ (გოგირდი 800 გ/კგ) „აგრო ლაიფ საენს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1474	3-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	1 (4-6)	4(1)
		3-8	თხილი, ვაშლი, ატამი	ნაცარი	„	1 (1-6)	4(1)
		2-3	კიტრი	ნაცარი	„	1 (2-5)	4(1)
		2-3	ვარდი	ნაცარი	„	1 (2-4)	4(1)
155	ლანგრიფი 75 წდგრ 750 გ/კგ (მანკოცები) (თ) 4)	2,0-2,5	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
	“ ინდოვილ ინდასტრის ლიმიტედ” ინდოეთი 1107/19	2,0-3,0	ატამი	ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე	„	30(4)	7(3)
		2-2.5	ვაზი	ჭრაქი შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10- დღიანი	30 (4)	7 (3)

				ფომოფსისი	ინტერვალით		
		2,0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10- დღიანი ინტერვალით	20 (4)	7 (3)
		2,0	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10- დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)
		2-2,5	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10- დღიანი ინტერვალით	15 (3)	7(3)
		2,5	საზამთრო	ანთრაქნოზი		30(4)	7(3)
		2,0	ხახვი	პერონოსპოროზი ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით	15 (3)	7(3)
156	ლაცერტა მაქს, სკ 200 გ/ლ+125 გ/ლ (აზოქსისტრობინი+დიფენოკონაზოლი) (თ), (3) „ასტრანოვა ტარ. ტიკ. ვე სან. ა.ს.« თურქეთი 1413	0.4	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი,	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16-დღიანი ინტერვალით. საშუალო ხსნარის ხარჯვა- 600 ლ/ჰა.	5(2-3)	7(3)
		0.4	პამიდორი, (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16-დღიანი ინტერვალით. საშუალო ხსნარის ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა.	3(2)	5(3)
157	ლაცერტა 250 სკ 250 გ/ლ (აზოქსისტრობინი) (თ) „ასტრანოვა ტარ. ტიკ. ვე სან. ა.ს.« თურქეთი 1427	0.4-0.6	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 10-12-დღიანი ინტერვალით. საშუალო ხსნარის ხარჯვა- 600 ლ/ჰა.	5(2)	7(3)
		0.4-0,6	კიტრი, ყაბახი წიწკა	ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი- სიმპტომების გამოჩენისთანავე და	5(2)	5(3)

					გრძელდება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით 10-12-დღიანი ინტერვალით. სამუშაო ხსნარის ხარჯვა 600- ლ/ჰა.		
		0.6-0,75	საზამთრო	ალტერნარიოზი	„	5(2)	5(3)
		0.6-0,75	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპსისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე, ყლორტი 25-30 სმ და ყვავილობის შემდეგ ჭრაქის წინააღმდეგ, ისვრიმობის პერიოდში და სიმწიფის დაწყებისას ნაცრის წინააღმდეგ, 10-15 დღიანი ინტერვალთ. შავი სილაქავის წინააღმდეგ, ყლორტი 2-3 სმ, 8-10 და 25-30 სმ. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	25(3-4)	7(3)
158	ლიდერი, სვ 90+ 600 გ/კგ (დიმეთომორფი+ მანკოცები) (4)	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
	„ნინგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ“ ჩინეთი 694/15	2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	40(3)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	40(3)	7(3)
		2-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპო-როზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპო-როზი	“	15(2)	7(3)
159	ლიმაი, სკ (ამისულბრომი 200 გ/ლ)	0,5 1,5 (მაქს. სეზონზე)	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის წინ და 8-10 დღიანი ინტერვალთ	7(2-3)	7(3)
	„ნისან ქემიკალ კორპორეიშენ“ იაპონია 1388	0.6 2.4 (მაქს.	კიტრი	პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 2-3 ფოთლის	7(2-4)	7(3)

		სეზონზე)			ჩამოყალიბებისას და 8-10 დღიანი ინტერვალით		
		0,5 3 (მაქს. სეზონზე)	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მთავარ ყლორტზე 9 ფოთლის ჩამოყალიბებიდან 7-10 დღიანი ინტერვალით	7(4-6)	7(3)
		0,4 1,125 (მაქს. სეზონზე)	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 2-3 ფოთლის ფაზიდან 10 დღიანი ინტერვალით	28(2-3)	7(3)
160	ლირა 680 სვ 40+640 გ/კგ (მეტალაქსილი მ+ მანკოცები)	2,5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-10 დღიანი ინტერვალით	10(4)	7(3)
	„ფადერ ალიანს ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1360	2,5	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	პერენოსპოროზი	“	10(3)	7(3)
		2,5	ხახვი (მწვანე ხახვის გარდა)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		2,5	ვაზი	ჭრაქი, შავი ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	“	25(3)	7(3)
		2,5	თამბაქო	პერენოსპოროზი	„	14 (3)	7(3)
		2,5	რაფსი (საშემოდგომ ო და საგაზაფხულ ო)	პერენოსპოროზი, ნაცრი სფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი	„	14 (3)	7(3)
161	ლუნა სენსეიშენ კს 500 250+ 250 გ/ლ (ფლოპირამი+ ტრიფლოქსისტრობინი) (თ) “ზაიერ აგ” გერმანია 865/16	0, 25-0, 3	ვაშლი	ნაცარი, ქეცი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილქტიკური და 7-14-დღიანი ინტერვალთ, არ ჩაატაროთ ზედიზედ 2 შესხურებაზე მეტი, ჩაატარეთ მორიგეობითი წამლობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებით	20(2-4)	7(3)
		0, 25-0, 3	ატამი, ბალი, ალუბალი	მონილიოზური სიდამწვრე, ფოთლის სიხუჭუჭე, ნაყოფის მინილიოზური სიდამპლე, ნაცარი, ქეცი, კოკომიკოზი	„ „	20(2)	7(3)
		0, 4-0, 55	კაკალი	ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი ქეცი	„	60(2)	7(3)
		0, 2-0, 55	ვაზი	ნაცარი, ჭრაქი ნაცრისფერი სიდამპლე ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 12- 14-დღიანი ინტერვალთ. არ ჩაატაროთ ზედიზედ 2 შესხურებაზე მეტი,	20 (2-6)	7(3)

					ჩაატარეთ მორიგეობითი წამლობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებით		
		0, 25-0, 55	საზამთრო	ალტერნარიოზი ანთრაქნოზი ასკოქიტოზი ნაცარი, რიზოქტონიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 14-დღიანი ინტერვალით.არ ჩაატაროთ ზედიზედ 2 შესხურებაზე მეტი, ჩაატარეთ მორიგეობითი წამლობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებით	5(2-4)	7(3)
162	მ-2, სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2- 2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
	(4) “პლატინ ქიმიკ მუმესსილიკ ვე დის ტიკ. ა.ს.”	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(4)	7(3)
	თურქეთი 695/17	2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	10(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	15(3)	7(3)
163	მანგო, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ), (4) “პლატინ ქიმიკ მუმესსილიკ ვე დის ტიკ. ა.ს.”	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალთ	20(5)	7(3)
	თურქეთი 696/17	2.0-3., 0	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალთ	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქეცი	“	40 (2)	7(3)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7 (3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		1.0-1.2	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ჭრაქი რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
164	მალაქიტი, კს 500 გ/ლ (დითიანონი 250 + პირიმეთანილი 250) (თ), (3) “ზასფი აგრო ზე” შვეიცარია 1470	1,25-1,5	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველივე სიმპტომების გამოჩენისას 10-14 დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა 500-1000 ლ/ჰა	20 (3)	7(3)
165	მაღზები, სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2- 2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
		2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის	21(4)	7(3)

	“ქროუნზბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ”				პერიოდში		
	კანადა 974/18	2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	10(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	15(3)	7(3)
166	მანგრიფი 75 წდგრ 750 გ/კგ (მანკოცები) (4)	2.5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	56(4)	7(3)
	„უპლ ზირაატ ვე ქიშია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 559/11/16	1, 6-3	ატამი, გარგარი, ბალი, ალუბალი, ქლიავი	მონილიოზი, ნაცრისფერი სიდამჰლე	“	20(4)	7(3)
		2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	42(4)	7(3)
		1, 6-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	15(4)	7(3)
		0, 24 1, 6	დეკორატიულ ი მცენარეები	მარსონიოზი, ალტერნარიოზი ჟანგა	“	-(4) -(4)	7(3) 7(3)
		1, 6	პარკოსნები	ჟანგა	“	20(2-4)	7(3)
		2	თამბაქო	პერონოსპოროზი	“	28(4)	7(3)
		1, 6	ბალჩეული კულტურები	პერონოსპოროზი	“	10(1-4)	7(3)
		1, 6	პურეული მარცვლოვნები	ჟანგა, სეპტორიოზი	“	28(2)	7(3)
		2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი და ალტერნარიოზი	“	14(3-4)	7(3)
		2	პამიდორი	მაკროსპორიოზი	“	14 (4)	7(3)
		2	კიტრი	პერონოსპოროზი	“	14 (4)	7(3)
167	მანკოლაქსილი, სფ 640+80 გ/კგ (მანკოცები + მეტალაქსილი) (3)	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ყვავილობის შემდეგ 10-12-დღიანი ინტერვალებით	30(3-4)	7(3)
	„უპლ ზირაატ ვე ქიშია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 843/17	2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი	შესხურება ბუტონების გამოჩენიდან 10-12- დღიანი ინტერვალებით	20(3)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი) პამიდორი(ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(3) 14(4)	7(3)
168	მანკოსილი 80, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) “აგრიკო გრუპ ლტდ.” ბულგარეთი 598/13/18	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალთ	20(5)	7(3)
		2.0-3.0	ვაზი	ჭრაქი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი	30(6)	7(3)

					პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალით		
		2.5-3	ხეხილი	ქეცი	“	40 (2)	7(3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი, (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7 (3)
169	მანკოში 80, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) “შარდა კროპექმ ლიმიტედ.”	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით	20(5)	7(3)
	ინდოეთი 625/13/19	2.0-3.0	ვაზი	ჭრაქი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“	40 (2)	7(3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი, (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7 (3)
170	მანკოშ დუო, წდგრ 40+640 გ/კგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2- 2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
	“შარდა კროპექმ ლიმიტედ.” ინდოეთი 626/13/19	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(4)	7(3)
		2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	10(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	15(3)	7(3)
171	მასს კაპტანი, სფ 500 გ/კგ (კაპტანი) (4)	3-5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5%-იანი სუსპენზიით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)
	“ერთარ ქიმია ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	3-4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე, ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4%-იანი სუსპენზიით	30(4)	7(3)
	თურქეთი 1103/19	3-4	ატამი, გარგარი ქლიავი	ნაცრისფერი სიდამპლე მონილიოზი ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე	“	30(3)	7(3)
		2.5-3	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტში)	ანთრაქნოზი ფიტოფტოროზი, პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)

		2.5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“	20(2)	7(3)
		3	ბახჩეული კულტურები	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი	“	20(2)	7(3)
172	მაქსიმუმი, სფ 90+ 600 გ/კგ (დიმეთომორფი+ მანკოცები)	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	2.5	ვაზი	ქრავი	“	40(3)	7(3)
	თურქეთი 988/18	2-2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	40(3)	7(3)
		2-2.5	კიტრი	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	15(2)	7(3)
173	მელოდი დუო 66,8 სფ 55 + 613 გ/კგ (იპროვალიკარბი + პროპინები)	2-3	ვაზი	ქრავი	შესხურება ყვავილობის შემდეგ 10-12 დღიანი ინტერვალებით	30(3-4)	7(3)
	(თ), (1) “ზაიერ აგ ” გერმანია 449/08/12/17	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი	შესხურება ბუტო-ნების გამოჩენიდან 10-12 დღიანი ინტერვალებით	30(3)	7(3)
		2.0-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპო-როზი	შესხურება დაავადების ინტენსიური გავრცელების დროს 10-12 დღიანი ინტერვალებით	20(3)	7(3)
		2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი	შესხურება დაავადების კრიტიკულ მომენტებში 10-12 დღიანი ინტერვა- ლებით	20(3)	7(3)
174	მელოდი კომპაქტი წდგრ 49 490 გ/კგ 406+84 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი + იპროვალიკარბი)	1, 5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი ბაქტერიოზები, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-15 დღის ინტერვალით. ხარჯვა 400- 600 ლ/ჰა	7(3)	7(3)
	(თ), (1) “ზაიერ აგ ” გერმანია 1213/17	1, 5	ხახვი	პერონოსპოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-12 დღის ინტერვალით. ხარჯვა 400- 500 ლ/ჰა	7(3)	7(3)
		1, 5	ვაზი	ქრავი წითურა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღის ინტერვალით. ხარჯვა 800- 1000 ლ/ჰა	30(3)	7(3)
175	მენეჯი 15 სფ 150 გ/კგ (იმიბენკონაზოლი) „ჰოკკო ქემიკალ ინდასტრი კო.,ლტდ“ იაპონია 1288	0,35	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ჟანგა, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დავადების პირველი ნიშნების გამოვლენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	25(3)	7(3)
		0,35	ვაზი	ანთრაქნოზი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის	25(3-4)	7(3)

					პერიოდში დაავადების პირველი ნიშნების გამოვლენისას და 10-14 დღიანი ინტერვალით		
		0,35	ატამი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველი ნიშნების გამოვლენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით	21(3)	7(3)
		0,35	გარგარი	ყავისფერი სიდამპლე	ხარჯვა-800 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
					„		
176	მენტა ინოქსი, ეკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი)	0.15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2)	7(3)
	(თ), (2) „მენტა ტარიმ ილაკლარი სან ვე ტიკ ლტდ სტი.“ თურქეთი 1169	0.25	კიტრი, ჰამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა, კორნიშონი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	“	3(3)	7(3)
		0.25	ვაზი	ნაცარი	„	20(3)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	3(3-4)	3(-)
		0,25	ქოთნის ყვავილები				
177	მენტა პრელუდ, სკ 300 გ/ლ (პირიმეთანილი) „მენტა ტარიმ ილაკლარი სან ვე ტიკ ლტდ სტი.“ თურქეთი 1405	1.2	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	28 (3)	7(3)
		0.75	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება კვირტების დაბერვიდან ყვავილობის დამთავრებამდე 7-12 დღიანი ინტერვალით. ყვავილობის პერიოდში გამოყენება არ არის დაშვებული. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	25 (3-5)	7(3)
		0,5	ჰამიდორი	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	14 (3)	7(3)
178	მენტაკოლი 70 სგ 700 გ/კგ	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი	30(3)	7(3)

	(პროპინები)				ინტერვალთ		
	„მენტა ტარიმ ილაკლარი სან ვე ტიკ ლტდ სტი.“ თურქეთი 1170	3-3,75	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	„	25(4)	7(3)
		1.2-1.25	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალთ	20(3)	7(3)
		0.8-1.5	პამიდორი ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, კლადოსპორიოზი	„	20(3)	7(3)
		1-1,25	ხახვი კომბოსტო სალათა	ჭრაქი	„	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	„	20(3)	7(3)
		1-1.25	ლობიო ბარდა	ანთრაქნოზი ჟანგა	„	20(3)	7(3)
		1-1,25	კარნიშონი	ჟანგა	„	7(3)	7(3)
		5-6.5	ციტრუსი	ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალთ	40(4)	7(3)
		1-1,5	მიხაკი ვარდი	ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(2)	7(3)
179	მენტაკოლ კომბი, სვ 700+60 გ/კგ (პროპინები+ციმოქსანილი ო)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფისი	„	30(3)	7(3)
	„მენტა ტარიმ ილაკლარი სან ვე ტიკ ლტდ სტი.“ თურქეთი 1171	1.5-2	კიტრი, გოგრა (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	„	20(3)	7(3)
		1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	„	20(3-4)	7(3)
180	მერპანი 80 წზგრ 800 გ/კგ (კაპტანი) (4) „ადამა აგრიქალა ზ.ვ.“	3-5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5%-იანი სუსპენზიით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)
	ნიდერლანდები 740/15/19	2.4-4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4%-იანი სუსპენზიით	30(4)	7(3)
		2.5-4	ატამი, გარგარი	ნაცრისფერი სიდამპლე	„	30(3)	7(3)
		2.5-3	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტში)	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		2.5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	„	20(2)	7(3)
		3-3.5	ბახჩეული კულტურები	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი	„	20(2)	7(3)

181	მეტონი, წდგრ (გოგირდი 800 გ/კგ) (3) „მაკკინლი ტრეიდიზგ ლპ“ ირლანდია 1483	2.0-4.0	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(3)	4(1)
		2.0-4.0	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	ნაცარი	„	14(5)	4(1)
		2.0-3.0	გოგროვმები	ნაცარი	„	1(2-3)	4(1)
		1.5-2.0	პარკოსნები (ლობიო, ბარდა)	ანთრაქნოზი, ჟანგა	„	1(2-5)	4(1)
		1.5-3.0	ბოსტნეული	პერენოსპოროზი	„	1(3-5)	4(1)
		2.0-3.0	კიტრი, პომიდორი	ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, სილაქავეები	„	1(2)	4(1)
182	მეტალაქსანი , სფ 640+80 გ/კგ (მანკოცები + მეტალაქსილი) (3)	2.5	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ყვავილობის შემდეგ 10-12 დღიანი ინტერვალებით	30(3-4)	7(3)
	„აგრიკო გრუპ ოოდ“ ბულგარეთი 427/08/12/17	2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპოროზი	შესხურება ბუტო-ნების გამოჩენიდან 10-12 დღიანი ინტერვალებით	30(3)	7(3)
		2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპოროზი		20(3-4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპო-როზი		20(3)	7(3)
183	მეტკუპერი, სფ 500 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი 420 გ/კგ + მეტალაქსილი 80 გ/კგ) „ნაჩინგ ბესტგრინ ქემიკალ კო.ლტდ“ ჩინეთი 910/18	2.5-3,0	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)

		4,0	ვაშლი	ქეცი	„	30(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	“	14(3)	7(3)
		2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი	„	14(3)	7(3)
		2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“	20(3)	7(3)
184	მიკალ ფლეში წზგრ 75 500+250 გ/კგ (ალუმინის ფოსფორი + ფოლპეტი)	4	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	42(5)	7(3)
	“ბაიერ აგ.” გერმანია 938/17	3	„	ფომოფისი	„	42(5)	7(3)
185	მიკლოფილი, კვ 125 გ/ლ (მიკლობუტანილი)	0,2-0,6	ვაზი	ნაცარი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	7(3)
	“ინდოფილ ინდასტრიზ ლიმიტედ” ინდოეთი 1262	0,32-0,6	ატამი, გარგარი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	7(3)
		0,2-0,6	გოგროვნები	ნაცარი	„	10 (3)	7(3)
		0,2-0,6	პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი	ნაცარი	„	10 (3)	7(3)
		0,2-0,6	საზამთრო ნესვი	ნაცარი	„	10 (3)	7(3)
		0,2-0,6	დეკორატიული მცენარეები ყვავილები	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	-(2-3)	7(3)
186	მილდიკატი , კს 250 + 25 გ/ლ (ნატრიუმის ფოსფიტი+ ციაზოფამიდი) „ისკ ბიოსაენსის იუროპ ნვ“ ბელგია 1386	1,5-4	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით: ყვავილობამდე, ყვავილობის ბოლოს, მარცვლების აქტიური ზრდის-ნაყოფის სიმწიფის დასაწყისში ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	30(3-4)	7 (3)
		2-4	პირშუშა ჩვეულებრივი	თეთრი ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	15(3)	7(3)
187	მირავის დუო 200 სკ (დიფენოკონაზოლი 125 გ/ლ+პიდიფლუმეტოფენი 75 გ/ლ) (თ), (3) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1467	0.7-1,0	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	სეპტორიოზი ალტერნარიოზი კლადოსპორიოზი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში :პირველი - დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას, შემდგომი- 7-10 დღიანი ინტერვალით. ფიტოსპოროზის წინააღმდეგ ტარდება აუცილებელი დამუშავებების	3(3)	7(3)
		0.7-1.0	ატამი	მონილია, კლადოსპორიოზი, ფოთლების სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი - კვირტების გაშლისას, მეორე-ყვავილობის დროს,	10(3)	7(3)

					-დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას, მესამე-ნაყოფების აქტიური ზრდის პერიოდში		
		0.7-1.0	ალუბალი, ბალი	მონილია, კოკომიკიზი, კლასტეროსპორიოზი თეთრი სიდამპლე ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : მონილიოზის წინააღმდეგ პირველი - კვირტების გაშლისას, მეორე-ყვავილობის დროს, კოკომიკიზის და კლასტეროსპორიოზის წინააღმდეგ-დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას, მეორე- 7-10 დღის შემდეგ, მესამე-ნაყოფების აქტიური ზრდის პერიოდში	10(3)	7(3)
		0,5-0,7	ვაშლი	ნაცარი, ქეცი, ალტერნარიოზი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი - ყვავილობის დროს, მეორე- 7-10 დღის შემდეგ, მესამე-ნაყოფების აქტიური ზრდის პერიოდში	28-60 (3)	7(3)
		0,7-1,0	საზამთრო	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(3)	7(3)
		0,7-1,0	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	„	5(3)	7(3)
		0.5-0,7	ვაზი	ნაცარი	„	14(3)	7(3)
188	მირავის პრაიმ, სკ (ფლუდიოქსონილი 250 გ/ლ+პიდიფლუმეტოფენი 150 გ/ლ) (თ), (3) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1468	0,75-1	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-10 დღიანი ინტერვალით	2(2)	7(3)
		0.75-1.0	მარწყვი	სიდამპლე	„	14(2)	7(3)
		0.8-1,2	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	„	14(2)	7(3)
189	მისტიკი 250, ზწე 250 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი)	0.5	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (2-3)	7(3)
	(3) “ნიუფარმი გმზხ და კო კზ” ავსტრია 1040/18	0,4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (3)	7(3)
		0.4	საგაზაფხულო და	მურა, ყვითელი, ღეროს ჟანგა, სეფტორიოზი,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04%-იანი	51(1)	7(3)

			საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ფუზარიოზი, ზადისებრი ლაქიანობა	სამუშაო ხსნარით		
190	მოქსიმატი 505 სგ 465+40 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ)	2.5-3	ვაზი	ჰრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	25 (4)	7 (3)
	„ინდოფილ ინდასტრიზ ლიმიტედ“ ინდოეთი 1293	2.5-3	ჰამიდორი ზადრიჯანი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2.5-3	გოგროვნები (ღია გრუნტი) (დახურული გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3) 8(3)	7(3)
		2,5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი		20 (3)	7(3)
		2,5-3	ზახვი	პერონოსპოროზი		14 (3)	7(3)
		2,5-3	საზამთრო	ჰრაქი, წერნაგი		14 (3)	7(3)
191	მუსტანგი, სკ 430 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (3)	0,3-0,4	ვაშლი, მსხალი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	30 (2-3)	7(3)
	„შანდონგ ბინონგ ტექნოლოჯი კო, ლტდ „ ჩინეთი 1280	0,3-0,4	ვაზი	ნაცარი	„	30 (2-3)	7(3)
192	ნანდო 500 სკ 500 გ/ლ (ფლუაზინამი) (თ), (3) ”ნიუფარმი გმზხ და კო კვ”	0,5-0,75	ვაშლი	ქევი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მწვანე კონუსში ან კოკრების გავარდისფერების ფაზაში, და შემდეგ 10-14 დღიანი ინტერვალით	60(2-3)	7(3)
	ავსტრია 887/17	0.5-0,75	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (პროფილაქტიკური და 7-8 დღიანი ინტერვალით)	21 (2)	7(3)
		1-1,5		ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (მეავილობის ბოლოს, მტევნის მეკვრამდე და ისვრილობის ფაზაში)	21(3)	
		0,3-0,4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (პროფილაქტიკური და 7-	7 (4)	7(3)

					10 დღიანი ინტერვალთ		
193	ნატივო 75, წზგრ 250+500 გ/კგ (ტრიფლოქსისტრობინი + ტებუკონაზოლი) (თ) (4)	0.16-0.18	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე, ობი შავი სიდამპლე ფომოპსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალთ	20 (3)	3(1)
	“ბაიერ აგ” გერმანია 581/12/17	0.3-0.35	ვაშლი	ქეცი ნაცარი ფოთლის ლაქიანობები	“	20 (3)	3(1)
		0.25-0.35	პამიდორი	ალტერნარიოზი ფიტოფტოროზი სიდამპლეები ფოთლის ლაქიანობები	“	20 (3)	3(1)
194	ნემასოლი, წზ 510 გ/ლ (მეტამსოდიუმი) “ტამინკო ზეზა” ბელგია 560/10/15	60-120 გ/კვ.მ.	კიტრი, პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი), დეკორატიუ ლი კულტურები	ნიადაგის პათოგენების კომპლექსი	მექანიზებული შეტანა 20 სმ სიღრმეზე და ნიადაგის დაფარვა ცელოფანის აპკით. თესვა ან რგვა 30 დღის შემდეგ	-(1)	30(30)
		80-120 გ/კვ.მ.	მრავალწლია ნი კულტურები ს სანერგეები	“	“	-(1)	30(30)
195	ნეორამი 37.5 წდგრ 375 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი)	2-3	კარტოფილი, პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 400-500 ლ/ჰა	20(4-5)	3(1)
	“იზაგრო ს.პ.ა. “ იტალია 561/10/15	2-2.5	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	“	15 (3)	3(1)
		2.4-2.5	კიტრი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		2.4	ხახვი, ნიორი	პერონოსპო როზი	“	20(3)	3(1)
		4-5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000-1200 ლ/ჰა	20(4)	3(1)
		4-5	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპო რიოზი, მონილიოზი, პოლისტიგმოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 800-1000 /ჰა	20(4)	3(1)
		2-3	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	20(4)	3(1)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2-3	(ლავენდა,	სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3-0,4% სამუშაო ხსნარით	20(3)	3(1)
		1.8-3	ძაღლყურძენა	ფიტოფტოროზი	“	20(2)	3(1)
		2	ფუტკარა	სეპტორიოზი	“	35(2)	3(1)

		2,4	მრავალმარდა)	ნაცარი	“	40(2)	3(1)
		0.4-0.8	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგე)	აღმონაცენთა ჩაწოლა, ნერგების ფესვის სიდამპლე, ყლორტების ფუზარიოზი, ბაქტერიოზი	აღმონაცენთა და ნერგების შესხურება 0,4% სამუშაო ხსნარით	-(3)	3(1)
		2.8-4.0	თუთა (ახალგაზრდა პლანტაციები)	“	“	-(4)	3(1)
		1.5-2	დეკორატიულ ი კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	-(2)	3(1)
196	ნიმბუსი 24 ეკ 245 გ/ლ (მიკლობუტანილი)	0, 2-0, 25	ვაშლი	ქეცი	“	20(2-3)	7(3)
	„ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 871/17	0, 1	ვაზი	ნაცარი	„	20(2-3)	7(3)
197	ნორდოქსი 75 წდგრ (სპილენძის (1) ოქსიდი 86% (75% მეტალური სპილენძის მიხედვით) (თ), (3) “ნორდოქს ა.ს.“ ნორვეგია 1095/19	1,2 -2	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როცა ყლორტები მიაღწევენ 10 სმ სიგრძეს, 10 დღის შემდეგ, ყვავილობის წინ და დამტვერვის შემდეგ. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	21 (4)	3(1)
		2,5-3,0 1,4-1,7	კურკოვანები	ბაქტერიული და სოკოვანი ნეკროზები ფოთლის დაფაცხავება ფოთლის სიხუჭუჭე ფოთლის ლაქიანობა ყავისფერი სიდამპლე	შესხურება კვირტის დაბერვისას 0,27-0,3% და ვარდისფერი კონუსის ფაზაში 0,14-0,17%. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	21 (2)	3(1)
		2-2,6 1,2-1,6	თესლოვანები	ბაქტერიული და სოკოვანი ნეკროზები, სოკოვანი დაავადებები (ნაცრის გარდა) ქეცი ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენამდე და ჩამოცვენის შემდეგ და გაზაფხულზე შეფოთლისას. ხარჯვა-800-1500 ლ/ჰა შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	15(3) 20(2)	3(1)
		3,0	კაკალი თხილი	ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებები (ნაცრის გარდა)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3% ხსნარით. ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	21(3)	3(1)
		1,7-2,0	კენკროვანები	ტოტებისა და ფოთლების დაავადებები (ნაცრის გარდა)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,17-0,2% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-400-800 ლ/ჰა	21(3)	3(1)
		1,4-2,0	პამიდორი წიწკა	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ბაქტერიული	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,2% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას	7 (4)	3(1)

				დაავადებები	7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1500 ლ/ჰა		
		1,4-1,7	გოგროვნები	ბაქტერიული დაავადებები პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,17% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1500 ლ/ჰა	7 (4)	3(1)
		1,4-1,7	კომბოსტო (ყველა სახის)	ბაქტერიული დაავადებები ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,17% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		1,4-2,0	ხახვი	ბაქტერიული დაავადებები ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,2% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	21 (3)	3(1)
		1,4-2,0	ნიახური ობრახუში	სეპტორიოზი ფოთლის ლაქიანობა	"	15(2)	3(1)
		1,4-1,7	ისპანახი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,17% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	15(2)	3(1)
		1,4-2,0	სატაცური	სატაცურის ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,2% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-800 ლ/ჰა	15(2)	3(1)
		1,4-2,0	პარკოსნები	ბაქტერიული დაავადებები ანთრაქნოზი ჟანგა, ასკობიტოზი, ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,2% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	7 (3)	3(1)
		0,8-2,0	შაქრის, სუფრის ჰარხალი	ცერკოსპოროზი ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას და 7-10-დღიანი ინტერვალით	21 (3)	3(1)
		0,8-2,0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-12 დღიანი ინტერვალით..ხარჯვა- 400-600 ლ/ჰა	7(5)	3(1)
		1,4-1,7	ვარდვაჭაჭა	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,17% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	15(2)	3(1)
		1,4-2,0	დეკორატიული მცენარეები	ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებები (ნაცრის და ნაცრისფერი სიდამპლის გარდა)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,14-0,2% ხსნარით დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-2000 ლ/ჰა	15(2)	3(1)

198	ონდარი , სვ 500 გ/კგ (კაპტანი) „აიკუვი ს.ა.,“ ესპანეთი 891/17	3-5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქევი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)
		3-4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)
		3-4	ატამი, გარგარი, ალუბალი, ნუში,	ფოთლის სიხუჭუჭე ანთრაქნოზი,	“	30(3)	7(3)
		2.5-3	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტში)	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
199	ორდანი, სვ 689+ 42 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი + ციმოქსანილი)	2,5-3	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
	დსს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 911/18	2.5-3	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(3)	7(3)
		2.5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	5(3)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი	“	“	20(3)	7(3)
		2-2,5	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	20(3)	7(3)
200	ორგეგო, კს 525 გ/ლ (დიმეტომორფი 225+ამეტოკტრადინი 300 გ/ლ) “ზასფი სე” გერმანია 1079/19	0,7-1	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დავადების გამოვლინებისას 7-10 დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-400-1000 ლ/ჰა	20(3)	7(3)
		0,7-1	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	“	20(3)	7(3)
		0,7-1	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	2 0(2)	7(3)
201	ოსიქლორი 50 სვ 500 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი, 500 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	02.5-3.2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი) სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-600 ლ/ჰა	20(4-5)	3(1)
	„მანიკა ს.პ.ა.“ იტალია 768/16	3.2-4	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.5-3.2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა	“	20(4)	3(1)
		2.5-3	კიტრი, ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		2.5-3	კომბოსტო	ბაქტერიოზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	3(1)

		2.5	წიწკა, ბადრიჯანი	ალტერნარიოზი	”	20(3)	3(1)
		2.5	ხახვი, ნიორი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		3-4	მზესუმზირა		“		
		4-5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დამთავრების შემდეგ	20(4)	3(1)
		4.5-8			შესხურება გვიან შემოდგომაზე. ხარჯვა-1500 ლ/ჰა		
		4-6	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპო-რიოზი, კოკომიკოზი, მონილოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	3(1)
		12-15			შესხურება გვიან შემოდგომაზე. ხარჯვა-1500 ლ/ჰა		
		3-6	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(5)	3(1)
		10-12.5	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-2500 ლ/ჰა	35(3)	3(1)
		1.6-2	მარწყვი	სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		2.5	თამბაქო	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		1.5-2	დეკორატიული კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქავები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	-(2)	3(1)
202	პასადობლი 70 წდგრ 700 გ/კგ (ფლუოპიკოლიდი 50+ პროპინები 650 გ/კგ/თ), (4) „ბაიერ აგ“ გერმანია 1114/19	2, 0	ვაზი	ჭრაქი შავი სიდამპლე ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პროფილაქტიკური ფოთლების განვითარების სტადიაში და დაავადების პირველი სიმპტომების გამოჩენისას ყვავილობამდე 10-12-დღიანი ინტერვალით ხარჯვა – 800-1000 ლ/ჰა	50 (2-3)	7(3)
203	პატამილი 72 სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი+ მანკოცები)	2,5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-10 დღიანი ინტერვალთ	10(4)	7(3)
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	2,5	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
	თურქეთი	2,5	ხახვი	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
	986/18	2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპოროზი	“	20(3)	7(3)
		2,5	თამბაქო	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		2,5	ვაზი	ჭრაქი	“	20(4)	7(3)
204	პენკილერი, ვკ 100 გ/ლ	0.15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო	20(2)	7(3)

	(პენკონაზოლი) (თ), (2) “ქროუნზბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ”	0.25-0.4	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	ხსნარით “	3(3)	7(3)
	კანადა 975/18	0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით	21(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	14(3-4)	3(-)
205	პენტოსი 100 გ/ლ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) „ზეჯიანგ ჰებენ პესტიციდ & ქემიკალ კო. ლტდ“ ჩინეთი 1370	0.15 0.25-0.4	კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	20(2) 3(3)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით “	20(4)	7(3)
		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,015-0,025% სამუშაო ხსნარით	21(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	-(-)
		0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0, 0.025-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025-0,05% სამუშაო ხსნარით	14(3-4)	-(2)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)

206	ვენფორსი 100, ვკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი)	0.15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2)	7(3)
	(თ), (2) „აგრიკო გრუპ ოოდ“ ბულგარეთი 639/13/18	0.25-0.4	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	“	3(3)	7(3)
		0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ალუბალი (სადედე)	კოკომიკოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	შავი მოცხარი (სადედეები, სანერგეები)	ნაცარი	“	-(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	3(3-4)	3(-)
		0.15-0.2	სამკურნალო მუნარეები (ფუტკარა)	ნაცარი, ჟანგა	სათესლე ნაკვეთების შესხურება	-(2)	7(3)
207	პერგადო Cu 27 წდგრ 270გ/კგ (მანდიპროპამიდი 25 + სპილენძის ქლორჟანგი 245 გ/კგ) „სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ“ შვეიცარია 884/17	4-5	ვაზი	კრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 10- 14-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 800-1000 ლ/ჰა	14(3-4)	7(3)
208	პერმიტი 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) „მაკინლი ტრეიდიზ ლპ“ ირლანდია 1464	0.25-0.4	კიტრი პამიდორი წიწკა ბადრიჯანი	ნაცარი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 025% სამუშაო ხსნარით “	20(2) 3(3)	7(3) 7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 15-0, 025% სამუშაო ხსნარით	21(3)	7(3)

		0.5-0.9	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	7(3)
		0.4-0.6	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (2)	7(3)
		0.4-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 05-0, 1% სამუშაო ხსნარით	14(2)	7(3)
		0.4	ვარდი	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(3)	3(-)
		0.35	თამბაქო	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(3)	7(3)
209	პესოსი 100 გ/ლ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) „კორუმა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს“ თურქეთი 823/17	0.15 0.25-0.4	კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 025% სამუშაო ხსნარით “	20(2) 3(3)	7(3) 7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 15-0, 025% სამუშაო ხსნარით	21(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0, 05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 25-0, 05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 05-0, 1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 5-1% სამუშაო ხსნარით	14(3-4)	3(-)
210	პითიო პრო, წზგრ 225 + 300 გ/კგ (ფამოქსადონი + ციმოქსანილი) (3)	0.4	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, მეორე დამუშავება დაყვავილების შემდეგ, ა მესამე - 14 დღის ინტერვალით	30(3)	7(3)
	„დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს“	0.4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში:	20(4)	7 (-)
	თურქეთი 1353	0,4	კიტრი, პომიდორი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი, ფიტოფ ტოროზი, ალტერნარიოზი	“	10(4)	7 (-)
		0,4	საზამთრო	ალტერნარიოზი	„	10(4)	7 (-)
211	პინაკლი, გვ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი)	0.15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2)	7(3)
	(თ), (2)	0.25-0.4	კიტრი	ნაცარი	“	3(3)	7(3)

			(დახურული გრუნტი)				
	“პარიჯატ ინდასტრის ჰვტ. ლტდ” ინდოეთი 522/09/15	0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ალუბალი (სადედე)	კოკომიკოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	შავი მოცხარი (სადედეები, სანერგეები)	ნაცარი	“	-(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	3(3-4)	3(-)
		0.15-0.2	სამკურნალო მუენარეები (ფუტკარა)	ნაცარი, ჟანგა	სათესლე ნაკვეთების შესხურება	-(2)	
212	პლანეტა 72 სგ (მეტალაქსილი 80 + მანკოცები 640 კგ) „ზეჯიანგ ჰებენ პესტიციდ & ქემიკალს კო., ლტდ“ ჩინეთი 1351	0,2	ვაშლი მსხალი	ქევი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		2,5	ვაზი	ჭრაქი	„	25(4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	20(3)	7(3)
		2-2,5	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი	„	14(4)	7(3)
		2-2,5	კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	პერენოსპოროზი	“	14 (4)	7(3)
		2-2,5	ხახვი	პერენოსპოროზი	„	20(3)	7(3)
213	პრიუსი 400 სკ 400 გ/ლ (პირიმეთანილი) (4) „ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1133/19	1.2-2.5	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე ჭრაქი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 800-1000 ლ/ჰა	21 (2)	7(3)
		0.75-1.2	ვაშლი, მსხალი	ქევი ნაცარი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო	56 (2-3)	7(3)

				მონილიოზი	შესხურება კვირტების დაბერვიდან ყვავილობის დამთავრებამდე 7-12--დღიანი ინტერვალით. ყვავილობის პერიოდში გამოყენება არ არის დაშვებული. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 1000-1500 ლ/ჰა		
		1.5-2	პამიდორი ლობიო	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12-დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 600-1000 ლ/ჰა	14 (2)	7(3)
		2	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დაწყებამდე 7-12-დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 1000-2000 ლ/ჰა	3 (2-3)	7(3)
214	პლაკოლი 70 სგ 700 გ/კგ (პროპინები) (თ), (1)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	30(3)	7(3)
	“პლატინ ქიმია მუმესსილიკ ვე დის ტიკ. ა.ს.” თურქეთი 860/17	2-3	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“	30(3)	7(3)
		1.5-2	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ფიტოფტორა, ფუზარიოზი	“	20(3)	7(3)
		5-6	ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ოზი	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამდე და მეორე ვეგეტაციის დასაწყისში.	40(4)	10(3)
		1.5-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
215	პოვერ სულფური H 80, წდგრ 800 გ/კგ	3-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4-6)	4(1)
	(გოგირდი) “საფა ტარიმი ა.ს.”	3-8	ვაშლი, მსხალი	“	“	1(1-6)	4(1)
	თურქეთი 523/09/15	2-3	კიტრი, პამიდორი	“		1(1-5)	1(1)
		2-3	ყაბაყი	“	“	1(1-3)	4(1)

		2-3	ვარდი	“	“	1(2-4)	4(1)
216	პოლიმეტ ბორდო, სფ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)	20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით . ხარჯვა-1000- 1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
	(თ), (1) „შიამ ქემიკალს პვტ.ლტდ“ ინდოეთი 1291	20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე . ხარჯვა-800- 1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-400- 500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
		4,5	პამიდორი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	15(4)	3(1)
		6		ფესვის ყელის სიდამპლე			
		4,5	ხახვი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-200- 300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4,5	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-400- 500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4,5	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	15(3)	3(1)
		8-10	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მწვანე კონუსის ფაზიდან. ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	25(4)	3(1)
		7-10	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი	„	25 (2-3)	3(1)
		8-10	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4-5)	3(1)
		8-10	ციტრუსი	მეჭექიანობა, ბაქტერიული ნეკროზი, ანთრაქნოზი, ნაყოფის ლპობა, მელანოზი მალსეკო		30(4)	3(1)
		7	მარწყვი	ფესვის სიდამპლე	შესხურება ყვავილობამდე	15 (1-2)	3(1)
		5	დეკორატიულ ი მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში.ხარჯვა-500 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
217	პოლირამი დფ, წდგრ 700 გ/კგ (მეთირამი) (3) “ბასფი სე” გერმანია 573/08/12/18	1.5-2.5	ვაზი	ჭრაქი, წითურა, შავი სიდამპლე, შავი ლაქიანობა, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი ყვავილედი წარმოქმნისას, მეორე ყვავილობის დროს, მესამე ნაყოფის ფორმირებისას, მეოთხე მარცვლებისბარდის ზომამდე მიღწევისას. ხსნარის ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა	30 (4)	7 (3)

		1.5-2.5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ჟანგა, ფოთლების სიხუჭუჭე, რუხი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი მწვანე კონუსში, მეორე გავარდისფერისას, , მესამე ყვავილობის ბოლოს, მეოთხე ნაყოფის კაკლის ზომამდე მიღწევისას. ხსნარის ხარჯვა 1500 ლ/ჰა	20 (2)	7 (3)
		2-2.5	ციტრუსები	ანთრაქნოზი ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ხსნარის ხარჯვა 2500 ლ/ჰა	30 (4)	7 (3)
		2.5-3	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა, რუხი სიდამპლე, სეპტორიოზი, ასკოხიტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 10-14 დღის ინტერვალით (დაავადების განვითარებიდან გამომდინარე). ხსნარის ხარჯვა 300-600 ლ/ჰა	20 (3)	7(3)
		1.5-2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი, ანთრაქნოზი,ალტერნარიო ზი, ფოთლის მურა ლაქიანობა, ასკოხიტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური (4-5 ფოთლის ფაზაში), შემდეგი 10-14 დღის ინტერვალით ხსნარის ხარჯვა 800 ლ/ჰა	20 (3)	7(3)
		1.5-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური (რიგების შეკვრისას), მეორე ბუტონიზაციის პერიოდში, მესამე ყვავილობის ბოლოს, მეოთხე ნაყოფის ზრდის პერიოდში. ხსნარის ხარჯვა 300-600 ლ/ჰა	20 (4)	7(3)
		1.9- 2.4	ხახვი	პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (3)	7(3)
		2.4-3.2	შაქრის ჭარხალი	პერენოსპოროზი ჟანგა მიკროსპოროზი ცერკოსპოროზი	“		
		3.2	ვარდი ეთერზეთოვან ი	ჟანგა	“	20 (4)	7(3)
		2.4-3.2	თამბაქო	პერენოსპოროზი	“	20 (4)	7(3)
		0.4-0.6	თუთა (სათესი განყოფილება)	აღმონაცენთა ჩაწოლა, თესლნერგების ფესვის სიდამპლე, ყლორტების ფუზარიოზი, ცილინდროსპორიოზი, ბაქტერიოზი	“	- (3)	7(3)
		1.2-2.0	თუთა (სანერგე)	ნერგების ფესვის სიდამპლე, ყლორტების ფუზარიოზი, ცილინდროსპორიოზი, ბაქტერიოზი	“	- (4)	7(3) “
218	პოლტიგლია 20 სგ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	3-6	კარტოფილი, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)

	(ბორდოს ნარევი 20% - სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)	3-6	კიტრი ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი სეპტორიოზი ანთრაქნოზი	“	10(4) 20 (30)	7(3)
	(თ), (1) “მანიკა ს.პ.ა.” იტალია	2-3	ხახვი, ნიორი	პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი	“	15 (3)	7(3)
	750/15	7-10	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	“	15(3)	3(1)
		2.8-5	კენკროვნები	ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი	“	15(3)	7(3)
		8-16	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, ნაყოფის სიდამპლე, სეპტორიოზი, მონილიოზი, ტოტების კიბო, ალტერნარია	“	15(4)	7(3)
		7-10	ვაზი	ჭრაქი, ესკორიოზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, ყვავილობის შემდეგ , მტევნების შეკვრისას	25(3-4)	7(3)
		8-12	კურკოვანი ხეხილი	ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	7(3)
		15-25	ციტრუსი	მეჭეჭიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა	“	25(4)	7(3)
		2.5-4	ყვავილები, დეკორატიულ ი კულტურები	ჟანგა, ლაქიანობები	“	-(2)	3(1)
219	პოსეიდონი 80 სვ 800 გ/კგ (ალუმინის ფოსფატი) (თ),(3) “სანსეტ ქიმიკ ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1148	4	ვაშლი, მსხალი,	ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი ფოთლების მთლიანად გაშლისას და 7-8-დღიანი ინტერვალით ყვავილობამდე ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	30(3)	7(3)
		4-5	ციტრუსები	გუმოზი მურა სიდამპლე ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (აპრილში, ივნისში და სექტემბერში) ყლორტების სწრაფი ზრდის პერიოდში	30(3)	7(3)
		2	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(3)	7(3)
		1,5-2	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი	”	15(2)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების სიმპტომების გამოჩენისას და 10 დღის ინტერვალით	15(2)	7(3)
		1,2-2	ხახვი (მწვანე ხახვის გარდა)	პერონოსპოროზი	”	20(2)	7(3)

		1,2-1,5	საზამთრო, ნესვი	ჰრაქი	„	10(2)	7(3)
220	პრევენტი წხ 722 გ/ლ (პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი) (თ), (4)	2,5	საზამთრო ნესვი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	3(2-3)	7(3)
	„დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს“ თურქეთი 1345	7,5 მლ/მ²	თამბაქო	ფესვის ყელის სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 25-30 დღიანი ინტერვალით	3(2)	7(3)
		2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15 დღიანი ინტერვალით	3(2-3)	7(3)
		500 მლ/100 კგ თესლზე	მზესუმზირა	ჰრაქი	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ	3(1)	-(3)
221	პრევიკურ ენერჯი წხ 840 840 გ/ლ (პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი)	2.5	კიტრი (ღია გრუნტი) საზამთრო ნესვი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა – 500 ლ	14(2)	
	530+ალუმინის ფოსფორი 310) (თ), (4) „ბაიერი აგ“ გერმანია 697/14/19	3 მლ/ მ2	“	ფესვის სიდამპლეები ჰრაქი	ნიადაგის მორწყვა დათესვის ან ჩითილების გადარგვის შემდეგ. ხარჯვა 2- 5 ლ 0, 25% სამუშაო ხსნარი 1 მ2	-(1)	
		2-4 ლ/ მ2	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის “დროს 0.15% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	
		2-4 ლ/ მ2	კიტრი პამიდორი კომბოსტო წიწაკა ბადრიჯანი საზამთრო ნესვი	ფესვის და ღეროს სიდამპლეები	ჩითილების მორწყვა 0, 15% სამუშაო ხსნარით 3-4 კვირის ინტერვალით	3(2)	
222	პრეფექტო 100 ეკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი)	0.125- 0.15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2)	
	(თ), (2)	0.25-0.380	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	“	3(3)	
	„ინტერნაციონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 524/09/13/18	0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით	20(3)	
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	
		0.4-0.8	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	
		0.375-1	ვარდი, მიხაკი,	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის	3(3-4)	

			ქოთნის ყვავილები		პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით		
223	პრივატი 250 გვ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი)	0,15-0,2	ვაშლი მსხალი	ქეცი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2-4)	7(3)
	„ზეჯანგ ჰებენ პესტიციდს ენდ ქემიკალს კო., ლტდ“ ჩინეთი 1352	0,2	კურკოვანი კულტურები	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე	“	20(2)	7(3)
		0,5-0,6	ციტრუსები	სკები (ქეცი) ალტერნარიოზი	„	25(3)	7(3)
224	პროგრესი, წდგრ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ-მეთილი)	1,5-2,4	ვაშლი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება „ვარდისფერი კონუსი“ - კაკლის ზომის ნაყოფები	35(4)	7(3)
	“პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 563/10/15	1,2-2	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი	შესხურება „კოკრების განცალკევებისას, ისვრილობის შუა პერიოდში”	35(4)	7(3)
		0,6-1	პამიდორი (ღია გრუნტში)	ფიტოფტო როზი, ალტერნა რიოზი, ნაცარი	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, ნაყოფების დამსხვილება პირველ სართულზე	10(2)	5(3)
		0,9-2,4	პამიდორი (დახურული გრუნტი)		ყვავილობის დასაწყისი, ნაყოფების დამსხვილება ბოლო სართულზე	5 (3)	2(3)
		0,6-1	კიტრი (ღია გრუნტში)	ფიტოფტო როზი, ალტერნა რიოზი ნაცარი	ყვავილობის დასაწყისი მესამე სართულის ნაყოფების განვითარება	5(2)	2(2)
		0,9-2,4	კიტრი (დახურული გრუნტი)		ყვავილობის დასაწყისი - ნაყოფების განვითარება ბოლო სართულზე	2(3)	2(2)
225	პროპაკური ნ, წზკ 722 გ/ლ (პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი) (თ), (4)	1.5	თამბაქო	ფესვის სიდამ-პლევები (პითიუმის გვარის სოკოებით გამოწვეული)	ნიადაგში შეტანა დათესვის წინ და 30 დღის შემდეგ	-(2)	7(3)
	“საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 746/15	2	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500- 1500 ლ	3(2)	7(3)
		300 მლ/მცე ნარე	“	ფესვის სიდამპლევები ჭრაქი	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ 0.25% სამუშაო ხსნარით	-(1)	-(3)
		300 მლ/მ ცენა რე	“	“	მორწყვა ჩითილების გადარგვის შემდეგ 0,15% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2-4 ლ/ მ ²	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის “დროს 0.25% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2	საზამთრო ნესვი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500- 1500 ლ	3(2)	7(3)
		2-4 ლ/ მ ²	კიტრი, პამიდორი კომბოსტო წიწაკა ბადრიჯანი	ფესვის და ღეროს სიდამპლევები	ჩითილების მორწყვა 0,15% სამუშაო ხსნარით 3-4 კვირის ინტერვალით	3(2)	7(3)

			საზამთრო				
226	პროპკონაზოლი, ეკ 250 გ/ლ (პროპკონაზოლი) (3) „ნანჯინგ ბესტგრინ ქემიკალ კო., ლტდ“ ჩინეთი 912/18	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	ნაცარი, მურა ჟანგა, ღეროს, ყვითელი ჰელმინ-თოსპრორ ოზული ლაქიანობა, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(1-2)	-(3)
		0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ქერი	ბადისებური ლაქიანობა, ნაცარი, ჟანგა, მურა წითელი ლაქიანობა	“	40(1-2)	-(3)
		0.5	შვრია	გვირგვინა ჟანგა, მურა წითელი ლაქიანობა	“	40(1-2)	-(3)
		0.5	ვარდი ეთერზეთოვანი	ნაცარი	”	20(2)	7(3)
		0,4	ვაზი	“	”	30(3)	7(3)
		0,4	ვაშლი	”	”	30(3)	7(3)
		0,4	ატამი	”	”	20(2)	7(3)
		0,4	კიტრი (ღია გრუნტი)	”	”	20(2)	7(3)
227	პროსპერი კაპს 300 (სპიროქსამინი 300 გ/ლ) (3) „ბაიერ აგ“ გერმანია 1227	1-1, 2	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღის ინტერვალით. ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა	35(2)	7(3)
228	პროტექტი. სფ 770 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი) „პარიჯატ ინდასტრის გვტ. ლტდ“ ინდოეთი 833/16	2.5-3	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების ფაზიდან 8- 10-დღიანი ინტერვალით 0.3% სამუშაო ხსნარით	25(7)	3(1)
		4	ვაშლი	ქეცი	პირველი შესხურება გავარდისფერების ფაზაში, შემდგომი 7- 10-დღიანი ინტერვალით	20(7)	3(1)
		4	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი	შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 8- 10-დღიანი ინტერვალით	10(4)	3(1)
		3	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	პირველი წამლობა 2-3 ნამდვილი ფოთლის ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 8- 10-დღიანი ინტერვალით	20(4)	3(1)
		3-4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, დანარჩენი სამი წამლობა 8- 10-დღიანი ინტერვალით	15(4)	3(1)
		7-10	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული სილაქავე, ბაქტერიული ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1-2)	3(1)
229	პროტექტ--ოაშ 50 სფ 500 გ/კგ (სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის	1,5-2,5	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როცა ყლორტები მიაღწევენ 10 სმ სიგრძეს, 10 დღის	20 (4)	3(1)

	ჰიდროქსიდი) (თ), (3)				შემდეგ, ყვავილობის წინ და დამტვერების შემდეგ		
	„აგროსაგრო ლტდ“ ბულგარეთი 652/19	1,1-5,4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ბაქტერიული სიდამწვრე ნაყოფების სიდამპლე	შესხურება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენამდე და ჩამოცვენის შემდეგ და გაზაფხულზე შეფოთლისას	15(3)	3(1)
		1,7-6	ატამი გარგარი ქლიავი ალუბალი	ფოთლის სიხუჭუჭე ბაქტერიული სილაქავე ბაქტერიული ნეკროზი კლასტეროსპორიოზი	შესხურება შემოდგომაზე და ზამთრის დამთავრებისას	15 (2)	3(1)
		1-3.6	ციტრუსები	მალსეკო Fფიტოფტოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიული ნეკროზი სეპტორიოზი	შესხურება შემოდგომაზე	21 (3)	3(1)
		1,3-4,95	კაკლოვნები	ფოთლების სიხუჭუჭე პოლისტიგმოზი ბაქტერიოზი სეპტორიოზი	შესხურება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენისთავე, ზამთრის დამთავრებისას და ყვავილობის წინ	21 (3)	3(1)
		0,55-1,8	პამიდორი კიტრი წიწკა	ფიტოფტოროზი პერონოსპოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით	7 (4)	3(1)
		0,55-1,8	საზამთრო ნესვი	პერონოსპოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 10-14-დღიანი ინტერვალით	7(4)	3(1)
		0,55-1.8	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როცა მცენარეები მიაღწევენ 15- 20 სმ და 10-14-დღიანი ინტერვალით	21(4)	3(1)
		1,1	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას და 7-10-დღიანი ინტერვალით	21 (3)	3(1)
		0,7-1,3	მარწყვი	ფოთლების თეთრი სილაქავე	„	21 (4)	3(1)
230	პროტონი, წდგრ (დიმეტომორფი 113 გ/კგ + ფოლპეტი 600 გ/კგ) „მაკკინლი ტრეიდინგ ლპ „ ირლანდია 1490	1.5-1.7	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, ალტერნარიოზი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(5)	7(3)
		1.5-1.7	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	28(3)	7(3)
			კიტრი, პომიდორი	პერენოსპოროზი.	„		

		1.5-1.7	(ღია და დახურული გრუნტი)	ალტერნატიული, ფიტოფტოროზი		28(3)	7(3)
		1.5-1.7	წიწაკა, ხახვი	ალტერნატიული	„	28(3)	7(3)
231	პროფაილერი 71.1 წდგრ 711 გ/კგ (ფლოუპიკოლიდი 44.4+ალუმინის ფოსფორი 666.7) „ბაიერ აგ“ გერმანია 653/14/18	2.5	ვაზი	Nნაცრისფერი სიდამპლე ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-14-დღიანი ინტერვალით	28 (3)	7(3)
232	რაიოკი, კვ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) დსს ფორმა „ავგუსტი“ რუსეთი 913/18	0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზა- ში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14 დღიანი ინტერვა- ლით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0,2-0,4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (4)	7(3)
		0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	„	20(2)	7(3)
		0.5-0.6	ციტრუსები	სკები (ქეცი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გავრცელების კერებში	30(2)	7(3)
		0,4	კარტოფილი	ალტერნატიული, ფიტოფტოროზი,	“	20(2)	7(3)
		0,5	პამიდორი	ალტერნატიული, ფიტოფტოროზი	“	20(2)	7(3)
233	რამბლერი 50 სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილ ი) (თ) 4)	2.5-3	ვაზი	ქრაქი შავი სიდამპლე ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15-დღიანი ინტერვალით	24 (3-5)	7 (3)
	„დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1139	2,5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნატიული	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-15-დღიანი ინტერვალით	14 (4)	7 (3)
		2,5-3	პამიდორი გოგრა	ფიტოფტოროზი ალტერნატიული	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2,5-3	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
234	რამინი 30 წზგრ (სპილენძის ოქსიკლორიდი 550 გ/კგ,	2.0-2.2	ვაზი	ქრაქი, შავი ლაქიანობა (ფომოფსისი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით: პირველი -	14(4-6)	7(3)

	სპილენძის მიხედვით 300 გ/კგ) „ქიმია ს.პ.ა“ იტალია 1448				პრევენციული დამუშავება. მაღალი დოზა გამოიყენება დაავადების გაძლიერების ფაზაში ან წვიმიან სეზონში. ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა		
		1,9-2,5 1,6-2,1	ვაშლი მსხალი	ქეცი, ტოტების ხმოზა, დამწვრობა , ფიტოფტოროზი	პირველი დამუშავება შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში, მეორე- ეპიდემიური ორგანოების ზრდის დროს ანუ დამსხვილებული კოკრები, შემდეგი-მწვანე წვეროები, მტევნების წარმოქმნა. წამლობა უნდა შეჩერდეს ყვავილობისას. ხარჯვა 1200 ლ/ჰა.	14(2-3)	7(3)
		0.5-0.9	მსხალი	ბაქტერიული დამწვრობა	შემოდგომა -ადრე გაზაფხულის წამლობა	14(3-4)	7(3)
		2.5	ვაშლი. მსხალი	ფიტოფტოროზი	სუსპენზიის ხარჯვა -10-15 ლ (20-40გ/100ლ), სულ ერთი წამლობა	14(1)	7(3)
		1.6-2.5	მუშ-მულა	ქეცი	შემოდგომა-ზამთრის დამუშავება, წამლობა უნდა შეჩერდეს ყვავილობისას	14(3-4)	7(3)
		1.9- 2.4	ატამი, გარგარი, ალუბალი, ქლიავი	ფოთლის სიხუჭუჭე, სიდამპლე, კლასტერო-პორიოზი, კურკოვების ბაქტერიული დაავადებები	მხოლოდ ზამთრის დამუშავება	14(3-4)	7(3)
		1.6-2.4	ციტრუსები	ყლორტების წვეროს სიდამპლე , ანთრაქნოზი, ბაქტერიული დაავადება	პრეპარატით დამუშავება ხდება ზამთრის ბოლოს	14(2-3)	7(3)
					პრევენციული დამუშავება დაავადებებისათვის	14(2-3)	7(3)

		1.9-2.6	ზეთისხილი	ფოთლის ლაქიანობა სიღამაშლეები	ოპტიმალური პირობების დადგომისას და მასობრივი გავრცელებისას		
		2.4	კივი	ყლორტების წვეროს სიღამაშლე, ბაქტერიული დაავადებები ალტერნარიოზი	პრეპარატით დამუშავება ხდება ზამთრის ბოლოს	14(1-2)	7(3)
		1.9-2.2	კაკალი, ნუში, წაბლი თხილი	ტოტების ხმოზა, ფოთლის მურა ლაქიანობა ბაქტერიული დაავადებები	დამუშავება შემოდგომა - ზამთრის პერიოდში	14(1-2)	7(3)
		1.5-2.0	მოცვი, ჟოლო, მაყვალ მოცხარი, ხურტკმელი, მარწყვი	სეპტორიოზი	დამუშავება შემოდგომა -- ზამთრის პერიოდში და ასევე ვეგეტატიური ორგა- ნოების ზრდის დაწყებისას	14(1-2)	7(3)
		1.6-1.8	პომიდორი	ჭრაქი ბაქტერიული დაავადებები	პრევენციული დამუშავება დაავადების გაჩენამდე , შემდეგ განმეორება საჭიროების შემთხვევაში.	14(3-4)	7(3)
		1.0-1.7	კიტრი, ყაზახი, ნესვი, გოგრა, საზამთრო	ჭრაქი ანტრაქნოზი, კუთხოვანი ლაქიანობა	წამლობა უნდა შეჩერდეს	14(1-2)	7(3)
		0.8-1.7	ნორი, ხახვი, ქლაკვი	ჭრაქი	დამუშავება დაავადებების გაჩენისთვის ხელსაყრელ პირობებში	14(3-5)	7(3)
		0.8-1.7	სალათა ისპანახი, რუკოლა	ჭრაქი, ალტერნარიოზი, ანტრაქნოზი, ბაქტერიული ლპობა	„	14(3-5)	7(3)
		0.8-1.7	კომბოსტო	ჭრაქი,	დამუშავება დაავადების გაჩენისთვის ხელსაყრელ პირობებში, აგრეთვე, დამზმარე მოქმედება შავი	14(3-5)	7(3)

				ალტერნარიოზი	სიდამპლის წინააღმდეგ		
		0.8-1.7	ბარდა, მუხუდო	ანტრაქნოზი, ჭრაქი, ბაქტერიული დაავადება	დამუშავება დაავადების გაჩენისთვის ხელსაყრელ პირობებში, აგრეთვე, დამხმარე მოქმედება ბაქტერიული სიდამპლის წინააღმდეგ	14(3-5)	7(3)
		0.8-1.7	ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა, ნემსის-წვერა	ჭრაქი, ვარდის შავი ლაქიანობა, მი-ხაკის ალტ-რნარიოზი, დაფნის ხმოზა-	„	14(1-2)	7(3)
		1.6-2.1	კარტოფილი	ალტერნარიოზი , ჭრაქი	დამუშავება დაავადებების გაჩენისთვის ხელსაყრელ პირობებში.	14(1-2)	7(3)
		1.6-2.1	თამბაქო	ჭრაქი, ალტერნარიოზი	„	14(1-2)	7(3)
235	რანსულფური 80 , წდგრ 800 გ /კგ (გოგირდი)	4-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	1(3)	4(1)
	„ინდოფილ ინდასტრიზ ლიმიტედ“ ინდოეთი 1294	5-6	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	ნაცარი	“	14-5)	4(1)
		2,5-3	გოგროვნები	ნაცარი	“	1(2-3)	4(1)
		1,8-2	ლობიო, ბარდა	ანთრაქნოზი ჟანგა	„	1(2-5)	4(1)
		1,8-2	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	1(3-5)	4(1)
		2,5	ბადრიჯანი	ნაცარი	„	1(3-5)	4(1)
		3-4	ვარდი	ნაცარი	“	-(4-6)	4(1)
		3-4	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი)	ნაცარი		-(2-4)	4(1)
		2-3	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი		1 (1-3)	4(1)
236	რევეს ტოპი 500 სკ 500 გ/ლ (მანდიპროპამიდი 250 + დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ) (თ) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 1016/18	0,6	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 7- 14 დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-200-600 ლ/ჰა	15(4)	-(3)

		0,6	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 7- 14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-200 -400 ლ/ჰა	15(4)	
237	რეინვოზებ ექსტრა, წზგრ 750 გ/კგ (მანკოცები) (თ) „შანდონგ ვეიფანგ რეინვოლუ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1392	2	კარტოფილი პამიდორი ხახვი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით	20(4)	7 (3)
		2.0-2,5	ვაზი	ჭრაქი	„	30(4)	7(3)
		2-2.5	ვაშლი	ქეცი	“	28 (4)	7(3)
		2-3	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე	“	28 (4)	7(3)
		2	კიტრი	პერონოსპოროზი	„	15 (4)	7 (3)
		2,5	საზამთრო	ანთრაქნოზი	„	15 (4)	7 (3)
238	რელაქსი , სგ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი 80 + მანკოცები 640) „აგრო ლაიფი საიენს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1356	2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(3)	7(3)
		2.5	ვაზი	ჭრაქი	„	25(3)	7(3)
		2.5	კიტრი	პერონოსპოროზი	“	14 (3)	7(3)
		2.5	ხახვი	ჭრაქი	“	14(2)	7(3)
239	რეტენგო, ეკ 200 გ/ლ (პირაკლოსტრობინი) (თ) “ზასფი სე” გერმანია 856/17	1, 1-1, 25	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი, ფეტვი	ნაცარი, რინხოსპოროზი პელმინტოსპოროზი, მურა და ღეროს ჟანგა, ყვითელი ლაქიანობა, თავთავის ლაქიანობები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (2)	7(3)
240	რექს დუო, სკ 497 გ/ლ (თიოფანატ-მეთილი 310+ეპოქსიკონაზოლი 187) (თ) “ზასფი სე” გერმანია 593/13/18	0.4-0.6	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	ნაცარი, მურა და ღეროს ჟანგა, სეპტორიოზი, ყვითელი ლაქიანობა, თავთავის ლაქიანობები, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (1)	7(3)
		0.4-0.6	ქერი	ნაცარი, ჯუჯა და ღეროს ჟანგა, სეპტორიოზი, ბადისებური ლაქიანობა, თავთავის ლაქიანობები, ფუზარიოზი	“	35 (1)	7(3)
		0.4-0.6	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი ნაცარი რამულარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პროფილაქტიკის მიზნით ან დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას, შემდეგი - 14-16 დღიანი ინტერვალით	25 (1-2)	7(3)

		0.4-0.6	ბარდა	ასკობიტოზი, ჟანგა, ნაცარი ფოთლების ლაქიანობა	“	21 (1-2)	7(3)
241	რიდომილ გოლდი მც 68 წდგრ 40+640 გ/კგ (მეფენოქსამი + მანკოცები) (4)	2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
	სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 493/08/12/17	2.5	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(4)	7(3)
		2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ქრაქი	“	10(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	15(3)	7(3)
242	რიდომილ გოლდ პლიუსი 42,5 სვ 425 გ/კგ (მეფენოქსამი 25+ სპილენძის ოქსიქლორიდი 400) (თ)	4-5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 300-500 ლ/ჰა	10(4)	7(3)
	“სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 753/15	4-5	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით.. ხარჯვის ნორმა 800-1000 ლ/ჰა	25(4)	7(3)
		4-5	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 300-500 ლ/ჰა	10(4)	7(3)
		4-5	კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ქრაქი	“	10(3)	7(3)
		4-5	ხახვი	“	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. . ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	15(3)	7(3)
243	რიდონეტი მც-72, სვ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი + მანკოცები) (4)	2.5	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
	“საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 525/09/15	2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	10(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ქრაქი	“	3(3)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	“	“	20(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი	“	20(3)	7(3)
		0.3-0.6	თუთა (სათესი)	აღმონაცენების ჩაწოლა,	აღმონაცენების და	-(3-4)	7(3)

			განყოფილება და სანერგეები)	თესლნერგების ფუზარიოზი, ცილინდროსპოროზი, ბაქტერიოზი	ნერგების შესხურება 0,3- 0,4% სამუშაო ხსნარით		
244	რიდონილი , სფ 100+480 გ/კგ (მეტალაქსილი 100 + მანკოცები 480) „შენზენ ქინგ ქუენსონ ინდასტრი კო., ლტდ“ ჩინეთი 1365	2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(3)	7(3)
		3	ვაზი	ჭრაქი	„	25(3)	7(3)
		3	კიტრი	პერენოსპოროზი	“	10 (3)	7(3)
245	რითმი სკ 300 გ/ლ (პირიმეთანილი) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 977/18	1.2 2-2.5	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე ჭრაქი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	21 (2)	
		0.75 1.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ნაცარი მონილიოზი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება კვირტების დაბერვიდან ყვავილობის დამთავრებამდე 7-12 დღიანი ინტერვალით. ყვავილობის პერიოდში გამოყენება არ არის დაშვებული. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	30 (2-3)	7(3)
		1.25-2	პამიდორი	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 12 დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	14 (2)	7(3)
		1.5-2	ლობიო, ბარდა	ნაცრისფერი სიდამპლე ასკოხიტოზი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ყვავილობის დაწყებამდე და ყვავილობის შემდეგ. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
246	როდოლიტ სუპერი, წზე 250 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (3)	0.4-0.5	ვაშლი, მსხალი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	30 (2-3)	7(3)
	“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 640/13/19	0.5	აატამი, ქლაივი, გარგარი	ნაცარი	“	30(2-3)	7(3)

		0.4-0.5	ალუბალი, ბალი				
		0.4	ვაზი	ნაცარი	“	30 (2-3)	7(3)
		0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	Mმურა, ყვითელი, ღეროს ჟანგა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ფუზარიუმი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	7(3)
		0.4	სამარცვლე პარკოსნები	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	35(2)	7(3)
		0.45	ზეთოვანი კულტურები (მზესუმზირა, რაფსი)	ნაცარი	“	30 (2)	7(3)
		0.45	კომბოსტო სტაფილო ხახვი, ნიორი პამიდორი, ბადრიჯანი, წიწკა კიტრი	ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა	“	21(2)	7(3)
247	როდოლიტი ექსტრა, წდგრ 800 გ/კგ (ტეპუკონაზოლი) (3)	0.4	ვაზი	ნაცარი	“	30 (2)	7(3)
	“შარდა კროპქემ ლიმიტედ” ინდოეთი 699/14	0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია	მურა, ყვითელი , ღეროს ჟანგა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ფუზარიუმი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	7(3)
248	როვრალი აკვაფლო, სკ 500 გ/ლ (იპროდიონი) „ბასფი აგრო ბ.ვ.“ შვეიცარია 849/17	1-1, 5	კურკოვანები (ქლიავი, ატამი, ვაშლატამა, ნუში, გარგარი, ბალი, ალუბალი,)	მონილიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი, დაავადებები შენახვის პირობებში	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ნაყოფის შეფერადების პერიოდში. ხარჯვა – 800-1200 ლიტრი/ჰა	10 (3)	7(3)
		1	თესლოვანები (ვაშლი, მსხალი, კომში)	„	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ნაყოფის ზრდის დამთავრებისას. ხარჯვა – 800-1500 ლიტრი/ჰა	10 (3)	7(3)
		1-1, 5	კენკროვანები (წითელი და შავი მოცხარი, ხურტკმელი, მამვალი, ყოლო)	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალთ. ბოლო დამუშავება ყვავილობის დამთავრების პერიოდში. ხარჯვა – 800-1200	14 (3) 14 (2-3)	7(3)

			მარწყვი		ლიტრი/ჰა		
		1-1.5	ყურმენი	„	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება დამწიფების პერიოდში. ხარჯვა – 800-1200 ლიტრი/ჰა	30 (3)	7(3)
		0, 5-1	ბოლქვიანები (ხახვი, ნიორი, პრასი)	ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი, თეთრი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12-დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ღეროს 50%-იანი დახრის პერიოდში. ხარჯვა – 800-1200 ლიტრი/ჰა	21 (3)	7(3)
		1	სალათა	ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი, თეთრი სიდამპლე რიზოქტონიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 6-8-დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ფოთლების მასის 50% -ით წარმოქმნისას. ხარჯვა – 500-600 ლიტრი/ჰა	21 (3)	7(3)
		1, 5-2	შესეუმზირა	გვირგვინის დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება გვირგვინის წარმოქმნის პერიოდში. ხარჯვა – 400-600 ლიტრი/ჰა	21 (2-3)	7(3)
		1, 5	ლობიო, ბარდა		შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-600 ლიტრი/ჰა	21 (2-3)	7(3)
		1	ჰამიდორი, კიტრი წიწაკა	ნაცრისფერი სიდამპლე ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ნაყოფის ზრდის დამთავრებისას. ხარჯვა – 400-600 ლიტრი/ჰა	14 (2-3)	7(3)
		1, 5	საზამთრო, ნესვი	სკლეროტინიოზი, რიზოქტონიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-600 ლიტრი/ჰა	14 (2-3)	7(3)
		1-1.5 1-1.5 1	ბოსტნეული სტაფილო კომბოსტო ბადრიჯანი ობრაზუმი	ალტერნარიოზი, მურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ცერკოსპოროზი დაავადებები შენახვის პირობებში-თეთრი, შავი, მურა სიდამპლეები, ფუზარიოზი, თესლის ომი, ფომოზი ალტერნარიოზი, რიზოქტონია ნაცრისფერი სიდამპლე ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ფესვის ზრდის დამთავრების პერიოდში. ხარჯვა – 400-600 ლიტრი/ჰა ძირხვეწების დამუშავება შენახვამდე სათესლე ნაკვეთებში ნათესების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მეორე დამუშავება- შენახვის წინ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14-დღიანი ინტერვალით.	21(2) 21(1) -(1) 14 (1) 21 (2)	7(3)

249	როკ ენ როლ, სკ 200 გ/ლ+125 გ/ლ (აზოქსისტრობინი+დიფენოკონაზოლი) (თ), (3) „მაკკინლი ტრედიინგ ლპ“ ირლანდია 1455	0.6-0,75 0,5 0,5-0,75	პამიდორი	ფიტოფტოროზი , სკლეროტინიოზი ალტერნარიოზი ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი სიმპტომების გამოჩენისას და 7—14 დღიანი ინტერვალით. საშუაო ხსნარის ხარჯვა- 400-500 ლ/ჰა.	7(3)	7(3)
		0.6-0.75 0,4-0,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველივე სიმპტომების გამოჩენისას და 7—14 დღიანი ინტერვალით. საშუაო ხსნარის ხარჯვა- 500-600 ლ/ჰა.	7(3)	7(3)
		0.5	სტაფილო	ალტერნარიოზი ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე და გრძელდება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით 7-14-დღიანი ინტერვალით.	7(3)	5(3)
		0.5	თხილი მიწის თხილი	ანთრაქნოზი ლაქიანოზა	„	28(3)	5(3)
		0.5-1	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპსისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე, ყლორტი 25-30 სმ და	25(3)	7(3)

					ყვავილობის შემდეგ ჭრაქის წინააღმდეგ, ისვრილობის პერიოდში და სიმწიფის დაწყებისას ნაცრის წინააღმდეგ, 10-15 დღიანი ინტერვალით. მაღი სილაქავის წინააღმდეგ, ყლორტი 2-3 სმ, 8-10 და 25-30 სმ. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა.		
250	როტუნდისი, სკ 250 გ/ლ (აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.” თურქეთი 1313	0,4-0.6	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ლაქების გამოჩენისთანავე 10-12 დღიანი ინტერვალით. საშუალო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 500-600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	15(2)	5(3)
		0,7-0.8	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპსისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ, ისვრილობის პერიოდში, სიმწიფის დაწყებისას. ხარჯვის ნორმა 800- 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურიზაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	25(2)	7(3)
		0,4-0,6	წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	„	5(2)	3(3)

		0.5-0.6	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი	„	15(2)	5(3)
		0,75	საზამთრო	ალტერნარია	„	15(2)	5(3)
		0,5	ხორბალი	სეპტორიოზი ნაცარი ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ლაქების გამოჩენისთანავე, 21-28 დღიანი ინტერვალით. საშუალო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 500-600 ლ/ჰა	30 (1-2)	7(3)
251	საკოზები მ-45, სვ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 600/13/18	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნრიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% საშუალო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალთ	20(5)	7(3)
		2.0-3,0	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	„შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% საშუალო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალთ	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქეცი	“	40 (2)	7(3)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7 (3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		1.0-1.2	კარტოფილი (სათესლე)	ჭრაქი რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
252	სალიტი 400 სკ (დოღინი 400 გ/ლ) (3) „ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1134/19	2, 25	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	75(1-2)	7(3)
		1, 7	ბალი, ალუბალი	ფოთლის ლაქიანობა	„	14(1-2)	7(3)
		1, 7	ვაშლი მსხალი	ქეცი,	„	60(1-2)	7(3)
253	სამშითი, სკ 300 გ/ლ (კრეზოქსიმ-მეთილი 100+ დიფენოკონაზოლი 200 გ/ლ) მპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა მპს „გეოუკრავიტი“	0,3	ვაშლი , მსხალი	ნაცარი, ქეცი, ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)

	საქართველო 1041/18	0.2	ატამი	ნაცარი, მონილიოზი	„	21(2)	7(3)
		0,3	ვაზი	ნაცარი, ჭრაქი	“	20(4)	7(3)
254	საფაკოლი 70 სფ 700 გ/კგ (პროპინები)	1.2-1.25	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
	“საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 785/16	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფისი	“	30(3)	7(3)
		0.8-1.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		0.8-1.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	25(3-4)	7(3)
		5-6.5	ციტრუსი	ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	40(4)	7(3)
255	საფაკოლ კომბი სფ 76 700+60 გ/კგ (პროპინები+ციმოქსანილი ი)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფისი	“	30(3)	7(3)
	“საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 786/16	1.25	კიტრი, გოგრა (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	20(3-4)	7(3)
256	სერკადისი, კს 300 გ/ლ (ფლუქსაპროქსადი) (თ) “ზასფი სე” გერმანია 1208	0, 1-0, 25	ვაზი	ნაცარი შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (3)	7(3)
		0,2-0,25 ლ/ტ	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი, ფომოზი, ვერცხლისფერი ქეცი, ანთრაქნოზი, მშრალი სიდამპლე	სათესლე კარტოფილის გორგლების დამუშავება დარგვამდე	45(1)	7(3)
		0,8 ლ/ჰა	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი, ფომოზი, ვერცხლისფერი ქეცი, ანთრაქნოზი, მშრალი სიდამპლე	სათესლე კარტოფილის გორგლების დამუშავება დარგვამდე და ნიადაგის შესხურება დარგვისას	45(1)	7(3)
257	სერკადის პლიუსი, კს (ფლუქსაპროქსადი 75 გ/ლ+ დიფენოკონაზოლი 50 გ/ლ) (თ) “ზასფი აგრო ზვ” შვეიცარია 1374	0, 6-1	საზამთრო	ნაცარი ალტერნარიოზი სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3 ფოთლის ფაზიდან 7-14 დღიანი ინტერვალით	10 (3)	7(3)
		0,9-1,2	ვაშლი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)

258	სექშენი, წზგრ 267+67 გ/კგ (ზოსკალიდი+პირაკლოს ტრობინი) (თ) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1336	0,9-1,2 1,2-1,5	ატამი ალუბალი გარგარი	მონილიოზი სკლეროტინოზი თეთრი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დასაწყისში და ყვავილობის შემდეგ 14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-1200-1500 ლ/ჰა	25(2)	7(3)
		0,75-1	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე	“ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების გამოჩენისას 14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500 ლ/ჰა	7(2-3)	7(3)
		0,75-1	პამიდორი ბადრიჯანი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ნაცრისფერი სიდამპლე	ძ	7(2-3)	7(3)
259	სვიტჩი 62,5 წდგრ 625 გ/კგ (ციპროდინილი 375+ ფლუდიოქსონილი 250 გ/კგ) (თ) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 661/09/10/15	0.6-1,2 0.6-1.0	ვაზი ვაშლი მსხალი	ნაცრისფერი სიდამპლე პენიცილიუმი სიდამპლეების კომპლექსი მონილიოზი გლეოსპორიუმი ნაყოფების სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-21 დღიანი ინტერვალთ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალთ	35 (2)	7(3)
		0.6-1.0 0.3-1.2	ატამი, გარგარი ქლიავი, ბალი, ალუბალი	მონილიოზი, ფუზარიოზული სიდამპლე, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალთ	20 (2-3)	7(3)
		0.8-1.2	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის 14- 21 დღიანი ინტერვალთ, პერიოდში: ყვავილობამდე, ყვავილობის შემდეგ და მოსავლის აღების წინ	7 (2-3)	7(3)
		0.6-1	დეკორატიულ ი კულტურები	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა პირველი სიმპტომების აღმოჩენისას და 5-14 დღიანი ინტერვალთ	- (3)	7(3)
		0.8-1.2 0.6-1	კიტრი, პამიდორი, გოგრა, საზამთრო, ნესვი ბადრიჯანი, კომბოსტო	ნაცრისფერი სიდამპლე ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა პირველი სიმპტომების აღმოჩენისას და 7-14 დღიანი ინტერვალთ	7 (2-3) 14 (2-3)	7(3)
		0.8-1	ბზარდა, ლობიო	ნაცრისფერი სიდამპლე ასკოხიტოზი სკლეროტინია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა პირველი სიმპტომების აღმოჩენისას და 10-14 დღიანი ინტერვალთ	14(2)	7(3)
260	სიგნუმი, წდგრ	1	ატამი,	სიდამპლეები,	შესხურება ვეგეტაციის	40(2)	7(3)

	267+67 გ/კგ (ზოსკალიდი+პირაკლოს ტრობინი)		გარგარი, ქლიავი	მონილიოზი, კლასტეროსპოროზი, ნაცრისფერი სიდამპლე	პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა		
	(თ) „ბასფი სე“ გერმანია 770/16	1-1.25	ალუბალი, ბალი	მონილიოზი, კლასტეროსპოროზი, ფოთლების გაყავისფერება, კოკომიკოზი	,	40(2)	7(3)
		1.5-1.8	ჟოლო	ნაცრისფერი სიდამპლე, თეთრი და მურა ლაქიანობები, ნაცარი, პერონოსპოროზი	“	40(2)	7(3)
		1-1.5	პამიდორი	ნაცრისფერი და თეთრი სიდამპლეები, ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	20(2-3)	7(3)
		0.5-1	სტაფილო	თეთრი სიდამპლე, ალტერნარიოზი, ნაცარი, ცერკოსპოროზი	“	30(2)	7(3)
		1-1.5	ხახვი	ალტერნარიოზი, ჟანგა, პერონოსპოროზი, კლადოსპოროზი	“	20(2-3)	7(3)
		1.25-1.5	კომბოსტო	ალტერნარიოზი, პერონოსპოროზი, თეთრი ჟანგა, სიდამპლე	“	20(2-3)	7(3)
		1.5	კიტრი	ნაცარი, პერონოსპოროზი	“	20(2-3)	7(3)
		0,25-0,3	კარტოფილი	ალტერნარიოზი	„	20(2)	7(3)
261	სილიტი 40 % სკ (დოლინი 400 გ/ლ) (თ), (3) „არისტა ლაიფსაენს ბენელუქს სპრლ ბელგია 1241	2, 25	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე ქევი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: მწვანე კონუსის ფაზაში და ვარდისფერი კოკრის ფაზაში. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	75(2)	7(3)
		2, 0	ბალი, ალუბალი ქლიავი	ფოთლის ლაქიანობა	„	20(2)	7(3)
		2-2, 5	ვაშლი მსხალი კომში	ქევი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ვარდისფერი კოკრის ფაზაში და 7-10 დღის ინტერვალთ. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	60(4)	7(3)
262	სიმ კაპტანი 50 სფ 500 გ/კგ (კაპტანი) (4)	3-5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქევი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 5%-იანი სუსპენზიით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)
	“სანსეტ ქიმიკ ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”	3-4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე, ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 4%-იანი სუსპენზიით	30(4)	7(3)
	თურქეთი 1151	3-4	ატამი, გარგარი, ქლიავი	ნაცრისფერი სიდამპლე მონილიოზი ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე	“	30(3)	7(3)
		6	ციტრუსები	ფიტოფტოროზი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი	ანთრაქნოზი	„	20(2)	7(3)

			(დია გრუნტში)	ფიტოფტოროზი, ფოთლების ბაქტერიული სიდამწვრე			
		2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“	20(2)	7(3)
		1, 5-2	ბოსტნეული	ნაცრისფერი სიდამწვრე ფესვის სიდამწვრე	”	20(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	”	20(2)	7(3)
		2	სალათა	ჭრაქი	”	20(2)	7(3)
		1, 5	მიხაკი	ჟანგა	შესხურება დაავადების გამოჩენიდან 10 დღის განმავლობაში	7(1)	7(3)
263	სკალა 400 სკ 400 გ/ლ (პირიმეთანილი) “ზაიერ აგ” გერმანია 654/14/18	1.2 2-2.5	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამწვრე ჭრაქი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 800-1000 ლ/ჰა	21 (2)	7(3)
		0.75 1.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ნაცარი მონილიოზი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება კვირტების დაბერვიდან ყვავილობის დამთავრებამდე 7-12-დღიანი ინტერვალით. ყვავილობის პერიოდში გამოყენება არ არის დაშვებული. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 1000-1500 ლ/ჰა	56 (2-3)	7(3)
		1.5-2	პამიდორი	ნაცრისფერი სიდამწვრე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12-დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 600-1000 ლ/ჰა	14 (2)	7(3)
		1.5-2	ლობიო, ბარდა	ნაცრისფერი სიდამწვრე ასკოხიტოზი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ყვავილობის დაწყებამდე და ყვავილობის შემდეგ. ხარჯვა – 600-1000 ლ/ჰა	14(2)	7(3)
		2	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამწვრე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დაწყებამდე 7-12-დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა – 1000-2000 ლ/ჰა	3 (2-3)	7(3)
264	სკაპი , ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) (4) “აგრიკო გრუპ ლტდ” ბულგარეთი	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზა-ში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14-დღიანი ინტერვა-ლით 0,015-	20(4)	7(3)

	731/14/19				0,02% სამუშაო ხსნარით		
		0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0.5-0.6	ციტრუსები	სკები (ქევი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გავრცელების კერებში	20(2)	7(3)
265	სკორი 250 ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) (4) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 404/04/09/14/19	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზაში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14- დღიანი ინტერვალით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0.5-0.6	ციტრუსები	სკები (ქევი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გავრცელების კერებში	20(2)	7(3)
266	სკორპი, ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი)	0.2-0,5	ვაშლი, მსხალი	ქევი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
	“ ნანჯინგ რონქუიმ კო ლტდ” ჩინეთი 1088/19	0.2	ვაზი	ნაცარი	“	25 (3)	7(3)
		0,5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი	“	7(4)	7(3)
267	სკორპიონი, ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი)	0,15-0.2	ვაშლი	ქევი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0,15-0.2	მსხალი	“	“	14(4)	7(3)
	„საფა ტარიმი ა. ს.“ თურქეთი 562/10/16	0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	“	20(2)	7(3)
		0.2	კურკოვანი კულტურები	კლასტეროსპოროზი, ქევი, კოკომიკოზი	“	21(2)	7(3)
		0,4	კარტოფილი	ფიტოფტო როზი	“	14(4)	7(3)
		0,5	პამიდორი	ფიტოფტო როზი	“	14(4)	7(3)
		0.5-0.6	ციტრუსები	სკები (ქევი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გავრცელების კერებში	20(2)	7(3)
268	სკორტი 250 ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) (თ)	0, 2-0.25	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
	„გლობაჰემი ნვ“ ბელგია 1242	0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	“	20(2)	7(3)
		0.2	კურკოვანი კულტურები	კლასტეროსპო-როზი, ქევი, კოკომიკოზი	“	21(2)	7(3)
		0.5-0.6	ციტრუსები	სკები (ქევი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების	20(2)	7(3)

					გავრცელების კერებში		
269	სოლორამი, წდგრ 700 გ/კგ (მეთირამი) (3) „პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ“ ინდოეთი 834/16	3	ვაზი	ჭრაქი, წითურა, შავი სიდამპლე, შავი ლაქიანობა, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი ყვავილედის წარმოქმნისას, მეორე ყვავილობის დროს, მესამე ნაყოფის ფორმირებისას, მეოთხე მარცვლებისზარდის ზომამდე მიღწევისას. ხსნარის ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა	30 (4-5)	7 (3)
		3-3, 5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ჟანგა, ფოთლების სიხუჭუჭე, რუხი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი მწვანე კონუსში, მეორე გავარდისფერისას, , მესამე ყვავილობის ბოლოს, მეოთხე ნაყოფის კაკლის ზომამდე მიღწევისას. ხსნარის ხარჯვა 1500 ლ/ჰა	25 (4)	7 (3)
		6-7.5	ციტრუსები	ანთრაქნოზი ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ხსნარის ხარჯვა 2500 ლ/ჰა	30 (4)	7 (3)
		2, 5-3	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა, რუხი სიდამპლე, სეპტორიოზი, ასკოხიტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 10-14 დღის ინტერვალით (დაავადების განვითარებიდან გამომდინარე). ხსნარის ხარჯვა 300-600 ლ/ჰა	20 (4)	7(3)
		2-2, 5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერენოსპოროზი, ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი, ფოთლის მურა ლაქიანობა, ასკოხიტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური (4-5 ფოთლის ფაზაში), შემდეგი 10-14 დღის ინტერვალით ხსნარის ხარჯვა 800 ლ/ჰა	20 (3)	7(3)
		2, 5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური (რიგების შეკვრისას), მეორე ბუტონიზაციის პერიოდში, მესამე ყვავილობის ბოლოს, მეოთხე ნაყოფის ზრდის პერიოდში. ხსნარის ხარჯვა 300-600 ლ/ჰა	20 (4)	7(3)
		2- 2.5	ხახვი	პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (3)	7(3)
		2.5-3.2	შაქრის ჭარხალი	პერენოსპოროზი ჟანგა მიკროსპოროზი ცერკოსპოროზი	“		7(3)
		3.2	ვარდი ეთერზეთოვან ი	ჟანგა	“	20 (4)	7(3)
270	სპილენძის შაბიამანი, ხვ 980 გ/კგ (სპილენძის სულფატი)	8-10	მოცხარი, ხურტკმელა	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1% სამუშაო ხსნარით	-(1)	3(1)

	(თ), (1) “თიფლის ქიმია სანაი” საქართველო 745/15	15-20	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ფილოსტიქტოზი, სილაქავები, მონილიოზი, ხმოზა	“	-(1)	3(1)
		10-15	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლას-ტეროსპორიოზი, მონილიოზი	“	-(1)	3(1)
		-	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ძირის და ტოტების სიდამპლეები	გადანაჰრების, ჰრილობების, ფულუროების დეზინფექცია 3-5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	3(1)
271	სპილენძის შაბიამანი, ფ 980 გ/კგ (სპილენძის სულფატი)	8-10	მოცხარი, ხურტკმელა	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქავები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1% სამუშაო ხსნარით	-(1)	3(1)
	(თ), (1) შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“ საქართველო 870/17	15-20	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ფილოსტიქტოზი, სილაქავები, მონილიოზი, ხმოზა	“	-(1)	3(1)
		10-15	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლას-ტეროსპორიოზი, მონილიოზი	“	-(1)	3(1)
		-	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ძირის და ტოტების სიდამპლეები	გადანაჰრების, ჰრილობების, ფულუროების დეზინფექცია 3-5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	3(1)
272	სპილენძის შაბიამანი, ფ 980-990 გ/კგ (სპილენძის სულფატი ჰენტაჰიდრატი)	8-10	მოცხარი, ხურტკმელა	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქავები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1% სამუშაო ხსნარით	-(1)	3(1)
	(თ), (1) შპს „რუსთავის აზოტი“ საქართველო 1152	15-20	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ფილოსტიქტოზი, სილაქავები, მონილიოზი, ხმოზა	“	-(1)	3(1)
		10-15	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლას-ტეროსპორიოზი, მონილიოზი	“	-(1)	3(1)
		-	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ძირის და ტოტების სიდამპლეები	გადანაჰრების, ჰრილობების, ფულუროების დეზინფექცია 3-5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	3(1)
273	სპილენძის შაბიამანი, ხფ 980 გ/კგ (სპილენძის II სულფატი ჰენტაჰიდრატი) (თ), (1) ღსს „ურალელექტრომედი“ რუსეთი 144/05/14/19	8-10	მოცხარი, ხურტკმელა	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქავები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1% სამუშაო ხსნარით	-(1)	3(1)
		15-20	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ფილოს-ტიქტოზი, სილაქავები, მონილიოზი, ხმოზა	“	-(1)	3(1)

		10-15	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლას-ტეროსპო-რიოზი, მონილოზი	“	-(1)	3(1)
		-	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ძირის და ტოტების სიდამპლეები	გადანაჭრების, ჭრილობების, ფულუროების დეზინფექცია 3-5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	3(1)
274	სფინქს ექსტრა, წდგრ 713 გ/კგ (დიმეტომორფი 113+ ფოლპეტი 600)	1.3-2,0	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 2-3 კვირიანი ინტერვალით	28 (4)	7(3)
	(თ), (4) „ადამა აგრიქალაზა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 615/13/18	1.3-2,0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	20 (3)	7(3)
		1.3-2,0	კიტრი პამიდორი	პერონოსპოროზი ნაცარი ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		1.3-2,0	ბადრიჯანი წიწაკა	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		1.3-2,0	ნესვი	ალტერნარიოზი ნაცარი	“	20(3)	7(3)
		1.3-2,0	ხახვი	პერონოსპორო-ზი	“	20(3)	7(3)
		1.3-2,0	მარწყვი	ფიტოფტოროზი ნაცარი	“	20(3)	7(3)
		1.3-2,0	თამბაქო	პერონოსპოროზი ნაცარი	“	20(3)	7(3)
		1.3-2,0	ყვავილეები	ნაცარი	“	14(4)	7(3)
275	სპრინტი, 50 სვ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ) 4) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ”	3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14-დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	ინდოეთი 727/14	3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		3	კიტრი	პერონოსპო-როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (2)	7(3)
276	სპრინტერი 700 წდგრ 700 გ/კგ (დიითიანონი) (თ), (4) „ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1135/19	0.5-0.7	ვაშლი, მსხალი	ქევი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა	შესხურება 0, 05% სამუშაო ხსნარით ვეგეტაციის პერიოდში ასკოსპორების ფრენამდე და 0, 03% სამუშაო ხსნარით ასკოსპო-რების ფრენის შემდეგ	20(2-5)	7(3)
		0.5-0.7	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 2% სამუშაო ხსნარით	30(2-66)	7(3)
		0.5-0.7	ატამი, გარგარი	ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 1% სამუშაო	15(3)	7(3)

				კლასტოსპო-რიოზი	ხსნარით (1000 ლ/ჰა)		
277	სტაგერი M-45, სვ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) „ლიმინ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1415	1,6-2 2-2,5	კარტოფილი პამიდორი	ფიტოფთოროზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით	20(5)	7 (3)
		2.-3	ვაზი	ჭრაქი	„	30(6)	7(3)
		2.5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“	30 (5)	7(3)
		2-3	ატამი, გარგარი	მონილიოზი ნაცრისფერი სიდამპლე ფოთლის სიხუჭუჭე	“	25 (4)	7(3)
		3	ციტრუსი	ანთრაქნოზი		25 (4)	7 (3)
		2-2,5	კიტრი	პერონოსპოროზი	„	15 (3)	7 (3)
		2-2,5	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი ნაცრისფერი ოზი	„	15 (4)	7 (3)
278	სტორი 250 ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) (4) “სანსეტ ქიმია ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1149	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზაში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14-დღიანი ინტერვალით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0,15-0,2	ქლიავი	კლასტეროსპორიოზი კოკომიკოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კვირტების გახსნისას, კოკრების გავარდისფერების ფაზაში და 12 დღიანი ინტერვალით	20(4)	7(3)
		0,3-0.4	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0.5-0.6	ციტრუსები	სკები (ქეცი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გავრცელების კერებში	20(2)	7(3)
279	სტრაჟი,სკ 500 გ/ლ (ციპროდინილი) (თ) შპს„ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 1042/18	0,4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
280	სტრობი 500 წდგრ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ მეთილი) (4) “ბასფი აგ” გერმანია 526/09/15	0.14 მცენარის სიმაღლე 3 მ-მდე	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, მურა სოკოები, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლეები	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით	35(3)	7(3)

					შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზი-საგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი		
		0.2 მცენარის სიმაღლე 3 მ-დან 4 მ-მდე	“	“	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზი-საგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	35(3)	7(3)
		0.26 მცენარის სიმაღლე 4 მ	“	“	“	35(3)	7(3)
		0.2-0.3	პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ნაცარი, ფიტოფტოროზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	10(2)	5(3)
		0.2-0.3	პამიდორი, (დახურული გრუნტი)	ნაცარი, ფიტოფტოროზი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 800-1000 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)	5(3)
		0.2-0.3	კიტრი (ღია გრუნტი), ყაბაყი	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 800 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია	2(2)	2(2)

					კულტურის შეცვლა		
		0.2	კიტრი (დახურული გრუნტი), ყაბაყი	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	2(2)	2(2)
		0.15-0.2	ვაზი	ნაცარი, ჭრაქი	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	10(3)	7(3)
281	სტრობსტარი, წხგრ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ მეთილი) (4) „ნინგზო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ“ ჩინეთი 670/15	0.2 მცენარის სიმაღლე 3-4 მ-მდე 0.3 მცენარის სიმაღლე 4 მ	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, მურა სოკოები, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლეები	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა ან 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	35(3)	7(3)
		0.2-0.3	პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი (ღია გრუნტი) პამიდორი, (დახურული გრუნტი)	ნაცარი, ფიტოფტოროზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა, დახურულ გრუნტში-800- 1000 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	10(2) 5(2)	5(3)
		0.2-0.3 0.3	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში	2(2)	2(2)

			კიტრი (დახურული გრუნტი		სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა		
		0.3	ვაზი	ნაცარი, ჭრაქი	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურიზაციისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	10(3)	7(3)
282	სულკალი, სფ (678,4გ/კგ ტეტრაკუპრუმ (II) სპილენძის სულფატი, 200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1)	9-12	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი სიდამპლეები ბაქტერიული სიდამწვრე ტოტების კიბო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	20(3-4)	7(3)
	„ინტერნასიონალ ქიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 1269	6.0-8.0	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	25(4)	3(1)
		7-9	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე სიდამპლეები ჟანგები ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	3(1)
		3,5-5	ჰამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი რიზოქტონიოზი	“	15(2-3)	3(1)
		3,5-5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	15(4)	3(1)

		15-20	ციტრუსი	მეჭეჭიანობა, მალსევო, ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი	“	25(4)	3(1)
		4-5	დეკორატიული მცენარეები	ჟანგა ლაქიანობები	“	-(2)	3(1)
283	სულფი, წდგრ 800 გ /კგ (გოგირდი) (4)	5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(2-3)	4(1)
	“მარდა კროპქემ ლიმიტედ” ინდოეთი 701/14	5-8	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	ნაცარი	“	1(3-5)	4(1)
		3	კიტრი პამიდორი	PNაცარი	“	1(2-3)	4(1)
		3	ვარდი	ნაცარი	“	-(2-4)	4(1)
284	სულფოლაკი 80 წდგრ 800გ /კგ (გოგირდი)	3-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4)	7(3)
		3-6	ვაშლი	ნაცარი	„	1(4)	7(3)
	“აგრომტულნი გმზხ” გერმანია 646/14/19	3-5	თესლოვანი ხეხილი	ნაცარი	„	1(4)	7(3)
		2-3	კიტრი, პამიდორი, კარტოფილი	ალტერნარიოზი, სილაქავეები, ანთრაქნოზი	„	1(4)	7(3)
		4-5	კურკოვანი ხეხილი	ნაცარი	„	1(4)	7(3)
		3-6	ციტრუსი	ნაცარი	„	1(4)	7(3)
		2	ვარდი	ნაცარი	„	1(4)	7(3)
		5	თხილი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების განვითარებისას	8(7-10)	7(3)
285	სულფური, წდგრ 800 გ/კგ (გოგირდი)	4-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, 7-10 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	1(2-3)	4(1)
	„იოგლილა სულფურ ენდ აგრემ ინდ.პვტ., ლტდ“ ინდოეთი 1334	5-8	თხილი თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	“	“	1(3-5)	4(1)
286	სუპერ დიანონი 700 წდგრ 700 გ/კგ (დიითიანონი) (თ) „აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 1256	0, 5-1	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ასკოსპორების ფრენამდე და ასკოსპორების ფრენის შემდეგ	25(2-4)	7(3)

287	სუპერ კოპერი, სფ 500 გ/კგ (სპილენძის ქლორჟანგი) (4) „ინტერნაციონალ კუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა	2.4-3.2	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორი-ოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(5)	3(1)
	527/09/13/18	3.2-4	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.4-3.2	პამიდორი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		2.4	კიტრი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.4	ხახვი	პერონოსპო-როზი	“	20(3)	3(1)
		6-8	სვია	“	“	20(4)	3(1)
		4-8	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		4-8	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროს-პორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	3(1)
		6	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	30(6)	3(1)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2-3.6	(ლავანდა,	სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3-0,4% სამუშაო ხსნარით	20(3)	3(1)
		1.8-3	ძაღლყურძენა	ფიტოფთოროზი	“	20(2)	3(1)
		2	ფუტკარა	სეპტორიოზი	“	35(2)	3(1)
		2,4	მრავალმარლ- ვა)	ნაცარი	“	40(2)	3(1)
		0.4-0.8	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგე)	ადმონაცენტა ჩაწოლა, ნერგე-ბის ფესვის სიდამპლე, ყლორტების ფუზარიოზი, ბაქტერიოზი	ადმონაცენტა და ნერგების შესხურება 0,4% სამუშაო ხსნარით	-(3)	3(1)
		2.8-4.0	თუთა (ახალგაზრდა პლანტაციები)	“	“	-(4)	3(1)
		1.5-2	დეკორა- ტიული კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქეები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	-(2)	3(1)
		12-15	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(3)	3(1)
288	სუპერ სტარი, სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი ი) (თ) „ნინგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ“ ჩინეთი 1026/19	2,5-3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	25 (3)	7 (3)

		3	ვაშლი		„	25 (3)	7(3)
		2.5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2.5-3	კიტრი	პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2.5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (2)	7(3)
289	სქაინერი 500 სგ 500 გ/კგ (ქლოროტალონილი 250+ სპილენძის ოქსიქლორიდი 250 გ/კგ) (თ) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ- ლტდ. სტი.” თურქეთი 877/17	2, 5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით	14(3)	3(3)
		2.5-3	ვაზი	ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი	„	30(3-4)	7(9)
		2.5-3	ვაზი	ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი	„	30(3-4)	7(9)
290	ტალენდო ეკ, 200 გ/ლ (პროკუინაზიდი) (თ) (4) “დიუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშენს ს.ა.რ.ლ.” შვეიცარია 585/13/18	0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-15 დღიანი ინტერვალით	28 (4)	7 (3)
		0.25	ხორბალი	ნაცარი	“	49 (2)	7 (3)
291	ტანკაპ ექსტრა 80 % სგ 800 გ/კგ (კაპტანი) „შანდონგ ვეიფანგ რეინზოლუ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1393	2-3	ვაშლი, მსხალი,	ქეცი, კიბო, ნაყოფის სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	30(1-2)	7(3)
		2-2,5	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, შავი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით	30(3)	7(3)
		2	ატამი, გარგარი	ფოთლის სიხუჭუჭე	მ	15(1-2)	7(3)
		2	კიტრი პამიდორი	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი ფიტოსპოროზი	“	15(1-2)	7(3)
		2	ბოსტნეული	ანთრაქნოზი მურა ლაქიანობა	მ	15(1-2)	7(3)
292	ტანოსი, წდგრ 500 გ/კგ (ფამოქსადონი 250+ციმოქ	0.4	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	30 (3-4)	7 (3)

	სანილი 250 გ/კგ) (თ), (3) “დიუპონ ინტერნეშნლ ოპერეიშენს ს.ა.რ.ლ.” შვეიცარია 888/17						
		0,6	კარტოფილი	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : რიგების შეკვრის დასაწყისში, კოკრების ფაზაში, ყვავილობის ბოლოს და ტუბერების ზრდის დროს. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	14 (4)	7 (3)
		0,5-0,6	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 8-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 400 ლ/ჰა	14 (4)	7 (3)
		0,4-0,6	მზესუმზირა	თეთრი და რუხი სიდამპლეები, ჭრაქი, ფომოფისი, ფომოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 4-6 ფოთლის ფაზაში, კოკრების ფაზაში და ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	50 (2-3)	7 (3)
		0,6	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 8-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 400 ლ/ჰა	14 (4)	7 (3)
293	ტასპა 500 ეკ 500 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ+პროპიკონაზოლი 250 გ/ლ)	0.4-0.5	ხორბალი, ქერი	ნაცარი, ღეროს, მურა, ყვითელი ჟანგა, სუპტორიოზი, ჰელმინტოსპორიოზი, პირენოფოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	30 (1-2)	-(3)
	(თ) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 702/14/19	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14- დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)
		0.2-0.25	ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი, ნაცარი, ლაქიანობები	“	30(4)	7(3)
		0.4	ციტრუსები	სკები, ლაქიანობები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (4)	7(3)
294	ტელდორი 50, წზგრ 500 გ/კგ (ფენპექსამიდი) (თ) (4) “ზაიერ აგ“ გერმანია 586/17	0.8-1.0	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	30 (3)	7)(3)
		0.8	ატამი	მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის	20 (3)	7(3)

			ბალი ალუბალი		პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით		
		1	ქლიავი	ნაცრისფერი სიდამპლე	“	20 (3)	7(3)
		0.8-1	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე	“	10 (1)	7(3)
295	ტენესი, წხ 360 გ/ლ (ჰიმექსაზოლი) „დოგალ კიმიევი მადელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს“ თურქეთი 1344	0,6	ჰამიდორი	ფესვის სიდამპლე	საჩითილეში ნიადაგის შესხურება (დარგვამდე, დარგვის ან გადარგვის შემდეგ)	-(1 -2)	-(-)
		0,8	თამბაქო	ფესვის სიდამპლე	სათესში ნიადაგის შესხურება (დათესვამდე, დათესვის შემდეგ, აღმოცენების შემდეგ)	-(1 -2)	-(-)
		5,0	წიწაკა	ფესვის სიდამპლე	წვეთოვანი ირიგაციით შეტანა	-(3)	-(-)
		1,2	კიტრი	ფესვის სიდამპლე	ნიადაგის შესხურება	-(3)	-(-)
296	ტერსელი, წდგრ 160 გ/კგ (დიტიანონი 120 + პირაკლოსტრობინი 40) (თ), (3) “ზასფი სე” გერმანია 594/13/18	2-2.5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ნაცარი სიდამპლეები შენახვის პერიოდში	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	30 (3)	7(3)
297	ტოპაზი 100 ეკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 402/04/09/14/19	0.12-0. 15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2)	7(3)
		0.25- 0.37	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	“	3(3)	7(3)
		0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.15- 0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ალუბალი (სადედე)	კოკომიკოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	შავი მოცხარი (სადედეები, სანერგეები)	ნაცარი	“	-(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)

		0.375-1	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	3(3-4)	3(-)
		0.15-0.2	სამკურნალო მუენარეები (ფუტკარა)	“	სათესლე ნაკვეთების შესხურება	-(2)	7(3)
298	ტოპკაზოლი, ეკ 250 გ/ლ (პროპიკონაზოლი) (3) „შენზენ კინგ ქუინსონ	0,3-0,4	ვაზი	ნაცარი	„	30(2-3)	7(3)
	კო., ლტდ“ ჩინეთი 1364	0,3	ვაშლი	ნაცარი	„	30(2-3)	7(3)
		0.5	ვარდი	ნაცარი	„	20(2)	7(3)
299	ტოპკონაზოლი, ეკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი)	0.25 0.3-0.4	კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2) 3(3)	7(3)
	(თ), (2) “ ნინგზო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ” ჩინეთი 703/15	0.25-0.3	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,03% სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
		0.5	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.4	ვარდი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	3(3-4)	3(-)
300	ტრიდე, წდგრ 500 გ/კგ (ტრიფლოქსისტრობინი) (თ), (3) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ” ინდოეთი 704/14	0.15	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი, შავი (მურა) ლაქიანობა, ფილოსტიქტოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10-დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14-დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილური ნებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის	14(2-3)	7(3)

					დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღმატებოდეს სამს.		
		0.25-0.3 0.25	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10-დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14-დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, არ უნდა აღმატებოდეს სამს	28(2-3)	7(3)
301	ტრიმაქსი, კვ 250 გ/ლ (ტრიადიმენოლი) (თ) „ნანჯინგ ბესტგრინ ქემიკალ კო., ლტდ“ ჩინეთი 915/18	0,2-0,25	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025%-იანი სულსპენზიით დაავადების პირველი ნიშნის გამოჩენისას	30(2-3)	7(3)
		0,2	ვაზი	ნაცარი	“	35(2-3)	7(3)
		0,2	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი		20 (2)	7(3)
302	ტროპერი 72, სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი 80 + მანკოცები 640) “ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 607/13/18	2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
		2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
		2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი	ჭრაქი	“	10 (3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	20(3)	7(3)
303	უნივერსალი, სფ 80+640 გ/კგ	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6%	14(3)	7(3)

	(მეტალაქსილი + მანკოცები)				სამუშაო ხსნარით		
	(4) “ნინგბო სანჯიო აგროსაიენს კო ლტდ” ჩინეთი 705/15	2.5	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(4)	7(3)
		2.5	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჰრაქი	“	10(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	15(3)	7(3)
		0.3-0.6	თუთა (სათესი განყოფილება და სანერგე)	აღმონაცენების ჩაწოლა თესურებების ფუზარიოზი	შესხურება 0.3-0.4% სამუშაო ხსნარით	-(3-4)	7(3)
304	უნიკორნი დფ, წზგრ 745 გ/კგ (ტებუკონაზოლი 45+გოგირდი 700)	2	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით	21 (4)	7(3)
	(თ), (3) “სულფურ მილს ლიმიტედ.” ინდოეთი 706/15	2	ვაშლი	ქევი ნაცარი	“	30 (4)	7(3)
		2	ატამი	ნაცარი	“	30 (4)	7(3)
		2	პამიდორი კიტრი	ალტერნარიოზი ნაცარი	“	7 (3)	7(3)
		1.5-2	ხორბალი	ნაცარი	“	7 (2)	7(3)
		1.5-2	დეკორატიული ი მცენარეები	“	“	- (4)	7(3)
305	ფავორიტი 70 სფ 700 გ/კგ (პროპინები) „დვა აგრო გმზხ“	1.5-2	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
	გერმანია 916/18	1,5-2.5	ვაზი	ჰრაქი, ფომოფისი	“	30(3-4)	7(3)
		2-2,5	ვაშლი	ქევი	„	30(5)	7(3)
		1,5-2,5	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კარპოფილიუმი	„	30(2)	7(3)
		1.5-2	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		1-1.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჰრაქი	“	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჰრაქი, ანთრაქნოზი	“	25(3-4)	7(3)
		5-6.5	ციტრუსი	ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	40(4)	7(3)
306	ფაინსულფური 80 წდგრ 800 გ/კგ	4-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(4-6)	4(1)
	(გოგირდი)	5-6	ვაშლი, მსხალი	“	“	7(1-6)	4(1)

	(3)						
	“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 1050/19	2-3	კიტრი, პამიდორი	“		7(1-5)	1(1)
		2-3	დეკორატიულ ი მცენარეები	“	“	7(2-4)	4(1)
307	ფაიტერ ბლუ, სფ 460 გ/კგ (დიმეტომორფი 60+ სპილენძის ქლორჟანგი 400) (თ) “საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 787/16	3-4	ვაზი	ჰრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში; ყვავილობის წინ, დაყვავილებისას, და მესამე წამლობიდან 10-14 დღის ინტერვალით	30(3-4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ბუტონიზაციისა და ყვავილობისას 10-14 დღის ინტერვალით	20(2-3)	7(3)
		2-2.5	პომიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში და მეორე წამლობიდან 10-14 დღის ინტერვალით	20(2-3)	7(3)
308	ფალკონი ეკ 460 460 გ/ლ (სპიროქსამინი 250 +ტებუკონაზოლი 167+	0.3	ვაზი	ნაცარი	შესხურება კოკრების განცალკეუებიდან მტევნების შეკვრამდე 10- დღიანი ინტერვლებით	30(4)	7(3)
	ტრიადიმენოლი 43 გ/ლ) (3) „ბაიერ აგ“ გერმანია 448/04/09/14/19	0.6	ხორბალი	ნაცარი, მურა, ღეროს და ყვითელი ჟანგა, ფოთლის და ღეროს სეპტორიოზი, ფუზარიოზი, ჰელმინტოსპო-რიოზი, ღეროს მტრევა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ფუზარიოზის გარდა) მილში გასვლის ფაზაში და დათავთავების დასაწყისში. ფუზარიოზის წინააღმდეგ დათავთავების ბოლოს, ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა – 300 ლ/ჰა	40 (2)	- (3)ჟ
309	ფანტიკი ფ, წდგრ 37,5+480 გ/კგ (ზენალაქსილ-მ + ფოლპეტი) (3) „იზაგრო ს.პ.ა.“ იტალია 564/10/15	2-2,5	ვაზი	ჰრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში; ყვავილობის წინ, დაყვავილებისას, და მესამე წამლობიდან 10-14 დღის ინტერვალით 0,25%- იანი ფანტიკით	40(3)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტო როზი	იწისზედა შესხურება; ბუტონიზაციისა და ყვავილობისას 0,25%-იანი ფანტიკით	14(2)	7(3)
		2-2.5	პომიდორი	ფიტოფტო როზი	მიწისზედა შესხურება ყვავილობის დასაწყისში და მეორე წამლობიდან 10-14 დღის ინტერვალით 0,25%-იანი ფანტიკით	3(2)	7(3)

		2-2.5	კიტრი	პერენოს პოროზი	შესხურება 2-3 ფოთლის ფაზაში, მეორე და მესამე წამლობიდან 10-14 დღის ინტერვალით	14(3)	3(1)
		2-2.5	ხახვი	პერენოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(3)	
310	ფინალი, ეკვ 500 გ/ლ (კარბენდაზიმი) (4) “ ნინგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ” ჩინეთი 707/15	0.3-0.6	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ფესვის სიდამპლე, ჩაწოლა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	-(7)
		0.5-0.6	“	ნაცარი, ჰელმინ- თოსპორიოზი, სეპტორიოზი, ფუზარიოზი და სხვა	“	30(2)	-(7)
		0.6-0.8	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, 0,25-0,3% სამუშაო ნაზავით	20(3)	7(3)
		0.6	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (დაავადების კრიტიკულ პერიოდში)	30 (2)	7(3)
		0.5	ვარდი	ნაცარი	“	-(2)	7(3)
311	ფოზოსი 100 ეკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2)	0, 15-0.25 0.3-0.4	კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2) 5(2)	7(3)
	„ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1173	0.25	ვაზი	ნაცარი	“	20(3)	7(3)
		0, 4-0.5	ვაშლი	ნაცარი	“	20(4)	7(3)
		0.4-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.4 0, 75-1	ვარდი (ღია გრუნტი) ვარდი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი, ჟანგა	“	-(3) 3(3-4)	3(-)
		0, 5	მიხაკი	ჟანგა	“	-(3)	3(3)
		4 მლ/10ლ წყალზე	ქოთნის მცენარეები	ნაცარი, ჟანგა	„	-(1)	
		0, 3-0, 4	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე		3(2)	3(3)
		0, 3-0, 4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი		3(4)	3(3)
		0, 3-0, 5	მარწყვი	ნაცარი		3(2)	3(3)
		0, 4	თამბაქო	ნაცარი, ჟანგა		5(2)	7(3)
		0, 15-0, 2	სამკურნალო მცენარეები	სეპტორიოზი		5(2)	7(3)
312	ფოლპანი , წხვრ 800 გ/კგ (ფოლპეტი) (თ), (3) „ადამა აგრიქალჩა ბ.ვ.“	1,5-2.0	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, შავი სილაქავე, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	40 (2-3)	7(3)

	ნიდერლანდები 1341						
		2,0-2,5	მარწყვი	ალტერნარიოზი სიდამპლეები		20(2)	7(3)
		1,5-2,0	მოცვი	სილაქავეები სიდამპლეები		20(2)	7(3)
313	ფორისი, სკ 250 გ/ლ (ფლუტრიაფოლი) (თ), (3)	0, 15	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღის ინტერვალით	30(4)	7(3)
	„პეტერს და ზურგი კვტ“ უნგრეთი	0, 15	ვაშლი	ნაცარი ქევი	“	30(4)	7(3)
	1224	0, 15	ატამი	ნაცარი	“	30(2)	7(3)
314	ფოსბელ ექსტრა, სფ 800 გ/კგ (ალუმინის ფოსფატი 500+ფოლპეტი 250+ციმოქსანილი 40 გ/კგ) (თ) „პრობელეტე ს.ა.უ. ესპანეთი 1322	1,2	სალათა და სხვა ფოთლოვანი ბოსტნეული (ბროკოლი, ბრუსელის კომბოსტო, სალათა რუკოლა, ისპანახი, მწვანე სალათა)	პერენოსპო-როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი დამუშავება დატესვის შემდეგ და შემდეგი ორი 15 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	21(1-3)	7(3)
		3	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: სიმპტომების გამოჩენისთანავე და 10-14 დღიანი ინტერვალით.	25(3)	7(3)
315	ფოსბელ 80, სფ 800 გ/კგ (ალუმინის ფოსფატი 800 გ/კგ) (თ) „პრობელეტე ს.ა.უ. ესპანეთი 1331	1,5-3	კურკოვანი და თესლოვანი ხეხილი	მონილიოზი ბაქტერიოზი გუმოზი ციტოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი დამუშავება დაავადებების გამოჩენისას და შემდეგი 15 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	25(2-3)	7(3)
		3-5	ციტრუსი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(2)	7(3)
		3	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 800- 1000 ლ/ჰა	25(3-4)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	„	7(3)	7(3)
		2	ხახვი (მწვანე ხახვის გარდა)	პერონოსპოროზი	„	20(2)	7(3)
316	ფოსბელ პლიუსი, სფ (ალუმინის ფოსფატი 350 გ/კგ+მანკოცები 350 გ/კგ)	1,5-2,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი დამუშავება სიმპტომების გამოჩენისთანავე და	21(1-3)	7(3)

	(თ) „პრობელეტე ს.ა.უ. ესპანეთი 1332				შემდეგი ორი 15 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400- 500 ლ/ჰა		
		2,5-3,5	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10- 14 დღიანი ინტერვალით. . ხარჯვა 800-1000 ლ/ჰა	28(3)	7(3)
317	ფოსილი 70 წდგრ 700 გ/კგ (დითიანონი) (თ) *პლატინ ქიმიკ მუმესსილიკ ვე დის ტიკ. ა.ს.”	0.6-0, 8	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პე- რიოდში ასკოსპორების ფრენამდე და ასკოსპორების ფრენის შემდეგ	20(5)	7(3)
	თურქეთი 857/17	0.5-0.7	ვაზი	ჰრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(6)	7(3)
		0.8-1	ატამი, გარგარი ბალი, ალუბალი	ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი სტიგმოზი, კოკომიკოზი	„	15(3)	7(3)
318	ფულპასი 100 ეკ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 994/18	0.15-0,25 0.25-0.4	კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით “	20(2) 3(3)	7(3) 7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.25-0,3	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით	21(3)	7(3)
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.2-0.4	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.4-0,5	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5% სამუშაო ხსნარით	14(3-4)	3(-)
		0,4	თამბაქო	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
319	ფუნგურან OH 50 სგ 500 გ/კგ (სპილენძის	1,5 -2,5	ვაზი	ჰრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, როცა ყლორტები მიაღწევენ 10	20 (4)	3(1)

	მიხედვით) (სპილენძის ჰიდროქსიდი) (თ), (3) „სპაესს-ურანია ქემიკალს გმზხ“ გერმანია 1084/19				სმ სიგრძეს, 10 დღის შემდეგ, ყვავილობის წინ და დამტკვრების შემდეგ		
		1,7-4,5	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება შემოდგომაზე და ზამთრის დამთავრებისას	15 (2)	3(1)
		3-5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენამდე და ჩამოცვენის შემდეგ და გაზაფხულზე შეფოთლისას	15(3)	3(1)
		2-3 0,45		ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება ყვავილობადე და ყვავილობის შემდეგ	20(2)	
		3 0,45	კომში	ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	20(2)	3(1)
		1,5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7-დღიანი ინტერვალით	7 (4)	3(1)
		2,4-3,2	კიტრი	პერონოსპოროზი ბაქტერიული კუთხოვანი სილაქავე	„	7 (4)	3(1)
		1.5-3,0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, როცა მცენარეები მიაღწევენ 15- 20 სმ და 10-14-დღიანი ინტერვალთ	21(4)	3(1)
		2,4	თამბაქო	აღმონაცენების ჩაწოლა, სიდამპლე	ჩითილების მორწყვა	-(2)	3(1)
		1,5		ბაქტერიული ჩოფურა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (3)	
		1,5-2	ლობიო	ბაქტერიული კუთხოვანი სილაქავე ბაქტერიული მურა სილაქავე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (3)	3(1)
		4,0	შაქრის ჭარხალი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას და 7-10-დღიანი ინტერვალთ	21 (3)	3(1)
		4,0	სვია	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (2)	3(1)
320	ფუნიქსი 25 , ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) „ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ“ კანადა 628/14/19	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზა- ში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14 დღიანი ინტერვა- ლით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით	20(2-4)	7(3)
321	ქვადრისი 250 სკ	0.4-0.6	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ნაცარი,	პრეპარატი გამოიყენება	5(2)	5(3)

	250 გ/ლ (აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 518/09/14/19		(ღია გრუნტი)	ალტერნარიოზი	მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04-0.06%- იანი სამუშაო ხსნარით: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16-დღიანი ინტერვალთ. სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა		
		0.4-0.6	პამიდორი, (დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04-0.06%- იანი სამუშაო ხსნარით: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16-დღიანი ინტერვალთ. სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 800-1000 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)	5(3)
		0.4-0.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04-0.06%- იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 14- 16-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვის ნორმა 800 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	3(2)	3(3)
		0.4-0.6	კიტრი (დახურული გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04-0.06%-იანი სამუშაო	3(2)	3(3)

					ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 14-16 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800-1000 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა		
		0.6-0.8	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.06-0.08 %-იანი საშუალო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ, ისვრილობის პერიოდში, სიმწიფის დაწყებისას. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილური ნაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	25(2)	7(3)
322	ქვადრის მაქსი 593,5 სკ 93.5+500გ/ლ (აზოქსისტრობინი+ ფოლპეტი) (თ), (3) სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ.” შვეიცარია 752/15	2-2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა.	5 (3)	7(3)
		1.5-2	კიტრი	პერინისპოროზი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა.	3(2)	7(3)
		2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, ფომოფსისი, შავი სიდამპლე, წითურა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-14 დღიანი ინტერვალით ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ, ისვრილობის პერიოდში, სიმწიფის დაწყებისას. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა.	30(3)	7(3)
323	შავიტი ფ 71.5, სფ 15+700 გ/კგ (ტრიადიმენოლი + ფოლპეტი) (თ), (4) „ადამა აგრიქალჩა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 453/10/15	2.0-2,5	ვაშლი მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25%-იანი სუსპენზიით დაავადების პირველი ნიშნის გამოჩენისას	30(2-3)	7(3)

		2.0	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	“	35(2-3)	7(3)
324	შავიტი ფ, წზგრ 20+700 გ/კგ (ტრიადიმენოლი + ფოლპეტი) (თ), (3) „ადამა აგრიქალა ზ.ვ.“ ნიდერლანდები 1326	2.0-2,5	ვაშლი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	40(4)	7(3)
		2,0-2,5	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, შავი სილაქავ, თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლე	“	40(4)	7(3)
		1,8-2,0	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	„	20(2)	7(3)
		1,8-2,0	კიტრი	პერონოსპოროზი	„	20(2)	7(3)
325	შაოლინ ექსტრა, წდგრ 625 გ/კგ (ციპროდინილი 375+ ფლუდიოქსონილი 250 გ/კგ)	0.6-1	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე სიდამპლეების კომპლექსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის ადრეულ ეტაპზე და ყვავილობის შემდეგ მოსავლის აღებამდე, 14-21 დღიანი ინტერვალით	30 (2)	7(3)
	(თ) „შანდონგ ვეიფანგ რეინზოუ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1428	0.8-1.0	ვაშლი მსხალი	ქეცი, მონილიოზი, პენიცილიუმი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაყოფების სიდამპლე, ალტერნარიოზი, ფუზარიოზული სიდამპლე, ხეხილის ვარჯის და ღეროების კიბო, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა პირველი სიმპტომების აღმოჩენისას, ადრეულ ნაყოფის გამოჩენისთანავე 10-12 დღიანი ინტერვალით	20 (3)	7(3)
		0.6	სალათა	ნაცრისფერი სიდამპლე სკლეროტინია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა პირველი სიმპტომების აღმოჩენისას და 10 დღიანი ინტერვალით	7 (3)	7(3)
		0,8-1	პამიდორი, ბადრიჯანი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა პირველი სიმპტომების აღმოჩენისას და 7 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
326	ჩემპიონი, წდგრ 770 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი) “ნუფარმი გმზხ და კო კგ ” ავსტრია 1143 /19	2-3	ვაზი	ჭრაქი სიწითლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების ფაზიდან 8-10-დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით	25(7)	3(1)
		4	ვაშლი	ქეცი	პირველი შესხურება გავარდისფერების ფაზაში, შემდგომი 7-10-დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით	20(7)	3(1)
		2-3	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ბაქტერიული სილაქავე	შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 8-10-დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით	10(4)	3(1)
		2-3	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	პირველი წამლობა 2-3 ნამდვილი ფოთლის	10(4)	3(1)

					ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 8-10-დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით		
		2-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, დანარჩენი სამი წამლობა 8-10-დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით	15(4)	3(1)
		5-7	ატამი	ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული სილაქავე, ბაქტერიული ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1)	3(1)
		2,5	კენკროვნები: მაყვარი, მოცვი, ქოლო მარწყვი	ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზები, ალტერნარიოზი, ასკოქიტოზი, ჟანგა, ფომოფისი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ლაქიანოზები, მონილიოზი	პირველი შესხურება იანვრის ბოლოს-თებერვლის დასაწყისში, შემდგომი ორი შესხურება მარტში 20 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-700-800 ლ/ჰა	15 (3)	7 (3)
		3-4	ნუში	ბაქტერიოზები, მონილიოზი, სტიგმოზი, ტოტების სიდამწვრე, შავი ლაქიანოზა, ფოთლების დაფარცხავება	პირველი შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას, მეორე შესხურება 20 დღის შემდეგ. ბოლო შესხურე მოკლე დროში მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	20(3-4)	7(3)
		3-4	თხილი	ბაქტერიოზები	პირველი შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას, მეორე შესხურება ყვავილობის დასრულებიდან 1-1,5 თვის ვადაში, მესამე შესხურება წინა დამუშავებიდან 20 დღის შემდეგ, შემდეგი-მოკლე დროში მოსავლის აღების შემდეგ. რეკომენდებულია გვიანი პროფილაქტიკური დამუშავება ნოემბრის ბოლოს-დეკემბრის დასაწყისში დამტვერვამდე. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	20(4-5)	7(3)
		3-5	კაკალი	„	პირველი შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას, შემდეგი ყვავილობამდე 15-20 დღით ადრე. მესამე შესხურება ყვავილობის დასრულებისთანავე, შემდგომ ორი დამატებითი დამუშავება წინა დამუშავებიდან 20 დღის ვადაში. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	20(5)	7(3)
		3-4	კივი	„	პირველი დამუშავება დეკემბერში, მოსავლის აღებიდან მოკლე ვადაში, შემდეგი ორი დამუშავება კვირტების გაშლამდე 20	20(3)	7(3)

					და 25 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა		
327	ცელიტელი, სფ 80 გ/კგ+640 გ/კგ (მეტალაქსილი+მანკოცები)	3,0	ვაზი	ჭრაქი, სიდამპლეები შავი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, კოკრების დაბერვის ფაზიდან 10 დღის ინტერვალით	25(2-3)	7 (3)
	შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 1217	3	ვაშლი	ქეცი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- პროფილაქტიკური, შემდეგ 10 დღის ინტერვალით	30 (2)	7(3)
		2.5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	20 (2)	7(3)
		2.5-3	კიტრი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	7(3)
		2.5-3	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	7(3)
328	ციდელი ტოპი 140 დკ 250 გ/ლ (ციფლუფენამიდი 15 გ/ლ+დიფენოკონაზოლი 125 გ/ლ) (თ) „სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ“	0, 5-0, 7	ვაშლი	ქეცი ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1200-1500 ლ/ჰა.	15 (3)	7(3)
	შვეიცარია 1163		პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, კლადოსპოროზი (ყავისფერი ლაქიანობა)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 500 ლ/ჰა.	15 (3)	7(3)
329	ციმაქსი, სფ 640+80 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ) 4)	3	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალით	25 (3)	7 (3)
	„აგრო ლაიფი საიენს კორპორეიშენ“ ინდოეთი 1355	3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	„	14 (3)	7(3)
		3	კიტრი	პერონოსპოროზი	„	14 (3)	7(3)
330	ციმო სუპერი 50, სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ) 4)	3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14- დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	„აგროს აგრო ლტდ ბულგარეთი 1175	2.5-3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14- დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
		3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (2)	7 (3)
		3	პამიდორი პამიდორი (დახურული	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით	14 (3) 10 (4)	7(3)

			გრუნტი)				
		3	კირი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
331	ციმბალი, წდგრ 450 გ/კგ (ციმოქსანილი) (თ)	0,25-0,5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 5 დღიანი ინტერვალით კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	5 (3)	7(3)
	„ბელხიმ კროპ პროტექშენ ნვ/სა“ ბელგია 1373	0,25-0,5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	7 (10)	
		0,25-0,3	ხახვი ნიორი	პერონოსპოროზი	„	10 (3)	
		0,25-0,5	სალათა	პერონოსპოროზი	„	7 (4)	
		0,25-0,3	ვარდი	პერონოსპოროზი	„	- (2)	
332	ციპრო პლიუსი წზგრ, 750 გ/კგ (ციპროდინილი) (თ)	0, 4 0.3	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
	„პარიჯატ ინდასტრის პეტ. ლტდ“ ინდოეთი 835/16	0, 2 0.3	ატამი, გარგარი ქლიავი, ალუბალი, ბალი	ნაცარი მონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი	“	28(4)	7(3)
		0.7	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი	“	20(3)	7(3)
333	ხორუსი 75 წზგრ, 750 გ/კგ (ციპროდინილი) (თ)	0,2 0.25	ვაშლი	ქეცი, ნაცარი მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	28(4)	7(3)
	“სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 435/05/10/15	0,2 0.25-0.3	მსხალი	ქეცი, ალტერნარიოზი მონილიოზი	“	28(4)	7(3)
		0,15-0,2 0.2-0.3	ატამი	ნაცარი მონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი	“	25(4)	7(3)
		0.2-0.3	გარგარი ქლიავი	მონილიოზი, კლასტეროსპორიოზი	“	28(4)	7(3)
		0,15-0,2 0.25-0.3	ალუბალი, ბალი	მონილიოზი კოკომიკოზი კლასტეროსპორიოზი	“	28(4)	7(3)
		0.5-0.7	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი	“	20(3)	7(3)
		1.2-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაცროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(2)	5(3)
		1.2-2	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	“	15(2)	5(3)

334	ჯაკო, წზგრ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ მეთილი) (4) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.« თურქეთი 1140	0.2 მცენარის სიმაღლე 3-4 მ- მდე 0.3 მცენარის სიმაღლე 4 მ	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, მურა სოკოები, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლეები	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა ან 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	35(3)	7(3)
		0.2-0.3	პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი (ღია გრუნტი) პამიდორი, (დახურული გრუნტი)	ნაცარი, ფიტოფტოროზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა, დახურულ გრუნტში-800- 1000 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	10(2) 5(2)	5(3)
		0.2-0.3 0.2-0,3 0.3	გოგროვნები კიტრი (ღია გრუნტი) კიტრი (დახურული გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	2(2)	2(2)
		0.3	ვაზი	ნაცარი, ჭრაქი	პრეპარატი გამოიყენება ლონისძიებათა სისტემაში სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაზისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	10(3)	7(3)
335	ჯეკ პოტი , კვ 300 გ/ლ	0.3-0,4	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების	25 (4)	7(3)

	(დიფენოკონაზოლი 200 გ/ლ+პენკონაზოლი 100 გ/ლ)				პირველი ნიშნების გამოჩენისას		
	(თ) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრაფიტი“	0.4-0,5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით	30(3)	7(3)
	საქართველო 907/17	0.4-0,5	ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი, ნაცარი, ლაქიანობები, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მონილიოზი	“	30(4)	7(3)
		0,15-0,25	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	„	20(2)	7(3)
		0,25	კიტრი (დახურული გრუნტი)			3(3)	7(3)
336	პარბორი 300 ეკ 300 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი 150 გ/ლ+პროპიკონაზოლი 150 გ/ლ)	0.5-0, 6	ხორბალი, ქერი	ნაცარი, ღეროს, მურა, ყვითელი ჟანგა, სეპტორიოზი, ჰელმინტოსპორიოზი, პირენოფოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	30 (1-2)	-(3) 1
	(თ) „საფა ტარიმი ა.ს. თურქეთი 829/16	0.25-0, 4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14-დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)
		0.3-0, 4	ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი, ნაცარი, ლაქიანობები	“	30(4)	7(3)
		1-1, 5	ციტრუსები	სკები, ლაქიანობები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (4)	7(3)
		0, 3	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	„	21(2)	7(3)
337	ჰელიოკუიფრი , სკ 400 გ/ლ (სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით)	1. 4-2.6	ვაზი	ჭრაქი, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში :პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით .	21(4)	7(3)
	“ექშენ პინ” საფრანგეთი 1318	1,4.5-2,6	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი	„	15(4)	7(3)
		1.2-2.7	ატამი, ვაშლატამა, ალუბალი, ბალი, ქლიავი, ალიჩა,	ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი	„	15(4)	7(3)
		1,4-2,6	მანდარინი , ლიმონი	ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი		21(4)	7(3)
		1,5	თხილი	ბაქტერიოზი		15(5)	7(3)
		1.3-1,8	ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი	„	10(4)	7(3)
		1.3-1,8	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	„	10(4)	7(3)

		1,5	მარწყვი, ჟოლო	ბაქტერიოზი	„	15(5)	7(3)
338	ჰელიოსი 250 ეკ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) „შანდონგ ვეიფანგ რეინზოუ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1391	0,2-0.3	ვაშლი მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარდისფერების ფაზაში და 10-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	20(1-3)	7(3)
		0.5	კარტოფილი	ალექტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(1-3)	7(3)
		0.5	პამიდორი	ალტერნარიოზი	„	15(1-3)	7(3)
339	ჰელიოსუფრი, სკ 700 გ/ლ (გოგირდი) (3) “ექშენ პინ ”	3-7,5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ: პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 7-14 დღიანი ინტერვალით	5(4-6)	4(1)
	საფრანგეთი 1317	1,5-5	ვაშლი, მსხალი , კომში	ნაცარი	“	3(2-6)	3(1)
		2-7		ქეცი			
		1,25-5	ატამი, გარგარი, ვაშლატამა	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით	3(2-6)	3(1)
		1,25-5	თხილი	ნაცარი	„	3(1-6)	3(1)
		1,5-6	კიტრი, ყაბაყი, გოგრა პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(2-5)	3(1)
		1,5-6	პარკოსნები	ნაცარი	“	3(1-5)	3(1)
		1,5-6	ბოსტნეული , სალათა, ისპანახი	ნაცარი	“	3(1-5)	3(1)
				სეპტორიოზი			
		1,5-6	კენკროვნები	ნაცარი	„	3(1-5)	3(1)
		4-6	მარცვლოვნები	ნაცარი	„	3(1-2)	3(1)
		4-5	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი	„	3(1-2)	3(1))
		1-6	სვია	ნაცარი	„	3(2-6)	3(1)
		1-5	ვარდი	ნაცარი	“	1(2-6)	1(1)
		1,5-6	დეკორატიული მცენარეები	ნაცარი	“	1(2-6)	1(1)
340	ჰექტაშ ბორდო 20 სფ 740 გ/კგ (სპილენძის სულფატი- კალციუმის	6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)

პიდროქსიდი) (თ), (1) “ვექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 642/13/18			(მაკროსპო რიოზი)			
	4-6	პამიდორი	“	“	8(4)	3(1)
	6-8	შაქრის, სუფრის ქარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
	6-8	თამბაქო	პერონოსპოროზი	“	15(3)	3(1)
	4-6	ზახვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
	4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
	4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფე-რი ლაქიანოზა, ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
	8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
	7-10	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	3-4	სამკურნალო მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-400 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
	0.7-1.4 3.5-6	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	ცილინდროს პორო-ზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა და 500-600 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
	0.5-1	წიწვიანი და ფოთლოვანი ჯიშები (სანერგეები)	ჟანგა, წიწვის და ფოთლის ლაქიანოზა	სანერგეების და შიშის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2-0,5% სამუშაო ხსნარით, ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
	5	მდეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-500 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
	20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა- 1000-1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
	20-25	ვაზი	ქრაქი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
	20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)

		15-18	მოცხარი, ზურტკმელი, ყოლო, მარწყვი	ჟანგა, ქეცი, ლაქიანობები, სეპტორიოზი, ანთრაქნოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხსნარის ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		15-20	თუთის პლანტაციები (სადედეები)	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით. ხსნარის ხარჯვა-600-800 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
341	ჰიდრომიკრონი 77 სფ 770 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით 500 გ/კგ) „სალეს უაი დერივადოს დე კობრე ს.ა.“ პერუ 1027/18	2-4	ვაზი	ქრაქი ბაქტერიოზული სიდაშწერე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების ფაზიდან 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0,4% სამუშაო ხსნარით	25(6)	3 3(1)
		4	თესლოვნები	ქეცი ბაქტერიოზი	პირველი შესხურება გავარდისფერების ფაზაში, შემდგომი 10 დღიანი ინტერვალით 0.4% სამუშაო ხსნარით	20(6)	3(1)
		4-6	ციტრუსი	ფიტოფტოროზი, ფომოფისი ბაქტერიული ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25 (4)	3(1)
		2-3	ჰამიდორი , ზადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0,3% სამუშაო ხსნარით	10(4)	3(1)
		2-3	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	პირველი წამლობა 2-3 ნამდვილი ფოთლის ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0,3% სამუშაო ხსნარით	15(3)	3(1)
		2-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპოროზი	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, დანარჩენი სამი წამლობა 10 დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით	15(4)	3(1)

		5-7	კურკოვნები	ფოთლის სიხუჭუჭი, ბაქტერიული სილაქავე, ბაქტერიული ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1)	3(1)
				მონილიოზი			
		2-3	მარწყვი	ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(2)	3(1)
				ფოთლის სიდამწვრე			
342	ჰოსტაკოლ კომბო, სფ 700+60 გ/კგ (პროპინები+ციმოქსანილი)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფსისი	“	30(3)	7(3)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1182	1.25	კიტრი, გოგრა (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	20(3-4)	7(3)
343	ჰოსტაკოლი, სფ 700 გ/კგ (პროპინები)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	30(2-3)	7(3)
	(თ), (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ. იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 983/18	2-3	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, მონილიოზი	“	30(2-4)	7(3)
		5-6	ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ოზი	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამ-დე და მეორე ვეგეტაციის დასაწყისში.	1(4)	10(3)
		1.2-2.25	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(4)	7(3)
		1.5-.2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი კლადოსპორიოზი		20(2)	7(3)
		1.2-2.25	კიტრი	ჭრაქი		20(2)	7(3)
		1.5-.2.5	კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი	ალტერნარიოზი		20(2)	7(3)
		1.5-.2.5	ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	30(3-4)	7(3)
		1.2-2.25	კომბოსტო	ჭრაქი		20(2)	7(3)
		1.2-2.25	მზესუმზირა	ალტერნარიოზი		35(2)	
		1.2-2.25	ბარდა, ლობიო	ანთრაქნოზი, ჟანგა		15(2)	7(3)
		1.2-2.25	ხახვი	პერონოსპოროზი		20(2)	7(3)
		2,0-.2.5	ვარდი	ჟანგა		-(2)	-(0)

მუხლი 6. თესლის შესაწამლი ინსექტიციდები და ფუნგიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარა- ტის ხარჯვის ნორმა (ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუ- შავებელი ობიექტი	მავნებელი, დაავადება	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამო-ყენების ჯერა- დობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებ ული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	ინსექტიციდები:						
ა)	გაუჩო სდკ 600 600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი 600 გ/ლ) (1)	0,6	საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრი, ჭვავი	ბუგრები	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ	-(1)	3(1)
	“ზაიერ აგ” გერმანია 1248	0,4 ტუბერებზე 0,6	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი, ბუგრები, მაისის ღრავა მავთულა ჭიები	თესლის შეწამვლა დათესვის დროს. კვალის შესხურება დათესვისას. ხარჯვა- 300 ლ/ჰა	42(1) -(1)	3(1)
ბ)	გაუჩო პლიუსი დკთშ 466 466 გ/ლ (კლოთიანიდინი 233 + იმიდაკლოპრიდი 233 გ/ლ) (1)	0,3-0,6	საშემოდგომო ჭვავი	მარცვლეულის ბუზი, ბუგრები, ჭიჭინოზებლები, რწყილები	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	3(1)
	“ზაიერ აგ” გერმანია 1212	0.6	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი	მარცვლეულის ბუზი, ბუგრები, ჭიჭინოზებლები, რწყილები პურის ბზუალა თრიფსები	“	-(1)	3(1)
		0,5	სოია	მავთულა ჭიები ხოჭოები პურის ხოჭო ცხვირგრძელებ ი	“	-(1)	3(1)
		5	სორგო	მავთულა ჭიები ხოჭოები ჩვეულებრივი მარცვლეულის ბუგრი	“	-(1)	3(1)
გ)	ემესტო კვანტუმი სდკ 273,5 207+66,5 გ/ლ (კლოთიანიდინი+)	0.25-0.3	კარტოფილი	ბუგრები მავთულა ჭიები, ცრუმავთულა	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (10-20 ლ/ტონა თესლზე)	-(1)	3(1)

	პენფლუფენი) (თ), (2) “ბაიერ აგ” გერმანია 955/17			ჭიები მაისის ხოჭო ჭიჭინობელები, თრიფსები			
დ)	ევდალ იმიდრიდი 70 წდგთშ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1030/19	0,35 0,15	კარტოფილი (დახურული გრუნტი)	ტკაცუნები ლრაჭები კოლორადოს ხოჭო	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
ე)	ევდალ პირინოსი 25 სგ 250 გ/კგ (ქლორპირიფოს-ეთილი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1186	2 გ/კგ 9 გ/კგ	მარცვლეული სიმინდი	პურის ბზუალა მომღრნელი ხვატრები მახრა სამხრეთის რუხი ცხვირგრძელა	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (5-10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		12 გ/კგ	ზოსტნეული	მომღრნელი ხვატრები მახრა	თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
ვ)	ნუპრიდი 600, სკ 600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი) (1) “ნუფარმი გმზხ და კო კგ” ავსტრია 682/14/19	0.15-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი ბუგრები მავთულა ჭიები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	3(1)
		4.5-5	სიმინდი	ბუგრები მავთულა ჭიები მარცვლეულის ბუხი	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	3(1)
		0.5-0.75	ხორბალი	მავთულა ჭია პურის ბზუალა ცხვირგრძელე ბ	“	-(1)	3(1)
		5-6	მზესუმზირა	მავთულა ჭიები	“	-(1)	3(1)
ზ)	პრემიუმი, კს 140+150 გ/ლ (იმიდოკლოპრიდი+ პენციკურონი) (1) “ქროუნზბრიდჯ მენეჯმენტ ლკ” კანადა 790/16	1-1.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)

თ)	პრესტიჟი სდკ 290 140+150 გ/ლ (იმიდოკლოპრიდი+ პენციკურონი) (1) “ბაიერი აგ” გერმანია 444/04/09/14/19	1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
ი)	პრიბანი 25 სფ 250 გ/კგ (ქლორპირიფოს-ეთილი) (თ), (1) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 748/15	2 12 გ/კგ	მარცვლეული ზოსტნეული	პურის ბზუალა მომღრნელი ხვატრები, მავთულა ჭიები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (5-10ლ/ტ თესლზე) თესვისწინა დამუშავება დასველების მეთოდით	-(1)	-(-)
კ)	რეზიუმე, წდფთშ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 984/18	7,5	მაქრის ჭარხალი	ტკაცუნები ლრაჭები მავთულა ჭიები მრავალფეხა ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი ბოლოფეხიანებ ი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		2	ხორბალი	პურის ბზუალა	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 5-8 ლ წყალი/ტ თესლზე „	-(1)	-(1)
		0,3 0,15	კარტოფილი	ტკაცუნები ლრაჭები კოლორადოს ხოჭო	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		5	სიმინდი	ტკაცუნები ლრაჭები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
ლ)	სელესტ ტოპი 312.5 სკ 312.5 გ/ლ (თიამეთოქსამი 262.5+ფლუდიოქ-სონილი 25+ დიფენოკონაზოლი 25) (თ),(1) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 755/15	0.4 1.6-1.8	კარტოფილი	მავთულა ჭიები, კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები, ჭიჭინოზელები მავთულა ჭიები	სარგავი მასალის შეწამვლა უშუალოდ დარგვამდე ან დარგვის დროს) (10ლ/ტ თესლზე) ნიადაგში შეტანა დარგვის დროს. (ხსნარის ხარჯვა-50 ლ/ჰა)	-(1)	-(-)

		1.5-2	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მომღრნელი ხვატრები, ჭიაჭურბელა, პურის ბზუალა, ზოლიანი პურის ბაღლინჯო, შვედური ხუზები	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ (10ლ/ტ თესლზე)	-(1)	
მ)	სიდოპრიდი სდკ 600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი) (1)	4	სიმინდი	ბუგრები მავთულა ჭიები ცრუმავთულა ხოჭიები მარცვლეულის ბუზი	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ ან წინასწარ 1 წლით ადრე (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	3(1)
	„ადამა აგრიქალჩა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 789/15	0.5-0.8	ხორბალი, ქერი	მავთულა ჭიები ცრუმავთულა ჭიები პურის ბზუალა ცხვირგრძელები ბუზები, რწყილები	“	-(1)	3(1)
		6-10	მზესუმზირა	მავთულა ჭიები ცრუმავთულა ჭიები	“	-(1)	3(1)
		2-4	რაფსი	რწყილები	“	-(1)	3(1)
		10-18	მაქრის ჭარხალი	აღმონაცენტა მავნებლების კომპლექსი	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ ან წინასწარ 1 წლით ადრე (36 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	3(1)
2.	ფუნგიციდები:						
ა)	აპრონი XL, წე 350 გ/ლ (მეფენოქსამი) (თ) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 754/15	0.5 2	მაქრის ჭარხალი	აღმონაცენტა ფესვისჭამია პერონოსპორო ზი	თესლის თესვისწინა ან წინასწარი (1 წლით ადრე) შეწამვლა (10-15 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		3	მზესუმზირა	პერონოსპორო ზი, ვერტიცილოზი , თეთრი სიდამპლე	თესლის თესვისწინა ან წინასწარი (1 წლით ადრე) შეწამვლა (10-15 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		2.5	კიტრი	პერონოსპორო ზი, ბაკტერიოზი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა (10-15 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
ბ)	გიზმო, კს 60 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (თ) “ნუფარმი გმზხდა კო კვ ” ავსტრია 751/15	0.4-0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზუ ლი და	თესლის თესვის წინა შეწამვლა	-(1)	-(-)

				ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი			
		0.4-0.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეებ ი, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.4-0.5	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
გ)	დივიდენდი სტარი 036 კს 30+6.3 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი+ციპროკ ონაზოლი) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 473/495/10/15	1	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მაგარი, მტვრიანა გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინთოსპო- რიოზული და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დასველების მეთოდით, უმულოდ დათესვის წინ ან წინასწარი (ერთ წლამდე) (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1.5	ქერი	მაგარი, მტვრიანა და მაგარი გუდაფშუტა, ბადურა და ხაზურა ლაქიანობები, ჰელმინთოსპო- რიოზული და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი, ნაცარი	“	-(1)	-(-)
		0.75-1	შვრია	ჰელმინთოსპო- რიოზული ფესვის სიდამპლე,, მაგარი გუდაფშუტა, მურა-წითელი ლაქიანობა, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)

		1	საშემოდგომო ჭვავი	ჰელმინთოსპო რიოზული და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები,		-(1)	-(-)
დ)	დიტანი მ-45, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ), (4) “დაუ აგროსაენსი, ექსპორტ ს.ა.ს.” საფრანგეთი 111/08/13/18	5-8	თუთა (თესლი)	თესლის ობი, ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე, აღმონაცენების ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
ე)	ემესტო კვანტუმი სდვ 273,5 207+66,5 გ/ლ (კლოთიანიდინი+პენფლუფე ნი) (თ), (1) “ბაიერ აგ” გერმანია 955/17	0.25-0.3	კარტოფილი	რიზოქტონიოზ ი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (10-20 ლ/ტონა თესლზე)	-(1)	3(1)
ვ)	ევდალ ტებუზოლი 2 ფთშ 20 გ/კგ (ტებუკონაზოლი) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმბა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1206	1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზუ ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე	-(1)	-(-)
		1,5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		1,5	შვრია,ჭვავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
ზ)	ევდალ ტებუქსილი სკ 60 60 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (თ)	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი,	თესლის თესვის წინა შეწამვლა	-(1)	-(-)

	„ტარკიმ ბიტკი კორუმპ სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1199			ჰელმინ- თოსპორიოზუ ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ოზი, ნაცარი, თესლის ოზი			
		0.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ოზი	“	-(1)	-(-)
თ)	ვალსაზები, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ), (4) „ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 514/18	5-8	თუთა (სათესი ნაკვეთები)	თესლის ოზი, ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე, აღმონაცენების ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
ი)	ინდაზოლი, ეკ 500 გ/ლ (კარბენდაზიმი) (4) “პარიჯატ აჯენის” ინდოეთი 565/15	1-1.5	საგაზაფ-ხულო და საშემოდგო-მო ხორბალი, ქერი	მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტა, ცერკოსპორელ ო-ზური და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ოზი (ფუზარიოზი და სხვა)	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1,5	რაფსი	ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-8 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1,5	სოია, ბარდა, ცერცველა	თესლის ოზი, ასკოქიტოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		5	თუთა (სათესი ნაკვეთები)	აღმონაცენის ჩაწოლა, ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე,	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
კ)	ინშურ პერფორმი, დკს 40+80 გ/ლ (პირაკლოსტრობინი+ ტრიტიკონაზოლი)	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტები, ფესვის ყელის	თესლის შეწამვლა თესვის წინ და დათესვამდე 1 წლით ადრე	-(1)	-(-)

	(თ) “ბასფი სე” გერმანია 773/16			სიდამპლეები, ფუზარიოზები, სეპტორიოზი, ბადისებური და ზოლებიანი ლაქიანობები, პითიუმი, ალტერნარიოზ ი, პირენოფოროზ ი			
		0.5	სიმინდი	მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტები, ფესვის ყელის სიდამპლეები, ფუზარიოზები, სეპტორიოზი, ბადისებური და ზოლებიანი ლაქიანობები, პითიუმი, ალტერნარიოზ ი, პირენოფოროზ ი	თესლის შეწამვლა თესვის წინ და დათესვამდე 1 წლით ადრე	-(1)	-(-)
ლ)	კარნავალი 50 სგ 500 გ/კგ (იპროდიონი) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტშ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 876/17	4.0	მზესუმზირა	აღმონაცენების თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლე, ფომოფისი	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		8.0	თუთა	თესლის ობი, ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე, აღმონაცენთა ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე), თესლის შეწამვლამდე 2-3 დღით თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
მ)	კონილი 2 ფთშ 20 გ/კგ (ტეპუკონაზოლი) (თ) „საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 1287	1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზუ ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი,	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე	-(1)	-(-)

				ნაცარი, თესლის ობი			
		1,5	ქერი	მტკრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		1,5	შვრია, ჭვავი	მტკრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
ბ)	პრემიუმი, კს 140+150 გ/ლ (იმიდოკლოპრიდი+ პენციკურონი) (1) “ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლკ” კანადა 790/16	1-1.3	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი, ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ვერცხლისფერი და ჭვეულებრივი ქეცი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
ო)	პრესტიჟი სდკ 290 140 + 150 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი + პენციკურონი) (1) “ბაიერ აგ” გერმანია 444/04/09/14/19	1	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი, ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ვერცხლისფერი და ჭვეულებრივი ქეცი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
პ)	რაქსილი ულტრა სდკ 120 120 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (თ) “ბაიერ აგ” გერმანია 830/16	0.2	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტკრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სექტორიოზი, ჰელმინ-თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა (5-8 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		0.25	ქერი	მტკრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)
		0.25	შვრია	მტკრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
ჟ)	როდოლიტი სკ 60 გ/ლ (ტებუკონაზოლი)	0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტკრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სექ-ტორიოზი, ჰელმინ-თოსპორიოზული და ფუზარიოზული	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)

	(თ) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 629/13/19			ი ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი			
		0.4	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.4	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
რ)	როვრალი აკვაფლო, სკ 500 გ/ლ (იპროდიონი) „ბასფი აგრო ბ.ვ.“ შვეიცარია 849	0.3-0.4	ნიორი, ხახვი	სიდამპლეები შენახვის პირობებში (სკლეროტინიოზი, ფუზარიოზი, ფომოზი)	ბოლქვების დამუშავება პრეპარატის სუსპენზიით შენახვამდე (მოსავლის აღების შემდეგ)	-(1)	-(-)
		0.38-0.4	კარტოფილი (სათესლე)	რიზოქტონიოზი, მშრალი და სველი სიდამპლე, ქეცი ფუზარიოზი ფომოზი	ტუბერების დამუშავება დათესვის წინ	-(1)	-(-)
ს)	რუბინი 2 ფთშ 20 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (თ) “კორუმა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს” თურქეთი 824/17	1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზი ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე	-(1)	-(-)
		1,5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		1,5	შვრია,ჭვავი	მტვრიანა	“	-(1)	-(-)

				გუდაფშუტა			
ტ)	სელესტ ტოპი 312.5 კს 312.5 გ/ლ (თიამეთოქსამი 262.5+ფლუდიოქ-სანილი 25+ დიფენოკონაზოლი 25) (თ), (1) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ" შვეიცარია 755/15	1.5-2	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მაგარი, მტვრიანა, ჯუჯა გუდაფშუტა, პელმინტოსპო რიოზული და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ (10ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
უ)	სერტიკორი 50 კს 50 გ/ლ (მეფენოქსამი 20 გ/ლ+ტებუკონაზოლი 30 გ/ლ) (თ) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ" შვეიცარია 895/19	0.75-1	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, პელმინ- ტოსპორიოზუ ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, პიტიუმბი, თესლის ობი, მ.შ. ალტერნარიოზ ი, თოვლის ობი, ნაცარი	თესლის თესვისწინა ან წინასწარი (1 წლამდე) შეწამვლა. არ არის რეკომენდებული თესლზე,რომელსაც გააჩნია 16%-ზე მეტი ტენიანობა	-(1)	-(-)
		0.75-1	ქერი	ქვის გუდაფშუტა,მტ ვრიანა გუდაფშუტა, ბადურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, პელმინტოსპო რიოზული და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი, მ.შ. ალტერნარიოზ ი,	“	-(1)	-(-)
		0.75-0,9	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა, ბადურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, პელმინტოსპო რიოზული და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი, მ.შ. ალტერნარიოზ ი, წითელ-მურა ლაქიანობა	“	-(1)	-(-)

ფ)	სუპერვინი, კს 50 გ/ლ (ფლუტრიაფოლი 30 გ/ლ+თიაზენდაზოლი 45 გ/ლ) (თ) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრაფიტი“ საქართველო 896/17	1-1,8	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზუ ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ოზი, ნაცარი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა (8-10 ლ წყალი/1 ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1,8	მზესუმზირა	თესლის ოზი, ფომოზი, პერენოსპოროზ ი, ნაცრისფერი და თეთრი სიდამპლეები	„	-(1)	-(-)
		1,8	ბარდა.ლობიო	თესლის ოზი, ნაცრისფერი და თეთრი სიდამპლეები	„	-(1)	-(-)
ქ)	ფინალი, სკ 500 გ/ლ (კარბენდაზიმი) (4) „სინოხემ ნინგზო ლტდ“ ჩინეთი 707/15	1-1,5	საგაზაფ-ხულო და საშემოდგო-მო ხორბალი, ქერი	მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტა, ცერკოსპორელ ო-ზური და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ოზი (ფუზარიოზი და სხვა)	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1,5	რაფსი	ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-8 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1,5	სოია, ბარდა, ლობიო, ცერცველა	თესლის ოზი, ასკოქიტოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		5	ხეხილი, თუთა, ტყის სანერგეები (სათესი ნაკვეთები)	აღმონაცენის ჩაწოლა, ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე,	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
ღ)	ჯენსილი ფთშ 060, 60 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (თ) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტშ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზუ ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ოზი, ნაცარი, თესლის ოზი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე (5ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)

	თურქეთი 1002/19						
		0.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.5	შვრია, ჭვავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
ყ)	შეესილი ფთშ 2 20 გ/კგ (ტებუკონაზოლი) (თ) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს“ თურქეთი 1154	1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზუ ლი და ფუზარიოზულ ი ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე	-(1)	-(-)
		1,5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		1,5	შვრია, ჭვავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)

მუხლი 7. ბიოლოგიური ინსექტიციდები და ფუნგიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	მავნებელი, დაავადება	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინი ს პერიოდი (გამოყენე ბის ჯერადობ ს დაწყების დრო	დამუშავებ ულ ფართობზე ხელით (მექანიზმ ული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1.	ინსექტიციდები:						
ა)	აბამეთი, ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) „შანდონგ ვეიფანგ რეინზოუ ქემიკალ, კო., ლტდ“ ჩინეთი 1462	0,75-1,25	ვაშლი, მსხალი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები, არაფარდი პარკვევია, ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და მავნებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2) 2(1-3)	2(1)
		0,5-0,75	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის	2(2-3)	2(1)

				ყურძნის ჭია	პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე, მავნეობის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით	2(1-2)	
		0,75-1,25	პომიდორი (ღია გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, ბაღჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	3(2)	3(-)
		0,75-1,25	ციტრუსები	ტკიპები, თრიფსები ფარიანები, ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით	2(1-2)	2(1)
ბ)	ალგამევი 1.8, ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“ თურქეთი 855/17	0.75-1.5	ვაშლი, მსხალი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები, ფსილები არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	7(1-2) 7(1-3)	2(1)
		0.6-1.2	ვაზი	ტკიპები ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	7(2-3) 7(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (I ასაკის მატლები)	7(1-2)	2(1)
		0.3-0.5	კომბოსტო	ჩრჩილი თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნებისას, კვერცხების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისამებრ	5 (1-2)	2 (1)
		0.6-1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I	1(2)	1(-)

					ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ, 50% გამოსული კვერცხებიდან		
		0.3-1.2	ჰომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ბახჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14-დღიანი ინტერვალით	5(2) 5(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ბახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	5(1-2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	“	5(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები, ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	“	7 (1-2)	3(-)
		1-1.5 0.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი) ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	7(3)	3(-)
გ)	არვილმეკი, ვკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) „საფა ტარიმი ა.ს.“ თურქეთი 1144	0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (I ასაკის მატლები)	7(1-2)	2(1)
		0.3-1.2	ჰომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ბახჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14-დღიანი ინტერვალით	5(2) 5(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	„	5(2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	“	5(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	“	7 (1-2)	3(-)
დ)	ბეკი 5 წზგ, 50 გ/კგ (ემამექტინი ბენზოატი) (თ), (1) „დოგალ კიმიევი მადდეღერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1349	0,3-0,4	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ ხარჯვა 600-1000 ლ/ჰა	14(1-2)	3(1)
		0,3-0,4	ბროწეული	ალურა	შესხურება ვეგეტაციის	14 (1-2)	3(1)

					პერიოდში		
		0,3-0,4	ზეთისხილი	ზეთისხილის ფოთლის ჩრდილი	„	14(1-2)	3(1)
		0.3-0.4	პომიდორი (დახურული გრუნტი)	ბამბის ხვატარი ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-1000 ლ/ჰა	7(1-2)	3(1)
		0,3-0.4	კიტრი (დახურულ გრუნტში)	ეგვიპტური ბამბის ხვატარი ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა –800 ლ/ჰა	7(1-2)	3(-)
		0, 3-0,4	ბადრიჯანი, წიწაკა (დახურულ გრუნტში)	ეგვიპტური ბამბის ხვატარი სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1-2)	3(-)
		0.3-0,4	მიხაკი	ბამბის ხვატარი ეგვიპტური ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 600 ლ/ჰა	-(1-2)	3(-)
ე)	ბერმექტინი, ეკ 18გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) „პრობელტე ს.ა.უ.“ ესპანეთი 1333	0.75 –1.5 0.75 –1.5	ვაშლი ვაშლი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, ჩვეულებრივი წითელი ტკიპა, ბუგრები ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების მომრავი ნიმუშები (მატლების მავნებლების გამოჩენისთანავე 15 დღიანი ინტერვალით	3 (1-2)	2 (1)
				არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-II ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	3(1-3)	2(1)
		0.75– 1.5	მსხალი	ტკიპები, ფსილები	ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	3(1-2)	2(1)
		0,3-0,5	კაკლოვნები	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	5(1-2)	3(-)
		0.3– 0.5	კომბოსტო	ჩრდილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნებისა და კვერხსდების გამოჩენისთანავე	3(1-2)	2(1)
		0.3– 0.5	კომბოსტო	თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-II ხნოვანების მატლების	3(1-2)	2(1)

					წინააღმდეგ		
		0.3–0.5	კომბოსტო	ფოთლის მენაღმეები	„	3(1–2)	2(1)
		0.6–1.2	ვაზი	ქლიავის აბლაბუდიანი ტკიპა, ვაზის გაღებებიანი ტკიპა,	საჭიროებისამებრ შესხურება მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგ მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით	10(2–3)	2(1)
		0.6–1.2	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ	10(1–2)	2(1)
		0.75 –1.5	ციტრუსი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ვერცხლისფერი ტკიპა თრიფსები, ნარინჯოვანთა ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგ მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით პირველი კვერხსდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე	10(1–2)	2(1)
		0.75 –1.5	ციტრუსი	ყვითელი ფარიანა ყავისფერი ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ	10(1–2)	2(1)
		0.75 –1.5	ციტრუსი	იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების (I ასაკის მატლები) წინააღმდეგ	10(1–2)	2(1)
		0.6–1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ზოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I- ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ 50% გამოსული კვერცხებიდან	3(2)	1(–)
		0.3–1.2	პომიდორი ი კიტრი(ღია და დახურული –ლი გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	3–7(2)	2(–)
		0.3–1.2	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ბახჩის ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14 დღიანი ინტერვალით	3–7(1–2)	2(–)
		0.3–1.2	ბახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	3–7(1–2)	2(–)
		0.5–1.2	ხენდრო, (მარწყვი)	ორლაქიანი აბლაბუდიანი	„	3(1–2)	2(1)

				ტკიპა, მარწყვის ფრთათეთრა			
		0.6-1.2	დეკორატი- ული მცე- ნარეები	მენაღმე ჩრჩილი, ბუგრი,სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და ბუგრების გამოჩენისთა- ნავე	-(1-2)	2(-)
		1-1.5	ყვავილოვო- ვანი კულტ- რები (ღია და დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	-(3)	3(-)
		0.5	ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, ბუგრი	„	-(3)	3(-)
3)	ბიო-დიე®, წეკ (Agremonine- აგრემონინა 3.5%+Berberine ბერბერინა 2.20%+Ricinine რიცინინა 2.8%, α-Terthienil- 3,50%) “ულტრაქუმიდა აგრიკოლა, ს.ა.დე სი.ვ.” მექსიკა 1442	1.0-2.0 ლ/ჰა	ნიორი, ხახვი,მწვანე ხახვი, სატაცური(NL)*	ხახვის თრიფსი (Trips tabaci) ან (Onion thrips)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 8 დღის ინტერვალით. ადექვატური ბრძოლის ლონისძიების უზრუნველსაყოფად, უნდა გამოვიყენოთ შემავსებელთან ერთად 0.6 მლ /ლ-წყალზე. შესხურება 450 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე NL*-შეზღუდვა არ არის	-(2)	
		2.0- 3.0ლ/ჰა	მოცვი, ჟოლო, მარწყვი, ანწლი(დიდგულა), მაყვალ (NL)*	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus urticae), ყვავილების (დასავლეთის)თრიფსი (Frankliniella occidentalis)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით. გამოვლინდება. შესხურება 600 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		2.0-3.0 ლ/ჰა	მოცვი, ჟოლო, მარწყვი, ანწლი(დიდგულა), მაყვალ (NL)*	მრგვალ ფრთიანი Drosophilla (Drosophilla Suzuki)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით. შესხურება 600 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		1.5-2.0 ლ/ჰა	ბადრიჯანი, წიწაკა, პომიდორი, პომიდორი ჩერი, ტკბილი წიწაკა (ბულგარული)	სათბურის ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum) თამბაქოს ფრთათეთრა (Bemisia tabaci)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით. შესხურება 450 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3-4)	
		1.5-2.0ლ/ჰა	კიტრი, ყაბაყი, საზაფხულო გოგრა,ნესვი, საზამთრო (NL)*	(დასავლეთის) ყვავილების თრიფსი (Frankliniella occidentalis) ბაღის ბუგრი (Aphis gossypii)	სრულდება მცენარის შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით.შესხურება 550-650 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	

		3.0ლ/ჰა	ბროკოლი, კომბოსტო, ბრიუსელის კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო(NL)*	კომბოსტოს ჩრჩილი (<i>Plutella xylostella</i>) კომბოსტოს ხვატარი (<i>Trichoplusia ni</i>)	სრულდება მცენარის შესხურება ფოთლებზე, 14 დღის ინტერვალით. ადექვატური ბრძოლის ლონისძიების უზრუნველსაყოფად, უნდა გამოვიყენოთ შემავსებელთან ერთად 0.6 მლ /ლ-წყლზე. შესხურება 450-550 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		2.0-3.0 ლ/ჰა	კარტოფილი	პომიდორის ჟანგა ტკიპა (<i>Vasates Lycopersici</i>)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით. გამოვლინდება. შესხურება 600 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		1.0-2.0 ლ/100ლ წყალი	სალათის ფურცლები	კომბოსტოს ბუგრი (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	სრულდება მცენარის შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით. ყვავილობის ფაზაში როდესაც პირველი დაზიანებ აღინიშნება. ერგება წყალი pH 6.5-ზე. ბრძოლის ლონისძიების უზრუნველსაყოფად, უნდა გამოვიყენოთ შემავსებელთან ერთად 0.6 მლ /ლ-წყლზე	-(3)	
		1.0-2.0 ლ/ჰა	ვაზი	ვაზის ფქვილისებრი ცრუფარიანა (<i>Planococcus citri</i>)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 21 დღის ინტერვალით. შესხურება 500 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		1.5-2.0 ლ/ჰა	ციტრუსი- ლიმონი, მანდარინი, ფორთოხალი გრეიფრუტი (NL)*	ვერცხლისფერი ტკიპა (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 21 დღის ინტერვალით.	-(3)	
		1.0-2.0 ლ/ჰა	ციტრუსი- ლიმონი, მანდარინი, ფორთოხალი გრეიფრუტი (NL)*	ციტრუსების ფქვილისებრი ცრუფარიანა (<i>Pseudococcus gahani</i>)	შესხურება 500 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		2.0 ლ/ჰა	ციტრუსი- ლიმონი, მანდარინი, ფორთოხალი გრეიფრუტი (NL)*	ციტრუსების (ნარინჯოვანთა)ბუგრი, ჩაის ბუგრი (<i>Toxoptera aurantii</i>)	შესხურება 500 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	

ზ)	ბიოინსექტ 2, სკ (Beauveria bassiana შტამი 71666, 10%, 1*109 CFU სპორა/მლ) შპს „ტესტ ლაბორატორია“ საქართველო 1296	6 (1,5%) 12 (3%)	სიმინდი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიაწი ბაღლინჯო (I, II, III, IV ასაკის ნიმფები) (I, II, III, IV ასაკის ნიმფები და იმაგო)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში სიმინდის რმისებრი სიმწიფის ფაზაში მავნებლის 1 ასაკის ნიმფების გამოჩენისთანავე და განმეორებით 7 -10 დღიანი ინტერვალით	- (2)	-(-)
		6 (1,5%) 12 (3%)	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიაწი ბაღლინჯო (I, II, III, IV ასაკის ნიმფები) (I, II, III, IV ასაკის ნიმფები და იმაგო)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თხილის ნაყოფის სიმწიფეში შესვლის დროიდან მავნებლის 1 ასაკის ნიმფების გამოჩენისთანავე და 7 -10 დღიანი ინტერვალით	- (3)	-(-)
თ)	ბიტოქსიბაცილინი, ფ ბა-1500 აე/მგ, ტიტრი არანაკლები 20 მლრდ. სპორა/გრ (Bacillus thuringiensis var. thuringiensis სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი და ეგზოტოქსინი 0, 6-1, 0%) (3) “შპს სგ სიბზიოფარმი” რუსეთი შპს „ჯეოფერტი“ საქართველო 1250	2-3 კგ/ჰა 40-80 გ/10 ლ 3-5 კგ/ჰა	ვაშლი, ქლიავი, გარგარი, მსხალი, ალუბალი, ბალი, თუთა	ვაშლის ნაყოფჰამია, ჩრჩილი, კუნელის თეთრულა, ამერიკული პეპელა, ფოთლიხვევიები, აბრეშუმხვევიები, მზომელები, ოქროკუდა (1-3 ასკის მატლები)	ვეგეტაციის პერიოდში შესხურება თითოეული თაობის წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალთ. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 800-1200 ლ/ჰა; 2-5 ლ/ხეზე; (დამოკიდებულია ხის ჯიშსა და ხნოვანებაზე) ყვავილობის დროს მცენარეების დამუშავება დაუშვებელია	5(2)	5(1)
		5 კგ/ჰა 80-100 გ/10ლ	მოცხარი, ხურტკმელი	ფოთლიხვევიები, მოცხარის ალურა, მზომელები, ხერხიები, ფოთლის მეგალები (1-3 ასაკის მატლები) აბლაბუდიანი ტკიპა	ვეგეტაციის პერიოდში შესხურება თითოეული თაობის წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალთ. ტკიპის წინააღმდეგ 15-17-დღიანი ინტერვალთ. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 600-800 ლ/ჰა; 0.5-2 ლ/ბუჩქზე (დამოკიდებულია მცენარის ხნოვანებაზე ჯიშზე)	5(2)	5(1)
		6-8 კგ/ჰა 60 - 80 გ/10ლ	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება პეპლების ფრენის დაწყების 8-10 დღის მემდეგ, თითოეული თაობის წინააღმდეგ 5-7 დღის ინტერვალთ.	5(2)	5(1)

					სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 600—1000ლ/ჰა 2— 5ლ/მირზე(დამოკიდებულია ვაზის ძირის ჯიშზე და ხნოვანებაზე)		
		2 კგ/ჰა 40–50 გ/10ლ	მჭერის და სუფრის ქარხალი საკვები იონჯა, მზესუმზირა სტაფილო	მდელოს ფარვანა (1–3 ასაკის მატლები)	ვეგეტაციის პერიოდში მესხურება თითოეული თაობის წინააღმდეგ, 7–8 დღიანი ინტერვალით. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 200–400 ლ/ჰა 0.5–1 ლ/10მ²	5(2)	5(1)
		2–5 კგ/ჰა 40–100 გ/10 ლ წყალში	კარტოფილი პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწკა	კოლორადოს ხოჭო	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მატლების მასობრივი გამოჩენისას, ყოველი თაობის მიმართ 6–8-დღიანი ინტერვალით. 20°C-ის ზემოთ 6–7-დღიანი ინტერვალთა მესხურება; 20°C -ის ქვემოთ 8– 10-დღიანი ინტერვალთა. სამუშაო სითხის ხარჯვის ნორმა 200–400 ლ/ჰა 0.5–1.5 ლ/10 მ²	5(3) 5(4)	5(1)
		21–30 კგ/ჰა 80–100 გ/10ლ	კიტრი (დახურული გრუნტი)	აბლაბუდის ტკიპა	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.7 –1% ხნარით 15–17 დღის ინტერვალთა. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 1000–3000 ლ/ჰა 1–3 ლ/10მ²	5(6)	5(1)
		2 კგ/ჰა	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი (1–2 ასაკის მატლები)	ვეგეტაციის პერიოდში მესხურება თითოეული თაობის წინააღმდეგ, 7–8 დღიანი ინტერვალთა. სამუშაო სითხის ხარჯვის ნორმა 200–400 ლ/ჰა	5(3)	5(1)
		1–1.5 კგ.ჰა 40–80 გ/10ლ	კომბოსტო	კომბოსტოს და თაღამის თეთრულა, ჩრჩილი (1–2 ასაკის მატლები)	„	5(3)	5(1)
		2–4 კგ/ჰა 40–50 გ/10ლ	სვია	სვიის ზუგრი, ფოთოლმღრნელი ხვატრები, ღეროს და მდელოს ფარვანა (1–3 ასაკის მატლები)	ვეგეტაციის პერიოდში მესხურება თითოეული თაობის წინააღმდეგ, 7–8 დღიანი ინტერვალთა. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 800–1200ლ/ჰა 2ლ/10მ²	5(2)	5(1)
		2, 5–3	იონჯა	იონჯის	მესხურება ყვავილობის	5(1)	5(1)

			(სათესლე კულტურა)	ბაღლინჯო (3-4 ხნოვანების მატლები)	10 დღის ინტერვალით. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 200-400 ლ/ჰა		
				იონჯის ხვატარი (უმცროსი ასკის მატლები)			
				მზომელები (უმცროსი ასკის მატლები)			
		ნგ/მ ²	დაუტვირთავი საწყობები	საწყობის მავნებლები	სველი დამუშავება. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 0.2ლ/მ ²	-(1)	-(1)
		2 (ა)	მუხა	ოქროკუდა (2-3 ხნოვანების მატლები), მოზამთრე და მცველუფია მზომელები (1-2 ასკის მატლები)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 10-25ლ/ჰა	-(1)	-(1)
		1-1.5 (ა)	მუხა	არაფარდი პარკხვევია (1-2 ასკის მატლები)	„	-(1)	-(1)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2კგ/ჰა 50-70 გ/10ლ	სალბი	მემოდგომის ნათესების ხვატარი და გამა ხვატარი (1-2 ასკის მატლები)	ვეგეტაციის პერიოდში მესხურება თითოეული თაობის წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალთ. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 200-400ლ/ჰა	5(3)	5(1)
		2-3 კგ/ჰა 50-70 გ/10ლ	უკვდავა (ნეგო) ამი კბილის ყვითელი ყაყაჩურა სამკურნალო გვირილა	მდელოს ფარვანა (1-3 ასკის მატლები)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 200-400ლ/ჰა	5(1)	5(1)
		3 კგ/ჰა 50-70 გ/10ლ	ეთერზეთო- ვანი ვარდი	მზომელები, ფოთლიხვევები (1-2 ასკის მატლები)	მესხურება გაფოთვლისას. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 400-600ლ/ჰა	5(1)	5(1)
		3 კგ/ჰა 50-70 გ/10ლ	კანაფი	მემოდგომის ნათესების და ბამბის ხვატარი	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 200-400ლ/ჰა	5(1)	5(1)
		3 კგ/ჰა 50-70 გ/10ლ	გულყვითელა (კალენდულა)გულ ყვითელი ნარგიზელა სამკურნალო კამა	მდელოს ფარვანა (1-3 ასკის მატლები)	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. სამუშო სითხის ხარჯვის ნორმა 200-400ლ/ჰა	5(1)	5(1)
		3 კგ/ჰა	ფშნის ევალი	ხვატრები (1-3 ასკის მატლები)	„	5(1)	5(1)
		3 კგ/ჰა	ნამდვილი რევანდი	მომღრნელი ხვატრები	მესხურება 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვის ნორმა 100-200ლ/ჰა	5(1)	5(1)
		3	ასკილი	ფოთლიხვევები	მესხურება კვირტების	5(1)	5(1)

		კგ/ჰა 50-70 გ/10ლ		(1-3 ასაკის მატლები)	გამოსვლისა და აკოვრების ფაზაში. სამუშო სიიხის ხარჯვის ნორმა 400-600ლ/ჰა		
ი)	ბოვერ-ჯი, ს Beauveria bassiana შტამი N - 024 (IMI 501797) 5.5 x 10 ¹⁰ სპორა /გ ა(ა)იპ საქართველოს აგარული უნივერსიტეტი საქართველო 1348	(ა) 2,5-3	წიწვონები	მბეჭდავი ქერქიჰამია Ips typograpus	შეხურების ჯერადობა 1-2 მატლებისა და ხოჭოების წინააღმდეგ.	–	
		(ა) 2,5-3	წიწვონები	ფიჭვის დიდი მებღაღ- Tomicus piniperda	შეხურების ჯერადობა 1-2 მატლებისა და ხოჭოების წინააღმდეგ .	–	
		(ა)2-2,5 2-2,5 ლ /ჰა	ტყე მერქნიანი სასოფლო- სამეურნეო კულტურები, ურბანული კულტურები	მოზამთრე მზომელა Eranis defoliara	1,2,3,4, ხნოვანების მატლების, 7 დღიანი ინტერვალით. შესხურების ჯერადობა სეზონის განმავლობაში.	–	
		2-2,5	ტყის და ურბანული კულტურები	ამერიკული თეთრი პეპელა Hypanthria cunea	1,2,3,4, მატლების (ნიმფების) და იმაგოების წინააღმდეგ სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების დამუშავება. შესხურების ჯერადობა საჭიროებისამებრ	–	
		(ა)2-2,5	ბზა	ბზის ალურა Cydalima perspectalis	1,2,3,4, ხნოვანების მატლების, 7 დღიანი ინტერვალით. შესხურების ჯერადობა სეზონის განმავლობაში საჭიროებისამებრ	–	
		2-2,5	სასოფლო სამეურნეო კულტურები ერთწლიანი და მრავალწლიანი	აზიური ფაროსანა, Haliomorpha halys	1,2,3,4,5 მატლების (ნიმფების) და იმაგოების წინააღმდეგ სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების დამუშავება. შესხურების ჯერადობა 2- 3 საჭიროებისამებრ	–	
კ)	ბრენდონი, წზგრ 50 გ/კგ (ემამექტინ ბენზოატი) „მაკკილნლი ტრედიინგ ლკ“ ირლანდია 1478	0,15-0,3	ვაშლი, მსხალი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, წითელი ტკიპა, ბუგრები, ფოთლის მენაღმეები, არაფარდი პარკვევია, ვაშლის ნაყოფჰამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და მავნებლების გამოჩენისთანავე, 7-14 დღიანი ინტერვალით	7(3)	2(1)
		0,15-0,3	ვაზი	ყურძნის ჰია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	8(1)	3(-)

		0,15-0,3	კომბოსტო	ჩრჩილი, თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნებისა და კვერცხდების გამოჩენისთანავე	7(2)	2(1)
		0,15-0,3	პამიდორი	ჩვეულებრივი აბალაზუდიანი ტკიპა, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე, 7-14 დღიანი ინტერვალით	7(2)	3(-)
		0,15-0,3	კიტრი	ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით	7(2)	3(-)
		0,15-0,3	სიმინდი	მარცვლეულის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით	7(2)	2(1)
		0,3	ბადრიჯანი, წიწაკა	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(2)	3(-)
ლ)	დეკაპრიონი, ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) „მაკკინლი ტრეიდიנג ლპ“ ირლანდია 1481	0,75	ვაშლი, მსხალი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები, არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და მავნებლების გამოჩენისთანავე	14(1-3)	2(1)
		0,5-1,2	ვაზი	ტკიპები, ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე, მავნებლის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით	14(2-3)	2(1)
		0,3-0,45	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბალაზუდიანი ტკიპა, ბაღის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14-დღიანი ინტერვალით.	5(2)	3(-)
		0,3-0,7	ციტრუსები	ტკიპები, თრიფსები, ფარიანები, ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით	14(1-2)	2(1)
		0,5-1,2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	2(1-2)	1(-)
		0,5	კომბოსტო, სალათა	ჩრჩილი	„	8(2)	2(1)
		0,3	წიწაკა,	წითელი ტკიპა, პამიდორის ჟანგა ტკიპა, მენადმე ბუზი, პამიდორის მენადმე	„	5(3)	2(1)

			ბადრიჯანი	ჩრდილი, კალიფორნიის თრიფსი			
		0,5-1,2	ყვავილოვანი კულტურები	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	3(3)	3(-)
მ)	ეფდალ ემაზენი 5 წდგრ, 50 გ/კგ (ემამექტინი ბენზოატი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1387	2, 5	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	10(1)	3(-)
		0.3-0.4	პომიდორი (ღია გრუნტი) (დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-1000 ლ/ჰა	7(1-4)	3(-)
		0.4 0.3	კიტრი (დახურული გრუნტი) კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა ”	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 1800 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 500-800 ლ/ჰა	7(2) 7(1-2)	3(-) 3(-)
		0, 3	ბადრიჯანი, წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1-2)	3(-)
		0.3-0.4	ნესვი საზამთრო	ბახჩის ბუგრი ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები ”	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 600 ლ/ჰა	7(1-2) 7(4-6)	3(-) 3(-)
		0.3-0.4	პომიდორი (ღია გრუნტი) (დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14- დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 400-1000 ლ/ჰა	7(1-4)	3(-)
6)	ეფდალ მექტინი, 18 ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1225	0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (I ასაკის მატლები)	7(1-2)	2(1)
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ბახჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14-	5(2) 5(1-2)	3(-)

			გრუნტი)		დღიანი ინტერვალით		
		0.3-1.2	ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	„	5(2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	“	5(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	“	7 (1-2)	3(-)
ო)	ვერტამექტინ ფორტე, წდგრ 50 გ/კგ (აბამექტინი) (თ), (1) „დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 1063/19	0.16	პომიდორი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ფოთლის მენადმე ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7- 10- დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 500-600 ლ/ჰა	3 (3)	3(-)
		0.16	კიტრი	ბახჩის ბუგრი ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14- დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა – 500-600 ლ/ჰა	3(3)	3(-)
		0.18	ვაშლი მსხალი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები ფსილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე 7-14- დღიანი ინტერვალთ	3(1-2) 3(2)	2(1)
		0.16	ვაზი	ტკიპები, ჭრიჭინოზებლები, კვირტის ჭია ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	3(3) 3(3)	2(1)
		0.16	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე	3(1-2)	2(1)
		0.16	დეკორატიული მცენარეები	ყვავილების თრიფსები მენადმე ჩრჩილები ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	3 (3)	3(-)
პ)	ვერტეკი, ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) „ერთარ ქიმა ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1230	0, 75-1, 5 0, 75-1, 5	ვაშლი მსხალი	ფოთლის მენადმეები, ტკიპები, ბუგრები, პარკიხვევია ტკიპები, ფსილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით,	7(1-2)	2(1)
		0, 6-1, 2	ვაზი	ყურძნის ჭია, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I –II თაობის წინააღმდეგ შესხურება ვეგეტაციის	7(1-2)	2(1)

					პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით		
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (I ასაკის მატლები)	7(1-2)	2(1)
		0, 3-0, 5	კაკალი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	5(1-2)	3(-)
		0, 3-0, 6	კომბოსტო	ჩრჩილი, თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი, ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველივე ნიშნების გამოჩენისას	5(1-2)	3(-)
		0, 6-1, 2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის 1 ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ 50% გამოსული კვერცხებიდან	1 (2)	1(-)
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი წიწკა ბადრიჯანი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა ბაზის ბუგრი წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა თრიფსები ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით	5(2)	3(-)
		0, 3-1, 2	ბაჩყელი კულტურები	ფოთლის მენაღმეები, თრიფსები, ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	5(2)	3(-)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენაღმე ჩრჩილები ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	„	7 (1-2)	3(-)
ჟ)	ვერტიმეკი 018 ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი)	1-1.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	3(3)	3(-)
	(თ), (1) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ”	0.5	ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	“	“	3(3)	3(-)
	შვეიცარია 566/10/15	0.75-1.5	ვაშლი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	არაფარდი პარკვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2(1-3)	2(1)
		0.75-1.5	მსხალი	ტკიპები, ფსლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	კომბოსტო	ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების	2 (1-2)	2 (1)

					პირველი ნიშნების ას, კვერცხდების გამოჩენისთანავე		
		0.3-0.5	“	თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2 (1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	“	ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისამებრ	2 (1-2)	2(1)
		0.6-1.2	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით	2(2-3)	2(1)
		0.6-1.2	“	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	ფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	გრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (ასაკის მატლები)	2(1-2)	2 (1)
		0.6-1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ, 50% გამოსული კვერცხდებიდან	1(2)	1(-)
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი, წიწაკა(ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	3(2)	3(-)
		0.3-1.2	“	ბახჩის ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14-დღიანი ინტერვალით	3(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ბახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	3(1-2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	“	2(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენაღმე ჩრჩილები, ბუერები, სათბურის ფრთათეთრა	“	3 (1-2)	3(-)
რ)	კლიპი წხგრ, 50 გ/კგ (ემამექტინი ბენზოატი) (თ), (1) „აგრო ლაიფ საიენს კორპორეიშენ.“	3,0	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	6(3)	3(-)

	ინდოეთი 1401						
		0.5 0,4-0,5	პომიდორი (ღია გრუნტი) (დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენიდან 7-14-დღიანი ინტერვალით.	4(3) 3(2)	3(-)
		0.4-0,5 0.5	კიტრი (დახურული გრუნტი) კიტრი (ღია გრუნტი)	ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14 დღიანი ინტერვალით.	3(2) 4(5)	3(-)
		0.5	ნესვი საზამთრო	ბახჩის ბუგრი ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები ”	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენიდან 7-14-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 600 ლ/ჰა	4(7)	3(-)
ს)	კრაფტი 18 ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) „ ქემინოვა ა/ს“ დანია 1183	1-1.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი) წიწვოვანი კულტურები ხეივანები, პარკები	წაბლის ფოთლის მენადმე, ფიჭვის ჩრჩილი, ბუგრები, წითელი ტკიპა, კრაზანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილისთანავე და 7 დღის ინტერვალით	3(3)	3(-)
		0.75-1.5 0, 7-1	ვაშლი	წითელი ხეხილის ტკიპა აბლაბუდიანი ტკიპა, ჟანგარა ტკიპა, ფოთლის მენადმე ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე. ემატება მინერალური ზეთი 2, 5% კონცენტრაციით	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5 0, 7-1	მსხალი	მსხლის ფსილა, წითელი ხეხილის ტკიპა აბლაბუდიანი ტკიპა, ჟანგარა ტკიპა, ფოთლის მენადმე ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე. ემატება მინერალური ზეთი 2, 5% კონცენტრაციით	2(1-2)	2 (1)
		0.75-1.2	ვაზი	წითელი ხეხილის ტკიპა, აბლაბუდიანი ტკიპა, ყვითელი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით	2(2-3)	2(1)
		0.6-1.2	*	ყურძნის ჭია, ყვითელი ფოთლიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5 0, 4-0, 75	ციტრუსი	ციტრუსის წითელი ტკიპა, აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური	2(1-2)	2(1)

				ციტრუსის მენაღმე	ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე		
		0.8-1 0.3-1.2 0, 75-1, 2	პომიდორი, (ღია და დახურული გრუნტი)	პამიდვრის მენაღმე ბუზი, ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა წითელი ტკიპა, პამიდვრის ჟანგარა ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი, პამიდვრის მენაღმე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 3-4- დღიანი ინტერვალით	3(2)	3(-)
		0.3-1.2 0, 75-1, 2	კიტრი, წიწაკა, ბადრიჯანი, ნესვი	წითელი ტკიპა, პამიდვრის ჟანგარა ტკიპა, მენაღმე ბუზი პამიდვრის მენაღმე ჩრჩილი, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე (ან კვერცხის ჩამოყალიბებისას) და 7- 10-დღიანი ინტერვალით	3(1-2)	3(-)
		0, 5-1 0.3-1.2	სალათა	ტკიპები, მენაღმე ბუზი	„	3(2)	3(-)
		0.5-1.2 0, 75-1, 2 0, 5-1	ხენდრო	ტკიპები კალიფორნიის თრიფსი მენაღმე ბუზი	„	2(1-2)	2(1)
		0.6-1.5 0.5	დეკორატიული მცენარეები ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	მენაღმე ბუზი ტკიპები კალიფორნიის თრიფსი	„	3(3)	3(3)
ტ)	ლეპიდინი სკ ბა-2000 აე/მგ (Bacillus thuringiensis, var. Kurstaki, შტამი BA1, სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი) მპს „ბიოაგრომცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი“ საქართველო 1000/18	2-3	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი, თხილი	ვაშლის და ხეხილის ჩრჩილები (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღ- მდეგ, 7-8-დღიანი ინტერვალით	2(1-2)	2(1)
		2-3	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი, თხილი	ამერიკული თეთრი პეპელა (1-3 ხნოვანების მატლები)	“	2(1-2)	2(1)
		2, 5	დეკორატიული მერქნიანი მცენარეები	ოქროკუდა, მზომელები, გაზაფხულის ჯგუფის ფოთლიხვევი ები, პარკიხვევიები (1-3 ხნოვანების მატლები)	“	2(1-2)	2(1)
		3-4	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჟამია	შესხურება მატლების მასობრივი გამოსვლისას მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ, 10- 14-დღიანი ინტერვალით	2(1-3)	2(1)
		2-3	ხურტკმელი, მოცხარი, კოლო,	ფოთლიხვევი ები, ხურტკმელის	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის	2(1-2)	2(1)

			მარწყვი, ძახველი, ცირცელი შავნაყოფიანი	ალურა, ხურტკმელის ხერხია (1-3 ხნოვანების მატლები)	ყოველი თაობის წინააღ- მდეგ, 7-8-დღიანი ინტერვალით		
		1	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, იონჯა, მზესუმზირა, სტაფილო, კომბოსტო	მდელოს ფარვანა (1-3 ხნოვანების მატლები)	1-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ, 7-8-დღიანი ინტერვალით	2(1-2)	2(1)
		2-3	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი	ტუბერების ჩაძირვა 1, 5- 2% სამუშაო ხსნარში შენახვის წინ. ხარჯი – 100ლ/10-15ტ ტუბერზე	-(1)	-(1)
		2-4	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პეპლების ფრენის დაწყებიდან 8-10 დღის შემდეგ, 1-2 დამუშავება 5-7 დღეში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		2-3	საგაზაფხულო ხორბალი	მარცვლეულის ხვატარი (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 100 თავთავზე 15- 20 ინდივიდის (უმცროსი ასაკის მატლები) რაოდენობისას	2(2)	-(1)
		2, 5 3-4	კომბოსტო და სხვა ბოსტნეული	კომბოსტოს და თალგამის თეთრულები (1-3 ხნოვანების მატლები), კომბოსტოს ალურები, ჩრჩილები (1- 2 ხნოვანების მატლები) ხვატრები (1-2 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღ- მდეგ, 7-8-დღიანი ინტერვალით	2(1-2) 2(2)	2(1)
		2-3	მუხა	ოქროკუდა (2-3 ხნოვანების მატლები), მუხის მწვანე ფოთლიხვევია (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	-(1)
		3-4	მუხა, არყი	არაფარდი პარკხვევია (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1-2)	-(1)
		3-4	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია (1-3 ხნოვანების მატლები), მონაზონა, ფიჭვის მზომელა და ფიჭვის ხვატარი (1-2 ხნოვანების მატლები)	“	-(1)	-(1)
		3-4	ქალაქის მწვანე ნარგავები	ზაფხულ-შემოდგომის ქერცლფრთიანთა კომპლექსი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(2)	2(1)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2	ხარისვარდა	ხარისვარდასი და მოზამთრე ხვატარი, ხვატარი-გამა (1-3 ხნოვანების მატლები),	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1-2)	5(1)
		2-3	კატაბალახა	მდელოს ფარვანა (1-3 ხნოვანების მატლები),	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(2)	5(1)
		2-3	გულყვითელი (კალენდულა))	მდელოს ფარვანა, ხვატრები (1-3 ხნოვანების მატლები),	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-4 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(2)	5(1)
		2-3	გვირილა	“	“	5(2)	5(1)

			სამკურნალო				
		2-3	ვარდი ეთერზეთოვანი	მოზამთრე მზომელა, ფოთლისხვევი ები (1-2 ხნოვანების მატლები)	“	2(1-2)	5(1)
უ)	ლეპიდოციდი სკ-მ ზა-2000 აე/მგ ((Bacillus thuringiensis, var. Kurstaki სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი) (4) “მპს სგ სიბზიოფარმი” რუსეთი მპს „აგრიდა“ საქართველო 204/08/14/19	0.5-1	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	ვაშლის და ხეხილის ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღ-მდეგ, 7- 8-დღიანი ინტერვალით	5(1-2)	5(1)
		1	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი, დეკორატიული მერქნიანი ნარგავები	ამერიკული თეთრი პეპელა	“	5(1-2)	5(1)
		1-1.5	“	ოქროკუდა, მზომელები, გაზაფხულის ჯგუფის ფოთლისხვევიები	“	5(1-2)	5(1)
		2-3	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჰამია	შესხურება მატლების მასობრივი გამოსვლისას მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ, 10- 14-დღიანი ინტერვალით	5(1-3)	5(1)
		1-1.5 3 (ა)	ხეხილისა და დეკორატიული მერქნიანი მცენარეები ხეხილისა და ტყის ჯიშები	ამერიკული თეთრი პეპელა არაფარდი პარკიხვევია ამერიკული თეთრი პეპელა არაფარდი პარკიხვევია (მასობრივი გავრცელების დროს)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 3- 14-დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		1-1.5	ხურტკმელი, მოცხარი, ყოლო, მარწყვი	ფოთლისხვევიები, ხურტკმელის ალურა, ხურტკმელის ხერხია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7- 8-დღიანი ინტერვალით	5(1-2)	5(1)
		1	მაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, იონჯა, მხესუმზირა, სტაფილო, კომბოსტო	მდელოს ფარვანა	1-2 შესხურება ვეგეტაციის პერი-ოდში მავნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7- 8-დღიანი ინტერვალით	5(1-2)	5(1)
		1	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი	ტუბერების ჩაძირვა 1% სამუშაო ხსნარში შენახვის წინ. ხარჯი – 100ლ/15ტ ტუბერზე	-(1)	-(-)
		2-3	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პეპლების ფრენის დაწყებიდან 8-10 დღის შემდეგ, 1-2 დამუშავება 5-7 დღეში	5(1-2)	5(1)

					მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ		
		1	საგაზაფხულო ხორბალი	მარცვლეულის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 100 თავთავზე 20 ინდივიდის (უმცროსი ასაკის მატლები) რაოდენობისას	5(1)	-(1)
		0.5-1 1.5-2	კომბოსტო და სხვა ბოსტნეული	კომბოსტოს და თაღამის თეთრულები, ჩრჩილები ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღ-მდეგ, 7- 8-დღიანი ინტერვალით	5(1-2)	5(1)
		3(ა)	მუხა	ოქროკუდა, მუხის მწვანე ფოთლიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	-(1)
		3(ა)	მუხა, არყი	არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	-(1)
		3 (ა)	მუხა და სხვა ფოთლოვანი ჯიშები	მოზამთრე ცქვლეფია მზომელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატ- ლების წინააღმდეგ	-(1)	-(1)
		3 (ა)	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია	“	-(1)	-(1)
		3 (ა)	“	მონაზონა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	-(1)
		3	ქალაქის მწვანე ნარგავები	ზაფხულ-შემოდგომის ქერცლფრთიანთა კომპლექსი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	5(1)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2	(სალბი	სალბის და მოზამთრე ხვატარი, ხვატარი-გამა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7- 8-დღიანი ინტერვალით	5(1-3)	5(1)
		0.5	ხარისვარდა	ხარისვარდასი და მოზამთრე ხვატარი, ხვატარი-გამა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1-2)	5(1)
		1	კატაბალახა	მდელოს ფარვანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1)	5(1)
		1.2	გულყვითელა (კალენდულა)	მდელოს ფარვანა, ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-4 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1)	5(1)
		1.2	დიდი კამა, ფშნის ეკალი	მდელოს ფარვანა, ფშნის და იონჯას ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1)	5(1)
		1.5	სამკურნალო მატრიკარია	მდელოს ფარვანა	“	5(1)	5(1)
		1.2	გვირილა სამკურნალო	“	“	5(1)	5(1)
		1.5	ვარდი ეთერზეთოვანი	მზომელები, ფოთლისხვევი ები	“	5(1-2)	5(1)
		2	ასკილი	ფოთლიხვევიები, ოქროკუდა, აბრეშუმ რკხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(1)	5(1)
		1.5	ძალყურძენა	მოზამთრე ხვატარი	შესხურება 2-3 ფოთლის ფაზაში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(2)	5(1)

ვ)	ნემიციელი®, ფ (Steinernema feltiae, 100 გ/კგ, 2*10 ⁵ ნემატოდები/გ) „ ე-ნემა გმზს “ გერმანია 1204	150 მლნ (ეკნ) S.feltiae ინფექციური ოუვენილები 75მ ² ფართობზე	შამპინიონები (სათბურის პირობებში) ბოსტნეული დეკორატიული მცენარეები	სოკოს კოლონები	ნიადაგის მულჩირებისას მისი შეტანა ნიადაგში ან საირიგაციო სისტემაში ჩართვა.	- (3-4)	-(-)
		300 მლნ (ეკნ) S.feltiae ინფექციური ოუვენილები 150მ ² ფართობზე	შამპინიონები (სათბურის პირობებში) ბოსტნეული დეკორატიული მცენარეები	სოკოს კოლონები	ნიადაგის მულჩირებისას მისი შეტანა ნიადაგში ან საირიგაციო სისტემაში ჩართვა.	- (3-4)	-(-)
ქ)	ნიმბეციდინი, ეკ (აზადირაქტინი 0,3 გ/ლ) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“	6	ხეხილი	ნაყოფჭამიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მასობრივი გამოჩენისთანავე, წინასწარ ყვავილობის ეტაპამდე , ნაყოფის გამონასკვის ეტაპზე და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	- (3)	-(-)
	თურქეთი 1298	5-6	ხეთისხილი	ხეთის ხილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მასობრივი გამოჩენისთანავე, წინასწარ ყვავილობის ეტაპამდე , ნაყოფის გამონასკვის ეტაპზე და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	- (3)	-(-)
		5-6	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიათი ბაღლინჯო ბაღლინჯოები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების ნიმფების გამოჩენისთანავე, წინასწარ ყვავილობის ეტაპამდე , ნაყოფის გამონასკვის ეტაპზე და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	- (3)	-(-)
		7-10	ციტრუსი	ციტრუსების ფქვილისეჭრი გრუფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში წინასწარ ყვავილობის ეტაპამდე , ნაყოფის გამონასკვის ეტაპზე და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	- (3)	-(-)
		5	ვაზი	ყურმის ჭია ჭიჭინობელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ყვავილობამდე, ისვრილობის ფაზაში და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	- (3)	-(-)

		3	ჰამიდორი ბადრიჯანი წიწაკა (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა კალიფორნიული თრიფსი ატმის ბუგრი ბახჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მასობრივი გამოჩენისას, ყოველი თაობის მიმართ 10 დღიანი ინტერვალით	- (3)	-(-)
		5	თამბაქო	თამბაქოს თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	- (3)	-(-)
		0,5 მლ/მ2/1 ლ წყალში	სათბურის კამა სოკო	ორფრთიანი ბუზები Sciaridae, Phoridae, Cecidae ოჯახებიდან	სოკოს მიცელიუმის სუბსტრატის ორჯერადი მორწყვა 10 დღის ინტერვალით	- (2)	-(-)
დ)	ნოსტალჯისტი BL, წხ (Beauveria bassiana შტამი Bb-1, 1, 5%, 1*10 ⁸ CFU სპორა/მლ) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ.იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1236	6 მლ/მ ²	სათბურის სოკო (შამპინიონები)	ორფრთიანი ბუზები Sciaridae, Phoridae, Cecidae ოჯახებიდან	სოკოს მიცელიუმის სუბსტრატის მორწყვა 7-8-დღიანი ინტერვალით. არ გამოიყენება კომბინაციაში პესტიციდებთან და სასუქებთან	- (2-3)	-(-)
		6 ლ/ჰა	თხილი ხეხილი ბოსტნეული	ყავისფერი მარმარა სუნიათი ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ნიმფების გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით	- (3-4)	-(-)
ე)	პორსელენი, წხგრ (ემამექტინი ბენზოატი 50 გ/კგ) (თ), (1) „შანდონგ ვეიფანგ რეინბოუ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1460	0,4	ვაშლი	ჩვეულბრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, წითელი ტკიპა, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები, არაფარდი პარკხვევია, ვაშლის ნაყოფჰამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და მავნებლების გამოჩენისთანავე, 7-14 დღიანი ინტერვალით	3(1-4)	2(1)
		0,3	ვაზი	ყურმის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წიანააღმდეგ	7(1-4)	3(-)
		0,4	ჰომიდორი (ღია გრუნტი)	ჩვეულბრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე, 7-14 დღიანი ინტერვალით	3(1-3)	3(-)
შ)	პროგრანიგამმა, წხ (Garlic extract ნივრის ექსტრაქტი-Allium sativum 25%+Chilly Pepper extract ცხარე წიწაკის ექსტრაქტი 25%+ Cinnamon Extract დარიჩინის ექსტრაქტი Cinnamomum zeylanicum 10%) “ულტრაქუიმიდა აგრიკოლა, ს.ა.დე სი.ვ.” მექსიკა 1445	3.0-5.0 ლ/ჰა	ვაზი (NL)*	ვაზის ჭიჭინობელა (Erythroneura imeretina)	სრულდება შესხურება წვეთოვანი სისტემით ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით, როდესაც დაზიანების პირველი ნიშანები გამოვლინდება. შესხურება 450-550 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე NL*-შეზღუდვა არ არის	-(3)	

		2.0-3.0 ლ/ჰა	მოცვი, ჟოლო, მარწყვი, მოცხარი, ანწლი, მაყვალ (NL)*	Drosophilla (Drosophilla Suzuki)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით, როდესაც დაზიანების პირველი ნიშანები გამოვლინდება. წყლის pH -7 შემცველობა და გამოვიყენოთ თეთრ შემავსებელთან ერთად 0.5 მლ /ლ-წყლზე შესხურება 170-270 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე	-(3)	
		1.0-2.0 ლ/ 200ლ წყალზე	ნიორი, ხახვი, მწვანე ხახვი, სატაცური (NL)*	ხახვის თრიფსი (Trips tabaci) ან (Onion thrips)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით	-(3)	
		1.5- 2.0 ლ/200ლ წყალ ში	ბადრიჯანი, წიწკა, პომიდორი, ტკბილი წიწკა (ბულგარულ ი)(NL)*	სათბურის ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით	-(3)	
		1.5- 2.0 ლ/ჰა	კიტრი, ყაბაყი, გოგრა, ნესვი , საზამთრო (NL)*	სათბურის ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით, შესხურება 550-650 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე	-(3)	
		1.5- 2.0 ლ/ჰა	წვრილი პომიდორი , კარტოფილი (NL)*	სათბურის ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე 7 დღის ინტერვალით. როდესაც დაზიანების პირველი ნიშანები გამოვლინდება. დაცვის ვადა სულ მცირე 21 დღე; შემოთავაზებული შესხურების წყლის მოცულობა 300-400 ლ/ჰა	-(3)	
ბ)	პროგრანიკ*ნიმბაკარ, ექ (Neem Extract მცენარე ნიმის ექსტრაქტი- Azadirachta indica 55%+Cinnamon Extract დარიჩინის ექსტრაქტი - Cinnamomum zeylanicum 15%) "ულტრაქუიმი აგრიკოლა, ს.ა.დე სი.ვ." მექსიკა 1444	1.0-3.0 ლ/ჰა	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus urticae), ყურმის ჭია (Lobesia botrana)	სრულდება შესხურება წვეთოვანი სარწყავი სისტემით ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით, როდესაც პირველი ნიშნები დაზიანების შეიმჩნევა. შესხურება 500-600 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე	-(3)	
		1.0-2.0 ლ/ჰა	ნიორი, ხახვი, მწვანე ხახვი, სატაცური	ხახვის თრიფსი (Trips tabaci) ან (Onion thrips)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 8 დღის ინტერვალით, ადექვატური ბრძოლის ლონისძიების უზრუნველსაყოფად, უნდა გამოვიყენოთ შემავსებელთან ერთად 0.6 მლ /ლ-წყლზე. შესხურება 450 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(2)	
		1.5-2.0 ლ/ჰა	ბადრიჯანი, წიწკა,	სათბურის ფრთათეთრა	სრულდება შესხურება 3 -	-(3)	

			პომიდორი, ტკბილი წიწაკა (ბულგარული)	(Trialeurodes vaporariorum) თამბაქოს ფრთათეთრა (Bemisia tabaci)	ჯერ, 7დღის ინტერვალით.		
		1.5-2.0 ლ/ჰა	ყაზაყიკიტრი, გოგრა, ნესვი, საზამთრო	(დასავლეთის) ყვავილების თრიფსი (Frankliniella occidentalis)	სრულდება მცენარის ფოთლების შესხურება 7დღის ინტერვალით. შესხურება 550-650ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		1.0-3.0ლ/ჰა	პომიდორი, წიწაკა, ტკბილი წიწაკა, კარტოფილი	პომიდორის ჟანგა ტკიპა (Vasates Lycopersici)	სრულდება შესხურება წვეთოვანი სარწყავი სისტემით ფოთლებზე, ფოთლებზე 7 დღის ინტერვალით. როდესაც ტკიპის პირველი დაზიანება გამოჩნდება. წყლის მორგება pH 6- 7-ზე. დამატება შემავსებელის 0.5 მლ /ლ-წყალზე. შესხურება 330-430 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		1.5-3.0 ლ/ჰა	ციტრუს-ლიმონი, მანდარინი, ფორთოხალი გრეიფრუტი	ვერცხლის-ფერი ტკიპა (Phyllocoptruta Oleivora), ციტრუსების (ნარინჯოვა-ნთა)ზუგრი, ჩაის ზუგრი (Toxoptera aurantii), ციტრუსების ფქვილისებრი ცრუფარიანა (Pseudococcus Gahani)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 21 დღის ინტერვალით. შესხურება 500 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
ვ)	პროვეტ® ოვი-დიე, წზ (Diocytlsulfosuccinate sodium salt მცენარე წიწის ცხიმოვანი მჟავების კალიუმის მარილები , ნატრიუმის მარილები 70%) “ულტრაქუიმი აგრიკოლა, ს.ა.დე სი.ვ.” მექსიკა 1443	0.25-1.0 ლ/200ლ წყალზე	ნიორი, ხახვი,მწვანე ხახვი, სატაცური	ხახვის თრიფსი (Trips tabaci) ან (Onion thrips), ხახვის (ფესვის) ტკიპა (Rhizoglyphus enhinopus), ნივრის ტკიპა (Eriophyes tulipae)	სრულდება 3-ჯერადი შესხურება ფოთოლეებზე 7 დღის ინტერვალით შესხურება 450 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		1.0 ლ/200 ლ წყალზე	ბადრიჯანი, წიწაკა, პომიდორი, ტკბილი წიწაკა (ბულგარული) (NL) *	სათბურის ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum)	სრულდება 3-ჯერადი შესხურება ფოთოლეებზე 7 დღის ინტერვალით. რეგულირდება წყლის pH, 7-მდე	-(3)	
		1.5-2.0 ლ/ჰა	კიტრი, ყაზაყი,გოგრა, ნესვი, საზამთრო (NL) *	ბაღის ზუგრი (Aphis gossypii), ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus urticae)	სრულდება მცენარის ფოთლების შესხურება 500-600ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	

					NL*-შეზღუდვა არ არის		
		1.5-2.0 ლ/ჰა	კარტოფილი, პომიდორი	პომიდორის ჟანგა ტკიპა (Vasates Lycopersici)	სრულდება მცენარის შესხურება ფოთლებზე, როდესაც ტკიპის პირველი დაზიანება გამოჩნდება. წყლის მორგება pH 6- 7- ზე. დამატება შემავსებელის 0.5 მლ /ლ- წყალზე. შესხურება 300-400 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე	-(3)	
		1.0-1.5 ლ/ჰა	კომბოსტო	კომბოსტოს ბუგრი (Brevicoryne brassicae)	სრულდება მცენარის შესხურება ფოთლებზე, როდესაც ბუგრის პირველი დაზიანება გამოჩნდება. წყლის მორგება pH 6- 7-ზე. დამატება შემავსებელის 0.5 მლ /ლ-წყალზე. შესხურება 300-400 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე	-(3)	
d)	პროკლეიმი 05 წზგრ, 50 გ/კგ (ემამექტინი ბენზოატი) (თ), (1) „სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ“ შვეიცარია 756/15	0.3-0.4	ვაშლი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(1-4)	2(1)
		0.3-0.4	„	წითელი ტკიპა	ტკიპების და მავნებლების	3(1 -4)	2(1)
		0.3-0.4	„	მენადმეები არაფარდი პარკვევია ფოთლიხვევიები ვაშლის ნაყოფჰამია	გამოჩენისთანავე, 7-14- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400- 1000 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-IIK კვერცხდების გამოჩენისთანავე. ხარჯვა – 400- 1000 ლ/ჰა მატლების გამოჩენისთანავე 7-14- დღიანი ინტერვალით ხარჯვა – 400- 1000 ლ/ჰა	3 (1-3)	2(1)
		0.3	კომბოსტო	ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების	7(1-2)	2(1)
		0.3-0.4	„	თეთრულები, კომბოსტოს	პირველი ნიშანებისა და კვერცხდების	7(1-2)	2(1)
		0.3	კომბოსტო	ხვატარი ფოთლის მენადმეები	გამოჩენისთანავე. ხარჯვა – 571 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების. ხარჯვა – 571 ლ/ჰა კვერცხდების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	2(1-2)	2(1)
		0.3-0.4	პომიდორი ღია გრუნტი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14-	3(1-4)	3(-)

					დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-1000 ლ/ჰა		
		0.4 0.3	კიტრი (დახურულ გრუნტში) კიტრი ღია გრუნტი	ბუერი, სათბურის ფრთათეთრა „	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 1800 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 500-800 ლ/ჰა	2(2) 7(1-2)	3(-) 3(-)
		0.3-0.4	ბახჩეული კულტურები ნესვი საზამთრო	ბახჩის ბუერი ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები „	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 600 ლ/ჰა	7(1-2) 7(4-6)	3(-) 3(-)
		0.3-0.4	სიმინდი	მარცვლეულის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 500-800 ლ/ჰა	7 (1-2)	2(1)
წ)	სპინტორი, სკ 240 გ/ლ (სპინოსინ A + სპინოსინ D) (თ), (1) “დაუ აგრო საენსესი ვმზხ ” ავსტრია 612/13/19	0.3- 0.5	კიტრი პამიდორი (დახურული გრუნტი)	თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3-0.4% სამუშაო ხსნარით 7- 10- დღიანი ინტერვალით	3 (2)	2(1)
		0.3-1.2	წიწკა ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	თრიფსები	“	5 (2-4)	2 (1)
		0.1-0.15 0.2-0.3	კომბოსტო	კომბოსტოს და თაღამის თეთრულები კომბოსტოს ჩრჩილი კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(2)	2 (1)
		0.15-0.3	ვაზი	ფოთლიხვევიები ყურძნის ჭია აბლაბუდიანი ტკიპა	ერთი შესხურება ყურძნის ჭიის თითოეული თაობის მიმართ, მატლების გამოჩენისთანავე (I-III)	16(3)	2 (1)
		0.15-0.3	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(3)	2 (1)
		0.2-0.3	ატამი, ქლიავი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია	“	7(3)	2 (1)
		0.2-0.3	თხილი თუთა	ამერიკული თეთრი პეპელა	“	7(3)	2(1)
		0.2-0.3	პამიდორი	ბამბის ხვატარი კოლოფის ჭია	“	7(2-3)	2 (1)
		0.15-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო (1-4 ასაკის მატლები) კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-IV ხნოვანების მატლების გამოჩენისთანავე	15(2)	2 (1)
		0.2-0.75	დეკორატიული მცენარეები	თრიფსები ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.4-0.5% სამუშაო ხსნარით 7- 10- დღიანი ინტერვალით	5(2-4)	2 (1)

ჟ)	სპოდპელი 5 წზგ, 50 გ/კგ (ემამექტინი ბენზოატი) (თ), (1) „ასტრანოვა ტარ. ტიკ. ვე სან. ა.ს.« თურქეთი 1387	0,25-0,4	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	10(1)	3(-)
		0.3-0.4	პომიდორი (ღია გრუნტი) (დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-1000 ლ/ჰა	0.3-0.4	პომიდორი (ღია გრუნტი) (დახურულ ი გრუნტი)
		0.3	კიტრი (დახურულ გრუნტში)	ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა ”	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 1800 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 500-800 ლ/ჰა	0.3	კიტრი (დახურულ გრუნტში)
		0, 3	ბადრიჯანი, წიწაკა (დახურულ გრუნტში)	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1-2)	3(-)
		0.3-0.4	მიხაკი	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 600 ლ/ჰა	7(2) 7(4-6)	3(-) 3(-)
ბ)	ტერრა ნიმ ოილ, წზ (აზადირაქტინი 0,3 მლ/ლ) Neem-ის ხის ნაყოფის თესლების ზეთი „სან ბიო ნატურალი“ ინდოეთი 1426	3	მარცლოვნები (ხორბალი, ქერი, შვრია)	ხერხია, ცხვირგრძელა, ხვატარი, ჭიაწურბელა, თრიფსები, ბუგრები, პურისხოჭო, კალია, ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მატლების მასობრივი გამოჩენისთანავე (ბარტყობა, აღერება, დათავთავეების ფაზაში), მარცვლის სიმწიფის ფაზაში, მოსავთვის აღებამდე 10 დღით ადრე	-(3)	-(-)
		3	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ფარვანა, ხვატარი, ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მატლების მასობრივი გამოჩენისთანავე, და შემდეგ, მავნებლის რიცხოვნობის შესაბამისად	-(3)	-(-)
		3	პარკოსნები	ბუგრები, თრიფსები, ხვატრები, ცხვირგრძელა, ხერხიები, ბაღლინჯო	„	-(3)	-(-)
		3	ბოსტნეული (პომიდორი, ბადრიჯანი წიწაკა)	ფრთათეთრა, ხვატარი, თეთრულა კალიფორნიული თრიფსი, ბუგრები, (ატმის და ბაღჩის ბუგრი)	„	-(3)	-(-)

		3	პომიდორი, კიტრი, წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ჩრჩილი, ბაღლინჯო ტკიპები, ბუგრები, ხვატარი, ფრთათეთრა, თრიფსი, ბაღლინჯო	„	-(3)	
		3	სტაფილო	ხახვის ბუზი, ბუგრი, ხვატარი, ბაღლინჯო	„	-(3)	-(-)
		3	გოგროვნები	ბუგრები, ხვატარი, ნესვის ბუზი, ტკიპები, ბაღლინჯო	„	-(3)	-(-)
		5-6	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ფარიანები, ჩრჩილი, ბუგრები, არაფარდი პარკიხვევია, კოკრიჭამია, ფოთლიხვევია, სფინქსი, მინაფრთიანა, თრიფსები, ოქროკუდა, ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მატლების მასობრივი გამოჩენისთანავე, ყვავილობის ეტაპამდე, ნაყოფის გამონასკვის ეტაპზე და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	-(3)	-(-)
		5-6	კურკოვნები (გარგარი, ატამი, ქლიავე)	ნაყოფჭამია, ბუგრები, კოკრიჭამია, ბუგრები, ფსილა, ტკიპა, ატმის ცრუფარიანა, ქლიავის ნაყოფჭამია, თრიფსები, ხერხია, ცრუფარიანა, ბაღლინჯო	„	-(3)	-(-)
		5	ვაზი	კვირტის ჭია, ტკიპები, ცრუფარიანა, ყურმნის ჭია, მასის და ივნისის ღრაჭები, ფოთლიხვევი, ბაღლინჯო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ყვავილობის ეტაპამდე, ისვრილობის ფაზაში და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	-(3)	-(-)
		5-6	ზეთისხილი	ზეთის ხილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მატლების მასობრივი გამოჩენისთანავე, წინსაწარ ყვავილობის ეტაპამდე, ნაყოფის გამონასკვის ეტაპზე და მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	1	-(-)
		5	ლევდი	ჩრჩილი, ტკიპები, ალურა, ფარიანა, ცრუფარიანა, ბაღლინჯო	„	-(3)	-(-)
		5-6	თხილი	აზიური ფაროსანა, ბაღლინჯოები	„	-(3)	-(-)
		7-10	ციტრუსი	ციტრუსების ვერცხლისფერი ტკიპა,	„	-(3)	-(-)

				ციტრუსოვანთა, ფრთათეთრა, ცრუფარიანები, ფარიანები, ბუგრები, ბაღლინჯო			
		3	ბროწეული	ბუგრები, ფარიანები, ოქროკუდა, ტკიპები, ბაღლინჯო	„	-(3)	-(-)
		5	ნუში	ცხვირგრძელა, ბუგრები, ქერქიჭამია, პეწიანა, მინაფრთიანა, ფარიანები, ბაღლინჯო	„	-(3)	-(-)
		3-3.5	სატყეო და სასათბურე სანერგე მეურნეობებში	ფრთათეთრა, ბუგრები, ბაღლინჯო, ტკიპები, თრიფსები, ხერხიები, ხვატრები, ჩრჩილი, ქექრქიჭამიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მასობრივი გამოჩენისთანავე და შემდეგ, მავნებლის რიცხოვნობის შესაბამისად	-(3)	-(-)
		20 მლ/ 1ლიტრში	ოთახის დეკორატიული მცენარეები	ბუგრები, თრიფსები, ფარიანა, ცრუფარიანა, ჩრჩილი	„	-(3)	-(-)
გ)	ტინა, ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (I) „ინდუსტრიალ კუიმიკა ქეი, ს.ა. ესპანეთი 1244	0.75-1.5	ვაშლი	ტკიპები, ფოთლის მენადმე ჩრჩილები, ბუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე.	7(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	მსხალი	მსხლის ფსილა, ტკიპები, ფოთლის მენადმე ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე.	7(1-2)	2 (1)
		0.6-1.2	ვაზი	აბლაბუდიანი ტკიპა, გალებიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით	7(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	“	ყურძნის ჭია,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I-II თაობის წინააღმდეგ	7(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ვერცხლისფერი ტკიპა, აბლაბუდიანი ტკიპა, თრიფსები, ნარინჯოვანთა ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე	7(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ყვითელი ფარიანა, ყავისფერი ფარიანა, ჩინური ცვილისებრი ცრუფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ	7(1-2)	2(1)
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფოთლის მენადმეები, ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა კალიფორნიის თრიფსი, ბახჩის ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით	5(2)	3(-)

		0.3-1.2	ბახჩელი კულტურები	მენაღმე ჩრჩილები, ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	5(2)	3(-)
		0, 6-1, 2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ 50% გამოსული კვერცხებიდან	5(2)	3(-)
		0, 3-0, 5	კომბოსტო	ჩრჩილი ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნების და კვერცხების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(1-2)	3(-)
		0, 3-0, 6	კომბოსტო	თეთრულები კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I-II თაობის წინააღმდეგ	5(1-2)	3(-)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენაღმე ჩრჩილები ბუგრები სათბურის ფრთათეთრა	„	3(1-2)	3(-)
3)	ჯეო-ნემა, ნსდ (Steinernema feltiae, 25 მლნ. მაინფიცირებელი იუვენილი (IJ/L)/ლ მპს „მცენარეთა ბიოლოგიური კონტროლი საქართველოში“ საქართველო 1168	20×10 ⁵ IJ/s/მ ²	კარტოფილი	კარტოფილის კოლორადოს ხოჭო	მცენარეებისა და ნიადაგის დამუშავება იმაგობზე და 1-2 ხნოვანების მატლების მიმართ. შესხურება საჭიროებისამებრ. ხარჯვის ნორმა -2000 ლ/ჰა	(2-3)	-(-)
		15×10 ⁵ IJ/s/მ ²	კომბოსტო	კომბოსტოს ჩრჩილი	1-2 ხნოვანების მატლების მიმართ 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა-500- 700 ლ/ჰა	(2-3)	-(-)
		30×10 ⁶ IJ/s/მ ²	სიმინდი, ხორბალი, ქერი, შვრია	შემოდგომის ნათესების ხვატარი, ღრაჭები	ნიადაგში შეტანა ვეგეტაციის პერიოდში, თითოეული ხნოვანების მიმართ. ხარჯვის ნორმა- 2000 ლ/ჰა	(2-3)	-(-)
		20×10 ⁶ IJ/s/მ ²	ბულგარული წიწკა, ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	დასავლეთის ყვავილების თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა- 500 -600 ლ/ჰა	(3-4)	-(-)
		20×10 ⁶ IJ/s/მ ²	პომიდორი, კიტრი (სათბურის პირობებში)	სამხრეთ ამერიკული პომიდორის მენაღმე ჩრჩილი, სერპანტინისებრი მენაღმე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით ან საირიგაციო სისტემაში ჩართვა. ხარჯვის ნორმა- 500 -600 ლ/ჰა	(4)	-(-)
		20×10 ⁶ IJ/s/მ ²	მამპინიონები (სათბურის პირობებში)	სოკოს კოლოები	ნიადაგის მულჩირებისას მისი შეტანა ნიადაგში ან საირიგაციო სისტემაში ჩართვა. ხარჯვის ნორმა- 500 -600 ლ/ჰა	(4-5)	-(-)
		20×10 ⁶ IJ/s/მ ²	ყვავილოვანი დეკორატიული მცენარეები, გაზონები	დასავლეთის ყვავილების თრიფსი	მცენარეებისა და ნიადაგის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით	(4-5)	-(-)
		20×10 ⁶ IJ/s/მ ²	მწვანელი (სათბურის)	თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი	(4-5)	-(-)

			ვირობებში)		ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა- 600 -700 ლ/ჰა		
		50×10 ⁶ IJ/s/მ ²	ხეხილი	ვაშლის ნაყოფჰამია	ვარჯის ქვეშ შესხურება საჭიროებისამებრ შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე. ხარჯვის ნორმა- 2000 ლ/ჰა	-(4)	-(-)
3 ¹⁾	პიპნოზი 05 წზგრ, 50 გ/კგ (ემამექტინი ზენზოატი) (თ), (1) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1008/19	2, 5	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	10(1)	3(-)
		0.3-0.4	პომიდორი (ღია გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-14-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 400-1000 ლ/ჰა	7(1-4)	3(-)
		0.4 0.3	კიტრი (დახურულ გრუნტში) კიტრი (ღია გრუნტი)	ზუგრი, სათბურის ფრთათეთრა ”	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 1800 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 500-800 ლ/ჰა	7(2) 7(1-2)	3(-) 3(-)
		0, 3	ბადრიჯანი, წიწაკა (დახურულ გრუნტში)	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1-2)	3(-)
		0.3-0.4	ნესვი საზამთრო	ბახჩის ზუგრი ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები ”	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 600 ლ/ჰა	7(1-2) 7(4-6)	3(-) 3(-)
2.	ფუნგიციდები:						
ა)	ბაქტოფიტი, სკ ბა-10000 აე/მლ (Bacillus subtilis. შტამი იპმ 215, ტიტრი არანაკლები 2 მლრდ სპორა/მლ)	2-3	ხორბალი საშემოდგომო და საგაზაფხულო	ჰელმინტოსპორიოზულ ი სილაქავეები, სეპტორიოზი, მურა ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 300 ლ/ჰა	1(3)	1(-)
	(3) „შპს სგ სიბიოფარმი“ რუსეთი შპს „გეორგიკა+“ საქართველო 1193	3 ლ/ტ	“	ფუზარიოზული და ჰელმინტოსპორიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ოზი, სეპტორიოზი, მურა ჟანგა	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 1-5 დღე-ღამით ადრე. ხარჯვა – 10 ლ/ტ	-(1)	-(-)
		2-3	ქერი საგაზაფხულო	მუქი-მურა, ბადურა სილაქავეები, რინოზოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მილში გასვლისას და ათავთავების ფაზაში. ხარჯვა – 300 ლ/ჰა	-(1-2)	-(-)
		3 ლ/ტ	”	ფუზარიოზული და ჰელმინტოსპორიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ოზი, სეპტორიოზი, მურა ჟანგა	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 1-5 დღე-ღამით ადრე. ხარჯვა – 10 ლ/ტ	-(1)	-(-)

		3	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 8-10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 1000 ლ/ჰა. დასაშვებია გამოყენება სისტემებში სხვა ფუნქციებიდან ერთად	1(3-5)	-(-)
		2 მლ/კგ 6 7-14	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფესვის სიდამპლეები ნაცარი	თესლის თესვისწინა დაღობვა 0, 2%-იან ხსნარში 3-6 საათის განმავლობაში შემდგომი გაშრობით. ხარჯვა – 1, 0-1, 5 ლ/კგ მცენარის ფესვის ქვეშ მორწყვა ჩითილების დარგვისას და 3-4 კვირის შემდეგ. ხარჯვა – 3000 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას 6-10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 2000 ლ/ჰა.	- (1) 1(2) 1(3)	-(-)
		7-12	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას 8-10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 1500 ლ/ჰა.	1(2)	(1)-
		3-4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას 15-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 400 ლ/ჰა.	-(2)	- (1)
		4-5 მლ/კგ 5 მლ/ლ წყალზე 2 12	კომბოსტო (თავიანი, ყვავილოვანი, სათესლე ნაკვეთები)	ბაქტერიოზები ჩაწოლა	თესლის თესვისწინა დაღობვა 0, 5%-იან ხსნარში 3-6 საათის განმავლობაში შემდგომი გაშრობით. ხარჯვა – 1, 0-1, 5 ლ/კგ დარგვამდე ჩითილების და სადედეების ფესვების ამოზანვა 0, 5%-იან ხსნარში. ხარჯვა – 1 ლ/100 ფესვზე ჩითილების შესხურება დარგვის შემდეგ ერთ თვეში. ხარჯვა - 300-400 ლ/ჰა. მცენარის ფესვის ქვეშ მორწყვა ჩითილების დარგვის შემდეგ. ხარჯვა – 3000 -4000 ლ/ჰა	-(1)	- (-) (1)- - (-)
		7-10	ვაშლი	ნაცარი, ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	1 (3-4)	(1)-
		4-5	შავი მოცხარი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის	1 (2)	(1)-

					პერიოდში. ხარჯვა – 600-800 ლ/ჰა		
		3-4 6-8	ხენდრო	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 400 - 600 ლ/ჰა მცენარის ფესვის ქვეშ მორწყვა. ხარჯვა -4000 ლ/ჰა	1 (4) 1(3)	(1)- - (-)
		5-7	სვია	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 800 - 1000 ლ/ჰა	1 (4)	(1)-
		1 მლ/ლ წყალზე	მიხაკი (დახურული გრუნტი)	ფუზარიოზი	კალმის ჩასველება დარგვის წინ 0, 1%-იან ხსნარში 15 წუთის განმავლობაში. ხარჯვა – 1ლ/500-1000 კალამზე	-(1)	-(1)
		1-3 მლ/ლ წყალზე 5-7	ვარდი (დახურული გრუნტი)	ფუზარიოზი ნაცარი	კალმის ჩასველება დარგვის წინ 0, 1-0, 3% - იან ხსნარში 15 წუთის განმავლობაში. ხარჯვა – 1ლ/500-1000კალამზე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თვეში 1-2-ჯერ. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	-(1) -(2)	-(1) (1) -
		1, 5-2	პიტნა	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 400 - 600 ლ/ჰა	1(2)	(1) -
ბ)	ბიოკატენა, სკ (Trichoderma Koningii შტამი B-7 MDI, 5×10^9 სპორა/მლ ⁻¹) (3) „ბიოაგრო“ მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი საქართველო 1409	5-10 ლ/ჰა	კენკროვნები (ღია გრუნტი)	ნაყოფის სიდამპლეები და სხვ. ფესვის სიდამპლეები	ნიადაგის დამუშავება მოსვენებამდე ან დარგვამდე. დამუშავების ჯერადობა ადრე გაზაფხულზე და შუა ზაფხულში -2 ჯერ. ჩითილების დამუშავება ხდება გადარგვამდე, თითოეულ ნერგს ორმოში ჩაასხით 150-200 მლ სამუშაო ხსნარი . დარგვამდე ჩითილების ფესვები ჩააღბოთ ნიადაგით შესქელებულ სამუშაო ხსნარში-1 ჯერ	3 (1-2)	-(-)
		5-10 ლ/ჰა 8-10 ლ/ჰა	ხეხილი ვაზი	ვერტიცილოზი ნაყოფის სიდამპლეები ცილინდროკარპონოზი	ნიადაგის დამუშავება მოსვენებამდე ან თესვამდე-1 ჯერ ფოთლოვანი შესხურება სიმეტოვალების გაზაში-2 ჯერ	3(1-	-(-)
		როფილაქტიკური ონისმიებების ათვის 1-2 ლ/100 ლ წყალში სამკურნალო	ბოსტნეული და ბალჩეული კულტურები	ფესვის სიდამპლეები: ფუზარიოზული ვერტილიოზური, პითიოზური, რიზოქტონიოზური ჭკნობა	დამუშავების ჯერადობა ადრე გაზაფხულზე და შუა ზაფხულში -1-2. თესლის ჩაღბობა 2%-იან სამუშაო ხსნარში, 6-8 საათის ექსპოზიციით;	3(1-2)	-(-)ბ)

		ლონისძიებები სათვის 2-2,5/ 100 ლ წყალში 1ლ/500 მ² დახურულ გრუნტში გამოყენებისა თვის- ნიადაგის დამუშავება თესვის ან რგვის წინ			ჩითილების დამუშავება ხდება გადარგვამდე, თითოეულ ჩითილს ორმოში ჩაასხით 50 მლ სამუშაო ხსნარი. შესაძლებელია დარგვამდე ჩითილების ფესვები ჩააღბოთ ნიადაგით შესქელებულ 2-% სამუშაო ხსნარში		
		5-10 ლ/ჰა 250—500 გ/ჰა	ტექნიკური კულტურები კარტოფილი	ფესვის სიდამპლეები: ფუზარიოზული ვერტილიოზური, პითიოზური, რიზოქტონიოზური ჰკნობა ნაყოფის სიდამპლეები	ნიადაგის დამუშავება მოსვენებამდე ან თესვამდე დამუშავების ჯერადობა ადრე გაზაფხულზე და შუა ზაფხულში -1-2. ჩითილების დამუშავება ხდება გადარგვამდე, თითოეულ ჩითილს ორმოში ჩაასხით 100 მლ სამუშაო ხსნარი, შესაძლებელია დარგვამდე ჩითილების ფესვები ჩააღბოთ ნიადაგით შესქელებულ 2- % სამუშაო ხსნარში	3(1-2)	-(-)
		2-3 ლ/ტონა 6-8 ლ/ჰა	მარცვლოვნები (ხორბალი, ქერი, შვრია)	ფუზარიოზული ჰკნობა თესლის და ფესვის სიდამპლეები თესლის სველი ანუ მყალი გუდაფშუტა	თესლის დამუშავება დათესვამდე შემდგომი გამომშობით-1 ჯერ ნიადაგის დამუშავება მოსვენებამდე ან თესვამდე-1 ჯერ	2(1) 2(1)	-(-)
		20 მლ/1 ლ წყალი	დეკორატიული მცენარეები ქოთნის ყვავილები	ფუზარიოზული ჰკნობა ფესვის სიდამპლეები	ნიადაგის დეზინფექცია ჩითილის დარგვისას მორწყვა-1 ჯერ	-(1) -(1)	
		1 ლ/500 მ²	ტყის კულტურები (სანერგეები)	ფუზარიოზული ჰკნობა ფესვის სიდამპლეები პერონოსპოროზი	ნიადაგის დამუშავება რგვის წინ ფოთლოების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- 1- ჯერ	-(1) -(1)	
გ)	ოვნიერი, ფ (Ampelomyces quisqualis. მტამი Aq 1) 1.5%, 2X106 CFU „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	3	ჰამიდორი (დახურული გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველივე სიმპტომების გამოჩენიდან 7- 10 დღიანი ინტერვალით.	-(2-3)	-(-)

	თურქეთი 1314						
დ)	PMV-01, სკ (Pepino mosaic virus შტამი CH ₂ იზოლატი 1906) > 5x 10 ⁵ ვირუსის უჯრედები/მკლ PMV- 0,1 „დე ცეუსტერ მესტსტოფფენ ნ.ვ.“, ბელგია 1377	4-8 ლ/ჰა	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	კიტრის მოზაიკის ვირუსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ახლადგადარგულ ჩითილებზე ვირუსით ინფიცირებამდე, პამიდორის ყვავილობამდე ხარჯვა 160-300 ლ/ჰა-ზე და შესხურების წნევა 5-6 ბარი, წყლის ტემპერატურა არა უმეტეს 15°C . ვირუსით დაზიანებული ფოთლების შეცლა ხდება წამლობიდან 24 საათის განმავლობაში	-(1)	-(-)
ე)	პროგრანიკ® მეგა, წხ (Creosote Bush Extract - Larrea tridentata 95%) „ულტრაქუიმი აგრიკოლა, ს.ა.დე სი.ვ.“ მექსიკა 1446	3.0-5.0 ლ/ჰა	ვაზი (NL)*	ვაზის ჭრაქი (ლასმოპარა ვიტიცოლა)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით, როდესაც გარემო პირობები ხელსაყრელია დაავადების განვითარებისათვის. შესხურება 450-550 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე	-(3)	
		3-5 ლ/ჰა	მოცვი, ჟოლო, მარწყვი, ანწლი(დიდგულა), მაყვალ (NL)*	ჭრაქი (ერონოსპორა რუბი)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 8-6 დღის ინტერვალით, როდესაც დაავადების პირველი ნიშანები გამოვლინდება. შესხურება 680-780 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე NL*-შეზღუდვა არ არის	-(3)	
		1-3 ლ/ჰა	ნიორი, ხახვი,მწვანე ხახვი, სატყეურ	ფოთლების ბაქტერიული დაავადება (Pseudomonas viridiflava)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, 7 დღის ინტერვალით, როდესაც გარემო პირობები ხელსაყრელია დაავადების განვითარებისათვის. შესხურება 340-440 ლ წყლის მოცულობით /ჰა- ზე	-(2)	
		3-5 ლ/200ლ/წყალ ში	ბადრიჯანი, წიწაკა, პომიდორი, ტკბილი წიწაკა(ბულგარულ ი)	ფესვის ყელის სიდამპლე (Rizoctonia solani)	სრულდება თესვების შესხურება დათესვამდე ერთჯერ და 3 დამატებითი შესხურება უშვალოდ მცენარის. პირველი გადარგვის პროცესის დროს, შემდეგი 2 შესხურება 7დღის ინტერვალით. შესხურება 90მლ მოცულობის/მცენარეზე	-(4)	
		3-5 ლ/200ლ/წყალ ში	კიტრი, ყაბაყი,გოფრა,ნესვი ,	ფესვის ყელის სიდამპლე (Fusarium oxysporum)	სრულდება მცენარის შესხურება გაუფენოვით ფესვის ყელთან, 14 დღის	-(3)	

			საზამთრო(NL)*		ინტერვალით, შესხურების დაწყება გადარგვის შემდეგ		
		1-3ლ/ჰა	პომიდორი, წიწაკა, ტკბილი წიწაკა, კარტოფილი,	ბაქტერიული დაავადება (Xanthomonas vesicatoria)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე 7 დღის ინტერვალით. შესხურება 600 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(3)	
		1.0-3.0 ლ/ჰა	ციტრუსი - ლიმონი, მანდარინი, ფორთოხალი გრეიფრუტი (NL)*	ანთრაქნოზი (Colletotrichum gloeosporioides)	სრულდება შესხურება ფოთლებზე, პირველად როდესაც ვითარდება - კვირტის ჩამოყალიბების სტადია, მეორედ - კვირტის ყვავილობის ეტაპზე, მესამე - გაყვავილობის პროცესში მეოთხე -ყვავილების დაცვენის სტადიაში.შესხურება 400 -500 ლ წყლის მოცულობით /ჰა-ზე	-(4)	
3)	სერენადე ასო სკ 1, 34% (Bacillus amyloliquefaciens . მტამი QST 713, ტიტრი მინიმუმი 1×10 ⁹ CFU/გ)	6-8	ატამი გარგარი	მონილიოზური სიდამპლე, მონილიოზური სიდამწვრე, ნაცრისფერი სიდამპლე, ბაქტერიული ლაქიანობა,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, ყვავილობისას და მოსავლის აღების წინ 7-10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 800 ლ/ჰა	-(3-4)	1(-)
	“ბაიერ აგ.” გერმანია 1228	6-8	ალუბალი ბალი	მონილიოზური სიდამპლე, მონილიოზური სიდამწვრე, ნაცრისფერი სიდამპლე	„	-(3-4)	1(-)
		6-8	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე	„	-(3-4)	1(-)
		6-8	ვაშლი	მონილიოზური სიდამპლე ნაცრისფერი სიდამპლე, ბაქტერიული სიდამწვრე ქერქის ბაქტერიული კიბო	„	-(3-4)	1(-)
		6-8	ხენდრო	ნაცრისფერი სიდამპლე	„	-(3-4)	1(-)
		5-8	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ნაცრისფერი სიდამპლე ბაქტერიოზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი ყვავილობისას, შემდგომი ყოველ 6-8 დღეში. ხარჯვა – 300-1000 ლ/ჰა	-(3-4)	1(-)

		5-8	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცრისფერი სიდამპლე ბაქტერიოზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი - ალმოცენებიდან 2-3 კვირის შემდეგ, შემდგომი ყოველ 6-8 დღეში. ხარჯვა - 300-1000 ლ/ჰა	- (3-4)	1(-)
		4-6	წიწაკა	ნაცრისფერი სიდამპლე ბაქტერიოზები ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი ყვავილობისას, შემდგომი ყოველ 6-8 დღეში. ხარჯვა - 300-1000 ლ/ჰა	- (3-4)	1(-)
ზ)	ტიმორექს გოლდი, ევ 23.8% (ეკვივალენტი (222,5 გ/ლ)) (ჩაის ხის ზეთი, Melaleuca Alternifolia -ს ექსტრაქტი) "სტოქტონ (ისრაელ) ლტდ" ისრაელი 530/09/19	1,0-1,5 1,5-2	პამიდორი (დახურული გრუნ ტი)	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკური შესხუ რება დაავადების თავიდან ასაცილებლად, შემდეგი შ ესხურებები ყოველი 7- 10 დღის ინტერვალით. მა ღალი კონცენტრაციის გამ ოყენება ხდება პირველივე სიმპტომებისთანავე. ხარჯვა-500-1000 ლ/ჰა ერიდეთ შესხურებას მაღა ლი სიციხის დროს.	-(4)	-(-)
		1,0-1,5	პამიდორი	ნაცარი	„	-(4)	-(-)
		1,0-1,5 1,5-2	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	„	-(4)	-(-)
		1,0-1,5 1,5-2	კიტრი (დახურული გრუნ ტი)	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	„	-(3)	-(-)
		1,5-2 1.0-1.5	გოგრა ყაბახი საზამთრო	ნაცარი	„	-(3)	-(-)

			ნესვი				
		1,0-1,5	წიწკა ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	„	-(4)	-(-)
		1,0-1,5	წიწკა ბადრიჯანი	ნაცარი	პროფილაქტიკური შესხურება დაავადების თავიდან ასაცილებლად, შემდეგი შესხურებები ყოველი 7-10 დღის ინტერვალით. მაღალი კონცენტრაციის გამოყენება ხდება პირველივე სიმპტომებისთანავე. ხარჯვა-400-800 ლ/ჰა ერიდეთ შესხურებას მაღალი სიციხის დროს.	-(4)	-(-)
		1,0-1,5	სტაფილო	ნაცარი	„	-(2)	-(-)
		1,0-1,5	კარტოფილი	ნაცარი	„	-(2)	-(-)
თ)	ტრიანუმ G, გრ (<i>Trichoderma harzianum</i> T-22, 1, 5 ×10 ⁸ სპორა/გ) (3) „კოპპერტ ბიოლოგიკალ სისტემს“ ნიდერლანდები 1200	100–250 გ/ჰა 250–500 გ/ჰა	მარწყვი, ჟოლო, მოცვი, ყურძენი	<i>ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp.</i>	კულტივაციისას ხნულეებში, თითოეული მცენარის გადარგვისას, მთელი სეზონის განმავლობაში ინტერვალი დამუშავებებს შორის 12 დღე. წვეთოვანი მორწყვის საშუალებით ან ზემოდან მორწყვით	- (1)	-(-)
		750 გ/ჰა 375 გ/ჰა	ხეხილის სანერგე კულტურები	<i>ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp.</i>	შერეული სუბსტრატთან ერთად მცენარეების გადარგვისას მთელ სეზონზე	–	-(-)
		100– 250 გ/ჰა 250–500 გ/ჰა	კიტრი, პომიდორი, წიწკა, ბადრიჯანი ღია და დახურული გრუნტი	ფოთლისა და ღეროს დაავადებების, ასკოხიტოზის, ანთრაქნოზის ალტერნარიოზის და ნაცრისფერი სიდამპლეების მიმართ ფესვის	თესლის ჩათესვისა 1სმ სიღრმეზე ან ჩითილების გადარგვისას მთელი სეზონის განმავლობაში	–(1)	-(-)

				დაავადებების ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული <i>Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp</i>			
		100– 250 გ/ჰა	კომბოსტო, სალათის ფოთლები, ისპანახი, მწვანე ხახვი)	ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული <i>Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp.</i>	შერეული სუბსტრატთან ერთად კულტივაციისას	–(1)	–(-)
		100– 250 გ/ჰა 250—500 გ/ჰა	ძირხვენიანი ბოსტნეული (კარტოფილი, სტაფილო, ჭარხალი)	ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული <i>Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp.</i>	კულტივაციისას ხნულეებში ან სამუშაო ადგილების სრული დამუშავებისა	–(1)	–(-)
		100– 250 გ/ჰა	პარკოსნები (ლობიო, სოია)	ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული <i>Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp.</i>	კულტივაციისდროს, დარგვისას რიგებში	–(1)	–(-)
		150–300 გ/ჰა 100–150 გ/ჰა	ხორბალი, ქერი, სიმინდი	ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული <i>Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp., Microdochium spp.</i>	სათესლე მასალასთან შერევა ჩათესვისა ხნულეებში შერევა	–(1)	1(-)
		100-250 გ/ჰა	ქოთნის მცენარეები	ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული <i>Fusarium spp, Pythium spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp.</i>	საკვებ საშუალებებ- ბთან შერევა	–(1)	
		300–150 გ/ჰა	გაზონის (სპორტული მოედნები, გოლფის მოედანი და სხვ.)	ფუზარიოზი პითიოზი რიზოქტონიოზი სკლეროტინიოზი გამოწვეული <i>Fusarium spp, Pythium</i>	მიზანშეწონი-ლია გამოყენება მორწყვის შემდეგ. ინტერვალი შესხურებებს შორის 12– 14 დღე	–(2)	

				<i>spp, Rizoctonia spp, Sclerotinia spp., Microdochium spp.</i>			
ი)	ფიტოსპორინი-M, ფ (Bacillus subtilis. შტამი 26Д, ტიტრი არანაკლები 2 მლრდ სპორა და უჯრედი/გ)	2-3	ხორბალი საშემოდგომო და საგაზაფხულო	ნაცარი მურა ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში აღერების და მილში გასვლის ფაზაში. ხარჯვა – 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
	(3) შპს „ნვპ ზაშინკომი“ რუსეთი 1197	0, 4-0, 5	“	ფუზარიოზული და ჰელმინტოსპორიოზულ ი ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე ან წინასწარი. ხარჯვა – 10 ლ/ტ	-(1)	-(-)
		0, 4-0, 5	ქერი საგაზაფხულო	ჰელმინტოსპორიოზულ ი ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა დათესვამდე ან წინასწარი. ხარჯვა – 10 ლ/ტ	-(1)	-(-)
		0, 6-0, 8	ბარდა	ფესვის სიდამპლე ფუზარიოზი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე. ხარჯვა – 5-6 ლ/ტ	-(1)	-(-)
		1, 5 გ/კგ 2-3 (20-30 გ/10 ლ წყალზე)	კიტრი (ღია გრუნტი)	ფესვის სიდამპლეები ფუზარიოზული ჭკნობა პერონოსპოროზი	თესლის თესვისწინა დალბობა 1-2 საათის განმავლობაში შემდგომი გაშრობით. ხარჯვა – 1, 0-1, 5 ლ/კგ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და შემდგომი 10-15-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 600-800 ლ/ჰა.	-(1)	-(-)
		1, 5 გ/კგ 4-5 2-3 (10-15 გ/10 ლ წყალზე)	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფესვის სიდამპლეები ფუზარიოზული ჭკნობა პერონოსპოროზი ნაცარი	თესლის თესვისწინა დალბობა 1-2 საათის განმავლობაში შემდგომი გაშრობით. ხარჯვა – 1, 0-1, 5 ლ/კგ მცენარის მორწყვა ფესვის ქვეშ 0, 2%-იანი სამუშაო ხსნარით ჩითილების დარგვისას, განმეორებითი მორწყვა 3 კვირის შემდეგ. ხარჯვა – 3000 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და შემდგომი 7- 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 3000 ლ/ჰა.	-(1) 1(2) - (2-3)	-(-)
		1, 5 გ/კგ 0, 5 (5 გ/10 ლ წყალზე)	ჰამიდორი (ღია გრუნტი)	ფესვის სიდამპლეები ფუზარიოზული ჭკნობა ბაქტერიული კიბო ფიტოფტორა	თესლის თესვისწინა დალბობა 1-2 საათის განმავლობაში შემდგომი გაშრობით. ხარჯვა – 1, 0-1, 5 ლ/კგ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და შემდგომი 10-15-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 400-600 ლ/ჰა.	-(1) - (2)	-(-)
		1, 5 გ/კგ 4-5	ჰამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფესვის სიდამპლეები ფუზარიოზული ჭკნობა ბაქტერიული კიბო	თესლის თესვისწინა დალბობა 1-2 საათის განმავლობაში შემდგომი	-(1) -(1)	-(-)

		0, 5 (5 გ/10 ლ წყალზე)		(დაავადებების სუსტი და საშუალო განვითარების შემთხვევაში) ალტერნარიოზი ფიტოფტოროზი (დაავადებების სუსტი და საშუალო განვითარების შემთხვევაში)	გამრობით. ხარჯვა – 1, 0-1, 5 ლ/კგ მცენარის მორწყვა ფესვის ქვეშ 0, 2%-იანი სამუშაო ხსნარით ჩითილების დარგვისას, განმეორებითი მორწყვა 3 კვირის შემდეგ. ხარჯვა – 3000 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და შემდგომი 10-155-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 2000 ლ/ჰა.	- (2-3)	
		0, 4-0, 5 2-3 (20-25 გ/10 ლ წყალზე)	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი ფიტოფტოროზი ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	ტუბერების დამუშავება დარგვამდე. ხარჯვა – 10 ლ/ტ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური ბამოების შეკვრის- ბუტონიზაციის ფაზაში და განმეორებით 10-15- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა -400 -600 ლ/ჰა.	-(1) -(2)	-(1)
		1, 5 გ/კგ 20 გ/10 ლ წყალზე 0, 6-0, 8 (6-8 გ/10 ლ წყალზე)	კომბოსტო თავიანი	მავფება ლორწოვანი ბაქტერიოზი ფუზარიოზული ჭკნობა	თესლის თესვისწინა დაღობა 1-2 საათის განმავლობაში შემდგომი გამრობით. ხარჯვა – 1, 0-1, 5 ლ/კგ დარგვამდე ჩითილების ფესვების ჩადირვა 1-2 საათით პრეპარატის ხსნარში. ხარჯვა – 10 ლ/1000 მცენარეზე მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (დარგვის შემდეგ 7-10 დღეში და განმეორებით 2- 3 კვირის შემდეგ. ხარჯვა - 200-500 ლ/ჰა.	-(1) -(2)	-(-)
		0, 3 (3 გ/10 ლ წყალზე)	შავი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 10-15-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	-(2)	-(1)
		0, 3 (3 გ/10 ლ წყალზე)	ვარდი (ღია და დახურული გრუნტი)	ნაცარი შავი ლაქიანობა, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 10-15-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა	-(2)	-(1)
		0, 3 3 (3 გ/10 ლ წყალზე)	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი)	ნაცარი ლაქიანობები ფესვის სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 1000 ლ/ჰა ნიადაგის მორწყვა დაავადებული მცენარის ფესვის ქვეშ. ხარჯვა – 1 ლ/მ ²	-(1)	-(1)
კ)	ცედრიქსი, წზ		კიტრი (დახურული	ფესვის სიდამპლეები (რიზოქტონიოზი	პირველი წამლობა ჩითილების დარგვამდე		-(-)

	(Pseudomonas fluorescens. შტამი PF-1 MTCC 5671 1.5%, 1X10 ⁸ CFU „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.” თურქეთი 1315	3	გრუნტი	პითიუმი ფუზარიოზი)	ერთი კვირით ადრე, წვეთოვანი ირიგაციის გზით, მეორე- ფოთლოვანი შესხურება დარგვიდან ერთი კვირის შემდეგ. შემდეგი წამლობა დარგვიდან 15 დღის შემდეგ, წვეთოვანი ირიგაციის გზით,	-(2-3)	
		3	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველივე სიმპტომების გამოჩენიდან 7- 10 დღიანი ინტერვალით.. ხარჯვა- 1000 ლ/ჰა	-(2-3)	-(-)
		1,5	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი წამლობა ყვავილების 10%- ის გაშლისას, მეორე- ყვავილების 50%-ის გაშლისას, მესამე-მწვანე ნაყოფის გამოჩენის დროს	-(2-3)	-(-)
		5/1 ტონა ტუბერებზე	კარტოფილი	ფესვის სიდამპლე (რიზოქტონიოზი)	ტუბერების დამუშავება დარგვამდე	-(1)	-(1)

მუხლი 8. ფერომონები და ბიოტექნიკური საშუალებები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავე ბელი ობიექტი	მავნებელი	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება
N	1	2	3	4	5
1	აკუვიტიმ, მის მწ (ცის- ვერბენოლი+იპსიდიენო ლი) “ვიტასეკ პფლანზენშუტც გმბხ” ავსტრია 804/16	2 მწერმჭერი /4 ჰა-ზე	ფიჭვი, ნაძვი , ტყის მცენარეულობა	კენწეროს ქერქიჰამია	მონიტორინგი, გამოჩენის სიგნალიზაცია ფერომონიალი მწერმჭერის მოთავსება ხეზე მავნებლის ფრენის დაწყების პერიოდში შემდგომი გენერაციის მასობრივ გამოჩენამდე ფერომონიანი პაკეტი თითოეულ მჭერში უნდა შეიცვალოს ახლით
2	იპსოვიტიმ, მის მწ (იპსიდიენოლი+2- მეთილ-3-ბუტენ-2-ოლ) “ვიტასეკ	2 მწერმჭერი /4 ჰა-ზე	ფიჭვი, ნაძვი, ტყის მცენარეულობა	ქერქიჰამია მზეჯდავი - ტიპოგრაფი	მონიტორინგი, გამოჩენის სიგნალიზაცია ფერომონიანი მწერმჭერის მოთავსება ხეზე

	პფლანზენშუტც გმბხ” ავსტრია 803/16				მავნებლის ფრენის დაწყების პერიოდში შემდგომი გენერაციის მასობრივ გამოჩენამდე ფერომონიანი პაკეტი თვითეულ მჭერში უნდა შეიცვალოს ახლით
		4 მწერმჭერი /3ა-ზე	“	“	ინტენსიური მონიტორინგი
		1 დისპენსერი/ დამჭერ ხეზე	“	“	ბრძოლა მწერების დაჭერის მეთოდით
3	სექსოვიტიმ, მის მწ (იპსენოლი+2-მეთილ- 3-ბუტენ-2-ოლ) “ვიტასეკ პფლანზენშუტც გმბხ” ავსტრია 805/16	2 მწერმჭერი /43ა-ზე	ფიჭვი, ნაძვი, ტყის მცენარეულობა	ექვსკბილა ქერქიჭამია	მონიტორინგი, გამოჩენის სიგნალიზაცია ფერომონიანი მწერმჭერის მოთავსება ხეზე მავნებლის ფრენის დაწყების პერიოდში შემდგომი გენერაციის მასობრივ გამოჩენამდე ფერომონიანი პაკეტი თვითეულ მჭერში უნდა შეიცვალოს ახლით
		4 მწერმჭერი /3ა-ზე	“	“	ინტენსიური მონიტორინგი
		1 დისპენსერი/ დამჭერ ხეზე	“	“	ბრძოლა მწერების დაჭერის მეთოდით
4	სიდოვიტიმ, რსგფ 0,003 გ/მწერმჭერი (E)-11- ჰექსადეცენალი+ (Z)- 11-ჰექსადეცენალი, 0,7 გ/დისპენსერი), “ვიტასეკ პფლანზენშუტც გმბხ” ავსტრია 1305	1 დისპენსერი/ 3ა	ბზა	ბზის ალურა	მონიტორინგი, ადრე გაზაფხულზე მწერის ზრდასრული ფორმის გამოჩენამდე, სამიზნე მავნებლის გამოჩენისთანავე, ფერომონიანი დამჭერი დისპენსერი (რეზინის სეპტა) უნდა განთავსდეს 20-30 მ დაშორებით, დაახლოებით 2მ ხის სიმაღლეზე ტოტის გასწვრივ ჰორიზონტალურად მიმაგრების გზით. დისპენსერი თავსდება დელტის ან ძაბრის ტიპის მოწყობილობაში, რათა უზრუნველყოთ მწერის სრულად დაჭერა მთელ სივრცეზე. ფერომონები გამოიყენება შემოდგომის სეზონის დასრულებამდე. ფერომონიანი დამჭერები მოწმდება ყოველ კვირას. დისპენსერის (რეზინის სეპტა) და წებოვანი დაფის შეცვლა ხდება 4-6 კვირის შემდეგ.
5	ტომოვიტიმ, მის მწ (ალფა-პინენი+პ- ჰიდროქსიბენზოის მჟავა+ეტანოლი) “ვიტასეკ პფლანზენშუტც გმბხ” ავსტრია 806/16	2-4 მწერმჭერი /4 3ა- ზე	ფიჭვი, ტყის მცენარეულობა	ფიჭვის დიდი მებაღე (ლაფნიჭამია)	მონიტორინგი, გამოჩენის სიგნალიზაცია ფერომონიანი მწერმჭერის მოთავსება ხეზე მავნებლის ფრენის დაწყების პერიოდში შემდგომი გენერაციის მასობრივ გამოჩენამდე ფერომონიანი პაკეტი თვითეულ მჭერში უნდა შეიცვალოს ახლით
		4-8 მწერმჭერი 3ა-ზე	“	“	ინტენსიური მონიტორინგი
		1 დისპენსერი/ დამჭერ ხეზე	“	“	ბრძოლა მწერების დაჭერის მეთოდით
6	ტუტაბსი , რეზინის სეპტა გაჟღენთილი ფერომონით, 990 გ/კგ (EZZ-3.8.11- ტეტრადეკატრინილ	10 მწერმჭერი / 3ა-ზე	პამიდვრის ნარგავები (ღია და დახურული გრუნტი)	პამიდვრის სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ჩრჩილი	მონიტორინგი, გამოჩენის სიგნალიზაცია ფერომონიანი მწერმჭერის ჩამოკიდება მცენარეზე დარგვისას, ნიადაგიდან 1 მეტრის დაშორებით, ფართობის

	აცეტატ (95%)+EZ-3.8-ტეტრადეკადიენილ აცეტატ (5%) „აკდენიზ ფლორა ზირაი ილაკ იმალატ ტარიმ ურუნლერი ტურიზმ ინსაატ იხრაკატ იმალატ სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 1105/19				კიდებზე, მწერმჭერების შორის დაშორება-მინიმუმ 10 მ. ფერომონი უნდა შეიცვალოს ყოველი 50-60 დღის განმავლობაში, მოსავლის აღებამდე. შემოწმება ტარდება რეგულარულად კვირაში ერთხელ
		50-60 მწერმჭერი/ ჰა-ზე	“	“	ზრმოლა მწერების მასობრივი დაჭერის მეთოდით. შემოწმება ტარდება რეგულარულად კვირაში ერთხელ
7	ტუტაბს, რეზინის სეპტა გაჟღენთილი ფერომონით, 0,95+0,05 მგ/მისატყუარზე (EZZ-3.8.11-ტეტრადეკატრიენილ აცეტატ (95%)+EZ-3.8-ტეტრადეკადიენილ აცეტატ (5%) „ალფა სენტს.ინკ“ აშშ 1320	10-20 მწერმჭერი / ჰა-ზე 2-3 მწერმჭერი/ჰა-ზე	პამიდვრის ნარგავები (ღია გრუნტი) პამიდვრის ნარგავები (დახურული გრუნტი)	პამიდვრის სამხრეთ ამერიკული მენადმე ჩრჩილი	მონიტორინგი, გამოჩენის სიგნალიზაცია ფერომონიანი მწერმჭერის (ქალაქის სატყუარა გაჟღენთილი ფერომონით) ჩამოკიდება ხდება მცენარეზე მავნებლის გამოჩენისთანავე, შემდეგ იხსნება პერგამენტარებული ფოლგა და ფერომონი იზიდავს მწერს სატყუარაზე . ფერომონიანი მწერმჭერის ჩამოკიდება მცენარეზე დარგვისას, ნიადაგიდან 1 მეტრის დაშორებით, ფართობის კიდებზე, მწერმჭერების შორის დაშორება-მინიმუმ 10 მ. ფერომონი უნდა შეიცვალოს 8 კვირის შემდეგ, გამოიყენება გაზაფხულზე იმაგოს გამოსვლამდე ნაკვეთში, უფრო ეფექტურია ადრე შემოღობიდან სეზონის ბოლომდე. შემოწმება ტარდება რეგულარულად კვირაში ერთხელ
		45-60 მწერმჭერი/ ჰა-ზე 6 მწერმჭერი ყოველ 10 მეტრში	პამიდვრის ნარგავები (ღია გრუნტი) პამიდვრის ნარგავები (დახურული გრუნტი)	პამიდვრის სამხრეთ ამერიკული მენადმე ჩრჩილი	ზრმოლა მწერების მასობრივი დაჭერის მეთოდით. შემოწმება ტარდება რეგულარულად კვირაში ერთხელ
8	P588-კომბო ჰალიომორფა ჰალის ლურ (ზმსზ კომბო) (მურგანთიოლი 5 მგ/მისატყუარზე+მეთილ (E, E, Z)-2,4,6 დეკატრიენოატი 80 მგ/მისატყუარზე) „ჩემტიკა ინტერნაციონალ ს.ა.“ კოსტა რიკა 1354	3 ფერომონი/ჰა	თხილი, სიმინდი, ხეხილის ბაღები და სხვა კულტურები	ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბალინჯო	მონიტორინგის მიზნისათვის, ადრე გაზაფხულიდან აპრილში ფაროსანას ზრდასრული იმაგოების გამოჩენისას (მინიმუმ 3 დამჭერი/ჰა-ზე) . 2 ფერომონი განთავსებული უნდა იყოს სხვადასხვა კულტურული მცენარეების ნაკვეთების საფრთხის შემცველ კიდებზე და 1 ნაკვეთის დიაგონალის ცენტრში. ფერომონიანი საჭერი ისე უნდა განთავსდეს ნაკვეთში, რომ უზრუნველყოს დაჭერა მწერის მცოცავი ნიმუშების (არა მფრინავი ფაზა) და იმაგოების. ემაგრება ხის ტოტს

					ჰორიზონტალურად, დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე, 1 სატყუარა თითო დამჭერში. სატყუარა მოწმდება ყოველ კვირას, იცვლება დამჭერებში ყოველი 12 კვირის ინტერვალით.
		30 ფერომონი/ჰა			მასობრივი დაჭერის მიზნისათვის, რეკომენდებულია 30 ფერომონის განთავსება 1 ჰექტარ ფართობზე. ფერომონები თავსდება ნაკვეთების კიდეებზე 5 მეტრის დაშორებით, საფრთხის შემცველ საზღვარზე. ხოლო დარჩენილი ფერომონები ნაკვეთის ცენტრში, ხეებს შორის მანძილი 20-25 მეტრის დაშორებით. ფერომონი მაგრდება ხის ტოტს ჰორიზონტალურად, დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე, 1 სატყუარა თითო დამჭერში. სატყუარა მოწმდება ყოველ კვირას, იცვლება დამჭერებში ყოველი 12 კვირის ინტერვალით. მწერის დასაჭერად გამოიყენება გამჭირვალე წებოვანი ლენტები, პირამიდის და ბოთლის მაგვარი საჭერები (ლენტები იცვლება როდესაც წებოვანი ზედაპირი გაივსება მწერებით).
9	ფეროდისი , ბუნებრივი წითელი რეზინის კაფსულა (დისპენსერი) გაჟღენთილი ფერომონით, 0,5 მგ/მწერმჭერზე, 714 მგ/კგ (EZZ-3.8.11-ტეტრადეკატრიენ-1 ილ აცეტატ+EZ-3.8-ტეტრადეკადიენ-1-ილ აცეტატ, 0,071%) „კოპპერტ ბიოლოგიკალ სისტემს“ ნიდერლანდები 1207	20-25 მწერმჭერი / ჰა-ზე	პამიდვრის ნარგავები (ღია და დახურული გრუნტი)	პამიდვრის სამხრეთ ამერიკული მენადმე ჩრჩილი	მონიტორინგი, გამოჩენის სიგნალიზაცია ფერომონი გამოიყენება დელტა ტიპის ხაფანგში. ეფექტურია 45 დღის განმავლობაში, უნდა შეიცვალოს ყოველი 4-6 კვირის შემდეგ, შემოწმება ტარდება რეგულარულად კვირაში ერთხელ
		30 მწერმჭერი/ ჰა-ზე	ბადებთან ერთად დაფარულ სათბურში, ერთნაირად ნაწილდება საფეხმავლო ბილიკების და დარგული მცენარეთა ხაზის გასწვრივ	“	ინტენსიური მონიტორინგი. ფერომონი გამოიყენება დელტა ტიპის ხაფანგში. ეფექტურია 45 დღის განმავლობაში, უნდა შეიცვალოს ყოველი 4-6 კვირის შემდეგ, შემოწმება ტარდება რეგულარულად კვირაში ერთხელ
10	ფეროკონი. ბმსბ კიტ, მისატყუარი (მეთილ ((E, E, Z)-2,4,6 დეკატრიენატი 50	1-2 ფერომონი/ჰა	თხილი ხეხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნიანი ბაღლინჯო	მონიტორინგი ადრე გაზაფხულიდან აზიური ფაროსანას ზამთრის დიაპაუზაში გადასვლამდე. 1. ფერომონი გამოიყენება იქ, სადაც

	მგ/მისატყუარზე +მურგანთიოლი 5 მგ/მისატყუარზე) „ტრესე ინკორპორეიტედ“ აშშ 1297				სამიზნე მავნებელი გამოჩნდება .განთავსებული უნდა იყოს ადრე გაზაფხულზე მწერის ზრდასრული იმაგოების გამოჩენისათვის (მინიმუმ 2 დამჭერი/ჰა-ზე), სხვადასხვა კულტურული მცენარეების ნაკვეთების ნაპირებზე ემაგრება 1 დამჭერი და 1 ნაკვეთის ცენტრში. 2. ფერომონი მაგრდება ხის ტანიდან 20- 100 სმ-ს დაშორებულ ტოტებზე, დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე. დამჭერის ზედაპირი უნდა ეხებოდეს ტოტს ჰორიზონტალური მიმართულების გზით. სატყუარა არ ეკიდება ხეზე. 1 ორმაგი მოქმედების სატყუარა თითო დამჭერში. სატყუარა იცვლება დამჭერებში ყოველ მე-12 კვირას. დამჭერების შემოწმება ხდება ყოველ კვირას.
11	შინ-ეტსუ მდ სტტ, დისპენსერი (E, E)-8,10- დოდეკადიენ-1-ოლი 573 გ/კგ + 1- დოდეკანოლი 297 გ/კგ+1- ტეტრადეკანოლი 71 გ/კგ) „შინ-ეტსუ ქემიკალ კო ლტდ“ იაპონია 1270	500 დისპენსერი /ჰა (1 დისპენსერი 20 მ2)	ვაშლი მსხალი კომში	ვაშლის ნაყოფჰამია	შეწყვილების ჩაშლა გაზაფხულზე ვაშლის ნაყოფჰამიის პირველი ფრენის დაწყებამდე - 1 დისპენსერი სეზონზე მიამაგრეთ დისპენსერების 70% ტოტებზე 1,5-2 მ სიმაღლეზე ძირიდან, და დისპენსერების 30% ზედა ტოტებზე ვარჯის დაწყებიდან 0,5-1 მ-ზე. მოათავსეთ ჩრდილში. გაანაწილეთ თანაბრად ფართობზე და მის საზღვრებზე . სასაზღვრო მწკრივში უნდა განთავსდეს დამატებითი დისპენსერები
12	შინ-ეტსუ მდ ლტტ, დისპენსერი (E, Z)- 7,9- დოდეკადიენ-1-ილ აცეტატი 792 გ/კგ) „შინ-ეტსუ ქემიკალ კო ლტდ“ იაპონია 1271	250 დისპენსერი /ჰა (1 დისპენსერი 40 მ2)	ვაზი	ყურმის ჰია	შეწყვილების ჩაშლა გაზაფხულზე ყურმის ჰიის პირველი ფრენის დაწყებამდე - 1 დისპენსერი სეზონზე.
13	ჰალჰალი. აზიური ფაროსანას (Halyomorpha halys) 2 კომპონენტია მისატყუარი (მეთილ (E,E, Z)-2,4,6- დეკატრიენოატი 75% (60 მგ/მისატყუარზე)+ მურგანთიოლი 25%(20 მგ/მისატყუარზე)) „ალფა სცენტს ინც.“ აშშ 1284	1ფერომონი/ჰა	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნია ბაღლინჯო	მონიტორინგი, კონტროლი „მოიზიდე და მოკალი“ მეთოდით. ფერომონი გამოიყენება იქ, სადაც სამიზნე მავნებელი გამოჩნდება .განთავსებული უნდა იყოს ადრე გაზაფხულზე მწერის ზრდასრული იმაგოების გამოჩენისას, სხვადასხვა კულტურული მცენარეების ნაკვეთების საზღვარზე (მინიმუმ 1 დამჭერი/ჰა-ზე). ემაგრება ხის ტოტზე ტანის 20-100 სმ-ს ფარგლებში დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე. ფერომონის გამოყენება უფრო ეფექტურია ადრეულ შემოდგომაზე სეზონის დასრულებამდე.
14	ჰალჰალი. აზიური ფაროსანას (Halyomorpha halys) 2 კომპონენტია მისატყუარი	1ფერომონი/ჰა	თხილი	ყავისფერი მარმარილოს სუნია ბაღლინჯო	მონიტორინგი, კონტროლი „მოიზიდე და მოკალი“ მეთოდით. ფერომონი გამოიყენება იქ, სადაც სამიზნე მავნებელი გამოჩნდება .განთავსებული უნდა იყოს ადრე

	(მეთილ (E,E, Z)-2,4,6-დეკატრიენოატი (240 მგ/მისატყუარზე+ მურგანთიოლი,80 მგ/მისატყუარზე „ალფა სცენტს ინც.“ აშშ 1367				გაზაფხულზე მწერის ზრდასრული იმაგოების გამოჩენისას, სხვადასხვა კულტურული მცენარეების ნაკვეთების საზღვარზე (მინიმუმ 1 დამჭერი/ჰა-ზე). ემაგრება ხის ტოტზე ტანის 20-100 სმ-ს ფარგლებში დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე. ფერომონის გამოყენება უფრო ეფექტურია ადრეულ შემოდგომაზე სეზონის დასრულებამდე. სატყუარა იცვლება დამჭერებში ყოველ მე-12 კვირას. დამჭერების შემოწმება ხდება ყოველ კვირას.
15	ჰერკონი®.ლურეტაპ® აზიური ფაროსანას 2-კომპონენტის მისატყუარი (ეთილ (E,E,Z)-2, 4,6 დეკატრიენოატი 125 მგ/მისატყუარზე + მურგანთიოლი 10 მგ/მისატყუარზე) „აბერდინ როად კომპანი , დ/ზ/ა ჰერკონ ენვაირომენტალ“ აშშ 1284	2 მისატყუარი /ჰა	თხილი, სიმინდი და სხვა კულტურები	ყავისფერი მარმარილოს სუნისანი ზაღლინჯო	აზიური ფაროსანას მონიტორინგი 1.ფერომონი გამოიყენება იქ, სადაც სამიზნე მავნებელი გამოჩნდება, მინიმუმ 2 დამჭერი ჰა-ზე. განთავსებული უნდა იყოს ადრე გაზაფხულზე მწერის ზრდასრული იმაგოების გამოჩენისათვის, ნაკვეთების ნაპირზე 5 მეტრის მანძილზე ზღის კიდეებიდან ერთმანეთისაგან 20-25 მ დაშორებით. ფართობის რიგებში, ცენტრში შეიძლება დაემატოს 1 ფერომონიანი დამჭერი მწერის სრულად დაჭერისათვის მთელ სივრცეზე. 2. ფერომონის მიმაგრება ტოტზე ხის ტანის 20-100 სმ-ის ფარგლებში, დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე ისე, რომ ზედაპირით ეხებოდეს ტოტს, ხის ტოტის გასწრივ ჰორიზონტალურად. გამოიყენება შემოდგომის სეზონის დასრულებამდე. ფერომონიანი დამჭერი მოწმდება ყოველ კვირას, სატყუარის შეცვლა დამჭერებში ხდება ყოველი 8 კვირის შემდეგ

მუხლი 9. ჰერბიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	სარეველა	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი, წხ 720 გ/ლ (2.4 დ დიმეთილამინის	0.8-1.2	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი	ნათესების შესხურება მცენარის 3-4 ფოთლის ფაზიდან აღერებამდე	-(1)	-(3)
	მარილი, მჟავაზე გადაანგარიშებით 600 გ/ლ) (3)	0.8-1..2	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)

	„ნიუფარმი გმზხ და კო კბ“						
	ავსტრია 413/04/09/14/19	1.1-1.4	აბუსალათინი, ქინძი	“	სარეველების შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	20(3)
		1.1-1.7	მდელოს ტიმოთელა	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში მიღში გამოსვლამდე	-(1)	20(3)
		0.6-1.1	მდელოს მელაკუდა	“	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	20(3)
		1.1-1.7	მინდვრის კოინდარი, მდელოს წივანა	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)
		1.1	მდელოს თივაქსრა დათესვის წელს (საფარის გარეშე)	“	სარეველების შესხურება კულტურის კულტურის 1- 2 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)
		1.1	მდელოს წივანა (ქერის საფარის ქვეშ)	“	სარეველების შესხურება კულტურის დათესვის წელს მდელოს წივანას 2-3 ფოთლის და ქერის ბარტყობის ფაზებში	-(1)	20(3)
2	აგატი , კვ 80+20 გ/ლ (კლოდინაფოპ- პროპარგილი+ კლოკვინტოსეტ- მექსილი) (თ), (4)	0.3-0.4	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	შვრიუკა	ნათესების შესხურება სარ ეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთლი) სტადიაში	-(1)	-(-)
	„ერთარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“ თურქეთი 1109/19	0.5-0.75	“	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ბურწას სახეობა)	ნათესების შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მიღში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
3	აგენტ, სე 452, 42 გ/ლ+6,25 გ/ლ (2,4-დ მჟავას რთული 2- ეთილ-ჰექსილის ეთერი+ფლორასულამი) (თ), (2) შპს „ვაზრეკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 1218	0,4-0,6	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი , მ.შ. 2,4-დ და მცპას- მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ფესურიანი სარეველები (ავშანფოთლიანი ამბროზია, მინდვრის მდოგვი, წიწმატურა, ნაცარქათამა, ყაყაჩო, ღორის ბირკა, შალგი, ქუთქუთა, ჯიჯლაყა)	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყოფის ფაზიდან 1-2 მუხლთაშორისის წარმოქმნამდე და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. საშემოდგომო მარცვლეული მუშავდება გაზაფხულზე. ხარჯვა- 200-300ლ/ჰა	53(1)	-(4)
		0,4-0,6	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 3-7 ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-200- 300ლ/ჰა	60(1)	-(4)
		0,4-0,6	ფეტვი	ერთწლიანი და	ნათესების შესხურება	60(1)	-(4)

				მრავალწლიანი	კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში ბარტყობიდან მიღში გასვლამდე ი.ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა		
		0,4-0,6	სორგო	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	„	50(1)	-(4)
4	აგილი , კვ 100 გ/ლ (პროპაზიზაფოპი) „ადამა აგრიქალა ზ.ვ.“ ნიდერლანდები 791/15	0.8-1.2	სოიო, ბარდა	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები	კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ერთწლიანი სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე , ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)	-(1)	7(3)
		0.6-0.8 დ 1-1.2	ხახვი	ერთწლიანი მარცვლოვანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი	კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე) კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)	30(1)	7(3)
		0.6-0.8 1-1.2	მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი	კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე) კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)	-(1)	7(3)
		0.6-1.2	კარტოფილი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები	კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ერთწლიანი სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე , ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)	-(1)	7(3)
		0.6-0.8 1-1.2	კომბოსტო	ერთწლიანი მარცვლოვანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი	კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე) კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)	50(1)	7(3)
		0.6-0.8 1-1.2	პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი	კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე) კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)	30(1)	-(3)
		0.6-1.2	ბაღები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	-(-)

				მარცვლოვნები	(ერთწლიანი სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე , ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)		
		1-1.6 0.6-1.2	შაქრის, სუფრის, საკვები, ჭარხალი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და მრავალწლიანი ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები	გრუნტის შესხურება კულტურის დათესვამდე ან აღმოცენებამდე კულტურის შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ერთწლიანი სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან აღერების ფაზამდე , ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას)	-(1)	73)
5	ამილინი, წზე 687 გ/ლ (2,4-დ ეთილ-ჰექსილეთერი) (თ), (4) “მარდა კროპქემ ლიმიტედ” ინდოეთი 708/14	0.8-1.2	ხორბალი, ქერი, შვრია	ერთწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
	ჰექსილეთერი) (თ), (4) “მარდა კროპქემ ლიმიტედ” ინდოეთი 708/14	0.8-1.2	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(7)
6	ამინოპელიკ სუპერი 464 წზკ (2,4 დ 344 გ/ლ + დიკამბა 120 გ/ლ დიმეთილამინის მარილის სახით) (თ), (3) „ადამა აგრექალჩა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 792/15	0.6-0.8	საშემოდგომო ხორბალი, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2,4 დ-ს და 2მ-4ქ-ს მიმართ გამძლე ღიჰას სახეობები (ნარი და სხვა) და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება ადრე გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზაში აღერებამდე, სარეველების 2-5 წამდელი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა	60(1)	-(3)
		0.5-0.7	საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი, ყვებვი	“	“	60(1)	-(3)
		1.3-1.5	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. 2,4 დ-ს მიმართ გამძლეები ღიჰას სახეობები (ნარი და სხვა) და მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	60(1)	-(3)
		1.5-2	მრავალწლიანი საკვები ბალახები	“	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზაში.	-(1)	20(3)
7	ანტისაპა, წზგრ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი) (თ) შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 1024/18	1,5	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(7)

		1	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1	სოიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0,5-1,5	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
8	არკადე 880 ეკ 880 გ/ლ (პროსულფოკარბი 800+ მეტრიბუზინი 80 გ/ლ) (თ) “სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ” შვეიცარია 917/16	3-4 4-5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 13 სმ სიმაღლისას. ხარჯვის ნორმა 100-500 ლ/ჰა.	-(1)	-(3)
9	არპადი, წდგრ 250 გ/კგ (რიმსულფურონი) (3) „პეტერს და ბურგი კვტ“ უნგრეთი 1223	30 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა “პავ ტალანტ, ს 900 გ/ლ”	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, ორჯერადი შესხურება პირველი და მეორე ტალღის სარეველებზე 10-20 დღის ინტერვალით	60(2)	-(3)
		40 გ/ჰა+ 250 მლ/ჰა “პავ ტალანტ, ს 900 გ/ლ”	სიმინდი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, მრავალწლიანი სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	60(1)	-(3)
		50 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა “პავ ტალანტ, ს 900 გ/ლ”	სიმინდი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი (ჰანგა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, მარცვლოვანი სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას და ღიჭას როზეტის ფაზაში	60(1)	-(3)
10	აქსიალი 45 ეკ 45+11,25 გ/ლ (პინოქსადენი+კლოკვინ ტოსეტ-მექსილი) (4) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ” შვეიცარია 662/14/19	1-1.3	ხორბალი ქერი	ერთწლიანი მარცვლოვნები (შვრიუკა და სხვა)	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობიდან მიღში გასვლის ფაზის ჩათვლით	-(1)	-(3)
11	აქსიალი 50 ეკ 50+12,5 გ/ლ (პინოქსადენი+კლოკვინ ტოსეტ-მექსილი) (4) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ” შვეიცარია 1449	0,6-1.2	ხორბალი ქერი ჭვავი ტრიტიკალე	ერთწლიანი მარცვლოვნები (შვრიუკა და სხვა)	ნათესების შესხურება შემოდგომაზე და შემდგომი წლის გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობიდან მიღში გასვლის ფაზის ჩათვლით, სარეველების 2-5 ფოთლის ფაზაში	-(1-2)	-(3)
12	ბაზაგრანი, წხ 480 გ/ლ	2-4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის	-(1)	7-(3)

	(ბენტაზონი) (4)		ხორბალი, შვრია, ქერი	შორის 2, 4-დ და 2მ-4 ქ-ის მიმართ გამძლე	ბარტყობის ფაზაში		
	„ბასფი სე“ გერმანია 259/04/12/17	2-4	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1.5-3.0	სოიო	ერთწლიანი ორლებნიანი (ბირკა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		3.0-4.0	სათესლე ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი (გვირილა)	ნათესების შესხურება კულტურის 5-6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		2.0-3.0	სამყურას სათესლე ნათესები	“	“	-(1)	-(3)
		2	იონჯა (ვეგეტაციის 1 წელი)	“	სათესლე ნათესების შესხურება კულტურის 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		1	კოინდარი ერთწლიანი	“	ნათესების შესხურება კულტურის აღერების ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-2.5	ბადის პიტნა	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 4-6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
13	ბაკკარდი 125 ევ 125 გ/ლ (კვიზალაფოპ-პ-ეთილი) (თ), (3) „ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1129/19	0, 75-1	კარტოფილი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, პამიდორი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ზურჩხა, მინდვრის სორგო, ბურწა, თივაქასრა)	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზიდან, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	7(3)
		1-1, 2	კარტოფილი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, პამიდორი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა	მრავალწლიანი მარცვლოვანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		1-1, 2	ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ქანგა მხოხავი)	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	7(3)
14	ბალერინა, სე 410 გ/ლ+7,4 გ/ლ (2,4-დ მეფას რთული 2- ეთილ-ჰექსილის ეთერი+ფლორასულამი) (თ), (2) დსს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 918/18	0,3-0,5	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი , მ.შ. 2,4-დ და მცპას- მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ფესურიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის მილში გასვლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. საშემოდგომო მარცვლეული მუშავდება გაზაფხულზე. ხარჯვა-200-300ლ/ჰა	53(1)	-(4)
		0,3-0,5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-200-300ლ/ჰა	60(1)	-(4)
		0,3-0,5	ფეტვი		ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში და სარეველების	60(1)	-(4)

					განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა		
		0,3-0,5	სორგო		ნათესების შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	50(1)	-(4)
15	ბანდერილა 70 სგ 700 გ/ჰგ (მეტრიბუზინი) (თ)	1.1-1.4	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	42(1)	-(7)
	„დოგალ კიმიევი მადდეღერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1201	0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	42(1)	20(-)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	42(1)	7(3)
		0.5-1	სოიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	42(1)	7(3)
16	ბარნელაველი 70, წდგრ 700 გ/ჰგ (მეტრიბუზინი) (თ) „ქროუნბრიდჯ მენეჯმენტ ლპ“ კანადა 630/14/19	1.1-1.4	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)
		0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1	სოიო	“	სარეველების შესხურება 15-20 დღეში ჩითილების გადარგვიდან	30(1)	7(3)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.7-0.8	“	“	სარეველების შესხურება კულტურის 5 სმ-დე სიმაღლისას	-(1)	7(3)
17	ბასტა წხ 150 150 გ/ლ (ამონიუმის გლუფოსინატი) (თ), (4) „ბასფი სე „ გერმანია 262/08/12/17	3-5	ხეხილი კურკოვნები ციტრუსი, ვაზი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე (კულტურის დაცვის პირობებში)	-(1)	7(3)
18	ბასულტრა 200 წხ 200 გ/ლ (ამონიუმის	3-7,5	ვაზი, ხეხილი ციტრუსი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი ორლებნიანი და	შესხურება ახალგაზრდა ვეგეტირებულ სარეველებზე	-(1)	7(3)

	გლუფოსინატი) (თ), (4) „საფა ტარიმ ს.ა.“ თურქეთი 1337			მარცვლოვანი სარეველები	გაზაფხულზე, აქტიური ზრდის პერიოდში (კულტურის დაცვის პირობებში). ხარჯვა-200- 400 ლ/ჰა		
19	ბეთანალ ექსპერტი ეკ 274 ეკ, 274 გ/ლ (ეტოფუმენატი 112+ ფენმედიფამი 91+დესმედიფამი 71) (თ), (3) „ბაიერ აგ“ გერმანია 709/14/19	1 1.5 3	მაქრის, საკვები, სუფრის ჭარხალი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. ძურწა, ჯიჯილაყა და ზოგიერთი ერთწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება სარეველების ლებნის პერიოდში(პირველი, მეორე და მესამე ტალღის). სამუშაო ხსნარის ხარშვა 200 ლ/ჰა. ნათესების ორჯერადი შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში (პირველი და მეორე ტალღის) ნათესების შესხურება კულტურის 4 ნამდვილი ფოთლის და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზებში	-(3) -(2) -(1)	7(3)
20	ბეითორი 40 წზ 40 გ/ლ (იმაზამოქსი) (თ), (3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1180	0.75-1	სოია	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	დამუშავება კულტურის 2- 3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების 1-3 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა -250-300 ლ/ჰა. ბეიტორის გამოყენების შემდეგ არ შეიძლება სულფონილმარდოვანას ჯგუფის პერბიციდების გამოყენება. არ გამოიყენება კომბინირებულ ნაზავებში მარცვლოვანი სარეველების საწინააღმდეგო პერბიციდებთან	-(1)	-(-)
		0.75-1	ბარდა (მარცვლი) ლობიო	“	დამუშავება კულტურის 3- 6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა -250-300 ლ/ჰა. ბეიტორის გამოყენების შემდეგ არ შეიძლება სულფონილმარდოვანას ჯგუფის პერბიციდების გამოყენება. არ გამოიყენება კომბინირებულ ნაზავებში მარცვლოვანი სარეველების საწინააღმდეგო პერბიციდებთან	-(1)	-(-)
		0,75-1,25	მზესუმზირა	„	დამუშავება კულტურის 3- 6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა -250-300 ლ/ჰა.	-(1)	-(-)
21	ბეკანო სკ 500, კს 500 გ/ლ (ინდაზიფლამი) (თ)	0, 15	ვაშლი, მსხალი, ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი, გარგარი,	ერთწლიანი ორლებნიანები	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე (კულტურის დაცვით).	20(1) 14(1)	7(3)

	„ბაიერ აგ“ გერმანია 1081/18		ალუბალი, ნუში, თხილი, ციტრუსი ვაზი		ხარჯვა – 100 ლ/ჰა. აღმოცენებულ სარეველებზე მოქმედებს მხოლოდ კომბინაციაში ბასტა 150 წბ-თან ან გლიფოსატთან იგივე ხარჯვის ნორმებში		
		3-3, 3	სოიო		„	-(1)	7(3)
		1, 7-2, 5	ლობიო ცერცვი მწვანე ლობიო ბარდა		„		
		1, 5-2, 5	სტაფილო		„	-(1)	7(3)
		2-2, 5	კარტოფილი	„	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე, კულტურის დარგვის, დაფარვების შემდეგ. ხარჯვა – 250-600 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		2-2, 5	კამა	„	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე, კულტურის დათესვის შემდგომ ან გადარგვამდე. ხარჯვა – 250-600 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		2, 5	თამბაქო		ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე, კულტურის გადარგვის შემდგომ სტადიაზე. ხარჯვა – 250-600 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
22	ბელვედერი, კს 320 გ/ლ (ფენმედიფამი 160+ დესმედიფამი 160) (თ),(3) „ადამა აგრიქალაზ ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 793/15	1,25 1.5 3	შაქრის, საკვები სუფრის ჭარხალი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. მურწა, ჯიჯილაყა და ზოგიერთი ერთწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება სარეველების ლებნის პერიოდში(პირველი, მეორე და მესამე ტალღის) 7-10 დღიანი ინტერვალით. სამუშაო ხსნარის ხარჯვა 200 ლ/ჰა. ნათესების ორჯერადი შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში (პირველი და მეორე ტალღის), ნათესების შესხურება კულტურის 4 ნამდვილი ფოთლის და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზაში	60(3) 60(2) 60(1)	7(3)
23	ბენტაგონი, წბ 480 გ/ლ (ბენტაზონი) (4)	1.5-3	სოიო	ერთწლიანი ორლებნიანი (ბირკა)	-	30(1)	7(3)
	„შანდონგ ბინნონგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ“ ჩინეთი	3.0-4.0	სათესლე ბარდა, ლობიო	ერთწლიანი ორლებნიანი (გვირილა)	ნათესების შესხურება კულტურის 5-6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)

	1459						
		2,4-4,6	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2,4 დ-ს და 2მ-4ქ-ს მიმართ გამძლე	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი , ჭვავი, ქერი, შვრია, ფეტვი	„	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-4	საშემოდგომო ხორბალი , ქერი, შვრია სამყურას შეთესვით	„	ნათესების შესხურება სამყურას პირველი სამწაკვითიანი ფოთლის განვითარების შემდეგ (მარცვლოვნების ბარტყობის ფაზაში)	-(1)	7(3)
		2-3	სამყურას სათესლე ნათესები	ერთწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		2	იონჯა (ვეგეტაციის 1 წელი)	ერთწლიანი ორლებნიანი	სათესლე ნათესების შესხურება კულტურის 1-2 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1	კოინდარი ერთწლიანი	ერთწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის აღერების ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-2,5	სამკურნალო მცენარეები (ალბური კრიალოსანა, ვეგეტაციის 1 წელი)	ერთწლიანი ორლებნიანი	პლანტაციების შესხურება კულტურის 1-2 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-2,5	ბადის პიტნა	ერთწლიანი ორლებნიანი	პლანტაციების შესხურება კულტურის 4-6 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
24	ბესტ ამინი 500 წზ 500 გ/ლ (2,4- დიმეთილამინის მარილი) (თ), (3) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტშ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 964/18	1.6-2.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, შვრია, სარეველები ჭვავი. ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
		2,0-2.5	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)
25	ბომბა, წზ 757 გ/ლ (გლიფოსატის მჟავა 540 გ/ლ, გლიფოსატის	1-1,5	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან	-(1)	7(3)

	იზოპროპილამინის მარილზე გადანაგარიშებით 729 გ/ლ) (3) „მაკკილნილი ტრედიდინგ ლპ“ ირლანდია 1423	1-2,8		სარეველები მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	ზაფხულში (კულტურის დაცვით)		
		1-2	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი , ზორბალი, რაფსი, მზესუმზირა, სოია	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		1-2	არასასოფლო- სამეურნეო მიწები, ანეული	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე აქტიური ზრდის პერიოდში.	-(1)	7(3)
		1-2	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)
		1-2,8	ჩაი (სანერგეები და მრავალწლიანი ნარგავები)	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი , მრავალწლიანი ფესურიანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე განმეორებითი შესხურებით 50 დღის შემდეგ	-(1)	7(3)
		1-3	ქალაქის, სოფლის ობიექტები :სკვერები, პარკები, რკინიგზის ზონები და ნაპირები, მინდვრები, ის პირები, გზები, აეროპორტები და სხვა ობიექტები	ბუჩქოვან- მერქნიანი მცენარეულობა, ხეები	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
		1,5-2,5	საირიგაციო და სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები	„	-(1)	7(3)
26	ბოქსერი 48 წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (3) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.« თურქეთი 1080/19	3-6	ხეხილი ვაზი ციტრუსი თხილი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)

		6	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი			
		10	გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები, მინდვრის პირები	ბუჩქები და ხეები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე		
		10	საირიგაციო და სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები			
27	ბუქტრილი ეკ 327, 5 (ბრომოქსინილ ოქტანოატი 327, 5 გ/ლ) (თ) “ზაიერი აგ.” გერმანია 1203	1 0, 5 0, 25	ხახვი	ერთწლიანი მარცვლოვანი	ნათესების ერთჯერადი შესხურება კულტურის 2 ფოთლის ფაზაში, ან ორჯერადი შესხურება კულტურის 1 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში და 8- 10- დღიანი ინტერვალით, ან ოთხჯერადი შესხურება კულტურის 1 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში და 8- 10- დღიანი ინტერვალით,	-(1-4)	7 (3)
28	გავან ექსტრა, წებრ 750 გ/კგ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „შანდონგ ვეიფანგ რეინზბოუ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1394	70-100 გ/ჰა	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
29	გალანტი, წბ 150 გ/ლ (ამონიუმის გლუფოსინატი) (თ), (4) შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 1342	3 5	ხეხილი, ვაზი, თხილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები (ნაცარქათამა, ჩაქვის ბალახი, ბურჩხა, ჯიჯლაყა და სხვ.)	მიმართული შესხურება ახალგაზრდა ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე, აქტიური ზრდის პერიოდში (კულტურის დაცვის პირობებში). ხარჯვა-200-400 ლ/ჰა	-(2)	7(3)

				ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები (რძიანა, იაპონური გრაკლა, ეკალიჭი, ოქროწყებლა, კაროლინას მალყურძენა და სხვ.)			
30	გალაქსი 240 ეკ, ეკ 240 გ/ლ (ოქსიფლორფენი) (თ), (4)	2.5-4.2	ვაშლი ციტრუსი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტირებულ სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
	„საფა ტარიმი ა.ს.“ თურქეთი 668/14/19	0.5	ხახვი, ნიორი	„	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1.0	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1,0	მზესუმზირა				
31	გალიგანი, ეკ 240 გ/ლ (ოქსიფლორფენი) (თ), (4)	4.2-8.4	ვაშლი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტირებულ სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
	„ადამა აგრიქალა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 741/15/19	0.5	ხახვი	“	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1.0	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
32	გეიზერი, წზკ 480 გ/ლ გლიფოსატიიზოპროპი ლამინის მარილი, შეავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ) (თ), (4) „შანზაი მხო ჩემიკალ ლტდ“ ჩინეთი 710/18	4-4.3	ხეხილი ვაზი ციტრუსი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		4-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვანი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)

33	გლიცინტი, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი) (თ), (3) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 631/13/19	2-4	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		4-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)
34	გლინი, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი, 360 გ/ლ გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით) (თ), (3)	2-4	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	„ნანჯინგ ბესტგრინ ქემიკალ კო., ლტდ“ ჩინეთი 919/18	4-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)
35	გლიფოგანი, წხ 360 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (4) „ადამა აგრიქალჩა ბ.ვ.“	2-4	ხეხილი ვაზი, ციტრუსი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	ნიდერლანდები 457/19	4-6	ხეხილი ვაზი, ციტრუსი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვ ნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)

		2-4	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		5.2	ჩაი (სანერგეები და მრავალწლიანი ნარგავები)	მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	ვეგეტირებული სარეველების შესხურება, განმეორებით 50 დღის შემდეგ	-(2)	7(3)
		4-6	ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: სკვერები, პარკები, რკინიგზის ზონები, საწარმოო დაწესებულებები და სხვა ობიექტები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩქოვან-მერქნიანი მცენარეულობა	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
		3-6 6-8	ტყის სანერგეების საანეულო მინდვრები	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები ჰიდროფიტული (წყლის ჭაობის) სარეველები	სარეველების შესხურება ყვავილობამდე ან ყვავილობისას აქტიური ვეგეტაციის პერიოდში	-(1) -(2)	7(3) 7(3)
36	გლიფოვიტი, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი, მჟავაზე გადანაგარიშებით 360 გ/ლ) (თ), (3) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“	4-5 6-8	ხეხილი ვაზი, ციტრუსი, თხილი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	უკრაინა შპს „გეოუკრაიტი“ საქართველო 920/18	2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)
		2-4	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		4-6	ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: სკვერები, პარკები, რკინიგზის ზონები, საწარმოო დაწესებულებები და სხვა	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩქოვან-მერქნიანი მცენარეულობა	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)

			ობიექტები				
		3-6	ტყის სანერგეების საანეულო მინდვრები	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	სარეველების შესხურება ყვავილობამდე ან ყვავილობისას	-(1)	7(3)
37	გლიფოსანი, წხ 360 გ/ლ (გლიფოსატი მჟავა) “აგრიკო გრუპ ოოდ” ბულგარეთი 414/08/12/18	2-4	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულ- ტურების დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
38	გოალი 2ე, ეკ 240 გ/ლ (ოქსიფლუორფენი) (თ), (4)	0.5	ხახვი, ნიორი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
	“დაუ აგროსაენსესი ემზს” ავსტრია 274/11/16	1.0	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		0, 8-1	მზესუმზირა(თეს, ლი, ზეთი)	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა		
39	გოლიაფი, წხ (2,4 დ მჟავას დიმეთილამინის მარილი 350 გ/ლ + დიკამბას დიმეთილამინის მარილი 125 გ/ლ) (3) შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა	0.5-0.8	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, შვრია, ფეტვი, ჭვავი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2,4 დ-ს და 2მ-4ქ-ს მიმართ გამძლე ღიჰას სახეობები (ნარი და სხვა)	ნათესების შესხურება ადრე გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზაში	60(1)	-(3)
	შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 921/17	1,2-1,5	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	60(1)	-(3)
40	დუიამინი, წხ 625 გ/ლ (2,4-დ მჟავა, მარილზე გადანაგარიშებით 820 გ/ლ წარმოდგენილი როგორც 455 გ/ლ დიმეთილამინისა და 365 გ/ლ დიეთილამინის მარილით) (თ), (4)	0,5-1,3 0,5-1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, შვრია, ჭვავი. ქერი ტრიტიკალე, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვან ი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
	„მაკინლი ტრეიდიგ ლკ“ ირლანდია 1456	0,5-1,4	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(7)

41	გონდოლიერი 240 გ/ლ (ოქსიფლორფენი) (თ), (4)	2.5-4.2	ვაშლი, მსხალი ციტრუსი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტირებულ სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას .ხარჯვა-400- 500 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1278	0.5	ხახვი, ნიორი	„	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1.0	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1,5	კომბოსტო		დარგვამდე ერთი დღით ადრე, სარეველების 2-3 სმ სიმაღლისას ან სარეველების ამოსვლამდე	-(1)	7(3)
		1,0	მზესუმზირა		ნათესების შესხურება დათესვის შემდეგ პირველივე კვირას, სარეველების ამოსვლამდე	-(1)	7(3)
42	გრანსტარი. წდგრ 750 გ/კგ (ტრიბენურონ- მეთილი) (4) “დუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ..” შვეიცარია 531/09/15	15-20 გ/ჰა	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე	ნათესების შესხურება სარეველის 2-3 ფოთლის ფაზაში კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე	-(1)	-(3)
		20-25 გ/ჰა	“	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე და მინდვრის ნარი, ხოვერა, ბეგიაური	“	-(1)	-(3)
		10-15 გ/ჰა	“	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე	ნათესების შესხურება სარეველის 2-3 ფოთლის ფაზაში კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე 100 მლ/ჰა “ ტრენდი-90 “-თან ნარევეში	-(1)	-(3)
43	გროდილ მაქსი ზდ 375 100+25+250 გ/ლ (ამიდოსულფურონი+ ნატრიუმის იოდოსულფურონი- მეთილი+ანტიდოტი) (თ) ”ბაიერ აგ” გერმანია 567/10/15	0.09–0.1	საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის განვითარების 2-3 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
44	დეამინი 720 წხ 720 გ/ლ (2,4-დ ამინის მარილი) (თ), (3)	1-1,8	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი	ნათესების შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)

	“შენზენ ქინგ ქუენსონ ინდასტრი კო, ლტდ” ჩინეთი 1172			ი სარეველები	აღერებამდე		
		1-1,8	სიმინდი	„	„	-(1)	-(3)
45	დიამინი, წზ 500 გ/ლ (2,4-დ მჟავა) (თ), (4)	1,5-2,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ზორობალი, შვრია, ჭვავი. ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
	“საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 532/09/15	1.5-2.5	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
46	დიანატი , წზ 480 გ/ლ (დიკამბა) (3) “ბასფი კორპორეიშენ ” აშშ 617/13/18	0.15-0.3	ზორობალი ქერი შვრია	ერთწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. 2.4დ-ს მიმართ გამძლეები მრავალწლიანი ორლებნიანი (ლიჭა და სხვ.)	შესხურება მარცვლოვნების ბარტყობის ფაზაში, ერთწლიანი სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში, მრავალწლიანი სარეველების სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 15 სმ-ს. გამოიყენება როგორც დამოუკიდებლად, ასე 2.4დ-თან კომბინაციაში. ხარჯვა –150-400 ლ/ჰა-ზე	-(1)	7(3)
		0.4-0.8	სიმინდი	“	“	-(1)	7(3)
47	დისერბონი კნ , ეკ 692 გ/ლ (2,4დ 346 გ/ლ+მეგპა 346 გ/ლ) (3) „ქემია ს.პ.ა. ” იტალია 1432	0.4-0.7	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ზორობალი ქერი ჭვავი შვრია	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველები (მინდვრის მდოგვი, ბაია, რუსული ღილილო, ყაყაჩო, რაფსი)	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში. ხარჯვა –400-600 ლ/ჰა-ზე	70(1)	-(3)
48	დიქსი, წზკ 480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი, 360 გ/ლ გლიფოსატის მჟავაზე გადანაგარიშებით) (თ), (3)	2-8	ვაზი ციტრუსები თხილი	ერთწლიანი , მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	28(1-3)	7-(3)
	„შანდონგ ვეიფანგ რაინზოვ ქემიკალ კო., ლტდ“ ჩინეთი 1383	2-6	ზეთოვანი კულტურების (მოსავლის აღებამდე) რაფსი, მდოგვი და სელი	ერთწლიანი, მრავალწლიანი, მარცვლოვნები და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის სიმწიფისას მოსავლის აღებამდე 2 კვირით ადრე მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%	-(1)	-(3)
		2-6	მარცვლოვნები	ერთწლიანი, მრავალწლიანი, მარცვლოვნები და	„	21(1)	-(3)

				ორლებნიანები			
49	დრაგო , ეკ 330 გ/ლ (კენდიმეტალინი) (თ), (3)	3-6	სოიო, სიმინდი, მხესუმზირა, თამბაქო, პომიდორი, კომბოსტო, წიორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(-)
	„მანდონგ ბინონგ ტექნოლოჯი კო, ლტდ „ ჩინეთი 1264	2,3-5	ხახვი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი		-(1)	20(3)
		5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
50	დუბლონ გოლდი, წდგრ 600 გ/კგ+150 გ/კგ (ნიკოსულფურონი+ტიფ ენსულფურონ-მეთილი) (თ), (3) დსს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 923/18	50-70 გ/ჰა + 200 მლ/ჰა ადიუ	სიმინდი (მარცვალი)	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჰანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში და ჰანგა მხოხავის 10-15 სმ სიმაღლისას, ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველების 1-4 ფოთლის ფაზაში + 200 მლ/ჰა ზან- ადიუ, ხარჯვის ნორმა 200- 300 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
51	დუამინი, წზ (2,4-დ მჟავა 625 გ/ლ, მარილზე გადაანგარიშებით 820 გ/ლ წარმოდგენილი როგორც 455 გ/ლ დიმეთილამინისა და 365 გ/ლ დიეთანოლამინის მარილით) (თ), (4)	0,5-1,3 0,5-1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, შვრია, ჭვავი. ქერი ტრიტიკალე, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვან ი სარეველები	წათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
	„სანონდა (ავსტრალია) პტუ ლტდ“ ავსტრალია 1456	0,5-1,4	სიმინდი	“	წათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(7)
52	ელიმინატორი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (4) “სტოქტონ კროპ პროტექშენ აგ “ შვეიცარია 643/13/18	1-1.25	სიმინდი (სამარცვლე) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჰანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანე ბში)	-(1)	7(3)
53	ელუმისი, ზდ 105 გ/ლ (მეზოტრიონი 75+ნიკოსულფურონი 30 გ/ლ) (თ), (3) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია	1-2	სიმინდი	ერთწლიანი და ზოგიერთი მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჰანგა, ბურჩხა) და ორლებნიანი (მინდვრის მდოგვი, ბოლოკა, სმ სიმაღლე	წათესების შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში (არაუგვიანეს 8 ფოთლის ფაზისა) და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე	60(1)	-(3)

	882/12/17			ნაცარქათამა, ჯიჯილაყა) სარეველები	მრავალწლიანე ბში). ხარჯვის ნორმა 200- 300 ლ/ჰა. ხელმეორედ დათესვის აუცილებლობისას პრეპარატის გამოყენების წელს შეიძლება დაითესოს მხოლოდ სიმინდი		
54	ესთეტი, ეკ (2, 4 დ 2-ეთილჰექსილის ეთერი 905 გ/ლ)	0, 6-0, 8	საგაზაფხულო ზორბალი, ქერი	ერთწლიანი და ერთწლიანი და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზაში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(7)
	(თ), (3) „ნუფარმი გმზხ და კო კგ ავსტრია 1238	0, 6-08	საშემოდგომო ზორბალი	*	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში გაზაფხულზე. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(7)
		0, 8-1, 0	სიმინდი	*	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზაში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(7)
55	ესკუდო, წდგრ 500 გ/კგ (რიმსულფურონი) (3) დსს ფირმა „ავგუსტი“	20 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა ადიუ	სიმინდი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ადრეული ზრდის ფაზაში	-(1)	7(3)
	რუსეთი 924/18	25 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა ადიუ 15+10 გ/ჰა+200 მლ ადიუ	სიმინდი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, მარცვლოვანი სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას და ღიჭას როზეტის ფაზაში ორჯერადი შესხურება პირველი და მეორე ტალღის სარეველების და კულტურის 2-6 ფოთლის ფა-ზაში (10-12 დღის ინტერვალით)	-(1)	7(3)
		25 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა ადიუ 15+10 გ/ჰა+200 მლ ადიუ	კარტოფილი	მრავალწლიანი (ჰანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი	ნარგავების შესხურება მიწის შემოყრის შემდეგ, სარეველების პირველი და მეორე ტალღის წამოსვლისას, მხოზავი ჰანგას 10-15 სმ სიმაღლისას ნარგავების შესხურება მიწის შემოყრის შემდეგ, ერთწლიანი სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთლი) და ჰანგას 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		25 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა ადიუ	პამიდორი (ნათესები)	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და	ნარგავების შესხურება კულტურის 3 ფოთლის ფაზაში და ერთწლიანი	-(1)	7(3)

		15+10გ/3ა+ 200 მლ/3ა ადიუ		ზოგიერთი ორლებნიანი (ჰანგა)	სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთოლი) ორჯერადი შესხურება კულტურის 3 ფოთლის ფაზაში და სარეველების მეორე ტალღის წამოსვლისას		
		25 გ/3ა+ 200 მლ/3ა ადიუ	პამიდორი (ნარგავები)	მრავალწლიანი (მხოხავი ჰანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი	ჩითილების შესხურება ნარგავების გადარგვიდან 15-20 დღის შემდეგ ნარგავების ორჯერადი შესხურება ნარგავების გადარგვიდან 15-20 დღის შემდეგ და სარეველების მეორე ტალღის წამოსვლისას	-(1)	7(3)
56	ესტერონი 600, ეკ (2, 4 დ მჟავას რთული 2- ეთილჰექსილის ეთერი 600 გ/ლ)	0, 6-08	საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, ქვავი	ერთწლიანი და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზაში	-(1)	-(7)
	(თ), (3) “დაუ აგროსაენსესი ვმზხ”	0, 7-08	საშემოდგომო ხორბალი	“	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში გაზაფხულზე	-(1)	-(7)
	ავსტრია 809/16	0.8-1.0	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზაში	-(1)	-(7)
		0, 7-1	სამოვრები		ნათესების შესხურება გაზაფხულზე	-(1)	-(7)
57	ეფდალ ალსონი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 968/18	1.25	სიმინდი (სამარცვლე) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჰანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანე ბში)	-(1)	7(3)
58	ეფდალ დიმეტრინი, წხ 500 გ/ლ (2,4- დ მჟავა) (თ), (3)	1.6-2.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, შვრია, ქვავი. ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	14(1)	-(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 987/18	2,0-2.5	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	14(1)	20(3)
59	ეფდალ ზალოსუპერი, ეკ 50 გ/ლ (კვიზალოფოპ-3-ეთილი) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 995/18	0,75-1	შაქრის ჰარხალი, ოსპი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ზურჩხა, მინდვრის სორგო, ძურწა, თივაქასრა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1-1,5	„	მრავალწლიანი	ნათესების შესხურება	-(1)	-(-)

61	ეფდალ კლოპარი 240 ეკ 240+60 გ/ლ (კლოდინაფოპ- პროპარგილი+ ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ- მექსილი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1037/18	0.3 0.3	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ზორბალი	შვრიუკა ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა, ღვარძლი)	ნათესების შესხურება სარეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში ნათესების შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მიწაში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
62	ეფდალ მეზუზინი, სფ 700 გ/კგ (მეტრიზუზინი) (თ)	1.1-1.4	ჰამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 969/18	0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1	“	“	სარეველების შესხურება 15-20 დღეში ჩითილების გადარგვიდან	30(1)	7(3)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.7-0.8	“	“	სარეველების შესხურება კულტურის 5 სმ-დე სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		0.5-1	სოიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.8-1	სიმინდი	“	“	-(1)	7(3)
63	ეფდალ მეტეორი, სფ 200 გ/კგ (მეტსულფურონ- მეთილი) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1062/18	37.5 გ/ჰა	საშემოდგომო ზორბალი, ქერი, შვრია,	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
64	ეფდალ ოქმოსტი 240 ეკ, 240 გ/ლ (ოქსიფლუორფენი) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1044/18	0.5	ზახვი ნიორი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1.0	“	“	ნათესების შესხურება	-(1)	7(3)

					კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში		
		0,8-1	მზესუმზირა	„	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	ზ7(3)
65	ეფდალ პენალინი 330 ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1038/18	5-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, მზესუმზირა, პამიდორი, კომბოსტო, სტაფილო, ნიორი, ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჭითილების გადარგვამდე. ხარჯვა-200-250 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
66	ეფდალ ულტრამიქსი, სე 452, 42 გ/ლ + 6,25 გ/ლ (2,4-დ მფავას რთული 2-ეთილ-ჰექსილის ეთერი+ფლორასულამი) (თ), (2) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1051/19	0,45-0,6	საშემოდგომო ხორბალი	ერთწლიანი ფართოფოთლოვანი ორლებნიანი, მ.შ. 2,4-დ და მცპას-მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ფესურიანი სარეველები	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის მიღში გასვლის ფაზაში (4 ფოთოლი) და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-225-400 ლ/ჰა	53(1)	-(4)
67	ეფდალ პროკერპი 50 სგ 500 გ/კგ (პროპიზამიდი) (თ),(3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1189	3-4	შაქრის ჭარხალი	აბრეშუმა ერთწლიანი, მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება აბრეშუმას მასიური გამოჩენისას, კულტურის 2-3 წყვილი ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		3-4	იონჯა	აბრეშუმა	ნათესების შესხურება დათესვის 1-3 დღის შემდეგ და მოსავლის აღების შემდეგ. ხსნარის ხარჯვა 400 -600 ლ/ჰა	-(2)	7(3)
		3-4	სალათა	ერთწლიანი, მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი სარეველები	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ, კულტურის აღმოცენებამდე ხარჯვა 600 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
68	ეფდალ როქსანი 48 წზ 480 გ/ლ (ზენტაზონი) (4) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1226	2	ხახვი	ერთწლიანი ორლებნიანი,	ნათესების შესხურება სარეველების გამოჩენისას, კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	30(1)	7-(3)
		2-2, 5	ლობიო	“	ნათესების შესხურება სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზაში	30(1)	7(3)
		1.5-3.0	სოიო	ერთწლიანი ორლებნიანი (ბირკა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	30(1)	-(3)

		3.0-4.0	სათესლე ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი (გვირილა)	ნათესების შესხურება კულტურის 5-6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	30(1)	-(3)
69	ექსპრესი , 75 წზგ 750 გ/გ (ტრიბუნურონ მეთილი) (თ),(4) “დუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ. “ შვეიცარია 711/15	15 გ/კა 30 გ/კა	მზესუმზირა (მხოლოდ სულფონილმარ დოვანას ჯგუფის ჰერბიციდების მიმართ გამძლე კომპანია “პიონერის “ ჰიბრიდები და ჯიშები) მზესუმზირა (მხოლოდ სულფონილმარ დოვანას ჯგუფის ჰერბიციდების მიმართ გამძლე კომპანია “პიონერის “ ჰიბრიდები და ჯიშები)	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანები ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზებში და სარეველის განვითარების ადრეულ სტადიაში 100 მლ “ტრენდი 90“- თან ნარევეში ორკვირიანი ინტერვალით. ხსნარის ხარჯვის ნორმა -200-300 ლ/ჰა. ძლიერ დასარეველიანებული ნათესების შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზებში და სარეველის განვითარების ადრეულ სტადიაში 100 მლ “ტრენდი 90“- თან ნარევეში. ხსნარის ხარჯვის ნორმა -200-300 ლ/ჰა.	-(2) -(1)	-(3) -(3)
70	ექსტრა, კვ 240 გ/ლ (ოქსიფლორფენი) (თ), (4)	0.5	ხახვი	ერთწლიანი ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
	„დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 1466	1.0	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
71	ვაგაბონდი 48 წზ 480გ/ლ (დიკამბა (დიმეტილამინის მარილი) (თ) “აგრიკო გრუპ ოოდ” ბულგარეთი 811/16	0.8-1	საგაზაფხულო და საშემოდგო- მო ხორბალი, ქერი, შვრია, ქვაკვი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2, 4-დ და 2მ-4ქ-ის მიმართ გამძლე და აგრეთვე ღიჭას სახეობები (ნარი და სხვა)	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1, 2	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2, 4-დ და 2მ-4ქ-ის მიმართ გამძლე და აგრეთვე ღიჭას სახეობები (ნარი და სხვა)	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
72	ვალსაგლიფი, წზ 360გ/ლ (გლიფოსატი) (3)	2-4	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში კულტურის დაცვით	-(1)	20(3)
	„ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კოზრე ს.ა. დე ს.ვ.“	2-4	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი,	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)

	მექსიკა 486/05/10/16		ხორბალი, რაფსი				
		5,2	ჩაი, (სანერგეები და მრავალწლიანი ნარგავები)	მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება განმეორებითი შესხურებით 50 დღის შემდეგ	-(2)	7(3)
73	ვალსატოპი, ეკ 330 გ/ლ (პენტიმეტალინი,)	3-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, პომიდორი, კომბოსტო, ნიორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(-)
	(თ), (3) „ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კოზრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 481/05/10/16	2,3-4,5	ხახვი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი		-(1)	20(3)
		3	ოხრახუში			-(1)	20(3)
		5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
		6-9	სამკურნალო მცენარეები (ანისული)	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება გაზაფხულზე მცენარის დარგვამდე	-(1)	-(3)
		3-5	ბადის პიტნა ვეგეტაციის 1 წელი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე შეიძლება დაითესოს ნებისმიერი კულტურა	-(1)	-(3)
		6	სამკურნალო სალბი, გვირილა	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი		-(1)	-(3)
74	ვეინი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (4) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1138	1.25-1.5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი)	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში	-(1)	7(3)
75	ვიდაგერი, წზგრ 250 გ/კგ (რიმსულფურონი) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 989/18	40 გ/ჰა+ 250 მლ/ჰა „აგროპოლი 8020”	სიმინდი	ერთწლიანი (ყურწა, ბურჩხა) და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა) და ორლებნიანი (ჯიჯლაძა, ცერცველა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ბარტყობის ფაზის დაწყებისას, მრავალწლიანი სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		50 გ/ჰა+ 200	კარტოფილი	მრავალწლიანი,	ნარგავების შესხურება	-(1)	7(3)

		მლ/ჰა „აგროპოლი 8020”		ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი (ჰანგა)	მიწის შემოყრის შემდეგ, ერთწლიანი სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთოლი) და ჰანგას 10-15 სმ სიმაღლისას		
		50 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა „აგროპოლი 8020”	პამიდორი	ერთწლიანი (ყურწა, ბურჩხა) და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალავა) და ორლებნიანი (ჯიჯლაძე)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ბარტყობის ფაზის დაწყებისას	-(1)	7(3)
76	ვიკილისი, წზგრ (მეზოსულფურონ- მეთილი 30,9 გ/კგ + იოდოსულფურონ- მეთილი ნატრიუმი 6,4 გ/კგ+ ანტიდოტი შეფენაირ დიეთილი 91,1 მლ/ლ) (თ), (3) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1434	0,25 +1 ლ/ჰა აგროპოლი 8020 0,3+1 ლ/ჰა აგროპოლი 8020	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი (ირაგა, კინძარა, ბეგაური) მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი (ვენახის მელაკუდა, შავთარა, ყეინა, ცერცველა, შვრიუკა, ჩიტიფეტვა)	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზის დასაწყისიდან დამთავრებამდე და მარცვლოვანი სარეველების განვითარების ადრეულ (2-4 ფოთოლი) სტადიაში და ორლებნიანების (2-6 ფოთოლი) სტადიაში. ჰერბიციდის სწრაფი ეფექტი მიიღწევა სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზაში	-(1)	-(3)
77	ვისტა, წზ 200 გ/ლ (ამონიუმის გლუფოსინატი) (თ), (4) „ლიერ ქემიკალ კო.ლტდ “ ჩინეთი 1283	3-5	ვაზი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე (კულტურის დაცვის პირობებში)	-(1)	7(3)
78	ზენკორ ლიკვიდი სკ 600 600 გ/ლ (მეტრიბუზინი) (თ)	0,3	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და ზოგიერთი მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	- (-)
	“ბაიერ აგ” გერმანია 712/14/19	0,4-0,7	“	“	ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ	42(1)	7(3)
		0,3-1,1	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0,5			ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 10 სმ სიმაღლემდე	42(1)	7(3)

		0,3-0,5	სტაფილო		ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ	42(1)	7(3)
79	ზერო, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატის მჟავა 360 გ/ლ, გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილზე გადაანგარიშებით)	2-4	ხეხილი ვაზი, ციტრუსი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	(თ) “აგრია ს.ა.” ბულგარეთი 778/18	4-8 4	ხეხილი, ციტრუსი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არა უმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)
		2-4	მინდვრები, , სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი და სხვა ტექნიკური კულტურები, ზეთოვანები, , ბოსტნეულ- ბაზჩეული	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		5.2	ჩაი (სანერგეები და მრავალ- წლიანი ნარგავები)	მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	ვეგეტირებული სარეველების შესხურება, განმეორებით 50 დღის შემდეგ	-(2)	7(3)
		4-6	ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: სკვერები, პარკები, რკინიგზის ზონები, საწარმოო დაწე- სებულებები და სხვა ობიექტები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩქოვან- მერქნიანი მცენარეულობა	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
		3-8	ტყის სანერგეების საანეულო მინდვრები	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	სარეველების შესხურება ყვავილობამდე ან ყვავილობისას	-(1)	7(3)
80	იაგუარი, ეკ 200 გ/ლ (კვიზალოფოპ-პ-ეთილი) „შანდონგ ბინონგ ტექნოლოჯი კო, ლტდ.“ ჩინეთი 1350	0,15-0,2 +მიმწეპებელი სარფაკტანტი 200 მლ/100 ლ 0,065-0,125 + მიმწეპებელი	ჭარხალი, კომბოსტო, რაფსი, სტაფილო, ყვავილოვანი კომბოსტო, მუხუდო, სამყურა, იონჯა, კიტრი, ლობიო	მოზამთრე- ერთწლიანი მარცვლოვანი (ნამკალა, შვრილა)	ნათესების შესხურება სარეველების ბარტყობის პერიოდში, ან 3 ფოთლის ფაზაში	-(1) -(1)	-(-)

		სარფაკტანტი 200 მლ/100 ლ 0,25-0,375 0,25 0,125-0,25 0,25 0,25-0,375 0,25-0,50	ლობიო, ხახვი, კარტოფილი, ბოლოკი, პომიდორი ბოლოკი, კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, სტაფი ლო, კიტრი, მწვანე ლობიო, ნესვი, ხახვი, მიწის თხილი კარტოფილი, გოგრა, სოია, მზესუმზირა, პომიდორი	მოზამბიკ- ერთწლიანი მარცვლოვნები (შვრიუკა) საზაფხულო - ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები (ბურჩხა.) მრავალწლიანი (გლერტა) ერთწლიანი მარცვლოვანი (ლომი) ბაიას ბალახი მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა.) ერთწლიანი მარცვლოვნები (მწყერფხა)	ნათესების შესხურება სარეველების ბარტყობის პერიოდში, ან 3 ფოთლის ფაზაში ნათესების შესხურება სარეველების 3 ფოთლის ფაზაში ნათესების შესხურება სარეველების 3 ფოთლის ფაზაში ნათესების შესხურება 2 ფოთლის ფაზაში ნათესების შესხურება სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზაში ნათესების შესხურება სარეველების 3 ფოთლის ან ბარტყობის ფაზაში	(1) (1)	(-) (-) (-)
81	იკანოსი 40 ზდ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „ნუფარმი გმზხ და კო კგ ავსტრია 831/16	1-1.5	სიმინდი (მარცვლი) სასილოსე	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ქანაგა) და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-8- ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში)	(1)	7(3)
82	იმპერატორი, წდგრ 600 გ/კგ (მეტსულფურონ- მეთილი) (3)	15-20 გ/ჰა	ხორბალი, ქერი, შვრია,	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/ჰა	(1)	(-)
	“ნიგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ” ჩინეთი 713/17	20-25 გ/ჰა	ხორბალი, ქერი, შვრია,	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. 2.4დ-ს მიმართ გამძლე და მინდვრის წარი, ხოვერა და	ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/ჰა	(1)	(-)

				ბეგიაური			
83	კაბუკი, გვ 26, 5 გ/ლ (პირაფლუფენ-ეთილი) (თ), „ნიჰონ ნოჰიაკუ კო, ლტდ“ იაპონია 1231	0, 4-0, 8	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, თხილი, კაკალი კივი	ფართოფოთლოვანი სარეველების კონტროლი: ნაცარქათამა, ჯიჯლაყა	კულტურის მიმართული შესხურება ფარის გამოყენებით 20- დღიანი ინტერვალით: (მარტი-სექტემბერი) (თებერვალი- სექტემბერი). მაქსიმალური საერთო ნორმა კულტურაზე სეზონის განმავლობაში -0, 8 ლ/ჰა. ხარჯვა – 200 ლ/ჰა	20(2)	-(3)
		0, 4 -0, 8	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, თხილი, კაკალი კივი	ძირებიდან ამონაყარის გასანადგურებლად	კულტურის მიმართული შესხურება ფარის გამოყენებით 20- დღიანი ინტერვალით (მარტი-სექტემბერი). მაქსიმალური საერთო ნორმა კულტურაზე სეზონის განმავლობაში -0, 8 ლ/ჰა. ხარჯვა – 200 ლ/ჰა	30(2) 7(2)	-(3)
		0, 4-0, 8	ვაზი	გვერდითი ყლორტების (მაქსიმუმ 15-20 სმ სიგრძის) გასანადგურებლად	კულტურის მიმართული შესხურება ფარის გამოყენებით 20- დღიანი ინტერვალით (აპრილი- აგვისტო).მაქსიმალური საერთო ნორმა კულტურაზე სეზონის განმავლობაში -0, 8 ლ/ჰა. ხარჯვა – 200 ლ/ჰა	60(2)	-(3)
		0, 4	ვაზი, ხეხილი, არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები, გზები, რკინიგზის ნაპირები	ფართოფოთლოვანი სარეველების კონტროლი	კულტურის მიმართული შესხურება ფარის გამოყენებით (თებერვალი- სექტემბერი). ხარჯვა – 200 ლ/ჰა	60(1)	-(3)
84	კაილეო, წიკ (2, 4 დ მჟავა 160 გ/ლ+ გლიფოსატი 240 გ/ლ) (თ)	3-5 4-5	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილის ბაღები (მინ. 3 წლის ასაკის ნარგავები)	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულიდან ზაფხულამდე, (კულტურის დაცვით), ხარჯვა – 200-400 ლ/ჰა	30(1)	7(3)
	„ნუფარმ გმზხ ენდ კო კვ ავსტრია 1191	3-5	სასოფლო- სამეურნეო კულტურები (მარცვლოვანი,	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის დამუშავებამდე ან კულტურების დათესვამდე 2 კვირით ადრე.	15(1)	7(3)

			სიმინდი, სორგო)		ხარჯვა – 200-400 ლ/ჰა		
		3-5	მინდვრები, რომლებიც განკუთვნილია საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლოვნების დასათესად	ერთწლიანი, მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	სარეველების შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ ან ნიადაგის დამუშავებამდე ხარჯვა – 100-400 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		4-5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები, რკინიგზის და გზების პირები, მინდვრის ნაპირები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	სარეველების შესხურება გაზაფხულიდან ზაფხულამდე, მათი აქტიური განვითარების პერიოდში, ხარჯვა – 200-500 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		3-5	სათიბ-სამოვრები	არასასურველი სარეველები	სამოვრების აღდგენის და მოხვნის წინ, ხარჯვა – 200-400 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		5	დეკორატიული მცენარეები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 100-500 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
85	კალსონი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტშ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“ თურქეთი 985/18	1.2 5-1.5	სიმინდი (სამარცვლე) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, ბურჩხა, მწყერფხა, მხოხავი ჭანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი (მწვანე ძურწა) და ერთწლიანი ორლებნიანი (ნაცარქათამა, დანდური, ცეცხლეკალა, ჭვეულებრივი ჯიჯილაყა)	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-12 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში)	-(1)	7(3)
86	კვიკსტეპი.ევ (კლეთოდირი 130 გ/ლ+გალოქსიფოპ-პ-მეთილი 80 გ/ლ) (3) დსს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 1357	0,4 0,8	კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, რაფსი, სოია, ბარდა, მხესუმზირა, სტაფილო, ხახვი, კომბოსტო	ერთწლიანი მარცვლოვანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი (მხოხავი ჭანგა)	ნათესების და ნარგავების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში კულტურის განვითარების ფაზისაგან დამოუკიდებლად ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა ნათესების და ნარგავების შესხურება მხოხავი ჭანგის 10-12 სმ სიმაღლისას კულტურის განვითარების ფაზისაგან დამოუკიდებლად	60(1)	-(3)

					ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა		
87	კვინ სტარ მაქსი, კვ 125 გ/ლ (კვიზალაფოპ-პ- ეთილი) (თ), (3)	0,4-0,6	რაფსი, სოია	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე - ერთწლიანები-2-4 ფოთლის ფაზაში და მრავალწლიანები 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
	შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრატი“ საქართველო 928/17	1-1,2	კარტოფილი, ხახვი, პამიდორი, შაქრის ჭარხალი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
88	კლიმი, წხ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ) (თ), (3)	2, 5-4, 5	ხეხილი ციტრუსი	ერთწლიანი, მრავალწლიანი და მარცვლოვნები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	“შენზენ კინგ ქუენსორ ინდასტრი კო, ლტდ” ჩინეთი 836/18	1.5-3.5	ვაზი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი სარეველები	„	-(1)	7(3)
89	კლიმი +, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ) (3) „რასტარ კროპპროტექშენ პტი ლტდ“ ავსტრალია 1385	3-6 2,75-5,5	ხეხილი ციტრუსი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი რიგთაშორისი სარეველები	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2,7-5,5	მინდვრები, სადაც დაითესება, სიმინდი		შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		2,75-7,3	არასასოფლო- სამეურნეო მიწები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე. გაზაფხულზე ან ზაფხულში კულტურის დაცვით. ხარჯვის ნორმა 500-800 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
90	კლინერი, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ)	3-4 4-6	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)

	(თ), (3) „ზეჯიანგ ხინან ქემიკალ ინდუსტრიალ გრუპ კო, ლტდ (ვინკა)“						
	ჩინეთი 1302	4-6	მინდვრები, რომლებიც განკუთვნილია საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლოვნების დასათესად	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ მომდევნო კულტურის თესვამდე 3-4 კვირით ადრე	-(1)	7(3)
		4-6	ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: სკვერები, პარკები, რკინიგზის ზონები, საწარმოო დაწესებულებები და სხვა ობიექტები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩქოვან- მერქნიანი მცენარეულობა	შესხურება ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
91	კლინერ ექსტრა, წდგრ 757 გ/ლ (გლიფოსატის ამონიუმის მარილი 75,7%, გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 68%) (3) „ზეჯიანგ ხინან ქემიკალ ინდუსტრიალ გრუპ კო, ლტდ“ ჩინეთი 1404	1.6-3.3	ხეხილი ციტრუსი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		1.1-2.4	მინდვრები, სადაც დაითესება, სიმინდი		შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		1.1-4.4	არასასოფლო- სამეურნეო მიწები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე. გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		1,6-3,3	თეთრი ჟოლოს კლანტაცია	”	”	-(1)	7(3)
		1,1-4,4	ქალაქის, სოფლის ობიექტები :სკვერები, პარკები, რკინიგზის ზონები, საწარმოო დაწესებულებები და სხვა ობიექტები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩქოვან- მერქნიანი მცენარეულობა	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
		1,1-4,4	ტყის ბილიკები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	სარეველების შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობისას	-(1)	7(3)

92	კლინი იქსტრიმი, წბ 540 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილის + კალიუმის მარილის სახით, 540 გ/ლ გლიფოსატის მჟავა) (4)	1,4	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, კივი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	მიმართული შესხურება ვეგეტირე-ბულ სარეველებზე გაზაფხულზე და ზაფხულში კულტურის დაცვით. ხარჯვა 100-200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
	“ნუფარმი გმზხ და კო კვ” ავსტრია 1335	2,0		მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	„	-(1)	7(3)
		1,4-2,0	ანეული	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	მიმართული შეს-ხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მთი აქტიური ზრდის პერიოდში	-(1)	7(3)
		1,4 2,0	მინდვრები, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა კულტურების (საგაზაფხულო მარცვლოვანი, ბოსტნეული, კარტოფილი, პარკოსნები, ბაღჩეული, ტექნიკური, ზეთოვანი), ასევე ერთწლიანი ყვავილოვანი დეკორატიული, გაზონის და სხვა საგაზაფხულო ნათესებისათვის	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირე-ბულ სარეველებზე ზაფხულის ბოლოს ან შემოდგომაზე, წინამორბედი კულტურის ნამკალზე. ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		1,4-2,0 2,0-3,0	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები (ელექტროგადამც ემი ხაზების დაცული ზონები და განაკაფები, გაზ- და ნავთობსადენები ს ტრასები, სარკინიგზო და ავტომაგისტრალ ების გზის პირები და მიწაყრილები, აეროდრომები და სხვა საწარმოო ტერიტორიები)	ერთწლიანი და მგრძობიარე მრავალწლიანი არასასურველი მარცვლოვანი და ორლებნიანი ბალახოვანი მცენარეულობა ყველა სახეობის არასასურველი ბალახოვანი მცენარეები (შედარებით გამძლე ბრძამის, ლერწმის და სხვა გამოკლებით), ფოთლოვანი ხე- ბუჩკოვანი ჯიშები (ვერხვი, არყის ხე, მურყანი (თხმელა)	შესხურება ვეგეტირებულ არასასურველ სარეველებზე. ხარჯვა- 100-200 ლ/ჰა. შეწამვის ჩატარების სეზონზე დამუშავებულ ტერიტორიებზე იკრძალება მარწყვის და სოკოს შეგროვება	-(1)	7(3)

		3,0-4,0		შედარებით გამძლე არასასურველი ბალახოვანი მცენარეები (შედარებით გამძლე ბრძამის, ლერწმის და სხვა გამოკლებით), ფოთლოვანი ხე- ბუჩქოვანი ჯიშები (ტირიფი)			
		1,4-2,0	მინდვრები, სადაც დაითესება შაქრის ჭარხალი და სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მრავალწლიანი (მათ შორის მხოვნი ჭანგა) სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის დათესვამდე 2 კვირით ადრე. ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		1,4-2,0	პამიდვრის, მზესუმზირის, სოიოს, სიმინდის ნათესები, კარტოფილის ნარგავები	„	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის აღმოცენებამდე 2-5 დღით ადრე. ხარჯვა-100-200 ლ/ჰაადრე	-(1)	7(3)
		1,4-2,0	მინდვრები, რომლებიც განკუთვნილია მზესუმზირის, კომბოსტოს, სოიოს დასათესად ან დასარგავად	„	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის დათესვამდე (დარგვამდე) 2-5 დღით ადრე. ხარჯვა- 100-200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		1,4-2,0	მინდვრები, რომლებიც განკუთვნილია სართავი სელის დასათესად	„	„	-(1)	7(3)
		0,4-0,5	იონჯა	აბრეშუმა	ნათესების შესხურება გათიბვიდან 7-10 დღის შემდეგ. ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
93	კლინი, წბ 480 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი, 360 გ/ლ გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით) (4)	2-3	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	მიმართული შეს-ხურება ვეგეტირე-ბულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	7(3)
	“ნუფარმი გმზხ და კო კვ” ავსტრია 455/04/09/14/19	2-3	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		3-5	სიმინდისა და ხორბლის ნაწვერალზე	მრავალწლიანი ორლებნიანი	მომდევნო კულტურების დათესვამდე 3-4 კვირით ადრე	-(1)	7(3)

		5 4-6	ჩაი (სანერგეები და მრავალწლიანი ნარგავები)	მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი და ბუჩქოვანი სარეველების ნაწილი	ვეგეტირებული სარევეების შესხურება კულტურის დაცვით, განმეორებით 50 დღის შემდეგ	-(2) -(1)	7(3) 7(3)
		5-6	გზის პირები, სადრენაჟო არხები, ბუჩქოვანი მცენარეები	არასასურველი მცენარეულობა	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე. 1-1.5 % - იანი ხსნარი). ხარჯვის ნორმა 500-800 ლ/ჰა	-(2)	7(3)
		5-6	ბუჩქოვანი მცენარეები	“	მიმართული შესხურება ბუჩქოვან მცენარეებზე	-(1)	7(3)
94	კლინ-აპი, ს 480 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი, 360 გ/ლ გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით) (3) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 1018/18	3-4,5 6	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, ზეთისხილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარევეები მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-3	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ზორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		4-6	სიმინდისა და ზორბლის ნაწვერალზე	მრავალწლიანი ორლებნიანი	მომდევნო კულტურების დათესვამდე 3-4 კვირით ადრე	-(1)	7(3)
		10	გზის პირები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები, სადრენაჟო არხები, მინდვრების ნაპირები	არასასურველი მცენარეულობა	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე. 1-1.5 % - იანი ხსნარი). ხარჯვის ნორმა 500-800 ლ/ჰა	-(2)	7(3)
		10	ბუჩქოვანი მცენარეები და არასასურველი მერქნიანი მცენარეები	“	მიმართული შესხურება ბუჩქოვან მცენარეებზე	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისა) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	7(3)
95	კოვბი 80 ეკ 80+20 გ/ლ (კლოდინაფოპ-პროპარგილი+	0.3-0.4	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ზორბალი	შვრიუკა	ნათესების შესხურება სარეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში	-(1)	-(-)

	ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ- მექსილი) (თ), (3) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს. თურქეთი 952/18	0.5-0.75	“	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა)	ნათესების შესხურება 2-3 წამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მილში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
96	კონკერ ექსტრა, ეკ 240+60 გ/ლ (კლოდინაფოპ- პროპარგილი+ კლოკვინტოსეტ მექსილი)	0.3	საშემოდგომო ზორობალი ქერი	შვრიუკა	ნათესების შესხურებასარეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში	-(1)	7(3)
	(თ), (4) „პარიჯატ ინდასტრიზ (ინდოეთი) პეტ ლტდ ინდოეთი 1322	0.5	“	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა)	ნათესების შესხურება 2-3 წამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მილში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
97	კონკერი, ეკ 80+20 გ/ლ (კლოდინაფოპ- პროპარგილი+ ანტიდოტი)	0.3-0.4	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ზორობალი	შვრიუკა	ნათესების შესხურებასარეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში	-(1)	7(3)
	(თ), (4) “პარიჯატ ინდასტრის პეტ. ლტდ” ინდოეთი 534/09/15	0.5-0.75	“	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა)	ნათესების შესხურება 2-3 წამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მილში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
98	კორვეტი, სე 452, 42 გ/ლ + 6, 25 გ/ლ (2, 4-დ მჟავას რთული 2- ეთილ-ჰექსილის ეთერი+ფლორასულამი) (თ), (2) „საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 1259	0, 5-0, 7	საშემოდგომო ზორობალი ქერი	ერთწლიანი ფართოფოთლოვან ი ორლებნიანი, მ.შ. 2, 4-დ და მცპას- მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ფესურიანი სარეველები	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის მილში გასვლის ფაზაში (4 ფოთოლი) და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა – 225-400 ლ/ჰა	53(1)	-(4)
		0, 7-0, 8	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა – 200- 300ლ/ჰა	60(1)	-(4)
99	კორუმა ვიდ კილერი დ, წხ 500 გ/ლ (2,4-დ მჟავა, დიმეტილამინის მარილზე გადაანგარიშებით 600 გ/ლ) (თ), (4)	1,6-3,0	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ზორობალი, შვრია, ქვაფი. ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
	„კორუმა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.” თურქეთი	2,0-2.5	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)

	1307						
100	კორფოსატი 48 წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი, გლიფოსატის	3	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ) (თ), (3) „კორუმა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს“	4-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	თურქეთი 1306	4	მინდვრები , სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		4-6	რკინიგზის ზონები, საწარმოო დაწესებულებები და სხვა ობიექტები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩქოვან- მერქნიანი მცენარეულობა	შესხურება ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
101	ლაგუნი 70 სფ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი) (თ)	1.1-1.4	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)
	„ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს. თურქეთი 1155	0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.5-1	სოიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
102	ლასტიკი ექსტრა, ეკ 70+40 გ/ლ (ფენოქსაპროპ-პ-ეთილ+ ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ- მექსილი)	0.8-1.2	საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი	ერთწლიანი მარცვლოვნები (შვრიუკა, ძურწას ყველა სახეობა, ბურჩხა)	ნათესების შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 2 -3 ფოთლის ფაზიდან კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვა 100-200 ლ/ჰა	60(1)	-(3)
	(თ), (3) დსს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 925/18	0.8-1	საშემოდგომო ხორბალი	ერთწლიანი მარცვლოვნები (შვრიუკა, ძურწას ყველა სახეობა, ბურჩხა)	ნათესების შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 2 -3 ფოთლის ფაზიდან კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვა 100-200 ლ/ჰა	60(1)	-(3)
103	ლექტორი, სკ (მეზოტრიონი 480 გ/ლ) (თ), (3) „შანდონგ ვეიფანგ რაინზოვ ქემიკალ კო., ლტდ“ ჩინეთი 1437	200 მლ/ჰა	სიმინდი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი (შვრიუკა, ბურჩხა, მწყერფება, ბოლოკა, ნაცარქათამა,	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მხოხავი ჰანგასთვის)	-(1)	-(3)

				წიწმატურა)	ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა.		
104	ლოგრანი 75 წდგრ 750 გ/კგ (ტრიასულფურონი) (თ), (3) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ" შვეიცარია 569/10/15	6.5-10 გ/ჰა	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანები, მ.შ. 2.4 დ-ს და 2მ- 4ქ-ის მიმართ გამძლე, ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზის დასაწყისში მილში გასვლამდე, ერთწლიანი სარეველების ფაზაში და მრავალწლიანი სარეველების როზეტის ფაზაში (5 სმ-დე დიამეტ- რით). გამოიყენება ნიადაგებში, რომელთა პH არ აღემატება 7.5-ს. განმეორებითი თესვის საჭიროებისას გამოიყენება მხოლოდ საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი. არ გამოიყენება მარცვლოვნებში პარკოსნების შეთესვით აგრეთვე	-(1)	-(4)
					თუ მცენარეები იმყოფება სტრესულ მდგომარეობაში (არახელსაყრელი ამინდობრივი პირობები, ჭარბი ტენიანობა)		
105	მაისი, მდს 250 გ/კგ (რიმსულფურონი) "პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ" ინდოეთი 570/10/15	40 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა "ტრენდი 90"	სიმინდი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ბარტყობის ფაზის დაწყებისას	-(1)	7(3)
		50 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა "ტრენდი 90"	სიმინდი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, მრავალწლიანი სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		50 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა "ტრენდი 90"	კარტოფილი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი (ჰანგა)	ნარგავების შესხურება მიწის შემოყრის შემდეგ, ერთწლიანი სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთოლი) და ჰანგას 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
106	მაისტერი წზგრ 62 620 გ/კგ (ფორამსულფურონი 300+-ნატრიუმის იოდოსულფურონ- მეთილი20+ანტიდოტი იზოქსადიფენ-ეთილი 300) (4) "ზაიერ აგ" გერმანია	150 გ/ჰა	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანები და მარცვლოვნები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებისას, სიმინდის 7 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	7(3)

	595/17						
107	მაისტერ პაუერი ზდ 57, 5 57, 5 გ/ლ (ფორამსულფურონი ნატრიუმის 31, 5 გ/ლ+იოდოსულფურონი- მეთილ ნატრიუმის 1, 0 გ/ლ, თიენკარბაზონ- მეთილი 10, 0 გ/ლ+ციპროსულფამიდი 15 გ/ლ) “ბაიერ აგ” გერმანია 1187	1.25-1.5	სიმიინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი), მ.შ. 2, 4 დ-ს მიმართ გამძლე	შესხურება კულტურის 3-7 ფოთლის ფაზაში და სარეველების ბარტყობის ფაზაში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
108	მაჩეტე, ზდ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „მაკკინლი ტრედიინგ ლპ“ ირლანდია 1452	1-1,25	სიმიინდი (სამარცვლე, სასილოსე)	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები მძურწა, ზურწხა, მწყერფება, ღვარძლი, შალაფა, მხოხავი ჭანგა, ჯიჯლაყა)	შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
109	მაჯესტიკი, წდგრ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი) (თ), (4)	1.1-1.4	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)
	“პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 535/09/15	0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1	“	“	სარეველების შესხურება 15-20 დღეში ჩითილების გადარგვიდან	30(1)	7(3)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.7-0.8	“	“	სარეველების შესხურება კულტურის 5 სმ-დე სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		0.5-1	სოიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.8-1	სიმიინდი	“	“	-(1)	7(3)
		2.1	ვარდი ეთერზეთოვანი (1-2 წლის და მსხმოიარე ნარგავები)	“	ადრე გაზაფხულზე ნიადაგის შესხურება რიგებში კულტურის ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1)	7(3)
110	მენსურონი, ზდ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „შანდონგ ბინონგ ტექნოლოჯი კო, ლტდ“, ჩინეთი 1263	1-1.5	სიმიინდი (სამარცვლე) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-4 ფოთლი ფართოფოთლოვან ერთწლიანებში, 3-5 ფოთლი მარცვლოვნებში	-(1)	7(3)

					და 20-30 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში)		
111	მერი X-480 წზ 480 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ) (3) „ხარო ლტდ“ ბულგარეთი 1436	3-4,5 6	ზეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, ზეთისხილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		1,5-4 4-6	მინდვრები, სადაც დაითესება სხვადასხვა საგაზაფხულო კულტურები	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ ან გაზაფხულზე საგაზაფხულო კულტურების დათესვამდე 2 კვირით ადრე. ხარჯვა -100-200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		1,5-4	ანეული	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მათი აქტიური ზრდის პერიოდში. ხარჯვა -100- 200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		2,25-4,5 4,5-6	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები (გზის პირები, ტრასები, რკინიგზის წაპირები, აეროპორტები, საწარმოო დაწესებულებები და სხვა ობიექტები)	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მათი აქტიური ზრდის პერიოდში. ხარჯვა -100- 200 ლ/ჰა არ დაიშვება სოკოსა და კენკრის შეგროვება დამუშავების ჩატარების სეზონზე	-(2)	7(3)
112	მეტრაბუზ დ 700 სვ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი) (თ), (3) „აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი	1.5-2	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)

	1258						
113	მეტრიკი სკ 60+ 233 გ/ლ (კლომაზონი +მეტრიბუზინი) (თ), (4) “ფმს ქემიკლ სპრლ.” ბელგია 715/15	1.5	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(7)
114	მეტსი, წდგრ 600 გ/კგ (მეტსულფურონ- მეთილი) (3) “პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 571/10/15	8 –10 გ/ჰა	ხორბალი, ქერი, შვრია,	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
115	მეტსილი, წდგრ 600 გ/კგ (მეტსულფურონ- მეთილი) (3) “შანდონგ ბინონგ ტექნოლოჯი კო ლტდ” ჩინეთი 1471	10-12 გ/ჰა	ხორბალი, ქერი, შვრია,	ერთწლიანი (ბოსტნის ია, მატიტელა, ქვათელა, წიწმატურა, მინდვრის მდოგვი, ბოლოკა, გვირილა, ქუთქუთა, ჩვეულებრივი ჯიჯლაყა) და მრავალწლიანი ორლებნიანი (მინდვრის ნარი)	ნათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
116	მილადარი, სკ 45 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 926/17	1,25	სიმინდი (მარცვალი) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა) ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში)	-(1)	7(3)
117	მისტრალი, წზგრ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი) (თ), (4)	0.7-1.4	ჰამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	- (-)
	„ადამა აგრიქალა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 742/15/19	0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1-1.5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
118	მორბიდოლი 240 ეკ 240 გ/ლ (ოქსიფლოუროფენი)	2,4	მსხალი	ერთწლიანი ორლებნიანები მარცვლოვანი (	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე	-(1) 14(1)	7(3)

	(თ) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს“ თურქეთი 1346			ბურჩხა, ბურჩა,მწყერფება, ნაცარქათამა, ხვართელა, ყანის ჭლექი, ღიჭა, მდოგვი, ღორის ბირკა, ს ამკურნალო მატრიკარია ყაყაჩო, ჯიჯლაყა, დანდური, სალყურმენა, თუთაბალახა)	(კულტურის დაცვით).		
		2,5	ციტრუსი	ერთწლიანი ორლებნიანები მარცვლოვანი	„	-(1)	7(3)
		1	მზესუმზირა	ერთწლიანი ორლებნიანები მარცვლოვანი	შესხურება დათესვიდან ერთი კვირის შემდეგ ან სარეველების აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0,75	ხახვი	ერთწლიანი ორლებნიანები მარცვლოვანი	შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1, 5	ყვავილოვანი კომბოსტო	ერთწლიანი ორლებნიანები მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე ერთი დღით ადრე	-(1)	7(3)
119	მუზა, წხვრ 750 გ/კგ (მეტრიზუზინი) (თ) „შანდონგ ვეიფანგ რეინზოლ ქემიკალ კო ლტდ“ ჩინეთი 1461	0,8-1,3	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(7)
		1	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1,3-1,7	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
120	მუსონ ექსტრა , წხვრ 800 გ/კგ (2,4- დიმეთილამინის მარილი) (თ), (3) „შანდონგ ვეიფანგ რაინზოვ ქემიკალ კო., ლტდ“ ჩინეთი 1429	0,6-0,8	ზორბალი, შვრია, ჭვავი. ქერი	ერთწლიანი , მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში მიღში გასვლამდე, , საშემოდგომო ნათესების დამუშავება გაზაფხულზე	-(1)	-(3)
		0,8-1	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)
121	ნემასოლი, წხ 510 გ/ლ (მეტამსოდიუმი)	60-120 გ/კვ.მ.	კიტრი, პამიდორი (ღია და დახურული	სარეველების გაღივებული თესლის	მექანიზებული შეტანა 20 სმ სიღრმეზე და ნიადაგის დაფარვა ცელოფანის	-(1)	30(30)

	“ტამინკო ბეზა” ბელგია 560/10/15		გრუნტი), დეკორატიული კულტურები	წინააღმდეგ	აპკით. თესვა ან რგვა 30 დღის შემდეგ		
		80-120 გ/კვ.მ.	მრავალწლიანი კულტურების სანერგეები	“	“	-(1)	30(30)
122	ნერო, 75 წდგრ 750 გ/კგ (ტრიბენურონ- მეთილი) (3) „ერთარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1275	15-20 გ/კა 20-25 გ/კა	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ზოიზალი, ქერი, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე მინდვრის ნარი, ხოვერა, ბეგიაური	ნათესების შესხურება სარეველის 2-3 ფოთლის ფაზაში კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე	-(1)	-(3)
123	ნიკოგანი 40 სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „ადამა აგრიქალა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 794/15	1-1.5	სიმინდი (სამარცვლე) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-4 ფოთოლი ფართოფოთლოვან ერთწლიანებში, 3-5 ფოთოლი მარცვლოვანებში და 20-30 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში)	-(1)	7(3)
124	ნიკონი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „ერთარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1229	1-1.5	სიმინდი (სამარცვლე) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-4 ფოთოლი ფართოფოთლოვან ერთწლიანებში, 3-5 ფოთოლი მარცვლოვანებში და 20-30 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში)	-(1)	7(3)
125	ნიკოფურონი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (4) “ ნინგბო სანჯიო აგროსაიენს კო ლტდ” ჩინეთი 720/15	1.25-1.5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში	-(1)	7(3)
126	ნიფურონი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (4) „ნანჯინგ რონქუიმ კო, ლტდ“ ჩინეთი 1117	1.25-1.5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი)	შესხურება კულტურის 3- 6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში	-(1)	7(3)
127	ნოკდაუნი 48 წხკ	2-4	ხეილი	ერთწლიანი	შესხურება ვეგეტირებულ	-(1)	-(3)

	480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (4) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 537/09/15		ვაზი	მარცვლოვანი და ორლებნიანი	სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)		
		4-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	7(3)
		4-6	მინდვრები, რომლებიც განკუთვნილია საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლოვნების დასათესად	ერთწლიანი , მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	სარეველების შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ მომდევნო კულტურების თესვამდე 3-4 კვირით ადრე	-(1)	7(3)
128	ნოკდაუნ მაქსი წზგრ 748 გ/კგ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი, გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 680 გ/კგ)) (თ), (4) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 1319	2	ციტრუსი ვაზი თხილი ზეთისხილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2,5	ციტრუსი ვაზი თხილი ზეთისხილი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
129	პანდა 330 ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (3)	3-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, მზესუმზირა, პამიდორი, კომბოსტო, სტაფილო, წიორი, ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე.	-(1)	-(-)
	შპს „ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“ უკრაინა	3-5	საშემოდგომო ხორბალი	„	წიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
	შპს „გეოუკრავიტი“ საქართველო 927/17	2,5-4,5	ოხრახუმი ხახვი	„	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		5	კარტოფილი	„	წიადაგის შესხურება ბოლო მიწის შემოძრვამდე	-(1)	7(3)

					კულტურის აღმოცენებამდე		
130	პანდორა, 330 ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (4)	3-6	სოიო სიმინდი, თამბაქო პამიდორი კომბოსტო, ნიორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(-)
	“აგრიკო გრუპ ლტდ” ბულგარეთი 735/14/19	2.3-4.5	ხახვი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		3	ოხრახუში	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
		5	საშემოდგომო ხორბალი	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
131	პანტერა 40 ეკ 40 გ/ლ (კვიზალოფოპ-პ- ტეფურილი) (4) “არისტა ლაიფსაენს რეჯისტრემს გრეიტ ბრიტან ლტდ”	0, 75-1	შაქრის და სუფრის ჭარხალი, მზესუმზი რა, კარტოფილი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, პამიდორი, კიტრი, წიწაკა, ლობიო სელი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ზურჩხა, მინდვრის სორგო, ძურწა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა, ხარჯვა – 200-400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
	დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 466/05/11/17	1-1, 5	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა ხარჯვა – 200-400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		1, 2-1, 5	ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით ხარჯვა – 200-400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
132	პარდუსი 480 სკ 480 გ/ლ (ბენტაზონი) (4) „ფადერ ალიანს ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1359	1,75-3.0	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი,	ნათესების შესხურება სარეველების გამოჩენისას, კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში , კარტოფილის 10- 15 სმ სიმაღლისას	-(1)	-(3)
		1,5-3.0	ლობიო	“	ნათესების შესხურება სარეველების 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		1,5-3.0	სოიო	ერთწლიანი ორლებნიანი (ბირკა)	ნათესების შესხურება კულტურის 1-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		2,5-3.0	სათესლე ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი (გვირილა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)

133	პაროქსი 24 ეკ 240 გ/ლ (ოქსიფლუორფენი) (თ) “შანდონგ ბინონგ ტექნოლოჯი კო ლტდ” ჩინეთი 1472	0.5	ხახვი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები (თათაბო, ბოლოკა, მაღლყურძენა, ნაცარქათამა, ამბროზია, ჯიჯლაყა, მატიტელ, ხოვერა, ლიჭა, მინდვრის მდოგვი)	შესხურება კულტურის 2 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1.0	წიორი	“	ნათესების შესხუ-რება კულტურის 3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		4.2-8.4	ვაშლი	”	შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტირებულ სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
134	პაროქსიფენი 24 ეკ, ეკ 240 გ/ლ (ოქსიფლუორფენი) (თ)	0.5	ხახვი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
	“პარიჯატ ინდასტრის პეტ. ლტდ” ინდოეთი 837/16	1.0	“	“	ნათესების შესხუ-რება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		4.2-8.4	ვაშლი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტირებულ სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
135	პატრული, წდგრ 600 გ/კგ (მეტსულფურონ- მეთილი) (3) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ	10-15 გ/კა	ხორბალი, ქერი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხუ-რება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/კა	-(1)	-(-)
	ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 965/18	15-20 გ/კა	ხორბალი, ქერი,	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. 2.4დ-ს მიმართ გამძლე და მინდვრის ნარი, ხოვერა და ბეგიაური	ნათესების შესხუ-რება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/კა	-(1)	-(-)
136	პეკსი 240 ეკ, ეკ 240 გ/ლ (ოქსიფლუორფენი) (თ)	0.5	ხახვი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა – 200-300 ლ/კა	-(1)	7(3)
	“აგრიკო გრუპ ლტდ” ბულგარეთი 812/16	1.0-1, 5	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში, ხარჯვა – 200-300 ლ/კა	-(1)	7(3)
		0, 8-1	მზესუმზირა. სოიო. წიწკა. თამბაქო		ნადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე, ხარჯვა – 200-300 ლ/კა		

137	პენტაგონი, წბ 480 გ/ლ (პენტაზონი) (3)	2-4	საგაზაფხულო და საშემოდ გომო ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია, ფეტვი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2-4-დ-ს და 2მ-4ქ-ის მიმართ გამძლე.	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
	“პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 572/10/15	2-4	საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია, სამყურას შეთესვით		ნათესების შესხურება სამყურას პირველი სამწაკეთიანი ფოთლის განვითარების შემდეგ (მარცვლოვნების ბარტყობის ფაზაში)	-(1)	-(3)
		2, 4-4.6	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებლიანი, მათ შორის 2-4-დ-ს და 2მ-4ქ-ის მიმართ გამძლე.	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		1.5-3	სოია	ერთწლიანი ორლებნიანი (ბირკა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-3 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		3.0-4	სათესლე ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი (გვირილა)	ნათესების შესხურება კულტურის 5-6 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		2.0-3	სამყურას სათესლე ნათესები	“	“	-(1)	-(3)
		2	იონჯა (ვეგეტაციის 1 წელი)	“	სათესლე ნათესების შესხურება კულტურის 1-2 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)
		1	კოინდარი ერთწლიანი	“	ნათესების შესხურება კულტურის აღერების ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-2.5	სამკურნალო მცენარეები (ალპიური კრიალოსანა ვეგეტაციის 1 წელი)	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 1-2 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-2.5	ბაღის პიტნა	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 4-6 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
138	პენდიგანი, ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (4)	3-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, პამიდორი, კომბოსტო, ნიორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(3)
	„ადამა აგრიქლჩა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 744/15/19	2.5-4.5	ხახვი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		3	ოხრაზუმი	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
		5	საშემოდგომო ხორბალი	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		3.0-4	სათესლე ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი (გვირილა)	ნათესების შესხურება კულტურის 5-6 წამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(3)

		2.0-3	სამყურას სათესლე ნათესები	“	“	-(1)	-(3)
		2	იონჯა (ვეგეტაციის 1 წელი)	“	სათესლე ნათესების შესხურება კულტურის 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(-)
		1	კონდარი ერთწლიანი	“	ნათესების შესხურება კულტურის აღერების ფაზაში	-(1)	73)
		2-2.5	სამკურნალო მცენარეები (ალპიური კრიალოსანა ვეგეტაციის 1 წელი)	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	-(1)	73)
		6-9	ანისული		ნიადაგის შესხურება გაზაფხულზე მცენარის დარგვამდე	-(1)	73)
		3-5	ბადის პიტნა (ვეგეტაციის პირველი წელი)	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	73)
		6	სამკურნალო საღბი, გვირილა		პლანტაციების შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	73)
139	პილოტი, წდგრ 250 გ/კვ (რიმსულფურონი) (4) “ნინგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ”	40 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა “ტრენდა 90”	სიმინდი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ბარტყობის ფაზის დაწყებისას	-(1)	7(3)
	ჩინეთი 716/15	50 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა “ტრენდა 90”	სიმინდი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, მრავალწლიანი სა-რეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		50 გ/ჰა+ 200 მლ/ჰა “ტრენდა 90”	კარტოფილი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი (ჰანგა)	წარგავების შესხურება მიწის შემოყრის შემდეგ, ერთწლიანი სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთლი) და ჰანგას 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
140	პრიმო , წზ (2,4-დ დიმეთილამინის მარილი 720 გ/ლ, მჟავაზე გადაანგარიშებით 600 გ/ლ) (თ), (3) „მანდონგ ბინონგ ტექნოლოჯი კო, ლტდ„ ჩინეთი 1281	1-1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ზორობალი, ქერი, შვრია, ჰვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი ისარეველები	ნათესების შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში აღერებამდე	-(1)	-(3)
		0,8-1,2	სიმინდი	„	„	-(1)	-(3)
141	პულსარი 40, წზ 40 გ/ლ (იმაზამოქსი)	0.75-1	სოიო	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	დამუშავება კულტურის 2- 3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში და სარეველების	-(1)	-(-)

	(თ), (3) “ბასფი აგ” გერმანია 781/16				განვითარების 1-3 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა -250-300 ლ/ჰა. პულსარის გამოყენების შემდეგ არ შეიძლება სულფონილმარდოვანას ჯგუფის ჰერბიციდების გამოყენება. არ გამოიყენება კომბინირებულ ნაზავებში მარცვლოვანი სარეველების საწინააღმდეგო ჰერბიციდებთან		
		0.75-1	ბარდა (მარცვლი)	“	დამუშავება კულტურის 3-6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა -250-300 ლ/ჰა. პულსარის გამოყენების შემდეგ არ შეიძლება სულფონილმარდოვანას ჯგუფის ჰერბიციდების გამოყენება. არ გამოიყენება კომბინირებულ ნაზავებში მარცვლოვანი სარეველების საწინააღმდეგო ჰერბიციდებთან	-(1)	-(-)
142	პულსარ პლიუსი, წზ 25 გ/ლ (იმაზამოქსი) “ბასფ აგროქემიკალ პროდაქტს ზ.ვ.” პუერტო-რიკო 1209	1, 2-2	მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	დამუშავება კულტურის 2-8 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზაში. ხარჯვა -200-400 ლ/ჰა. პულსარის გამოყენების შემდეგ არ შეიძლება სულფონილმარდოვანას ჯგუფის ჰერბიციდების გამოყენება. არ გამოიყენება კომბინირებულ ნაზავებში მარცვლოვანი სარეველების საწინააღმდეგო ჰერბიციდებთან	-(1)	-(-)
143	პუმა სუპერი წზე 144 69+75 გ/ლ (ფენოქსაპროპ-პ-ეთილ+ ანტიდოტი მეფენპირ-დიეთილი) (თ), (3) “ბაიერ აგ” გერმანია 313/05/10/15	0, 8-1, 2	საგაზაფხულო ზოობალი	ერთწლიანი მარცვლოვნები (შვრიუკა, ძურწას ყველა სახეობა, ბურჩხა)	ნათესების შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 2 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე	-(1)	7(3)
		0, 8-1	საშემოდგომო ზოობალი	ერთწლიანი მარცვლოვნები (შვრიუკა, ძურწას ყველა სახეობა, ბურჩხა)	ნათესების შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 2 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე	-(1)	7(3)

144	რაუნდაპი მაქსი, წხ (გლიფოსატის მჟავა 450 გ/ლ, კალიუმის მარილის მიხედვით 551 გ/ლ) (თ), (3)	1.5-2,5 3,0-5,0	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი ციტრუსი ვაზი თხილი (მინ. 3 წლის ასაკის ნარგავები)	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში, მოსავლის აღების შემდეგ (კულტურის დაცვით), ხარჯვა-150-200 ლ/ჰა	-(2)	-(3)
	“ბაიერ აგრიკალზურ ზგბა“ ბელგია 980/18	1.5-2,5 3,0-5,0	სათოხნი კულტურები (სიმინდი, სორგო, პარკოსნები, შაქრის და სუფრის ჭარხალი, მზესუმზირა, რაფსი, თამბაქო, კომბოსტო, პამიდორი, კიტრი, სტაფილო, კარტოფილი) ნამჯა	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე . ხარჯვა-150-300 ლ/ჰა	-(2)	7(3)
		1,5-3.0	მინდვრები, რომლებიც განკუთვნილია საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლოვნების, მზესუმზირის, სოიას დასათესად	ერთწლიანი , მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	სარეველების შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ მომდევნო კულტურების თესვამდე 3-4 კვირით ადრე. ხარჯვა -100-150 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		3,0-5,0	საშემოდგომო ხორბალი საშემოდგომო და საგაზაფხულო ქერი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე. ხარჯვა-150-250 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		0,4-0,5 ან 0,15-0,2%	იონჯა	აბრეშუმას სახეობები	ნათესების შესხურება მოთიბვის 5-7 დღის შემდეგ. ხარჯვა-150-250 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		4,0-5,5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, აეროდრომები, დამბები, რკინიგზის და გზების პირები, მინდვრის ნაპირები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩკოვანი მცენარეები	სარეველების შესხურება მათი აქტიური განვითარების პერიოდში, ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		3,0-5,0	სათიბ-საძოვრები	არასასურველი სარეველები	საძოვრების აღდგენის და მოხვნის წინ. ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		2,5-4,0	სატყეო მეურნეობები, ფოთლოვნები და წიწვიანები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩკოვანი მცენარეები	დარგვამდე 1-2 კვირით ადრე. ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		2,5-4,0	სატყეო	არასასურველი	2 წელიწადში დარგვის	-(1)	7(-)

			მეურნეობები, სანერგეები, ამონაყარი, ნაძვისა და ფიჭვის ტყე	ბალახოვანი მცენარეები და ბუჩკები	შემდეგ . ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა		
		3,0%	სატყეო მეურნეობები, ხეების გადანაჭრები	ახალი ამონაყარი	ახალი ამონაყარი. ხარჯვა-300-400 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		1.5-2,5 3,0-5,0	დასახლებული პუნქტები, პარკები, სკვერები, ბულვარები, ტრამვაისა და რკინიგზის გზები, სამრეწველო და სხვა ობიექტების სანიტარულ-დამცავი ზონები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩკოვანი მცენარეები, ხეები	ვეგეტირებული სარეველების და არასასურველი მცენარეების შესხურება . ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		1,5	მარწყვი	გადაზრდილი სარეველები	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ.	-(2)	7(-)
		1,3-5,2	ანეული	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი, მ.შ. ხვარტკლა, მინდვრის ნარი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე აქტიური ზრდის პერიოდში. ხარჯვა-200 -400 ლ/ჰა	-(1-2)	7(-)
145	რეგლონ-სუპერი 150 წხ 150 გ/ლ (დიქვატი) (თ), (3)	2	სტაფილო (სათესლე)	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ვეგეტირებული სარეველების შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე.	10(1)	-(8)
	“სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 458/10/15	2	კარტოფილი (სასურსათო)	“	ვეგეტირებული სარეველების შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე.	10(1)	-(8)
146	რედ პალკი, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ) (3) „მაკკინლი ტრედიინგ ლკ“ ირლანდია 1453	2-3 3-5	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-3	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი,	ერთწლიანი ორლებნიანი და	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება	-(1)	7(3)

			ზორბალი, რაფსი, მზესუმზირა, სოიო	მარცვლოვანი	მოსავლის აღების შემდეგ		
		2-3	მარცვლოვნები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირის ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	7(3)
		3-5	ჩაი (სანერგეები და მრავალწლიანი წარგავები)	მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება განმეორებითი შესხურებით 50 დღის შემდეგ	-(1)	7(3)
		2-3	ანეული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მათი აქტიური ზრდის პერიოდში.	-(1)	7(3)
		3-5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები-ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: (სკვერები, მიწის პირები, გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები და სხვა ობიექტები)	ბუჩკოვან-მერქნიანი მცენარეები, ხეები	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
		3-5	საირიგაციო და სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
147	რეინგრანი, წხ 480 გ/ლ (ბენტაზონი) (4)	1.5	სოიო	ერთწლიანი ორლებნიანი (ჯიხლაყა, წიწმატურა, ღიღილო, შვია, ყუთყუთა, ხოვერა, გვირილა, დანდური, მიდვრის მდოგვი)	ნათესების შესხურება კულტურის პირველი წამდვილი ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (2-6 ფოთოლი)	30(1)	-(3)
	„შანდონგ ვეიფანგ რაინზოვ ქემიკალ კო., ლტდ“	3.0-4.0	ხახვი, ბარდა, ლობიო	ერთწლიანი ორლებნიანი (ჯიხლაყა,	ნათესების შესხურება კულტურის 5-6 წამდვილი ფოთლის ფაზაში და	30(1)	-(3)

	ჩინეთი 1438			წიწმატურა, ლილილო, შვია, ყუთყუთა, ხოვერა, გვირილა, დანდური, მიდვრის მდოგვი)	სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში		
148	რესორტი 33 ეკ 330 გ/ლ (პენტიმეტალინი) (თ), (3)	3-6	სოიო, სიმინდი, მზესუმზირა, თამბაქო, პომიდორი, კომბოსტო, წიორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(-)
	„დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1202	2, 3-5	ხახვი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი		-(1)	20(3)
		5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
149	რიზასო, ზღ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „კორუმა კლორ ალკალი სან.ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1433	1-1,25	სამარცვლე და სასილოსო სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები (ძურწა, მწყერფეხა, შვრიუკა, ღვარძლი, შალაფა, მხოხავი ჭანგა, ჯიჯლაყა ჩვეულებრივი)	შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
150	რივეტი 24 ეკ 240 გ/ლ (კარფენტრაზონ-ეთილი) (თ), (4) „ფმს ქემიკალ სპრლ“ ბელგია 657/14/18	85-125 მლ/100 ლ წყალი	ხორბალი ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. 2.4 დ მიმართ გამძლე ფართოფოთლიანი სარეველები	წათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზებში. საშემოდგომო კულტურებს ამუშავებენ გაზაფხულზე. ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
		80-85 მლ/100 ლ წყალში	ვაზი, თხილი, ატამი, ვაშლი, ქლიავი	მირებიდან ამონაყარის გასანადგურებლად	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
151	რიმაქსი დ 762 წდგრ 765 გ/კგ (ტრიბენურონ- მეთილი)102, 5+დიკამბა 659 გ/კგ) (4) „ფადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1130/2019	130-180 გ/ჰა	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, კვავი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე	წათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზიდან მილში გასვლამდე	-(1)	-(3)
152	როტტერი, წდგრ 600 გ/კგ (მეტსულფურონ- მეთილი)	10-15 გ/ჰა	ხორბალი, ქერი, შვრია	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი	წათესების შესხურება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის	-(1)	-(-)

	(4) „ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 588/12/17				დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/ჰა		
153	რუმბო წხ 36 360 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი 486 გ/ლ, გლიფოსატის მიხედვით 360 გ/ლ) (თ), (4) “აიკუვი” ესპანეთი 743/15	2-4	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		4-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვ ნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	-(-)
154	სამბა 500 სკ (S-მეტოლახლორი 312,5 გ/ლ+ ტერბუტილაზინი 187,5 გ/ლ) (თ),(3) „ტერავიტა ლლკ“ პოლონეთი 1192	4-4,5	სიმინდი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება დარგვამდე, დარგვის პერიოდში ან დარგვის შემდეგ, ან მცენარის 3-5 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა.	- (1)	7(3)
		4-4,5	მზესუმზირა, სოიო, კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება დარგვამდე, დარგვის პერიოდში ან დარგვის შემდეგ, მაგრამ კულტურის თესლის აღმოცენებამდე	-(1)	-(-)
		4-4,5	პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება დათესვამდე	-(1)	-(-)
		4-4,5	სორგო	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება დარგვამდე, დარგვის პერიოდში ან დარგვის შემდეგ, ან მცენარის 3-5 ფოთლის ფაზაში. გამოყენების აუცილებელი პირობა-სორგოს დამუშავება ანტიდოტით.	-(1)	-(-)

155	სანსტეპი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსუ ლფურონი) (თ), (3) "სანსტეპ ქიმიკატარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმაღატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1082	1.25-1.5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ქანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში	-(1)	7(3)
156	სენკრონი 70 წდგრ, წდგრ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი)	1.1-1.4	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)
	(თ), (4) "საფა ტარიმი ა.ს. " თურქეთი 671/14/19	0.7-0.8	"	"	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1	სოიო	"	სარეველების შესხურება 15-20 დღეში ჩითილების გადარგვიდან	30(1)	7(3)
		1.4-2.4	კარტოფილი	"	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.7-0.8	"	"	სარეველების შესხურება კულტურის 5 სმ-დე სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		0.5-1	სოიო	"	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.8-1	სიმინდი	"	"	-(1)	7(3)
157	სერტო პლიუსი, წზგრ (ტრიტოსულფურონი 250გ/კგ + დიკამბა 500 გ/კგ) (თ) "ზასფი სე" გერმანია 807/16	0.15-0.2+ 1 ლ/ჰა „ჰასტენი“	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ზორობალი, ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2, 4 დ-ს და 2მ-4მ-ს მიმართ გამძლე ღიჰას სახეობები (ნარი და სხვა) და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში, ხარჯვა – 150-400 ლ/ჰა	60(1)	-(3)
		0.2+ 1 ლ/ჰა „ჰასტენი“	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. 2, 4 დ-ს მიმართ გამძლე ღიჰას სახეობები (ნარი და სხვა) და მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	60(1)	-(3)
158	სმერჩი, წზ 410 გ/ლ (გლიფოსატი) (თ), (3)	3-4	ხეხილი ვაზი ციტრუსი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	„ნანჯინგ რონქუიმ კო, ლტდ“ ჩინეთი	5-8	ხეხილი ვაზი ციტრუსი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან	-(1)	7(3)

	1116				ზაფხულში (კულტურის დაცვით)		
159	სონრაუნდი 48 წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (3) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 959/18	3-4 6	ხეხილი ვაზი ციტრუსი თხილი არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		6 10	გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები ბუჩქები და ხეები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
160	სორტი სუპერი , ეკ 50 გ/ლ (კვიზალოფოპ-პ-ეთილი) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1174	0,75-1	შაქრის ჭარხალი, ოსპი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, შვრიუკა, მდელის მელაკუდა, მინდერის სორგო, ძურწა, თივაქსრა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1-1,5	„	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი, შალაფა, გლერტა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		0,75-1	მზესუმზირა, კარტოფი ლი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, სოიო, პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, მდელის მელაკუდა, მინდერის სორგო, ძურწა, თივაქსრა)	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზიდან , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1-1,5	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი, შალაფა, გლერტა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1-1,5	ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი, შალაფა, გლერტა)	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	-(-)
161	სპონსორი 330 ე 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (3)	3-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, პამიდორი, კომბოსტო, წიორი. მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(-)
	„საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 800/17	5	ხახვი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)

		5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
		5	საშემოდგომო ხორბალი	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
162	სტელლარი, წხ 160+50 გ/ლ (დიკამბა+ტოპრამეზონი) (4) “ზასფი სე” გერმანია 718/15	1-1.25+ 1-1,25 ლ/ჰა მეტოლაცი	სიმინდი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი და მრავალწლიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ბარტყობის ფაზის დაწყებისას და მრავალწლიანი სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
163	სტომპი 330 ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი)	3-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, პამიდორი, კომბოსტო, ნიორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(-)
	(4) “ზასფი აგ”	2.5-4.5	ხახვი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
	გერმანია 346/04/09/15	3	ოხრახუმი	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
		5	საშემოდგომო ხორბალი	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
			სამკურნალო მცენარეები			-(1)	7(3)
		6-9	(ანისული	“	ნიადაგის შესხურება გაზაფხულზე ნარგავების დარგვამდე	-(1)	7(3)
		6	ბადის პიტნა ვეგეტაციის 1 წელი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		6	სამკურნალო სალბი	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის აღმოცენებისას	-(1)	7(3)-
		6	გვირილა	“	“	-(1)	7(3)
164	სტოპი, ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (4)	3-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, პამიდორი, კომბოსტო, ნიორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(-)
	“ზარდა კროპქემ ლიმიტედ” ინდოეთი 719/14	2.5-4.5	ხახვი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	7(3)
		5	საშემოდგომო	“	ნიადაგის შესხურება	-(1)	7(3)

			ხორბალი		დათესვის შემდეგ კულტურის აღმოცენებამდე		
165	სტრატოს ულტრა, ეკ 100 გ/ლ (ციკლოქსიდიმი) (თ) “ზასფი სე “ გერმანია 858/17	1-2+ 1.0-2.0 ლ/ჰა მეთოლბატი 2.0-2.5+ 2.0-2.5 ლ/ჰა მეთოლბატი	შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, სიმინდი, კარტოფილი, რაფსი, სოიო	ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	წიადაგის შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
166	სულფონი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსულფურონი) (თ), (3) „აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 813/16	1.25-1.5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ქანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში	-(1)	7(3)
167	სუპერ სენქორი, სფ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი) (თ)	1.1-1.4	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	წიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)
	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. .იტპ. იპრ. სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1181	0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.5-1	სოიო	“	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
168	ტერდოკი 080 ეკ 80+20 გ/ლ (კლოდინაფოპ- პროპარგილი+ ანტიდოტი) (თ), (3) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 966/18	0.3-0.5	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	შვრიუკა	ნათესების შესხურება სარ ეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში	-(1)	-(-)
		0.5-0.75	“	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა)	ნათესების შესხურება 2-3 წამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მილში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
169	ტიტანი, წზგრ 250 გ/კგ (რიმსულფურონი) (4) „ერთარ ქიშია ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	50 გ/ჰა+ 250 მლ/ჰა “ტრენდ 90”	სიმინდი	ერთწლიანი, მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ბარტყობის ფაზის დაწყებისას	60-(1)	7(3)

	თურქეთი						
	1301	50 გ/3ა+ 50 მლ/3ა “ტრენდ 90”	პამიდორი	ერთწლიანი, მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, მრავალწლიანი სა-რეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	15(1)	7(3)
		50 გ/3ა+ 250 მლ/3ა “ტრენდ 90”	კარტოფილი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი (ჭანგა)	ნარგავების შესხურება მიწის შემოყრის შემდეგ, ერთწლიანი სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთოლი) და ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
170	ტიტუსი, წდგრ 250 გ/კგ (რიმსულფურონი) (3) “დიუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ.” შვეიცარია 360/05/10/16	40 გ/3ა+ 250 მლ/3ა “ტრენდ 90”	სიმინდი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების ბარტყობის დაწყების ფაზაში	-(1)	7(3)
		50 გ/3ა+ 250 მლ/3ა “ტრენდ 90”	სიმინდი	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში, მრავალწლიანი სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		50 გ/3ა+ 250 მლ/3ა “ტრენდ 90”	კარტოფილი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი (ჭანგა)	ნარგავების შესხურება მიწის შემოყრის შემდეგ, ერთწლიანი სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთოლი) და ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		50 გ/3ა+ 250 მლ/3ა “ტრენდ 90”	პამიდორი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი (ჭანგა)	ნარგავების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში მიწის შემოყრის შემდეგ, ერთწლიანი სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში (1-4 ფოთოლი) და ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
171	ტოპკაპი 240 ეკ 240+20 გ/ლ (კლოდინაფოპ-პროპარგილი+ ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ-მექსილი) (თ), (3) „საფა ტარიმ.ა.ს.“ თურქეთი 1009	0.2 0.3	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ზორობალი	შვრიუკა ერთწლიანი მარცვლოვანი (ზურჩხა, ძურწას სახეობა, ღვარძლი)	ნათესების შესხურება სარეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში ნათესების შესხურება 2-3 წამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მილში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
172	ტორნადო 500, წხ 500 გ/ლ (გლიფოსატის მჟავა 500 გ/ლ, იზოპროპილამინის მარილზე გადაანგარიშებით 675	2-3	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	7(3)

	გ/ლ) (3) დსს ფირმა „ავგუსტი“ რუსეთი 929/18						
		2-3	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ზორბალი, რაფსი, კარტოფილი და სხვა ტექნიკური კულტურები, სამარცვლე პარკოსნები, ზეთოვანები, ზოსტნეულ-ბაღჩეული	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		3-5	სიმინდისა და ზორბლის ნაწვერალზე	მრავალწლიანი ორლებნიანი	მომდევნო კულტურების დათესვამდე 3-4 კვირით ადრე	-(1)	7(3)
		5-6	გზის პირები, სადრენაჟო არხები	არასასურველი მცენარეულობა	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე. 1-1.5 % - იანი ხსნარი). ხარჯვის ნორმა 500-800 ლ/ჰა	-(2)	7(3)
		5-6	ბუჩქოვანი მცენარეები	“	მიმართული შესხურება ბუჩქოვან მცენარეებზე	-(1)	7(3)
		1,5-3	ანეული	ერთწლიანი და მრავალწლიანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მათი აქტიური ზრდის პერიოდში. ხარჯვა 100-200 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
173	ტრუი, 75 წდგრ 750 გ/კგ (ტრიბენურონ- მეთილი) (3) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 633/13/19	15-20 გ/ჰა	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ზორბალი, ქერი, ჭკავი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე	ნათესების შესხურება სარეველის 2-3 ფოთლის ფაზაში კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე	-(1)	-(3)
		20-25 გ/ჰა	“	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე და მინდვრის ნარი, ხოვერა, ბეგიაური	“	-(1)	-(3)
		10-15 გ/ჰა	“	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ-ს მიმართ გამძლე	ნათესების შესხურება სარეველის 2-3 ფოთლის ფაზაში კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე 200 მლ/ჰა “ ტრენდი-90 “-თან ნარევში	-(1)	-(3)
174	უნიმარკი 70 წზგრ 700 გ/კგ (მეტრიბუზინი) (თ) „უპლ ლიმიტედ“	1.1-1.4	პამიდორი	ერთწლიანი ორლებნიანი (დანდური, ნაცარქათამა, ჭვეულებრივი	ნიადაგის შესხურება ჭითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)

	ინდოეთი 990/18			ჯიჯლაყა, ყანის ბაია, ჯუნჯრუკი , ბოლოკურა, შავთარა, მინდვრის მდოგვი) და მარცვლოვანი (მწყერფხვა, ყვითელი ძურწა)			
		0.7-0.8	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	42(1)	20(-)
		1	სოიო	“	სარეველების შესხურება 15-20 დღეში ჩითილების გადარგვიდან	42(1)	7(3)
		0.5-1			წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.7-0.8	“	“	სარეველების შესხურება კულტურის 5 სმ-დე სიმაღლისას	42(1)	7(3)
175	ურაგანი ფორტე 500 წხ 500 გ/ლ (გლიფოსატი კალიუმის მარილის მიხედვით) (თ), (4)	1.5-3	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით). ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
	„სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 454/04/09/14/19	3-4	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით). ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		1.5-3	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად. ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		1.5-3	ანეული, არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	სარეველების შესხურება მათი აქტიური განვითარების პერიოდში. ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა. ადამიანების დაშვება კენკრისა და სოკოს საკრეფად -15 დღეში	-(1)	7(-)
		3-4	მინდვრები საგაზაფხულო კულტურების დასათესად	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	სარეველების შესხურება შემოდგომაზე მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		1.5-3.5	პარკები, სკვერები, ბულვარები, ტრამვაისა და რკინიგზის გზები,	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩკოვანი მცენარეები	ვეგეტირებული სარეველების და არასასურველი მცენარეების შესხურება	-(1)	7(-)

			სამრეწველო და სხვა ობიექტების სანიტარიულ- დამცავი ზონები				
176	ფასინეითი, წბ 280 გ/ლ (ამონიუმის გლუფოსინატი) (თ), (4) „უპო ზირაატ ვე ქიმია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 1222	4	ხეხილი თხილი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტირებულ სარეველებზე (კულტურის დაცვით)	14(1)	7(3)
177	ფელიქსი, წდგრ 757 გ/კგ (გლიფოსატი ამონიუმის მარილი, მჟავაზე გადაანგარიშებით 680 გ/კგ) (თ), (3) „დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 930/18	1,5-2,5 2-4	ხეხილი ვახი, ციტრუსი, თხილი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასაბრუნად	-(1)	-(-)
		2-4	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ზორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)
		4-6	ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: სკვერები, პარკები, რკინიგზის ზონები, საწარმოო დაწესებულებები და სხვა ობიექტები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩქოვან- მერქნიანი მცენარეულობა	ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში	-(1)	7(3)
178	ფენიუს გოლდი 720 წბ 720 გ/ლ (2,4-დ დიმეთილამინის მარილი) (თ), (3) „ინტერნასიონალ ქუიმიკა დე კობრე ს.ა. დე ს.ვ.“ მექსიკა 931/17	1-1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ზორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვან ისარეველები	ნათესების შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში აღებამდე	-(1)	-(3)
		0,8-1,2	სიმინდი	„	„	-(1)	-(3)

179	ფლუენტი, ეკ 125 გ/ლ (ფლუაზიფოპ- ბუთილი) (თ), (3)	2-4	სოიო, ლობიო	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის 4-5 ფოთლის ფაზაში აღერების დამთავრებამდე	(1)	(3)
	“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 634/13/19	4-6	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი	მრავალწლიანი, ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	(1)	7(3)
		4-8.3	მინდვრები, სადაც დაითესება სოიო	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	“	(1)	(3)
		4-10	მინდვრები, სადაც დაითესება მრავალწ ლიანი მარცვლოვანი ბალახები სათესლე	“	შესხურება ვეგე-ტირებულ სარევე-ლებზე შემოდგო- მით მოსავლის აღების შემდეგ ან გაზაფხულზე თესვამდე 2-4 კვირით ადრე	(1)	(3)
		6-8	მინდვრები ყვავილოვანი კულტური სათვის (სათესლე)	“	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	(1)	(3)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2-3	(ბაღის პიტნა	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	პლანტაციების შესხურება კულ-ტურის გახარების შემდეგ ან მისი 8-10 სმ სიმაღლისას	(1)	7(3)
		1-1.5	ხარისვარდა	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 4-6 ფოთლის ფაზაში	(1)	7(3)
		2-4	ანისული)	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში	(1)	7(3)
		3-4	გერანი	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის გახარების შემდეგ	(1)	7(3)
		2	კატაბალახა)	“	გაზაფხულის და ზაფხულის ნათესი პლანტაციების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში	(1)	7(3)
		3-4	ვარდი ეთერზეთოვანი	“	წიადაგის რიგების მიმართული შეს-ხურება ვეგეტირე-ბულ სარეველებზე	(1)	7(3)
		2-6	ფიჭვის, ნაძვის, კედრის ნათესები სანერგეებში	ქანგა და ერთწლიანი მარცვლოვნები მათ შორის ფეტვისნაირები	შესხურება ახლადამოცენებულ სარეველებზე ან ვეგეტაციის მეორე პერიოდში	(1)	7(3)
		0.75-1	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, სტაფილო, ხახვი, რაფსი,	ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში	(1)	7(3)

			მზესუმზირა, პამიდორი, კომბოსტო				
		2-4	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისა	-(1)	7(3)
		1-1.5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი	შესხურება კარტოფილის ფოჩების 10-15 სმ სიმაღლისა სარეველების 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		3	“	მხოხავი ჭანგა	შესხურება კარტოფილის ფოჩების და ჭანგის 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		1-1.5	ხეხილი, ციტრუსები, ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		4-6	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება სარეველების 15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
180	ფლუზიტოპი, ეკ 150 გ/ლ (ფლუზაფიფოპ-3-ბუთილი) (4) “ნინგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ” ჩინეთი 722/15	1-1.5	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, სტაფილო, პამიდორი სათესი და სარგავი, კომბოსტო, ხახვი, მზესუმზირა , რაფსი	ერთწლიანი მარცვლოვანი	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	7 (3)
		2-4	სოიო, ლობიო, ბარდა	ერთწლიანი მარცვლოვანი	ნათესების შესხურება კულტურის 4-5 ფოთლის ფაზაში აღერების დამთავრებამდე	-(1)	7 (3)
		2-4	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, სტაფილო, პამიდორი სათესი და სარგავი, კომბოსტო, ხახვი, მზესუმზირა , რაფსი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (მხოხავი ჭანგა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას მიუხედავად კულტურული მცენარის განვითარების ფაზისა	-(1)	7 (3)
		1-1.5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი	შესხურება კარტოფილის ფოჩების და ჭანგის 10-15 სმ სიმაღლისას ,სარეველების 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
181	ფორმულა, წზგრ 750გ/კგ (ტიფენსულფურონ-მეთილი) (თ)“ შპს „ ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ“	6-15გ/ჰა+ ტანდემი 0.2 ლ/ჰა 15-20 გ/ჰა+ ტანდემი 0.2 ლ/ჰა	საგაზაფხულო ზორბალი, ქერი საგაზაფხულო ზორბალი, ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში, ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
	უკრაინა შპს „გეოუკრატი“	6-8 გ/ჰა+ ტანდემი 0.2 ლ/ჰა	სოია	„	ნათესების შესხურება კულტურის 1-2 სამმაგი ფოთლის ფაზაში,	-(1)	-(3)
	საქართველო 932/17	10-15 გ/ჰა+ტანდემი	სიმინდი	„	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის	-(1)	-(3)

		0.2 ლ/ჰა			ფაზაში,		
182	ფორმულა სუპერი 5 ევ 50 გ/ლ (კვიზალოფოპ-პ-ეთილი) „ჰექტამ ტიკარეტი ტ. ა.ს.“	0, 75-1	მაქრის და სუფრის ჭარხალი, მზესუმზირა, კარტოფილი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, სოიო, პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, მინდვრის სორგო, ძურწა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
	თურქეთი 802/16	1-1, 5	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1, 25-1, 75	ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	-(-)
183	ფოუზილე, წხ 125 გ/ლ (ფლუაზიფოპ-პ-ბუთილი) (3) “ინდასტრიალ ქლიმიკა ქეი ს.ა.“ ესპანეთი 1292	2-2,5	სოია	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში და მხოხავი ჭანგას 10-15 სმ სიმაღლისას, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა. ზარჯვა-200-300 ლ/ჰა	60 (1)	30 (30)
		1-1.5	კარტოფილი (გარდა საადრეო და საშუალო სიმწიფის ჯიშებისა), მაქრის, სუფრის ჭარხალი, კომბოსტო, ხახვი, რაფსი, მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	60 (1)	30 (30)
		1-2	ლობიო, ბარდა, საკვები პარკოსნები, ყვითელი ხანჩკოლა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	“	60 (1)	30 (30)
		2	სამყურა (სათესლე ნათესები)	ერთწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება მფარავი კულტურის მოსავლის აღების 2-3 კვირის შემდეგ, ან სამყურას კულტურის ადრე საგაზაფხლო მოთიბვის შემდეგ	60 (1)	30 (30)
		2-2,5	კარტოფილი (გარდა საადრეო და საშუალო სიმწიფის ჯიშებისა), მაქრის, სუფრის ჭარხალი, კომბოსტო, ხახვი, რაფსი, მზესუმზირა	მრავალწლიანი მარცვლოვნები (მხოხავი ჭანგა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას მიუხედავად კულტურული მცენარის განვითარების ფაზისა	60 (1)	30 (30)

184	ფრონტიერ ოპტიმა, ეკ 720 გ/ლ (დიმეტენამიდ-3) (თ) “ზასფი კორპორეიშენ “ აშშ 808/16/19	0.8-1-1.2 0.8-1.4	შაქრის ჭარხალი მზესუმზირა, სიმინდი, კარტოფილი, სოიო	ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები (შვრიუკა, ძურწას ყველა სახეობა, ბურჩხა) და ზოგიერთი ორლებნიანები	წიადაგის შესხურება თესვამდე ან თესვის შემდეგ, კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
185	ფუზილად ფორტე 150 ეკ 150 გ/ლ (ფლუაზიფოპ-3-ბუთილი) (4) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 467/08/12/17	0.75-1.5	სოიო, საკვები პარკოსნები, ყვითელი ხანჭკოლა (სათესლე ნათესები) შაქრის, სუფრის ჭარხალი, კანაფი, პამიდორი სათესი და სარგავი, კარტოფილი, კომბოსტო, ხახვი, მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვანი	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	7(3)
		0.75-1	კიტრი	“	“	20(1)	7(3)
		0.75-1	ლობიო, ბარდა	“	“	33(11)	7(3)
		1.5-2	სოიო, საკვები პარკოსნები, ყვითელი ხანჭკოლა (სათესლე ნათესები) შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, პამიდორი სათესი და სარგავი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები (მხოხავი ჭანგა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ-ის სიმაღლისას მიუხედავად კულტურული მცენარის განვითარების ფაზისგან დამოუკიდებლად	-(1)	7(3)
		1.5-2	თეთრი სამყურა (სათესლე ნათესები)	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება ძირითადი კულტურის აღების შემდეგ სარეველების 5-10 სმ-ის სიმაღლისას ან ადრე გაზაფხულზე კულტურის მოთელვის შემდეგ	-(1)	7(3)
		1.5-2	ხეხილი, კენკროვნები, ვაზი	“	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ ან ყვავილობამდე	-(1)	7(3)
		1.5-2	ფი ჭვის, ნაძვის, კედრის ნათესები სანერგეებში	“	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე 2-3 წელიწადში ერთჯერ	-(1)	7(3)
186	ქათენგი, სე 452,45 გ/ლ+6,25 გ/ლ (2,4-დ მჟავას რთული 2-ეთილ-ჰექსილის ეთერი+ფლორასულამი) (თ), (2) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი“ თურქეთი	0,5	ხორბალი, ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი , მ.შ. 2,4-დ და 2M-4X-ის-მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველები (ცხვირისტახელა, პატარძალა, ბატყნისყურა,	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის და ბარტყობის ფაზაში, სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-200 ლ/ჰა	ქათენგი, სე 452,45 გ/ლ+6,25 გ/ლ (2,4-დ მჟავას რთული 2-ეთილ-ჰექსილის ეთერი+ფლორასულამი) (თ), (2) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ	0,5

	1375			ვახის ბაღაზი, გერანი, ყვავისხმალა, საღებავი მათრახა, მიდვრის მდოგვი, გონგოლა, ცხენის ცერცველა, ზვეულებრივი ცერცველა)		ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1375	
		0,6	ხორბალი, ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი , მ.შ. 2,4-დ და 2M-4X-ის-მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველები (ირაგა, ნარშავი, ხოვერა, მათიტელა, ყანის ბაია, ბაყაყურა)		14(1)	3(7)
		0,7	ხორბალი, ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი , მ.შ. 2,4-დ და 2M-4X-ის-მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველები მწარა, ქინძარა, ღიღილო, მინდვრის ნარი)		14(1)	3(7)
		0,7	სიმინდი	ერთწლიანი , მრავალწლიანი ორლებნიანი (შვია, ჯიჯილაყა, ღირმწარა, ნაცარქათამა, ბეგია ური, ღიღილო, ძალყურძენა, ღორის ბირკა)	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-200-300ლ/ჰა	14(1)	3(7)
		0,8	სიმინდი	მრავალწლიანი ორლებნიანი (მწარა, ხვართქლა)	შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	14(1)	3(7)
187	შოკი, წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი) (თ), (4) “ ნინგბო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ” ჩინეთი 723/15	2.5-4.5	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		4.5-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2.5-4.5	მარცვლოვ ნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და	-(1)	-(-)

					ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად		
188	ციტიშენ, ეკ 80 +20 გ/ლ (კლოდინაფოპ-პროპარგილი+ანტიდოტი) (თ), (3) „უპლ ზირატი ვე ქიშია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი“ თურქეთი 845/17	0.3-0.4 0.5-0.75	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	შვრიუკა ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა)	ნათესების შესხურება სარეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში ნათესების შესხურება 2-3 წამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მიწაში გამოსვლამდე	-(1) -(1)	-(-) -(3)
189	ჰელგა სუპერი, ეკ 50 გ/ლ (კვიზალოფოპ-პ-ეთილი) „აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ.“	0,75-1	შაქრის და სუფრის ჭარხალი, მხესუმში რა, კარტოფილი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, სოიო, პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, მინდვრის სორგო, ძურწა)	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზიდან, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
	ლტდ. სტი.” თურქეთი 967/18	1-1,5	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1,25-1,5	ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	-(-)
190	ჰერბიმატი 330 ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (3) “ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 864/17	3-5	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, მხესუმში რა, პამიდორი, კარტოფილი, კომბოსტო, ნიორი, ხახვი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე.	-(1)	-(-)
		3-5	საშემოდგომო ხორბალი	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
191	ჰექტაფერმინი, 500 წხ 500 გ/ლ (2,4- დიმეთილამინის მარილი) (თ), (3) “ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 611/13/18	1.5-2.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, შვრია, ჭკვავი, ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
		1.5-2.5	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)

192	ჰექტორ მაქსი, წდგრ 650 გ/კგ (დიკამბა 550 გ/კგ +ნიკოსულფურონი 92 გ/კგ +რიმსულფურონი 23 გ/კგ) (თ) “დიუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ. (დიუპონ)” შვეიცარია 798/16	440 გ/ჰა+ 250 მლ/ჰა “ტრენდი 90”	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ფართოფოთლიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის 2 -6 ფოთლის ფაზაში და სარეველების აღმოცენების ადრეულ(2 ფოთლის)ფაზაში. ხსნარის ხარჯვა – 200-600 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
193	ჰორმა, წზკ (2, 4 დ მჟავა 275 გ/ლ + მცპა მჟავა 275 გ/ლ ამინის მარილის სახით) (თ), (3) „ინდუსტრიალ კუიმიკა ქეი ს.ა.“ ესპანეთი 1245	1.6-2	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი, ტრიტიკალე	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2, 4 დ-ს და 2მ-4ქ-ს მიმართ გამძლე ღიჰას სახეობები (ნარი და სხვა) და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება ადრე გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზაში აღერებამდე, სარეველების 2-5 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა – 200-400 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
		1.6-2	მდელოები, მწვანე საფარი, გაზონები	“	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის ბარტყობის ფაზაში.	-(1)	20(3)

მუხლი 10. მცენარეთა ზრდის რეგულატორები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	დანიშნულება	დამუშავების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (დამუშავების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებულ) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	აგრო გიბბ, წზ (ჰიბერელინის მჟავა, 45 გ/ლ) “აგრო ლაიფ საენს კორპორეიშენ” ინდოეთი 1475	15 მლ	ციტრუსი (მანდარინი)	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება ტარდება, როცა 70-80 % ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		60 მლ	ფორთოხალი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება ყვავილედის შეკვრის 4-5 კვირის შემდეგ. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		30 მლ	ლიმონი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება, როცა აღინიშნება პირველი ფერის ცვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	(1)	(-)
		30 მლ	ვაშინგტონის ჯიშის	მოსავლიანობის	შესხურება როცა აღინიშნება ფერის	- (1)	(-)

			ფორთოხალი	გაზრდა	პირველი ცვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა		
		45 მლ	გრეიფრუტი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება როცა ალინიშნება ფერის პირველი ცვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		60 მლ	ვაზი (უთესლო)	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება ტარდება როცა 70 % ყვავილების დაცვივდა, შემდეგი - 10-12 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	- (2)	- (-)
		15 მლ	ვაზი (საქიშმიშე ჯიშები)	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება ტარდება ყვავილების დაცვიდან 4-5 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		45-75 მლ	მსხალი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, ყინვაგამძლეობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 30 % ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		45 მლ	ალუბალი, ბალი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება მასობრივი ყვავილობისას. ხარჯვა 600 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		300-450 მლ	ატამი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება მასობრივი ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა 600 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		45-75 მლ	მარწყვი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, გამძლეობის გაზრდა არასასურველი გარემო პირობებისადმი, მცენარის ზრდა- განვითარების გაძლიერება. ნაყოფების რაოდენობის და წონის გაზრდა, დამწიფების დაჩქარება	შესხურება ყვავილის ყუნწების გამოჩენამდე 3-4 კვირით ადრე. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		15-30 მლ	კარტოფილი	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება მასობრივი ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		30-60 მლ	სალათა	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება 3-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	- (1)	- (-)
		90 მლ	წიწკა	მოსავლიანობის გაზრდა, ნაყოფების დამწიფების სიჩქარე	შესხურება კოკრების ფაზაში და ყვავილობის დასაწყისში ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	- (2)	- (-)
		120-150 მლ	დეკორატიული კულტურები	გამძლეობის გაზრდა	შესხურება მოჭრილ ყვავილებზე 300 - 400 ლ/ჰა	- (1)	- (-)

2	ატონიკი, წზ (ნატრიუმის პარა- ნიტროფენოლატი 3 გ/ლ+ნატრიუმის ორტოფენოლატი 2 გ/ლ+ნატრიუმის 5- ნიტროფუაიკოლატი 1 გ/ლ) „ასაპი ქემიკალ იუროპ, ს.რ.ო.“ ჩეხეთის რესპუბლიკა 1321	0,6+0,6	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი საგაზაფხულო ქერი	მცენარეებისა და თესლის ზრდა- განვითარების გაუმჯობესება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება	შესხურება ბარტყობის ფაზა-ალერების ფაზის დაწყებამდე 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 300 ლ/ჰა	28 (2)	-(-)
		0,25+0,6	შაქრის ჭარხალი		შესხურება კულტურის 6 ფოთლის ფაზაში და 3-4 ფოთლის ფაზაში 10 დღიანი ინტერვალით . ხარჯვა - 600 ლ/ჰა	15(2)	-(-)
		0,6	სიმინდი		შესხურება კულტურის 6 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა – 300-600 ლ/ჰა	60 (1)	-(-)
		0,6+0,6	რაფსი საშემოდგომო და საგაზაფხულო		შესხურება ყვავილედის ფორმირების ფაზაში ყვავილობამდე 10 დღიანი ინტერვალით . ხარჯვა - 300-500 ლ/ჰა	30(2)	-(-)
		0,5+1	კარტოფილი		შესხურება მცენარის 10- 15 სმ სიმაღლისას ყვავილობამდე 10-30 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 300-600 ლ/ჰა	21 (2)	-(-)
		0,5+0,5+0,5	სტაფილო		შესხურება კულტურის 2 ფოთლის ფაზიდან მირხვენის 50%-მდე ზომის მიღწევამდე 7-30 დღიანი ინტერვალით . ხარჯვა - 500 ლ/ჰა	30 (3)	-(-)
		1+1	მზესუმზირა		შესხურება ყვავილედის ფაზაში და ყვავილობამდე 10 დღიანი ინტერვალით . ხარჯვა - 300-600 ლ/ჰა	30 (2)	-(-)
		1 0,5+0,5+0,5	პამიდორი	მცენარეების ზრდა- განვითარების და ნაყოფების ფორმირების გაუმჯობესება. მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ყვავილეების	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში . ხარჯვა- 600 ლ/ჰა. შესხურება მცენარეების დარგვის შემდეგ, ყვავილეების	10 (1)	-(-)

				ხარისხის ზრდა	წარმოქმნისას და ყვავილობის დასაწყისში 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 500 ლ/ჰა.		
		1	წიწაკა ტკბილი		შესხურება ყვავილელების ფორმირების დაწყებამდე. ხარჯვა - 500 ლ/ჰა	10 (1)	-(-)
		0,6+0,6+0,6	კიტრი		შესხურება მე-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზიდან ნაყოფის სრულ ზრდამდე 7 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა – 500 ლ/ჰა	3 (3)	-(-)
		1+1	ვაზი	მცენარეების ზრდა- განვითარების გაუმჯობესება, ნაყოფების რაოდენობის მატება. მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	შესხურება: 1-- ყვავილობამდე, მე- 2 - სამი კვირის შემდეგ. ხარჯვა - 1000 ლ/ჰა	14 (2)	-(-)
		0,6+0,6+0,6	ვაშლი ალუბალი		მცენარის შესხურება შესხურება: კოკრების ფაზიდან ნაყოფის ნახევარი ზომის მიღწევამდე. ხარჯვა- 500 ლ/ჰა	7 (3)	-(-)
		0,6+0,6	შავი მოცხარი	მცენარეების ზრდა- განვითარების გაუმჯობესება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	შესხურება პირველი ფოთლის ფაზიდან 50 % ნაყოფის წარმოქმნამდე 7-30 დღის ინტერვალთ. ხარჯვა- 500 ლ/ჰა	7 (2)	-(-)
		0,6+0,6+0,6	ქოლო		შესხურება ყვავილობის ფაზიდან ნაყოფების 50%-ის ტიპური ზომის მიღწევამდე. ხარჯვა - 500 ლ/ჰა	7 (3)	-(-)
		0,6+0,6+0,6	მარწყვი		შესხურება ყვავილების გახსნიდან ნაყოფის ზომის 90 %-ის მიღწესამდე 7-14 დღის ინტერვალთ.	7 (3)	-(-)
		0,4+0,6+0,6+0,4	სვია		შესხურება ზრდის პერიოდში, 7 დღის შემდეგ, ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 7-30 დღიანი	28 (4)	-(-)

					ინტერვალთ		
			მიხაკი	დაფესვიანების სტიმულაცია	სარგავი მასალის ჩაღობა 0,33% -იან ხსნარში 12 საათის განმავლობაში +15- +20 გრადუს ტემპერატურაზე წყალში შემდგომი გამოვლებით	-(1)	-(-)
			ყვავილების და ბოსტნულის თესვები		თესლის ჩაღობა 0,25- 0,05% -ან ხსნარში 6-8 საათის განმავლობაში. თესლის დათესვა გაშრობის შემდეგ	3 (1)	-(-)
3	ბონზი 004, სკ 4 გ/ლ (პაკლობუტრაზოლი) (4) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1017/19	1,5-5,0 მლ/ლ წყალში	დეკორატიული კულტურები ყვავილები	მცენარეების ზრდის რეგულირება (სიმაღლის შემცირება)	შესხურება ან მორწყვა ვეგეტაციის პერიოდში.	-(6-7)	-(-)
4	გიბგრო 20 %, აბი 200 გ/კგ (ჰიბერელინის მჟავა) ნუფარმი გმზხ და კო კგ”	10-12 აბი/ჰა (1-1.2 აბი/100 ლ)	მსხალი	ნაყოფების წარმოქმნის სტიმულაცია, დაბალი ტემპერატურების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესება	ბუტონიზაციის ფაზა/ყვავილობის დასაწყისი-20 მმ დიამეტრის ნაყოფის ზომის ფაზა.ხარჯვა 1000 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
	ავსტრია 846/16	30 აბი/ჰა (1 აბი/100 ლ)	ციტრუსები	ნაყოფის ჰკნობის თავიდან აცილება, მოსავლის აღების ვადების გაზრდა	შესხურება მწვანედან ყვითელზე ნაყოფის ფერის ცვლილებისას. ხარჯვა 3000 ლ/ჰა	-(1-2)	-(-)
		10-12 აბი/ჰა (1-1.2 აბი/100 ლ)	ბალი	ნაყოფის ზომის ზრდა და კანის სიმკვრივის გაუმჯობესება	შესხურება მწვანედან ყვითელზე ნაყოფის ფერის ცვლილებისას. ხარჯვა -1000 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		20 აბი/ჰა (2 აბი/100 ლ)	ვაზი (სუფრის უწიპწო)	მტევნის სიგრძის ზრდისა და ნაყოფის ჩამოყალიბების სტიმულირება, სიმწიფის დაჩქარება	შესხურება 70% ყვავილების ჩამოყრის ფაზაში+მწვანე ნასკვის ჩამოყალიბების ფაზაში, ინტერვალი 14 დღე. ხარჯვა 1000 ლ/ჰა	-(2)	-(-)
		1-5 აბი/ჰა (0.1-0.5 აბი/100 ლ)	ვაზი (საქიშმიშო ჯიშები)	ნაყოფის ზომის ზრდა	შესხურება ყვავილობის დასასრულს/ნასკვის ჩამოყალიბების ბოლო ფაზაში.	-(1)	-(-)

					ხარჯვა 1000 ლ/ჰა		
		12 აბი/ჰა (2 აბი/100 ლ)	ვაზი (სუფრის წიბწებიანი)	მტევნის სიგრძის ზრდის სტიმულირება	(საგაზაფხულო დამუშავება) შესხურება ყვავილელების ჩამოყალიბების ფაზაში. ხარჯვა – 600 ლ/ჰა		
		11, 6-17, 4 აბი/ჰა (2-3 აბი/100 ლ)	მარწყვი	ნაყოფის ჩამოყალიბების სტიმულირება,	შესხურება ყვავილობამდე 15-20 დღით ადრე. ხარჯვა – 580 ლ/ჰა	-(1)	-(–)
		1 აბი/600 ლ	კარტოფილი	ბოლქვების ზრდის სტიმულირება, მოსავლიანობის მატება	ბოლქვების ჩასველება 4 წუთით პრეპარატის ხსნარში	-(1)	-(–)
		7, 5-15 აბი/ჰა (1.5-3 აბი/100 ლ)	ტკბილი წიწკა	სიმწიფის დაჩქარება, მოსავლიანობის ზრდა	შესხურება საწყის და შუა ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(–)
		6-20 აბი/ჰა (2-4 აბი/100 ლ)	პომიდორი	განვითარების დაჩქარება, დაბალი ტემპერატურების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესება	შესხურება ყვავილობის საწყის ფაზაში. ხარჯვა 300- 500 ლ/ჰა	-(1)	-(–)
5	გიბერქეი, აბი 10 გ/ აბი (პიბერელინის მჟავა 10%) „ინდუსტრიალ ქუიმიკა ქეი ს.ა.“ ესპანეთი 1473	12 აბი/ჰა (1 აბი/133 ლ წყალში)	მსხალი	ნაყოფების წარმოქმნის სტიმულაცია, დაბალი ტემპერატურების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესება (განსაკუთრებით ვილიამის მსხალში)	ბუტონიზაციის ფაზა/ყვავილობის დასაწყისი-20 მმ დიამეტრის ნაყოფის ზომის ფაზა, სიმწიფის დასაწყისი, ნაყოფების შეფერვის დასაწყისი ხარჯვის ნორმა 1500 ლ/ჰა	1-2	7
		6 აბი/ჰა (1 აბი/133 ლ წყალში)	არტიშოკი	კრეფის პერიოდის გახანგრძლივება, არტიშოკების დამწიფების დაჩქარების მეშვეობით	ნაყოფის ჩამოყალიბების პროცესის დაჩქარება, ფოთლების მაქსიმალური მასა 90% -ია, 800 ლ/ჰა	3	7
		12 აბი/ჰა (1 აბი/133 ლ წყალში)	ციტრუსები (მანდარინი, ფოთოხალი, ლიმონი)	ნაყოფის დამწიფების კონტროლი, გაყვითლების პერიოდის გადავადების წყალობით; ქერქის გამკვრივების და შეფერვის შემცირება; მოსავლიანობის ზრდა	ყვავილობის დასაწყისი, ყვავილობა, შესხურება ფერის ცვლილების (მწვანედან- ყვითელში) დაწყებისას; 1500 ლ/ჰა	3	7
		6- 12 აბი/ჰა (1 აბი/133 ლ)	ალუბალი და ბალი	გამოყენების შემდგომ	ყვავილობის დასაწყისი,	3	7

		წყალში)		ალუბლის ყვითელი ვისრუსის მიმართ კარგი იმუნიტეტის ჩამოყალიბება; ინტენსიური და უფრო მყარი- ერთგვაროვანი ნაყოფების ფორმირება; ნაყოფების ზომაში მატება და მოსავლიანობის ზრდა	ყვავილობა, შესხურება ფერის ცვლილების დაწყებისას; 1500 ლ/ჰა		
		4 – 12 აბი/ჰა (1-2 აბი/100 ლ წყალში)	ვაზი (სუფრის უწიპწო)	მტევნის სიგრძის გაზრდის სტიმულირება	ყვავილობისას: 300 -1000 ლ/ჰა; მარცვლების ჩამოყალიბების შემდგომ: 800-1000 ლ/ჰა	2	7
		4 - 12 აბი/ჰა (1-2 აბი/100 ლ წყალში)	ვაზი (სუფრის წიპწებიანი)	მტევნის სიგრძის ზრდის სტიმულირება	ყვავილობისას: 800-1000 ლ/ჰა	2	7
		20 -30 აბი/ჰა (3 აბი/100 ლ წყალში)	ვაზი (სუფრის უწიპწო)	ნაყოფების ზომაში გაზრდის სტიმულირება	ყვავილობისას: 800-1000 ლ/ჰა	4	7
		11, 6-17, 4 აბი/ჰა (2-3 აბი/133 ლ წყალში)	მარწყვი	ნაყოფების ფორმირების და განვითარების სტიმულირება	შესხურება ყვავილობამდე 15-20 დღით ადრე, 400-600 ლ/ჰა	1	-
		1 აბი/600ლ წყალში	კარტოფილი	ტუბერების მოსვენების პერიოდის შეწყვეტა და ზრდის სტიმულირება, უკეთესი გაღივება და მოსავლიანობის მატება	ბოლქვების/ტუბერებ ის დასველება 4 წუთით პრეპარატის სამუშაო ნაზავში	1	-
		6-20 აბი/ჰა (2-4 აბი/100 ლ წყალში)	წიწკა (ტკბილი, ცხარე)	ნაყოფების ფორმირების და განვითარების სტიმულირება, დაბალი ტემპერატურის მიმართ მედეგობის მომატება, სიმწიფის დაჩქარება და მოსავლიანობის ზრდა	შესხურება ყვავილობის დასაწყისიდან, ყვავილობის და შუა ყვავილობაში; 300-500 ლ/ჰა	3	7
		6-20 აბი/ჰა (2-4 აბი/100 ლ წყალში)	პომიდორი	ნაყოფების ფორმირების და განვითარების სტიმულირება, დაბალი	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისიდან: 300-500 ლ/ჰა	3	7

				ტემპერატურის მიმართ მედეგობის მომატება, სიშვითის დაჩქარება და მოსავლიანობის ზრდა			
6	გოლდ გიბი, სკ 20 გ/ლ (პიბერელინის მჟავა)	150 მლ+100 მლ სუმმერ 90	ციტრუსები (მანდარინი)	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 70-80 % ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
	“საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 795/16	600 მლ+100 მლ სუმმერ 90	ფორთოხალი	“	შესხურება ყვავილედის შეკვრის 4-5 კვირის შემდეგ. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		300 მლ+100 მლ სუმმერ 90	ლიმონი	“	შესხურება, როცა აღინიშნება პირველი ფერის ცვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		300 მლ+100 მლ სუმმერ 90	ვაშინგტონის ჯიშის ფორთოხალი	“	შესხურება, როცა აღინიშნება პირველი ფერის ცვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	
		450მლ+100 მლ სუმმერ 90	გრეიფრუტი	“	შესხურება, როცა აღინიშნება პირველი ფერის ცვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		480 მლ+80 მლ სუმმერ 90	ვაზი (უთესლო)	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება, ტარდება როცა 70% ყვავილების დაცვივდა, შემდეგი-10- 12 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(2)	-(-)
		120 მლ+80 მლ სუმმერ 90	ვაზი (საქიშმიშო ჯიშები)	“	შესხურება ტარდება ყვავილების ცვენიდან 4-5 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		360-600 მლ+360 მლ სუმმერ 90	მსხალი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, ყინვაგამძლეობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 30% ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		360 მლ+200 მლ სუმმერ 90	ალუბალი, ბალი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება მასობრივი ყვავილობისას. ხარჯვა - 600 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		2400-3600 მლ+200 მლ სუმმერ 90	ატამი	“	შესხურება მასობრივი ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა-600 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		360-600 მლ+80 მლ სუმმერ 90	მარწყვი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, გამძლეობის გაზრდა არასასურველი გარემო პირო- ბებისადმი, მცენარისზრდა- განვითარების გაძლიერება, ნაყოფების რაოდენობის და წონის გაზრდა, დაძვინების	შესხურება ყვავილის ყუნწების გამოჩენამდე 3-4 კვირით ადრე. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)

				დაჩქარება			
		60-120 მლ+40 მლ სუმმერ 90	კარტოფილი	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება მასობრივი ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა-200- 300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		120-240 მლ+40 მლ სუმმერ 90	სალათა	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება 3-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		360 მლ+40 მლ სუმმერ 90	წიწაკა	მოსავლიანობის გაზრდა, ნაყოფების დამწიფების დაჩქარება	შესხურება კოკრების ფაზაში და ყვავილობის დასაწყისში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(2)	-(-)
		240-300 მლ+50 მლ/100 ლ წყალში	დეკორატი- ული კულტურები	გამძლეობის გაზრდა	შესხურება მოჭრილ ყვავილებზე.	-(1)	-(-)
7	გრო-სტოპ ფოგი, ცნწკ 300 გ/ლ (ქლორპროპამი) „სერტის იუროპ ზ.ვ.“ ნიდერლანდები 1056	60 მლ/ტ 20-25 მლ/ტ 12,5 მლ/ტ	კარტოფილი შენახვის პირობებში	ტუბერის ღივის ზრდის ინჰიბირება	ტუბერების შესხურება ორი წესით: ა) პირველი-25 მლ/ტ, შემდეგი 6 შესხურება 4 კვირის ინტერვალით -12,5 მლ/ტ და ბოლო შესხურება-20 მლ/ტ, ბ) პირველი-60 მლ/ტ, შემდეგი 3 შესხურება 8 კვირის ინტერვალით-20 მლ/ტ . საერთო მაქსიმალური ხარჯვის ნორმა არ უნდა აღემატებოდეს 120 მლ/ტ , ხოლო დამუშავების რაოდენობა-7 ან 4-ს. პირველი შესხურება ტარდება მხოლოდ ტუბერების სრული მომწიფების დამთავრების შემდეგ (3 კვირაში შესანახად მოთავსების შემდეგ). საცავში ოპერატორის მუშაობა დასაშვებია სპეციალური ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საცავის დეგაზაცია დამუშავების შემდეგ - 24 საათი. კარტოფილის ბაზარზე განთავსების ან გადამუშავების მიზნით გამოყენების ვადა - გრო-სტოპ ფოგის ბოლო	-(3-7)	-(-)

					დამუშავებიდან 14 დღე.		
8	ეიბიჯი სან , აპ (1-მეთილციკლოპროპენი 3,3 %) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1412	0,042 გ/ მ3 0,084 გ/ მ3	ვაშლის , მსხლის, კივის, ქლიავის, ხურმის ნაყოფი კომშის ნაყოფი	ნაყოფში არსებული ეთილენის ინჰიბირება, მოსავლის აღების შემდგომ ნაყოფის დამწიფებისა და დაბერების პროცესის დაბლოკვა, ხილის კანის ფერის, სიმკვრივისა და სიმჟავის შენარჩუნება, შენახვის ვადების გახანგრძლივება	გამოიყენება ხილის დაკრეფის შემდეგ არა უგვიანეს 2-7 დღისა (ვაშლის, მსხლის, კივის, ქლიავის, კომშის, ხურმის ნაყოფის ფიზიოლოგიური სიმწიფე) სასაწყობო პირობებში სამაცივრო ჰერმეტიკულ კამერებში. ხილის მოთავსებამდე კამერებს აცივებენ 1-2° C ტემპერატურამდე. ნაყოფების დამუშავებისათვის გამოიყენება სათანადო გენერატორი, რომლის 5-ლიტრიან ავზში ემატება წყალი და ნატრიუმის ჰიდროქსიდის სათანადო რაოდენობა 0,2%-იანი ხსნარის მისაღებად. ავზში შეაქვთ პრეპარატი, რთავენ გენერატორს და დაუყოვნებლივ ტოვებენ კამერას, ჰერმეტიკულად ხურავენ. ხილის დამუშავების ხანგრძლივობა-24 საათი . პროცესის დასრულების შემდეგ ხდება კამერის განთავსება 15 წუთის განმავლობაში, შემდეგ რთავენ შენახვის რეჟიმს	-(1)	-(-)
9	ეფდალ ბლუგიბი 20 წზ 20 გ/ლ (ჰიბერელინის მჟავა)	30 მლ+20 მლ ტარვეტი	ციტრუსები (მანდარინი)	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 70-80 % ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1039/18	120 მლ+20 მლ ტარვეტი	ფორთოხალი	“	შესხურება ყვავილედი შეკვრის 4-5 კვირის შემდეგ. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)

		60 მლ+20 მლ ტარვეტი	ლიმონი	“	შესხურება როცა აღინიშნება პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		60 მლ+20 მლ ტარვეტი	ვაშინგტონის ჯიშის ფორთოხალი	“	შესხურება როცა აღინიშნება პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	
		90მლ+20 მლ ტარვეტი	გრეიფრუტი	“	შესხურება როცა აღინიშნება პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		120 მლ+20 მლ ტარვეტი	ძვაზი (უთესლო)	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება ტარდება როცა 70% ყვავილების დაცვივდა, შემდეგი-10-12 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(2)	-(-)
		30 მლ+20 მლ ტარვეტი	ვაზი (საქიშმიშო ჯიშები)	“	შესხურება ტარდება ყვავილების ცვენიდან 4-5 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		90-150 მლ+90 მლ ტარვეტი	მსხალი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, ყინვაგამძლეობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 30% ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		90 მლ+50 მლ ტარვეტი	ალუბალი, ბალი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება მასობრივი ყვავილობისას. ხარჯვა -600 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		600-900 მლ+50 მლ ტარვეტი	ატამი	“	შესხურება მასობრივი ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა-600 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		90-150 მლ+20 მლ ტარვეტი	მარწყვი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, გამძლეობის გაზრდა არასასურველი გარემო პირობებისადმი, მცენარისზრდა-განვითარების გაძლიერება, ნაყოფების რაოდენობის და წონის გაზრდა, დამწიფების დაჩქარება	შესხურება ყვავილის ყუნწების გამოჩენამდე 3-4 კვირით ადრე. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		30-60 მლ	კარტოფილი	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება მასობრივი ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		60-120 მლ+20 მლ ტარვეტი	სალათა	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება 3-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		180 მლ+20 მლ	წიწკა	მოსავლიანობის გაზრდა,	შესხურება კოკრების ფაზაში და	-(2)	-(-)

		ტარვეტი		ნაყოფების დამწიფების დაჩქარება	ყვავილობის დასაწყისში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა		
		240-300 მლ+50 მლ ტარვეტი	დეკორატიუ ლი კულტურები	გამძლეობის გაზრდა	შესხურება მოჭრილ ყვავილებზე.	-(1)	-(-)
10	ზერებრა აგრო, წზ 500 მგ/ლ +100 მგ/ლ (კოლოიდური ვერცხლი+პოლიჰექსამე თილენზიგუანიდი ჰიდროქლორიდი) (თ) შპს „რეზერვი“ რუსეთის ფედერაცია 1164	80-100 მლ/ტ	საგაზაფხულ ო და საშემოდგომ ო ხორბალი	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება	თესლის თესვისწინა დამუშავება. ხარჯვა - 10 ლ/ტ	- (1)	-(-)
		80-100 მლ/ჰა			შესხურება ბარტყობის ფაზის დასასრულში– აღერების ფაზის დაწყებამდე. ხარჯვა - 300 ლ/ჰა	- (1)	-(-)
		60-100 მლ/ტ	საგაზაფხულ ო და საშემოდგომ ო ქერი	ხარისხის გაუმჯობესება ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციისა	თესლის თესვისწინა დამუშავება. ხარჯვა - 10 ლ/ტ	- (1)	-(-)
		60-100 მლ/ჰა			შესხურება ბარტყობის ფაზის დასასრულში– აღერების ფაზის დაწყებამდე. ხარჯვა - 300 ლ/ჰა	- (1)	-(-)
		100 მლ/ტ	სიმინდი	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	თესლის თესვისწინა დამუშავება. ხარჯვა - 10 ლ/ტ	- (1)	-(-)
		100 მლ/ჰა			შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა – 300 ლ/ჰა	- (1)	-(-)

		100 მლ/ტ	კარტოფილი	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	ტუბერების დარგვის წინა დამუშავება. ხარჯვა - 10 ლ/ტ	- (1)	-(-)
		150 მლ/ჰა			შესხურება ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა - 300 ლ/ჰა	- (1)	-(-)
		75-100 მლ/ტ	მზესუმზირა	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	თესლის თესვის წინა დამუშავება. ხარჯვა - 10 ლ/ტ	- (1)	-(-)
		75-100 მლ/ჰა			შესხურება კალათების წარმოქმნის ფაზის დასაწყისში. ხარჯვა - 300 ლ/ჰა	- (1)	-(-)
		75-100 მლ/ტ	სოიო, ბარდა, ლობიო	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	თესლის თესვის წინა დამუშავება. ხარჯვა - 10 ლ/ტ	- (1)	-(-)
		75-100 მლ/ჰა			შესხურება ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა - 300 ლ/ჰა	- (1)	-(-)
		250 მლ/ჰა	ხეხილი	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	შესხურება: 1-- ყვავილობის ფაზაში, მე- 2-ნაყოფის მოსხმის ფაზაში. ხარჯვა - 1000 ლ/ჰა	- (2)	-(-)
		250 მლ/ჰა	ციტრუსები	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ	შესხურება: 1- ყვავილობის ფაზაში, მე-2--ნაყოფის მოსხმის ფაზის	- (2)	-(-)

				იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	დასაწყისში. ხარჯვა - 1000 ლ/ჰა		
		250 მლ/ჰა	კაკალი თხილი	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	შესხურება: 1- ყვავილობის ფაზაში, მე-2-ნაყოფის მოსხმის ფაზის დასაწყისში. ხარჯვა - 1000 ლ/ჰა	- (2)	-(-)
		200 მლ/ჰა	ვაზი	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა, პროდუქციის ხარისხის ზრდა	შესხურება: 1- ყვავილობის ფაზაში, მე-2- პირველი შესხურებიდან 15-25 დღის შემდეგ. ხარჯვა - 800 ლ/ჰა	- (2)	-(-)
		100 მლ/10 ლ წყალი	ბოსტნეული და სანელებლებ ის საწარმოებელ ი კულტურები	ავადმყოფობების და არასასურველი გარემო პირობების მიმართ იმუნიტეტის ამაღლება, მოსავლიანობის ზრდა,პროდუქციის ხარისხის ზრდა	თესვების დაღობვა 1-2 საათის განმავლობაში.	- (1)	-(-)
		80-100 მლ/ჰა			შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა – 300 ლ/ჰა	- (1)	-(-)
11	მეგაფილ ტაბლეტი, აბი 1 გ/აბი (პიბერელინის მჟავა)	1,5 აბი/100 ლ წყალში	ციტრუსები (მანდარინი)	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 70-80 % ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
	„დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს“ თურქეთი 1347	1 აბი/100 ლ	ფორთოხალი (ვაშინგტონი ს ჯიშის)	“	შესხურება როცა აღინიშნება ყვავილის პირველი ფერის წვლილება.. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		1 აბი/100 ლ	ლიმონი	“	შესხურება როცა აღინიშნება ყვავილის პირველი ფერის წვლილება.. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		2 აბი/100 ლ	ფორთოხალი (გარდა	“	შესხურება ყვავილების	-(1)	-(-)

			ვალენსიის ჯიშისა)		გახსნიდან 4-5 დღის შემდეგ ხარჯვა 500 ლ/ჰა		
		1,5 აბი/100 ლ	გრეიფრუტი	“	შესხურება როცა აღინიშნება ყვავილის პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		2 აბი/100 ლ	(ვაზი (უთესლო)	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება ტარდება როცა 70% ყვავილების დაცვიდა, შემდეგი- 10-12 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		½ აბი/100 ლ	ვაზი (საქიშმიშო ჯიშები)	“	შესხურება ტარდება ყვავილების ცვენიდან 4-5 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		1,5-2,5 აბი/100 ლ	მსხალი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, ყინვაგამძლეობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 30% ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		1,5-2 აბი/100 ლ	ალუბალი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება როცა აღინიშნება ყვავილის პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა -600 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		1-1,5 აბი/100 ლ	ატამი	“	შესხურება აგვისტოს პირველ კვირას. ხარჯვა-600 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		1,5-2,5 აბი/100 ლ	მარწყვი	ნაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, გამძლეობის გაზრდა არასასურველი გარემო პირობებისადმი, მცენარისზრდა- განვითარების გაძლიერება, ნაყოფების რაოდენობის და წონის გაზრდა, დაშვიფების დაჩქარება	შესხურება ყვავილობამდე 3-4 კვირით ადრე. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		½-1 აბი/100 ლ	კარტოფილი	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება დარგვამდე. ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		1-2 აბი/100 ლ	სალათა	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება მოკრეფამდე 7-15 დღით ადრე ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		2,5-6 აბი/100 ლ	არტიშოკი	მოსავლიანობის გაზრდა, ნაყოფების დაშვიფების დაჩქარება	შესხურება მცენარის 4-5 ფოთლის ფაზაში ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		4-15 აბი/100 ლ	დეკორატიუ ლი	გამძლეობის გაზრდა	შესხურება მოჭრილ ყვავილებზე.	-(1)	-(-)

			კულტურები				
12	ნოვოსილი, წე (ტრიტერპენ მჟავები 10 %) ციტოლოგიის და გენეტიკის ინსტიტუტი (იციგ სო რან) რუსეთი 1476	100 მლ/ჰა	პომიდორი	ამცირებს ანთრაქნოზის, ფიტოფტოროზის, სექტორიოზის, შავი ბაქტერიული ლაქიანობის დაავადებებს.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: საყვავილე მტევნის ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა-300 ლ.	14(3)	7(3)
		30 მლ/ჰა	კიტრი	ამცირებს პერენოსპოროზის, ბაქტერიოზის, ნაცრის, ხმობის გავრცელებას 1,5-2 ჯერ, აგრეთვე ზრდის მოსავალს	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი წამლობა 2-3 - ფოთლის ფაზაში, მეორე- ყვავილობის დასაწყისში, მესამე- მასობრივ ყვავილობაში, მეოთხე- მესამე წამლობიდან 7 დღის შემდეგ. ხარჯვა-300 ლ.	14(4)	7(3)
		200 მლ/ჰა	კარტოფილი	ამცირებს ფიტოფტო-როზს, მაკროსპოროზს და ხმობას 3-5 ჯერ.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- ყვავილობის დასაწყისი. მეორე- ში, მესამე- მეორე წამლობიდან 7 დღის შემდეგ. ხარჯვა-300 ლ.	14(3)	7(3)
		100 მლ/ჰა	ყურძენი	ამცირებს მილდიუმის, ოიდიუმის, ანთრაქნოზის და სიდამპლეების გავრცელებას 2-3 ჯერ. აგრეთვე, ზრდის შაქრიანობას 1.5-2 ჯერ, ამაღლებს სადეგუსტაციო შეფასებას, ერთი კვირით აჩქარებს სიმწიფეს.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- ყვავილობისას, მეორე- პირველი წამლობიდან 12 დღის შემდეგ. ხარჯვა-300 ლ.	14(2)	7(3)
		200 მლ/ჰა	სათესლე ხახვი	ზრდის მოსავ-ლიანობას 25%-ით, 20%-ით ზრდის აღმო-მოცენობას, აჩქარებს მოსავ-ლიანობას. ამცირებს პერენოსპორო-	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი -მასობრივი აღერება, მეორე - პირველი წამლობიდან 7 დღის შემდეგ. ხარჯვა-300 ლ.	14(2)	7(3)

				ზისაგან დაზიანებას			
		200 მლ/ჰა	ხახვი	აგრძელებს შენახვის პერიოდს 30-40%-ით, ამცირებს სიმწიფის პე- რიოდს.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- 4 ფოთლის ფაზაში, მეორე- პირველი წამლო- ბიდან 15 დღის შემდეგ. ხარჯვა-300 ლ.	14(2)	7(3)
		80 მლ/ჰა	კომბოსტო	ზრდის მო- სავლიანობას 20- 25%-ით, შაქრიანობას 2-3%- ით და ვიტამინი C-ს 4-5მგ %-ით..	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- 6-7 ფოთლის ფაზაში. მეორე- კომბოსტოს თავის მასობრივი მოხვევა. ხარჯვა-300 ლ.	14(2)	7(3)
		40 მლ/ჰა	ლობიო	ზრდის მო- სავლიანობას 10- 15%-ით, ცილებს პარკოსნებში, ამცირებს სიმწიფის პერიოდს, ბაქტერიოზის გავრცელებას ფოთლებზე და ნაყოფებზე.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- ყვავილობის დასაწყისი, მეორე- მესამე- მეორე წამლობიდან 7 დღის შემდეგ. ხარჯვა-300 ლ.	14(3)	7(3)
		100 მლ/ჰა	წიწიბურა	ზრდის მო- სავლიანობას 22- 28%-ით, 10 დღით აჩქარებს თესლის სიმწიფეს, ზრდის თესლის სასაქონლო ხარისხს.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი- დაბლა ყვავილედის მეორე- მასობრივი ყვავილობისას. ხარჯვა-300 ლ.	14(2)	7(3)
		100 მლ/ტ	საშემოდგომ ო და საგაზაფხუ- ლო ხორბალი	ზრდის მოსავლიანობას 10-15%-ით, ამცირებს ჟანგას და ფესვის სიდამკვლის გავრცელებას. ზრდის თესლის მასას 10- 13%-ით, ფესვის სისტემას 40-60%-ით წებოვნების ხარისხს.	თესლის თესვისწინა დამუშავება-10ლ/ტ. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი-მეორე- დათავთავეების ფაზა. ხარჯვა-300 ლ.	14(1) 14(2)	7(3)
				ზრდის მო- სავლიანობას,	შესხურება ვეგეტაციის		

		40 მლ/ჰა	სოიო	ადიდებს თესლის ზეთიანობას.	პერიოდში: წამლობა ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა-300 ლ.	14(1)	7(3)
		40 მლ/ჰა	ჭარხალი	ზრდის მოსავლიანობას, ამცირებს სხვადასხვა დაავადებების გავრცელებას.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი-8-10 ფოთლის ფაზაში. მეორე- პირველი წამლობიდან 15 დღის შემდეგ. ხარჯვა-300 ლ.	14(2)	7(3)
		80 მლ/ჰა	მზესუმზირა	ზრდის მოსავლიანობას, ამცირებს სხვადასხვა დაავადებების გავრცელებას.	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი-8-10 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. მეორე- ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა-300 ლ.	14(2)	7(3)
		100 მლ/ტ	შვრია	ზრდის მოსავლიანობას	თესლის თესვის წინა დამუშავება 10ლ/ტ. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ბარტყობის ფაზაში. ხარჯვა-300 ლ.	14(1) 14(1)	7(3)
		120 მლ/ტ 100 მლ/ჰა	ქერი	ზრდის მოსავლიანობას, ამცირებს სხვადასხვა დაავადებების გავრცელებას.	თესლის თესვის წინა დამუშავება-10ლ/ტ. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ბარტყობის ფაზა. სამუშაო ხარჯვა-300 ლ.	14(1) 14(1)	7(3)
		100 მლ/ტ 60 მლ/ჰა	სიმინდი	ზრდის მოსავლიანობას, ამცირებს ჟანგას გავრცელებას.	თესლის თესვის წინა დამუშავება- 10ლ/ტ. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: 4-6 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა-300 ლ.	14(1) 14(1)	7(3)
13	რეგალისი, წდგრ 100 გ/კგ (პროპექსადიონ-კალციუმი) „ბასფი სე“ გერმანია 850/17	2.5 1.25 1.25	ვაშლი, მსხალი	ყლორტების ვეგეტატიური ზრდის რეგულაცია, მოსავლიანობის ზრდა, ნაყოფის შეფერილობის გაუმჯობესება	შესხურება ერთწლიანი ნამატის 2-5 სმ სიგრძის მიღწევის შემდეგ (ყვავილობის დასრულების პერიოდში). ხარჯვა 500-1000 ლ/ჰა	30(1) 60(2) 60(2)	-(-) -(-) 3 (-)

				ბაქტერიული სიდამწვრე	ორჯერადი დამუშავებისას- მეორე დამუშავება 3- 5 კვირის შემდეგ (ზრდის სტადია) ან ყლორტების მოსალოდნელი ძლიერი ზრდის დროისათვის.ხარჯვა 750 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21 დღის ინტერვალით		
14	რეგალის პლიუსი, წდგრ 100 გ/კგ (პროჰექსადიონ- კალციუმი) „ბასფი სე“ გერმანია 1407	2.5 1.25 1.25	ვაშლი, მსხალი	ყლორტების ვეგეტატიური ზრდის რეგულაცია, მოსავლიანობის ზრდა, ნაყოფის შეფერილობის გაუმჯობესება ბაქტერიული სიდამწვრე	შესხურება ერთწლიანი ნამატის 2-5 სმ სიგრძის მიღწევის შემდეგ (ყვავილობის დასრულების პერიოდში). ხარჯვა 500-1000 ლ/ჰა ორჯერადი დამუშავებისას- მეორე დამუშავება 3- 5 კვირის შემდეგ (ზრდის სტადია) ან ყლორტების მოსალოდნელი ძლიერი ზრდის დროისათვის.ხარჯვა 750 ლ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21 დღის ინტერვალით	30(1) 60(2) 60(2)	-(-) -(-) 3 (-)

მუხლი 11. დეფოლიანტები და დესიკანტები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი,სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატ ის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა)	კულტურა, დასამუშავებელ ი ობიექტი	დამუშავების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურებები	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე- ბულ) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6
1	ბასტა წზ 150 150 გ/ლ (ამონიუმის გლუფოსინატი) (4) „ბასფი სე“ გერმანია 262/08/12/17	1,5-2	მზესუმხირა	შესხურება დესიკაციის მიზნით მარცვლის ბუნობრივი მომწიფების ფაზაში, როცა კალათების 70-80% მურა ფერს მიიღებს (25-30% თესლის ტენიანობისას)	5-6(1)	7(3)

		1,5-2	სოიო	შესხურება დესიკაციის მიზნით ქვედა და შუა იარუსების პარკების გაყავისფერებისას	10(1)	7(3)
		1.5-2	საგაზაფხულო ხორბალი	შესხურება მარცვლის ცვილისებრი სიმწიფის ფაზაში	10(1)	7(3)
2	გლიფოგანი, წხ 360 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (4) „ადამა აგრიქალზა ბ.ვ.“ ნიდერლანდები 457/15/19	3	მარცვლოვანი კულტურები	შესხურება 2 კვირით ადრე მოსავლის აღებამდე (მარცვლის ტენიანობის 30%-ის ფარგლებში მარცვლის შემოშლისათვის და ნაწილობრივ სარეველების დათრგუნვისათვის)	-(1)	-(-)
3	ვისტა წხ 200 გ/ლ (ამონიუმის გლუფოსინატი) (4) „ლიერ ქემიკალ კო.ლტდ“ ჩინეთი 1283	1,5	სოია	შესხურება დესიკაციის მიზნით სოიას ქვედა და შუა იარუსების პარკების 70% გაყავისფერებისას	-(1)	7(3)
4	კაბუკი, ეკ 26, 5 გ/ლ (პირაფლუფენ-ეთილი) (თ) „ნიჰონ ნოჰიაკუ კო, ლტდ“ იაპონია 1231	0, 6-1, 2	კარტოფილი	მოსავლის აღების წინ ფოთლების დესიკაცია. შესხურება 7 დღის ინტერვალით (მარტი-აგვისტო). მაქსიმალური საერთო ნორმა კულტურაზე სეზონის განმავლობაში -1, 2 ლ/ჰა. ხარჯვა – 300 ლ/ჰა	14(2)	-(3)
5	რეგლონ-სუპერი, წხ 150 გ/ლ (დიქვატი) (თ) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 458/10/15	2	მზესუმზირა	ნათესების შესხურება კალათების გამუქების დასაწყისში. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	4-6 (1)	-(7)
		2.5-3	სტაფილო (სათესლე)	შესხურება მეორე რიგის ქოლგებში მარცვლის სრული მომწიფების ფაზაში, თესლის საერთო მასის ტენიანობის არანაკლებ 50%-ის დროს. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	6-8(1)	-(7)
		2-3	კომბოტო (სათესლე)	შესხურება მარცვლის მთლიანი ცვილობის და ბიოლოგიური მომწიფების დასაწყისში მისი ტენიანობის 50%-ისას	5-10(1)	-(8)
		5-10	შაქრის, საკვები, სუფრის ჭარხალი (სათესლე)	შესხურება ბოლქვის 30-40%-ის გაყავისფერებისას. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	10(1)	-(8)
		2	კარტოფილი (სასურსათო და სათესლე)	შესხურება ტუბერების ფორმირების დამთავრების და კანის გაუხეშების პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	10(1)	-(8)

6	რივეტი 24 ეკ ეკ 240 გ/ლ (კარფენტრაზონ-ეთილი) (თ), (4) "ფმს ქემიკალ სპრლ" ბელგია 657/14/18	250-270 მლ/100 ლ წყალში	კარტოფილი სასურსათო სათესლე	მოსავლის აღების წინ ფოთლების დესიკაცია არა უგვიანეს 7-10 დღისა ფიტოფტოროზის წინააღმდეგ ფუნგიციდით ბოლო დამუშავებისას შესხურება ტუბერების ფორმირების დამთავრების და კანის გაუხეშების პერიოდში	- (1) - (1)	-(3) -(3)
7	სკორპიონი, წხ 150 გ/ლ (დიქვატი დიბრომიდი) (თ) „პეტერსი და ბურგი კვტ“ უნგრეთი 1166	2(ა)	მზესუმზირა	კულტურის დესიკაცია მოსავლის აღებამდე. ნათესების შესხურება კალათების გამუქების დასაწყისში, ტენიანობის არაუმეტეს 35%-ისა. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	4-6 (1)	-(7)
		1,5-2,0	ხორბალი	კულტურის დესიკაცია მოსავლის აღებამდე. ნათესების შესხურება მარცვლის ცვილისებრი სიმწიფის ფაზის დასაწყისში	10(1)	-(8)
		2	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	კულტურის დესიკაცია მოსავლის აღებამდე. შესხურება ტუბერების ფორმირების დამთავრების და კანის გაუხეშების პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	10(1)	-(8)
		1,5-2	რაფსი (საშემოდგომო და საგაზაფხულო)	კულტურის დესიკაცია მოსავლის აღებამდე. ნათესების შესხურება დეროს შუა ნაწილში პარკის 60% გამუქების პერიოდში. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	4-6 (1)	-(7)
		2-3	ვაშლი	კულტურის დესიკაცია მოსავლის აღებამდე ამონაყარის მოსაცილებლად	10(1)	-(8)

შენიშვნა: აკრძალულია იმ პრეპარატების შემოტანა, წარმოება, მიმოქცევა, რეკლამა და გამოყენება საქართველოს ტერიტორიაზე, რომლებიც არ არის მოცემული სახელმწიფო კატალოგის პირველ ნაწილში.

თავი II. პესტიციდების სია, რომელთა არსებული ნაშთების გახარჯვა დაშვებულია

მუხლი 12. ინსექტიციდები და აკარიციდები

სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	მავნებელი	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებულ

	ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი						ი) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	აგრიფოსი, აბი 560 გ/კგ (ალუმინის ფოსფიდი) (თ), (1) „აგრია ს.ა.“ ბულგარეთი 978	5გ/მ3 (2აბი)	ჩატუცირთავი მარცვალსაცავე ბი	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 15-160C-ის დროს ექსპოზიცია 5 დღე. პერსონალის დაშვება მოხდება მხოლოდ განიავების შემდეგ, როცა ფოსფინის შემცველობა სამუშაო ზონის ჰაერში არ აღემატება ზდკ-ს.	-(1)	7(3)
		9გ/მ3 (3აბი)	მარცვალი (სასურსათო, სათესლე, საფურაქე)	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 10 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1-)	-(-)
		6 გ/მ3 (2აბი)	ფქვილი, ბურღული საწყობში ან პოლიეთი- ლენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		5 გ/მ3 (2აბი)	მშრალი ბოსტნეული საწყობში ან პოლიეთი- ლენის საფარქვეშ	მავნებლები შენახვის პირობებში	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 5 დღისა, რეალიზაცია მოხდება, როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	7(3)
		2,4 გ/მ3 (1აბი)	მარცვლოვანი ან პარკოსანი კულტურების მარცვალი გემისა და ტანკერების ტრიუმფში, ნავსადგურე- ბში	მავნებლები შენახვის პირობებში	ფუმიგაცია 15-160C-ის დროს, ექსპოზიცია ფიტოექსპოფუმი- გაციის” ტექნო-ლოგიის გამოყენებით-16 დღე; რეცირკულაციის მეთოდით 1 დღე. დეგაზაცია რეისის დროს და დრეიფის დროს; მარცვლის დათვალიერება და დატვირთვა მოხდება მაშინ, როცა ფოსფინის შემცველობა მარცვლის ზედაპირიდან 0,5-1 მ სიმაღლეზე 0,1 მგ/მ3-ია. დეალიზაცია მოხდება როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს. ხალხის დაშვება სრული განიავების შემდეგ, როცა ჰაერში ფოსფინის შემცველობა არ აღემატება მდდ-ს.	-(1)	-(-)
2	ბიიტალი, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1)	1.4-2.1 2.1	ვაშლი, მსხალი ვაშლი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები,	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	40(2) 40(1)	10(4) 10(4)

	“აგრიკო გრუპ ლტდ” ბულგარეთი 728/14			ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია			
		2.1	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		1.2 1.3	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2) 30(2)	10(4)
		1.3-1.5	ხორბალი, ქვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები		30(2)	10(4)
		0.8-1.1	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, შემარცვლიები ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	შაქრის ჭარხალი სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		1.0	კომბოსტო	ფოთლისმწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		2.0 5	ვაზი	კოქციდები ტკიპები, ფოთლიხვევიები,		20(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
3	ბინგო 40 ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოათი) (1) “ერტარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალექტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	1.4-2.1 2.1	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	40(2) 40(1)	10(4) 10(4)
	თურქეთი 1101	2.1	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		1.2 1.3	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2) 30(2)	10(4)
		1.3-1.5	ხორბალი, ქვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები,		30(2)	10(4)

				თრიფსები, ბაღლინჯოები			
		0.9-1.0	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინობლები		30(2)	10(4)
		1.0	კომბოსტო	ფოთლისმწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		0,9-1,0	იონჯა (სათესლე ნაკვეთები)	ბაღლინჯოები, ბუგრები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		2.0-2.5	ვაზი	კოქციდები, ტკიპები, ფოთლისვევეები,		25(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1,0-1,5	ზეთისხილი	ჩრჩილები, ფსილები, ცხვირგრძელები, ნაყოფის ბუზები		30(2)	10(4)
		0,75	ვარდი	ბუგრები, ხერხები		-(2)	7(3)
		0,75-1,0	დეკორატიული კულტურები	ბუგრები, ტკიპები		-(2)	7(3)
		4	ალვის ხე	ვერხვის პატარა ხარაბუზა		-(2)	7(3)
4.	ბი 58 ახალი, კვ 400 გ/ლ (დიმეთოატი) (1) "ზასფი აგ" გერმანია 462/04/09/15	1.1-1.9 1.5	ვაშლი, მსხალი ვაშლი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლისვევეები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	40(2) 40(1)	10(4) 10(4)
		1.1-1.9	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		0.5-0.9	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინობლები		30(2)	10(4)
		0.8-0.9	თამბაქო	ბუგრები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		2-3	თუთა	ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება თუთის აბრეშუმხვევიას გამოკვების დამთავრების შემდეგ, ნაყოფის საკვებად გამოყენება არ დაიშვება	30(2)	10(4)
		0.9-1.1	ლავანდა	ჭიჭინობლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.7-1.1 1.4-1.9	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		0.5-0.9	იონჯა (სათესლე ნაკვეთები)	ბაღლინჯოები, ბუგრები, ტკიპები		30(2)	10(4)

		0.8-1.2	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუხები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9 0.5-0.7	შაქრის ჭარხალი სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლისმწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1.1-2.0	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვე-ვიები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		1.1-1.5	შავი მოცხარი (სანერგები, სადედეები)	ფოთლიხვევიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.6-1.1	მარწყვი (სადედეები)	ტკიპები, ბუგრები, ჭრიჭინოზებლები		30(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1-2	საძოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირეტროიდებთან ერთად კომბინირებული ნაზავით	30(1)	10(4)
5	ბი-ფოსფინი, ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოათი) (1) "პარიჯატ ინდასტრის პეტ. ლტდ" ინდოეთი 676/15	1.4-2.1 2.1	ვაშლი, მსხალი ვაშლი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვე-ვიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	40(2) 40(1)	10(4) 10(4)
		2.1	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		1.2 1.3	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2) 30(2)	10(4)
		1.3-1.5	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუხები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები		30(2)	10(4)
		0.8-1.1	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	შაქრის ჭარხალი სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)

		2.0 2.5	ვაზი	კოქციდები ტკიპები ყურძნის ჭია		20(2)	10(4)
		1.2	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები ტკიპები ჭრიჭინოებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
6	გოლდმაიტი 57 ეკ 588 გ/ლ (პროპარგიტი) (3) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 991	1.2-1.8	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	10(4)
		1.5-3	ვაშლი	„	„	30(2)	7(3)
		1.6-2.4	ალუბალი, ბალი		შესხურება მოსავლის ადების შემდეგ	-(2)	7(3)
		4.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლის ფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	7(3)
		2,0	სოიო	ტკიპები	„	45(1)	7(3)
		2.2-4.3	თხილი	„	„	60(2)	-(3)
7	გრანდ დ. ეკ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 663/14	1-2 1-1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევები ჩრჩილები, ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1) 30(1)	7.(3) 7(3)
		0.75-1.0	ხორბალი	ჭია წურბელა, პურის ზუჯალა		30(1)	10(4)
		0.5-0.75	ქერი	მაწვე კუსებურა, პურის ხოჭო		30(1)	10(4)
		1-1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	10(4)
		0.8-1.5	შაქრის ქარხალი	ბუგრი, რწყილები ჩვეულებრივი ცხვირგრძელა		40(1)	10(4)
		0.5	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულე- ბის მიწები	კალიები		20(1)	10 (4)
		2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები, ცრუფარიანები მენადმე ჩრჩილი		40(1)	10(4)
8	დეცისი ზღუ 25 ეკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „ბაიერ აგ“	0.25	ხორბალი, ქერი	მაწვე კუსებურა, ჭიაწუპრბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
	გერმანია 030/04/09/14	0.5-0.7	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.1-0.2 0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის		20(2)	7(3)

				ჩრდილი			
		0.2	ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.3	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები რწყილები		20(2)	7(3)
		0.25-0.5	შაქრის ჭარხალი	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.4-0, 5 0.5-0.7	სამოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები (ახალგაზრდა მატლები) კალიები (ჯოგური და იმაგო)		20(1)	7(3)
		0.3-0, 5	ჯვარყვავილოვანი კულტურები	რწყილები		30(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0.3	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი		20(1)	7(3)
		0.5	თამბაქო	ბუგრები		20(1)	10(3)
		0.5-1.0	იონჯა	ბალინჯო, ბუგრები ცხვირგრძელები, სქელფეხა		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		0.2-0.3	სამკურნალო მცენარეები (ასკილი, მაღლყურძენა, ლენცოფა, ლევანდა, კრიალოსანა, შმაგა, მრავალ-მარდვა, ბაყაყურა, ბარამბო)	ფოთლებისა და ღეროების მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		3-4	ჩაი	ჩაის ბუგრი	შესხურება იმ პლანტაციებში, სადაც არ იკრიფება ფოთოლი	-(2)	7(3)
		0.2	ფიჭვი	ფიჭვის ქერქის ბალინჯო	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდეულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს	-(1)	7(3)
		0.4-0.8	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მავნებლების კომპლექსი (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	7(3)

9	დეცისი უმშ 12.5	0.6-0.7	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
	12.5 გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (1)	0.5-1.0	ხეხილი	ნაყოფჩამიები, ბუგრები ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
	„ბაერ აგ“ გერმანია 031/04/09/14	0.08-0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი კულტურები	ფოთლიხვევიები, მზომელები, ოქროკუდა, ხერხიები და სხვ. მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. დასვენება მე-5 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს	-(1)	7(3)
		1	სამოვრები, ველური მცენარეულობა, ყველა სასოფლო- სამეურნეო კულტურა	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკვისას	20(1)	7(3)
10	ეფდალ პრომიტე 570 ეკ 570 გ/ლ (პროპარგიტი) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 997	1.2-1.8	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	10(4)
		1.5-3	ვაშლი	„	„	30(2)	7(3)
		1.6-2.4	ალუბალი, ბალი	„	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(2)	7(3)
		4.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლის ფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	7(3)
		2.2-4.3	თხილი	„	„	60(2)	-(3)
		3	მიხაკი, ვარდი	„	„	3-5(1)	7(3)
11.	ესკაპე 20 ხგ 200 გ/კგ (აიეტამბირიდი) (თ), (3)	0,3 0,35	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღის ბუგრი ფრთათეთრა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
	“სანსეტ ქიმიას ტარიმ ურუნლერი ვე ალელერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1052	0,15-0.3	პამიდორი, კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(1)	1(-)
		0,15	წიწკა	ატმის ბუგრი		3(1)	1(-)

			(დახურული გრუნტი)				
		0,15	საზამთრო	ატმის ბუგრი		10(1)	1(-)
		0.05-0,075	ხორბალი	ბაღლინჯო, მავნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0.15-0,35		პურის გზულა		14(1)	-(-)
		0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		0.1-0.1.25		კარტოფილის ჭიამაია			
		2,4-3,0	ვაშლი	მწვანე ბუგრი		25(1)	-(-)
12	ვერტიკალი 40 ეკ 400 გ/ლ (დიმეთოტი) (1) “სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1056	1. 5-2.1	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლისმღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	30(2)	10(4)
		2.1	ვაშლი	ვაშლის ყვავილჭამია, მსხლის ბაღლინჯო, მაჟაურა, პეწიანა	შესხურება ყვავილობამდე	30(1)	10(4)
		2.1	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	30(1)	10(4)
		1.2	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		1.3		კოლორადოს ხოჭო			
		1.3-1.5	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები		30(2)	10(4)
		0.8-1.1	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	შაქრის ჭარხალი სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)
		1.0	კომბოსტო	ფოთლისმწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		2.0-2.5	ვაზი	კოქციდები ტკიპები, ფოთლიხვევები,		30(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1,8-2,25	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი, ბაღლინჯო, ზეთისხილის		21 (2)	10(4)

				ჭრიჭინოზელა, ზეთისხილის ცხვირგრძელა, ზეთისხილის ხოჭო, ზეთისხილის ბუზი			
		0,8-1,0	დეკორატიული მცენარეები	ბუგრები ტკიპები		10(2)	10(4)
		0,6-0,8	ვარდი	ვარდის ბუგრი, ვარდის ხერხია		10(2)	10(4)
13	თიაკლომექსი 480 სკ 480 გ/ლ (თიაკლოპრიდი) (თ), (1)	0.08-0.10	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II ასაკის მატლების წინააღმდეგ მავნებლის 2 თაობაში (ივნისი-ივლისი). ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	20(2)	4(1)
	„მაკ-გმზხ“ გერმანია 970	0.06	კომბოსტო	კომბოსტოს ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 400 ლ/ჰა	20(1-2)	7(3)
		0.06	კიტრი	ბუგრების კომპლექსი		20(1)	7(3)
		0.2	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა	30(1-2)	7(3)
		0.2-0.25 0.3-0.45 0.18-0.3	ვაშლი	ნაყოფჭამია ფოთლიხვევია ყვავილჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (მაისი- ივლისი), ხარჯვის ნორმა 800-1200 ლ/ჰა შესხურება კოკრების განცალკევების ფაზაში	30(-2) 28(2) -(1)	7(3)
		0.4-0.5	ციტრუსები	ბუგრები, ცრუფარიანები, ფარიანები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ეკონომიური ზღვრების გათვალისწინებით. ხარჯვის ნორმა 2000- 2500 ლ/ჰა	30(1-4)	7(3) 7(3) 7(3)
14	იაკუზა 20 სგ 200 გ/კგ (ტებუფენაირადი) (თ), (3) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელტლერი იმაღალ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1054	0.45-06 0,35-0.45	ვაშლი	ზეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა ობობა ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩენისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
		1,2-1.5	მსხალი	მსხლის ფსილა	„	14 (2)	7(3)
		0.5	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ვაზის ქეჩის ტკიპა	„	14 (2)	7(3)
		0.25-0.35	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		0.5-0.8	ციტრუსები	ტკიპები	„	20 (2)	7(3)
		0.35-0,4	ვარდი, მიხაკი,	ტკიპები	„	- (2-3)	7(3)

			ქრიზანტემა				
		0,35-0,4	ლობიო	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		0.3	მარწყვი	კუნელის ტკიპა	„	10 (2)	7(3)
15	იზოლდესისი 2,5 ეკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „მეტროპოლიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.« თურქეთი 1074	0.25-0,35	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები, პურის ბზულა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.5-0.7	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა, ბამბის ხვატარი		20(2)	7(3)
		0.1-0.2 0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.3-0,4	სოია, ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	ბოსტნეული	მომღრღნელი ხვატრები, ბამბის ხვატარი, კოლორადოს ხოჭო ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები, თრიფსები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ხერხიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
16	იზოლატე 5 ეკ 50 გ/ლ (ლამბდაციგალოტრინი) (თ), (1) „მეტროპოლიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.« თურქეთი 1075	0.2 0.15-0.2 0,25	ხორბალი, ქერი	პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინოზებები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა, ცხვირგრძელები პურის ბზულა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		0.25	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა, ხვატრები		30(1)	10(4)
		0.4-0,75	სოიო	ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ხვატრები		30(2)	10(4)
		0.4-0.8	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)

		0.1-0.2 0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)
		0.15	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		30(1)	10(4)
		0.1-0,25	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
17	იმიდამექსი 70 % წდგრ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1)	0,1	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყურძნის ჭიის მატლების მიმართ	25(2)	7(3)
	„მაკ-გმზხ“ გერმანია 971	0.07-0,1	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფჭამიას მატლების მიმართ.	20(4)	7(3)
		0.07-0.1		ვაშლის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მიმართ	20(1-2)	7(3)
		0.1		კალიფორ ნიის ფარიანა, მენადმე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.07-0.1	ატამი	აღმოსა ვლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0.07-0.1	ატამი	ატმის ბუგრი		20(1)	7(3)
		0.2	ციტრუსები	ციტრუსო ვანტა ფრთათეთრა		25(4)	7(3)
		0.2	ციტრუსები	ნარინჯი სფერი (ჩაის) ბუგრი		25(2)	7(3)
		0.04-0.05	პომიდორი	ბამბის ხვატარი, ბაღის ბუგრი		20(1)	7(3)
		0.04-0.05	კიტრი	ბაღის ბუგრი		20(1)	7(3)
		0.04-0.05	საზამთრო	ბუგრები		20(1-2)	7(3)
		0.04-0.05	ვარდი	ბუგრები		25(1-2)	7(3)
		0.04-0.05	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		25(1-2)	7(3)
18	ინსექტიციდი ქეი, ვკ (პარაფინის ზეთი 830 გ/ლ) “ინდუსტრიალ ქუიმიკა ქეი ს.ა.” ესპანეთი 1043	9--18	ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი ვაშლი, მსხალი	ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები ცრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1200-1800 ლ/ჰა პპრეპარატის გამოყენება .არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს	20(1-2)	7(3)
		10-15	ვაზი	ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები	შესხურება ზამთრის ბოლომდე 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		20-37,5	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა- 1200-2500 ლ/ჰა	20(1-2)	7(3)
		25-30	კაკალი, თხილი, ნუში	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები,	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)

				გრუფარიანები			
		12-27	მდეკორატიული მცენარეები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		12-27	ზეთისხილი	კოკციდები		20(1-2)	7(3)
19	კავანა 5 ეკ 50 გ/ლ (ლამბდაციპლოტრინი) (თ), (1) "სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელური იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1057	0.2 0.15-0.2 0,25	ხორბალი, ქერი	პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინოზებები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა, ცხვირგრძელები პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		0.25	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა, ხვატრები		30(1)	10(4)
		0.4-0,75	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
		0.4-0.8	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)
		0,3	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი		20(1)	10(4)
		0,75	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა		30 (1-2)	10(4)
		0.1-0.2 0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	10(4)
		0.15	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		30(1)	10(4)
		0.1-0,25	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
		0.2-0.4	ახალგაზრდა, არამსხოიარე ბაღები, ქალაქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0,5	შაქრის ჭარხალი	ჭარხლის ფაროსანა		30(1)	10(4)
20	კინმიქსი, უმშ 8 გ/ლ (ბეტა-ციპერმეტრინი) (1)	1,5-2	საძოვრები, ველური მცენარეულობა	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მასობრივი გამოჩენის პერიოდში	10(1)	7(3)
	"აგრო-ქემი კვტ" უნგრეთი	2	"	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)	"	10(1)	7(3)

	1021						
21	კონფიპრიდი, წდგრ 700 გ/კგ (იმინდაკლოპრიდი) (1)	0,35	ვაზი	ყურმის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
	“ნანჯინგ რონქუიმ კო ლტდ” ჩინეთი 1086	0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ვაშლის ბუერი კალიფორნიის ფარიანა, მენადმე ჩრჩილი	„	25(2)	7(3)
		0.08	პომიდორი	ბამბის ხვატარი, ბაღის ბუერი	„	15(1)	7(3)
		0,12	პომიდორი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა მენადმე ჩრჩილი	„	7(2)	7(3)
		0.08	კიტრი	ბაღის ბუერი	„	15(1)	7(3)
		0,12	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ბუერები	„	7(2)	7(3)
		0.1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	„	25(2)	7(3)
22	მიდაში, წზფ 700 გ/კგ (იმინდაკლოპრიდი) (1) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 620/13	0,15-0,2	ვაზი	ყურმის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყურმის ჭიის მატლების მიმართ	30(2)	7(3)
		0.15-0,2	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ვაშლის ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფჭამიას მატლების მიმართ.	25(2)	7(3)
		0.1		კალიფორ ნიის ფარიანა, მენადმე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.07-0.1	ატამი	აღმოსა ვლური ნაყოფჭამია ატმის ბუერი		20(1-2)	7(3)
		0.2	ციტრუსები	ციტრუსო ვანტა ფრთათეთრა ნარინჯი სფერი (ჩაის) ბუერი		25(2-4)	7(3)
		0.06-0.08	პომიდორი	ბამბის ხვატარი,		15(1)	7(3)
			კიტრი	ბაღის ბუერი			
		0.04-0.05	საზამთრო	ბუერები		20(1-2)	7(3)
		0.06-0.08	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	7(3)
		80-120 გ/მ2	მრავალწლიანი კულტურების სანერგეები			-(1)	30(30)

23	მეტადეკს პელლეტ გრ, პილ 50 გ/კგ (მეტალდეჰიდი) (თ) „ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 944	40-50 კგ	ბოსტნეულ- ბაღჩეული, კიტრი- პამიდორი დაცულ გრუნტში, ხეხილი, ტყის ჯიშები, ციტრუსები, კენკროვანები, ვაზი, თამბაქო, დეკორატიული მცენარეები, საჩითილე და სანერგეები	ლოფორთქინები და ლოკოკინები	გაფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე, რიგთაშორის და ბილიკებზე, მავნებლის გამოჩენისას	20(1)	10(4)
24	ომნუსი 57 % ეკ 570 გ/ლ (პროპარგიტი)	1.5	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
	„აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 866	1.1	ალუბალი, ბალი	“	შესხურება მოსავლის ალების შემდეგ		-(2)
25	პრედატორი 2,5 ეკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელტლერი იმაღალტ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1058	0.25-0,35	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები, პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.5-0,6	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(3)	-(3)
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.1-0.2 0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.3-0,4	სოია, ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუგრები, ხვატრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო, ფრთათეთრა, ბუგრები, კოლოფთის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.3-0,4	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები		20(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ჩრჩილები, ხერხიები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)

		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0,5	თხილი კაკალი	არაფარდი პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (1)	7(3)
		0,4-0,45	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ჩრჩილი ზეთისხილის ცრუფარიანა		21(2)	7(3)
		0,6-0,9	ჩაი	ფოთლის მწუწნი შავნებლები		30(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		0,25	შაქრის ქარხალი	ხვატარები, რწყილები, ფაროსანა, ცხვირგრძელა ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (1)	7(3)
26	პროპაფექტი 57 ეკ 570 გ/ლ (პროპარგიტი) “ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ” ჩინეთი 622/14	1.2-1.8	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	7(3)
		3.0	ვაშლი			30(2)	7(3)
		1.6-2.4	ალუბალი, ბალი		შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(2)	7(3)
		4.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	
27	სანსირო 550 ეკ 500+50 გ/ლ (კლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელური იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1059	1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	7(3)
		0.75-1.0	ხორბალი	ჭია წურბელა, ჰურის ბზუალა		30(1)	10(4)
		0.5-0.75	ქერი	შავნე კუსებურა, ჰურის ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.75-1.0	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(2-3)	
		0.5-1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	10(4)
		1.5	ციტრუსები	ფარიანები, ცრუფარიანები		40(1)	10(4)
		2.2-2.6		მენადმე ჩრჩილი			
		1.5	ვაზი	ფარიანები, ცრუფარიანები		30(1)	10(4)

28	სერბანი 4, ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) "სერექსაგრი ზირაატ ვე ქიმია სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ სტი." თურქეთი 979	1,8-2,4	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფქამიები, ფოთლიხვევები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ამერიკული თეთრი პეპელა, ბუგრები, ბაღლინჯოები, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40 (2)	7 (3)
		1,8-2,0	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჭრჩილი		40 (2)	7 (3)
		1.5-2,0	ვაზი	ცრუფარიანები, ტკიპები		30(2)	7(3)
		0,6—1,2	ბოსტნეული	კოლორადოს ზოჭო,, თამბაქოს თეთრულა, ხახვის ბუზი, ხახვის ფსილა, კომბოსტოს თეთრულა		20 (2)	7 (3)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ზოჭო, ბუგრები		20 (2)	7 (3)
		2-2.5 1.5-2 0.8	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, ხვატარები მდელოს ფარვანა ბუგრი, ჭარხლის რწყილი, ბუზი		30 (2)	13 (4)
		1.2	მხესუმზირა	მხესუმზირას ალურა		30 (1)	7 (3)
		1,2	სიმინდი	მანებელთა კომპლექსი		30(3)	7 (3)
		1,0	ბარდა, ლობიო	მეგრცვლიები		30 (2)	7 (3)
		0,8-1,2	მარცვლეული	ჭურის ბზუალა, მარცვლეულის ჭრჩილი		30 (2)	7 (3)
29	სმაჩი, სკ 240 240 გ/ლ (სპიროდიკლოფენი) (თ) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 945	0.4-0.6	ვაშლი მსხალი	ხილის წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა, კუნელის ტკიპა მსხლის ჩვეულებრივი ფსილა	შესხურება კვირტის გახსნის და ვარდისფერი კონუსის სტადიაში	14(2)	7(3)
		0.4-0.6	ბალი, ალუბალი	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას, სიმწიფეში შესვლისას	14(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება კვირტის გახსნისა, ყვავილობისა და მისი დასრულებისას	14(1)	7(3)
		0.5-0.,8	ციტრუსი	აბლაბუდიანი ტკიპა, ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა	შესხურება ყვავილობის დასრულებისას და სიმწიფეში შესვლისას	14(2)	7(3)
30	სულფექსი გოლდი, წდგრ	5	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ხარჯვის	1(1-2)	4(1)

	800 გ/კგ (გოგირდი)				ნორმა - 1000 ლ/ჰა		
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	5-8	ხეხილი	“	“	1(1-2)	4(1)
	თურქეთი 993	8-10	ციტრუსები	”	”	1(1-2)	4(1)
31	ტაფანა 100 ეკ 100 გ/ლ (ალფა- ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0,2	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ფარვანა ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით	15(3)	-(4)
	“სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელური იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1055	0.1-0.15	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიჭინობელები, თრიფსები, რწყილები, ქიაწურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	
		0.25-0.35	ვაზი	ფოთლიხვევიები		25(2)	-(4)
		0.2-0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფქამია, ვაშლის ჩრჩილი, ფოთლიხვევიები ამერიკული თეთრი პეპელა		25(2)	10(4)
		0,4	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი		25(2)	10(4)
		0,35-0,4	თხილი			25(2)	10(4)
		0.1-0,3	ბარდა, ლობიო	ბუგრები ბადლინჯოები მემარცვლები	შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ	20(1)	10(4)
		0.1	შაქრის და სუფრის ჭარხალი	ჭარხლის ფოთლის ბუგრი, ჭარხლის მენადმე ბუზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.1		კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		20(2)	
		0.1-0.2	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი	”		
		0,15-0,2	ბოსტნეული	მთიბველები	”	15(2)	10(4)
		0,25	პამიდორი	ხვატარი	”	20(2)	10(4)
32	ტეკვანდო კაპსულა კს 50 გ/ლ (ლამბდა- ციპალოტრინი) (თ), (1) „საფა ტარიმ ა.ს.	0.4-0.8	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20-25 დღიანი ინტერვალით	20 (2)	10(4)

	თურქეთი 1004						
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	10(4)
		0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ხვატრები		20(2)	10(4)
		0.1-0,2	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		20 (1)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, კომბოსტოს თეთრულა, კომბოსტოს ჩრჩილი, რწყილები ჭიჭინობელები		20 (1)	10(4)
		0.25	ხორბალი, ქერი	ხორბლის ხოჭოები, თრიფები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხები, ჭიაწურბელა		30(1)	-(-)
		0,2-0.25	სიმინდი	სიმინდის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
		0,2-0.4	ახალგაზრდა მსხმოიარე ბაღები, ქალაქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები თხილი	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.1	შაქრის ჭარხალი	რწყილები		20(1)	10(4)
		0.3-0.5	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი, ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ცრუფარიანა		20(2)	10(4)
		0.75	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როცა თხილის დიამეტრი მიაღწევს 3-4 მმ	20(2)	10(4)
		0,15-0,2	არასასოფლო- სამეურნეო დანამშენების ბუზები	კალიები (არაჯოგური ფორმები, ჯოგური ფორმების უმცროსი ასაკის მატლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	
				კალიები (ჯოგური ფორმები, ზრდასრული ფორმები და იმაგო)			30(1)
33	ტურბანი 4 ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი)	0.5	არასასოფლო- სამეურნეო დანამშენების	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10 (4)

	(თ), (1) “ერტარ ქიმიკ ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმაღ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” 1102		სავარგულები				
		2	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები		40 (2)	7 (3)
		1.5-2	ვაზი	ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები		40 (2)	7 (3)
		2	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები		40 (2)	7 (3)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		40 (2)	7 (3)
		2-2.5	შაქრის ჭარხალი	ცხვირგრძელები, ხვატარები		30 (2)	10(4)
		1.5-2		მდელოს ფარვანა, ბუგრი			
		0.8					
		1.5	იონჯა	ფიტონომუსი		25 (1)	10(4)
		1.0-1.2	საშემოდგომო ხორბალი	პურის ბაღლინჯოები, თრიფსები, ბუგრი, ჭიაჭურბელა, პურის ბზუალა, შემოდგომის პურელის ხვატარი, მარცვლოვანთა ბუზები პურის ბაღლინჯოები, ჭიაჭურბელა		30(1)	10(4)
		0.8-1	საგაზაფხულო ხორბალი				
		1,8-2	ზეთისხილი	იისფერი ცრუფარიანა ზეთისხილის ჭრჩილი		30(2)	10(4)
34	ფაქტორი, ეკ 500 გ/ლ (ბრომპროპილატი) (4) “პარიჯატ ინდასტრის პვტ. ლტდ” ინდოეთი 508/09/15	1.5-3.0	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	45(2)	7(3)
		1.2-1.8	ვაზი			45(1)	7(3)
		1-1.5	ვარდი (ღია და დახურული გრუნტი)	აბლაბუდა ტკიპები		3(2)	3(-)
		0.9	მოცხარი	ტკიპები		45(1)	3(-)
		1.5-2	ჟოლო (სანერგე ბი)			-(2)	7(3)
		0.8-1.2	ასკილი (სანერგე ბი)			-(2)	7(3)
		0.8-1.2	შავბალახა			-(2)	7(3)

			სამკურნალო (სათესლე ნაკვეთები)				
		3.75-4.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	45(1)	7(3)

მუხლი 13. როდენტიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა	დასამუშავებელი ობიექტი	მავნებელი	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება
N	1	2	3	4	5
1	კაპკანი, ბრ პარაფ. 0,005 % (ბროდიფაკუმი) (თ) შპს „კომპანია „უკრაინა“ შპს „გეოუკრაინა“ საქართველო 894	1,5-2,5 კგ/ჰა 1-2 ბრიკეტი/სოროზე 1-3 ბრიკეტი დამცველ ყუთში	სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები საწყობები, სა-თავსოები, სარ-დაფები, კომბ-საკვების ცეხები, დახურული გრუნტი, სამეურნეო შენობები, მარცვალ-გადასამუშავებელი საწარმოები	ჩვეულებრივი და საზოგადოებრივი მემინდვრია რუხი და შავი ვირთაგვები ბინის თავი	შეტანა სოროში შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში სპეციალური კოვზით შემდგომი მიწის შემოყრით. დახურულ შენობებში მისატყუარი განლაგდება დამცავ ყუთებში მღრღნელების ლოკალიზაციის ადგილებში, ერთმანეთისაგან 2-15 მეტრის დაშორებით. მისატყუარების რაოდენობა დამოკიდებულია მღრღნელების დასახლებაზე (დასახლება 10-20 ან 500 სორო/ჰაზე). დახურულ გრუნტში-15-50 გ ბინის თავგებისათვის, 30-150 გ-ვირთაგვებისათვის, ხორბლის ნათესებში საზოგადოებრივი მემინდვრისათვის-1-2 ბრიკეტი /სოროში დამუშავების ინტერვალი 7- 14 დღე/დამე, არაუმეტეს 2 დამუშავების სეზონზე
2	კილრატი, მის 0,005 % (ბროდიფაკუმი) (თ) „ დვა აგრო გმზხ“ გერმანია 1085	1,5-1,7 კგ/ჰა 2-3 ბრიკეტი/სოროზე 1-3 ბრიკეტი დამცველ ყუთში	მარცვლეული კულტურები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები დახურული გრუნტი, საწყობები, სა-თავსოები, სარ-დაფები, კომბ-საკვების ცეხები, სამეურნეო შენობები, მარცვალ-გადასამუშავებელი საწარმოები	ჩვეულებრივი და საზოგადოებრივი მემინდვრია რუხი და შავი ვირთაგვები ბინის თავი	შეტანა სოროში შემოდგომა-ადრე გაზაფხულზე სპეციალური კოვზით შემდგომი მიწის შემოყრით. ხორბლის ნათესებში საზოგადოებრივი მემინდვრისათვის-2-3 ბრიკეტი /სოროში. დამუშავების ინტერვალი 14- 16 დღე/დამე, არაუმეტეს 2 დამუშავების სეზონზე. დახურულ შენობებში მისატყუარი განლაგდება დამცავ ყუთებში მღრღნელების ლოკალიზაციის ადგილებში, ერთმანეთისაგან 2-15 მეტრის დაშორებით. მისატყუარების რაოდენობა დამოკიდებულია მღრღნელების დასახლებაზე (დასახლება 10-20 ან 500 სორო/ჰაზე). დახურულ გრუნტში-15-50 გ ბინის თავგებისათვის, 30-150 გ-ვირთაგვებისათვის
		600 გ/100 მ2 5-10 გ/სოროზე 30-50 გ/ყუთში 0,005% მისატყუარზე	“საწყობები, სა-თავსოები, სარ-დაფები, კომბ-საკვების ცეხ-ბი, დახურული გრუნტი, სამეურნეო შენობები, მარცვალ-გადასამუშავებელი საწარმოები	რუხი და შავი ვირთაგვები ბინის თავი	მოშხამული მისატყუარი განლაგდება 30-50 გრამის რაოდენობით დამცველ ყუთებში არა უმცირეს 4 ნაკვეთურში, რომლის ფართობიც 100 მ2-მდეა. შედარებით დიდი ფართობის სათავსოებში განლაგებულ წერტილებს შორის ინტერვალი 10-15 მ-ია. ათვისებულ მისატყუარს შეავსებენ ყოველ 7 დღეში ერთხელ. ბრძოლის ხანგრძლივობა 2 კვირა

3	მტორმი სევიურე, მის ბლოკი 0.005 % (ფლოკუმაფენი) (თ) “ბასფი სე” გერმანია 1091	-	სასოფლო-სამეურნეო საეარგულები, დახურული გრუნტი საწყობები, სათავსოები სარდაფები, კომბსაკვების ცეხები სამეურნეო შენობები მარცვალგა დასამუშავებელი საწარმოები	ჩვეულებრივი მემინდრია საზოგადოებრივი მემინდრია ბინის თავი	1 ბრიკეტი/სოროში განლაგდება მინდორში 10-15მ დაშორებით მემინდრების გავრცელების ადგილებში. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მიუწვდომელობა ბავშვებისათვის, ცხოველებისათვის და ფრინველებისათვის. შექმული მისატყუარის განახლება ხდება 7-10 დღეში. 1 ბრიკეტი/სოროში 2 მეტროს დაშორებით თავის გაგვრცელების ადგილებში. შექმულ მისატყუარის განახლება ხდება სამჯერ 3 კვირის განმავლობაში. დახურულ სივრცეში ბრიკეტები განლაგდება მისატყუარის დამცველ ყუთებში. მას განალაგებენ როგორც შენობის იატაკზე, ისე მის სხვადასხვა სიმაღლეზე. განლაგებულ წერტილებს შორის მინიმალური დაშორება 2 მ-ია.
		-	“	რუხი ვირთაგვები	1 ბრიკეტი/სოროში ყოველ დამცველ ყუთში მოთავსდება 2-3 ბრიკეტი 5 მ დაშორებით შედარებით დიდი ფართობის სათავსოების გარეთა მხარეზე. შექმულ მისატყუარის განახლება ხდება 3-4-ჯერ 7 დღის განმავლობაში
		-	“	შავი ვირთაგვა	“
4	მტორმი პელეტი, გრ 0.005 % (ფლოკუმაფენი) (თ) “ბასფი სე” გერმანია 1092	-	სასოფლო-სამეურნეო საეარგულები, დახურული გრუნტი, საწყობები, სა-თავსოები, სარდაფები კომბსაკვების ცეხები სამე-ურნეო შენობები, მარცვალგა- დასამუშავებელი საწარმოები	ჩვეულებრივი მემინდრია საზოგადოებრივი მემინდრია ბინის თავი	მისატყუარი განლაგდება 2-4 მ დაშორებით. სათავსოებში გამოიყენება 10-20 გ. შექმულ მისატყუარის განახლება ხდება ყოველ 7 დღეში 3-4 ჯერ. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მიუწვდომელობა ბავშვებისათვის, ცხოველებისათვის და ფრინველებისათვის.
		-	“	რუხი ვირთაგვები	მისატყუარი განლაგდება 5-10 მ დაშორებით. სათავსოებში გამოიყენება 30-50 გ. შექმულ მისატყუარის განახლება ხდება ყოველ 7 დღეში 3-4 ჯერ. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მიუწვდომელობა ბავშვებისათვის, ცხოველებისათვის და ფრინველებისათვის.
		-	“	შავი ვირთაგვა	“

მუხლი 14. ფუნგიციდები

სავაჭრო სახელწოდება,	პრეპარატის ხარჯვის	კულტურა, დასამუშავებელი	დაავადება	დამუშავების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი	დამუშავებულ ფართობზე

	პრეპარატული ფორმა, მოქმედი წივითიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	ობიექტი			(გამოყენების ჯერადობა)	ხელით (მექანიზირებუ ლი) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	აგსტარი 250 ეკ 250 გ/ლ (ტრიადიმეფონი) „აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 851	0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(6)	7(3)
2	ანტრაკოლ ბლაუ 65, სგ 650 გ/კგ (პროპინები) (თ) (1) “ზაიერ კროპსაენს აგ” გერმანია 578/12	1.5-2	ვაზი	ჭრაქი	“	30(3)	7(3)
		2-3	ვაშლი	ქეცი	“	30(4)	7(3)
		0.8-1	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ფიტოფტორა	“	20(3)	7(3)
		1-1.25	ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი	“	30(3-4)	7(3)
		5-6	ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ობი	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამდე და მეორე ვეგეტაციის დასაწყისში.	40(4)	10(3)
		1.2-1.25	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(4)	7(3)
	ბაისტარი, სგ სგ 250 გ/კგ (ტრიადიმეფონი) „ნიგზო სანჯოი აგროსაიენს კო ლტდ“ ჩინეთი 1025	0.35-0.5	ვაშლი	ნაცარი, ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 02% სამუშაო ხსნარით	20(6)	7(3)
3		0.35-0.5	ვაზი	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 02% სამუშაო ხსნარით	30(6)	7(3)
		0.1-0.2	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 01-0, 02% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.2-0.6	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 01% სამუშაო ხსნარით	5(2)	5(3)
		1-4	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	“	“	10(2)	7(3)
		0.6-1	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	-(3)

		0.75	ვარდი დეკორა- ტიული (დახურული გრუნტი)	ჟანგა, ნაცარი, ლაქიანობები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 05% სამუშაო ხსნარით	5(1)	7(3)
4	ბორდო ლუქსი, სფ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის სულფატი- კალციუმის ჰიდროქსიდი)	6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
	(თ), (1)	4-6	პამიდორი	“	“	8(4)	3(1)
	“ერთარ ქიმია ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმალ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	4-6	შაქრის, სუფრის ქარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
	თურქეთი 1112	4-6	ხახვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
		2.8-4	მოცხარი , ხურტკმელი	ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-600 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		2.8-4	იონჯა	მურა ლაქიანობა	“	15(2)	3(1)
		4.2-10	ქალაქის მწვანე ნარგავები	ქეცი, ლაქიანობები, სეპტორიოზი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	3(2)	3(1)
		2.1-2.8	სამკურნალო მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-400 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		8-12	კურკოვნები	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	“	15(4)	3(1)
		8-10	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		20-25	ციტრუსები	სკები, მალსეკო ანთრაქნოზი ბაქტერიული		15(4)	7(3)

				ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა			
		5	დეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები ქეცი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 500 ლ/ჰა შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	-(3) -(1)	3(1)
		20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში				3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი სიხუჭუჭე კლასტეროსპორიოზი მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
5	ენერგოლ კომბი, სფ 700-60 გ/კგ (პროპინები+ციმო ქსანილი)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღის ინტერვალით	30(3)	7(3)
	„ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 951	1.25	კიტრი, გოგრა (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღის ინტერვალით	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	28(3-4)	7(3)
		1,25	ხახვი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღის ინტერვალით	14(3)	7(3)
		1,0	სალათა	ალტერნარია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	14(3)	7(3)
6	ერპლანტი 100 ევ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1068	0.3	კიტრი, ჰამიდორი, წიწკა, ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	7(2-3)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	„	20(4)	7(3)
		0.25-0,3	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	21(3-4)	7(3)
		0.4	ვარდი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5% სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	-(3-4)	3(-)

7	ერფრუტი 50 სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქ სანილი) (თ)	2,5-3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	“სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1066	2,5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2,5-3	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
8	ეფდალ დიფენპრო 30 ეკ 300 გ/ლ (დიფენოკონაზო ლი 150 გ/ლ+პროპიკონაზო ლი 150 გ/ლ) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1067	0,4-0.5	ხორბალი, ქერი	ნაცარი, ღეროს, მურა, ყვითელი ჟანგა, სეპტორიოზი, ჰელმინტოსპოროზი, პირენოფოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	21 (1-2)	-(3)
		0.25-0,4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)
		0,3-0,4	სოია	ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით	30 (3)	7(3)
9	ეფდალ იპროდიინი 500 სფ 500 გ/კგ (იპროდიონი)	0.15	სტაფილო	თეთრი, შავი, მურა სიდამპლეები, ფუზარიოზი, თესლის ოზი, ფომოზი	ძირხვეწების დამუშავება შენახვამდე	-(2)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 998	1.5	“	მურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ცერკოსპოროზი, ალტერნარიოზი	სათესლე ნაკვეთებში ნათესების შესხურება 0,5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.75-1,5 1,5-3,0	პამიდორი	ნაცრისფერი სიდამპლე ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		0.4	კიტრი	სკლეროტინიოზი	“	7 (2)	7(3)
		0.4	ბოსტნეული	ნაცრისფერი სიდამპლე	“	15 (2)	7(3)
		1,5-1,9	თამბაქო	მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის		

					პერიოდში		
10	ეფდალ პიროქსომი 76 სგ 700-60 გ/კგ (პროპინები+ციმოქსანილი)	2-2.5	ვაზი	კრაქი, ფომოფსისი	“	30(3)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.« თურქეთი 1060	1.25	კიტრი, გოგრა (ღია გრუნტი)	კრაქი	“	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	კრაქი, ანთრაქნოზი	“	20(3-4)	7(3)
11.	ზეანოლი 50 სგ 500 გ/კგ (იპროდიონი) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ჯურუნლერი ვე ალექტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1069	1,8-2,25	კურკოვნები (გარგარი, ქლიავი, ატამი, ბალი, ალუბალი,)	მონილიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ნაყოფის შეფერადების პერიოდში. ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	25 (3)	7(3)
		0,8-1,5	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება დამწიფების პერიოდში. ხარჯვა-800-1200 ლიტრი/ჰა	30 (3)	7(3)
		2,5	ციტრუსი	ყავისფერი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი სიმპტომების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით.	30 (3)	7(3)
		0,5-1	ხახვი, ნიორი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი, თეთრი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ღეროს 50%-იანი დახრის პერიოდში. ხარჯვა-800-1200 ლიტრი/ჰა	21 (3)	7(3)
		0,5	პამიდორი	ნაცრისფერი სიდამპლე ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 -14 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ნაყოფის ზრდის დამთავრებისას. ხარჯვა-400-600 ლიტრი/ჰა	15(2-3)	7(3)
		0,45	კიტრი	თეთრი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	15 (2-3)	7(3)
		1,2	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ, სანერგეებში და	15 (2-3)	7(3)

					სადედეგში შეზღუდვის გარეშე ხარჯვა-800-1200 ლიტრი/ჰა		
12	იზოლბლუ ზორდომიქსი, სფ (200 გ/კგ სპილენძის მიხ ედვით) (სპილენძის სულფატი- კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) „მეტროპოლიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.« თურქეთი 1076	6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
		4-6	ჰამიდორი	“	“	15(4)	3(1)
		4-6	ხახვი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 400-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	15(3)	3(1)
		8-15	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 1000-1500 ლ/ჰა	25(6)	3(1)
		6,5-15	ატამი გარგარი	ფოთლის სიხუჭუჭე კლასტეროსპოროზი		25(2)	3(1)
		7-13	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4)	7(3)
		20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა- 1000-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროს პოროზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
13	იზოლდიფეკორი 250 გვ	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ- დისფერების ფაზა-ში, ყვავილობის შემდეგ და 10- 14 დღიანი ინტერვა-ლით	20(4)	7(3)

	250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) „მეტროპოლიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.“ თურქეთი 1077				0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით		
14	იზოლპროპინები 70 სგ 700 გ/კგ (პროპინები) (თ), (1)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)
	„მეტროპოლიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.“ თურქეთი 1078	2,4-3,5	ვაშლი, მსხალი	ქევი	“	30(3)	7(3)
		1,0-1,5	მზესუმზირა	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (2)	10(3)
		1.5-2	გოგროვნები	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
		1.5-2	კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი) რიზოქტონიოზი ფესვის ფუზარიოზული სიდამპლე,		20(4)	7(3)
		1,0-1,5	ხახვი	პერონოსპოროზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	კომბოსტო	პერონოსპოროზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	ნესვი, საზამთრო	ანთრაქნოზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	ბარდა, ლობიო	ანთრაქნოზი, ჟანგა, ასკოხიტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		1,0-1,5	ვარდი, მიხაკი	ჟანგა		- (3)	- (3)
15	კამბაზი მც. სგ 90+ 600 გ/კგ (დიმეთომორფი+ მანკოცები)	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
	“სანსეტ ქიმიკატარიმ	2.5	ვაზი	ჭრაქი	„	30(3)	7(3)

	ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1070						
		2-2.5	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)
		2-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	“	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	15(2)	7(3)
16	კარპაზი 50 წზგრ, 500 გ/კგ (ციპროდინილი) (თ) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1014	0,4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
		0,2 0.4	ატამი, გარგარი ქლიავი, ალუბალი, ბალი	ნაცარი Mმონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, კოკომიკოზი	“	28(4)	7(3)
		0.7	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი	“	20(3)	7(3)
17	კინგკოზები მ-45, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1048	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი ზადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, მაკროსპოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით	28(4-5)	7(3)
		2.0-3.,0	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღის ინტერვალით	28 (2)	7(3)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღის ინტერვალით	14 (3)	7 (3)
		1,2-1,6	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	„	20 (3)	7 (3)
		1,2-1,6	საზამთრო, ნესვი	ანთრაქნოზი	„	7 (3)	7 (3)
		1,2-1,6	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	28 (3)	7(3)

		1.0-1.2	კარტოფილი (სათესლე)	ჭრაქი რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	7(3)
		1,0-1,2	ლობიო, ბარდა	ანთრაქნოზი, ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	28 (3)	7(3)
18	კონრადი, სკ 250 გ/ლ (აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1006	0.6	ჰამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16 დღიანი ინტერვალით. სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)	5(3)
		0,6	წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	„	3(2)	3(3)
		0.5-0.6	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 14-16 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	3(2)	3(3)
		0,75	საზამთრო	ალტერნარია	„	3(2)	3(3)
		0.8	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპსისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ, ისვრის პერიოდში, სიმწიფის დაწყებისას. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	25(2)	7(3)

19	კორუნები 70 სვ 700 გ/კგ (პროპინები) (თ), (1)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	30(3-4)	7(3)
	“კორუმა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს” თურქეთი 868	2,5-3,5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“	25(3-4)	7(3)
		1.5-2	კიტრი, ჰამიდორი, ბადრიჯანი, კომბოსტო, ხახვი (ღია გრუნტი) საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ფიტოფტოროზი, ფუზარიოზი ანთრაქნოზი	“	20(3)	7(3)
		1.5-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	„	20(4)	7(3)
		1.5-2	პარკოსნები	ანთრაქნოზი	„	20(4)	7(3)
20	კოპერ -ქაუნთ -N , ზკ 271,5 გ/ლ (სპილენძიამონი უმ დიაცეტატის კომპლექსი, 93 გ/ლ Cu მიხედვით) (თ), (3) “ მინერალ რესერჩ ენდ დეველოპმენტ, ქემიკალ სპეშიალიტის დივიჟენ, ინკ.” აშშ 1046	18-28 18-23 9 2-5	ვაშლი,	ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიული კიბო, ანთრაქნოზი ფესვის ყელისა და ვარჯის სიღამპლე ბაქტერიული სიღამწვრე	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა 1500 ლ/ჰა შესხურება შემოდგომაზე მოსავლის აღების შემდეგ ან ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხარჯვა-400 ლ/ჰა (15-20 ლიტრი თითოეულ ხეზე და მის გარშემო ნიადაგზე. შესხურება ყვავილობის პერიოდში 10% ყვავილელების გახსნიდან 7 დღის ინტერვალით ყვავილობის დამთავრებამდე	-(1) - (2)	3(1)
		2,5-5 19-28	მსხალი	ბაქტერიული სიღამწვრე ყვავილეების ბაქტერიული ჭკნობა	შესხურება ყვავილობის პერიოდში 10% ყვავილელების გახსნიდან 5- 7 დღის ინტერვალით შესხურება გვიან შემოდგომაზე	- (2) -(1)	3(1)
		18-28	გარგარი	კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი	შესხურება შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე და 7 დღის ინტერვალით.. ხარჯვა 1500 ლ/ჰა	-(2-3)	3(1)
		19-28	ატამი ვაშლატამა	ბაქტერიული ლაქიანოზა, კოკომიკოზი, მონილიოზი,	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე და 7-10 დღის ინტერვალით.. ხარჯვა 1500	21 (2-4)	3(1)

		15		ბაქტერიოზი ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი	ლ/ჰა		
		6 2-3	ალუბალი	კვირტების ბაქტერიული ჰკნობა, ნაყოფის ლაქიანობა მონილიოზი	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, გვიან შემოდგომაზე და ზამთრის ბოლოს. ხარჯვა-400 ლ/ჰა შესხურება ყვავილელების გაშლის და ყვავილობის ფაზაში 7 დღის ინტერვალით. . ხარჯვა-400 ლ/ჰა	-(3) 21 (2-3)	3(1)
		19-28	ქლიავი, ტყემალი	ბაქტერიული ნეკროზი, ბაქტერიული კიბო ,მონილიოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და გაზაფხულზე მწვანე კონუსის და ვარდისფერი კოკორი ფაზაში 7 დღის ინტერვალით..	21(2-3)	3(1)
		18-28 18-23	ნუში	მონილიოზი, კლასტეროსპორიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას და 7 დღის ინტერვალით შესხურება გვიან შემოდგომაზე 3-4 კვირის ინტერვალით კვირტების დაბერვამდე	20 (3) -(3)	3(1)
		19-28	თხილი	ბაქტერიული კიბო, მერქნის ნეკროზი	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ და თებერვლიდან აპრილის დასაწყისამდე	20(1-3)	
		19-28	კაკალი	კაკლის ნეკროზი	შესხურება ყვავილეების გამოჩენიდან ყვავილობის დაწყებამდე 7 დღის ინტერვალით	20(2-3)	

		19	კივი	ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1 თვის ინტერვალით. ხაჯვა-1500 ლ/ჰა	20 (3)	
		2-3	ზეთის ხილი	ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე 1 თვის ინტერვალით. ხაჯვა-400 ლ/ჰა	20(2-4)	3(1)
		18-23	კენკროვნები	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქები, ყვითელი ჟანგა, ბაქტერიული კიბო	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ.	-(1)	3(1)
		5-14			შესხურება კვირტების გახსნისას და 10-14 დღიანი ინტერვალთ	15(2-3)	
		11,5-23	მოცხარი, ზურტკმელი	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქები	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალთ	-(3)	3(1)
		9-23	მოცვი	ალტერნარიოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და 4 კვირის შემდეგ	-(2)	3(1)
		3,5-5	მარწყვი	ფოთლის ლაქიანობა, ფოთლის სიდამწვრე	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებიდან მოსავლის აღებამდე 7 -10 დღის ინტერვალთ	15(2-4)	3(1)
		4,5-5	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი, ანტრაქნოზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კვირტების გახსნისას, 4-6 ფოთლის ფაზაში და 7-10 დღიანი ინტერვალთ	25(4-6)	3(1)
		1-2	ციტრუსი	სკები, ლაქიანობა, მელანოზი, ვარდისფერი ოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილელების გაშლის წინ და ყვავილობის შემდეგ 7 დღიანი ინტერვალთ. ხაჯვა-400 ლ/ჰა	30 (2-4)	3(1)
		5-14		მონილიოზი	შესხურება შემოდგომაზე 7 დღიანი ინტერვალთ.	-(2)	
		5-7	სტაფილო	ალტერნარიოზი ფიტოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მცენარეების 12-15 სმ სიმაღლისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალთ	10(3-4)	3(1)

		3,5-7	ხახვი	ჭრაქი, ალტერნარიოზი	„	10 (2-4)	3(1)
		5	მწვანე ხახვი	ჭრაქი	შშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კარგად დაფენსვანებულ მცენარეზე და 7-10 დღიანი ინტერვალით	10 (3)	3(1)
		5-7	ნიახური	ბაქტერიული კიბო, ცერკოსპოროზი, სეპტორიოზი	„	10 (2)	3(1)
		7	კამა, ცერეცო, ოხრაზუში	ფომოფისი, რიზოქტონია, ჭკნობა, ბაქტერიული კიბო	„	10 (3)	3(1)
		3,5	ისპანახი	ანთრაქნოზი, ცერკოსპოროზი, ჭრაქი	შშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალთ	10(3)	3(1)
		2,5-5	კომბოსტო ყველა სახის	ფოთლის შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე	„	10(2-3)	3(1)
		1,2-2,5		პერონოსპოროზი			
		3,5 -5	გოგროვნები, ბახჩეული კულტურები	პერონოსპოროზი , ალტერნარიოზი,,ანთრაქნოზი,,ბაქტერიული ლაქიანობა, შავი სიდამპლე	„	10(2-4)	3(1)
		5	ბადრიჯანი				
		65 მლ/100 კვ.მ.	ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პროფილაქტიკური და 7- 10 დღიანი ინტერვალთ	10(4)	3(1)
		3,5-7	წიწაკა				
		65-95 მლ/100 კვ.მ.	წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ბაქტერიული ლაქიანობა ცერკოსპოროზი	შესხურება აღმოცენების შემდეგ ან გადარგვის შემდეგ და 7-10 დღიანი ინტერვალთ .	10(4)	3(1)
		3,5-6	პამიდორი	მურა კუთხოვანი ლაქიანობა, ფოთლის ბაქტერიული სიდამწვრე		10(3-4)	
		65 -95 მლ/100 კვ.მ.	პამიდორი (დახურული	ფიტოფტოროზი , ალტერნარიოზი, მაკროსპოროზი	„		3(1)

			გრუნტი)				
		3,5-7	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი, მაკროსპორიოზი, როზოქტონიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით .	15(3-4)	3(1)
		3,5-7	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 7დღიანი ინტერვალით	15(2-3)	3(1)
		5-11,5	თამბაქო	ფოთლის კუთხოვანი ლაქიანობა, პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი	მცენარეების შესხურება დაავადების გამოჩენისას და 10 დღის ინტერვალით	15(2-4)	3(1)
		9,5-14		პიტომი, ცერკოსპოროზი, ბაქტერიული კიბო	ნიადაგის შესხურება გადარგვამდე და ჩითილების გადარგვის შემდეგ.	-(1-2)	
		3,5-5	ხორბალი, ქერი , შვრია	ჰელმინტოსპორიოზი ,სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თავთავის გამოჩენისას და 10 დღის შემდეგ	20(2)	3(1)
		5		თავთავის ფუზარიოზი, ბაქტერიული ჭკნობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 10 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	
		5	სიმინდი	ბაქტერიული სიდამპლე, ბაქტერიული ჭკნობა, ბაქტერიული ზოლიანობა, ღეროს სიდაპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გამოჩენისას და 7 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	3(1)
		2,5-7	პარკოსნები	ბაქტერიული კიბო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას მცენარეების 7-12 სმ სიმაღლისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალით	20(2-4)	3(1)
		2,5-5	იონჯა	ალტერნარიოზი	შესხურება მოსავლის აღებამდე 10-14 დღით ადრე და 30 დღის ინტერვალით	14 (1-2)	3(1)
		1	დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები	ბაქტერიოზები, ალტერნარიოზი, ცერკოსპოროზი,, ფიტოფტორა, ანთრაქნოზი, ტოტების სიდაპლეები, ჭრაქი, ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პროფილაქტიკური და 14 დღიანი ინტერვალით . ხაჯვა-900 ლ/ჰა	15(4)	3(1)

		5	სოკი	წიწვის ჟანგა	შესხურება კვირტების გახსნისას და 3-4 კვირის ინტერვალით	-(1-2)	3(1)
		14	მუხა	სფეროსებრი ხავსი	შესხურება გაზაფხულზე ხავსის აქტური ზრდის დაწყებისას , ხარჯვა -16-18 ლ /ხის სიმაღლის გრძივ მეტრზე	-(1)	3(1)
21	კუპროსულფი წზგრ 25 250 გ/კგ (სპილენძის სულფატი) (თ), (1)	15-20	ვაშლი მსხალი	ქეცი, მონილიოზი ბაქტერიოზი ლაქიანოზები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე.ხარჯვა 1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
	“აიკუფი სა.” ესპანეთი 691/14	10-15	ატამი გარგარი, ქლიავი, ალუბალი ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე.ხარჯვა 1000 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		8-10	კენკროვნები	ანთრაქნოზი სეპტორიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე.ხარჯვა 800 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		10-15 ბორდოს ხსნარის სახით	ვაშლი	ქეცი, მონილიოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალთ .ბორდოს ხსნარის 1%-იანი სამუშაო ნაზავით. ხარჯვა 1000-1500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-5 ბორდოს ხსნარის სახით	კიტრი	პერონოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალთ .ბორდოს ხსნარის.1%-იანი სამუშაო ნაზავით. ხარჯვა 400-500 ლ/ჰა	20(4)	3(1)
		5 4-5 ბორდოს ხსნარის სახით	პამიდორი	მურა კუთხოვანი ლაქიანოზა ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი	“	15(3) 15(4)	3(1)
		4-6 ბორდოს ხსნარის სახით	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი, როზოქტონიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალთ .ბორდოს ხსნარის .1%-იანი სამუშაო ნაზავით. ხარჯვა 400-600 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		10 ბორდოს ხსნარის სახით	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-დღიანი ინტერვალთ .ბორდოს ხსნარის 1%-იანი სამუშაო ნაზავით.. ხარჯვა 1000 ლ/ჰა	20(4)	3(1)
		20-25 ბორდოს ხსნარის სახით	ციტრუსი	სკეზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში .ბორდოს ხსნარის 1%-იანი სამუშაო ნაზავით. ხარჯვა- 2000-2500 ლ/ჰა	30 (4)	3(1)
22	მაიოზი70 სგ 700 გ/კგ (Pპროპინეზი) „სანსეტ ქიმიკა ტარიმ	1.5-2	კარტოფი-ლი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალთ	20(3)	7(3)

	ურუნლერი ვე ალეტლერი იმლ. პაზ. სან. ვე ტის. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1049						
23	მანკოზატი მც, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) „სიკვამ ს.პ.ა.“	2,0-2,5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30 (4)	7(3)
	იტალია 897	2,0-3,0	ატამი	ფოთლების სიხუჭუჭე	„	30(4)	7(3)
		2,0-2,5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით	30(4)	7(3)
		2,0	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	„	20(4)	7(3)
		2,0	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	„	15 (3)	7 (3)
		2,5	საზამთრო	კოლექტორიხუმი	„	15 (3)	7 (3)
		2,0	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	20 (4)	7(3)
		2,5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	35 (4)	7(3)
		2-2,5	კარტოფილი (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
24	მაქსალინი, სფ 400+40 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქ სანილი) (თ)	2,5-3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-500- 1000 ლ/ჰა	28 (3-5)	7 (3)
	„ოქსონ იტალია სპა“ იტალია 1019	2,5-3	პამიდორი, მადრიჯანი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10- დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-400- 1000 ლ/ჰა	10 (3-4)	7(3)
		2,5-3	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-600- 1000 ლ/ჰა	10 (3-4)	7(3)
		2,5-3	კარტოფილი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-400- 1000 ლ/ჰა	14 (4-5)	7(3)
		4-5	ხახვი	პერონოსპოროზი ალტერნარიოზი ჟანგა	„	14 (4)	7(3)
25	მელტემი 72 სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი +	2,5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ყვავილობის შემდეგ 10-12 დღიანი ინტერვალთ	30(3-4)	7(3)

	მანკოცები)						
	„სანსეტ ქიმია ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმლ. პაზ. სან. ვე ტის. ლტდ. სტი“ თურქეთი 1071	2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი	შესხურება ბუტონების გამოჩენიდან 10-12 დღიანი ინტერვალებით	20(3)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი) პამიდორი(ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (3) 14(4)	7(3)
26	მიკალი სფ 75 500+250 გ/კგ (ალუმინის ფოსფორი + ფოლპეტი)	3-4	ვაზი	ჭრაქი ნაცრისფერი სიდამპლე ნაცარი შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0, 25% სამუშაო ხსნარით	30(5)	7(3)
	(4) „ბაიერ აგ.“ გერმანია 123/04/09/14	0.3-0.5 0.9-1.5	თუთა (სათესი განყოფილება და სანერგე)	ყლორტების ფუზარიოზი ფესვის სიდამპლე, ცილინდროსპოროზი, ბაქტერიოზი	აღმონაცენთა და ნერგების შესხურება 0, 3% სამუშაო ხსნარით	-(3-4)	7(3)
27	ოსსიქლორი 35 წზგრ 350 გ/კგ (სპილენძის ქლორფანგი)	2.5-3.2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი) სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-600 ლ/ჰა	20(4-5)	3(1)
	“მანიკა ს.პ.ა.” იტალია 1032	3.2-4	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.5-3.2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა	“	20(4)	3(1)
		2.5-3	კიტრი, ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		2.5-3	კომბოსტო	ბაქტერიოზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	3(1)
		2.5	წიწკა, ბადრიჯანი	ალტერნარიოზი	”	20(3)	3(1)
		2.5-3	ხახვი, ნიორი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		3,2-4	მზესუმზირა	ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		4-6			შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის დამთავრების შემდეგ. .ხარჯვა-1500 ლ/ჰა		
		10—17	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე. .ხარჯვა-1200 ლ/ჰა	20(4)	3(1)

		4-6	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიოზი, სკლეროტინიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	3(1)
		12-16			შესხურება გვიან შემოდგომაზე. ხარჯვა-1500 ლ/ჰა		
		4-6	ზეთისხილი	ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება გვიან შემოდგომაზე.	20(4)	3(1)
		6	კივი	სიდამპლეები	მცენარის ქვედა ნაწილის შესხურება 10-15 ლ ხსნარით	20(4)	3(1)
		4-7,5	თხილი, კაკალი, ნუში	ციტოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		3-6	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე	“	30(5)	3(1)
		10-12,5	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ფიტოსპოროზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი, მალსეკო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-2500 ლ/ჰა	35(3)	3(1)
		1,75-2,5	მარწყვი	სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		3,2-4	თამბაქო	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		4-6	დეკორატიული კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქავეები, ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(2)	3(1)
		1.75-2,5					
		2,5-3	ბარდა, ლობიო	ჭრაქი, ალტერნარიოზი, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი, ჟანგა	”	20(3)	3(1)
		2,5-3	ფოთლოვანი ბოსტნეული	ჭრაქი, ალტერნარიოზი, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი, ჟანგა, ცერკოსპორა	”	20(3)	3(1)
28	პოლტიგლია მანიკა 20 წდგრ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	3-6	კარტოფილი, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	(ბორდოს ნარევი 20% - სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)	3-6	კიტრი ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი სეპტორიოზი ანთრაქნოზი	“	10(4) 20 (30)	7(3)
	(თ), (1) “მანიკა ს.პ.ა.” იტალია 1031	2-3	ხახვი, ნიორი სტაფილო, კომბოსტო	პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი,	“	15 (3)	7(3)

		6	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	“	15(3)	3(1)
		2.8-5	მარწყვი	ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი	“	15(3)	7(3)
		10-20	თესლოვანი	ქეცი, ნაყოფის სიდამპლე,	შესხურება მცენარის მოსვენების პერიოდში	-(1)	7(3)
		9-19	ხეხილი	სეპტორიოზი, მონილიოზი, ტოტების კიბო, ალტერნარია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში:	15(4)	
		7,5-10			შესხურება ფოთლების ცვენისას და კვირტების გახსნისას	-(1)	7(3)
		12-14	თხილი, კაკალი, ნუში		შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(3-4)	
		8-12	ვაზი	ჭრაქი, ესკოროიოზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, ყვავილობის შემდეგ, მტევნების შეკვრისას	25(3-4)	7(3)
		14-24	კურკოვანი ხეხილი	ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მონილიოზი, ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი	შესხურება მცენარის მოსვენების პერიოდში	-(1))	7(3)
		12-20	ზეთისხილი	ფუმაგო (სიშავე)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		15-25	ციტრუსი	მეჭექიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი მზაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა	მცენარის შემოდგომას, ზამთრის ზოლოს, გაზაფხულზე	25(4)	7(3)
		8		ლპობა	მცენარის ქვედა ნაწილის შესხურება 10-15 ლ ხსნარი		7(3)
		5-6	კივი		შესხურება ფოთლების ცვენისას	20(2)	
		2.5-4	ყვავილები, დეკორატიული კულტურები	ჟანგა, ლაქიანობები, ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(2)	3(1)
29	პროკურე, კვ 250 გ/ლ (პროპიკონაზოლი) (3) „ლიიდს ლაიფსაენს ლიმიტედ“	0,4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3-4)	7(3)
	დიდი	0,4	ვაშლი	„	„	30(3)	7(3)

	ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1124						
		0,4	კიტრი (ღია გრუნტი)	„		20(2)	7(3)
30	რაპირა 5 ეკ 50 გ/ლ (კვიზალოფოპ-პ- ეთილი) “ერთარ ქიმა ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმაღ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1104	0,75-1	შაქრის და სუფრის ჭარხალი, მზესუმზი რა, კარტოფი ლი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, სოიო, პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, მინდვრის სორგო, ძურწა)	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზიდან , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1-1,5	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1,25-1,5	ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	-(-)
31	რიდოლეტი მც, სფ 640+80 გ/კგ (მანკოცები+მეტა ლაქსილი)	2- 2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
	“ერთარ ქიმა ტარიმ ერნ. ალეტლერი იმაღ. პაზ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(4)	7(3)
	თურქეთი 1108	2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	10(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	15(3)	7(3)
32	რიფიტი 50 წდგრ 500 გ/კგ (ტრიფლოქსისტრ ობინი) (თ), (3) “პლატინ ქიმა მუმესსილიკ ვე დის ტიკ. ლტდ. სტი ” თურქეთი 862	0,15-0,25	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი, შავი (მურა) ლაქიანობა, ფილოსტიქტოზი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით	14(2-3)	7(3)

					შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილური ნებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნქციონირება. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.		
		0.25-0.3 0.14	ვაზი	ჭრაქი ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილური ნებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნქციონირება. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, არ უნდა აღემატებოდეს სამს	35(2-3)	7(3)
		0,15	ნესვი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10 დღის ინტერვალით	10 (2-3)	7 (3)
33	რკინის შაბიამანი ტექნიკური, ხფ 53-47% (რკინის (II) სულფატი) (თ) კსს“ყირიმის ტიტანი“ უკრაინა 830	30-40	ვაშლი, მსხალი	შტამბისა და ტოტების დაავადებები, ქეცი, ლაქიანობები, ნაცრისფერი სიდამპლე, მონილიოზი, შავი კიბო	მცენარეებისა და ნიადაგის შესხურება 3-4% ხსნარით გვიან შემოდგომაზე (ფოთოლცვენის შემდეგ) ან ადრე გაზაფხულზე (კვირტების დაბერვამდე). ხარჯვა-2-5 ლ/ხეზე (ასაკიდან და ჯიშისაგან გამომდინარე)	-(2)	7(3)
		30-40	ვაზი	ანთრაქნოზი, ბაქტერიული კიბო, ნეკროზი, ჭრაქი	მცენარეებისა და ნიადაგის შესხურება 2-3 % ხსნარით გვიან შემოდგომაზე (ფოთოლცვენის შემდეგ) ან ადრე გაზაფხულზე (კვირტების დაბერვამდე) ხარჯვა-1-1,5 ლ/ბუჩქზე (ასაკიდან და ჯიშისაგან გამომდინარე)	-(2)	7(3)
		30-40	ხურტკმელი	ამერიკული თეთრი	„	-(2)	7(3)

			შავი მოცხარი	ნაცარი, სეპტორიოზი, ანთრაქნოზი ნაცარი, ანთრაქნოზი, თეთრი ლაქიანობა, მოცხარის სვეტის ჟანგა			
		30-50	ხეხილი, ციტრუსები, კენკროვნების ბუჩქები	მღიერები და ხავსი	მცენარეებისა და ნიადაგის შესხურება 6-8 % ხსნარით გვიან შემოდგომაზე (ფოთოლცვენის შემდეგ) ან ადრე გაზაფხულზე (კვირტების დაბერვამდე)	-(2)	7(3)
34	როვონე 50 სგ 500 გ/კგ (იპროდიონი)	0.15	სტაფილო	თეთრი, შავი, მურა სიდამპლეები, ფუზარიოზი, თესლის ოზი, ფომოზი	მირხველების დამუშავება შენახვამდე	-(2)	7(3)
	“საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 584/13	1.5	“	მურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ცერკოსპოროზი, ალტერნარიოზი	სათესლე ნაკვეთებში ნათესების შესხურება 0,5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		-	კიტრი, პამიდორი (დახურული გრუნტი)	თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლეები	დაზიანებული ღეროების წასმა (ცარცთან ან კირთან ნარევით 1:2 ან 1:1)	-(1)	-(-)
		0.5	პამიდორი	ალტერნარიოზი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		0.4	კიტრი	სკლეროტინიოზი	“	7 (2)	7(3)
		0.4	ბოსტნეული	ნაცრისფერი სიდამპლე	“	15 (2)	7(3)
		1.0 –1.5	ვაზი	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15% სამუშაო ხსნარით	30(3-4)	7(3)
		1.5-1.8	გარგარი	მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		1.2	მარწყვი	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ 0,25% სამუშაო ხსნარით. სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე	-(2)	7(3)
		1.2	ტიტა	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით	-(4)	7(3)
		0.4-0.8 1.2-2.1	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	ალმონაცენთა ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლე, ცილინდროსპოროზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი	ალმონაცენთა და ნერგების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	-(3-4)	7(3)
35	როვრალი 50 სგ 500 გ/კგ (იპროდიონი) „ფმს ქემიკალ სპრლ“ ბელგია 1158	1-2	კარტოფილი	ალტერნარიოზი, თეთრი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	15(4)	7(3)
		1-2	სტაფილო	თეთრი, შავი, მურა	სათესლე ნაკვეთებში	-(4)	7(3)

				სიდამპლეები, მურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ცერკოსპოროზი, ალტერნარიოზი	ნათესების შესხურება		
		500 გ/100 კგ	სტაფილო	ალტერნარიოზი	თესლის შეწამვლა	-(1)	-(-)
		1,5	ხახვი პრასი	სიდამპლეები, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა, ქრავი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	15 (2) 15(4)	7(3)
		1-1,5	ნიორი	ნაცრისფერი სიდამპლე ალტერნარიოზი	„	14 (5)	7(3)
		4 გ/ლ	ნიორი	თეთრი სიდამპლე	თესლის შეწამვლა	- (1)	7(3)
		1.5-2	სალათა	სკლეროტინიოზი, რიზოქტონიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (2)	7(3)
		2-3	ბროკოლი , ყვავილოვანი კომბოსტო	ალტერნარიოზი	“	10 2)	7(3)
		3	კომბოსტო (დასასაწყობებელ ი)	ალტერნარიოზი	შესხურება მოსავლის აღებამდე 7-14 დღით ადრე	14 (1)	7(3)
		1-1,5	ლობიო, ბარდა	ნაცრისფერი სიდამპლე, სკლეროტინიოზი	„	14 (2)	7(3)
		1	კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ღეროს სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით	7 (2)	7(3)
		1,5-2	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4)	7(3)
		1,5-2	გარგარი, ალუბალი, ატამი, ქლიავი	მონილიოზი, კლასტეროსპორიოზი, ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		1-2	კენკროვნები	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	7(4)	7(3)
		1,5-2	მარწყვი ჟოლო	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, გვირგვინოვანი სიდამპლე, ღეროს სიდამპლე, მეწამული სილაქავე, ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი, ფომოფისი	შესხურება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ. სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე	-(1)	7(3)
		2	არაქისი	სკლეროტინიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-21 დღიანი ინტერვალით	10(3)	7(3)
		1	ნუში	მონილიოზი, კლასტეროსპორიოზი, ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		1-1,5	რაფსი	სკლეროტინიოზი, ღეროს სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30% ყვავილის გაშლისას	10(1)	7(3)
		1.2	დეკორატიული მცენარეები	ფესვის სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1% საშუაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		1,5-2	წიწვნების	ფესვის სიდამპლე	შესხურება დაავადების	-(3)	7(3)

			სანერგეები		გამოვლენის პირველი ნიშნებიდან და 21 დღიანი ინტერვალით		
36	სანაკოლი, სფ 700 გ/კგ (პროპინები) “ნანჯინგ რონქიმ კო ლტდ”	3	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10-დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
	ჩინეთი 1087	2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	30(4)	7(3)
		3	ვაშლი	ქეცი	„	25(4)	7(3)
		3	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(4)	7(3)
		3	კიტრი (დახურული გრუნტი)	პერონოსპოროზი	„	7(3)	7(3)
37	საფა რიდონეტ გოლდი მც 68, სფ 40+640 გ/კგ (მეტალაქსილი მ + მანკოცები)	2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი , ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	20(3)	7(3)
	(4) „საფა ტარიმი ა.ს.“ თურქეთი 660/14	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		2.5	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ჭრაქი	“	3(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	15(3)	7(3)
38	საფკონილი 500 სკ 500 გ/ლ (კლორტალონი ლი) (თ) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1015	3	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
		2,5	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3%-იანი სამუშაო ხსნარით 8-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	3 (3)
		2.0-2,5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 -12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	3(3)
		2-3	ვაზი	ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი	„	30(3-4)	7(9)

		3-3,5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	20(4)	3(3)
		3	გარგარი	ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში შესხურება მოსვენების პერიოდში	56 (2) -(1)	3(3)
39	სულფექსი გოლდი, წდგრ 800 გ/კგ (გოგირდი)	3-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4-6)	4(1)
	“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”	3-8	ვაშლი, მსხალი	“	“	1(1-6)	4(1)
	თურქეთი 993	3-8	ატამი			1(1-5)	4(1)
		2-3	გოგროვნები	“		1(1-5)	1(1)
		2-3	ბარდა, ლობიო	ასკოხიტოზი, ჟანგა		1(1-3)	1(1)
		2-3		ბადრიჯანი	ასკოხიტოზი, ნაცარი	“	1(1-3)
		2-3		ხახვი	ჟანგა		1(1-3)
		2-3		ვარდი	ნაცარი	“	1(2-4)
40	ტაგიანტი 30 ს 360 გ/ლ (ჰიმექსაზოლი) “საფა ტარიმი” თურქეთი 950	45,0	პამიდორი (საჩითილე)	ფუზარიოზული ჰკნობა, პიტიუმი	საჩითილეში ნიადაგის შესხურება (დარგვამდე, დარგვის ან გადარგვის შემდეგ)	- (1 -2)	-(-)
		60,0	თამბაქო (სათესი)	„	სათესში ნიადაგის შესხურება (დათესვამდე, დათესვის შემდეგ, აღმოცენების შემდეგ)	- (1 -2)	-(-)
41	ტილტუსტი, ეკ 250 გ/ლ (პროპიკონაზოლი) (3) “აგრიკო გრუპ ლტდ “ ბულგარეთი 732/14	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	ნაცარი, მურა ჟანგა, ლეროს, ყვითელი ჰელმინ-თოსპრორ ოზული ლაქიანობა, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(1-2)	-(3)
		0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ქერი	ბადისებური ლაქიანობა, ნაცარი, ჟანგა, მურა წითელი ლაქიანობა	“	40(1-2)	-(3)
		0.5	შვრია	გვირგვინა ჟანგა, მურა წითელი ლაქიანობა	“	40(1-2)	-(3)
		0.5	ვარდი ეთერზეთოვანი	“	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,08% სამუშაო ხსნარით	20(2)	7(3)

		1	მდელის სამყურა	ანთრაქნოზი, ასკოქიტოზი, მურა ლაქიანობა	მეორე წლის ნათესების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით	40(1-2)	-(3)
42	ტი რექსი, ვკ 300 გ/ლ (პროპიკონაზოლი 150 გ/ლ+ტრიადიმეფონი 150 გ/ლ) შპს „კომპანია „უკრავეტი“	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მურა, ღეროს და ყვითელი ჟანგა, ნაცარი, სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	-(3)
	უკრაინა შპს „გეოუკრავეტი“ საქართველო 914	0.5	ქერი	გვირგვინა ჟანგა, ნაცარი, მურა წითელი ლაქიანობა, ზოლებიანი ლაქიანობა, ბადისებური ლაქიანობა	“	30(1)	-(3)
		0.5	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ჟანგა, ცერკოსპოროზი	”	20(3)	-(3)
		0,4	ვაშლი	ნაცარი	”	30(4)	7(3)
43	ფუნგიკინგი, სვ 700 გ/კგ (პროპინები)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	30(2-3)	7(3)
	(თ), (1) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”	2-3	ვაშლი	ქეცი, მონილიოზი	“	30(2-4)	7(3)
	ინდოეთი 627/13	1.2-2.25	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ფიტოფტოროზი	“	20(3)	7(3)
		1.5-2.5	ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი	“	30(3-4)	7(3)
		5-6	ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ოზი	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამ-დე და მეორე ვეგეტაციის დასაწყისში.	1(4)	10(3)
		1.2-2.25	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(4)	7(3)
44	ციმოზები, სვ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ციმოქსანილი) (თ) 4)	3	ვაშლი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25 (3)	7 (3)
	„ნანჯინგ რონქუიმ კო ლტდ“ ჩინეთი 1089	3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12-დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		3	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10-დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
45	ჰექტაშ ბაკირი, სვ 500 გ/კგ (სპილენძის ქლორფანგი) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ას.” თურქეთი	2.4-3.2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(5)	3(1)

641/13							
		3.2-4	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.4-3.2	პამიდორი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		2.4	კიტრი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.4	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		4-8	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		4-8	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	3(1)
		6	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	30(6)	3(1)
		0.4-0.8	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგე)	აღმონაცენტა ჩაწოლა, ნერგების ფესვის სიდამძლე, ყლორტების ფუზარიოზი, ბაქტერიოზი	აღმონაცენტა და ნერგების შესხურება 0,4% სამუშაო ხსნარით	-(3)	3(1)
		2.8-4.0	თუთა (ახალგაზრდა პლანტაციები)	“	“	-(4)	3(1)
		1.5-2	დეკორა-ტიული კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქეები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	-(2)	3(1)
		12-15	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(3)	3(1)

მუხლი 15. თესლის შესაწამლი ინსექტიციდები და ფუნგიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	მანველები, დაავადება	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1.	ინსექტიციდები:						
ა)	გორტკა წდფთშ 70 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1) „საფა ტარიმ ა.ს. თურქეთი	7,5	შაქრის ჭარხალი	ტკაცუნები ღრაქები მავთულა ჭიები მრავალფეხა ჭარხლის ჭველებრივი	თესლის თესვისწინა შეწამლა. 15-20 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	

	1007			რწყილი ბოლოფეხიანები			
		2	ხორბალი, ქერი	პურის ბზუალა	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 5-8 ლ წყალი/ტ თესლზე „	-(1)	-(1)
		0,3 0,15	კარტოფილი	ტკაცუნები ღრაჭები კოლორადოს ხოჭო	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		5	სიმინდი	ტკაცუნები ღრაჭები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
ბ)	ეფდალ იმიდრიდი 600 სკ 600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი) (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1061	15	შაქრის ჭარხალი	ტკაცუნები ღრაჭები მავთულა ჭიები მრავალფეხა ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი ბოლოფეხიანები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი /ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		0,35 0,15	კარტოფილი	ტკაცუნები ღრაჭები კოლორადოს ხოჭო	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		6	სიმინდი	ტკაცუნები ღრაჭები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ ტ თესლზე	-(1)	-(1)
გ)	მატადორ გრანდი, სდკ 200+100+100 გ/ლ (იმიდოკლოპრიდი + მეტალაქსილი +ციმოქსანილი გ/ლ) (1) შპს „კომპანია „უკრაინა“ უკრაინა შპს „გეოუკრაინა“ საქართველო 1023	1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ზუგრები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
დ)	პონჩო სდკ 600 600 გ/ლ (კლოთიანიდინი) (1) „ზაიერი აგ“ გერმანია 941	4,0 7,5-10,0	სიმინდი	რუხი სახრეთის წვრივგრძელა მავთულა ჭიები დასავლეთის სიმინდის ხოჭო	თესლის თესვისწინა შეწამვლა	-(1)	-(1)
2.	ფუნგიციდები						
ა)	ალიანსი, დს 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) „ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.“ თურქეთი 608/13	1	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის	“	-(1)	-(-)

				სიდამპლე, თესლის ობი			
		0.75-1	შვრია	ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	“	-(1)	-(-)
		1	ჭვავი	ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	“	-(1)	-(-)
ბ)	ევდალ დინეჟსი, ფთშ 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 999	1	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1.5	ქერი	მტვრიანა, მაგარი, ქვა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)
		0,75-1	შვრია	ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	“	-(1)	-(-)
		1	ჭვავი	ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	“	-(1)	-(-)
		2	სიმინდი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
გ)	კონილი, ფთშ 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) “საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი	1.5-2	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
	529/09/15	1.5-2	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)
დ)	მატადორ გრანდი, სდკ 200+100+100 გ/ლ (იმიდოლოპრიდი + მეტალაქსილი +ციმოქსანილი გ/ლ) (1) შპს „კომპანია „უკრაინა უკრაინა შპს „გეოუკრაინა“	1	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)

	საქართველო 1023						
ე)	მაქსილი-8, სფ 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) “სტოქტონ აგრიმორი აგ” შვეიცარია 587	1.5-2	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი	მტვრიანი და მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინტოსპორი ოზული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი, ნაცარი	თესლის შეწამვლა მშრალი მეთოდით	-(1)	-(-)
ვ)	სონფიქსი 1 ფთშ 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) საგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 1001	1,5	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინტოსპორიოზ ული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
ზ)	ტეზიკური ფთშ 060, ფთშ (სკ) 60 გ/ლ (ტეზიკონაზოლი) (თ) “საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი 666/14	0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- ტოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე- ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე (5ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		0.4	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.4	შვრია,ჭვავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)

მუხლი 16. ბიოლოგიური ინსექტიციდები და ფუნგიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯ-ვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელ ი ობიექტი	მავნებელი, დაავადება	დამუშავების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (დამუშავების ჯერა-დობა)	დამუშავებუ ლ ფართობზე ხელით (მექანი- ზირებუ-ლი) სამუ-შაობის დაწყე-ბის დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1.	ინსექტიციდები:						
ა)	აცენტე, კკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1)	0.75-1.5	ვაშლი, მსხალი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენალმეები ფსილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების	7(1-2) 7(1-3)	2(1)

	„სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”			არაფარდი პარკხვევია	გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ		
	თურქეთი 1093	0.6-1.2	ვაზი	ტკიპები ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	7(2-3) 7(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით , პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (I ასაკის მატლები)	7(1-2)	2(1)
		0.3-0.5	კომბოსტო	ჩრჩილი თეთრულები კომბოსტოს ხვატარი ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნებისას, კვერცხდების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისამებრ	5 (1-2)	2 (1)
		0.6-1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I ხნოვანების	1(2)	1(-)

					მატლების წინააღმდეგ, 50% გამოსული კვერცხებიდან		
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ბახჩის ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14-დღიანი ინტერვალით	5(2) 5(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ბახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	5(1-2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	“	5(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	“	7 (1-2)	3(-)
		1-1.5 0.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი) ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	7(3)	3(-)
ბ)	გრინ გარდ სკ პრემიუმი, სკ 100 გ/ლ (Metarhizium acridum Fl- 985) „ბასფ აგრიკალჩერალ სპეციალისტის ლიმიტედ“- დიდი ბრიტანეთი 1045	0.5	საძოვრები, სათიბები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენისა და განვითარებისას, კალიების დაფრთიანებამდე. ხარჯვა – 400 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
გ)	ტორპედო 18, ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (I) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 609/13	1-1.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	3(3)	3(-)
		0.5	ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	“	L”	3(3)	3(-)
		0.75-1.5	ვაშლი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2(1-3)	2(1)
		0.75-1.5	მსხალი	ტკიპები, ფსილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	2(1-2)	2 (1)

					მავნებლების გამოჩენისთანავე		
		0.3-0.5	კომბოსტო	ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნების ას, კვერცხდების გამოჩენისთანავე	2 (1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	“	თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2 (1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	“	ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისამებრ	2 (1-2)	2(1)
		0.6-1.2	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით	2(2-3)	2(1)
		0.6-1.2	“	ყურმის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვრის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	ფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	ერუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (სასაკის მატლები)	2(1-2)	2 (1)
		0.6-1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ, 50% გამოსული კვერცხდებიდან	1(2)	1(-)
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	3(2)	3(-)
		0.3-1.2	“	ბახჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14-დღიანი ინტერვალით	3(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ბახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების	3(1-2)	3(-)

				მენადმეები	გამოჩენისთანავე		
		0.5-1.2	ხენდრო	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	“	2(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები, ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	“	3 (1-2)	3(-)
დ)	ფორეი 76 ბ, სკ ბა-16700 აე/მგ (Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki მტამი ABTS-351, სპოროვან- კრისტალური კომპლექსი) “ვალენტ ბიოსაიენსეს LLC (აშშ)” აშშ 199/08/13	1,5-2 ,5	წიწვოვნები და ფოთლოვნები, მერქნიანი მცენარეები (ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, თუთა, ალუბალი, ბალი, თხილი)	ოქროკუდა ჩრჩილები	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 - 10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		1.5-2,5 (ა) 1,5-2,5 (ა)	ტყის მერქნიანი მცენარეები , თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	ამერიკული თეთრი პეპელა არაფარდი პარკიხვევია	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5- 10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		1.5-2 ,5 (ა)	წიწვოვნები	აღმოსავლური რგოლური პარკიხვევია ფიჭვის პარკიხვევია	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 -10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		1,5-2,5 (ა) 1.5-3 (ა) 1,5-2,5 (ა)	მუხა თელა	მუხის ფოთლიხვევია მზომელა თელის მზომელა ხეხილის ფოთლიხვევია	მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 - 10 დღიანი ინტერვალით მესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 - 10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2) - (1-2)	5(1) 5(1)
		1,5-2	ტყის სანერგეები, დეკორატიული მცენარეები	ფოთლის და წიწვის მრღნელი მავნებელთა კომპლექსი	”	-(1-2)	5(1)
		1.5-3 (ა)	ქარსაფარი ზოლის მცენარეები,	მრღნელი მავნებელთა კომპლექსი	”	-(1-2)	5(1)
		1,5-2,5	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ქერცლფრთიანი მწერები	”	-(1-2)	5(1)
2.	ფუნგიციდები:						

მუხლი 17. ჰერბიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელ ი ობიექტი	სარეველა მცენარე	დამუშავების ხერხი, დრო, დამუშავების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (დამუ- შავების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანი- ზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	აისი 642 წდგრ (დიკამბა 609 გ/კგ +რიმსულფურონი 32, 53 გ/კგ) (თ) „ვადერ ალიანსი ლტდ“ დიდი ბრიტანეთი 1127	310 გ/ჰა- 385 გ/ჰა	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ფართოფოთლია ნი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის 2 -6 ფოთლის ფაზაში და სარეველების აღმოცენების ადრეულ (2 ფოთლის)ფაზაში. ხსნარის ხარჯვა – 200-600 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
2	ალიონი სკ 500, კს 500 გ/ლ (ინდაზიფლამი) (თ) „ბაიერ აგ“ გერმანია 1081	0, 15	ვაშლი, მსხალი, ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი, გარგარი, ალუბალი, ნუში, თხილი, ციტრუსი ვაზი	ერთწლიანი ორლებნიანები	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე (კულტურის დაცვით). ხარჯვა – 100 ლ/ჰა. აღმოცენებულ სარეველებზე მოქმედებს მხოლოდ კომბინაციაში ბასტა 150 წზ-თან ან გლიფოსატთან იგივე ხარჯვის ნორმებში	20(1) 14(1)	7(3)
		3-3, 3	სოიო		„	-(1)	7(3)
		1, 7-2, 5	ლობიო ცერცვი მწვანე ლობიო ბარდა		„		
		1, 5-2, 5	სტაფილო		„	-(1)	7(3)
		2-2, 5	კარტოფილი	„	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე, კულტურის დარგვის, დაფარცვის შემდეგ. ხარჯვა – 250-600 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		2-2, 5	კამა	„	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე, კულტურის დათესვის შემდგომ ან გადარგვამდე. ხარჯვა – 250-600 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
		2, 5	თამბაქო		ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე, კულტურის გადარგვის	-(1)	7(3)

					შემდგომ სტადიაზე. ხარჯვა – 250-600 ლ/ჰა		
3	ალკანსე, კაპს 341 გ/ლ პენდიმეტალინი 298+კლომაზონი 43 გ/ლ (3) „ფმს ქემიკალ სპრლ“ ბელგია 1110	2,5	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები (მწყერფეხა, ბეგიაური, თივაქასრა, ლემა, ნაცარქათამა, ძალეფურძენა, დანდური, ძურწა, ღიჭა, ჯიჯილაყა, მატიტელა, წალიკა)	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე , კულტურის დათესვის შემდგომ სტადიაზე. ხარჯვა-250-600 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
4	ამეტრინი 500 სკ (პრომეტრინი 500 გ/ლ) (3) „ფადერ ალიანსი დიდი ბრიტანეთი 1128	2-3	ქინძი, ოხრაბუში, კამა, ნიახური, რელანი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ნათესების 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში შესხურება	28(1)	-(-)
		2.5-3, 5	სოიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(-)
		3	ლობიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	-(-)
		2-3, 5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	20(1)	-(-)
		1.5-3.5	სტაფილო	“	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, კულტურის აღმოცენებამდე. ან 1-2- ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	70(1)	-(-)
		2-3, 5	სიმინდი		ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, დათესვასთან ერთდროულად ან კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(-)
		2, 5-3	მზესუმზირა		ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(-)
5	არტისტი 41, 5 წდგრ 240 +175 გ/კგ (ფლუფენაცეტი+მე ტრიბუზინი) (თ), (3)	2-2, 5	სოია	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	- (-)
	„ბაიერ აგ“ გერმანია 1094	2-2, 5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე (მიწის	-(1)	7(3)

					შემოყრის შემდეგ)		
6	აფალონი 45, სკ 450 გ/ლ (ლინურონი) (თ) „ადამა აგრიქალა ბ.გ.“ ნიდერლანდები 616/13	1.5-2.5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი ფართოფოთლო ვანი სარეველები	ნიადაგის შესხურება კულტურის დათესვის დროს ან დათესვიდან 2-3 დღეში კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვის ნორმა 300-400 ლ/ჰა. არ არის მიზანშეწონილი გამოყენება იმ რაიონებში, რომლებიც ხასიათდებათ უხვი ნალექებით	-(1)	-(3)
		2-3	სოია სიმინდი მზესუმზირა	“	“	-(1)	-(3)
		1.5-2	ლობიო	“	“	-(1)	-(3)
		1-1.5	ხახვი ნიორი	“	“	-(1)	-(3)
		1.5-2.5	სტაფილო ოხრახუში ნიახური ქინძი	“	“	-(1)	-(3)
7	ბრეის სუპერი, ეკ 125 გ/ლ (ფლუაზიფოპ-პ- ბუთილი) (3) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 610/13	0.75-1.5	სოიო, საკვები პარკოსნები, შაქრის, სუფრის ჭარხალი, პამიდორი სათესი და სარგავი, კარტოფილი, კომბოსტო, ხახვი, მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	- (1)	7 (3)
		0.75-1	კიტრი	ერთწლიანი მარცვლოვნები	“	20 (1)	7 (3)
		0.75-1	ლობიო, ბარდა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	“	33 (11)	7 (3)
		1.5-2	სოიო, საკვები პარკოსნები, შაქრის, სუფრის ჭარხალი, პამიდორი სათესი და სარგავი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები (მხოხავი ჭანგა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას მიუხედავად კულტურული მცენარის განვითარების ფაზისა	- (1)	7 (3)
8	ბუქტრილ უნივერსალი 560 ეკ 280+ 280 გ/ლ (ბრომოქსინილი ოქტანოატ/ჰექტანოა ტ+ 2, 4 დ 2- ეთილჰექსილის ეთერი) (თ) “ზაიერი აგ.” გერმანია 1113	0, 8-1	სიმინდი	ერთწლიანი (ჯინჯლაყა, წიწმატურა, მატიტელა, ბოლოკა, ღიჭა, მინდვრის მდოგვი) და მრავალწლიანი ორლებნიანები (ნაცარქათამა, ხვართელა, შვიტა, ყაყაჩო, ძაღლყურძენა, ცერცველა, მ.შ. 2, 4დ-ს მიმართ	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში ხარჯვა – 100-200 ლ/ჰა	-(1-2)	10(4)

				გამძლე)			
		1, 0	ხორბალი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანები (გარდა სოსანი, ჟუნჭრუკი, წიწმატელა)	ნათესების შესხურება მარცვლის რმისებრი სიმწიფიდან მარცვლის სრულ სიმწიფემდე	-(1-2)	10(4)
9	გეზაგარდი, კს 500 გ/ლ (პრომეტრინი) (3)	2-3	ქინძი, ოხრახუში, კამა, ნიახური	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ნათესების 1-2 წამდვილი ფოთლის ფაზაში შესხურება	28(1)	-(-)
	“სინგენტა აგრო აგ” შვეიცარია 320/04/09/14	2.5-3	სათესლე ბარდა, ნიორი მზესუმზირა	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(-)	-(-)
		2.5-3.5	სოიო	“	“		
		3	ლობიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	-(-)
		2-3.5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე.	20(1)	-(-)
		1.5-3	სტაფილო	“	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, კულტურის აღმოცენებამდე. ან 12-წამდვილი ფოთლის ფაზაში.	70(1)	-(-)
		2-3.5	სიმინდი		ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, დათესვასთან ერთდროულად ან კულტურის აღმოცენებამდე.	-(1)	-(-)
10	დიკოპურ ტობი, წხ 464 გ/ლ (2.4 დ მჟავა 344 + დიკამზა მჟავა 120) (3) “ნიუფარმი გმზხ და კო კგ” ავსტრია 596/13	0.6-0.8	საშემოდგომო ხორბალი ჭვავი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლო ვანი სარეველები ბუჩქისებრთა და ზაფხული ერთწლიანი გართხუმი სარეველები	ნათესების შესხურება ადრე გაზაფხულზე კულტურის აღერების ფაზაში მილში გასვლამდე	-(1)	7(3)
11	ეფდალ იზოფოსატი 36 წხ 360 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	4	ხეხილი ვაზი ციტრუსი თხილი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
	თურქეთი 946	13-20	სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები	შესხურება სარეველებზე აქტიური ზრდის ფაზაში	-(1)	7(3)
		13-14	გზები,	ბუჩქები და	შესხურება ვეგეტირებულ	-(1)	7(3)

			რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, მინდვრის პირები	ხეები	სარეველებზე (კულტურის დაცვით)		
12	ვალსაგარდ ექსტრა, კვ 840+40 გ/ლ (აცეტოქლორი+ანტი დოტი) (თ) “სტოქტონ კროპ პროტექშენ აგ “ შვეიცარია 644/13	2-2.5	სიმინდი სამარცვლე	ერთწლიანი მარცვლონები და ზოგიერთი ორლებნიანები	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე (ჩაკეთებით სინესტის ნაკლებობისას) ან კულტურის აღმოცენებამდე)	-(1)	-(4)
		2-2.5	სიმინდი მწვანე საკვებად, სასილოსე და გადამუშავების სხვა პროდუქტებისა ვ	ერთწლიანი მარცვლონები და ზოგიერთი ორლებნიანები	“	70 (1)	-(4)
		1.5-2	სოია მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლონები და ზოგიერთორლე ბნიანები	“	-(1)	-(4)
13	ზეგრანი 350 სე 100+250 გ/ლ (ბრომოქსინილი+ ტერბუტილაზინი) (თ) “ნუფარმ გმზხ და კო. კვ ავსტრია 1097	1,5-2	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანები (მ.შ. 2,4დ-ს მიმართ გამძლე)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში	-(1)	10(4)
14	კაპტორა, წხ 15+33 გ/ლ (იმაზაპირი+იმაზამო კსი) (თ), (3) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1098	1-1.2	მზესუმზირა (კაპტორას მიმართ გამძლე ჰიბრიდები)	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანები (მ.შ. კელაპატრა)	ნათესების შესხურება კულტურის 4 -6 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების ადრეულ სტადიებზე. ხარჯვა 200- 400 ლ/ჰა	-(1)	-()
15	კოკო გოლდი, სგ 500 გ/კვ (ატრაზინი 333+პრომეტრინი 167) (3) “აგრიკო გრურ ლტდ”	4-6	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, დათესვასთან ერთდროულად ან კულტურის აღმოცენებამდე.	-(1)	-()

	ბულგარეთი 733/14						
16	ლენტეშული დ, წე 687 გ/ლ (2,4-დ 2 ეთილ- ჰექსილეთერი) (თ), (4) “ნუფარმი გმზხ და კო კგ” ავსტრია 276/04/09/14	0.7-1.0	ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
	ჰექსილეთერი) (თ), (4) “ნუფარმი გმზხ და კო კგ” ავსტრია 276/04/09/14	0.8-1.2	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	-(7)
17	პაიამინი 500 წხ 500 გ/ლ (2,4-დიმეთილამინის მარილი) (თ), (3) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1083	1.6-3,0	საგაზაფხულო და სამემოდგომო ხორბალი, შვრია, ჭვავი. ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
		2,0-2,5	სიმინდი	“	ნათესების შესხურება 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)
18	პრიმექსტრა გოლდი, სკ 400+ 320გ/ლ (მეტოლაქლორი + ატრაზინი) (თ) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ “ შვეიცარია 316 /08/12	2-3.5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი	ნიადაგის შესხურება თესვამდე (ჩათოხნით 5 სმ-ზე ან მის გარეშე), თესვასთან ერთად ან კულტურის აღმოცენებამდე შესაძლებელია ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზამდე	-(1)	-(7)
19	პრომე გოლდი, სფ 500 გ/კგ (პრომეტრინი) (3) “აგრიკო გრუპ ლტდ” ბულგარეთი 736/14	2.5-3	სათესლე ბარდა, ნიორი მხესუმხირა	ერთწლიანი ორლებნიანი და მაცვლოვნები	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(7)
		2.5-3.5	სოიო	“	“		
		3	ლობიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	-(1)
		2-3.5	კარტოფილი	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე.	20(1)	-(1)
		1.5-3	სტაფილო	“	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, კულტურის აღმოცენებამდე. ან 12- ნამდვილი ფოთლის	70(1)	-(1)

					ფაზაში.		
		2-4	სიმინდი		ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, დათესვასთან ერთდროულად ან კულტურის აღმოცენებამდე.	-(1)	-(1)
20	პრომოტრინი, სფ 500 გ/კგ (პრომეტრინი) (3) "შარდა კროპქემ ლიმიტედ" ინდოეთი 717/14	2.5-3.5	სათესლე ბარდა, ნიორი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვნები	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(1)
		2.5-4	სოიო	"	"		
		3.5	ლობიო	"	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	-(1)
		2-4	კარტოფილი	"	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე.	20(1)	-(1)
		1.5-3.5	სტაფილო	"	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, კულტურის აღმოცენებამდე. ან 12-ნამდვილი ფოთლის ფაზაში.	70(1)	-(1)
		2-4	სიმინდი		ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, დათესვასთან ერთდროულად ან კულტურის აღმოცენებამდე.	-(1)	-(1)
		2.5-4	სოიო	"	"		
21	რაუნდაპი ექსტრა, წხ 540 გ/ლ (გლიფოსატი კალიუმის მარილი, 663 გ/ლ მარილის მიხედვით) (თ), (3) „მონსანტო იუროპ ს.ა.“	1.5-2,0 2,5-4,0	თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი ციტრუსი ვაზი თხილი (მინ. 3 წლის ასაკის ნარგავები)	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით), ხარჯვა-150-200 ლ/ჰა	-(2)	-(3)
	ბელგია 981	1.5-2,5 2,5-4,0	სათოხნი კულტურები (სიმინდი , სორგო, პარკოსნები, შაქრის და სუფრის ჭარხალი, მზესუმზირა, რაფსი, თამბაქო, კომბოსტო, პამიდორი, კიტრი, სტაფილო, კარტოფილი)	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის დარგვამდე ან დათესვამდე. ხარჯვა-150-300 ლ/ჰა	-(2)	7(3)

			ნამჯა				
		2.5-4,0	საშემოდგომო ხორბალი საშემოდგომო და საგაზაფხულო ქერი	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, მორიგე კულტურის დათესვამდე 3-4 კვირით ადრე. ხარჯვა-150-250 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		0,3-0,4 ან 0,15%	იონჯა	აბრეშუმას სახეობები	ნათესების შესხურება მოთიბვის 5-7 დღის შემდეგ. ხარჯვა-150-250 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		3.5-4,5 3,,3	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, აეროდრომები, დამბები, რკინიგ ზის და გზის პირები, მინდვრის ნაპირები, სასაფლაოები წყლის არეები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩკოვანი მცენარეები წყალში მზარდი სარეველები	სარეველების შესხურება მათი აქტიური განვითარების პერიოდში, ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(2) -(1)	7(-)
		2,5-4,0	სათიბ- სამოვრები გაზონები	არასასურველი სარეველები	სამოვრების აღდგენის და მოხვნის წინ. ხარჯვა-250- 300 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		2,5-4,0	სატყეო მეურნეობები, ფოთლოვნები და წიწვიანები	არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩკოვანი მცენარეები	დარგვამდე 1-2 კვირით ადრე. ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		2,5-4,0	სატყეო მეურნეობები, სანერგეები, ამონაყარი, ნაძვისა და ფიჭვის ტყე	არასასურველი ბალახოვანი მცენარეები და ბუჩკები	2 წელიწადში დარგვის შემდეგ . ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(1)	7(-)
		2,5%	სატყეო მეურნეობები, ხეების გადანაჭრები	ახალი ამონაყარი	ახალი ამონაყარი. ხარჯვა- 300-400 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		1.5-2,0 2,5-4,0	დასახლებული პუნქტები, პარკები, სკვერები, ბულვარები, ტრამვაისა და რკინიგზის გზები, სამრეწველო და სხვა ობიექტების სანიტარულ- დამცავი ზონები	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები არასასურველი ბალახოვანი და ბუჩკოვანი მცენარეები, ხეები	ვეგეტირებული სარეველების და არასასურველი მცენარეების შესხურება . ხარჯვა-250-300 ლ/ჰა	-(2)	7(-)
		1,3	მარწყვი	გადაზრდილი სარეველები	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ.	-(2)	7(-)
22	სამსონი ექსტრა 6 ზდ	0,75	სიმინდი (მარცვალი)	მრავალწლიანი მარცვლოვანი	შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში და	-(1)	7(3)

	(თ), (3) “სერექსაგრი ზირაატ ქიმია სანაი ვე ტიკარეტ	4-6		მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი			
	ლტდ. სტი « თურქეთი 844	2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1)	7(3)
		6	მინდვრები, რომლებიც განკუთვნილია საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლოვნების დასათესად	ერთწლიანი , მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	სარეველების შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ მომდევნო კულტურების თესვამდე 3-4 კვირით ადრე	-(1)	7(3)
		1-1,5/1000 მ2	სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები	შესხურება სარეველებზე აქტიური ზრდის ფაზაში	-(1)	7(3)
		1,0/1000 მ2	გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპ ორტები	ბუჩქები და ხეები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		1.5-3	ნოირი		შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში		
26	სვიფტი, წბ 100 გ/ლ (იმაზეტაპირი) (4) „ლიდს ლიფესიენს ლიმიტედ“ დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 1125	1,5	სოიო ლობიო	ერთწლიანი , მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	დამუშავება კულტურის 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში და სარეველების განვითარების 2-3 ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა -250-300 ლ/ჰა. სვიფტის გამოყენების შემდეგ არ შეიძლება სულფონილმარდოვანას ჯგუფის ჰერბიციდების გამოყენება. არ გამოიყენება კომბინირებულ ნაზავებში მარცვლოვანი სარეველების საწინააღმდეგო ჰერბიციდებთან	-(1)	-(-)
27	ტანგრა, კვ 125 გ/ლ (ფლუაზიფოპ-პ- ბუთილი) (4) “აგრიკო გრუპ ლტდ“ ბულგარეთი 737/14	0.75-1.5	სოიო, საკვები პარკოსნები, შაქრის, სუფრის ქარხალი, პამიდორი სათესი და სარგავი, კარტოფილი, კომბოსტო, ხახვი, მზესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	- (1)	7 (3)
		0.75-1	კიტრი	ერთწლიანი მარცვლოვნები	“	20 (1)	7 (3)

		0.75-1	ლობიო, ბარდა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	“	33 (11)	7 (3)
		1.5-2	სოიო, საკვები პარკოსნები, შაქრის, სუფრის ჭარხალი, პამიდორი სათესი და სარგავი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები (მხოხავი ჭანგა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას მიუხედავად კულტურული მცენარის განვითარების ფაზისა	- (1)	7 (3)
28	ტოკტა სუპერი, ეკ 50 გ/ლ (კვიზალოფოპ-ეტილი) (4) "საფა ტარიმი ა.ს." თურქეთი 672/14	0,75-1	შაქრის და სუფრის ჭარხალი, მზესუმზირა, კარტოფილი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, სოიო, პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, მინდვრის სორგო, ძურწა)	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზიდან, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1-1,5	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას, მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1,25-1,75	ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ჭანგა მხოხავი)	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე კულტურის დაცვით	-(1)	-(-)
29	ტოპიკი 80 ეკ 80+20 გ/ლ (კლოდინაფოპ-პროპარგილი+კლოკვინტოსეტ-მექსილი) (თ), (4)	0.3-0.4	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	შვრიუკა	ნათესების შესხურება სარეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში	-(1)	-(-)
	„სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1254	0.5-0.75	“	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა)	ნათესების შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მილში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)

მუხლი 18. მცენარეთა ზრდის რეგულატორები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	დანიშნულება	დამუშავების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (დამუშავების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებულ) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7

1	ბიორაგი, ს 0.12 გ/ლ (ლუკრეაზინი)	12.5 მლ/კგ	მზესუმზირა	მოსავლიანობისა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება	თესლის თესვისწინა (4-5 დღით ადრე) დამუშავება 12 სთ-ის განმავლობაში	-(1)	-(-)
	ი/მ “რამაზ გახოკიძე” საქართველო 455/12	12.5 მლ/კგ	კიტრი, პამიდორი, ბაღჩეული კულტურები	„	თესლის თესვისწინა (4-5 დღით ადრე)დამუშავება 15 სთ-ის განმავლობაში	-(1)	
		„	ხორბალი სიმინდი	„	თესლის თესვისწინა (4-5 დღით ადრე)დამუშავება 10-24 სთ-ის განმავლობაში	-(1)	
		„	ლობიო	„	თესლის თესვისწინა (4-5 დღით ადრე)დამუშავება 5 სთ-ის განმავლობაში	-(1)	
		20 მლ/კგ	კარტოფილი	„	თესლის თესვისწინა (4-5 დღით ადრე)დამუშავება 1,5 სთ-ის განმავლობაში	-(1)	
		-	ჩითილები სხვადასხვა კალმები	ფესვწარმოქმნის სტიმულირება	ჩითილების დამუშავება პრეპარატის ხსნარით (100 მლ/ლ განზავებით)	-(1)	
		50-250 მლ/მირზე	ვაზი, ციტრუსები, ვერცხლისფერი ნაძვი	ფესვწარმოქმნის სტიმულირება, ნაყოფმსხმოიარობი ს დაჩქარება	დარგვის წინ 24 სთ-ის განმავლობაში კალმების დამუშავება პრეპარატის ხსნარით (100 მლ/ლ განზავებით) დარგვის წინ 72 სთ-ის განმავლობაში	-(1)	
		12.5 მლ/კგ	სოიო	მოსავლიანობის და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება	თესლის თესვისწინა დამუშავება 3 სთ-ის განმავლობაში	-(1)	
2	სტაბილანი, წზ 750 გ/ლ (ქლორმეკვატქლორიდი) “ნიუფარმი გმზხ და კო კვ”	1- 1.5 ლ/ჰა	საშემოდგომო ხორბალი	ჩაწოლის წინააღმდეგ	ნათესების შესხურება ბარტყობის ფაზის დასასრულში აღერების ფაზის დაწყებამდე. ხარჯვის ნორმა 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
	ავსტრია 538/09/14	0.5-1	მარცვლოვანი კულტურები	“	შესხურება მასიური აღმოცენების ფაზაში. ხარჯვის ნორმა 200-500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
		0.4-0.8 0.1-0.2	მაღალმოსავლიანი ხორბლის ჯიშები	“	შესხურება მასიური აღმოცენების ფაზაში. შესხურება აღერების ფაზაში. ხარჯვის ნორმა 200-500 ლ/ჰა	-(2)	-(-)
3	ფიტომაგი, ფ 30 გ/კგ (1- მეთილციკლოპროპე ნი) შპს “ფიტომაგინტერი” რუსეთის ფედერაცია 885	0,05-0,2 გ/ მ3 (0,7-1 გ/ტონაზე)	ვაშლის ნაყოფი	ნაყოფში არსებული ეთილენის ინჰიბირება, მოსავლის აღების შემდგომ ნყოფის დამწიფებისა და დაბერების პროცესის დაბლოკვა, ჩხილის კანის ფერის, სიმკვრივისა და სიმჟავის შენარჩუნება, შენახვის ვადების გახანგრძლივება	გამოიყენება ხილის დაკრეფის შემდეგ არა უგვიანეს 2-7 დღისა (ვაშლის ნაყოფის ფიზიოლოგიური სიმწიფე) სასაწყობო პირობებში სამაცივრო ჰერმეტიკულ კამერებში. ხილის მოთავსებამდე კამერებს აცივებენ 1-2ი C ტემპერატურამდე. ნაყოფების დამუშავებისათვის გამოიყენება სათანადო გენერატორი, რომლის 5- ლიტრიან ავზში ემატება წყალი და ნატრიუმის	-(1)	-(-)

					ჰიდროქსიდის სათანადო რაოდენობა 0,2%-იანი ხსნარის მისაღებად. ავზში შეაქვთ პრეპარატი ფიტომაგი, რთავენ გენერატორს და დაუყონებლივ ტოვებენ კამერას, ჰერმეტიკულად ხურავენ. ხილის დამუშავების ხანგრძლივობა-24 საათი . Pპროცესის დასრულების შემდეგ ხდება კამერის განთავსება 15 წუთის განმავლობაში, შემდეგ რთავენ შენახვის რეჟიმს		

შენიშვნა: კატალოგის მეორე თავში მოყვანილი პრეპარატების იმპორტი არ დაიშვება მათი ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებამდე.

თავი III. ჰიგიენური ნორმატივები

მუხლი 19. პირობითი აღნიშვნები

1. ა – პრეპარატი ხასიათდება ალერგიული მოქმედებებით.
2. დდსდ – დროებითი დასაშვები სადღეღამისო დოზა.
3. დმდდ – დროებითი მაქსიმალურად დასაშვები დონე.
4. დსდ – დასაშვები სადღეღამისო დოზა.
5. უჯ – უჯრედების.
6. წ.მ. – წყალმიგრაციული მალიმიტირებელი მაჩვენებელი.
7. ჰმ – ჰაერმიგრაციული მალიმიტირებელი მაჩვენებელი.
8. მდდ – მაქსიმალურად დასაშვები დონე.
9. მე – მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია.
10. ად – არ დაიშვება კონტროლის მეთოდის მგრძნობელობის გათვალისწინებით.
11. ან – არ არის ნორმირებული მოცემულ გარემოში.
12. ნა – ნორმირება არ არის საჭირო მოცემულ გარემოში.
13. ზსუდ-ზემოქმედების საორიენტაციოდ უსაფრთხო დონე.
14. სდკ – საორიენტაციოდ დასაშვები კონცენტრაცია.
15. ზდკ – ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია.
16. სდდ – საორიენტაციოდ დასაშვები დონე.
17. საერთ. – საერთო სანიტარული მალიმიტირებელი მაჩვენებელი.
18. ორგ. – ორგანოლექტიკური მალიმიტირებელი მაჩვენებელი
19. ს.-ს. – საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაცია.
20. ს.-ტ. – სანიტარულ-ტოქსიკოლოგიური მალიმიტირებელი მაჩვენებელი.
21. ტრ. – ტრანსლოკაციური მალიმიტირებელი მაჩვენებელი.
22. ფიტ – ფიტოსანიტარული მალიმიტირებელი მაჩვენებელი.
23. (+)– პრეპარატი საშიშია კანზე მოხვედრისას
24. აზ -აეროზოლი.
25. ო+აზ -ორთქლი+აეროზოლი.

26. (++) –ნივთიერებები, რომელთანაც მუშაობისას გამორიცხული უნდა იყოს კონტაქტი სუნთქვის ორგანოებთან და კანთან.

27. დმდდ -დროებითი მაქსიმალურად დასაშვები დონე (*).

28. მდდი - მაქსიმალურად დასაშვები დონე იმპორტირებული პროდუქციისათვის (**).

29. დმდდი -დროებითი მაქსიმალურად დასაშვები დონე იმპორტირებული პროდუქციისათვის (**).

30.მრპ-მსხვილი რქოსანი პირუტყვი.

მუხლი 20. ჰიგიენური ნორმატივები

მე-2 გრაფაში მითითებულია მხოლოდ ის ნივთიერებები, რომელთა მიხედვით ხორციელდება კონტროლი. თუ ნივთიერება (გრაფა 2) წარმოადგენს ნარევი პრეპარატის ერთ-ერთ კომპონენტს, მისი სავაჭრო დასახელების შემდეგ (გრაფა 9) ფრჩხილებში მოყვანილია მეორე კომპონენტის რიგითი ნომერი (თუ კონტროლი ხორციელდება ორივე კომპონენტის მიხედვით). წილადის ნიშნამდე მოყვანილია ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზდკ), მის შემდეგ საორიენტაციოდ დასაშვები კონცენტრაცია (სდკ) ნიადაგისათვის, (სდდ) წყლისათვის ან ზემოქმედების საორიენტაციოდ უვნებელი დოზა (ზსდ) ჰაერისათვის. დროებით დასაშვები სადღეღამისო დოზა (დდსდ) და დროებით მაქსიმალურად დასაშვები დონე (დმდდ) აღნიშნულია ვარსკვლავით.

	მოქმედი ნივთიერება	დსდ (მგ/კგ ადამიანის სხეულის მასის)	ზდკ/სდკ ნიადაგში (მგ/კგ)	ზდკ/სდდ წყალ-სატევებში (მგ/დმ ³)	ზდკ/ზსუდ სამუშაო ზონის ჰაერში (მგ/მ ³) გამოყენებისას	ზდკ/ზსუდ ატმოსფერულ ჰაერში (მგ/მ ³) გამოყენებისას	მდდ პროდუქციაში (მგ/კგ)	პრეპარატის სავაჭრო დასახელება
N	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-მეთილციკლოპროპენი	0,0009	ნა	ნა	50,0	ნა	ვაშლი-0,01, ვაშლის წვენი-ნა	ფიტომაგი, ეიბიჯი სან
2	2,4-დ მჟავა	/0.01	0.1/(ტრ)	0.0002/(ს-ტ)	1.0/	/0.0001	პურეულის მარცვალი-2, 0, სიმინდი, , სორგო, ფეტვი (მარცვალი)-0.05, სორგო-0, 01***, სიმინდი (ზეთი)-0.1, ციტრუსები-1.0***, კენკრა და სხვა წვრილი ხილი, ბრინჯი აქერცლილი-0, 1***, ხილი (თესლოვანი), სოია (პარკი)-0, 01***, კარტოფილი, კაკალი-0, 2***, ხილი (კურკოვანი), მჟერის ლერწამი, სიმინდი ტკბილი სუფრის (მოხარშული ტარო)-0, 05***,წიწიბურა-0,05 რმე-0.01*, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვართა -5, 0***, კვერცხი, 0, 01***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0.2, ფრინველის ხორცი და	2,4-დ 500, დიალენი(51) , დიალენ სუპერი (51), ტრეზორი (186), დიკოპურ ტოპი (50) სანაფენი, 2,4 -დ დიმეთილამინის მარილი, დიამინი, დიკამინი დ, ვალსამინი (51), ჰექტაფერმინი, ამინოპელიკ სუპერი(51), ფენიქსი 60. ფენიქს გოლდი 72, გოლიაფი (51), ზესტ ამინი 500, ეფდალ დიმეტრინი, პაიამინი, დეამინი, კაილეო (42), ჰორმა (128), კორვეტი, პრიმო, კორუმა ვიდ კილურ, დისერბონ კნ (128), დუამინი

							სუბპროდუქტები-0, 05***, კარაქი-0.1*, ფქვილი, ბურღული -ნედლეულის მიხედვით*, მტკნარი წყლის თევზი -0.01*, დანარჩენი საკვები პროდუქტი – 0.0020.002	
3	2, 4 დ მცირედ-აქროლადი ეთერები 2.4. დ 2-ეთილჰექსილის ეთერი	ნა	ნა	ნა	0.5/	0.004/ (ს.ს.) 0,01/წმ	პურეულის მარცვალი-2, 0, სიმინდი, , სორგო, ფეტვი (მარცვალი)-0.05, სორგო-0, 01***, სიმინდი (ზეთი)-0.1, ციტრუსები-1.0***, კენკრა და სხვა წვრილი ხილი, ზრინჯი აქერცლილი-0, 1***, ხილი (თესლოვანი), სოია (პარკი)-0, 01***, კარტოფილი, კაკალი-0, 2***, ხილი (კურკოვანი), შაქრის ლერწამი, სიმინდი ტკბილი სუფრის (მოხარშული ტარო)-0, 05***, წიწიბურა-0,05 რმე-0.01*, სუბპროდუქტები მუძუმწოვართა -5, 0***, კვერცხი, 0, 01***, ხორცი მუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0.2, ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები-0, 05***, კარაქი-0.1*, ფქვილი, ბურღული -ნედლეულის მიხედვით*, მტკნარი წყლის თევზი -0.01*, დანარჩენი საკვები პროდუქტი – 0.002	ლევირატი ლენტემულ დ, ესტერონი, ამილინი, ესტერონი 600, ბალერინა (103 ¹), ეფდალ ულტრამიქსი (103 ¹) აგენტი(103 ¹), ესთეტი, კორვეტი (103 ¹), ქატენგი (103 ¹),
4	2 მეთილ-4-დიმეთილამი ნომეტილბენ-ზომიდაზოლ-5-ოლდიჰიდ-როქლორიდი	0.005/	/0.03	/0.03	/0.1	/0.002	სიმინდი, კიტრი –ან დანარჩენი საკვები პროდუქტი - 0.002	ამბიოლი
5	2-მეთილ-3-ბუტენ-2-ოლ	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	იპსოვიტი, სექსოვიტი
	Ampelomyces Quisqualis strain	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ოვნიერი
	Bacillus amyloliquefaciens, შტამი QST-713	ნა	ნა	ნა	20000 უჯ/მ³	0.005 მგ/მ³	ნა	სერენადე ასო
	Bacillus subtilis, შტამი ИПМ-215	ნა	ნა	ნა	20000 უჯ/მ³	0.005 მგ/მ³	ნა	ბაქტოფიტი, სკ
	Bacillus subtilis, შტამი 26-Д	ნა	ნა	ნა	20000 უჯ/მ³	0.005 მგ/მ³	ნა	ფიტოსპორინი-M
6	Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, (სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი და ეკზოტოქსინი)	ნა	ნა	ნა	20000 უჯ/მ³	0.005 მგ/მ³	ნა	ბიტოქსიზაცილინი, ბიკოლი
7	Bacillus thuringiensis var. kurstaki,	ნა	ნა	ნა	10 უჯ/მ³	3 X 105 უჯ/მ³	ნა	ლეპიდოციდი, ლეპიდოციდი CK-M, დიპელი 8L, ფორეი 76B, დელფინი, ლიპიდინი

	(სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი)							
8	Bacillus thuringiensis var.tenebrionis, (სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი კომპლექსი და ეკზოტოქსინი)	ნა	ნა	ნა	20000 უჯ/მ ³	0.005 მგ/მ ³	ნა	ნოვოდორი
9	Beauveria bassiana (კონიდიები)	ნა	ნა	ნა	0,3 მგ/მ ³	ან	ნა	ნოსტალჯისტი, ბიონსექტ 2, ზოვერ-ჯი
10	M-ოქსი 2, 6 ლუტიდინი	0.003	/0.1	0.02/ (ს.ტ.)	/0.8	/0.001	პამიდორი, კიტრი – 0.04	ივინი
	Pepino mosaic virus, შტამი CH2 ,იზოლატი 1906							PMV-01
11	Pseudomonas aureofacies	ნა	ნა	ნა	ან	ან	ნა	აგატ-25კ
12	Pseudomonas fiorecens, შტამი -33	ნა	ნა	ნა	2.5 10 ⁴	2.510 ³	ნა	პლანრიზი
13	Pseudomonas syringae	ნა	ნა	ნა	ან	ან	ნა	პენტაფაგი
14	Pseudomonas flourescens strain pf 1	ნა	ნა	ნა	ან	ან	ნა	ცედრიქსი
15	Steinernema carpocapsae	ნა	ნა	ნა	ან	ან	ნა	ნზკ
16	Streptomyces lavendulae , Streptomyces griseum	ნა	ნა	ნა	0.002	ან	0.05	ფიტოლაგინი 300
	Trichoderma Koningii შტამი B-7 MDI	ნა	ნა	ნა	ან	ან	ნა	ბიოკატენა
17	ავერსექტინი c	0.00016	/0.1	/0.3	/0.05	/0.002	კიტრი, პამიდორი, კარტოფილი, ხილი (თესლოვანი), მოცხარი,- 0.005, ხორცი -0.004 ,სუპროდუქტები -0.01, ქონი-0.024, რძე-0.001	ფიტოვერმი
18	აბამექტინი	0.002	/0.01	0.001/ (ს.-ტ.)	/0.05	/0.00004/	კიტრი-0.01, ხილი (თესლოვანი), პამიდორი-0,02, წიწკა, მ.შ. ტკბილი-0,02***, წიწკა ჩილი (გამხმარი)0,2***, ზადრიჯანი-0,01, კომბოსტო-0,01*,ციტრუსი-0,01***, ყურძენი-0.01, სვია ხმელი-0,1***, ნუში ჩენწოში-0,1***, კაკალი (ნუში-0,01***, სალათა ფოთლოვანი (ლატუკი)-0,05***, ზამბა (თესლი)-0,01***, ნესვი, გოგრა, საზამთრო-0,01***, მარწყვი-0,02***, კარტოფილი-0,01***, რძე (მრკ, თხის)-0,005***, სუპროდუქტები (თხის), ქონი, ღვიძლი (მრკ)-0,1***, თირკმელები (მრკ)-0,05***, ხორცი(მრკ, თხის)-0,01***	ვერტიმევი, ტორპედო, ალგამევი, ვერტამექტინი ფორტე, აგენტე, არვილმევი, კრაფტი 18, ეფდალ მექტინი, ობერონ რაპიდი (170), ვერტეკი, ტინა, ბერმექტინი, აბამექტი, დიკაპრიონი
19	აზოქსისტრობინი	0.03	/0.4	0.01/ (საერთ.)	/1.0	/0.01	ყურძენი-2,0, ღვინო-0.5, პამიდორი, კიტრი --3,0 , მარცვლეული -0.5, ხახვი-10,0, კარტოფილი 0,05, არტიშოკი, კომბოსტო	ქვადრისი, ქვადრის მაქსი (221), კონრადი, დორისი, აზოქსი, აფიქსი, როტუნდისი, კუსტოდია (173), ლაცერტა, ლაცერტა მაქს (60), როკ ენ როლ

							(ყველა სახეობის), ნიახური, ბრინჯი, წვრილი ხილი -5,0***, სატაცური, კაკალი-0,01***, ფისტა-1,0***, ნუში ჩენჩოში-7,0***, ბანანი, ხილი (კურკოვანი)-2,0***, სოია (მარცვალი), მზესუმზირა (თესლი), შტომი-0,5***, ბოსტნეული საკვები ბოლქვით, მარწყვი-10,0*** ხახვი-10,0, ციტრუსები-15,0***, ბამბა (თესლი), მანგო-0,7***, ბოსტნეული, პარკოსნები, სალათა(თავხვეულა, ფოთლოვანი)-3,0***, გოგრა, ბოსტნეული საკვები ტუბერით და ფესვებით-1,0***, კარტოფილი-1,0, სვია ხმელი, წიწაკა ჩილი ხმელი-30,0***, სიმინდი (ზეთი)-0,1***, პაპია, ვარდკაჭა-0,3***, არახისი-0,2***, რძე, კვერცხი, ფრინველის ხორცი, ფრინველის სუბპროდუქტები-0,01***, ძუძუმწოვართა ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-0,05***, რძის ცხიმი-0,03***, ძუძუმწოვართა სუბპროდუქტები-0,07***	(60), აზობინი,
20	ალუმინის ფოსფატი	3.0	/0.5	0.3/ (საერთ.)	2.0/	/1.0	ყურძენი-0.8, კიტრი-75,0, პამიდორი-100,0, ხახვი - 0.01, ყაზახი, ნესვი-0,3, კარტოფილი-0.2, პურეულის მარცვალი-0.4, ხმელი სვია -1.0, მარწყვი - 0.002 ვაშლი-0,2, ვაშლის წვენი- ად	ალიეტი, ევალი, მიკალი (221), ალუფიტი, პროფალიერი (215), პრევიკურ ენერჯი (150), მიკალ ფლემი (221), პოსეიდონი, ფოსბელ 80, ფოსბელ პლუსი (111), ფოსბელ ექსტრა (221, 235)
21	ალფა-პინენი	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ტომოვიტი
22	ამეტოკტრადინი	0,7	/1,0	0,05/ (საერთ.)	/1,5	/0,01	კარტოფილი 0,1, კიტრი- 0,5, ხახვი თავიანი-0,5, პამიდორი 2,0, ყურძენი- 5,0, ღვინო-1,0**, ყურძნის წვენი-ად	ორვეგო (57)
23	ამიდოსულფ ურონი	0.3	/0.25	0.003/ (საერთ.+ორგ.)	/1.0	/0.001	პურეულის მარცვალი-0.1, სიმინდი (მარცვალი) -0.5	გროდილ მაქსი (130)
	ამისულბრომი	0,1	ან	ან	ან	ან	ყურძენი 0,5, კარტოფილი- 0,05,პამიდორი-0,4, კიტრი- 0,01	ლიმაი
24	ამიტრაზი	0.01*	0.2/ (ტრ.)	0.05 (ორგ.)	0.5/	0.1/ (მ.-ე.) 0.01 (ს.-ს.)	თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კიტრი, პამიდორი- 0.5, ფოთოხალი-0.5***, ბამბა (თესლი)-0.5***, ბამბა (გაუწმენდავი ზეთი)-0.05,	მიტაკი

							თაფლი, სვია-0.2; ხორცი (მრპ-ს, ღორის)-0.05***, სუბპროდუქტები (მრპ-ს, ღორის, ცხვრის)-0.2***; რძე-0.01***; ცხვრის ხორცი-0.1***	
25	ამონიუმის გლუფოსინატი	0.02	/0.1	/0.01 (საერთ.)	/0.04	/0.002	ხეხილი, კენკროვნები, ციტრუსოვნები, ყურძენი, სტაფილო-0.2, კარტოფილი-0.5, მზესუმზირა (თესლი), რაფსი (მარცვალი), 5,0, წიწიბურა, ფეტვი, ხორბლეულის მარცვალი-0.4, მცენარეული ზეთები-0.4, პარკოსნები-3,0, ნუში, მოცხარი (წითელი, შავი, თეთრი)-0.5***, სატაცური,, ტროპიკული და სუბტროპიკული ხილი, კორნ-სალათა, თავიანი ხახვი, მაქრის ჭარხალი, რაფსისა და მზესუმზირის ზეთი არარაფინირებული, ბანანი-0.2***, სიმინდი, კაკალი-0.1***, კვერცხი, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0.05***, სუბპროდუქტები საკვები ძუძუმწოვართა და ფრინველის-0.1***, რძე-0.02***	ბასტა, ფასინეითი, ვისტა, ბასულთა, გალანტი
26	არაფარდი პარკხვევიას ბირთვული პოლიედრო-ზის ვირუსი	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ვირინ ენშ
27	ატრაზინი	0.0004	0.01/ (ფიტ.) 0.5/ (ტრ.)	0.002 (ს.-ტ.)	2.0/	0.0004	სიმინდი (მარცვალი)-0.03; ხორცი, კვერცხი-0.02; რძე-0.05	პრიმექსტრა (120), პრიმექსტრა გოლდი (120), კოკო გოლდი (148)
28	აცადარახტინი	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნიმ-აცალი, ნიმბეციდინი, ტერა ნიმის ზეთი
29	აცეტამიპრიდი	0.07	/0.6	0.02/ (საერთ.)	/0.2	/0.004	კიტრი, პომიდორი-0.3, კარტოფილი, პურეულის მარცვალი - 0.5, რაფსი (მარცვალი, ზეთი)-0, 1, ხილი (თესლოვანი)-0, 8*	აცე, მოსეტამი, ტემპი, გოლდპლანი, ეფდალ აფიტრინი, ესკაპე. პასკალი, ეჰედი (237), ადმიტი (105), როკეტი, არმორი (105). აგროპლანი, ანტიკლემშ მაქსი (143, 146), პოტეგონი
30	აცეტოქლორი	0.002	0.5/	0.003/ (საერთ.)	/0.5	/0.0005	სოიოს თესლი, მარცვალი, მზესუმზირა (თესლი), რაფსი (მარცვალი) -0,02, რაფსი (ზეთი)- 0.04, სოიო (ზეთი) - 0.04, სიმინდი - 0.03, მზესუმზირა (ზეთი) - 0.02	ტროფი, აცენიტი, ვალსაგარდ ექსტრა
31	ბენალაქსილი	0.07*	ან	ან	ან	ან	ყურძენი, ნესვი-0.3***; თავხვეულა სალათა-1.0***; ხახვი, კარტოფილი-0.02***; პამიდორი-0.2***; საზამთრო-0.1***	გალბენი მ-8-65 (113), ფანტიკი ფ (221)
	ბენთიავალიკარბ-იზოპროპილი	ან	ან	ან	ან	ან	ან	ვალბონი (111)

32	ბენომილი	0.02	/0.1	0.1/ (ს.-ტ.)	0.1/	0.01/	მარცვლეული, ბრინჯი-0.5, შაქრის ჭარხალი-0.1, მზესუმზირა (თესლი), კარტოფილი -0.1, ყურძენი (მარცვალი, წვენი), სოიო (ზეთი)-0.015, ზოსტნეული (კარტოფილის გარდა), ხილი (თესლოვანი და კურკოვანი)-0.075, კენკროვნები, სოიო (თესლი) -0.02	ბენომილი, ბენლატი, ფუნდაზოლი
33	ბენტაზონი	0.1	/0.15	0.01/ (ს.-ტ.)	5.0/	/0.01	სოიო (პარკოსნები, ზეთი), პურელის მარცვლოვნები, ბრინჯი-0.1, სორგი, კარტოფილი-0.1, მარცვლოვანი პარკოსნები (სოიოს გარდა)-0.2; მიწის თხილი-0.05***; თავიანი ხახვი, სელი (თესლი)-0.1***; სიმინდი (მარცვალი)-0.2; კვერცხი-0.05***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა), რძე-0.05***; სვია (ხმელი)-1.0*	ბაზაგრანი, პენტაგონი, ეფდალ როქსანი, რეინგრანი, პარდუსი, ბენტაგონი
34	ბეტაციფლუტრინი	0.01	/0.4	0.0005/ (საერთ.)	/0.1	/0.001	ხილი (თესლოვანი), კარტოფილი - 0.2, ხორბლეული, რაფსი (თესლი, ზეთი), კომბოსტო 0.1, ბარდა - 0.2*, შაქრის ჭარხალი-0.5, ყურძენი - 0.02*, ყურძნის წვენი - 0.002	ბულდოკი
35	ბიტერტანოლი	0.01*	ან	ან	ან	ან	ხილი კურკოვანი (ქლიავის გარდა)-1.0***; ბანანი, კიტრი-0.5***, პურელის მარცვალი, ; ხილი (თესლოვანი), ქლიავი (შავი ქლიავის გარდა)-2.0***პამიდორი-3.0***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა), რძე, ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.05***, კვერცხი, ცხოველური წარმოშობის ცხიმო - 0.05, ფრინველი (ხორცი, სუბპროდუქტები)-0.01***	ბაიკორი
36	ბიფენაზატი	0,01*	ან	ან	ან	ან	ბამბა (თესლი)-0.3***; ყურძენი, ხილი (თესლოვნები)-0.7***; ქიშმიში, წიწაკა ტკბილი, ხილი (კურკოვანი), მარწყვი -2.0***; კაკალი-0.2***; ნუში ნაჭუჭში-10,0***; ზოსტნეული საკვები ნაყოფებით, გოგროვნები, პამიდორი - 0.5***; წიწაკა ჩილი-3,0***, ხმელი სვია-20.0***, პიტნა-40,0***, ძუძუმწოვრების	აკრამაიტი

							ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა), რძის ცხიმო-0.05***; რძე, ფრინველი (ხორცი, სუბპროდუქტები)-0.001***; კვერცხი, ძუძუმწოვართა სუბპროდუქტები-0.001***	
37	ბიფენტრინი	0.015	/0.1	0.005/ (საერთ.)	/0.015	/0.0015	ბამბა (ზეთი)-0.015; ხილი თესლოვნები, (მსხლის გარდა)-0.04; მსხალი-0.5; ყურძენი-0.2; ციტრუსი-0.05***; პამიდორი, კიტრი-0.4; სიმინდი (მარცვალი)-0.05; შაქრის ჭარხალი-0.05; სიმინდი (ზეთი), მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.02; კომბოსტო-1.0; კარტოფილი-0.05; რაფსი (მარცვალი, ზეთი)-0.1; პურეულის მარცვალი-0.5; გაუცრელი ფქვილი ხორბლის-0.5***, ხმელი სვია-10.0***, ხენდრო-1.0***; ხორბლის ქატო გადაუმუშავებელი-2.0***; ხორბლის ფქვილი-0.2***; მრკ-ს ხორცი, ცხიმი; მრკ-ს რძე, თირკმელი, ღვიძლი; ქათმის ცხიმი, ხორცი, სუბპროდუქტები-0.05***; ქათმის კვერცხი-0.01***	ტალსტარი, პირინექს სუპერი (231), ინსაკარი, ანტიბრუმფი (231), ზონდერი, ჰაბლა, ტენჩანტ პოლიუსი (231),თეიქოფ, ფენდი,კურა-კურა, , ბატალიონი, ცეზარი, ზუფფალო (231), გლადიუსი, ბაიტი
38	ბოსკალიდი	0.04	/0.4	0.04 (საერთ.)	/1.0	/0.002	ხილი (თესლოვნები)-2.0; კარტოფილი-0.05; კიტრი, პამიდორი-3.0; ბოსტნეული საკვებფესვიანი და საკვებოლქვიანი (სტაფილოს გარდა)-2.0***; სტაფილო-2.0; ბანანი-0.6***; პურეულის მარცვალი-0.5***; კენკრა და სხვა წვრილი ხილი (ხენდროს და ყურძნის გარდა), შავი ქლიავი, წიწაკა ჩილე (ხმელი), ქიშმიში-10.0***; კომბოსტო (ყველა სახეობის), ბოსტნეული საკვებოლქვიანი (ხახვის გარდა), კივი-5.0***; თავიანი ხახვი, ყურძენი-5.0; ყავა (პარკოსნები), ხის კაკალი (ფისტას და ნუშის გარდა)-0.05***; ნუში ჩენჩოში-15.0***; ფოთლოვანი ბოსტნეული-30.0***; ნაყოფისმომცემი ბოსტნეული, გოგრა, მარცვლოვანი პარკოსნები (ლობიო, ბარდა), ხილი კურკოვანი (შავი ქლიავის გარდა), ხენდრო-3.0***;	კოლიისი (104), კანტუსი, სიგნუმი (142), სექშენი (142), ბელისი (142), ფემიდა

							ზეთოვანი კულტურების თესლი-1.0***; მზესუმზირა (თესლი), რაფსი (მარცვალი)-1.0; მზესუმზირა (ზეთი)-0.5; რაფსი (ზეთი)-0.2, ფისტა- 1.0***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-0.7***; ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.2***; ფრინველის ხორცი, კვერცხი, ქონი, სუბპროდუქტები-0.02***; რძე-0.1***; რძის ცხიმი- 2.0***	
39	ბროდიფაკუმი	ნა	ნა	0.0005/ (საერთ.)	/0.01 (ა)	/0.00016	ნა	კლერატი, კაპკანი, კილრატი
40	ბრომოქსინილი	0.001	/0.1	0.001/ (საერთ.)	/0.3	/0.001	პურეული (მარცვალი), ფეტვი, სიმინდი-0.05, ვაშლი, ალუბალი-0.03, კარტოფილი-0.01, რაფსი- 1.0, ატამი-0.2, კომბოსტო, პამიდორი, ბარდა -0.01, მზესუმზირა-0, 05	ემბლემი, ზეგრანი (175), ბუკტრილი უნივერსალი (2), ბუქტრილი
41	ბრომპროპილატი	0.03*	/0.05	0.05/ (საერთ.)	/0.1	/0.001	ყურძენი-2.0*; ციტრუსები, თესლოვანი ხილი-2.0; პარკოსნები (პარკი ან უმწიფარი თესლი)-3.0***; კიტრი, ნესვი, გოგრა- 0.5***, კურკოვნების ხილი (შავი ქლიავის გარდა), ხენდრო-2.0***; კენკრა- 0.05, ბამბა (ზეთი)-0.02*, თაფლი-0.02	ნეორონი, ფაქტორი
42	ბრომუკონაზოლი	0.01	/0.1	0.002/ (საერთ.)	/0.1	/0.005	ხორბლეული, ხილი (თესლოვანი), ყურძენი- 0.04; კენკრა-0.08	ვექტრა
43	ბუპროფეზინი	0.009*	/0.241	0.0003/ (საერთ.)	/0.09	/0.0004/	კიტრი-0.7, გოგრა-0.7***, ხილი (თესლოვანი)-6.0***, ხილი (კურკოვანი) -2.0***, ატამი, ნეკტარინი-9.0***, ზეთისხილი-5.0***, პამიდორი-1.0, წიწაკა- 2.0***, წიწაკა ჩილი (გამხმარი)-10.0***, ციტრუსი, ყურძენი-1.0***, ყურძენი-0.01, ციტრუსების გამხმარი რბილობი, ქიშმიში-2.0***, მანგო-0.1***, მარწყვი-3.0***, ნუში-0.05***, ნუში ჩენჩოში-2.0***, რძე -0.01***, ძუძუმწოვართა ხორცი და სუბპროდუქტები (გარდა ზღვის ხორცისა)-0.05***	აპლაუდი
44	გალაქსიფოპ-P - მეთილი	0.00065	/0.15	0.001/ (საერთ)	1.0/	/0.0001	შაქრის, საკვები ჭარხალი, მზესუმზირა და სოიო (თესლი), მზესუმზირა (ზეთი)-0.05, რაფსი (თესლი) -0.2 კარტოფილი-0.01	ზელეკ-სუპერი
45	გლიფოსატი	0.01	0.5 /(ტრ.)	0.02/	1.0/	/0.01	ხეხილი, ციტრუსოვნები,	გლიალკა, გლისოლი,

	იზოპროპილამინის მარილი გლიფოსატი	0.1		(ს.-ტ.)		0,1/(მ.ე.) 0,06 (ს.-ს.) (ა)	ბოსტნეული, კარტოფილი, სოკო-0.3, ყურძენი, კენკრა (ყველა)-0.1, საზამთრო-0.3*, ბანანი-0,05***, მზესუმზირა (თესლი)-7,0, სიმინდი (მარცვალი)-1,0, მზესუმზირა (ზეთი)-0.1, ხორბლეულის მარცვალი, სოია (ხმელი მარცვალი)-20.0, რაფსი (მარცვალი)-10,0, ბრინჯი-0.15*, სოიოს, მზესუმზირას, რაფსის ზეთი-ნა, ბარდა (ხმელი)-5,0, ბაგა (თესლი)-40,0***, პარკოსნების მარცვალი (ხმელი), შაქრის ლერწამი -2,0***, შაქრის ლერწამის ბადაგი-10,0***, ქატო ხორბლის დაუმუშავებელი-20,0***, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვართა-5,0***, კვერცხი, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა), ფრინველის ხორცი, რძე -0,05***, სუბპროდუქტები ღორის და ფრინველის--0,5***	დომინატორი, გლიფოსანი, გლიფოგანი, კლინ-აპი კლინი, კორფოსატი მაქსი, სვიპი, გლიფოვიტი, ეფდალ იზოფოსატი 48, სონრაუნდი 48, ეფდალ იზოფოსატი 36, სანფორსი 48 წხ, ბოქსერი, კორფოსატი, კლინერი , კლინი იქსტრიმი, გლიაციტი, გეიზერი, რუმბო, ზერო, ფელიქსი, ტორნადო, გლინი , კაილეო (2), ნოკდაუნ მაქსი, კლინერი ექსტრა, დიკსი, კლიმი, კლიმი+, ბომბა, მერი, რედ ჰალკი, დიქსი ექსტრა
46	გლიფოსატი კალიუმის მარილი გლიფოსატი ტრიმეზიუმი	0.1	/0.8	0.004 (საერთ)	/0.5	/0.02	პურეულის მარცვალი, ხილი (თესლოვანი), ყურძენი- 0.3	ურაგანი ფორტე, რაუნდაპი მაქსი, რაუნდაპი ექსტრა ურაგანი, ნოქდაუნი, ვალსაგლიფი, ტოტალი, შოკი
47	გოგირდი	ნა	160.0/ (საერთ.)	ნა	6.0/	/0.07	ნა	გოგირდი, თიოვიტი ჯეტ, პოვერ სულფური, ორიუსული (173), სულფოლაკი, სულფი, კარჯილ დე, კოსავეტი, გოგირდი+, უნიკორნი (173), ეფდალ სულფური, სულფექს გოლდი, ფაინსულფური, ჰელიოსულფური, სულფური, რანსულფური, ინფერნო, მერტონი, ლაიფსული, რადარ კომბი ფლო (137), პლაიერ კომბი (173)
48	დაზომეტი	0.004	/0.9	0.01/ (ორგ.)	2.0/	/0.003	კიტრი-0.05, პომიდორი -0.05, კარტოფილი, ბოსტნეული, თევზი -0.5	ბაზამიდ გრანულიატი
49	დელტამეტრინი	0.001	0.01/ (ტრ)	0.006/ (ს.ტ.)	/0.1	/0.001	მზესუმზირა (თესლი), თამბაქო-0.1*, მზესუმზირა (ზეთი), ბაგა (ზეთი), ბანანი- 0.05*, ხილი (კურკოვანი)-0, 2**, ხილი (თესლოვანი), ყურძენი-0,2, პურეულის მარცვალი-2,0, კენკრა (გარდა მარწყვისა)-0,5**, მარწყვი, ბადრიჯანი-0,2**, წიწაკა, კიტრი -0,2, ბოსტნეული	დეცისი ზლუ, დეცისი ექსტრა დეცისი უმშ, დეცის პროფი, დელტა, დელტარინი, პროტეუსი 110 ზდ (74), დენტისი, დეცის ფლუქსი ეკ 25 , ჰექტამ დელტარინი 12,5 უმშ, ეფდალ დელტამეტრინი, პრედატორი, იზოლდესისი, დეკაგარდი, დნ, ჯეტსისი, რიტმუსი, დემეტრინა

							ფოთლოვანი (მ.შ. სალათა)-0,5, პარკოსნები, მარცვალი (მშრალი)- 1,0, კომბოსტო ყველა სახის-0,1, სიმინდი (მარცვალი), ბრინჯი, შაქრის ჭარხალი-0,01, სოია (ზეთი), კაკაო (მარცვალი)-0,01*, კარტოფილი-0,1, სვია ხმელი- 5,0, რაფსი (მარცვალი, ზეთი), ციტრუსები, სიმინდი (ზეთი)-0,1, პამიდორი-0,3, ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით, გოგროვნები (მ.შ. ნესვი, გოგრა, საზამთრო)-0,2, პრასი-0,2***, თხილი, სიმინდი ტკბილი(მოხარშული ტარო), კაკალი-0,02***, ფქვილი ხორბლის გაუცრელი-2,0***, ფქვილი ხორბლის-0,3***, ოსპი (ხმელი), მწვანე ზეთისხილი-1,0***, სოკო, ხახვი თავიანი-0,05***, ბოსტნეული საკვები ტუბერებით და ფესურებით (მ.შ. სტაფილო, ბოლოკი)-0,1 , ჩაი შავი და მწვანე, ხორბლის ქატო გადაუმუშავებელი-5,0, ღვიძლი, თირკმელები (მრპ, თხა, ღორი, ცხვარი), რძე-0,05, ქონი ცხოველური-0,5, კვერცხი, ფრინველის სუბპროდუქტები-0,02***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0,5***, ფრინველის ხორცი-0.1***,	
50	დესმედიფაზი	0.025	0.25/ (ტრ.)	0.05/ (ს.-ტ.)	1.0/	/0.02 (მ.ე.) 0.01(ს.-ს.) (ა)	ჭარხალი შაქრის, სუფრის, საკვები-0.1*	ბეტანალი ამ, ბეტანალი ს (199), ბეტანალ ექსპერტი (199, 71), ბელვედერი (199)
51	დესმეტრინი	0.0015*	0.1 (ხმ)	0.01 (ს.-ტ.)	2.0/	/0.002	კომბოსტო-0.05, ხახვი-0.05*	სემერონი
52	დიაზინონი	0.005*	0.1/ (ტრ.)	0.004/ (ს.-ტ.)	0.2/	0.0001/ (ს.-ს.)	პურეულის მარცვალი, კარტოფილი, თავიანი ხახვი, ბამბა (ზეთი), ჭარხალი შაქრის და სუფრის, სიმინდი, თაღამურა, ტურნეფსი-0.1; კომბოსტო თავხვეულა, კიტრი, პამიდორი, სტაფილო, ყაყაჩო ზეთოვანი, თამბაქო-0.5; სვია ხმელი-1.0; ნიგოზი-0.01***; ნუში, წიწაკა ტკბილი (მათ შორის მიხაკისებრი), ჩინური კომბოსტო,	ბაზუდინი, დიაზინონი

							გოგრა-0.05***; მოცვი, მაყვალი, (ბონზენური კენკრა), ანანასი, ბოლოკი-0.1***; მუსკუსის ნესვი, ყოლო, მოცხარი (წითელი, შავი, თეთრი), კენკრა, ატამი, კივი, კოლრაბი, მუხუდო (ახალი პარკოსნები), პარკოსნები (პარკები ან ახალი თესლები)-0.2***; ხილი თესლოვანი-0.3***; წიწაკა ჩილე (ხმელი), თალგამურა, სალათა თავხვეულა და ფოთლოვანი, ისპანახი-0.5***; ანანასი, ხენდრო, ქლიავი (შავი ქლიავის გარდა), ალუბალი, ხახვი-ბატუნი-1.0***; შავი ქლიავი-2.0***; სიმინდი ტკბილი (ფუჭეში მოსახარში), ფრინველის კვერცხი და ხორცი-0.02; ქათმის სუბპროდუქტები-0.02***; ხორცი (მრპ-ს, თხის, ღორის, ცხვრის)-2.0; თირკმელები და ღვიძლი (მრპ-ს, თხის, ღორის, ცხვრის)-0.03***; რძე და რძის პროდუქტები-0.02	
53	დიაფენთიურონი	0.0003	/0.2	0.001/ (ს.-ტ.)	/0.5	/0.0003	კიტრი, პამიდორი-0.05	პეგასი
54	დიკამზა	0.3	0.25/ (ტრ.)	0.02/ (ს.-ტ.)	1.0/	0.01/	პურეულის მარცვლეული მარცვალი, სიმინდი (მარცვალი)-0.5, სიმინდი (ზეთი)-0.05, ფეტვი-0.3	დიალენი (2), დიალენ სუპერი (2), ვალსამინი (2), ველოსიტი, ლინტური (186), დიანატი, დიკოპურ ტოპი (2), სტელლარი (182), ამინოპელკ სუპერი (2), ვაგაბონდი, ჰექტორ მაქსი (160,132), სერტო პლიუსი (189), გოლიაფი (2), რიმაქსი(187), აისი (160)
55	დიქვატი (დიბრომიდი)	0.003	/0.2	0.02/ (ორგ.)	0.05/	0,01 /0.004	ბარდა-0,2, სტაფილო, კარტოფილი- 0.05; მზესუმზირა (თესლი)-1,0, რაფსი (თესლი)-2,0, მზესუმზირა (ზეთი), რაფსი (ზეთი)-0,1, სოიო (მარცვალი, ზეთი)-0.2, წიწიბურა-0,01*, ქერი-5,0***, პარკი.ცერცვი (ხმელი), ბრინჯი გაშალაშინებული-0,2***, სიმინდი, მცენარეული ზეთი გაუწმენდავი (გარდა მზესუმზირის, სოიასი და რაფსისა), ბოსტნეული საკვები ფესვებით, ბოლქვებით და ნაყოფებით-0,05***, ბრინჯი-10,0***, ბრინჯი გაქერცილი-1,0***, ხორბლის ქატო დაუმუშავებელი,	რეგლონ სუპერი სკორპიონი

							გაუცრელი ხორბლის ფქვილი, ხორბალი, ქერი, სორგო-2,0***, ხორბლის ფქვილი-0,5***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0.01, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვართა, კვერცხი, ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები-0,05***, რძე-0.01*	
56	დიითიანონი	0.01	/0.02	0.003/ (საერთ.)	/0.5	/0.0001	ყურძენი -3, 0, ხილი (თესლოვანი)-5.0, ხილი (კურკოვანი)-5, 0*, ციტრუსები-3, 0***, კენკრა და წვრილი ხილი-5, 0***	დელანი, დითიმეგა, ტერსელი (142), აკრობატ ტოპი (57), ფოსილი, სპრინტერი, დანონი, დელავიტი, სუპერ დიანონი, მალაქიტი (145), ალიგატორი
57	დიკლოფოპ-მეთილი	0.02	ა5	0.1/ (ორგ.)	/0.5	ა5	შაქრის ჭარხალი-0.01, სოიო (მარცვალი)-0.05*, სოიო (ზეთი)-0.02*, პურეულის მარცვალი-0.02	ილოქსანი
58	დიმეთოათი	0.002	/0.1	0.003/ (ს.-ტ.)	0.5 /	0.0003 / (ს.- ს.)	არტიშოკი-0,05***, სატაცური-0,05***, კომბოსტო ყველა სახის- 0,2, პურეულის მარცვალი- 0,05, ხილი (თესლოვანი)- 0,02, ხილი (კურკოვანი) - 0,02, ციტრუსები-5,0, მანგო-1,0***, ზეთისხილი მწვანე-0,5***, პარკოსნები- 1,0, წიწაკა ჩილი-3,0***, წიწაკა ტკბილი მიხაკისებრიის ჩათვლით- 0,5***, კარტოფილი-0,05,, შაქრის, სუფრის ჭარხალი -0.05, ზეთისხილი შავი , სოკო, ბრინჯი, ბადჩეული, კიტრი, პამიდორი, სვია ხმელი, თამბაქო, სვია მშრალი, თუთა, კენკრა (ყველა), ფეტვი, ყურძენი, მზესუმზირა (თესლი და ზეთი), სიმინდი (თესლი, ზეთი, სოია (პარკი, ზეთი)- 0.02, რაფსი (მარცვალი, ზეთი)-0,05, ნიახური- 0,5***, სალათა-0,3***, ხორცი მრკ, თხის, ცხენის, ღორის და ცხვრის-0,05***, რჯე მრკ, თხის ცხვრის- 0,05***, სუბპროდუქტები მრკ-0,05***, ქონი მრკ (გარდა რძის ცხიმისა)- 1,0***, კვერცხი-0,05***, შინაური ფრინველის ქონი და ხორცი-0,05***,, ფრინველის სუბპროდუქტები-0,05***, ცხვრის სუბპროდუქტები- 0,05***	ბი-58 ახალი, საფაგორი, დინგო, დანადიმი, პოლიგორი, ბიფოსფინი, ბიიტალი, დემეტრა, დი-68, კორუმგორი, დიმევიტი, ეფდალ კემიდონი, ალპგორი, ფოს-ბი, ვერტიკალი, ბინგო, დუმბლე, ბი-58 ტოპი
59	დიმეთენამიდი-პ	0.07*	/0.1	0.1/ (ორგ.)	/0.7	/0.006	სოიო (პარკოსნები)-0.02; სოიო (ზეთი)-0.02;	ფრონტიერ ოპტიმა

							სიმიინდი (მარცვალი)-0.02; შაქრის ჭარხალი, სუფრის-0.02; ლობიო (შშრალი პარკოსნები)-0.02***; მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.04; კარტოფილი, ნიორი, ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, სორგო, ტკბილი სიმიინდი (ფუჩეჩში მოსახარში), ტკბილი კარტოფილი, მიწის თხილი-0.01***, კვერცხი, ხორცი ძუძუმწოვრების (ზღვის ცხოველების გარდა), რძე, შინაური ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები-0.01***	
60	დიმეტომორფი	0.1	0.04/	0.1 /	0.1/	/0.1	ბროკოლი-1,0***, კომპოსტო თავიანი-2,0***, კოლრაბი-0,02***, ვალერიანა ზოსტნის-10,0***, ხახვი თავიანი -0,15, კარტოფილი -0.5, კიტრი-1,0, პამიდორი-0.1, ყურძენი-3.0 , ქიშმიში-5,0***, ზოსტნული მსხმოიარე (გარდა გოგრისა)-1,0***, გოგრა-0,5***, სვია ხმელი-80,0***, სალათა თავხვეულა-10,0***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა) -0,01***, რძე -0,01***, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვართა-0,01***, კვერცხი-0,01***, ფრინველის ხორცი, სუბპროდუქტები-0,01***	აკრობატი მც (111) ავანგარდი (111), დიმაწკო (111), სვინქს ექსტრა (221), ლიდერი (111), აკრობატ ტოპი (53), ფაიტერ ზლუ (165), მანკოცებ სუპერი (111) , ეფდალ აკრობოტი (111), მაქსიმუმი (111),კამბაზი (111), ორვეგო (21'), კარმენი, აქტორმენი (111), დუეტ ფორტე (221), არევა გოლდი (111), დიმეკური, ციმაქსი(111), ზანჯო ფორტე (210), გრანდ მდ (111), პროტონი (221)
61	დიმეტიპინი	0.008	/0.1	0.0002 (საერთ.)	0.5/	/0.003	კარტოფილი,მზესუმზირა (თესლი, ზეთი) -0.05*	ხარვეიდი 25 F
62	დინიკონაზოლი	0.003	/0.1	0.004/	/0.01	0.005/	პურელის მარცვალი -0.05	სუმი 8, კონილი ,მაქსილი-8, ალიანსი, სონფიქსი, ეფდალ დინექსი
63	დინოტეფურანი	0,22	ან	ან	10,0 8 სთ (შესუნთქვადი მტვერი) 3,0 8 სთ (რესპირაბელური მტვერი)	ან	საკვები პროდუქცია-0,01	სტარკლი
64	დიფენკონაზოლი	0.01	/0.1	0.001/ (ს.-ტ.)	/1.0/ (ა)	/0.01 (მ.ე.) 0, 003/(ს.-ს, (ა))	ხილი(თესლოვანი)-0, 1, ჭარხალი შაქრის, სუფრის -0.2, პურელის მარცვალი-0.08, , ხილი (კურკოვანი)-0.2, ვაშატამა და ატამი-0, 5, პამიდორი, -0.6, სტაფილო-0.3,	სკორი, დივიდენდი, დივიდენდი სტარი (239), სკორპიონი, ფუნექსი, სკაპი, ტასპა (154), სელექტ ტოპი (75, 213), ატტიკი (299), ჰარბორი (154), კორბეტი, აპლორი, ბროდერი (154), სკანდალი 250 ეკ, ჯეკ-პოტი (137),

							კარტოფილი-0.02, ყურძენი-0, 5, ნიახური-5.0**, სატაცური-0, 03***, ბანანი-0, 5**, ციტრუსები-0, 6**, ბრინჯი-1, 0**, კომბოსტო ყველა სახის-0, 5***, მანგო-0, 07***, ნიორი, სოია (მარცვალი), მზესუმზირა (თესლი)-0, 02***, პრასი-0, 3***, სალათა თავხვეული და ფოთლოვანი, მწვანე ზეთისხილი-2, 0***, რაფსი (მარცვალი)-0, 05***, პაპაია-0, 2***, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვართა-0, 2***, კვერცხი, ფრინველის ხორცი და მისი სუბპროდუქტები-0, 01***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0, 05***, რძე-0, 005***	რაიოკი, დინალი (243), ეფდალ დონაზოლი, სამშეტი (104), რევეს ტოპი (110), იზოლდიფეკორე, ეფდალ დიფენპრო (154), სკორპი, ემბრელია (78 ¹), სტორი, ციდელი ტოპი (243), სკორტი, ლაცერტა მაქს (18), პრივატი, ჰელიოსი, სერკადის პლიუსი (219 ¹), გრაფიტონი, როკ ენ როლ (18), მორავის დუო (135 ²), ანტალია
65	დიფლოვიდაზინი	0.02	/0.07	0.002	/0.4	0.001	ვაშლი-0.04, ყურძენი-0.02	ფლუმაიტი
66	დიფლუბენზურონი	0.02	/0.2	0.01/ (საერთ.)	3.0/	/0.006	ხილი (თესლოვანი)- 0.1, კომბოსტო – 1.0, სოკო (მ.შ. ქამა-სოკო) – 0.3, ციტრუსები-0, 5***, ბრინჯი-0, 01***, ხორცი და ძუძუმწოვარის სუბპროდუქტები (ზღვის ცხოველების გარდა)-0, 1***, კვერცხი, ფრინველის ხორცი-0, 05***, რძე-0, 02***	დიმილინი, ჰეროლდი, ალფამილინი (237)
67	დიქლორანი	0.03	ან	0.007 (ს.-ტ)	ან	ან	ხილი (კურკოვანი)-0.1, ხილი (თესლოვანი)-0.06, სტაფილო, კომბოსტო, ხახვი, კარტოფილი-0.004, კიტრი-13, ყურძენი, კენკროვნები-7, პამიდორი-0.3, კვების ყველა დანარჩენი პროდუქტი-0.1	ბოტრანი
68	დიქლოფლუანიდი	0.3	/0.2	0.025/ (ორგ.)	1.0/	1.0/	ხილი თესლოვანი-5.0; მოცხარი (შავი, წითელი, თეთრი), ჟოლო-15.0; ხენდრო-10.0; ხურტკმელი-7.0, ყურძენი-15.0; კიტრი-5.0***, სალათა-ლატუკი-10.0***; თავიანი ხახვი-0.1***; კარტოფილი-0.1***; პამიდორი-2.0***; ატამი-5.0***; წიწაკა-2.0***; წიწაკა ჩილე (ხმელი)-20.0***	ეუპარენი, ფოლიკური ე (173)
69	დოდინი	0.01*	ან	ან	ან	ან	ხილი (თესლოვანი და კურკოვანი)- 5, 0***,	სალიტი, სილიტი
70	ემამექტინ ბენზოატი	0.003	0.07	0.005/ (საერთ.)	/0.1	/0.001	ყურძენი, ხილი (თესლოვანი) -0.05, პამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა - 0.02, კომბოსტო, სალათა-0.7	პროკლეიმი, ჰიპნოზი, სპოდჰელი, ბეკჩი, ეფდალ ემაბენ, კლიპ, პორსელენი, ბრენდონი, ტოპ გან , ორიონი(85)

71	ეთილფენა-ცინი	ნა	ნა	0.0002 (საერთ.)	0.01/(ა)	/0.0002	ნა	გელცინი
72	ეთილენ ბის დიტიოკარ-ზამინის მჟავის თუთიის მარილი ეთი- ლენტიურამდისულფი დთან კომპლექსში	0.006	0.6/	0.1/ (ს.-ტ.)	0.1/	/0.001	ყველა საკვები პროდუქტები-0,02	ავიქსილი (133, 67), არცერიდი (115, 67) ბაზოცენი (184, 66), პოლიხომი (165)
73	ეთილენთიო- შარდოვანა	0.001	ნა	ნა	ნა	ნა	ყველა მცენარეული და საკვები პროდუქტები-0,02	ავიქსილი (133,66), აკრობატი მც (57,111), არცერიდი (66, 115), ბაზოცენი (67, 184), გალბენი მ8-65 (30, 111), ვალსალაქსილი (111, 115), ვალსაზები (111, კლიპი (111, 193), პოლიხომი (165, 115), რიდომილ მც (111, 115), რიდომილ გოლდი მც (111, 115), რიდონეტი მც (111, 115), ტატტუ (150), დითან მ45 (111), ნოვოზირი (111), ვიქტორი (111), მანგრიფი (111), საკოზები(111), მანკოში (111), გრანდ მდ(111)
74	ეპოქსიკონაზოლი	0.004	/0.4	0.0005/(საერთ.)	/1.0	/0.001	პურეულის მარცვალი -0,2, შაქრის ჭარხალი - 0,05	რეკს დუო (76)
75	ესფენვალერატი	0.02*	/0.1	0.003/ (ორგ.)	/0.05	/0.0004	სიმინდი (მარცვალი)0.01*, მზესუმზირა (თესლი), სოიო (მარცვალი)-0.02*, მზესუმზირა(ზეთი), სოიო (ზეთი)-0.04*, შაქრის ჭარხალი-0.01*, ბამბა (ზეთი), კარტოფილი, ყურძენი, ბარდა, პურეულის მარცვალი, ხილი (თესლოვანი), რაფსი-0.1, კომბოსტო-0.05, ხორცი და ხორცპროდუქტები, რძე-0.01, კვერცხი-0,01***, ფრინველის ხორცი, ფრინველის სუბპროდუქტები-0,01***	სუმი ალფა
76	ეტოპროფოსი	0.0004*	ან	ან	ან	ან	მარწყვი, ზანანი, ლერწმის შაქარი, ნესვი-0.02***; წიწკა, კარტოფილი, ბატატი-0.05***; პამიდორი, კიტრი-0.01***; წიწკა ჩილე (ხმელი)-0.2***; ბაღის თაღამი-0.02***, ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-0.01***; რძე, სუბპროდუქტები (ძუძუმწოვრების)-0.01***;	მოკაპი
77	ეტოფუმეზატი	0.1	/0.2	0.5/(საერთ.)	3.0/(ა)	0.08/ (მ.-ე.) 0.03/6 (ს.-ს.)	კვების პროდუქტები, ჭარხალი სუფრის, შაქრის, საკვები-0.1, თამბაქო-1.0*	ბეტანალ ექსპერტი (47 ,199),
78	ეტოქსაზოლი	0,04	ან	ან	ან	ან	თესლოვანი ხეხილი -0,02, გარგარი, ატამი-0,1, ქლიავი-0,02, ყურძენი- 0,02, კიტრი, პამიდორი, ბადრიჯანი-0,1, მარწყვი- 0,2	ზუმი 11 სკ
79	ვალიფენალატი	0,07/	/0,04	0,02/ (ორგ.+საერთ.)	/1,0	/0,001	კარტოფილი- 0,01,ყურძენი-0,2	ვალის ფ (221), ვალის მ (111)

80	ზოქსამიდი	0,5/	/5,5	0,003/ (საერთ)	/1,0	/0,002	ქიმიში (ყველა სახის)- 15,0***, ბოსტნეული საკვები ნაყოფით , გოგროვნები- 2,0***, ყურძენი- 5,0, კარტოფილი-0,02***, პამიდორი -2,0***	ზორვევი ვინაბელი (133 ¹)
81	თიაბენდაზოლი	0.3	/1.0	0.001 (საერთ.)	0.2/ (აზ.)	/0.08	პურეულის მარცვალი-0.2; სიმინდი (მარცვალი)-0.2; ფეტვი, ბრინჯი, ბარდა, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.2; რაფსი (მარცვალი, ზეთი)-0.2; პამიდორი-0.1*; კარტოფილი-15.0; ციტრუსოვნები-5.0**; ავოკადო-15.0***; ბანანი- 5.0***; მანგო-5.0***; სოკო- 60.0***; პაპაია-10.0***; ხილი (თესლოვანი)-3.0***; ვარდკაჭა-0.05***; მრკ-ს თირკმელები-1.0***; მრკ-ს ღვიძლი-0.3***; მრკ- ს ხორცი-0.1***; მრკ-ს რძე- 0.2***; ფრინველის ხორცი- 0.05***; კვერცხი-0.1***	ტექტო, ვინციტი (217), სუპერვინი (217)
82	თიაკლოპრიდი	0.01*	/0.07	0.004/ (ს.-ტ.)	/0.4	/0.002	ხილი (თესლოვანი)-0.7; რაფსი (ზეთი)-0.3; რაფსი (მარცვალი)-0.5; ყურძენი, კარტოფილი-0.02; კენკროვნები და სხვა წვრილი ხილი-1.0**; ნუში გაუმჟღავნებელი-10.0***; ბამბა (თესლი), ბრინჯი, ხის კაკალი-0.02***; კიტრი, გოგრა ჩვეულებრივი- 0.3***; მდოგვი (თესლი), ხილი კურკოვანი, პამიდორი-0.5***; ბადრიჯანი-0.7***; კივი, ნესვი, საზამთრო, ზამთრის გოგრა -0, 2***, ხორბალი-0.1***, წიწაკა ტკბილი (მიხაკისებრის ჩათვლით)- 1.0***; მსხვილნაყოფიანი- 0.2***; ფრინველის კვერცხი, ხორცი და სუბპროდუქტები-0, 3***, მუშპროდუქტების სუბპროდუქტები-0.5***;; ხორცი მუშპროდუქტების (ზღვის ცხოველების გარდა)-0, 1***, რძე-0.05***	კალიფსო, ულტრატოქსი, პროტექსი 110 ზდ (46, თიაკლომექსი, ბელტ ექსპერტი (212), როკიფსო
83	თიამეთოქსამი	0.015	0.2/	0.01/ (საერთ)	/0.4	/0.01	კარტოფილი, პურეულის მარცვალი, მდოგვი, რაფსი (მარცვალი, ზეთი), შაქრის და საკვები ჭარხალი, კიტრი, ბარდა, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), კომბოსტო, ხახვი- 0.05; ბადრიჯანი, წიწაკა, პამიდორი -0.2; ხილი (თესლოვანი), მოცხარი,	აქტარა, მედალი, სელესტ ტოპი (60,213), კუნგფუ სუპერი (105), რენოვა 25 წდგრ, მედალ გოლდი (105), მისტი, ეფორია (105)

							ყურძენი-0.1, მიმინდი (მარცვალი, ზეთი)-0.05	
84	თიენკარბაზონ-მეთილი	0.2	09	0.05/ (საერთ.)	/1,0	/0.02	სიმიინდი (მარცვალი, ზეთი)-0.5	მასტერ პაუერი (223, 130, 239 ¹)
85	თიოფანატ-მეთილი	0.02	/0.4	0.05/ (ორგ.)	0.1/	/0.007	მაქრის ჭარხალი, პურეულის მარცვალი-1.0, ხურმა, ფეიხო-0.2*, კიტრი, ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი), ყურძენი-0.5, მოცხარი-0.01	ტოფსინი-მ, რექს დუო (68) კვარტეტი, ზახისნიკი
86	თირამი	0.002	/0.06	0.01/ (ს-ტ)	0.5/	0.05/ (მ.-ე.) 0.001/ (ს.-ს.)	პურეული მარცვალი-0.01, კარტოფილი-0.005, ყველა საკვები პროდუქტები-0.01, სიმიინდი (მარცვალი, ზეთი)-0.1	ტმთდ, რაქსილი თ (174), ვიტავექსი 200 ფფ (94), ვიტავექსი 200 (94), ფენორამი (94), თირამ გრანუფლო
87	თუთიის ფოსფიდი	ნა	0.4	0.005	0.1	0.1	პურეულის მარცვალი - 0.1; შაქარი, მშრალი ხილი და ზოსტენული, კაკაოს მარცვალი, ჩაი, სანელბლები, კაკალი, არაქისი - 0.01, სოიო (მარცვალი)-0.05*	თუთიის ფოსფიდი, კომანდო, სუპერ ცინკი, რატიციდი, .დეტია მაუს გიფტკორნერი,
88	იმაზალილი	0.03	/0.2	0.02/ (საერთ.)	/0.2	/0.008	ბანანი-2.0***; ციტრუსოვნები-5.0***; კიტრი (კორნმონის ჩათვლით)-0.5***; ნესვი-2.0***; იაპონური ხურმა-2.0***; თესლოვანი ხილი-5.0***; კენკროვნები: ჟოლო (წითელი, შავი), ხენდრო და სხვა-2.0***; პურეულის მარცვლოვნები (ხორბალი და სხვა)-0.1; სოიო (პარკოსნები)-0.02; სოიო (ზეთი)-0.04; მზესუმზირა (თესლი)-0.02; მზესუმზირა (ზეთი)-0.04; რაფსი (ზეთი)-0.04; სიმიინდი (მარცვალი, ზეთი)-0.3; ფეტვი-0.4; ბარდა-0.1	ბაიტან უნივერსალი (183), მაგმატილი, ეფდალ ექსალილ
89	იმაზამოქსი	0.25	/1.5	0.0004/ (ორგ. საერთ.)	/1.0	/0.02/ (ს.-ს.) 0.05/ (მ.ე. ა)	სოიო (მარცვალი, ზეთი), ბარდა - 1.0, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), რაფსი (თესლი, ზეთი) -0.1	პულსარი 40, ევროლაიტინინგი (81), კაპტორა (81), ბეითორი, პულსარ პლიუსი
90	იმაზაპირი	0.25	/0.5	0.1/	2.0/(ა)	0.05/(მ.ე.) /0.02/ (ს.-ს.) (ა)	ველურადმზარდი კენკროვნები - 2.0, ველურადმზარდი სოკო-4.0, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი) -0.1, სოიო-0.5	არსენალი, ევროლაიტინინგი (80), კაპტორა (81)
91	იმაზეტაპირი	0.2	/0.1	/0.09 (საერთ.)	2.0/ (ა)	0.05/(მ.ე.) /0.02/ (ს.-ს.) (ა)	სოიო (თესლი და ზეთი), ბარდა, მზესუმზირა (თესლი და ზეთი) -0.5	პივოტი, სვიფტი
92	იმიბენკონაზოლი	0,0098	ა5	0,021	0,025	ა5	ვაშლი-1,0, მსხალი-0,3, ატამი-0,5, გარგარი-2,0, ყურძენი-5,0, ციტრუსები-1,0, საზამთრო-0,3, ნესვი-	მენეჯი

							0,5, ჩაი 15,0, მუხუდო-0,1	
93	იმიდაკლოპრიდი	0.06	0.5/ (ტრყ)	0.03/ (ორგ.+საერთ.)	0.5/ (ა)	0.03/ (მ.ე.) 0,01/ (ს.-ს.0 (ა)	სიმინდი (მარცვალი,ზეთი), პურეულის მარცვალი, რაფსი (მარცვალი, ზეთი), სოია (მარცვალი, ზეთი), ზეთოვანი სელი (თესლი, ზეთი)-0,1, მზესუმზირა (თესლი) - 0,4, მზესუმზირა (ზეთი)-0,2, ბარდა(ხმელი გაქერცლილი, ტკბილი, წოტები და მოუმწივარი თესლები)-5,0, ხილი (თესლოვანი)-0,5, მსხალი-1,0, კენკრა და სხვა წვრილი ხილი -3,0, კიტრი-1,0, ხახვი (პრასი, მწვანე, თავიანი)-0,2, კომბოსტო ყველა სახეობის , სტაფილო, პამიდორი, შაქრის, სუფრის ჭარხალი, კარტოფილი-0,5, ბადრიჯანი-0,5**, ლობიო-2,0***, სვია ხმელი -10,0*, ყურძენი-1,0**, ციტრუსები-1,0**, ციტრუსები (ხმელი რბილობი)-10,0***, ხილი კურკოვანი (გარგარი, ალუბალი, ვაშლატამა, ატამი)-0,5***, ქლიავი , შავი ქლიავი-0,2***, ვაშლის კოპტონი- 5,0***, ბროწეული-1,0***, ბანანი-0,05***, ყავა მარცვალი-1,0***, ბადრიჯანი-0,5** , წიწაკა-1.0*, წიწაკა ჩილი (ხმელი)-10,0***, ყაბახი ზაფხულის-1,0*, ბოსტნეული საკვები ტუბერებით და ფესურებით-0,5***, სიმინდი ტკბილი (მოხარშული ტარო) - 0,02***, სალათა თავხვეული-2,0***, მანგო, საზამთრო, ნესვი-0,2***, ნუში-5,0***,	გაუჭო, კონფიდორი, კონფიდორ მაქსი, პრესტიჟი (139), პრემიუმი (139), სულტანი, მიდაში, კონფიდორ ოილი, ნუპრიდი, კომპრადორი, იმიდორი მაქსი, იმიჯი, სინოპრიდი, კომპრადორ ოილი (127), პერფექტო, (105), ანტიკოლორადი (105), ანტიხრუმში (35), ეფიდორ ოილი (127), იმიდამექსი, რეზიუმე, გორტკა, ეფდალ იმიდრიდი 70 წდფითმ, მატადორ გრანდი (115, 235), ეფდალ იმიდრიდი 60 სე, კონფიპრიდი, იმიდაგოლდი, ნუპრიდი 200, გაუჭო პლიუსი (99), გაუჭო სდკ 600, იმიდორ დ, რეზიუმე, ბორეო ნეო (237, 99), კომფიდრიდი, ჰირო

							არაქისი-1,0***, კაკალი პეკანი-0,05***, ხორბლის ფქვილი -0,03***, ხორბლის ქატო გადაუმუშავებელი-0,3*, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვრების-0,3***, ხორცი ძუძუმწოვრების (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0,1***, რძე-0,1***, ხორცი შინაური ფრინველის - 0,02***, სუბპროდუქტები შინაური ფრინველის - 0,05***	
94	ინდაზიფლამი	0.02	/0.5	ან (ს.-ტ.)	ან	ან	ყურძენი-0.01, ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი)- 0,01, ციტრუსები-0,01, თხილი-0,01, ოლივა, ფისტა, ნუში-0,01, შაქარი, შაქრის ლერწამი-0,01	ალიონი 500 სკ, ბეკანო
95	ინდოლილ 1-3- ძმარმჟავა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ჰეტეროაუქსინი
96	ინდოქსაკარბი	0.01	/0.9	0.015/(საერთ.)	/0.3	/0.005	ყურძენი-2,0, ხილი (თესლოვანი)-0.5, მსხალი- 0,2*, შავი ქლიავი-3,0***, წიწაკა - 0.3***, კარტოფილი-0,02***, ხახვი-2,0, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკკოლი- 0,2***, კომბოსტო თავხვეული- 3,0***, შტოში-1,0***, ქიშმიში-5,0***, ბადრიჯანი, გოგრა-0,5***, სალათა ფოთლოვანი- 15,0***, სალათა თავხვეული-7,0***, პიტნა ლიმნის-15,0***, არაქისი- 0,02**/*, პამიდორი- 0.5, რაფსი (მარცვალი, ზეთი)- 0,05 სოია (მარცვალი ხმელი)- 0,5***, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვრების, საკვები- 0,05***, ხორცი ძუძუმწოვრების (გარდა ზღვის ცხოველებისა)- 2,0***, რძე-0,1***, რძის ცხიმი-2,0***, ხორცი, სუბპროდუქტები შინაური ფრინველის -0,01***	ავანტი, კაიზერი, ტეზკარპი, ავაკანტი, ტუნჩი, ორიონი (64)
97	იოქსინილი	0.001	1/0.2	0.01/ (ს.-ტ.)	/0.1	/0.001	ნიორი, ხახვი-0.1	ტოტრილი
98	იპროვალიკარბი	0.125	ან	ან	ან	ან	ყურძენი-0.05	მელოდი დუო (155), მელოდი კარე (231) მელოდი კომპაქტი (165)
99	იპროდიონი	0.06	/0.15	0.01/ (ს.-ტ.)	/1.0	ნა	ყურძენი-10.0, ნუში -0,2***, ხილი თესლოვანი-5,0***, ხილი კურკოვანი-5,0***,	როვრალი, როვონე, როვრალ აკვა ფლო, კარნავალი, ეფდალ იპროდინი, ზეანოლი, როვრალი

							კივი-5,0***, კიტრი-2,0, მზესუმზირა (თესლი)-0,5, მზესუმზირა (ზეთი)-0.02, კარტოფილი-0,05, სტაფილო-0.5 , ხახვი თავიანი -0,2***, პამიდორი-5.0, კომბოსტო ყველა სახის-5,0**, ვარდკაჭაჭა ფოთლოვანი-1.0***, კენკრა (მოცვი, წითელი და შავი ჟოლო, მარწყვი)-15.0**, სალათა თავხვეული და ფოთლოვანი-10.0**, შაქრის ჭარხალი-0,1***, ქერი, პარკოსნები-2,0***, რაფსი (მარცვალი)-0,5***, ბრინჯი აქერცლილი-10,0***, პურეულის მარცვალი-0,1, სიმინდი (მარცვალი, ზეთი)-0,2	50 სფ
100	იპსიდენოლი	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	იპსოვიტი
101	იპსენოლი	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	სეკსოვიტი
102	კაპტანი	0.1	/1.0	0.2 (ორგ.)	0.3/	/0.003	ხილი (თესლოვანი)- 3.0, ვაშლის წვენი-0.01, ყურძნის წვენი-0.05, ყურძენი-25*, ქიშიში (ყველა სახეობის)-50,0***, კენკროვნები (მოცვი, წითელი მოცვი, ჟოლო, მარწყვი) -20,0***, ნუში - 0,3***, ხილი კურკოვანი- 25,0***, ნესვი-10,0***, კიტრი-3,0***, კარტოფილი-0,05***, პამიდორი-5,0***	მერპანი 80, ორდანი, ეფდალ კაპტანიში, მასს კაპტანი, კარნეოლი, ტანკაპ ექსტრა, კაპტანალი
103	კარბენდაზიმი	0.03*	/0.1	0.1/	0.1/	/0.001	შაქრის ჭარხალი, რაფსი (მარცვალი)-0.1, რაფსი (ზეთი)-0,05, პურეულის მარცვალი-0.5, კენკრა და სხვა წვრილი ხილი-1,0 მარწყვი, მოცხარი-0.05, ხილი (თესლოვანი)-0.2, ყურძენი-3,0, კიტრი (კორფა კიტრის ჩათვლით)- 0.05*, ხილი კურკოვანი, წიწაკა ჩილი, ბრინჯი აქერცლილი-2,0***, სატასური, ზანანი, სტაფილო-0,2***, პარკოსნები, კომბოსტო ბრიუსელის, ქლიავი, შავი ქლიავი, გოგრა, პამიდორი-0,5***, ფორთოხალი (ჰიბრიდების ჩათვლით)- 1,0***, ალუბალი-10,0***, ყავა (მარცვალი), არაქისი, კაკალი-0,1***, სალათა თავხვეული, მანგო, ანანასი-5,0***, წიწაკა ჩილი ხმელი-20,0*** მრკ-ს და ფრინველის	დეროზალი, ინდაზოლი, ფინალი, პლატინ კარბენდაზიმი, იგლი (111)

							ხორცი, ქათმის ქონი, სუბპროდუქტები ძუძუმწოვრების, კვერცხი, რძე-0,05***	
104	კარბოსულფანი	0.01	0.01/ (კონტროლი კარბოსულ ფანის მიხედ ვით)	0.02/ (ს.-ტ.) (კონტროლი კარბოსულფან ის მიხედ ვით)	/0.2	/0.01	კარტოფილი-0.25; შაქრის ჭარხალი-0.3; სიმინდი- 0.05; ციტრუსოვნები (ხმელი რბილობის ჩათვლით)-0.1***; ბამბა (თესლი)-0.05***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა), სუბპროდუქტები, ფრინველის ხორცი, კვერცხი და სუბპროდუქტები-0.05*** (კონტროლი კარბოსულფანის და მისი მეტაბოლიტების მიხედვით)	მარშალი, მარშალი 5 გ
105	კარბოქსინი	0.01	/0.05	0.02/ (ს.-ტ.)	1.0/ (ს.-ტ.)	/0.015	სიმინდი (მარცვალი), ფეტვი, პურელის მარცვალი, კარტოფილი- 0.2, სიმინდი (ზეთი)-ნა	ვიტავექსი 200 ფფ (77), ფენორამი (77), ვიტავექსი 200 (77)
106	კარბოფურანი	0.002	0.01/(მ.-ე.)	0.02(ს.-ს.)	0.05/ (ს.-ს.)	/0.001	შაქრის ჭარხალი-0.05, რაფსი (მარცვალი, ზეთი)- 0.1, მდღგვი (თესლი, ზეთი)-0.05 , ხმელი სვია - 5.0*	ფურადანი
107	კარფენტრაზონეთილი	0.03	/0.06	0.1/(აერთ.)	/1.4	/0.01	ხეხილი-0.01, კენკროვნები, ბოსტნეული, ჯვარყვავილოვანი კულტურები- 0.05, პურელის მარცვალი, რაფსი 9მარცვალი, ზეთი), მზესუმზირა (თესლი,ზეთი),სიმინდი (მარცვალი,ზეთი) 0.02, ჩაი-0.02, პარკოსნები-0.02, შაქრის ჭარხალი-0.01	რივეტი
108	კვიზალოფოპ-პ- ტეფურილი	0.004	/0.1	0.002/ (საერთ.)	/0.5	/0.005	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, კარტოფილი, პამიდორი, სტაფილო, სოიო (თესლი), მზესუმზირა (თესლი) კომბოსტო - 0.04; სოიო (ზეთი), მზესუმზირა (ზეთი), ხახვი-0.06, რაფსი (თესლი, ზეთი)-0.02	პანტერა
	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი							ტარგა, ტოკტა სუპერი, ფორმულა

								სუპერი, კვინ სტარ მაქსი, ჰელგა სუპერი, ეფდალ ზალოსუპერი, სერ სუპერი, რაპირა. , ბაკკარდი სერ სუპერი, სორტი სუპერი, იაგუარი
109	კლექტოდიმი	0,01/	/0,1	0,002/ (საერთ)	/0,7	/0,005	პარკოსნები ხმელი-10***, ბამბის ზეთი საჭმელი- 0,5***, შაქრის ჭარხალი-0,1, ნიორი-0,5***, ხახვი თავიანი -0,5, მიწის თხილი-5,0***, კარტოფილი -0,5., რაფსი (მარცვალი, ზეთი, -0,5, სოია (მარცვალი)-0,1, სოიას ზეთი-0,5, მზესუმზირა (თესლი-0,5, მზესუმზირის ზეთი -0,1, ბარდა, ნუტ-2,0, სელი (თესლი, ზეთი) -0,1, პამიდორი-1,0, სტაფილო, სუფრის ჭარხალი -0,1, კომბოსტო-0,5 სუბპროდუქტები საკვები- 0,2***, კვერცხი-0,05***, ძუძუმწოვართა ხორცი(გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0,2***, რძე- 0,05***	კვიკსტები
110	კლოდინაფოპ- პროპარგილი	0.002	/0.2	0.01/ (საერთ.)	/0.6	/0.002	პურელის მარცვალი-0.05	ტოპიკი, კონკერი, ციტეიშნ, კოვბოი (101), ტერდოკი (101), , ტოპკაპი (101), ეფდალ კლოპარი (101), აგატი, კონკერ ექსტრა, ფოისონი (101)
111	კლოთიანიდინი	0.08	/0.1	0.5/ (საერთ + ორგ.)	/0.4	/0.02	კარტოფილი, პამიდორი- 0.05; რაფსი (მარცვალი)- 0.04; რაფსი (ზეთი), შაქრის ჭარხალი-0.1; პურელი მარცვლოვნები-0.2; ზეთოვანი კულტურების თესლი (რაფსის გარდა)- 0.02; მზესუმზირა (ზეთი)- 0.05; არტიშოკი, ყავა (პარკოსნები), ზოსტნული საკვებნაყოფიანი (გოგროვნების გარდა)- 0.05***; ნიახური-0.04***; კენკროვნები და სხვა წვრილი ხილი, ციტრუსოვნები-0.07***; კომბოსტო (ყველა სახეობის), შავი ქლიავი- 0.2***; კაკაო-პარკოსნები, გოგროვანი, სიმინდი (ზეთი), პარკოსნები- 0.02***; ფოთლოვანი ბოსტნული-2.0***; პაპაია, პეკანი, ანანასი-0.01***; წიწკა ჩილე (ხმელი)- 0.5***; კურკოვანი ხილი- 0.2***; ჩაი (მწვანე, შავი)- 0.7***	ჰონჩო, ემესტო კვანტუმი (138), გაუზო პლიუსი (83), ბორეო ნეო (237, 83)
112	კლომაზონი	0.04	/0.04	0.02/ (საერთ.)	/1.0	/0.02	სოიო (თესლი, ზეთი)- 0.01, ბრინჯი 0.2*,	მეტრიკი(122), ალკანსე (136)

							სიმიინდი (მარცვალი), სტაფილო, შაქრის ჰარხალი, რაფსი (თესლი,ზეთი)-0.1, ბარდა-0,01*	
113	კლოკვინტოსეტ- მექსილი	0,04	/0,07	0,001/ (ორგ.)	/0,8	/0,01	პურეულის მარცვალი, კარტოფილი-0,1	ლასტიკ ექსტრა (200), კოვზოი (98), ტერდოკი (98) ტოპკაპი (98), ეფდალ კლოპარი (98), აგატი, აქსიალი (141), აქსიალი 50 (141), ფოისონი (98)
114	კლოპირალიდი	0.15	/0.1	0.04/	2.0/	/0.01	პურეულის მარცვალი-0.2, კომბოსტო-0.05*, სიმიინდი (მარცვალი)-2.0, სიმიინდი (ზეთი), შაქრის ჰარხალი, რაფსი(მარცვალი)-0.5, ხორცი და ხორცის პროდუქტები-0.3, რძე და რძის პროდუქტები, ველურად მოზარდი სოკოები და კენკრა-0.004	ლონტრელი 300, ლიონი 300 წხ
115	კლოფენტეზინი	0.02	/0.07	0.01/ (ს.-ტ.) (საერთ.)	1.0/	/0.02	ყურძენი-2.0; ციტრუსოვნები-0.5***; თესლოვანი ხილი-0.5; კარტოფილი-0.05; ნუში გაუწმენდავი-5.0***; კიტრი, პამიდორი, ხეხე ნაზარდი კაკალი, კურკოვანი ხილი-0.5***; მოცხარი (შავი, წითელი, თეთრი)-0.2***; გამხმარი ყურძენი (ქიშმიში), ხენდრო-2.0***; ნესვი- 0.1***, ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები, კვერცხი, ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა), რძე, ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები-0.05***;	აპოლო
116	კოლოიდური ვერცხლი	-	ნა	0.05	1.0	0.01	ნა	ზერებრა აგრო (187)
117	კრეზოქსიმ-მეთილი	0.4	/0.2	0.01/ (საერთ.)	/1.0	/0.1	ხილი (თესლოვანი)-0.2, კენკრა-0.1*; მოცხარი-1,0**, კიტრი, პამიდორი-0.5, ხილი (თესლოვანი), ყურძენი -1,0, ქიშმიში- 2,0***, გრეიპფრუტი, ფორთოხალი ჰიბრიდების ჩათვლით-0,5***, ზეთისხილი-0,2***, ზეთისხილის ზეთი-0,7*** ხორბალი, ჭვავი- 0,05***, ქერი-0,1***, ძუძუმწოვართა სუბპროდუქტები , საკვები-0,05***, ძუძუმწოვართა ქონი გარდა რძის ცხიმისა- 0,05***, რძე-0,01***, ხორცი ქათმის-0,05***	სტრობი, პროგრესი, კოლისი (36), სტრობსტარი, დრენი, სამშიტი (60), ეფდალ კრესდიტი, ჯაკო, კამბიტი
118	ლამბდაციპალოტრინი	0.002	/0.05	0.001/ (ს.-ტ.)	/0.1	/0.001	ხილი (კურკოვანი)-0.03**, ხილი (თესლოვანი)-0.1, კარტოფილი, სიმიინდი- 0.01, ხმელი სვია-1.0*, მდოგვი (თესლი,ზეთი)- 0.1*,რაფსი (მარცვალი,	კარატე, კარატე ზეონი, ვალსამბა, გრანდი 5, კაიზო, კუნგ-ფუ, კუნგფუ სუპერი (75), პერფექტო (83), ანტიკოლორადი (83), ეფდალ ლამტორინი, ტეკვანდო კაპსულა, კავანჩა, იზოლლატე, ადმიტი (28),

							ზეთი), სოიო (მარცვლი, ზეთი)- 0.1, სიმინდი (მარცვლი, ზეთი) , კომბოსტო, პამიდორი, ბარდა, პურეულის მარცვლი, კარტოფილი, სტაფილო- 0.01, შაქრის ჭარხალი, ხახვი -0.02, ყურძენი-0.15, ციტრუსები-0.2**,	არმორი (28), ლამბდა-CY, პეტრა, მედალ გოლდი (75), ლამდექსი, ევორია (75), ლოკ-5, ინტეგრალი
119	ლინურონი	0.008	ან	0.1	0.5	0.1	კარტოფილი-0.05, სტაფილო-0.2, ბარდა- ლობიო-0.1, ხახვი, ისპანახი, სალათა-0.05, ნიახური-0.1	აფალონი
120	ლუკრეზინი	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	კვების პროდუქტები-ნა	ბიორაგი
121	ლუფენურონი	0.01	/0.1	0.005/ (საერთ.)	/0.8	0.01	ხილი (თესლოვანი), კარტოფილი-0.04, პამიდორი-0.5, ყურძენი- 0.1	მატჩი, ბოქსი, ლუფოქსი (201)
122	მალათიონი	0.3	2.0/ (ტრ.)	0.05/ (ორგ.)	0.05/	0.015/ (მ.-ე.)	თესლოვანი ხილი-0.5; სატაცური-1.0***; ხმელი პარკოსნები-2.0***; პარკოსნები (საკვები და სოიოსმაგვარის გამოკლებით)-1.0***; მოცვი-10.0***; ციტრუსოვნები-7.0*; ბამბის თესლი-20.0***; ბამბის საკვები ზეთი- 13.0***; კიტრი-0.2; ყურძენი-5.0*; სიმინდი- 0.05; ფოთლოვანი მდოგვი-2.0***; წიწაკა- 0.1***; წიწაკა ჩილე (ხმელი)-1.0***; სორგო- 3.0***; ისპანახი-3.0***; ხახვი (თავიანი ჩვეულებრივი)-5.0; კენკროვნები ხენდრო (შავი, წითელი, თეთრი) მოცხარი, ჟოლო, ხურტკმელი-1.0; ტკბილი სიმინდი, სუფრის (ფუჩეჩში მოსახარში)- 0.02***; პამიდორი-0.5; ტომატის წვენი-0.01***; პურეული მარცვლოვნები- 10.0; გადაუმუშავებელი ხორბლის ქატო-25.0***; ხორბლის ფქვილი-0.2***; შაქრის ჭარხალი, სუფრის, კომბოსტო, კურკოვანი ხილი, ბაღჩეული, ჩაი-0.5; ბარდა, სოიო (პარკოსნები)-0.3; თამბაქო, ხმელი სვია, სოკო, ბურღულეული (მანის გარდა)-1.0; სოიო (ზეთი)- 0.1; მიწის თხილი-1.0*; პური-0.3*; მდოგვი, ზეთოვანი ყაყაჩო-0.1*; მზესუმზირა (თესლი,	კარბოფოსი, მალაფოსი, ნიკათიონი

							ზეთი)-0.02; რაფსი (მარცვალი, ზეთი)-0.1; კარტოფილი, სტაფილო-0.05; მეცხოველეობის პროდუქტები-0.01	
123	მანდიპროპამიდი	0,03	0,24	0,05 (საერთ)	1,0	0,01	ბროკოლი-2,0***, კომბოსტო თავიანი-3,0***, პამიდორი-1,0, ხახვი თავიანი-0,1, ხახვი მწვანე-7,0***, კარტოფილი-0,5, კიტრი, გოგრა-0,2***, ნესვი-0,5***, წიწაკა-1,0***, წიწაკა ჩილი (ხმელი)-10,0***, ფოთლოვანი ბოსტნეული-25,0***, ყურძენი-2,0, ქიშმიში-5,0***, ალუბალი-20,0***	პერგადო C (165), რევუს ტოპი (60)
124	მანკოცები	0.03	/0.1	/0.01/ (ორგ.)	0.5/	/0.001	კარტოფილი, ხახვი, პამიდორი, ყურძენი, კიტრი-0,1	აკრობატი მც (57), რიდომილ მც (115), ტატტუ (150), კლიპი (153), ნოვოზირი, რიდომილ გოლდი მც (115), იუნომილი მზ (115),ვალსაზები, მანგრიფი, ვიქტორი(115), დითანი მ-45, საკოსები, მანკოში, მანკოსილი, მეტალაქსანი (115), ტროპერი (115), მაქსიმო (115), ვალსალაქსილი (115), ავანგარდი (57), დიმანკო (57), გალბენი მ8-65(30), კურზები (235), კორზ სუპერი (235), სპრინტი (235), ვალსალაქსილ ზ პლიუსი (235) , რაპიდ გოლდი (235), რაპიდ გოლდ პლიუსი (235, 165) , საფა რიდონეტ გოლდ მც 68 სფ, (115), კლასიკა, მანგო, პრომეთე (115), მ-2 (115), უნივერსალი (115), ლიდერი (57) , კადილაკი, მანკოცებ სუპერი (57), მანკოლაქსილი (115), კუპროფიქს 30 დისპერსი (164), რიდოზემი მც-72 (115), ეფდალ აკრობოტი (57), დრაკო ბლუ, ეფდალ მაკო მ-45, ეფდალ ციმოქსაზები (235), მანკოზატი მც, არმეთილი (115), მალზები (115), მაქსიმუმი(57), პატამილი(115), კარზეპი (235), ეფდალ მანტოლაქსი (115), მაქსალინი (235), სუპერსტარი (235), კინგკოზები მ-45, ერფრუტი (235), კამბაზი (57), მელტემი (115), ციმოზები (235), ლანგრიფი, კორზები (235) , რიდოლეტი (115), რამბლერი (115), კარმენი (57) , იგლი (92), ვიოლეტი (115), აქტორმენი (57), ციმო სუპერი (235), ცელიტელი (112), ინდოფილი 72 სფ ბლუ, მოქსიმატო (235) , არევა გოლდი (57), ფოსბელ პლიუსი (20), რაინკოზებ ექსტრა, სტაგერი, რიდონილი (115), რელაქსი (115), პლანეტა (115), მანკოშ დუო (115), ლირა (115), აკრომენი (57) ,

								ციმაკსი , ვალის მ (72 ¹), გრანდ მდ (57)
125	მეზოსულფურონ-მეთილი	1,0/	/0,9	0,006/	/1,0	/0,01	პურეულის მარცვალი-0,5	ვიკილისი (130)
126	მეზოტრიონი	0.5	/0.2	0.1/ (საერთ.)	/1	/0.06	სიმიინდი (მარცვალი)-0.1	ლუმაქსი (120,145), ელუმისი (132), ლექტორი, ალატანი (132)
127	მეთილბრომიდი (კონტროლი არაორგანული ბრომიდით)	1.0	ნა	0.2/ კონტროლი არაორგანული ბრომიდის მიხედვით	1.0/ კონტროლი არაორგანული ბრომიდის მიხედვით	/0.1 კონტროლი არაორგანული ბრომიდის მიხედვით	კონტროლი არაორგანული ბრომიდის მიხედვით: ჰამიდორი-3.0; კიტრი-2.5; სალათა-2.5*; კამა, ნიახური, ოხრახუმი-1.5*; ბადრიჯანი, წიწაკა-2.0*; პურეული მარცვლოვნების მარცვალი (მათ შორის გაუცრელი ფქვილი)-50.0; ლობიო, ბარდა. ციტრუსოვნები-30.0*; კურკოვანი და თესლოვანი ხილი, ყურძენი, ბროწეული-20.0*; კარტოფილი-50.0*; კონტროლი მეთილბრომიდის მიხედვით: პურეული მარცვლოვნები, კაკაო-პარკოსნები-5.0** (24 საათიანი განიავების შემდეგ); 0.01**-(რეალიზაციის მომენტში); ხმელი ხილი-2.0** (24 საათიანი განიავების შემდეგ); 0.01**-(რეალიზაციის მომენტში); მარცვლოვანი პროდუქტი (მათ შორის დაფქვილი)-1.0** (24 საათიანი განიავების შემდეგ); 0.01**-(რეალიზაციის მომენტში); მიწის თხილი, ხის კაკალი-10.0** (24 საათიანი განიავების შემდეგ); 0.01**-(რეალიზაციის მომენტში)	ბრომიანი მეთილი
128	მეთირამი	0.006	0.6/	0.1/ (ს.-ტ.)	0.1/	/0.001	ყვების ყველა პროდუქტი-0.02	პოლირამი დფ (პოლიკარბაცინი), კაურიტილი (166), კაბრიო ტაპი (142), სოლორამი, ალექტო (235)
129	მეტალაქსილი მეტალაქსილი მ	0.08*	0.05/ (ტრ.)	0.001 (ს.-ტ.)	0.5/	/0.02	კარტოფილი, ჭარხალი შაქრის (სუფრის)-0.05; ჩინური კომბოსტო-0.05**; კიტრი (კორნიშონის ჩათვლით), ჰამიდორი, კომბოსტო (ყველა სახეობის)-0.5; ხმელი სვია-10.0*; მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), სიმიინდი (მარცვალი), რაფსი (მარცვალი, ზეთი), პურეულის მარცვლოვნები-0.1; თავი ხახვი-2.0; ყურძენი-2.0; თამბაქო-1.0*; ისპანახი-2.0***; ავოკადო, კაკაო-პარკოსნები, გოგრა, ნესვი, საზამთრო, მოცხარი (შავი,	აპრონი, არცერიდი (166), რიდომილ მც (111), ტუბარიდი (165), , ვიქტორი (111), მანკოლაქსილი (111), რიდონეტი მც (111), ვალსალაქსილი(111), მეტალაქსანი (111), ტროპერი (111), მაქსიმო (111), ოუნომილ მც (111), რიდონეტ გოლდ მც 68 სფ (111), საფა რიდონეტ გოლდ მც 68 (111), მ-2 (111), პრომეთე (111), უნივერსალი (111), რიდოზემი მც-72 (111), მალზემი(111), არმეთილი (111), პატამილი (111), მატადორ გრანდი(83, 235), ეფდალ მანტოლაქსი (111), მელტემი (111), ვიოლეტი (111), ცელიტელი (111), რიდონილი (111), რელაქსი (111),

							წითელი)-0.2***; ციტრუსოვნები-5.0***; სტაფილო, ბამბა (თესლი), ახალი გაქერცილი ბარდა, სოიო, პარკოსნები (ხმელი)-0.05***; სოიო (პარკოსნები, ზეთი)-0.1; თავხვეულა სალათა-2.0**; მიწის თხილი, წიწაკა, თესლოვანი ხილი-1.0***; წიწაკა ჩილე (ხმელი)-10.0***	პლანეტა (111), მანკოშ დუო (111), ლირა (111), კუპრექსი(165), ბლუფოქსი (166)
130	Melaleuca Alternifolia (ჩაის ხის ზეთი)	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ტიმორექს გოლდი
131	მეტალდეჰიდი	0.02.	/1.0	0.001/ (საერთ.)	0.2/	0.003/ (მ-ე., ს.-ს)	პურეულის მარცვლი, ხილი კურკოვანი და თესლოვანი, ზოსტნული (კარტოფილის გარდა), ყურძენი-0.7, ციტრუსები (რბილობი)-0.2*, კენკრა-0.8	მეტალდეჰიდი, დეტია სნეილ გრანულს, მეტადაქსი პელეტ, ეფდალ კიმოტოქსი, ტალდექს ექსტრა, ლოკოციდი, ფიბულა
132	მეტამიტრონი	0.025	/0.4	0.3/ (ს.ტ.)	0.5/	/0.003	ჭარხალი შაქრის, სუფრის- 0.03	გოლტექსი
133	მეტამსოდიუმი	ან	0.001	ან	ან	ან	ან	ნემასოლი
134	Metarhizium acridum F1- 985	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	პამიდორი, კარტოფილი- 0.25, სოიო (თესლი, ზეთი)-0.1, სიმინდი (მარცვლი) -0,2	გრინ გარდ სკ პრემიუმი
135	S-მეტოლაქლორი	0.02	/0.02	0.02/ (ს.-ტ.)	/1.0	/0.02	სიმინდი (ზეთი, მარცვლი), სოიო (თესლი), მზესუმზირა (თესლი), სუფრის ჭარხალი, რაფსი (მარცვლი,ზეთი) -0.1, ბაღჩეული, კიტრი-0.05*, ბამბა(ზეთი), სოიო (ზეთი), კომბოსტო-0.02, მზესუმზირა (ზეთი), შაქრის ჭარხალი,-0.05, თამბაქო, ხმელი სვია-1.0*	დუალი, პრიმექსტრა (26), პრიმექსტა გოლდი (26), ლუმექსი (112,175), სამბა (175)
136	მეტომილი	0.02*	/0.1	0.1/ (საერთ.)	/0.1	/0.001	ყურძენი, ხილი (თესლოვანი)- 0.3, პარკოსნები (ხმელი)- 0,05***, ციტრუსები-1,0***, ციტრუსები (რბილობი ხმელი)-3,0***, ზოსტნული საჭმელი ნაყოფით (გარდა პამიდორისა), გოგროვნები-0,1***, ბამბა (თესლი დაფქვილი საკვები)-0,05***, ბამბა (ზეთი საკვები)-0,04***, ბამბა (თესლი), სალათა თავხვეული და ფოთლოვანი, ხილი კურკოვანი (ატამი, ვაშლატამა) , სოიას მარცვლი (ხმელი), სოია (ზეთი)-0,2***, სოია (მარცვლი), ,ქლიავი- 1,0***, პარკოსნები	ლანნატი

							(მთლიანი ჭოტი და ნედლი მარცვალი)-1,0***, სოიას ფქვილი-20,0***, ბარდა (ჭოტი და მოღუმწიფარი თესლი)- 5,0***, სიმინდი (თესლი, ზეთი), კარტოფილი- 0,02***, ხახვი-0,2, პამიდორი-1,0, კომბოსტო- 0,03, პიტნა ხმელი-0,5***, ქერი, წიწაკა (ხმელი)- 0,7***, წიწაკა ჩილი (ხმელი)-10,0***, რაფსი (მარცვალი), სატაცური, პურეულის მარცვალი, ხორბლის აღმონაცენი- 2,0***, ხორბლის ქათო დაუმუშავებელი-3,0***, ხორბლის ფქვილი-0,03***, ხორცი და სუბპროდუქტები ძუძუმწოვრების (ზღვის ცხოველების გარდა), ხორცი, კვერცხი და სუბპროდუქტები ფრინველის, რძე-0,02***	
137	მეტრიბუზინი	0.01	0.2/ (მ.3.)	0.1 (საერთ.)	/1.0	0.02/	პამიდორი, კარტოფილი- 0.25, სოიო (მარცვალი, ზეთი), სიმინდი (მარცვალი) -0, 1, სტაფილო-0, 1, პამიდორის წვენი-ად	ზენკორი, ზენკორი 600, მაჯესტიკი, ბარნელაცელი, სენკრონი, , მეტეორი, მეტრიკი (100), სურდონი 70, კურმუზინი, არკადე (156), ეფდალ მეზუზინი, უნიმარკი, ანტისაპა, არტისტი (219 ¹), ლაგუნე, სუპერ სენქრონი, ბანდერილა, მეტრაბუზ დ, მუზა, კურმუზინი
138	მეტრაფენონი	0.05	0.3	0.003	1.0	ან	ყურძენი-0.1	ვივანდო
139	მეტსულფურონ- მეთილი	0.003	/0.1	0.01/ (საერთ.)	5.0/	/0.02 (მ.-ე.) 0.005 (ს.-ს.)	პურეულის მარცვალი, ფეტვი-0.05, სელი (თესლი, ზეთი)-0,1	მეტსი, როტტერი, ალე, იმპერატორი, პატრული, ეფდალ მეტეორი, მეტსილი
140	მევენოქსამი	0.08*	0.05/ (ტრ.)	0.001/ (ს.-ტ..)	0.5/	/0.02	კარტოფილი, სუფრის, შაქრის, ჭარხალი,-0.05, პამიდორი, კიტრი, მ.შ.კორნიშონები,კომბოსტო ყველა სახეობის -0.5, ჩინური კომბოსტო-0.05*, ხახვი-2,0, მშრალი სვია- 10.0*, თამბაქო-1.0*, ისპანახი-2,0***,ყურძენი- 2,0, მზესუმზირა (თესლი და ზეთი), სიმინდის მარცვალი, რაფსი (მარცვალი, ზეთი), პურეულის მარცვალი - 0.1,ავოკადო, კაკაო- მარცვალი, ,გოგრა, ნესვი, საზამთრო, მოცხარი (წითელი, შავი)-0,2***, ციტრუსები-5,0***, სტაფილო, ბამბა(თესლი), ბარდა ახალი აქერცლილი,	აპრონ გოლდი, მაქსიმ გოლდი (213), რიდომილ გოლდი მც (111), აპრონი იქს ლ 350 წე, რიდომილი გოლდ პლიუსი (165), სერტიკორი (173)

							სოია (მარცვალი (მშრალი)-0,05***, სოია (მარცვალი, ზეთი)0,1, სალათა თავხვეული -2,0***, არაქისი, წიწაკა, ხილი თესლოვანი-1,0***, წიწაკა ჩილი (მშრალი)-10,0***	
141	მიკლოზუტანილი	0.3*	აწ	0.05/ (საერთ.)	/0.7	/0.003	ბანანი, ხმელი სვია, კურკოვანი ხილი-2.0***; ყურძენი-1.0***; შავი მოცხარი, თესლოვანი ხილი-0.5***; პამიდორი-0.3***; ქლიავი (შავი ქლიავის ჩათვლით)-0.2***; ხენდრო-0.1***; მრკ-ს ხორცი, სუბპროდუქტები, რძე, ფრინველის სუბპროდუქტები და კვერცხი-0.01***	ნიმბუსი 24 ეკ. მიკლოფილი, განზო
142	მინერალური ზეთი თითისტარა ზეთი პარაფინის ზეთი	 ნა	ნა 0.3	 ნა	 10 (ნახშირ. მიხედვით) 5.0	ნა 0.05	ნა 0.01	ტრინოლი-2, ჰექტოლინეუმი, კორუმ იაზლიკ იაგი, აგრომინერალ თილი, კომპრადორ თილი (83), ეფდალ სუნოლი ეფედორ თილი, სიპკამოლი ე, ინსექტიციდი ქეი, ეკო თილ სპრეი, სპრეი თილი 11E, ინსექტოილი, კუპონ 800, ოლეოლუკი ოვიპრონი
143	მცპა	0.002	/0.04	0.003/ (ორგ.)	1.0/	/0.001	პურეული მარცვლეულის მარცვალი, ბარდა, ფეტვი, სელი, ბრინჯი, კარტოფილი, მზესუმზირა (ზეთი)-0.05	ხვასტოქსი, ჰორმა (2), დისერბონ კნ (2)
144	ნაპროპამიდი	0.015	აწ	1.0/ (ორგ.)	აწ	აწ	მზესუმზირა (თესლი)-0.15*, მზესუმზირა (ზეთი)-0.05*, პამიდორი, კიტრი, ყაბაყი, გოგრა-0.1*, თამბაქო-1.0*	დევერინოლი
145	ნატრიუმის იოდოსულფურონ-მეთილი	0.03	ნა	0.001/ (საერთ.+ორგ.)	/1.0	აწ	პურეულის მარცვალი-0.1, სიმინდი (მარცვალი) -0.2	გროდილ მაქსი (22), მაისტერი (223), მაისტერ პაუერი (, 223, 75 ¹ , 239 ¹), ვიკილისი (111 ¹)
146	ნატრიუმის ფოსფიტი							მილდიკატი (232 ²)
147	ნეონოლი	ნა	ნა	ნა	/3.0	ნა	ნა	რიმექსი

148	ნიკოსულფურონი	0.2	/0.2	0.004/ (ორგ.)	5.0/(ა)	/0.02	სიმიინდი (მარცვალი) -0.2, სიმიინდი (ზეთი)-0.1	სამსონი, ელიმინატორი, ნიკოში, ნიკოფურონი, ნიკოგანი, ვოიაჟი, ჰექტორ მაქსი (51, 160), სულფონი, იკანოსი, სამსონი ექსტრა 6 ზდ, ელუმისი (112), მილადარი, დუბლონ გოლდი (180), ფულსპიდი, ეფდალ ალსონი, კალსონი, სანსტეპი, ნიფურონი, ვეინი, ნიკონი, გავან ექსტრა, მაჩეტე, ალატანი (112)
149	ოქსადიქსილი	0.06	/0.4	0.01/ (ორგ.)	5.0/	/0.05	კარტოფილი-0.1, ნედლი სვია-0.25, ყურძენი, პამიდორი-0.5, შაქრის ჭარხალი-1.0*, ხილი (თესლოვანი)-0.5*, თამბაქო, კიტრი, ხახვი-0.04	ოქსიხომი (165), ავიქსილი(66)
150	ოქსათიპიპროლინი	ან	ან	0,006/ (საერ.)	/1,0	/0,003	ან	ზორვეკი ვინაზელი (722)
151	ოქსამილი	0.009*	ან	ან	/0.01	ან	პამიდორი, კიტრი-2,0*, შაქრის ჭარხალი-0.1*, ხმელი სვია-1.0*, არაქისი-0,05***, კარტოფილი, სტაფილო-0,1***, ბამბა (თესლი)-0,2***, ნესვი, წიწკა ტკბილი და მიხაკისებრი-2,0***, ციტრუსები-5,0***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა), სუპროდუქტები მრკ, თხის, ცხენის, ღორის, ცხვრის, რძე, ხორცი, კვერცხი და სუპროდუქტები ფრინველის-0,02***	ვიდატი, ვიდატი 10 ლ
152	ოქსიფლუორფენი	0.003	/0.2	0.02 (org.)	/1.0	/0.001	ხილი (თესლოვანი), ხახვი, მზესუმზირა (თესლი,ზეთი) - 0.2	გოალი, გალაქსი, გალიგანი, პექსი, კოლტარი, პაროქსიფენი, ეფდალ ოქმოსტი, ექსტრა, პაროქსი
153	პაკლობუტრაზოლი	0,1	ან	ან	0,1	ან	ნა	ზონზი
154	პიდიფლუმეტოფენი	0,055	0,2	0,1	0,1	0,01	ყურძენი -2,0, პამიდორი - 1,0, ტყის მარწყვი-3,0***	მორავის დუო (60), მორავის პრაიმი (213)
155	პენდიმეტალინი	0.008	/0.15	0.05/ (ორგ.)	0.5/	/0.008	სოიო (თესლი და ზეთი), ნიორი, თამბაქო, ხმელი სვია-0.1*, პამიდორი, კიტრი-0.05*, ხახვი, კომბოსტო, ოხრახუმი, ბამბა (ზეთი)-0.05, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.1, სტაფილო-0,2, პარკოსნების ნარევი-0,01*	სტომპი, ვალსატოპი, სტოპი, პანდორა, პენდიგანი, სპონსორი, ჰერბიმატი , პანდა, ეფდალ პენალინი, ალკანსე (100), რესორტი, დრაგო, რეიკერი
156	პენთიოპირადი	0.13	/0.9	0.02/ (საერთ.)	/0.8	/0.02	ხილი (თესლოვანი)-0.5	აფეთი
157	პენკონაზოლი	0.03*	01/	0.003/ (საერთ.)	/0.8	/0.01	კიტრი, საზამთრო-0.1, პამიდორი-0.2*, ხილი (თესლოვანი), ნესვი-0.2, ყურძენი, ხილი (კურკოვანი)-0.3, ვაშლატამა, ატამი-0,05***, კენკრა-0.5, პურეულთა მარცვალი-0.005, ქიშიში-	ტოპაზი, პრეფექტო, პინაკლი, პენფორსი, კობუზი, ტოპკონაზოლი, ეფექტი, პესოსი, ეფდალ პეკოზოლი, პენკილერი, ფულპასი, ჯეკ პოტი (60), ერპლანტი, მენტა ინოქსი, ფობოსი, პენტოსი, პერმიტი, რადარ კომბი ფლო (44)

							სვია ხმელი-0,5***, ხორცი და სუბპროდუქტები მრპ, ფრინველის ხორცი და კვერცხი -0,05***, რძე- 0,01***	
158	პენფლუფენი	0,04	0,1	0,01 (საერთ)	1,0	0,01	კარტოფილი-0,01	ემესტო კვანტუმი (99)
159	პენციკურონი	0.02	/0.2	0.015/ (საერთ.)	/0.6	/0.003	კარტოფილი-0.1	პრესტიჟი (83), პრემიუმი (83)
160	ვერმეტრინი (ამოღებულია ხმარებიდან)	0.05	/0.05	0.07/ (ს.-ტ.)	0.5/	0.07 (მ.-ე.) 0.02 (ს.-ს.)	კაკალი (ნუში, არაქისი)- 0.1***; სატაცური-1.0***; პარკოსნები (ხმელი)-0.1***; მშრალი სვია-50.0***; ხოხნოტა (პირმუშხა)- 0.5***; კომბოსტო (ყველა სახეობის)-5.0***; ხახვი- 0.5***; სალათა თავხვეულა-2.0***; კიტრი (კორნიშონის ჩათვლით)- 0.5; პამიდორი-1.0; კარტოფილი-0.05; სტაფილო-0.1***; შაქრის ჭარხალი-0.05; წიწაკა-1.0; ნიახური-2.0***; ბადრიჯანი-1.0***; ისპანახი-2.0***; ბროკოლი- 0.1***; ციტრუსოვნები- 0.5***; კივი-2.0***; კენკროვნები (ხურტკმელი, ხენდრო, მაყვალი)-2.0; ყურძენი-2.0; ნესვი-0.1; გოგრა-0.5***; პურელის მარცვლოვნები-2.0; მზესუმზირა (თესლი)-1.0; მზესუმზირა (ზეთი საკვები და გაუსუფთავებელი)-1.0; სიმინდი ტკბილი (მარცვალი)-0.1; სოიო პარკოსნები (ხმელი)-0.05; სიმინდი ტკბილი (მარცვალი)0.1; სოიო პარკოსნები (ხმელი)-0.05; გაუსუფთავებელი სოიოს ზეთი-0.1; ყავა (პარკოსნები)-0.05***; პარკოსნები (მთლიანი პარკები ან/და უმწიფარი მარცვლები)-1.0***; რაფსი (მარცვალი)-0.05***; ბამბა (თესლი)-0.5***; ბამბა (საკვები ზეთი)-0.1; სოკო- 0.1***; ზეთისხილი-1.0***; ბარდა ახალი გაქერცილი-0.1*; წიწაკა ჩილე (ხმელი)-10.0***; ფისტა-0.05***; ხილი თესლოვანი და კურკოვანი-2.0; ჩაი მწვანე და შავი (ფერმენტირებული და გამომშრალი)-20.0***; ხორბლის ქატო-5.0***;	ვისმეტრინი, როვიკურტი

							თავთუხის ფქვილი-0.5***; ხორბლის აღმონაცენი-2.0***; მსხვილმარცვლოვანი ხორბლის ფქვილი-2.0***; ბრინჯი-0.01, ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-1.0***; კვერცხი-0.1***; ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.1***; ფრინველის ხორცი-0.1***	
161	პიმეტროზინი	0, 03	0, 07	0. 01/ (საერთ.)	/1, 0	/0.001	რაფსი (თესლი, ზეთი)-0.02, პამიდორი -0.5, კიტრი-1, 0, კარტოფილი-0, 02	პლენუმი 500 წდგრ
162	პინოქსადენი	0,05	/1.5	0,002/ (ორგ.)	/1.0	/0,02	პურეულის მარცვალი – 1.0	აქსიალი, აქსიალი 50 ეკ
163	პირაკლოსტრობინი	0.03	/0.2	0.01 (საერთ.)	/1.0	/0.01	ყურძენი-2.0; თესლოვანი ხილი-0.5; პურეულის მარცვლოვნები-0.5; სიმინდი (მარცვალი, ზეთი), სოიო (ზეთი)-0.02; სოიო (პარკოსნები)-0.05; მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.3; ნუში გაუწმენდავი, თავხვეულა სალათა, ჟოლო (წითელი, მავი)-2.0***; ნუში გაწმენდილი, ზანანი, არაქისი გაუწმენდავი, ბარდა (პარკი, უმწიფარი თესლი), პეკანი-0.02***; პარკოსნები (ხმელი), კომბოსტო (ყველა სახეობის)-0.3***; კანტალუპა (მუსკუსის ნესვი), ჭარხალი შაქრის-0.2***; კარტოფილი-0.2; პამიდორი-0.3; კიტრი-0.5; სტაფილო-0.5; გოლუმბიკა, ციტრუსოვნები, ფისტა, ხილი კურკოვანი-1.0***; ყავა (პარკოსნები), ბადრიჯანი, ბარდა (ხმელი), გოგრა ჩვეულებრივი, ოსპი (ხმელი) -0.5***; წიწაკა, ხენდრო-0.5***; ქიშმიში-5.0***; ნიორი, მანგო, პაპაია-0.05***; სვია (ხმელი)-15.0***; პრასი-0.7***; ხორცი ძუძუმწოვრების (ზღვის ცხოველების გარდა)-0,5***; ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები, ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები, კვერცხი-0.05***; რძე-0.03***	კაბრიო ტოპი(114) ტერსელი (53) სიგნუმი (36), ინშურ პერფორმი (188), რეტენგო, სეშენი (36), ბელისი (36), მალაქიტი (53)
164	პირაფლუფენეთილი	0, 2			0, 1		ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი), თხილი, კაკალი, კივი, ყურძენი, კარტოფილი-0, 02	კაბუკი

165	პირიდაზენი	0.008	/0.3	0.1/ (საერთ.)	0.4/	0.001/	ხილი (თესლოვანი)-0.2, ციტრუსი (რბილობი)-0.3	სანმაიტი, სამმაიტი, მაიტ კილერი, ეფდალ პირდენი, ლავანტე, ანტიკლემზ მაქსი (28, 146), ენიგმა
166	პირიდატი	0.02	/0.03	0.002/ (საერთ.)	/1.0	/0.01	სიმინდი-0.05	ლენტაგრანი
167	პირიმეტანილი	0.17-0.2	0.3	0.03	1.0	0.002	ხილი (თესლოვანი)-7,0, ხილი (კურკოვანი), ყურძენი-4,0, ვაშლის პიურე ხმელი-40,0***, გარგარი, პარკოსნები (პარკი და მოუმწიფარი თესლი), სალათა თავხვეული, ხახვი - ბატუნ-3,0***, ხახვი თავიანი, ნუში-0,2***, კენკრა (მარწყვის და ყოლოს ჩათვლით)-3,0, ციტრუსები-7,0***, ქლიავი-2,0***, ბანანი-0,1***, სტაფილო-1,0***, პამიდორი-0,7, კაკალი-0,5***, ქიშმიში (ყველა სახის)-5,0***, კარტოფილი-0,1, ბარდა ხმელი-0,5***, ყურძნისა და ვაშლის წვენი-0,002, ხორცი მუშუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)- 0,05***, რძე, სუბპროდუქტები-0,1***	ზატო სტარი 520 (190), ფლინტ სტარი (190), სკალა, რითმი, პრიუსი, მენტა პრელუდ, მალაქიტი (53)
168	პირიმიფოს-მეთილი	0.03*	0.5/ pH 5, 5 დროს-0.1/ (ტრ.)	0.01/	2.0/	0.03/ (მ.-ე.) 0.01 (ს.-ს.)	კენკროვნები, ქამა სოკო-0.004; ნესვი, წიწკა, ბადრიჯანი, შაქრის ჭარხალი-0.2*; თალგამურა, ტურნეპსი, კომბოსტო, ნიახური (მწვანელი), კურკოვანი ხილი, ყურძენი, ჩაი-0.5*; ციტრუსოვნები (რბილობი)-0.1*; კარტოფილი, ბროკოლი, ნიახური (ფესურები), სტაფილო-0.05*; ბრინჯი, თამბაქო-1.0*; ბარდა-5.0*; პამიდორი, კიტრი-0.2; პურეულის მარცვალი-7.0; ხორბლის გადაუმუშავებელი ქატო-15.0***; ფრინველის ხორცი-0.1; ფრინველის ღვიძლი-0.5; ხორცი მუშუმწოვრების (ზღვის ცხოველების გარდა), მუშუმწოვრების სუბპროდუქტები, ფრინველის სუბპროდუქტები (ღვიძლის გარდა), რძე-0.01***, კვერცხი-0.01;	აქტელიკი, ანტიკლემზ მაქსი (143, 28) , კორნილოფოსი
169	პირიპროქსიფენი	0.07	/0.4	0.01/ (საერთ.)	/1.0	/0.03	ხილი (თესლოვანი), კიტრი- 0.2, პომიდორი-1,0, ციტრუსები-0,5***, ბამბა (თესლი)-0,05***,	ადმირალი, ვენტო

							ბამბა (ზეთი)-0,01***, მრც-ს და თხის ხორცი და სუბპროდუქტები -0,01***	
170	პოლიჰექსამეთილენზიგ უანიდ ჰიდროქლორიდი	0,002	ნა	0,006/ (ს.ტ.)	/0,4	/0,004	კარტოფილი-0,2	ზერებრა აგრო (103 ¹)
171	პრომეტრინი	0.005	0.5 (ტ.რ.)	0.002/ (ს.-ტ.)	5.0/	/5.0	ძირა-0,1*, მწესუმზირა (თესლი, ზეთი), ქინძი, სიმინდი (თესლი, ზეთი), სოიო (თესლი და ზეთი), ბარდა, ნიორი, ლობიო, ოსპი-0.1, სტაფილო, კარტოფილი, ნიახური, კამა, ოხრახუში-0.02	გეზაგარდი, კოკო გოლდი (26), პრომოტრინი, პრომე გოლდი, ამეტრინი
172	პროკუინა-ზიდი	0,003	/0.1	0.006/ (საერთ.)	/1.0	/0.001	ყურმენი-0.5	ტალენდო
173	პროპამოვარბ ჰიდროქლორიდი	0.4*	/0.2	0.1/ (საერთ.)	/0.7	/0.07	კარტოფილი-0.3, ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით და გოგროვნები-5,0, სალათა თავხთეულა და ფოთლოვანი -15.0**, ბოლოკი-1.0**, ყვავილოვანი კომბოსტო-0,2***, ისპანახი-40,0***, ხახვი თავიანი-2,0, წიწაკა ჩილი (მშრალი)-10,0***, წიწაკა ტკბილი, მ.შ. მიხაკისებრი-3,0***, ბადრიჯანი-0,3***, პამიდორი, კიტრი -10,0, ვარდკაჭაჭა (ყლორტები)-2,0***, შაქრის ჭარხალი-0,01*, ხორცი და სუბპროდუქტები ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა) და ფრინველის, რძე, კვერცხი-0,01***	პრევიკური, ტატტუ (111), ინფინიტო (215), კონსენტო(195), პრევიკურ ენერჯი (20), ბოტრინი, პროპაკურ ნ, ეფდალ პროვარი, ევაკური, პრევენტი
174	პროპარგიტი	0.01	/0.4	0.002 (საერთ.)	/0.3	/0.02	სოიო (პარკოსნები, ზეთი)-0.1; ბამბა (ზეთი), კიტრი-0.2*; ხილი კურკოვანი-4.0*; ხილი თესლოვანი-3.0; ვაშლის წვენი-0.2***; ციტრუსოვნები-3.0*; ციტრუსოვნების რბილობი (ხმელი)-10.0***; ნუში-0.1***; პარკოსნები (ხმელი)-0.3*; ბარდა ხმელი-0.3*; ბამბა (თესლი)-0.1***; ყურმენი-7.0; ყურმენის წვენი-1.0***; ყველა სახეობის ქიშიში-12.0***; ხმელი სვია-100.0*; სიმინდი-0.1***; სიმინდის ფქვილი-0.2***; სიმინდი (გაუწმენდავი ზეთი)-0.7***; სიმინდი (საკვები ზეთი)-0.5***; არაქისი-0, 1***, არაქისის საკვები ზეთი-0.3***; კარტოფილი-0.03***; ჩაი მწვანე, შავი (გამომშრალი და ფერმენტირებული)-5.0***;	ომაიტი, ვალსარგიტი, საფმაიტი, პროპაფექტო, ომნუსი, 3, გოლდმაიტი, ეფდალ პრომეთე

							ჰამიდორი-2.0***, ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.1***; კვერცხი-0.1***; რძე, ძუძუმწოვრების და ფრინველის ხორცი, სუბპროდუქტები (ზღვის ცხოველების გარდა)-0.1***	
175	პროპახიზოფოპი	0.015	/0.15	0.001/ (საერთ.)	/1.0	/0.0003	ბამბა (ზეთი)-0.01, შაქრის ჰარხალი, რაფსი(მარცვალი, ზეთი)-0.1, კომბოსტო-0.2	აგილი
176	პროპიზამიდი	0.3	/0.2	0.3/	/0.5	/0.003	შაქრის ჰარხალი-0.1, ვარდკაჭაჭა სასალათე-1.0*	კერბი, ეფდალ პროკერპი
177	პროპიკონაზოლი	0.07	/0.2	0.15/ (ორგ.)	0.5/	0.01/(ს.-ს.) 0,03/(მ.-ე.)	პურეულის მარცვალი, შაქრის ჰარხალი,რაფსი (მარცვალი,ზეთი)-0.1, ქერი-0,2, სუფრის ჰარხალი-0.05, ყურძენი - 0.5, ბანანი-0.1***,კენკრა - 0,05, შტოში-0,3, ყავა (მარცვალი), პეკანი, ანანასი, შაქრის ლერწამი- 0,02***, სიმინდი, პოპკორნი, სიმინდი ტკბილი სუფრის (მოხარშული ტარო)- 0,05***, სოია (მარცვალი, ზეთი)-0,1, ძუძუმწოვართა ხორცი და სუბპროდუქტები (გარდა ზღვის ცხოველებისა), ქათმის ხორცი, კვერცხი, რძე-0,01***	ტილტი, ტილტი პრემიუმი, სანაზოლი, ალტო სუპერი (239), ტასპა(60), ტილტუსტ, ბამპერი 25, ჰარბორი (60), ბროდერი (60), ტირექსი (184), პროპკონაზოლი, ეფდალ დიფენპრო (60), პროკურე, ტოპკაზოლი
178	პროპინები	0.005 პროპილენ თიოშარდო ვანა-0.00001	აწ	აწ	0.5	0.002	ყურძენი, ყურძნის წვენი-0.002	ანტრაკოლი, ანტრაკოლ ზლაუ, მელოდი დუო (87), ფუნგიკინგი, საფაკოლი, საფაკოლ კომბი (235), პლაკოლი, კორუნები, ფავორიტი, ალგაკოლი, ეფდალ პრონები, ენერგოლ კომბი (235), ჰოსტრაკოლი, მაიოზი, ეფდალ პიროქსომი (235), იზოლპროპინები, მენტაკოლ კომბი (235), მენტაკოლი, ჰოსტრაკოლ კომბო (235)
179	პროსულფოკარბი	0,005	0,3	0,003	0,4	0,004	პურელ მარცვალში-0,002 კარტოფილი-0,05*	არკადე (122),
180	პროქლორაზი	0.01	/0.3	0.05/ (ს.-ტ.)	/0.1	/0.001	შაქრის ჰარხალი-0.1; პურეულის მარცვალი-2.0; ციტრუსოვნები-10.0***; სელის თესლი-0.05***; სოკო-3.0***; წიწაკა (შავი, თეთრი)-10.0***; მზესუმზირა (თესლი)- 0.5***; მზესუმზირა (ზეთი)-1.0***; რაფსი (მარცვალი)-0.7***; ქაბო (გადაუმუშავებელი)-7.0***; ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-10.0***; ხორცი ძუძუმწოვრების (ზღვის ცხოველების	სპორტაკი, ემსონი, ეფდალ ექზუმი

							გარდა)–0.5***; რძე–0.05***; ფრინველის ხორცი–0.05***; ფრინველის სუბპროდუქტები–0.2***; კვერცხი–0.1***	
181	პროციმბილონი	0.1*	/0.5	/0.004 (ს.-ტ.)	1.0/	/0.02	კიტრი, კორნიშონის ჩათვლით–2.0*; პამიდორი, ყურძენი–5.0*; პარკოსნები (სავსე პარკები ან/და უმწიფარი თესლი, მარცვალი, ახალგაზრდა პარკები)–3.0*; კომბოსტო (ყველა სახეობის), ხილი კურკოვანი (ქლიავი, ატამი, ალუბალი და სხვა)–10.0***; კენკროვნები–10.0***; ხილი თესლოვანი–1.0***; მზესუმზირა (თესლი), თავი ხახვი–0.2***; მზესუმზირა (ზეთი)–0.5***; თავხვეულა სალათა, წიწაკა–5.0***; წიწაკა ჩილე (ხმელი)–50.0***	სუმილექსი
182	პროპექსადიონ-კალციუმი	0,2	0,3	0,03	1,0	0,02	ვამლი-0,1, დანარჩენი კვების პროდუქტები-1,0	რეგალისი, რეგალის +
183	რიმსულფურონი	0.02	/0.03	0.002/ (საერთ.)	1.5	/0.02	სიმინდი (მარცვალი), კარტოფილი–0.01, სიმინდი(ზეთი)–0.02, პამიდორი–0.05	ტიტუსი, მაისი, პილოტი, რიმექსი, ჰექტორ მაქსი (51,132), ესკუდო, ვიდაგერი, აისი (51), არპადი, ტიტანი
184	რკინის (II) სულფატი	ან	ან	0,3 (რკინის მიხედვით)	6 (რკინის მიხედვით)	0,007 (რკინის მიხედვით)	საკლავი ცხოველების ცხიმ-ნედლეული, შპიკი, თევზის ქონი, ცხოველური ცხიმები, გადამდნარი ცხიმები, კარაქი–5,0	რკინის შაბიამანი
185	S -მეთილის აციბენზოლარი (ზენდიკარი)	0,03/	/0,2	0,005/ (ორგ)	/0,8	/0,001	პამიდორი–0,9**, ბადრიჯანი–0,01**, სალათა–0,3**, ნესვი–0,01**, პურელის მარცვალი–0,1	ბიონი
186	სეტოქსიდიმი	0.1	/0.2	0.04 (საერთ.) (ორგ.)	/1.0	/0.08	შაქრის ჭარხალი, სოიო (თესლი და ზეთი)–0.1, ციტრუსოვნები, სტაფილო–0.02, კომბოსტო–0.03, ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი), ყურძენი–0.05*	ნაბუ, პოასტი
187	სპილენძამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი	0.1	ან	ან	/1.0	ან	ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი)–5, მარწყვი–5, ყურძენი– 5	კოპერ-ქაუნთ- N
188	სპილენძის (1) ოქსიდი	0.17 (სპილენ- ძით)	3.0/	1.0/(ორგ.)	0.5/	0.0008/	კარტოფილი–2.0, ხილი თესლოვანი და კურკოვანი,, პამიდორი, კიტრი, ხახვი, ბოსტნეული, შაქრის ჭარხალი, ყურძენი, კენკროვნები, ბაღრეული–5.0, ციტრუსები–20,0, ხმელი სვია–10.0*, კვერცხი, ხორცი–2.0	ნორდოქსი
189	სპილენძის სამკაპროლა	0.06	ნა	0.03/ (ს.ტ.)	2.0/	ნა	შაქრის ჭარხალი –	კარტოციდი

	ქტამდიქლორიდმონოჰიდრატი						0.5,პამიდორი, ხახვი, სტაფილო, ვაშლი, ყურძენი-0.15, კარტოფილი-1.0, ციტრუსი-0.002	
190	სპილენძის სულფატი	0.17 (სპილენძით)	3.0/	1.0/(org.)	0.5/	0.0008/	კარტოფილი-2.0; ხმელი სვია-10.0*; თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, პამიდორი, კენკროვნები, ყურძენი, შაქრის ჭარხალი, კიტრი, ხახვი, ბოსტნეული, ბაღჩეული-5.0; ციტრუსოვნები-20.0, კვერცხი, ხორცი-2.0;	ბორდოს სითხე, კუპროქსატი, სპილენძის შაბიამანი, , კუპერვალი, კუპერვალი ბლუ, ჰექტამ ბორდო, კუპროსულფი, ბორდოს ნარევი მაქსი, კუპერტინ სუპერი (235), საფა ბორდოს ნარევი, პოლტიგლია 20 სფ, ბორდოფლო ნიუ, კუპერ სულფატ პენტაჰიდრატი, კუპროფიქს 30 დისპერს(111), ბორდოს ნარევი 20% სფ, სპილენძის შაბიამანი ფ, ბლუ ბორდო დისპერს, ბორდო სალდეგო 20%, ეფდალ მოკანი(235), იზოლბლუბორდომიქსი, პოლტიგლია მანიკა წდგრ, ბორდო კავარო ბლუ, ბორეკავი, პოლიმეტ ბორდო, სულკალი, ეფდალ გოზტაში, ეფდალ ბაქსული, ბორდოს ნარევი 15%, ტან გოზტაში, ბლუ დროპ
191	სპილენძის ქლორჟანგი	0.17 (სპილენძით)	3.0/	1.0/ (ორგ.)	0.5/	0.0008/	კარტოფილი-2.0; ხმელი სვია-10.0*; თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, პამიდორი, კენკროვნები, ყურძენი, შაქრის ჭარხალი, კიტრი, ხახვი, ბოსტნეული, ბაღჩეული-5.0; ციტრუსოვნები-20.0, კვერცხი, ხორცი-2.0;	სპილენძის ქლორჟანგი, ოქსიზომი (133), პოლიზომი (66), ტუბარიდი (115), კურზატი რ (235), აზიგა პიკი, სუპერ კოპერი, მელოდი კომპაქტი (88), კუპროკავარო, კუპროფლო, ნეორამი, ჰექტამ ბაკირი, ექსპერტ ტიმი (235), ციხომ ბლუ (230), რაპიდ გოლდი პლიუსი (111, 235), კუპერ მაქსი, აირონი (166), ფაიტერ ბლუ (57), ოსსიქლორი 50 სფ. რიდომილი გოლდ პლიუსი (125), , სქაინერი (230), პერგადო C (110), ორდანი (235), მეტკუპერი (115). ოსსიქლორი 35 წზგრ, ზესტ ბაკირი, ეფდალ ბაკიროქსი, კუპროტანი, კუპერ 88, კუპრაბლუ, კუპრექსი (115), რამინი
192	სპილენძის ჰიდროქსიდი	0.17 (სპილენძით)	3.0/	0.1/ (ს.-ტ.)	0.5/	0.0008	კარტოფილი-2.0; ხმელი სვია-10.0*; თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, პამიდორი, კენკროვნები, ყურძენი, შაქრის ჭარხალი, კიტრი, ხახვი, ბოსტნეული, ბაღჩეული-5.0; ციტრუსოვნები-20.0, კვერცხი, ხორცი-2.0;	კოსაიდი 2000, კონსული, ჩემპიონი, იროკო, პროტექტ-ოაშ, აირონი (165), კაურიტილი (114), ზელპი, პროტექტი, გარტი, ჰიდრომიკრონი, ჰელიოკუივრი, კუპერ ჩემპიონი, ეფდალ ბაროქსი, ბლუფოქსი (116)
193	სპინოსინი A+ D	0.02*	0.1	0.11/ (ორგ.)	1.0	0.002	კიტრი-1.0; წიწაკა-2.0; კარტოფილი-0.5; ნუში ჩენწოში-2.0***; ნუში-0.01***; ხილი თესლოვანი-0.1***; ნიახური-2.0***; პურეულის მარცვალი-1.0***; ციტრუსოვნები-0.3***; ბამბის თესლი-0.01***; ბამბის ზეთი	სპინტორი

							საკვები-0.01***; ყურძენი-0.5***; ქიშმიშის ყველა სახეობა-1.0***; კივი-0.05***; ფოთლოვანი ბოსტნეული-10.0***; სოიოს პარკოსნები (ხმელი)-0.01***; წიწაკა ჩილე (ხმელი)-3.0***; ხილი კურკოვანი-0.2***; პამიდორი-0.3***; ხორბლის გადაუმუშავებელი ქატო-2.0***; კომბოსტო (თავხვეულა, ყვავილოვანი)-2.0***; მრკ-ს თირკმელები-1.0***; მრკ-ს ღვიძლი-2.0***; მრკ-ს ხორცი-3.0***; მრკ-ს რძე-1.0***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-2.0***; ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.5***; მრკ-ს რძის ცხიმი-5.0***; კვერცხი-0.01***; ფრინველის ხორცი-0.2***	
194	სპიროდიკლოფენი	0.01*	ან	ან	ან	ან	ციტრუსოვნები-0.4***; კიტრი კორნიშონის ჩათვლით-0.07***; მოცხარი (წითელი, შავი, თეთრი), ხენდრო-2.0***; ქიშმიში-0.3***; პაპაია, ყავა (პარკოსნები)-0.03***; წიწაკა ტკბილი (ესპანური წიწაკის და წიწაკისებრის ჩათვლით), ყურძენი-0.2***; ხილი თესლოვანი-0.8***; ხილი კურკოვანი, პამიდორი-0.5***; სვია ხმელი-40.0*; ხის კაკალი, ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.05***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-0.01***; რძე-0.004***	ენვიდორი, სმაჩი, კონტიერი
195	სპიროტეტრამატი	0.5	ან	ან	ან	ან	ციტრუსები,თესლოვანი ხეხილი-1,0,კურკოვანი ხეხილი-3,0, კომბოსტო, წიწაკა, პამიდორი-2,0, კიტრი-0,2, ყურძენი-2,0, სვია-15,0, ფოთლოვანი ბოსტნეული -7,0	მოვენტო
196	სპირომესიფენი	0, 03	0, 01	0.05 მკგ/ლ (საერთ.)	0, 01	0, 01	ვაშლი-0, 02, ბოსტნეული-0.3, ნესვი-0.1, კიტრი-0.2, ლობიო, მარწყვი-1	ობერონი, ობერონ რაპიდი (17)
197	სპიროქსამინი	0.025	/0.4	0.002/ (ორგ.)	0.2/ (აზ.)	0.01/ (მ.-ე.) 0.003/ (ს.-ს.) (აზ.)	ყურძენი -2.0, ბრინჯი-0.2*, პურეულის მარცვალი -0.2, შაქრის ჭარხალი-0.1	ფალკონი (173, 183), პროსპერი
198	ტაუ-ფლუვა-ლინატი	0.01	/0.01	0.002/ (საერთ.)	/0.1	/0.001	ხილი (თესლოვანი), კიტრი, ყურძენი -0.2, პურეულის მარცვალი, სოიო (თესლი,ზეთი)-.	მავრიკი 240

							0.01,ხილი (კურკოვანი)- 0.01*, რაფსი (თესლი, ზეთი), კარტოფილი, პამიდორი-0.1	
199	ტებუკონაზოლი	0.03	/0.4	0.025/ (საერთ.)	0.3/ (ა)	/0.01 (მ.ე.) 0.003/ (ს.-ს.)	პურეულის მარცვალი(ქერი, ჭვავი, ხორბალი, მგრი და სხვ.), ფეტვი, მზესუმზირა (თესლი,ზეთი)-0.2, ყურძენი-2.0, სიმინდი (მარცვალი, ზეთი), სელი ზეთოვანი (თესლი, ზეთი), სოიო (მარცვალი,ზეთი), შაქრის ჭარხალი-0.1, რაფსი (მარცვალი)-0.5, რაფსი (ზეთი)-0.3, გოგრა-0,02***, ბარდა, ბრინჯი-2.0, პამიდორი, კიტრი-0,2***, ბანანი-0,05***, ხილი კურკოვანი (ალუბალი, ატამი)-1,0***, ყავა (მარცვალი)-0,1***, ყავა (მარცვალი მოხალული)-0,5***, ქიმიში-3,0***, სვია ხმელი-30,0***, არაქისი-0,05***, წიწაკა ჩილი (ხმელი),წიწაკა ტკბილი (მიხაკისებრის ჩათვლით)-0,5***, ხილი (თესლოვანი) -0,5***, მრკ სუბპროდუქტები -0,05***, მუშუმწოვართა ხორცი (გარდა ზღვის ცხოველებისა), ქათმის ხორცი და სუბპროდუქტები, კვერცხი-0,05***, რძე-0,01***	ფოლიკური, ფოლიკური ბტ (184), ფოლიკური ე (63), რაქსილი, რაქსილი თ (77), ფალკონი (173, 183), მისტიკი, როდოლიტი, როდოლიტი სუპერი, როდოლიტი ექსტრა, ორიუსული (44), ნატივო 75 (190), ტეზიკური, უნიკორნი (44), გიზმო, რუბინი, ტეზიკი, რაქსილი ულტრა, არბალეტი, სერტიკორი (125), მისტიკი 250 წზე, ჯენსილი, ჰექსილი, ეფდალ ტეზიქსილი, ეფდალ ტეზიქსილი, ბეტკური, მუსტანგი, კუსტოდია (18), ბენელუსი (238), ავალონი, აქსიომა (217), პლაიერ კომბი (44), ოლიმპუს
200	ტებუფენპირადი	0.01	/0, 4	0, 01/ (საერთ.)	/0, 5	/0, 0001	ბოსტნეული-0.5, ხილი (თესლოვანი)-0.2, ყურძენი-0.5, ყურძნის წვენი, ღვინო-0.1	მსაი, ტალავი, ეფდალ ტეზიქსი, იაკუზა, სელდონი, კონილი 2 ფთმ, პირატი
201	(ამოღებულია 27.11.2018, №2-953)	-						
202	ტერბუტილაზინი	0.003	/0.04 (ტრ.)	0.005/ (ს.-ტ)	/1.0	/0.002	ხილი (თესლოვანები), ყურძენი, ციტრუსი (რბილობი), მზესუმზირა (თესლი)-0.1, მზესუმზირა(ზეთი), კარტოფილი-0.05 , სიმინდი (მარცვალი, ზეთი)-0,1	ტოპოგარდი (176), ლუმაქსი (112, 120), ზეგრანი (38), სამბა (120)
203	ტერბუტრინი	0.03	/0.3	0.01 /(საერთ.)	/0. 5	/0.01	პურეულის მარცვალი, კარტოფილი-0.1	იგრანი, ტოპოგარდი (175)
204	ტეტრაკონა-ზოლი	0.003	/0.4	0.01 /(საერთ.)	/0.06	/0.003	პარეულის მარცვალი -0.2, შაქრის ჭარხალი-0,05	დომარკი
205	ტეფლუტრინი	0,005	0,14	0,02	0,07	0,0005	შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა(ზეთი), სიმინდი -0,05, კარტოფილი-0.01	ფორსე 1,5
206	ტეფლუბენზურონი	0.01*	ა5	ა5	ა5	ა5	კომბოსტო (ყველა სახეობის)-0.5***; ხილი კურკოვანი-0.1***; ხილი თესლოვანი-1.0***;	ნომოლტი

							კარტოფილი-0.05***	
207	ტიფენსულფურონ-მეთილი	0,01	/0,07	0,01 (საერთ.)	/2.0	/0,01	პურელის მარცვალი, სელი(ზეთი)-0,5, სიმინდი (მარცვალი)-0,02, სოია (მარცვალი, ზეთი)-0,02	ფორმულა, დუბლონ გოლდი (132)
208	ტოლიფლუანიდი	0.08*	/0.25	0.0005/	/1.0	/0.005	ხილი თესლოვანი-5.0; კიტრი-1.0; ყურძენი-3.0; ყოლო, ხენდრო, მაყვალი-5.0; მოცხარი (შავი, წითელი, თეთრი)-0.5*; პამიდორი-3.0; ხმელი სვია-50.0***; პრასი-2.0***; სალათა-ლატუკი (თავხვეულა)-15.0***; წიწკა ჩილე (ხმელი)-20.0***; წიწკა ტკბილი, მიხაკისებრი წიწკის ჩათვლით-2.0***	ეუპარენი მულტი
209	ტოპრამეზონი	0.002	/0.04	0.02 (საერთ.)	/0.8	/0.002	სიმინდი (მარცვალი, ზეთი)-0,1 , დანარჩენი კვების პროდუქტები - 0,002	სტელლარი (51)
210	ტრიადიმენოლი	0.03	0.02/ (ტრ.)	/0.002/ (საერთ.)	0.5/	0.07/ (მ.ე.) 0.01 (ს.ს.)	პურელის მარცვალი-0.2, ფეტვი-0.02*, ყურძენი-2.0, ბრინჯი-0.2, კიტრი, პამიდორი-0,1, ხილი (თესლოვნები)-0.3, შაქრის ჭარხალი-0.1, ანანასი-5,0**, არტიშოკი-0,7***, ბანანი-1,0***, ყავა (მარცვალი)-0,5***, კენკრა-0,7***, ქიშმიში-10,0***, ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით-1,0***, გოგრა-0,2***, წიწკა ჩილის (ხმელი)-5,0***, სუბპროდუქტები \ძუძუმწოვართა-0,07***, კვერცხი-0,01***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0,02***, რძე-0,01***, ხორცი და სუბპროდუქტები ფრინველის-0,01***	ბაიტან უნივერსალი (79), ფალკონი (171,173), შავიტი 71.5 (221), ტრიმაქსი, ბიომკა, შავიტი ფ წხგრ (221)
211	ტრიადიმეფონი	0.03	0.03/ (ტრ.)	0.02 (ს.-ტ.)	0.5/	0.05/(მ.ე.) 0.02 (ს.-ს.)	პურელის მარცვალი, შაქრის ჭარხალი, კიტრი, პამიდორი-0.5, ხილი ((თესლოვანი)-0,3, ხილი (კურკოვანი) -0,05 , ანანასი-3,0**, არტიშოკი-0,7***, ბანანი-1,0***, ყავა (მარცვალი)-0,8***, კენკრა-0,7*, მსხმოიარე ბოსტნეული-1,0****, ნესვი -0.05, გოგრა-0,2***, წიწკა ჩილი ხმელი-5,0***, ყურძენი-0.1, ქიშმიში-10,0***, ფეიხოა-0.02 , ბრინჯი-0,2, სუბპროდუქტები \ძუძუმწოვართა-0,01***, კვერცხი-0,01***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა	ზაზოცენი (66), აზოცენი , ბაილეტონი, ფოლიკურ ბტ (173), ვალსატონი, აგსტარი 250 ეკ, ტირექსი(154), ბაისტარი

							ზღვის ცხოველებისა)- 0,02***, რძე-0,01***, ხორცი და სუბპროდუქტები ფრინველის-0,01***	
212	ტრიალატი	0.005	/0.05	0.03/ (ორგ.)	1.0/	/0.003	პურეულის მარცვალი- 0.05, პარკოსნების მარცვალი-0.05*	ტრიალატი, ავადექსი ზვ,
213	ტრიასულ-ფურონი	0.005	/0.1	0.004/	/2.0	/0.004	პურეულის მარცვალი-0.1	ტრეზორი (2), ლინტური(51), ლოგრანი
214	ტრიბენურონ -მეთილი	0.01	/0.01	0.06/ (საერთ.)	5.0/	0.05/(მ.ე. 0.02 (ს.ს.)	მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.02, პურეულის მარცვალი -0.01	გრანსტარი, ტრუი, გრანლენდი, ექსპრესი, კორიდა. რიმაქსი (51). აისი, ნერო, მისი
215	ტრიტერპენის მჟავები							ნოვოსილი
	ტრიტიკონა-ზოლი	0.005	/0.1	0.001/(საერთ.)	/0.8	/0.01	პურეულის მარცვალი- 0.04; სიმინდი (მარცვალი), ფეტვი (მარცვალი)-0.1, სიმინდი (ზეთი)-0.002	კორიოლისი , ინშურ პერფორმი (192)
216	ტრიტოსულფურონი	0,06	0,04	0,005	1,0	0,03	მარცვლოვნების მარცვალი-0,01	სერტო პლიუსი (51)
217	ტრიფლოქსისტრობინი	0.04*	/0.2	0.03/ (საერთ.)	/1.0	/0.02	ხილი(თესლოვანი)-0, 5, ჭარხალი შაქრის -0.05***, პურეულის მარცვალი- 0.5***, ხილი (კურკოვანი)- 1, 0***, პამიდორი, ბადრიჯანი, მარწყვი, ციტრუსები-0.7***, ციტრუსების რბილობი ხმელი-1, 0***, ხახვი და პრასი-0, 7***, კაკალი-0, 02***, ნუში-3, 0***, მიწის თხილი-0, 02*, ყურძენი-5, 0, ქიშმიში-5, 0***, ბანანი-0, 5**, ნიახური-1.0***, სალათა -10, 0**, სტაფილო-0.1***, კარტოფილი-0.02***, კომბოსტო ყველა სახის-0, 5***, წიწაკა ტკბილი მიხაკისებრის ჩათვლით- - 0, 3***, ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით (კიტრი, კორნიშონი, ყაბახი, პატისონი)-0, 2**, წიწაკა, მწვანე ზეთისხილი, ბახჩეული კულტურები (საზამთრო, ნესვი, გოგრა)- 0, 3**, სვია ხმელი-40, 0*, მელისა-0, 1***, ბრინჯი-5, 0***, სიმინდი-0, 02***, თირკმელები მრკ, თხის, ლორის, ცხვრის-0, 04***, ღვინძო მრკ, თხის, ლორის, ცხვრის-0, 05***, კვერცხი-0, 04***, ფრინველის ხორცი და მისი სუბპროდუქტები საკვები-0, 04***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა)-0, 05***, რძე-0, 02*	ზატო, ზატო სტარი (145), ნატვიო 75 (173), ფლინტი, ფლინტი სტარი (145), ტრიდე, რიფიტი, ლუნა სენსიტივენ სკ 500 (216), ევდალ ლოქსბინი, გურადორი
218	ტრიფლუმურონი	0,014	აწ	აწ	აწ	აწ	ვაშლი, მსხალი-0,5, ატამი, კლიავი, გარგარი-1,0, ყურძენი-0,2	ალსისტინი 480 სკ
219	ტრიფლურალინი	0.01	/0.1	0.02/ (ს.ტ.)	3.0/	/0.01	სტაფილო -0.01*, ბამბა	ნიტრანი, ტრეფლანი,

							(ზეთი), საზამთრო-0.25*, მზესუმზირა (თესლი და ზეთი), სოიო (თესლი და ზეთი), კომბოსტო, პამიდორი, კიტრი, თამბაქო, ნიორი, ბადრიჯანი, წიწაკა, ხახვი- 0.1, ოხრახუში -0.01, თამბაქო-0.5, რაფსი (მარცვალი, ზეთი)-0.1	ტრიფლურალინი
220	ტრიფორინი	0.02*	/0.03	0.02/ (ორგ.)	1.0/	/0.2	ხილი თესლოვანი-2.0*; ყურძენი-0.01*; კიტრი-0.1; გოლუბიკა, ხენდრო, ხურტკმელი, მოცხარი- 1.0***; ალუბალი, ქლიავი- 2.0***; ატამი-5.0***; პამიდორი-0.5***; პურელის მარცვლოვნები-0.1***; პარკოსნები (პარკი და/ან უმწიფარი თესლები)- 1.0***; ზოსტნეული საკვებნაყოფიანი, გოგროვანი-0.5***	საპროლი
221	ფამოქსადონი	0.01	/0.1	0.01/ (საერთ.)	/1.0	/0.01	კარტოფილი -0.05, პამიდორი-0.2, ყურძენი- 0.25, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.1, ხახვი-1.0	იტერალი (235), კლიპი (111), ტანოსი (235), პითიო პრო (235)
222	ფენაზახინი	0.005	/0.2	0.001/	/0.3	/0.007	ხილი (თესლოვნები) -0.2, ყურძენი-0.01	დემიტანი
223	ფენამიდონი	0.03	/0.1	0.003/ (საერთ.)	/1.0	/0.01	პამიდორი-0.5, კარტოფილი-0.03	კონსენტო(150)
224	ფენამიფოსი	0,0008*	ან	ან	ან	ან	ვაშლი, ნესვი, ბანანი, კომბოსტო ბრიუსელის და თავხვეული, ზამბა (თესლი) არაქისი, ზამბის და არაქისის ზეთი არარაფინირებული-0,05***, ხორცი და სუბპროდუქტები ფრინველის და ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა), კვერცხი-0,01***, რძე- 0,005***	ეფდალ ფენოსი 400 ეკ
225	ფენარიმოლი	0.01*	0.04/	0.00002/ (საერთ.)	/1.0	/0.004	ხილი თესლოვანი, ყურძენი-0.3; ვაშლის კოპტონი, სვია, წიწაკა ჩილე (ხმელი)-5.0***; დასათესი არტიშოკი- 0.1***; ბანანი, ქიშმიში- 0.2***; მრკ-ს ხორცი და თირკმელები, პეკანი- 0.02***; მრკ-ს ღვიძლი, ნესვი-0.05***; ალუბალი, ხენდრო-1.0***; ატამი, წიწაკა ტკბილი (მიხაკისებრი წიწაკის ჩათვლით)-0.5***	რუბიგანი
226	ფენვალერატი	0.02	0.02/	0.015/ (ს.-ტ.)	0.3/	0.02/ (მ.-ე.) 0.01	(ამოღებულია) ზამბა (რაფინირებული და არა რაფინირებული ზეთი),	სუმიციდინი

						(ს.-ს.)	სიმიინდი (მარცვალი), სოიო (პარკოსნები, ზეთი), ბარდა-0.1*; ხილი თესლოვანი, პურეულის მარცვლოვნები-2.0*; კომბოსტო თავხვეულა- 3.0***; ყურძენი, კარტოფილი-0.01*; ხმელი სვია-5.0*;; მოცხარი-0.03*; გაწმენდილი პარკოსნები, რძე-0.1***; პარკოსნები (საკვების და სოიოს გარდა), ჩინური კომბოსტო, პამიდორი, კენკროვნები (მოცხარის გარდა) და სხვა წვრილი ხილი-1.0***; კომბოსტო ბროკოლი, ბრიუსელის და ყვავილოვანი, ნიახური, ალუბალი, ციტრუსოვნები, თავხვეულა სალათა, ხორბლის გაუცრელი ფქვილი-2.0***; ზამბა (თესლი), კიტრი, ნესვი, ხის კაკალი, ფქვილი ხორბლის (გაუცრელის გარდა)-0.2***; კივი, ატამი, წიწაკა ჩილე (ხმელი), ქატო ხორბლის გადაუმუშავებელი-5.0***; არაქისი გაუწმენდავი, მზესუმზირა (თესლი), სიმიინდი სუფრის ტკბილი (მოსახარში ფუჩეჩში)- 0.1***; წიწაკა ტკბილი (მიხაკისებრი წიწაკის ჩათვლით), გოგრა ჩვეულებრივი და ზამთრის მსხვილნაყოფიანი, საზამთრო-0.5***; ბოსტნეული საკვებნაყოფიანი ფესვურებით და ტუბერებით (კარტოფილის და ნიახურის გარდა)-0.05***, ხორცი ძუძუმწოვრების (ზღვის ცხოველების გარდა)-1, 0***, ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.02***; თევზი-0.0015	
227	ფენიტროთიონი	0.006	2.0/ (ტრ.)	0.006/ (ს.-ტ.)	0.1/	/0.005	ხილი თესლოვანი-0.5; პურეულის მარცვლოვნები-6.0; სოიო (პარკოსნები)-0.01***; ბრინჯი-0.3; პური, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), ხილი (კურკოვანი), ციტრუსოვნები (რბილობი), თამბაქო,	სუმიითიონი

							შაქრის ჭარხალი, სუფრის-0.1; ჩაი-0.5*; ველურად ნაზარდი კენკროვნები და სოკო-0.01, ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები-0.05***; კვერცხი-0.05***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-0.05***; რძე-0.01***; ფრინველის ხორცი-0.05***;	
228	ფენმედიფამი	0.03	0.25/ (ტრ.)	0.05/ (საერთ.)	0.5/	/0.02/(მ.ე.)0.01 (ს.ე.) (ა)	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი-0.2, ვარდკაჭაჭა, სასალათე ვარდკაჭაჭა-0.5	ბეტანალი ს (47), ბეტანალ ექსპერტი (47, 71), ბელვედერი(47)
229	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი	0.01	/0.04	0.0003/ (საერთ.)	/0.2 (ა)	/0.01 (მ.ე.) 0.01/(ს.ე.) (ა)	პურეულის მარც-ვალი, სტაფილო, სუფრის ჭარხალი, მზესუმზირა (ზეთი), ხაზვი-0.01, შაქრის ჭარხალი, სოიო (თესლი და ზეთი)-0.1, კომბოსტო, მზესუმზირა (თესლი)-0.02, რაფსი (თესლი და ზეთი), ბარდა-0.2	ფურორე სუპერი, პუმა სუპერი 7.5, იგლ სუპერი, ლასტიკ ექსტრა (101)
230	ფენოქსაკარბი	0.05	/0.003	0.25 (საერთ.)	/0.005	/0.0005	ყურძენი-0.1, ხილი (თესლოვანი-1,0, ხილი კურკოვანი-0.01	ინსეგარი, ლუფოქსი (108)
231	ფენპიროქსიმატი	0.01	/0.3	0.001/ (საერთ.)	/0.05	/0.005	სოია (მარცვალი, ზეთი), ყურძენი, ხილი (თესლოვნები)-0.3, სვია (ხმელი)-10,0***, ფორთოხალი (პიბრიდის ჩათვლით)-0.2***	ორტუსი, ორდუსი, რეინკალი
232	ფენპროპი-მორფი	0.003	/0.5	0.01/ (საერთ.)	/1.0	/0.003	პურეულის მარცვლოვნები-0.2; მზესუმზირა (თესლი)-0.05*; მზესუმზირა (ზეთი)-0.1*; ბანანი-2.0***; ჭარხალი შაქრის-0, 05***, კვერცხი, ძუძუმწოვრების ქონი (რძის ცხიმის გამოკლებით), რძე, ფრინველის ხორცი, ქონი და სუბპროდუქტები-0.01***; მრკ-ს თირკმელები თხის, ცხვრის და ღორის-0.05***; მრკ-ს ღვიძლი თხის, ცხვრის და ღორის-0.3***; ძუძუმწოვრების ხორცი (ზღვის ცხოველების გარდა)-0.02***	კორბელი
233	ფენთიონი	0.001	/0.1	0.001/ (ორგ.)	/0.3 (+)	/0.001	პურეული მარცვალი, პარკოსანთა მარცვალი, შაქრის ჭარხალი-0.15, რძე და რძის პროდუქტები-0.01, ხორცი და ხორცის პროდუქტები-0.2	ლებაციდი
234	ფენჰესამიდი	0.18	ან	0.006 (ორგანოლეპტ., (ს.-ს.))	2	0.004	ატამი, ქლიავი - 2, ალუბალი, ჟოლო, სტაფილო -5, ყურძენი, მარწყვი-3, კივი-10, პამიდორი-1, ხორცი, კვერცხი-0.05, რძე-0.01	ტელდორი, ეფდალ ფენდორი

235	ფიპრონილი	0.0002	0.05/ (წ.-მ.)	0.001/ (ს.-ტ.)	/0.01	/0.0001	კარტოფილი-0, 02, პურეულის მარცვალი - 0.005, ბანანი-0, 005***, შაქრის ჭარხალი-0. 2***, მზესუმზირა (თესლი)-0, 002***, კომბოსტო (ყველა სახის)-0, 1***, ბრინჯი, სიმინდი-0, 01***, რაფსი- 1.0, ხილი (თესლოვნები) - 0.02, რძე მრს- 0. 1***, კვერცხი-0, 01***, ფრინველის სუბპროდუქტები, ღვიძლი მრს-0, 1 ***, ხორცი მრს-0, 5***, ხორცი ფრინველის-0, 01***	ადონისი, რეგენტი 20 გ.
236	ფიჭვის ქარციხერხიას ბირთვული პოლიედრო-ზის ვირუსი	ნა	ნა	ნა	5 102 პოლიედრი / მ³	ნა	ნა	ვირინ-დიპრიონი
237	ფლოკუმაფენი	ნა	ან	ან	2.0	0.2/	ნა	შტორმი, შტორმი პელეტი, შტორმი სევიურე
238	ფლორასულამი	0, 05	/0, 1	0, 01/ (საერთ.)	/1, 0	/0, 04	სიმინდი (მარცვალი, ზეთი)-0, 1, პურეულის მარცვალი, ფეფვი, სორგო- 0, 05	ბალერინა (3), ეფდალ ულტრამიქსი (3), აგენტი (3), კორვეტი (3), ქათენგი (3)
239	ფლუაზინამი	0,002	/0,1	0,001 (საერთ.)	/1,0	/0,001	კარტოფილი- 0,025	ნანდო, ბანჯო, ბანჯო ფორტე (57)
240	ფლუაზიფოპ-პ- ბუთილი	0.001	/0.3	0.001/ (საერთ.)	/0.5	/0.001	სუფრის ჭარხალი-0.1*, შაქრის ჭარხალი, ხახვი, კარტოფილი-0.02, სტაფილო, ბარდა-0.03, ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი), ყურძენი- 0.02*, კომბოსტო, რაფსი (მარცვალი, ზეთი) -0.04, სიმინდის მარცვალი, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), სოიო (მარცვალი, ზეთი -0.04	ფუზილადი-სუპერი, ფუზილადი ფორტე, ბრეის სუპერი, ფლუენტი, ფლუზიტოპი, ტანგრა, ფოუზილე
241	ფლუბენდიამიდი	0, 02	ან	ან	ან	ან	ყურძენი-2, 0**, ხილი თესლოვანი -0, 8**, ხილი კურკოვანი-2, 0**, კაკალი- 0, 1**, ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით ჟეაბახი, პატისონი, კიტრი)-0, 15**, ბახჩელი (ნესვი, საზამთრო, გოგრა0-0, 06**, სალათა-0, 7**, ისპანახი-1, 0** კომბოსტო (ყველა სახის)- 4, 0**, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი-0, 2**, სიმინდი - 0, 01	ბელტი, ბელტ ექსპერტი (74)
242	ფლუდიოქსონილი	0.055	/0.2	0.1/	/1.0	/0.01	პურეულის მაცვალი-0.05; სიმინდი (მარცვალი)-0.02; მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), შაქრის ჭარხალი, კარტოფილი, სოიო (პარკოსნები, ზეთი), რაფსი (მარცვალი, ზეთი)- 0.05; ყურძენი-2.0; ბარდა (მწვანე მარცვლების ჩათვლით)-0.3;	მაქსიმი, მაქსიმი გოლდი (125), სვიტჩი (238), სელესტ ტოპი (69, 75), გეოქსი, მორავის პრაიმი (135?), კორზაქუინი (238)

							პამიდორი-1.0; თავი ხახვი, ნიორი-0.5; ვაშლის კოპტონი ხმელი-20.0***; რეჰანი, მწვანე ხახვი, სალათა თავხვეულა, ფოთლოვანი მდოგვი, კრეს-სალათა-10.0***; ხმელი რეჰანი და მწვანე ხახვი-50***; შავი მოცხარი, მაცვალი (ზოიზენის და ლოგანის კენკროვნების ჩათვლით), ხილი თესლოვანი (მსხლის გარდა) და კურკოვანი, ჟოლო წითელი და შავი- 5.0***; გოლუბიკა. კომბოსტო თავხვეულა- 2.0***; ბროკოლო, სტაფილო, მსხალი-0.7***; ციტრუსოვნები-7.0***; ბამბა (თესლი-0.05***; კიტრი, ბადრიჯანი, გოგრა ჩვეულებრივი, პარკოსნები (საკვები პარკოსნების და სოიოს პარკოსნების ჩათვლით)-0.3***; კივი- 15.0***; წიწაკა ტკბილი (მიხაკისებრი წიწაკის ჩათვლით)-1.0***; ფისტა- 0.2***; ხენდრო- 3.0*** კვერცხი, ძუძუმწოვრების და ფრინველის სუბპროდუქტები-0.05***; ხორცი ფრინველის და ძუძუმწოვრების (ზღვის ცხოველების გარდა), რძე სიმინდი სუფრის ტკბილი (მოსახარში ფუჭეში)- 0.01***; ნესვი-0.03***;	
243	ფლუზილაზოლი	0,01	ა5	/0,02	/0,5	/0,01	გარგარი-0.5, ვაშლი-0.2, შაქრის ჭარხალი-0.01, ყურძენი, მზესუმზირა, მსხალი-0.05, პურელის მარცვალი-0.01	პანჩი, ოლიმპი
244	ფლუოპიკოლიდი	0.07	/0.14	0.01/(სერT.)	/1.0	/0.02	კარტოფილი-0.05, ქიშმიში-10,0***, ხახვი მწვანე, ხახვი ჭლაკვი- 10,0***, კომბოსტო (ყველა სახის)-2,0**, ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით, ხახვი თავიანი-1,0***, პამიდორი, ბადრიჯანი, ტკბილი წიწაკა-1,0**, კიტრი, ყაბახი, პატისონი-0,5**, სალათა-9,0**, ისპანახი, გოგროვნები-0,5***, საზამთრო, ნესვი, გოგრა-0,5**, წიწაკა	ინფინიტო (150), პროფაილერი (20), პასადობლი (155)

							ჩილი ხმელი, ყურძნის კოპტონი-7,0***, ყურძენი-2,0**, პამიდვრის და ყურძნის წვენი -0.002 ძუძუმწოვართა სუბპროდუქტები, ძუძუმწოვართა ხორცი (გარდა ზღვის ცხოველების ხორცისა), ხორცი, ფრინველის სუბპროდუქტები, კვერცხი-0.01***, რძე- 0,02***	
245	ფლუპირამინი	0.015	0.24	0.001/ (საერთ.)	/1.0	/0.0001	პურეულის მარცვლოვნები-0.1; ყურძენი-1.0; ხილი თესლოვანი-0.5; ხილი კურკოვანი-0.7**; ბანანი- 0.6**; პამიდორი-0.9; წიწკა-0.8**; კაკალი-0.3**; კენკროვნები (ხენდრო და სხვ.)-2.0; კიტრი-0.5**; კარტოფილი-0.1	ლუნა სენსიტივენ სკ 500 (190)
246	ფლუპირადიფურონი	0, 064					ვაშლი, მსხალი-0, 4, ყურძენი -0, 8	სივანტო პრაიმი
247	ფლუტრიაფოლი	0.004	0, 1/	0.006/ (საერთ.)	/0.5	/0.005	პურეულის მარცვალი, სიმინდი (მარცვალი), ფეტვი, ბრინჯი, ბარდა (მწვანეს გარდა), ხილი (თესლოვნები), მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), ყურძენი -0.05, შაქრის ჭარხალი-0.1, რაფსი (მარცვალი, ზეთი)- 0, 2	იმპაქტი, ვინციტი (73), ფორისისუპერვინი (73), ფორისი, აქსიომა (173)
248	ფლუროქლო-რიდონი	0.04	/0.03	0.04/ (ს.-ტ.)	/1.2	/0.001	ბამბა (ზეთი)-0.01, კარტოფილი,მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), სტაფილო-0.1	რეისერი
249	ფლუვალინატი	0.005	/0.01	0.002/ (საერთ.)	/0.1 (+)	/0.001	ვაშლი, მსხალი, ყურძენი, კიტრი-0.2, პურეული მარცვალი-0.01, კარტოფილი, ქლიავი- 0.01*, რაფსი, პამიდორი- 0.1, სოიო (თესლი და ზეთი)-0,002	მავრიკი 2F
250	ფლუქსაპიროქსადი	0, 02	/0, 9	0, 006/ საერთ.)	/0, 8	/0, 001	პურეული მარცვალი-0, 5	სერკადისი, სერკადის პლიუსი (60)
251	ფოზალონი	0.006	0.5 (ტრ.)	0.001 (ორგ.)	0.5 /	0.01/	კომპოსტო, ნესვი -0.2*, ბამბა (ზეთი), ბადრიჯანი, პამიდორი, შაქრის ჭარხალი, ხილი (თესლოვნები და კურკოვნები), ყურძენი, ციტრუსოვნები (რბილობი), პურეულის მარც-ვალი, თამბაქო, წეკო, სოკო, პარკოსანი მარცვლეული-0.2, კარტოფილი, სოიო (თესლი და ზეთი),	ზოლონი

							ზეთოვანი ყაყაჩო -0.1 მშრალი სვია-2.0*, ბრინჯი- 0.3, მსხვილნაყოფა შტოში, მეცხოველეობის პროდუქტები, ტყის კენკრა-0.01	
252	ფოლპეტი	0.01	/0.1	0.04/ (ორგ.)	0.5/	/0.003	კარტოფილი-0.1, ყურძენი, ხილი (კურკოვანი)-0.02, , ხილი (თესლოვანი)-3,0**, კიტრი, ხახვი თავიანი- 1,0***, ნესვი, პამიდორი- 3,0***, მარწყვი-5,0***, სალათა თავხვეული- 50,0***, ქიშმიში-40,0***	მიკალი (20), ფოლპანი, შავიტი 71.5 (183), მელოდი კარე (88), ფანტიკი ფ (30), სვინქს ექსტრა (57), ქვადრის მაქსი (18), მიკალ ფლეში (20), (დეუტ ფორტე (57) ფოსბელ ექსტრა (20, 235), შავატი ფ (წზგრ 183), ვალის ფ (72 ¹), პროტონი (57)
253	ფოსმეტი	0.02	0.1/ (ტრ.)	0.2/ (ორგ.)	0.3/	/0.004	შაქრის ჭარხალი-0.25; სოკო-0.1; კენკროვნები ველურად ნაზარდი-0.01; კარტოფილი-0.05; გოლუბიკა, ყურძენი, გარგარი, ვაშლატამა, ატამი, ხილი თესლოვანი- 10.0***; ცირუსოვნები- 3.0***; ბამბა (თესლი)- 0.05***; ხის კაკალი-0.2***; მრკ-ს ხორცი-1.0***; რძე- 0.02***	იმიდანი
254	ფორამსულფურონი	8,5	/1,0	0,3/(სერT.)	/1.0	/0.02	სიმინდის მარცვალი-1.0, სიმინდი (ზეთი)-0.5	მაისტერი (130), მაისტერ პაუერი (130, 75 ¹ , 239 ¹)
255	ფორმოთიონი	0.02	/0.2	0.004/ (ორგ.)	0.5 (+)	0.01 მე	შაქრის, სუფრის ჭარხალი, ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ალუბალი, კომპოსტო, ყურძენი, ჩაი, ბროწეული- 0.2, ბამბა (თესლი)-0.25*, ციტრუსოვნები (რბილობი)-0.04*, მშრალი სვია 2.0*	ანთიო
256	ფოსფინი	ნა	/0.4	/0.005	0.1/	0.01/ (მ.რ.) 0.001 (ს.-ს.)	პურეულის მარცვალი-0.1, შაქარი, მშრალი ბოსტნეული და ხილი, კაკაო მარცვალი, ჩაი, სანელებლები, კაკალი, არახისი-0.01, სოიო (მარცვალი)-0.05*	ფოსტოქსინი, ვალსაფიდი, ცელფოსი, შენფოსი, იონგფოსი, აგრიფოსი, დეგემ მატოქსინი ტბ, დეგემ პლაიტი ფირ, მეფოსი
257	(ფოსფოროვანი მჟავის მარილი ფოსფოროვანი მჟავის კალიუმის მარილი	0,01	ან	ან	ან	ან	ნა	გეოფიტი
258	ფურათიოკარბი	0.0001	/0.01	0.0006 (ს.ტ.)	/0.05	/0.0001	პურეულის მარცვალი, მზესუმზირა (თესლი და ზეთი), რაფსი (თესლი), სიმინდი (მარცვალი), შაქრის ჭარხალი-0.02	პრომეტ 400
259	ქლორანტრანილიპროლ ი	2,0	0,2	0,2	1,4	0,007	ხეხილი (თესლოვანი) -0,5, ხეხილი (კურკოვანი)-1,0**, კარტოფილი-0,1, ყურძენი- 1,0, ქიშმიში-2,0**, ციტრუსოვნები-1,0**, კიტრი-0,3**, ბადრიჯანი, პამიდორი-0,6**, წიწაკა- 1,0**, წიწაკა ჩილი (ხმელი)-5,0***,	კორაგენი, ამპლიგო

							ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით-0,6***, გოგრა-0,3***, საზამთრო, ნესვი-0,2, თხილი, ნიგოზი-0,05, პურეულის მარცვალი-0,02***, ბამბა (თესლი)-0,3***, ფოთლოვანი ბოსტნეული (ოხრახუში)-20,0***, სალათა ყველა სახეობის, კომბოსტო ყველა სახეობის-20,0**, ნიახური-7,0***, ბოსტნეული საკვები ფესვებით და ტუბერებით-0,02***, სამკურნალო მცენარეები-15, კვერცხი-0,01***, ხორცი ძუძუმწოვართა (გარდა ზღვის ცხოველებისა), სუბპროდუქტები ძუძუმწოვართა, რძე, ხორცი და სუბპროდუქტები ფრინველის-0,01***, რძის ცხიმი-0,1***	
260	ქლორბრო-მურონი	0.01	/0.05	0.4/ (ორგ.)	0.5/	1.0/	პურეული მარცვალი, სიმინდი (მარცვალი), სოიო (მარცვალი და ზეთი)-0.1, სტაფილო-0.2	მალორანი
261	ქლორიდაზონი	0.002	/0.7	0.01/ (ს.-ტ.)	0.5/	0.5/(მ.ე.) 0.001/ (ს.-ს.)	შაქრის, სუფრის ჭარხალი-0.1	პირამინი
262	ქლორმეკვატ-ქლორიდი	0.1	/0.1	0.002/ (ს.-ტ.)	0.3/	/0.002	პურეულის მარცვლოვნები (ტრიტიკალეს გარდა)-2.0; ბამბის თესლი-0.5***; რაფსი (მარცვალი)-5.0***; რაფსის გაუწმენდავი ზეთი-0.1***; ქათო ჭვავის-10.0***; ფქვილი ჭვავის-3.0***, ფქვილი ჭვავის გაუცრელი-4.0***; ტრიტიკალე-3.0***; ფქვილი თავთუხის-2.0***; ყურძენი, ხილი თესლოვნები, პამიდორი, კომბოსტო-0.05 კვერცხი-0.1***, თხის ხორცი-0.2***; თირკმელები-მრპ-ს, თხის, ღორის, ცხვრის-0.5***; ღვიძლი-მრპ-ს, თხის, ღორის, ცხვრის-0.1***; ხორცი-მრპ-ს, ღორის, ცხვრის-0.2***; რძე, მრპ-ს, თხის, ცხვრის-0.5***; შვრია-10.0; ფრინველის ხორცი-0.04***; ფრინველის სუბპროდუქტები-0.1***;	ანტივილეგაჩი, სტაბილანი
263	ქლოროტალონილი	0.02	/0.2	0.02/ (საერთ.)	/2.0	/0.001	კიტრი-1,0, პამიდორი- 2,0, ხილი (თესლოვნები)-0,15, ყურძენი-0.5*, კარტოფილი-0.2, პურეულის მარცვალი-0.1, ხმელი სვია-1.0*, ლობიო	ბრავო, კორკონილი, სქაინერი (165), საფკონილი

							(პარკი ხმელი-0,2***, კომბოსტო როკოლი და ბრუსელის-5,0***, კომბოსტო თავხვეულა და ყვავილოვანი-1,0***, სტაფილო-1,0***, ნიახური (ფესვი)-10,0**, პარკოსნები (პარკი და მოუმწიფებელი თესლი)-5,0***, ხახვი თავიანი-0,5***, ოხრახუში-3,0***, ატამი-0,2**, ალუბალი-0,5***, ნესვი-2,0***, ბანანი-0,01***, გოგრა-5,0***, სიმინდი ტკბილი (მოხარშული ტარო)-0,01***, შაქრის ჭარხალი-0,2***, შროტი-5,0***, წიწაკა ტკბილი (მიხაკისებრის ჩათვლით)-7,0***, წიწაკა ჩილი ხმელი-70,0***, არაქისი-0,05***, ხილი (კურკოვანი)-0,2	
264	ქლორპირიფოსი	0.01*	0.2/ (ტრ.)	0.002/ (ს.-ტ.)	/0.3	0.0002/(ა)	კარტოფილი-2,0, სიმინდი (მარცვალი), შაქრის ჭარხალი, რაფსი (თესლი, ზეთი)- 0,05, ბამბა (ზეთი)-0.05*: პურეულის მარცვალი-0.5, ხილი (თესლოვნები), ყურძენი -0.5, , ხილი (კურკოვანი)-0.5**, ატამი, ვაშლატამა-0,2**, ციტრუსები -0.3 **, კომბოსტო თავხვეული-1,0**, ნუში, ყვავილოვანი კომბოსტო, ყავა (მარცვალი), პეკანი, კაკალი -0,05***, ბანანი, ბროკოლი, წიწაკა ტკბილი და მიხაკისებრი, ჩაი მწვანე და შავი-2,0***, სტაფილო, სოია (მარცვალი), ფქვილი ხორბლის, ქიშმიში-0,1***, ლობიო, მწვანე ბარდა, სიმინდი ტკბილი (მოხარშული ტარო)-0,01***, კომბოსტო ჩინური, მტოში-1,0***, ბამბა (თესლი), მარწყვი-0,3***, სიმინდის ზეთი, ხახვი თავიანი-0,2***, წიწაკა ჩილის (ხმელი)-20,0***, ბრინჯი, სორგო-0,5***, სოიოს ზეთი რაფინირებული-0,3***, თირკმელები, ღვიძლი მრკ, სუბპროდუქტები ღორის, კვერცხი, ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები, ცხვრის სუბპროდუქტები-0,01***, ხორცი მრკ და ცხვრის-	დურსბანი, დურსბანი უმშ, ნურელ დ (237), ვალსარელი(237), ტენჩანტი (237) ,ლოქსლი, საირენი, პიროფლექტრა, პირინექს სუპერი (35), სარბანი, გრანდ დ, პირინექსი, ციპი პლუს (237), ეფდალ ფოსეტრინი (237), პირიფოსი, ქლორპირიფიტი-აგრო(237), ჰექტაშ პრიბანი 240 უმშ, ალბანი, ბრენდ დ, სერბანი 4, სანსირო (237), ტურბანი, საგა, სუპერვილ ფორტე (237), ულტიმატუმი (237), სარბანი 24, დელფოსი, ლოქსლი 240 უმშ, ტენჩანტ პლიუსი (35), ანტიხრუმჩი (35), ბუფფალო (35), საპები (237), ლორკანი, ზოიკოტი (237)

							1,0***, რძე მრპ, თხის, ცხვრის, ღორის-0,02***	
265	ქლორპირიფოს - მეთილი ქლორპირიფოს -ეთილი	0.01*	ა5	ა5	ა5	ა5	ციტრუსი -2, 0***, ბადრიჯანი, ყურძენი, წიწაკა, ხილი (თესლოვანი), პამიდორი-1, 0***, წიწაკა ჩილის (ხმელი), სორგო ხორბალი (მარცვალი)-10, 0***, კარტოფილი-0.01***, ბრინჯი-0, 1***, ხილი (კურკოვანი)-0, 5***, მარწყვი -0, 06***, ხორბლის ქათო გადაუმუშავებელი - 20, 0***, ხორცი, ქონი, სუბპროდუქტები მრპ და ფრინველის-0, 05***	პრიზანი-4, პრიზან 25 სფ, ეფდალ პირინოსი მენსბანი
266	ქლორპროპამი	0.05*	ა5	0.07/	2,0/	/0.001	კარტოფილი-30,0***, ხახვი, სტაფილო, ვარდკაჭაჭა-0,05, კარტოფილი გაფცქვნილი ჩიფსების დასამზადებლად -3,0, ხორცი მრპ-0,1***, სუბპროდუქტები მრპ 0,01***, რძე -0,01***, რძის ცხიმი-0,02***	გრო-სტოპ ფოგი
267	ციაზოფამიდი	0,17/	/0,2	0,01/ (საერთ)	/1,3	/0,002	კარტოფილი-0,1,პამიდორი-0,6	მილდიკატი (130 ¹⁾)
268	ციკლოატი	0.1	0.8 /(ტრ.)	0.2 (ს.-ტ.)	1.0/	ა5	სუფრის, შაქრის ჭარხალი-0.3	რონიტი ნე, შაბეტი
269	ციკლოკსიდიმი	0.07	/0.4	0.01/ (ორგ.)	/1.0	/0.002	მარცვლოვანი პარკოსნები (მათ შორის ბარდა და ლობიო)-2.0***; სოიო (პარკოსნები, ზეთი)-5.0; სიმინდი (მარცვალი, ზეთი)-0.2; მზესუმზირა (თესლი და ზეთი)-1.0; კომბოსტო (თავხვეულა, ყვავილოვანი)-2.0***; სტაფილო-0.5***; ყურძენი-0.5***; სალათა თავხვეულა და ფოთლოვანი-0.2***; კარტოფილი-2.0; რაფსი (მარცვალი)-2.0***; ხენდრო-0.5***; შაქრის ჭარხალი-0.5	სტრატოს ულტრა
270	ციმოქსანილი	0.02	/0.04	0. 3/ (ორგ.)	0.3/ (ა)	0.01/(მ.გ.) 0,002/(ს.-ს.)	კარტოფილი, კიტრი-0.05, ყურძენი, პამიდორი -0.1, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0.2, ხახვი-0.5	კურზატი რ (165), იტერალი (193), კურზები (111), რაპიდ გოლდი (111), რაპიდ გოლდ პლიუსი (111,165), კორზ სუპერი(111), ექსპერტ ტიმი (165), კუპერტინ სუპერი (164), საფაკოლ კომბი (155), ტანოსი (193),ეფდალ ციმოქსაზები (111),ზახისტი (115), ორდანი (165), ენერკოლ კომბი (155), კარზეპი (111), მატადორ გრანდი (83, 115), მაქსალინი (111), ალექტო (114), სუპერ სტარი (111), ეფდალ მოკანი (164) ეფდალ პიროქსომი(155), ერფრუტი(111), მენტაკოლ კომბი (155), ციმო სუპერი (111),

								ჰოსტრაკოლ კომბი (155.), მოქსიმატო (111)	
271	ცინეზი	0.02	0.2/ (საერთ)	0.03/ (ორგ)	0.1/	0.5/(მ-.e.)0.0003 (ს-ს)	კარტოფილი -0.1, პურეულის მარცვალი, ბრინჯი, ბარდა-0.2, პამიდორინ კიტრი, შაქრის ჭარხალი, ხახვი, ბახჩეული, ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი), ყურძენი-0.6,თამბაქო, ვარდი ეთერზეთოვანი, სვია-1.0, შაქრის ჭარხალი-0.6, ხახვი -0.6, კენკრა (ყველა) -0.02	ციხომ ბლუ (165)	
272	ციპერმეტრინი (ზეტა და ზეტა ციპერმეტრინები)	0.02	0.02/ (ტრ.)	0.006 (ს.-ტ.)	0.5/	0.04/ (მ.ე.) 0.01/ (ს.-ს.)	არტიშოკი-0,1***, პურეულის მარცვალი (ტრიტიკალის გარდა)-2,0, ტრიტიკალე-0,3***, ხორბლის ქატო გადაუმუშავებელი-5,0***, კომბოსტო თავხვეული - 1,0, ციტრუსები- 2,0, ჩაი მწვანე, ჩაი შავი (ფერმენტირებული ხმელი)-20,0***, ყავა (მარცვალი)-0,05***, ქიშიში-0,5 , ბადრიჯანი-0,03***, წიწაკა ტკბილი და მიხაკისებრი-0.2*, წიწაკა ჩილი (ხმელი)-10,0***, წიწაკა ჩილი-2,0***, ყურძენი-0.5, ბოსტნეული ფოთლოვანი-0,7***, პრასი-0,05***, ბოსტნეული საკვები ტუბერებით და ფესურებით (გარდა შაქრის ჭარხლისა, სტაფილოს და კარტოფილისა)-0,01***, ხახვი თავიანი-0,1***, პარკოსნები (გარდა სოიას და ბარდისა)-0,7***, ზეთოვანი კულტურების თესლი (გარდა მზესუმზირის, სოიას, სიმინდის, სელის თესლისა)-0,1***, ბამბა (ზეთი)-0,01*, სელი (თესლი, ზეთი)-0,2, პ*, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)-0,2, ბარდა, რაფსი (ზეთი), სოიო (ზეთი), ქამა-სოკო-0,1, ბოსტნეული საკვები ნაყოფებით, გოგროვნები, საზამთრო, ნესვი, კიტრი, პამიდორი-0,2, პაპია, ზეთისხილის ზეთი-0,5***, მწვანე ზეთისხილი-0,05***, კარტოფილი, სტაფილო, სოია (თესლი), სიმინდი (მარცვლი, ზეთი)-0.05, სიმინდი ტკბილი	არრივო, შერპა, ციტკორი, ინტა-ვირი, ციპერსანი, ციმბუში, კინმიქსი, ნურელ დ (231), ვალსარელი (231), ფიური, ვალსაციპერი, ტენჩანტი (231), ალექსანდერ, რივომეტრინი, ციპი პლუს (231), კრალი, სიპერკორი, საირუქსი, ეფდალ ფოსეტრინი (231), ქლორპირივიტი-აგრო (231), ციპრინი, კინმიქსი უმშ, ეფდალ კიმეტრინი , სანსირო (231), ეპედი (28). სუპერვილ ფორტე (231), მატადორი, ულტიმატუმი (231), ბესტ სიპერი, სიტრინი, საპები (231), ბოიკოტი (231)	ფასტაკი, ალპაკი, ალფა ციპი, ფენდონა, სუპერ ჰექტამეტრინი, კორტაკი, ბესტ ალფა. ეფდალ ალფატრინი, ტავანა, ალარმი, ფასი, ალფამილინი (61), ბალისტა, პოლიმეტრინი, კალიბრი, ალფალაფი, ბორეო ნეო (83,99)
	ალფაციპერმეტრინი (ციპერმეტრინის იზომერების ნარევი) ალფამეტრინი (სინონიმი)								

							(მოხარშული ტარო)- 0,05***, იონჯა, შაქრის ჰარხალი-0,1, კენკრა (ყველა)-0.07, ხილი (თესლოვნები)-0.7, ხილი (კურკოვანი)-0.1, მანგო- 0,7***, ბრინჯი-2,0***, შაქრის ლერწამი-0,2***, თევზი-0.0015, ძუძუმწოვართა ხორცი (გარდა ზღვის ცხოველების ხორცისა)-2,0, მსხვილფეხა საქონლის, ცხვრის, ღორის, ფრინველის ღვიძლი და თირკმლები, ქონი-0,2, ფრინველის სუბპროდუქტები (გარდა ღვიძლისა) -0,05**, ძროხის რძე,-0.05, რძის ცხიმო- 0,5*** კვერცხი-0.1	
273	ციპროდინილი	0.03	/0.7	0.1/ (ორგ)	/0.8	/0.005	თესლოვანი ხილი-1,0, კურკოვანი ხილი-2,0, ყურძენი-5,0, სტაფილო- 2,0**, პამიდორი-0,5, ნუში 0,02***, ნუში ჩენწომი- 0,05***, ქერი-3,0***, პარკოსნები (გარდა საკვებისა და და სოიასმარცვლისა), წიწაკა ტკბილი და მიხაკისებრი, შავი ზეთისხილი, ხორბალი-0,5***, კიტრი, ბადრიჯანი, გოგრა-0,2***, ქიშმიში, შავი ქლიავი- 5,0***, სალათა თავხვეული და ფოთლოვანი-10,0***, ხახვი თავიანი-0,3***, მარწყვი, ხორბლის ქატო გადაუმუშავებელი-2,0***, ძუძუმწოვართა სუბპროდუქტები, ტ კვერცხი, ძუძუმწოვართა ხორცი (გარდა ზღვის ცხოველების ხორცისა), ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები-0,01***, რზე-0,0004***	ხორუსი, სვიტჩი (213), ციპრო პლიუსი, კორუსი, კარპაზი 50 წზგრ, სტრაჟი, ათლეტი, ბენელუსი (173), კორიტუსი, კორზაქუინი (213)
274	ციპროკონაზოლი	0.005	/0.2	0.001/ (ს.-ტ.)	/0.7	/0.001	პურეულის მარცვალი- 0.05, ხილი (თესლოვანი), ყურძენი-0.1	ალტო, ალტო სუპერი (154), დივიდენდ სტარი (60), ატტიკი (60)
275	ციპროსულფამიდი	0.08	/0,24	0,07/ (საერთ.)	/0,8	/0,01	სიმინდი (მარცვალი, ზეთი)-0,1	მასტერ პაუერი (75 ¹ , 130, 223)
276	ცირამი	0.02	ან	ან	ან	ან	ციტრუსი, თხილი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, ყურძენი, მარწყვი, კარტოფილი, პამიდორი, სტაფილო, ნიორი, ხახვი, კიტრი, ნესვი, საზამთრო- 0.1, ალუბალი-5	ზირაფლო
277	ცის-ვერბენოლი	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	ნა	აკუვიტი

278	ჰესაკონაზოლი	0.05	ან	0.00005	ან	ან	ვაშლი, ყურძენი-0.1, კიტრი -0.02	ანტაკი
279	ციფლუფენამიდი	0.04	ან	ან	ან	ან	ყურძენი (სუფრის, ტექნიკური ჯიშები)-0.15, კიტრი-0.04, კურკოვანი ხეხილი-0.05	დინალი (60), ციდელი ტოპი (60)
280	ჰექსითიაზოქსი	0.03	/0.1	0.0005/ (საერთ.)	/1.0	/0.05	ციტრუსოვნები-0.5*; ბამბა (თესლი)-0.5*; ბამბა (ზეთი)-0.1*; ხილი თესლოვანების-0.4*; ყურძენი-1.0*; ხენდრო-0.5***; ფინიკი, სვია ხმელი-2.0***; ქიშმიში, შავი ქლიავი-1.0***; ბოსტნეული საკვებნაყოფიანი, გოგროვანი (საზამთროს გარდა), ხის კაკალი-0.05***; ბადრიჯანი, პამიდორი-0.1***; ყურძნის ჭაჭა (მშრალი)-15.0***; ნაყოფი კურკოვნების-0.3***, ძუძუმწოვრების სუბპროდუქტები, კვერცხი, ძუძუმწოვრების ქონი (მათ შორის რძის ცხიმო), რძე, ხორცი ძუძუმწოვრების (ზღვის ცხოველების გარდა), ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები-0, 05***	ნისორანი, ექსიტოქსი
281	ჰიბერელინის მჟავა	ნა	ნა	ნა	/0.2	ნა	ნა	გოლდ გიბბი, გიბგრო 20%, ეფდალ ბლუგბი , მეგაფილ ტაბლეტი, აგრო გიბ, გიბერქეი
282	ჰიბერელინის მჟავის ნატრიუმის მარილები	ნა	ნა	ნა	/0.2	ნა	ნა	ჰიბერსიბი
283	ჰიმექსაზოლი	0.01	0.03	0.002 /(ს.-ტ.)	/1.0	/0.01	შაქრის, სუფრის ჭარხალი-0.01, ბარდა, ბრინჯი-0.01	ტაჩიგარენი, ტაგანტი, ტენნესი
284	ჰუმინური მჟავების ნატრიუმის მარილი	ნა	ნა	ნა	ნა	/0.05	ნა	ნატრიუმის ჰუმატი

თავი IV. ეკოლოგიური ნორმატივები

მუხლი 21. ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები თევზსამეურნეო წყალსატევებისათვის

მე-2 გრაფაში მითითებულია მხოლოდ ნივთიერებები, რომელთა მიხედვით ხორციელდება კონტროლი. თუკი ნივთიერება (გრაფა 2) წარმოადგენს ნარევი პრეპარატის ერთ-ერთ კომპონენტს, მისი სავაჭრო დასახელების შემდეგ (გრაფა 4) ფრჩხილებში მითითდება მეორე კომპონენტის რიგითი ნომერი (თუ კონტროლი ხორციელდება ორივე კომპონენტის მიხედვით).

	მოქმედი ნივთიერება	ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზღვ) (მგ/ლ)	პრეპარატის სავაჭრო დასახელება

N	2	3	4
1	2,4 დ	0.1	2,4-დ 500, დიკამინი, დიამინი, 2,4-დ დიმეტელამინის მარილი, ლენტეზული, ესტერონი, დიკოპურ ტოპი (31), ჰექტაფერმინი, ამინოპელიკ სუპერი (31), ლევირატი, ესტერონი 600, ფენიქსი 60%, ფენიქს გოლდი 72, გოლიაფი (31), ბესტ ამინი 500, ეფდალ დიმეტრინი, ეფდალ ულტრამიქსი, პაიამინი, ბუქტრილ უნივერსალი, (21), დეამინი, კაილეო , ჰორმა, კორვეტი, პრიმო, კორუმა ვიდ კილერ, ქატენგი, დისერბონ კნ, მუსონ ექსტრა, დუამინი
2	2მეთილ-4დიმეთილამინომეთილ-ბენზიმიდაზოლ-5ოლ დიჰიდროქლორიდი	0.07	ამზიოლი
3	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი)	10.0	ლეპიდოციდი, ლეპიდოციდი CK-M დიპელი 8ლ, ფორეი 76 ზ, დელფინი, ლიპიდინი
4	Bacillus thuringiensis var. thuringiensis , ეგზოტოქსინი (სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი)	0.5	ბიტოქსიზაცილინი
5	Pseudomonas aureofacies 16	10.0	აგატი 25”
6	Pseudomonas syringae	10.0	პენტაფაგი
7	Pseudomonas fiorecens, Stami AP -33(B-3481)	1.0	პლანრიზი
8	Steinernema carpocapsae	ნა	ნბკ
9	Streptomyces lavendulae , Streptomyces griseum (ფიტობაქტერიომიცინის შტამი პროდუცენტი))	0.1	ფიტოლავენი-300
10	Trichoderma lignorum (სოკოს სპოროვანი მასა)	0.1	ტრიხოდერმინი
11	ავერსექტინი C	0.0001	ფიტოვერმი
12	ალფაციპერმეტრინი	ად	ფასტაკი, ალპაკი, ფენდონა, ალფა ციპი, სუპერ ჰექტამეტრინი, კორტაკი, ბესტ ალფა, ეფდალ ალფატრინი, ტავანა, ალარმი, ფასი, ალფამილინი (17), ბალისტა, პოლიმეტრინი 10 უმშ, კალიბრი, ალფალაიფი
13	ალუმინის ფოსფატი	0.03	ალუფიტი, ევალი, მიკალი (118), მიკალ ფლემი(118), პროფაილერი, ალიეტი, პოსეიდონი, ფოსბელ 80 სფ, ფოსბელ ექსტრა (118, 123), ფოსბელ პლიუსი
14	ამიდოსულფურონი	0.01	გრადილ მაქსი (51)
15	ამონიუმი გლუფოსინატი	1.0	ბასტა, ფასინეტი, ვისტა, ბასულტრა. გალანტი
16	არაფარდი პარკხვევიას ბირთვული პოლიედროზის ვირუსი	1.0	ვირინ-ენში
17	დიფლუბენზურონი		დიმილინი, ჰეროლდი, ალფამილინი (12)
18	ბენომილი	0.005	ბენლატი, ფუნდაზოლი
19	ბენტაზონი	1.4	ბაზაგრანი, პენტაგონი ,ეფდალ როქსანი , პარდუსი, ბენტაგონი
20	ბეტაციფლუტრინი	ად	ბულდოკი
21	ბრომოქსინილი	0.001	ემბლემი, ზეგრანი(93 ⁺), ბუქტრილ უნივერსალი (1), ბუქტრილი
22	ბრომპროპილატი	0.0003	ნეორონი, ფაქტორი
23	გალაქსიფოპ-რ-მეთილი	0.001	ზელეკ-სუპერი
24	გლიფოსატი	0.001	გლიპერი, გლიფოგანი, გლიფოსატი, გლიფოსანი, მამბა, კლინი, ნოკდაუნი, ვალსაგლიფი, ურაგანი, ურაგანი ფორტე, კლინი, დომინატორი, რაუნდაპი მაქსი, რაუნდაპი ექსტრა, გლიაცინტი, გეიზერი, ზერო, პაროქსიფენი, კორფოსატი მაქსი, კლიმი, სვიპი , ეფდალ იზოფოსატი 36, ეფდალ იზოფოსატი 48, სონრაუნდი 48, კლინ აპი, სანფორსი, ბოქსერი, სმერჩი, შოკი, ტოტალი, კლინერი, კორფოსატი, ნოკდაუნი მაქსი, კლინი იქსტრიმ, კლიმი, კლიმი+, დიკსი, ზომბა, მერი, რედ ჰალკი
25	გოგირდი	ად	გოგირდი, თიოვიტი ჯეტ, პოვერ სულფური, კუმულუს დფ, ორიუსული(93), სულფოლაკი, სულფი, კარჯილ დფ, კოსავეტი, გოგირდი, უნიკორნი (93), ეფდალ სულფური, სულფექს გოლდი, ფანსულფური, ჰელიოსუფრი, რანსულფური, სულფური, ინფერნო, მერტონი, ლაიფსული, რადარ კომბი ფლო, პლაიერ კომბი
26	დეტამეტრინი	ად	დეცისი ბლუ, დეცისი ექსტრა, დეცისი უმშ, დეცისი

			პროფი, დელტა, დელტარინი, დეცის ფლუქსი ეკ 25, ჰექტაშ დელტარინი 12,5 უმშ , ეფდალ დელმეტრინი, დეკაგარდი, პრედატორი, იზოლდესისი, ჯეტსისი 2,5, დ66, რიტმუსი, დელმეტრინა
27	დესმედიფამი	0.0002	ბეტანალი ამ, ბურეფენი ფდ 11 (109), ბეთანალ ექსპრესი (109, 42), ბელვედერი (109)
28	დესმეტრინი	0.0005	სემერონი
29	დიაზინონი	ად	ბაზუდინი
30	დიაფენთიურონი	ად	პეგასი
31	დიკამბა	5.0	დიალენი, დიალენი სუპერი, ველოსიტი, დიანატი, დიკოპურ ტოპი(1), ამინოპელიკ სუპერი (1), სერტო პლიუსი, ჰექტორ მაქსი (87), ვაგაბონდი, გოლიაფი (1). რიმაქსი, აისი, რიმაქსი (99)
32	დიქვატი	0.00043	რეგლონ სუპერი, სკორპიონი
33	დიმეთოატი	0.0014	ბი-58 ახალი, საფაგორი, დინგო, დანადამი, პოლიგორი, ბი-ფოსფინი, ბიიტალი, დემეტრა, დი-68, კორუმგორი, დენტისი, დიმევიტი, ეფდალ კემიდონი, ალპგორი, ფოს-ბი, ვერტიკალი, დუმბლე, ბი-58 ტოპი
34	დიმეტენამიდი	0,01	ფრონტიერ ოპტიმა
35	დიმეტომორფი	0.17	აკრობატი მც, ავანგარდი, სფინქს ექსტრა(118), დიმანკო, ლიდერი, აკრობატ ტოპი, მანკოცებ სუპერი, ფაიტერ ბლუ (91), ეფდალ აკრობოტი , მაქსიმუმი, კამბაზი, ორვეგო, აქტორმენი, არევა გოლდი, დემიკური
36	დინიკონაზოლი, დინიკონაზოლი მ	0.0003	სუმი-8, კონილი, მაქსილი-8, ალიანსი , სონფიქსი 1, ეფდალ დინექსი
37	დიფენოკონაზოლი	0.0004 0.006	სკორი, სკორპიონი, ფუნქიქსი, დივიდენდი დივიდენდ სტარი(127), სკაპი, ტასპა (84), სელესტ ტოპი (44), ატიკი (124), ჰარბორი (84), კორბეტი, აპლორი, ბროდერი (84), სკანდალი 250 ეკ, ჯექ პოტი (76), რაიოკი, დინალი, ეფდალ დონაზოლი, სამმიტი (61), რევეს ტოპი, იზოლდიფეკორე, ეფდალ დიფენპრო (84), ემბრელია, სკორპი, სტორი, ციდელი ტოპი, სკორტი, ჰელიოსი, ანტალია, გრავიტონი
38	დიფლუბენზურონი	0.0004	დიმილინი, ჰეროლდი, ალფამილინი
39	ეთილენზისდითიოკარბამინის მჟავის თუთიის მარილი ეთილენთიურამდისულფიდთან (კომპლექსი)	0.00024	პოლიხომი, პოლირამი დფ
40	ეპოქსიკონაზოლი	0.02	რექსი დუო (45)
41	ესფენვალერატი	ად	სუმი-ალფა, ბესტგოლი
42	ეტოფუმეზატი	0.007	ბეტანალ ექსპრესი (109, 27)
43	თიაბენდაზოლი	0.0005	ტექტო, ვინციტი, სუპერვინი
44	თიამეთოქსამი	1.0	ექტარა, მედალი, სელესტ ტოპი (37), კუნგფუ სუპერი (62), რენოვა, მედალ გოლდი (62), მისტი, ეფორია (118)
45	თიოფანატ-მეთილი	0.26	ტოფსინ მ, რექს დუო(40), კვარტეტი, ზახისნიკი
46	თირამი	0.0001	ტმოდ, ვიტავაქსი 200 (54), ვიტავაქსი 200 ფფ (54) თირამ გრანუფლო
47	იმაზალილი	0.001	ბაიტან უნივერსალი (120, 96), მაგმატილი
48	იმაზაპირი	0.0001	არსენალი, ევრო-ლაიტენინგი, კაპტორა
49	იმაზეტაპირი	0.01	პივოტი, სვიფტი
50	იმიდაკლოპრიდი	1.0	გაუჩო, კონფიდორი, კონფიდორი მაქსი, სულტანი, მიდაში, კონფიდორ ოილი, ნუპრიდი, კომპრადორი, იმიდორი მაქსი, პრესტიჟი , პრემიუმი, სინოპრიდი, იმიჯი, კომპრადორ ოილი, პერფექტო (62), ანტიკოლორადო (62), ანტიხრუშჩი, ეფედორ ოილი, იმიდამექსი, მიდაში პლიუსი, გორტკა, მატადორ გრანდი (66,123) ეფდალ იმიდრიდი 700, ეფდალ იმიდრიდი 60 ითშ, კონფიპრიდი, იმიდაგოლდი, ნუპრიდი 200, გაუჩო პლიუსი, იმიდორ დ, ანტიხრუშჩი , კომფიდრიდი, ჰირო
51	იოდოსულფურონ-მეთილ-ნატრიუმი	0.001	გრადილ მაქსი(14), მაისტერი
52	იოქსინილი	ად	ტოტრილი
53	იპროდიონი	0.003	როვრალი, როვონე, კარნავალი, როვრალ აკვავლო, ეფდალ იპროდინი, ზეანოლი, როვრალი 50 სფ

54	კარბოქსინი	0.000063 (მოცემული პრეპარატისათვის) 0.016 ((მოცემული პრეპარატისათვის)	ფენორამი ვიტავაქსი 200 (46), ვიტავაქსი 200 ფფ(46)
55	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი	0.004	ტოქტა სუპერი, ფორმულა სუპერი, კვინ სტარ მაქსი, ჰელგა სუპერი, ეფდალ ზალსუპერი, სერ სუპერი, სორტი სუპერი, იაგუარი
56	კვიზალოფოპ-პ-ტეფურილი	0.004	პანტერა
57	კლოდინაფოპ-პროპარგილ	0.25	ტოპიკი, კონკერი, ციტეიშნ, კოვზოი, ტერდოკი, ეფდალ კლორალი, ტოპკაპი, აგატი, კონკერ ექსტრა
58	კლომაზონი	0.01	მეტრიკი (70), ალკანსე (75)
59	კლოპირალიდი	0.06 (მოცემული პრეპარატისათვის)	ლონტრელ-300, ლიონი 300 წხ
60	კლოფენტიზინი	0.1	აპოლო
61	კრეზოქსიმ-მეთილი	0.003	სტრობი, პროგრესი, კოლლისი, სტრომსტარი, დრენჩი, სამშიტი (37), ეფდალ კრესდიტი, ჯაკო
62	ლამბდაციგალოტრინი	ად	კარატე, კარატე ზეონი, ვალსამბა, კაიზო, გრანდი, კუნგ ფუ, კუნგფუ სუპერი (44), პერფექტო (50), ანტიკოლორადი (50), ეფდალ ლამბტორინი, ტეკვანდო კაპსულა, ამპლიგო, კავანჩა, იზოლლატე, ადმიტი, არმორი, ლამბდა CY, პეტრა, მედალ გოლდი (44), ლამდექსი, ეფორია (44), ლოკ-5, ინტეგრალი
63	ლუფენურონი	0.1	მატჩი, ბოქსი, ლუფოქსი (110)
64	მალათიონი	ად	კარბოფოსი, მალაფოსი, ნოვათიონი, მალათიონი
65	მეთირამი	0.00024	პოლირამი DF, კაბრიო ტოპი (76), სოლორამი
66	მეტალაქსილი	0.01	აპრონი, რიდომილ მც, რიდონეტი მც, ვალსალაქსილი, იუნომილი მც, მეტალაქსანი, ვიქტორი, ტროპერი, მაქსიმო, რიდონეტ გოლდი მც, საფა რიდონეტ გოლდი მც, უნივერსალი, ვალსალაქსილ ჩ პოლიუსი (120), მანკოლაქსილი, რიდოზემი მც-72, მალზები, არმეთილი, პატრული, მაქსალინი, ეფდალ მანტალაქსი , მატადორ გრანდი (50, 123), მელტემი, მალზები, რიდოლეტ მც, ვიოლეტი, ზახისტი, რიდონილი, რელაქსი, პლანეტა, მანკომ დუო, ლირა
67	მეტამიტრონი	0.005	გოლტიქსი
68	მეტოლაკლორი	0.00022	დუალი, ლუმექსი, პრიმექსტრა, პრიმექსტრა გოლდი
69	მეტსულფურონ-მეთილი	0.007	მეტსი, როტტერი, ალე, იმპერატორი, პატრული, ეფდალ მეტეორი, მეტსილი
70	მეტრიბუზინი	ად	ზენკორი, მეჯესტიკი, ბარნელაცელი, ზენკორი 600, სენკრონი, მეტეორი, მეტრიკი (59), კურმუზინი, არკადე, ეფდალ მეზუზინი, ანტისაპა, უნიმარკი, არტისტი, ლაგუნი, მეტრაბუზ დ, მუზა
71	მეფენოქსამი	0.0003	აპრონ გოლდი, აპრონ იქს ლ 150, რიდომილ გოლდი მც, მაქსიმ გოლდი, რიდომილ გოლდ პოლიუსი (91), სერტიკორი (93)
72	მცპა მჟავა	0.02	ხვასტოქსი, დისერბონი
73	ოქსადიქსილი	0.0001	ოქსიხომი (91)
74	ოქსიფლოურფენი	0.001	გოალი, გალაქსი, გალიგანი, პექსი, პაროქსიფენი, კოლტარი, ეფდალ ოქმოსტი, გონდოლიერი, ექსტრა, პაროქსი
75	პენდიმეტალინი	0.006	სტომპი, ვალსატოპი, სტოპი, პანდორა, პენდიგანი, სპონსორი, ჰერბიმატი, პანდა, ეფდალ პენალინი, ალკანსე (58)
76	პენკონაზოლი	0.1	ტოპაზი, პრეფექტო, პინაკალი, პენ ფორსი, ტოპკონაზოლი,, ეფექტი, პესოსი, ეფდალ პეკოზოლი, პენკილერი, ფულპასი, ჯეკ პოტი (37), პენკილერი, ერპლანტი, მენტა ინოქსი, ფლობი, პერმიტი
77	პირაკლოსტრობინი	0.02	კაბრიო ტოპი (64), სიგნუმი, ინშურ პერფორმი (100), რეტენგო, ტერსელი, სექშენი
78	პირიდატი	0.001	ლენტაგრანი

79	პირიდაბენი	0.0001	სანმაიტი, სამმაიტი, მაიტ კილერი, ეფდალ პირდენი
80	პირიმიფოსმეთილი	ად	აქტელიკი
81	პროდიფოქსი	ად	ილოქსანი
82	პრომეტრინი	0.05	გეზაგარდი, პრომოტრინი, , პრომე გოლდი, კოკო გოლდი, ამეტრინი
83	პროპარგიტი	0.004	ომაიტი, ვალსარგიტი, საფმაიტი, პროპაფექტო, ომნუსი, გოლდმაიტი, ეფდალ პრომიტე
84	პროპკონაზოლი	0.00006	ალტო-სუპერ (127), ტილტი, ტილტი პრემიუმი, ტასპა (37), ჰარბორი (37), ბროდერი (37), ომნუსი, სანაზოლი, გოლდმაიტი, ტილტუსტი, ზამპერი, ტი რექსი (97), პროპკონაზოლი, ეფდალ დიფენპრო (37), პროკურე
85	პროქლორაზი	0.0035	სპორტაკი. ემსონი, ეფდალ ექზუმი
86	პროციმიდონი	0.003	სუმილექსი
87	რიმსულფურინი	0.5	ტიტუსი, მაისი, პილოტი, რიმექსი, ჰექტორ მაქსი (31), ესკუდო, ვიდაგერი, აისი, ტიტანი
88	რკინა	0,1	რკინის სულფატი
89	სეტოქსიდიმი	0.0016	ნაზუ
90	სპილენძის სამკაპროლაქტამ დიქლორიდმონოპიდრატი	0.015	კარტოციდი
91	სპილენძის ქლორჟანგი	0.004 (0.001 სპილენძზე გადანაგარიშებით)	სპილენძის ქლორჟანგი, ოქსიზომი (73), აზიგა პიკი, სუპერ კოპერი, კუპროკაფარო, კუპროფლო, ციხომი ზლუ (125), ნეორამი, ჰექტამ ზაკირი , კურზატი (123), ექსპერტი ტიმი (123), ოსიქლორი, ფაიტერ ზლუ (35), სქაინერი, პერგადო C, მელოდი კომპაქტი, რაპიდ გოლდი, რაპიდ გოლდი პლიუსი (123), კუპერ მაქსი, აირონი, ოსიქლორი, რიდომილ გოლდ პლიუსი (71), ორდანი, მეტკუპერი, ოსიქლორი 35, ზესტ ამინი, ეფდალ ზაკიროქსი, კუპროტანი, კუპერ 88, კუპრაზლუ, კუპრექსი (115), რამინი
92	Steirnerinema carpocapsae	ნა	ნბკ
	Streptomyces lavendulae, Streptomyces griseus	0.1	ფიტოლავინი
93	ტეზკონაზოლი	0.1	რაქსილი, ფოლიკური, ფოლიკურ ზტ(95), ფალკონი (94), ნატივო 75, მისტიკი, როდოლიტი, როდოლიტ სუპერი, ორიუსული (25), როდოლიტი ექსტრა, უნიკორნი (25), გიზმო, რუბინი, ტეზუჯი, რაქსილ ულტრა, ჯენსილი, ნატივო, არზალეტი, სერტეკორი (71), მისტიკი 250 ზე, ჰექსილი, კონილი 2 ფთმ, მუსტანგი, ბეტკური, ბენელუსი, კუსტოდი
94	ტიფენსულქფურონ-მეთილი	0,7	ფორმულა, დუბლონ გოლდი
95	ტოლიფლუანიდი	0.1	ეუპარენი მულტი
96	ტრიადიმენოლი	0.1	ზაიტან უნივერსალი (47, 120), ფალკონი (92), შავიტი, ტრიმაქსი, შავიტი ფ წზგრ (118)
97	ტრიადიმეფონი	0.2	ზაილეტონი, ვალსატონი, აზოცენი, ფოლიკური ზტ (92), აგსტარი 250 ეკ, ტირექსი (84), ზაისტარი
98	ტრიალატი	0.00035	ტრიალატი, ავადექსი
99	ტრიბენურონ-მეთილი	0.2	გრანსტარი, ტრუი, გრანლენდი, კორიდა, რიმაქსი (31)
100	ტრიტიკონაზოლი	0.01	კორრიოლისი, ინშურ პერფორმი (77)
101	ტრიტოსულფურონ-მეთილი	6,25	სერტო პლიუსი
102	ტრიფლურალინი	0.0003	ტრეფლანი
103	ტრიფორინი	ად	საპროლი
104	ფენაზახინი	0.0001	დემიტანი
105	ფენარიმოლი	0.006	რუზიგანი
106	ფენვალერატი	ად	სუმიციდინი
107	ფენიტროთიონი	ად	სუმიითიონი
108	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი	0.05	პუმა სუპერი, ფურორე სუპერი, იგლ სუპერი, ლასტიკ ექსტრა
109	ფენმედიფამი	0.0001	ბეტანალ ს, ზურეფენი ფდ 11 (27), ბეთანალ ექსპერტი (27, 42), ბელვედერი (27)
110	ფენოქსიკარბი	0.0004	ინსეგარი, ლუფოქსი (63)
111	ფენპიროქსიმატი	0.0003	ორტუსი, ორდუსი, რეინკალი

112	ფენპროპიმორფი	0.0001	კორბელი
113	ფენჰექსამიდი	0.06 მგ/დმ ³	იმიდანი
114	ფიპრონილი	0.0001	ადონისი, რეგენტი
115	ფიჭვის წითურა ხერხიას ბირთვული პოლიენდროზის ვირუსი	0.1	ვირინ დიპრიონი
116	ფლუაზიფოპ-პ-ბუთილი	0.001	ფუზილად სუპერი, ფუზილადი ფორტე, ბრეის სუპერი, ფლუენტი, ფლუზიტოპი, ტანგრა, ფოუზილე
117	ფლუვალინატი	ად	მავრიკი 2F
118	ფოლპეტი	0.0005	მიკალი(13), ფოლპანი, შავიტი (96), მელოდი კარე, ფანტიკი ფ, სფინქს ექსტრა(35), ქვადრის მაქსი, მიკალ ფლემი (13), შავიტი ფ წხგრ (96), ფოსბელ ექსტრა (13,123)
119	ფორმოთიონი	0.0025	ანთიო
120	ფუბერიდაზოლი	0.01	ბაიტან უნივერსალი (47, 96)
121	ქლორმეკვატქლორიდი	0.01	ანტივილეგაჩი, სტაბილანი
122	ქლორპირიფოსი	ად	დურსბანი, დურსბანი უმშ, წურელ დ (126), ვალსარელი (126), ტენჩანტი (126), ლოქსლი, საირენი, პიროელექტრა , პირინექს სუპერი (123), სარბანი, პირინექსი, პრიბან 25 სფ, ციპი პლიუსი (126), ეფდალ ფოსტერინი(126), პირიფოსი, ქლორპირივიტ-აგრო (126), ჰექტამ პრიბანი 240 უმშ, ალბანი, ბრენდ დ, სერბანი, სანსირო (126), საგა, სუპერვილ ფორტე (126), ტურბან 4 , ულტიმატუმი (126), სარბანი 24 უმშ, დელფოსი, ზუფვალო, ლოქსლი 240 უმშ, ტენ ჩანტ პლიუსი, ზუფვალო, საპები (126), ლორკანი, ბოიკოტი (126)
123	ციმოქსანილი	0.001	კურზატი რ (89), იტერალი, ექსპერტ ტიმი (89), კურზები, რაპიდ გოლდ პლიუსი (91), რაპიდ გოლდი , კორზ სუპერი, ვალსალაქსილ 8 პლიუსი , საფაკოლი კომბი, კარზები, მატადორ გრანდი (50,66), ალექტო, ეფდალ მოკანი, ერფრუტი, ეფდალ პიროქსომი, სუპერ სტარი, ციმოზები, კორზები, რამბლერი, მენტაკოლ კომბი, ციმო სუპერი, მოქსიმატი, ფოსბელ ექსტრა (13, 118)
124	ციკლატი	0.0001	რონიტ 6E
125	ცინები	0.0004	ციხომ ზლუ(91)
126	ციპერმეტრინი	ად	შერპა, არრივო, ფიური, ვალსაციპერი, ციპერმეტრინი, წურელ დ (122), , ტენჩანტი (122), ალექსანდერ, რივომეტრინი, ციპი პლიუსი (122), სიპერკორო, კრალი, საირუქსი, ეფდალ ფოსტერინი (119), ქლორპირივიტ აგრო, (122), ციპრინი, ეფდალ კიმეტრინი, სანსირო (122), სუპერვილ ფორტე (122), მატადორი, ეპედი, ულტიმატუმი (122), სიტრინი, ლორკანი, ბოიკოტი
127	ციპროკონაზოლი	0.007	ალტო, ალტო-სუპერი (84), დივიდენდ სტარი (37) ,ატტიკი (37)
128	ჰექსითიაზოქსი	0.0014	ნისორანი
129	ჰიბერილინის მჟავას ნატრიუმის მარილი	0.1	ჰიბერსიბი, გოლდ გიბბი, გიბგრო 20%, ეფდალ ბლუგები
130	ჰიმექსაზოლი	0.04	ტაჩიგარენი, ტაგიანტი

თავი V. პესტიციდების საშიშროების კლასები ადამიანისათვის

მუხლი 22. პესტიციდების საშიშროების კლასები ადამიანისათვის

	პრეპარატის საფაქრო დასახელება, პრეპარატული ფორმა	მოქმედი ნივთიერება, კონცენტრაცია	საშიშროების კლასი
1	აბამიტი, ეკ	აბამექტინი 18 გ/ლ	II
2	აბიგა-პიკი, წხ	სპილენძის ქლორჟანგი (400 გ/ლ)	U
3	აგატ-25 კ, დპ	პსეუდომონას აურეოფაციენს H 16 (ტიტრი 5-8 10 ¹⁰ ინაქტივაციამდე)	U
4	აგატი, ეკ	კლოდინაფოპ-პ-პროპარგილი+ კლოკვინტოსეტ-მექსილი (80 გ/ლ+20 გ/ლ)	III

5	აგენტი, სე	2, 4-დ-2-ეთილჰექსილის ეთერი +ფლორასულამი(452, 42 გ/ლ+6, 25 გ/ლ)	U
6	აგილი, ეკ	პროპაზიზაფოპი (100 გ/ლ)	U
7	აგრიფოსი,აზი	ალუმინის ფოსფიდი (560 გ/კგ)	არ კლას.
8	აგრო გიბზ, წზ	ჰიბერელინის მჟავა (45 გ/ლ)	U
9	აგრომინერალ ოილ, ზაფხულის ზეთი	თითისტარას ზეთი (800 გ/ლ)	U
10	აგროპლანი, სფ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	III
11	აგსტარი 250 ეკ	ტრიადიმეფონი (250 გ/ლ)	U
12	ადმირალი 10 ეკ	პირიპროქსიფენი (100 გ/ლ)	U
13	ადმიტი, ეკ	აცეტამიპრიდი +ლამბდაციპლოტრინი (16 გ/ლ +30 გ/ლ)	III
14	ადონისი, ეკ	ფიპრონილი (40 გ/ლ)	III
15	ავაკანტი, სკ	ინდოქსაკარბი (150 გ/ლ)	U
16	ავალონი 250 ზწე	ტებუკონაზოლი 250 გ/ლ	II
17	ავანგარდი, სფ	მანკოცები+დიმეტომორფი (600+90 გ/კგ)	U
18	ავმი-5, მზე	ნავთობის ზეთი	U
19	ავანტი , ეკ	ინდოქსაკარბი (150 გ/ლ)	U
20	აზობინი, სკ	აზოქსისტრობინი 250 გ/ლ	III
21	აზოქსი, წდგრ	აზოქსისტრობინი (500 გ/კგ)	U
22	ათლეტი 750 წდგრ	ციპროდინილი (750 გ/კგ)	III
23	აირონი, წდგრ	(სპილენძის ჰიდროქსიდი +სპილენძის ქლორჟანგი) (140+140 გ/ლ)	U
24	აისი 642 წდგრ	რიმსულფურონი +დიკამბა (32,5 გ/კგ+609 გ/კგ)	II
25	აკრომატი მგ, წდგრ	მანკოცები+დიმეტომორფი (600+90 გ/კგ)	U
26	აკრომატ ტოპი, წდგრ	დიტიანონი +დიმეტომორფი (350+150 გ/კგ)	III
27	აკრომატი 480 სკ	ბიფენაზატი (200 გ/ლ)	III
28	ალარმი, ეკ	ალფაციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	II
29	ალგაკოლი სფ 70	პროპინეზი (700 გ/კგ)	U
30	ალგამევი 1,8 ეკ	აზამეტეტინი (18 გ/ლ)	II
31	ალე 20 სფ	მეტსულფურონ-მეთილი (200 გ/კგ)	U
32	ალექსანდერ, ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
33	ალიანსი, დს	დინიკონაზოლი (10 გ/ლ)	U
34	ალიგატორი, წდგრ	დიტიანონი (750 გ/კგ)	III
35	ალიონი 500 სკ, კს	ინდაზიფლამი (500 გ/ლ)	III
36	ალკანსე, კაპს	პენდიმეტალინი +კლომაზონი (298 გ/ლ+43 გ/ლ)	III
37	ალიეტი 80 სფ	ალუმინის ფოსფიდი (800 გ/კგ)	III
38	ალპაკი, ეკ	ალფაციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
39	ალპგორი, ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
40	ალსისტინი 480 სკ	ტრიფლუმურონი (480 გ/ლ)	II
41	ალტო სუპერი, ეკ	პროპიკონაზოლი +ციპროკონაზოლი (250+80 გ/ლ)	U
42	ალფა ციპი, ეკ	ალფაციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
43	ამბიოლი, კფ	2 მეთილ-4- დიმეთილამინო- მეთილბენზიმიდა-ზოლ-5-ოლ-დიჰიდროქლო-რიდი (980 გ/კგ)	III
44	ამეტრინი 500 კს	პრომეტრინი (500 გ/ლ)	U
45	სპრინტი წზე	2.4 დ-2-ეთილჰექსილეთერი (687 გ/ლ)	III
46	ამინოპელიკ სუპერი .წზკ	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი+დიკამბა დიმეთილამინის მარილი (344+120 გ/ლ)	III
47	ამპლიგო 150, მკს	ქლორანტრანილიპროლი+ ლამბდა-ციგალოტრინი (100გ/ლ+ 50 გ/ლ)	III
48	ანტაკი, სკ	ჰექსაკონაზოლი (50 გ/ლ)	U
49	ანტალია 250 ეკ (	დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ	III

50	ანტიკლეფი მაქსი, ევ	პირიმეფოს-მეთილი +პირიდაზენი +აცეტამიპრიდი 200 გ/ლ+150 გ/ლ+50 გ/ლ)	U
51	ანტიკოლორადი, სკ	იმიდაკლოპრიდი+ლამბდაციპალოტრინი (150+50 გ/ლ)	II
52	ანტისაპა, სფ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
53	ანტიბრუში, კს	იმიდაკლოპრიდი+ბიფენტრინი(100+100 გ/ლ)	U
54	ანტრაკოლი სფ 70	პროპინეზი (700 გ/კგ)	U
55	ანტრაკოლ ზღაუ 65 სფ	პროპინეზი (650 გ/კგ)	U
56	აპლაუდი 25 სკ	ბუპროფეზინი (250 გ/ლ)	III
57	აპოლო, სკ	კლოფენტიზინი (500 გ/ლ)	U
58	აპლორი 25 ევ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
59	აპრონი გოლდი, წე	მეფენოქსამი (350 გ/ლ)	II
60	აპრონი იქს ლ 350 წე	მეფენოქსამი 350 გ/ლ	II
61	არბალეტი 75 წდგრ	ტეზუკონაზოლი (750 გ/კგ)	U
62	არევა გოლდი, წზგრ	დიმეტომორფი+მანკოცები (90+600 გ/კგ)	U
63	არივო 25 ევ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
64	არკადე, ევ	პროსულფოკარბი +მეტრიბუზინი (800+80 გ/ლ)	III
65	არმეთილი მ, სფ	მანკოცები +მეტალაქსილი (640+80 გ/კგ)	U
66	არმორი, სკ	აცეტამიპრიდი +ლამბდაციპალოტრინი (200 გ/ლ+150 გ/ლ)	III
67	არსენალი, წკ	იმაზაპირი (250 გ/ლ)	U
68	არტისტი 41,5 წდგრ	ფლუფენაცეტი+ მეტრიბუზინი (240 გ/კგ+ 175 გ/კგ)	II
69	ატიკი, კს	დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლი (30+6.3 გ/ლ)	U
70	აფალონი 45 სკ	ლინურონი (420 გ/ლ)	U
71	აქსიალი, ევ	პინოქსადენი (450 გ/ლ)	U
72	აქსიალი 50 ევ გ/ლ)	პინოქსადენი 50 გ/ლ+კლოკვინტოსეტ-მექსილი 12,5	U
73	აქსიომა 300 სკ	ტეზუკონაზოლი 225 გ/ლ+ფლუტრიაფოლი 75 გ/ლ	III
74	აქტარა, წდგრ	თიამეტოქსამი (250 გ/კგ)	U
75	აფეტი, სკ	პენთიოპირადი (200 გ/ლ)	U
76	აფფიქსი, სკ	აზოქსისტრობინი (250 გ/ლ)	U
77	აქტელიკი, ევ	პირიმეფოს-მეთილი (500 გ/ლ)	U
78	აქტორმენი მც, სფ	დიმეტომორფი 90 გ/კგ+მანკოცები (600 გ/კგ)	U
79	აცე, ხფ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	U
80	აცენოლი-მ	ცის-8-დოდეცენილაცეტატი 20%+ტრანს-8-დოდეცენილაცეტატი 80%	III
81	აცენტე, ევ	აბამექტინი (18 გ/ლ)	II
82	ბაიკორი, სკ	ბიტერტანოლი (500 გ/ლ)	U
83	ბაზაგრანი, წზ	ბენტაზონი (480 გ/ლ)	U
84	ბაზამიდ გრანულიატი, მგრ	დაზომეტი (970 გ/კგ)	III
85	ბაზუდინი, გრ	დიაზინონი (100 გ/კგ)	U
86	ბაილეტონი სფ 25	ტრიადიმეფონი (250 გ/კგ)	U
87	ბაისტარი 250 ევ	ტრიადიმეფონი (250 გ/ლ)	U
87 ¹	ბაიტი 100 ევ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
88	ბაკკარდი 125 ევ	კვიზალაფოპ-პ-ეთილი (125 გ/ლ)	III
89	ბალერინა, სე	2,4-დ-2-ეთილჰექსილის ეთერი +ფლორასულამი(410 გ/ლ+7,4 გ/ლ)	U
90	ბარნელაცელი 70 წდგრ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
91	ბასტა 150 წზ	ამონიუმ გლუფოსინატი (150 გ/ლ)	U
92	ბატალიონი 100 ევ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
93	ბაქტოფიტი, სფ	ზაცილლუს სუბტილის (ზა -10000 აე/გ)	U
94	ბეთანალ ექსპერტი ევ 274	ეტოფუმეზატი+ფენმედიფამი+დესმედიფამი (112+91+71 გ/ლ)	U
95	ბეთორი, წზ	იმაზამოქსი (40 გ/ლ)	U
96	ბეხჩი 5 წზგრ	ემამექტინ ბენზოატი 50 გ/კგ	U
97	ბელვედერი, კს	ფენმედიფამი+დესმედიფამი (160+160 გ/ლ)	U
98	ბელისი, წდგრ	ბოსკალიდი 252 გ/კგ+პირაკლოსტრობინი 128 გ/კგ	U
99	ბელტი 480 კს	ფლუბენდიამიდი (480 გ/ლ)	III
100	ბენელუსი ევ	ტეზუკონაზოლი +ციპროდინილი (125+187,5 გ/ლ)	III
101	ბენტაგონი,წზ	ბენტაზონი 480 გ/ლ	U
102	ბერმექტინი ევ	აბამექტინი (18 გ/ლ)	II
103	ბესტ ალფა, ევ	ალფაციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
104	ბესტ ამინი 500 წზ	2.4 დ (500 გ/ლ)	III

105	ბესტ სიპერი 25 ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/კგ)	II
106	ბესტგოლი, ეკ	ესფენვალერატი (50 გ/ლ)	II
107	ბეტკური 25 ეკ	ტებუკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
108	ბი-58 ახალი, ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
109	ბი-58 ტოპი, ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
110	ბიიტალი , ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
111	ბიკოლი, სფ	ხაცილლუს ტჰურიინგიენსის ვარ. თჰურიინგიენსის (ტიტრი არანაკლები 45 მლრდ სპორა/გ, ბა 2000 აე/გ)	II
112	ბინგო 40 ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
113	ბიოკატენა	Trichoderma Koningii B-7 MDI 5*10 ⁹ სპორა /მლ	U
114	ბიონი, წდგრ	ს-მეტილის აცინენზოლარი 500 გ/კგ	U
115	ბიტოქსიზაბილინი, პ	ხაცილლუს ტჰურიინგიენსის ვარ. თჰურიინგიენსის (ბა-1500 აე/მგ)	II
116	ბიფოსფინი ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
117	ბლუ ბორდო დისპერს, წზგრ	ბორდოს ნარევი, სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (სპილენძის მიხედვით 200 გ/კგ)	III
118	ბოვერ-ჯი, ს	Beauveria bassiana , შტამი IMI 501799, 5.5×10 ¹⁰ CFU/გ)	U
119	ბოიკოტი, ეკ	ქლორპირიფოსი 500 გ/ლ+ციპერმეტრინი 50 გ/ლ	II
120	ბომბა, წხ	გლიფოსატის მჟავა 540 გ/ლ, იზოპროპილამინის მარილი 729 გ/ლ	U
121	ბონზი 004 სკ	პაკლობუტრაზოლი (4 გ/ლ)	II
122	ბორდო ლუქსი, სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	III
123	ბორდო სალდეგო 20 სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	III
124	ბორდო კაფარო ბლუ, სფ	ბორდოს ნარევი 20% -სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ)	III
125	ბორდოს ნარევი მაქსი 20 სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ)	III
126	ბორდოფლო ნიუ, სკ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (124 გ/ლ)	III
127	ბორდოს ნარევი 20% სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ)	III
128	ბორდოს ნარევი 15% სფ	სპილენძის სულფატი +კალციუმის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით 150 გ/კგ	III
129	ბორდოტან 20 სფ	200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით	II
130	ბოტრანი 75 სფ	დიქლორანი (750 გ/კგ)	U
131	ბოტრინი, წზკ	პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი (722 გ/ლ)	U
132	ბოქსი 50 ეკ	ლუფენურონი (50 გ/ლ)	U
133	ბრავო, კს	ქლორატოლონილი (500 გ/ლ)	U
134	ბრეის სუპერი, ეკ	ფლუაზიფოპ-პ-ბუთილი (125 გ/ლ)	III
135	ბროდერი 30 ეკ	დიფენკონაზოლი+პროპიკონაზოლი (150 გ/ლ+150 გ/ლ)	III
136	ბროდიფაკუმი, პ	ბროდიფაკუმი (1 გ/კგ)	II
137	ბურჟუა, წზგრ	ფამოქსადონი+ციმოქსანილი (225 გ/კგ +300გ/კგ)	II
138	ბუქტრილი უნივერსალი ეკ 560	ბრომოქსინილი+2,4 დ მჟავა (280 გ/ლ + 280 გ/ლ)	II
139	გავან ექსტრა, წზგრ	ნიკოსულფურონი 750 გ/კგ	U
140	გალაქსი 240 ეკ	ოქსიფლუორფენი (240 გ/ლ)	U
141	გალბენი მ- 65 სფ	ბენალაქსილი+მანკოცები (650+80 გ/კგ)	U
142	განზო, ეკ	მიკლობუტანილი 125 გ/ლ	III
143	გარტი, სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (770 გ/კგ)	III
144	გაუჩო პლიუსი, დკთშ	იმიდაკლოპრიდი+ კლოთიანიდინი (233+233 გ/ლ)	II
145	გაუჩო, სდკ	იმიდაკლოპრიდი (600 გ/ლ)	II
146	გეზაგარდი, სსკ	პრომეტრინი (500 გ/ლ)	U
147	გეიზერი, წზკ	გლიფოსატი (480 გ/ლ)	U
148	გელცინი, გელი	ეთილფენაცინი (2 გ/ლ)	U
149	გეოფიტი, წზკ	ფოსფოროვანი მჟავას მონო + ფოსფოროვანი მჟავას დიკალიუმის მარილები (745 გ/ლ)	U
150	გეოქსი 50 წდგრ	ფლუდოქსანილი 500 გ/კგ	U
151	გიბერქეი, ტაბ	ჰიბერელინის მჟავა (100 გ/კგ)	U
152	გიბგრო 20 % , აბი	ჰიბერელინის მჟავა (200 გ/კგ)	U
153	გიზმო, კს	ტებუკონაზოლი (60 გ/ლ)	U
154	გლადიუსი, ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II

155	გლიაცინტი, წხ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	U
156	გლინი, წხ	გლიფოსატი (480 გ/ლ)	U
157	გლიპერი, წხ	გლიფოსატი (360 გ/ლ)	U
158	გლიფოგანი, წხ	გლიფოსატი (360 გ/ლ)	U
159	გლიფოვიტი, წხ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ	U
160	გლიფოსანი, წხ	გლიფოსატი (360 გ/ლ)	U
161	გოალი 2 ე, ეკ	ოქსიფლუორფენი (240 გ/ლ)	U
162	გოგირდ პლიუსი, წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
163	გოლდ გიბი, აგპ	ჰიბერელინის მჟავა (200 გ/კგ)	U
164	გოლდმაიტი 57 ეკ	პროპარგიტი (588 გ/ლ)	U
165	გოლდპლანი, სფ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	U
166	გოლიაფი, წხკ	2,4 დიმეთილამინის მარილი+დიკამბა (350+125 გ/ლ)	U
167	გორტკა, წდფთშ 70	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
168	გრავიტონი, ეკ	დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ	III
169	გრინ გარდ სკ პრემიუმი	Metarhizium acridum F1-985	III
170	გროდილ მაქსი, ზდ	ამიდოსულფურონი+იოდოსულფურონი+ნატრიუმის მეთილი+ანტიდოტი (100+25+250 გ/ლ)	U
171	გრანდი 5, ეკ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
172	გრანდ დ, ეკ	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი (500 + 50 გ/ლ)	II
173	გრანდ მდ, სფ	დიმეტომორფი-9%+მანკოცები 60%	U
174	გრანლენდი, წდგრ	ტრიბენურონ-მეთილი (750 გ/კგ)	III
175	გრანსტარი, მდს	ტრიბენურონ-მეთილი (750 გ/კგ)	III
176	გრო-სტოპ ფოგი, ცნწკ	ქლორპროპამი (300 გ/ლ)	II
177	გურადორი, წხგრ	ტრიფლოქსისტრობინი (500 გ/კგ)	III
178	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი, წხ	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი (720 გ/ლ)	III
179	დ66 ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
180	დანადიმი, ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
181	დანონი 70 წდგრ	დიტთანონი (700 გ/კგ)	III
182	დეგემ მაგტოქსინი, აბი, გრ, ფირ	მაგნიუმის ფოსფიდი (560 გ/კგ)	არ კლას.
183	დეკაგარდი 25 ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	U
184	დელანი 70 წდგრ	დიტთანონი (700 გ/კგ)	III
185	დელტა 12.5 ეკ	დელტამეტრინი (125 გ/ლ)	III
186	დელტარინი 2.5 ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
187	დელფოსი 5 გ, გრ	ქლორპირიფოსი (50 გ/კგ)	II
188	დემეტრა, ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
189	დემიტანი, სკ	ფენაზახინი (200 გ/ლ)	III
190	დენაცილი-მ	ცის-8-დოდეცენილაცეტატი	U
191	დენტისი 25 ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
192	დეროზალი, კს	კარბენდაზიმი (500 გ/ლ)	U
193	დეტია მალს გიფტკორნერი, მის	თუთიის ფოსფიდი 3,04%	II
194	დეცისი ექსტრა, ეკ	დელტამეტრინი (125 გ/ლ)	III
195	დეცისი პროფი, ეკ	დელტამეტრინი (250 გ/ლ)	III
196	დეცისი უმშ 12.5	დელტამეტრინი (12,5 გ/ლ)	III
197	დეცის ფლუქსი ეკ 025	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
198	დეცისი ზლუ 25 ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
199	დიალენ სუპერი, წხ	2.4-დ მჟავა+დიკამბა მჟავა(344+120 გ/ლ)	III
200	დიამენი, წხ	2.4-დ მჟავა (500 გ/ლ)	III
201	დიამინი, წხ	2.4-დ მჟავა (500 გ/ლ)	III
202	დიანატი, წხ	დიკამბა მჟავა (480 გ/ლ)	U
203	დიენოლი მ	ტრანს-8,ტრანს-10-დოდეკადიენოლი	III
204	დივიდენდი სტარი, კს	დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლი (30 + 6.3 გ/ლ)	U
205	დივიდენდი, კს	დიფენოკონაზოლი (30 გ/ლ)	U
206	დიტანი მ-45, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
207	დიტიმეგა 75 წხგრ	დიტთანონი (700 გ/კგ)	III
208	დიკამინ -დ, წხ	2.4-დ დიმეთილამინის მარილი (600 გ/ლ)	III
209	დიკოპურ ტოპი წხ	2.4-დ მჟავა+დიკამბა მჟავა (344+120 გ/ლ)	III
210	დიმანკო 9+60 სფ	დიმეტომორფი+მანკოცები (600+90)	III
211	დიმევიტი, ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
212	დიმექური TM 500 სკ	დიმეტომორფი 500 გ/ლ	U
213	დიმილინი, სფ	დიფლუბენზურონი (250 გ/ლ)	U

214	დინალი, სკ	ციფლუფენამიდი+დიფენოკონაზოლი (30+60 გ/ლ)	III
215	დინგო 40 ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
216	დისერბონ კნ, ეკ	2,4 დ მჟავა (346 გ/ლ+მცპა 346 გ/ლ)	II
217	დიპელი 8ლ, ზს	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (ზა-17600 აე/მგ)	U
218	დი-68, ეკ	დიმეთოატი 400 გ/ლ	II
219	დიქსი TM , წხკ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, გლიფოსატ მჟავის მიხედვით 356 გ/ლ	U
220	დიქსი ექსტრა	გლიფოსატის მჟავა (68,8 გ/ლ), გლიფოსატის მონოამონიუმის მარილი (757 გ/ლ)	
221	დომარკი 10 ეკ	ტეტრაკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
222	დომინატორი, წხ	გლიფოსატი (360 გ/ლ)	U
223	დორისი, სკ	აზოქსისტრობინი (250 გ/ლ)	U
224	დრაკო ბლუ, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
225	დრენჩი, წდგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	U
226	დუამინი, წხ	2,4დ მჟავა 625 გ/ლ, მარილებზე გადანაგარიებით 820 გ/ლ, წარმოდგენილი 455 გ/ლ დიმეთილამინის მარილი+365 გ/ლ დიეთანოლამინის მარილი	II
227	დუბლონ გოლდი, წზგრ	ნიკოსულფურონი+ ტიფენსულფურონ-მეთილი (600+150 გ/კგ)	U
228	დუეტ ფორტე 650 წზგრ	დიმეტომორფი+ფოლპეტი (150+500 გ/კგ)	U
229	დუმბლე, ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
230	დურსბანი, ეკ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
231	დურსბანი 450 უმშ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
232	ევაკური, წხ	პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი (722 გ/ლ)	III
233	ევრო-ლაიტენინგი, წხ	იმაზამოქსი+იმაზაპირი(33+15 გ/ლ)	U
234	ეიბიჯი სან, აპ	(1-მეთილციკლოპროპენი 3,3 %)	U
235	ელიმინატორი, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
236	ელუმისი, ზდ	მეზოტრიონი+ნიკოსულფურონი (75+30 გ/ლ)	III
237	ემბლემი, ხფწხშ	ბრომოქსინილი ოქტანოატი (200 გ/კგ)	II
238	ემბრელია 140 სკ	(იზოპირამი 100 გ/ლ+დიფენოკონაზოლი 40 გ/ლ)	
239	ემესტო კვანტუმი, ფთშ+ითშ 273,5, სდკ	პენფლუფენი+ კლოტანიდი (66,5+ 207 გ/ლ)	II
240	ემსონი, ეკ	პროქლორაზი(450 გ/ლ)	U
241	ენვიდორი, სკ	სპიროდიკლოფენი (240 გ/ლ)	U
242	ენერკოლ კომბი, სფ	პროპინები +ციმოქსანილი (700+60 გ/კგ)	U
243	ენიგმა 20 სფ	პირიდაზენი 20%	U
244	ერფრუტი 50 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	U
245	ესთეტი, ეკ	2.4-დ მჟავა (600 გ/ლ) 2.4-დ (რთული ეთილჰექსილის ეთერი)	III
246	ესკაპე 20 ხფ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	U
247	ესკუდო, წდგრ	რიმსულფურონი (500 გ/ლ)	U
248	ესტერონი, ეკ	2.4-დ მჟავა (564 გ/ლ) 2.4-დ (რთული ეთილჰექსილის ეთერი)	III
249	ესტერონი, ეკ	2.4-დ მჟავა (600 გ/ლ) 2.4-დ (რთული ეთილჰექსილის ეთერი)	III
250	ეუპარენი მულტი, წდგრ	თოლიფლუანიდი (500 გ/კგ)	U
251	ეფდალ აკრობოტი მგ, სფ	მანკოცები + დიმეთომორფი (600 + 90 გ/კგ)	U
252	ეფდალ ალსონი, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
253	ეფდალ ალფატრინი 100 ეკ	ალფა-ციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
254	ეფდალ აფიტრიდი 20 სფ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	U
255	ეფდალ ბაქსული 20 სფ	20% მეტალური სპილენძის ეკვივალენტი	II
256	ეფდალ ბაკიროქსი 50 წზგრ	50% მეტალური სპილენძი	II
257	ეფდალ ბაროქსი 77% სფ	77% სპილენძის ჰიდროქსიდი	II
258	ეფდალ ბლუგიბი, 20 წხ	ჰიპოთერილინის მჟავა (20 გ/ლ)	U
259	ეფდალ გოზტაშიმ 25% სფ	25% მეტალური სპილენძი	II
260	ეფდალ დელმეტრინი, ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
261	ეფდალ დიმეტრინი	2,4-დ მჟავა (500 გ/ლ)	III

262	ეფდალ დინექსი, ფთშ	დინიკონაზოლი (10 გ/კგ)	ს
263	ეფდალ დიფენპრო , ეკ	დიფენოკონაზოლი+ პროპიკონაზოლი (150+150 გ/ლ)	ს
264	ეფდალ დონაზოლი, ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	ს
265	ეფდალ ემაზენ 5 წზგრ	ემაზექტინ ბენზოატი 50 გ/კგ	ს
266	ეფდალ ექსუმ 450 ეკ)	პროქლორაზი 450 გ/ლ	ს
267	ეფდალ ექსალილ 50 ეკ	იმაზალილ 500 გ/ლ	II
268	ეფდალ ზალოსუპერი, წზ	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი (50 გ/ლ)	III
269	ეფდალ იზოფოსატი, წზ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	ს
270	ეფდალ იზოფოსატი 360 , წზ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი (360 გ/ლ)	ს
271	ეფდალ იმიდრიდი 70 წდფთშ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
272	ეფდალ იმიდრიდი 60 სკ	იმიდაკლოპრიდი (600 გ/ლ)	III
273	ეფდალ იპრიდინი 500 სფ	იპროდიონი (500 გ/კგ)	ს
274	ეფდალ კაპტანიმი 50 სფ	კაპტანი (500 გ/კგ)	II
275	ეფდალ კემიდონი, ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
276	ეფდალ კიმეტრინი 25 ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
277	ეფდალ კიმტოქსი, გრ	მეტალდეჰიდი (50 გ/კგ)	III
278	ეფდალ კრესდიტი 50 წდგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	ს
279	ეფდალ ლამტორინი, ეკ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
280	ეფდალ ლოქსბინი 50% წდგრ	ტრიფლოქსისტრობინი (500 გ/კგ)	III
281	ეფდალ მაკო მ-45, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	ს
282	ეფდალ მანტალაქსი, სფ	მეტალაქსილი + მანკოცები (80+640 გ/კგ)	ს
283	ეფდალ მეტუზინი, სფ	მეტრებუზინი (700 გ/კგ)	II
284	ეფდალ მექტინი 18 ეკ	აზამექტინი (18 გ/ლ)	II
285	ეფდალ მეტეორი, სფ	მეტსულფურონ-მეთილი (200 გ/კგ)	ს
286	ეფდალ მოკანი, მდს	ციმოქსანილი+სპილენძი (42+397, 5გ/კგ)	ს
287	ეფდალ ოქმოსტი 240 ეკ	ოქსიფლუორფენი (240 გ/ლ)	ს
288	ეფდალ პეკოზოლი 100 ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	ს
289	ეფდალ პენალინი 330 ეკ	პენდიმეტალინი (330 გ/ლ)	ს
290	ეფდალ პირდენი, სფ	პირიდაზენი (200 გ/კგ)	ს
291	ეფდალ პირინოსი 25 სფ	ქლორპირიფოს-ეთილი (250 კგ)	II
292	ეფდალ როქსანი, წზ	ბენტაზონი (480 გ/ლ)	ს
293	ეფდალ პრომიტე 570 ეკ	პროპარგიტი (570 გ/ლ)	ს
294	ეფდალ პროკერპი 50 სფ	პროპიზამიდი (500 გ/კგ)	ს
295	ეფდალ პრონები, სფ	პროპინები (700 გ/კგ)	ს
296	ეფდალ სულფური 80 ,სფ	გოგირდი (800 გ /კგ)	ს
297	ეფდალ სუნოლი, 70 ზწე, ზაფხულის ზეთი	თითისტარა ზეთი (700 გ/ლ)	III
298	ეფდალ ტებუზოლი 2 ფთშ	ტებუკონაზოლი (20 გ/კგ)	ს
299	ეფდალ ტებუქსილი სკ 60	ტებუკონაზოლი (60 გ/ლ)	ს
300	ეფდალ ტებუქსი, სფ	ტებუფენპირატი (200 გ/კგ)	ს
301	ეფდალ ფენდორი სკ 500	ფენჰექსამიდი 500 გ/ლ	II
302	ეფდალ ფოსეტრინი 550 ეკ	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი (500 +50 გ /ლ)	II
303	ეფდალ ციმოქსაზები 50 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	ს
304	ეფედორ ოილი,სკ	იმიდაკლოპრიდი (4 გ/ლ) +მინერალური ზეთი 704 გ/ლ	ს
305	ექსიტოქსი, სფ	ჰექსიტიაზოქსი (100 გ/კგ)	ს
306	ევექტი, ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	ს
307	ეფორია 247 მკს	თიამეთოქსამი 141+ლამბდაციპალოტრინი 106 გ/ლ	II
308	ექსპერტ ტიმი სფ	ციმოქსანილი+სპილენძის ქლორჟანგი (397.5 +42 გ/კგ)	ს
309	ექსპრესი 75 წზგრ	ტრიბენურონ-მეთილი (750 გ/კგ)	ს
310	ეჰედი, ეკ	აგეტამიპრიდი+ციპერმეტრინი (16 გ/ლ+72 გ/ლ)	III
311	ვაგაბონდი 480 წზ	დიკამბა დმა (480 გ/ლ)	ს
312	ვალის-მ წზგრ	ვალიფენალატი 60 გ/კგ + მანკოცები 600 გ/კგ	II
313	ვალიფ-ფ წზგრ	ვალიფენალატი 60 გ/კგ+ ფოლპეტი 480 გ/კგ	II
314	ვალსაგარდი ექსტრა .ეკ	აგეტოქლორი+ანტიდოტი (840+40 გ/ლ)	ს
315	ვალსაზები, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	ს
316	ვალსალაქსილი, სფ	მანკოცები +მეტალაქსილი (640+800 გ/კგ)	ს
317	ვალსალაქსილ ჩ პლიუსი, სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (400+40 გ/კგ)	ს
318	ვალსამბა, ეკ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
319	ვალსამინი, წზ	2.4- დ +დიკამბა (დიმეტილამინის მარილი) (360+100 გ/ლ)	III
320	ვალსარგატი, ეკ	პროპარგიტი (570 გ/ლ)	ს
321	ვალსარელი, ეკ	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი (500+50 გ/ლ)	II

322	ვალსატონი, სფ	ტრიადიმეფონი (250 გ/კგ)	U
323	ვალსატოპი, ეკ	პენდიმეტალინი (330 გ/ლ)	U
324	ვალსაციპერი 250 ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
325	ვალსაგლიფი, წხ	გლიფოსატი (360 გ/ლ)	U
326	ვალსაფიდი , აბი	ალუმინის ფოსფიდი (560 გ/კგ)	არ კლას.
327	ვეინი, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
328	ველოსიტი, წხ	დიკამბა (480 გ/ლ)	U
329	ვენტო, ეკ	პირიპროქსიფენი (100 გ/ლ)	U
330	ვერტევი ეკ	აბამექტინი (18 გ/ლ)	II
331	ვერტენოლი ბს-1	აიდ-1+ცის-ვერბენოლი+დიმეტილვინილკარბინოლი	U
332	ვერტენოლი ბს-2	აიდ-1+ცის-ვერბენოლი+დიმეტილვინილკარბინოლი	U
333	ვერტიკალი 40 ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
334	ვერტიმევი, ეკ	აბამექტინი (18 გ/ლ)	II
335	ვექტრა, სკ	ბრომპუკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
336	ვიდატი 10 გრ	ოქსამილი (100 გ/კგ)	II
337	ვიდატი ლ, 10 წხ	ოქსამილი (100 გ/კგ)	II
338	ვიდაგერი, წხგრ	რიმსულფურონი (250 გ/კგ)	U
339	ვივანდო, კს	მეტრაფენონი (500 გ/ლ)	U
340	ვიკილისი, წდგრ)	მეზოსულფურონ-მეთილი 3%+ნატრიუმის იოდოსულფურონ-მეთილი 0,6%+საფენერი დიეთილმეფენპერი 9%	III
341	ვიოლეტი 72 სფ	მანკოცები+მეტალაქსილი (640+80 გ/კგ)	U
342	ვისტა 150 წხ	ამონიუმ გლუფოსინატი (200 გ/ლ)	U
343	ვიტავაქსი 200 ფფ. წსკ	კარბოქსინი+თირამი (200+200 გ/ლ)	U
344	ვიქტორი, წხგრ	მანკოცები +მეტალაქსილი (640+800 გ/კგ)	U
345	ვოიაჟი, წდგრ	ნიკოსულფურონი (40 გ/კგ)	U
346	დრაკო ბლუ, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
347	ზატო , წხგრ 50	ტრიფლოქსისტრობინი (500 გ/კგ)	III
348	ზატო სტარი 520 სკ	ტრიფლოქსისტრობინი + პირიმეთანილი (520 გ/ლ)	U
349	ზახისნიკი, სკ	თიოფანატ-მეთილი (500 გ/ლ)	U
350	ზახისტი, სფ	ციმოქსანილი+მეტალაქსილი (250+100 გ/კგ)	III
351	ზეანოლი 50 სფ	იპროდიონი (500 გ/კგ)	U
352	ზეგრანი 350 სე	ბრომოქსილინი +ტერბუტილაზინი (100+250 გ/ლ)	II
353	ზელეკ-სუპერი, ეკ	გალოქსიფოპ-რ-მეთილი (104 გ/ლ)	III
354	ზენკორი, წხგრ 70	მეტრირიზინი (700 გ/კგ)	II
355	ზენკორი 600 სკ	მეტრირიზინი (600 გ/ლ)	II
356	ზერებრა აგრო, წხ	კოლიდური ვერცხლი+პოლი ჰექსამეთილენ ბიგუანიდ ჰიდროქლორიდი (500 მგ/ლ+ 100 მგ/ლ)	III
357	ზერო, წხ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მჟავის სახით (360 გ/ლ)	U
358	ZZკუპროტანი 700 სკ	სპილენძის ქლორჟანგი, სპილენძის მიხედვით 700 გ/ლ	U
359	ზირაფლო, წდგრ	ცირამი (760 გ/კგ)	III
360	ზოლონი, ეკ	ფოზალონი (350 გ/ლ)	II
361	ზონდერი 100 ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
362	ზორვეკ ვინაზელი,სე	ოქსათიაპიპროლინი 40 გ/ლ+ზოქსამიდი 300 გ/ლ	U
363	ზუმი 11 სკ	ეტოქსაზოლი (110 გ/ლ)	III
364	თეიქოფ 100 ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
365	თიაკლომექსი 480 სკ	თიაკლოპრიდი (480 გ/ლ)	III
366	თიოვიტ ჯეტი, წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
367	თირამ გრანულო, წდგრ	თირამი (800 გ/კგ)	III
368	თუთიის ფოსფიდი, პ	თუთიის ფოსფიდი (800 გ/კგ)	II
369	იაგუარი, ეკ	კვიზალოფოპ-პ-ბუთილი 200 გ/ლ	III
370	იგლ სუპერი, ეკ	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი (75 გ/ლ)	U
371	იგლი, სფ	კარბენდაზიმი + მანკოცები (120 გ/კგ+630 გ/კგ)	U
372	იკანოსი 40 ზდ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
373	იმიდაგოლდი 350 სკ	იმიდაკლოპრიდი (350 გ/ლ)	III
374	იმიდამექსი 700 წდგრ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
375	იმიდანი 50 სფ	ფოსმეტი (500 გ/კგ)	II
376	იმიდორ დ 700 წდგრ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
377	იმიდორი მაქსი, წდგრ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III

378	იმიჯი, წხვ	იმიდაკლოპრიდი (200 გ/ლ)	III
379	იმპაქტი, სკ	ფლუტრაფოლი (125 გ/ლ)	U
380	იმპერატორი, წდგრ	მეტსულფურონ-მეთილი (600 გ/კგ)	U
381	ინდაზოლი, ეკ	კარბენდაზიმი (500 გ/ლ)	U
382	ინდოფილი 72 სფ ზლუ	მანკოცები (720 გ/კგ)	U
383	ინსაკარი, ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
384	ინსეგარი, სფ	ფენოქსიკარბი (250 გ/კგ)	U
385	ინტეგრალი 5 ეკ	ლამბდაციპალოტრინი 50 გ/ლ	II
386	ინშურ პენფორმი დკს	ტრიტიკონაზოლი +პირაკლოსტრობინი (80+40 გ/ლ)	U
387	იონგფოსი, აზი	ალუმინის ფოსფიდი (570 გ/კგ)	არ კლას.
388	იტერალი, წდგრ	ფამოქსადონი+ციმოქსანილი (225 +300 გ/კგ)	II
389	ინფინიტო სკ 687.5	ფლოუპიკოლიდი+პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი (62.5+625 გ/კგ)	U
390	იროკო 40 წდგრ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (400 გ/კგ)	U
391	იუნომილი მც, სფ	მანკოცები +მეტალაქსილი (640+800 გ/კგ)	U
392	კაბრიო ტოპი, წხვრ	მეთირამი+პირაკლოსტრობინი (600 გ/კგ)	U
393	კაბუკი, ეკ	პირაფლუფენ-ეთილი (26, 5 გ/ლ)	U
394	კადილაკი, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
395	კაიზერი, ეკ	ინდოქსიკარბი (150 გ/ლ)	U
396	კაიზო, წხვრ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/კგ)	II
397	კაილეო, წხ	2,4 დ+ გლიფოსატი (160 გ/ლ+240 გ/ლ)	II
398	კალიფსო კს 480	თიაკლოპრიდი (480 გ/ლ)	III
399	კამბაზი მც, სფ	მანკოცები+დიმეტომორფი (600 გ/კგ+ 90გ/კგ)	U
400	კამბიტი , წდგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	U
401	კანტუსი, წდგრ	ზოსკალიდი (500 გ/კგ)	U
402	კაპკანი, ზრ	ბროდიფაკუმი (0,005%)	III
403	კაპტანლი, წხდრ	კაპტანი 900 გ/კგ	III
404	კარატე, ეკ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
405	კარატე ზეონი, მკს	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
406	კარნეოლი, ეკ	კაპტანი (860 გ/ლ)+კალიუმის ფოსფიტი 660 გ/ლ	III
407	კარბოფოსი, ეკ	მალათიონი(500 გ/ლ)	U
408	კარზენი 50 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	U
409	კარმენი მც, სფ	დიმეტომორფი + მანკოცები (90 გ/კგ+600 გ/კგ)	U
410	კარნავალი 50 სფ	იპროდიონი (500 გ/კგ)	III
411	კარპაზი 50 წდგრ	ციპროდინილი (500 გ/კგ)	U
412	კაურიტილი, წდგრ	მეთირამი+სპილენძის დიჰიდროქსიდი (810 გ/კგ)	U
413	კარჯილ დფ, წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
414	კვადრისი, სკ	აზოქსისტრობინი (250 გ/ლ)	U
415	კვარტეტი 70 სფ	თიოფანატ-მეთილი (700 გ/კგ)	U
416	კვინ სტარ მაქსი, ეკ	ხიზალაფოპ-3-ეთილი (125 გ/ლ)	III
417	კილრატი, წდგრ	ბროდიფაკუმი (0,005%)	U
418	კინმიქსი, ეკ	ბეტაციმერმეტრინი (50 გ/ლ)	III
419	კლასიკა, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
420	კლერატი, გრ	ბროდიფაკუმი (0.05 გ/კგ)	III
421	კლიმი, წხ	გლიფოსატი (480 გ/ლ)	U
422	კლიმი+, წხ	გლიფოსატი იპა მარილი 480 გ/ლ	U
423	კლინი, წხ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი (360გ/ლ)	U
424	კლინ-აპი, 480 ს	გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	U
425	კლინერი, წხ	გლიფოსატი (480 გ/ლ)	U
426	კლინერი ექსტრა, წხვრ	გლიფოსატი ამინის მარილი 750 გ/კგ	III
427	კლინი იქსტრემი, წხ	გლიფოსატის მჟავა (540 გ/ლ)	U
428	კლიპი, წდგრ	ფამოქსადონი+მანკოცები (625+62.5 გ/კგ)	U
429	კოზუზი 100 ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
430	კოვბოი 80 სფ	კლოდინაფოპ-პროპარგილი +კლოკვინტოსეტ-მეთილი (80+20 გ/ლ)	U
431	კოკო გოლდი, სფ	ატრაზინი+პრომეტრინი (333+167 გ/კგ)	U
432	კოლოისი, სკ	კრეზოქსიმ-მეთილი + ზოსკალიდი (300 გ/ლ)	III
433	კოლტარი, ეკ	ოქსიფლუორფენი (240 გ/ლ)	U
434	კომანდო, ფ	თუთიის ფოსფიდი (800 გ/კგ)	II
435	კომპრადორი 350 სკ	იმიდაკლოპრიდი (350 გ/ლ)	III

436	კომპრადორ ოილი სკ 0.04	იმიდაკლოპრიდი +მინერალური ზეთი (4+704 გ/ლ)	U
437	კონილი, სკ	დინიკონაზოლი (10 გ/ლ)	U
438	კონკერ ექსტრა, ეკ	კლოდინაფოპ-პ-პროპარგილ (240 გ/ლ)	U
439	კონკერი, ეკ	კლოდინაფოპ-პ-პროპარგილი+ანტიდოტი (80+20 გ/ლ)	U
440	კონრადი, სკ	აზოქსისტრობინი (250 გ/ლ)	U
441	კონსენტო სკ 450	ფენამიდონი+პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი (75+375 გ/ლ)	U
442	კონსული, წზგრ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (768 გ/კგ)	U
443	კონტიერი, სკ	სპიროდიკლოფენი (240 გ/ლ)	U
444	კონფიდორ მაქსი, წზკ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/ლ)	III
445	კონფიდორი, წზკ	იმიდაკლოპრიდი (200 გ/ლ)	U
446	კონფიდორ ოილი სკ 0.04	იმიდაკლოპრიდი (4 გ/ლ)	U
447	კონფიპრიდი, წდგრ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
448	კოპერ-ქაუნტი-N , ხკ	სპილენძამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი (271,5 გ/ლ)	III
449	კორაგენი, სკ	ქლორანტრანილიპრიდი (200 გ/ლ)	U
450	კორბეტი ,ეკ	დიფენკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
451	კორვეტი, სე	2, 4-დ-2-ეთილჰექსილის ეთერი +ფლორასულამი (452, 42 გ/ლ + 6, 25 გ/ლ)	U
452	კორზ სუპერი 50 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	U
453	კორზები, სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (680+45 გ/კგ)	U
454	კორიოლისი, კს	ტრიტიკონაზოლი (200 გ/ლ)	U
455	კორიდა, წდგრ	ტრიბენურონ-მეთილი (750 გ/კგ)	U
456	კორიტუსი, წზგრ	ციპროდინილი 500 გ/ლ	U
457	კორკონილი 500 სკ	ქლოროტალონილი (500 გ/ლ)	U
458	კორტაკი 100 ეკ	ალფაციპერმეტრინი (100გ/ლ)	III
459	კორუმა იაზლიკ იაგი, ზაფხ ზეთი	თითისტარა ზეთი (850 გ/ლ)	III
460	კორუმაგორი 40 ეკ	დიმეთოატი (400 გ/ლ)	II
461	კორუსი 75 წდგრ	ციპროდინილი (750 გ/კგ)	III
462	კორფოსატი მაქსი, წზგრ	გლიფოსატი იზოპროპილაიმნის მარილი (748 გ/კგ)	U
463	კორფოსატი 480, წზ	გლიფოსატი იზოპროპილაიმნის მარილი (4808 გ/კგ), გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ	U
464	კოსაიდი 2000 წდგრ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (538 გ/კგ)	III
465	კოსავეტი, წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
466	კორუმა ვიდვილერ დ, წზ	2.4-დ მჟავა (500 გ/ლ)	III
467	კრალი 250 ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
468	კრაფტი 18 ეკ	აზამეტრინი (18 გ/ლ)	II
469	კუმულუსი დფ,წზგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
470	კუნგფუ, ეკ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
471	კუნგფუ სუპერი, ეკ	თიამეთოქსამი (141 გ/ლ)+ლამბდაციპალოტრინი (106 გ/ლ)	II
472	კუპერვალი 20 სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი(200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	III
473	კუპერვალ ბლუ, სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი(200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	III
474	კუპერ მაქსი, სფ	სპილენძის ქლორფანგი (500 გ/კგ)	U
475	კუპერ 88 , სფ	სპილენძის ოქსიქლორიდი 887 გ/კგ	U
476	კუპერ სულფატ პენტაჰიდრატი	სპილენძის სულფატი (980-990 გ/კგ)	III
477	კუპერტინ სუპერი, სფ	ციმოქსანილი+სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (50+200+25 გ/კგ)	III
478	კუპერ ჩემპიონი, სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (770 გ/კგ, სპილენძის მიხედვით 500 გ/კგ)	III
479	კუპონი 800, ხკ	პარაფინის ზეთი 800 გ/ლ	U
480	კუპრაბლუ, წდგრ	სპილენძის ოქსიქლორიდი 614 გ/კგ, სპილენძის მიხედვით 350 გ/კგ	U
481	კუპრექსი,სფ	სპილენძის ოქსიქლორიდი 350 გ/კგ+მეტალაქსილი 150 გ/კგ	U
482	კუპროკავარო, სფ	სპილენძის ქლორფანგი (877 გ/კგ)	III
483	კუპროფლო, კს	სპილენძის ქლორფანგი (438.5 გ/კგ)	U
484	კუპროფიქს 30 დისპერს, წზგრ	ბორდოს ნარევი 461,6 გ/კგ (სპილენძის მიხედვით 120 გ/კგ)+ მანკოცები(300 გ/კგ)	U
485	კუპროსულფი წზგრ 25	სპილენძის სულფატი (250 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	III
486	კუპროქსატი, სკ	სპილენძის სულფატი (350 გ/ლ)	III
487	კურა-კურა, ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II

488	კურზატი რ, სფ	ციმოქსანილი+სპილენძის ქლორჟანგი (689.5+42 გ/კგ)	III
489	კურზები 50 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (500 გ/კგ)	U
490	კურმუზინი 70 სფ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
491	კურონები 70 სფ	პროპინები (700 გ/კგ)	U
492	კუსტოდია, კს	ტებუკონაზოლი +აზოქსისტრობინი (200+120 გ/ლ)	III
493	ლაგუნე 70 სფ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
494	ლაგანტე 20 სფ	პირიდაბენი (200 გ/კგ)	III
495	ლაიფსული, წდგრ	გოგირდი (800 გ/ლ)	U
496	ლამბდა-CY, ეკ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
497	ლამდექსი, მკს	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
498	ლანატი 20 ს	მეტომილი (200 გ/ლ)	II
499	ლანგრიფი 75 წდგრ	მანკოცები (750 გ/კგ)	U
500	ლაცერტა 250 სკ	აზოქსისტრობინი 250 გ/ლ	U
501	ლასტიკი ექსტრა, ეკ	ფენოქსაპროპ-პ-ილი+ ანტიდოტი კლოკვინტოქსეტ-ეთილი (70+40 გ/ლ)	U
502	ლაცერტა მაქ, სკ	აზოქსისტრობინი 200 გ/ლ+დიფენოკონაზოლი 125 გ/ლ	U
503	ლევირატი, წხ	2.4-დ მჟავა მცირედ აქროლადი ეთერების სახით (550 გ/ლ)	U
504	ლენტემული დ, წე	2.4-დ -2- ეთილპექსილეთერი (687 გ/ლ)	U
505	ლეპიდინი, სკ	Bacillus thuriensis var. kurstaki (ბა-2000 აე/მგ)	U
506	ლეპიდოციდი, სკ-მ ლეპიდოციდი, სკ-მ	Bacillus thuriensis var. kurstaki (ბა-2000 აე/მგ)	U
507	ლეპიდოციდი, პ	Bacillus thuriensis var. kurstaki (ბა-3000 აე/მგ)	U
508	ლექტორი, სკ	მეზოტრიონი 480 გ/ლ	
509	ლიდერი, სფ	დიმეტომორფი+მანკოცები (90+600 გ/კგ)	U
510	ლიმაი, სკ	ამისულბრომი 200 გ/ლ	U
511	ლინტური, წხგრ	დიკამბა მჟავა+ტრიასულფურონი (659+41 გ/კგ)	III
512	ლიონი 300, წხ	კლოპირალიდი (300 გ/ლ)	U
513	ლირა, სფ	მეტალაქსილი მ 40+ მანკოცები 640 გ/კგ	U
514	ლოგრანი, წდგრ	ტრიასულფურონი (750 გ/კგ)	U
515	ლოკოციდი,პელ., გრ	მეტალდეპიდი (50 გ/კგ)	III
516	ლონტრელი-300, წპ	კლოპირალიდი (300 გ/ლ)	U
517	ლორკანი, ეკ (ციპერმეტრინი 250 გ/ლ)	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
518	ლოქსლი, ხ უმშ	ქლორპირიფოსი (450 გ/ლ)	II
519	ლოქსლი 240 უმშ	ქლორპირიფოსი (240 გ/ლ)	III
520	ლუმექსი 537.5 სე	მეზოტრიონი+მეტალაქსილი+ტერბუტილაზინი (37.5+375+125 გ/ლ)	III
521	ლუნა სენსიტივ 500 სკ	ფლოპირამი125+ტრიფლოქსისტრობინი 250 გ/ლ	III
522	ლუფოქსი 105 ეკ	ლუფენურონი+ინდოქსიკარბი (30+75 გ/ლ)	U
523	მ.-2, სფ	მეტალაქსილი +Mმანკოცები (80+640 გ/კგ)	U
524	მაგმატილი 500 ეკ	იმაზალილი (500 გ/ლ)	II
525	მავრიკი 2F, წე	ფლოვალინატი (240 გ/ლ)	III
526	მავრიკი, წე	ტაუ-ფლოვალინატი (240 გ/ლ)	III
527	მაისი, მდს	რიმსულფურონი (250 გ/კგ)	U
528	მაისტერი, წხგრ	ფორამსულფურონი+იოდოსულფურონ-მეთილი+ნატრიუმი+ანტიდოტი იზოქსადიფენ-ეთილი (300+20+300 გ/კგ)	U
529	მაისტერ პაუერი ზდ 57,5	ფორამსულფურონი 31,5 გ/ლ+ იოდოსულფურონ-მეთილ ნატრიუმი 1,0 გ/ლ+ თიენკარბაზონ-მეთილი 10 გ/ლ+ციპროსულფამიდი 15 გ/ლ	U
530	მალაფოსი, ეკ	მალათიონი (500 გ/ლ)	U
531	მალაქიტი, სკ	დიტიაზონი 250 გ/ლ+პირიმეთანილი 250 გ/ლ	II
532	მალზები, სფ	მანკოცები +მეტალაქსილი (640+800 გ/კგ)	U
533	მანგო, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
534	მანგრიფი, სფ	მანკოცები (750 გ/კგ)	U
535	მანკოზატი მგ, სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
536	მანკოლაქსილი, სფ	მანკოცები +მეტალაქსილი (640+800 გ/კგ)	U
537	მანკოსილი 80 სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
538	მანკოცებ-სუპერი, წდგრ	მანკოცები+დიმეტომორფი (600+100 გ/კგ)	U
539	მანკოზი 80 სფ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U

540	მაიტ კილერი, სფ	პირიდაბენი (200 გ/კგ)	U
541	მარშალი 5 გ, გრ	კარბოსულფანი (50 გ/კგ)	III
542	მარშალი 25 ეკ	კარბოსულფანი (250 გ/ლ)	III
543	მასს კაპტანი , სფ	კაპტანი (500 გ/კგ)	U
544	მასაი, წხფ	ტებუფენპირატი (200 გ/კგ)	U
545	მატადორ გრანდი, სდკ	იმიდაკლოპრიდი+მეტალაქსილი+ციმოქსანილი (200+100+100)	U
546	მატჩი, ეკ	ლუფენურონი (50 გ/ლ)	U
547	მაჩეტე,ზდ	(ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ)	U
548	მაქსალინი, სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (400+40 გ/კგ)	U
549	მაქსილი-8, სფ	დინიკონაზოლი (10 გ/კგ)	U
550	მაქსიმი გოლდი აპ, კს	ფლუდიოქსანილი+მეტაქსილი (25 +10 გ/ლ)	U
551	მაქსიმი, კს	ფლუდიოქსანილი (25 გ/ლ)	U
552	მანკოშ დუო, წდგრ	მანკოცები+მეტალაქსილი (640+40 გ/კგ)	U
553	მაქსიმუმი, სფ	დიმეთომორფი+ მანკოცები (90+ 600 გ/კგ)	U
554	მაჯესტიკი, სფ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
555	მგფოსი 56%, აზი	ალუმინის ფოსფიდი 560 გ/კგ	არ კლას.
556	მედალი, წდგრ	თიამეთოქსამი (250 გ/კგ)	U
557	მედალ გოლდი ,სკ	ლამბდაციპალოტრინი (10 გ/ლ)+თიამეტოქსამი (141 გ/ლ)	II
558	მეთაბრომი 980, აირი	ბრომმეთილი (980 გ/კგ)	არ კლას.
559	მეთაბრომი, 100 აირი	ბრომმეთილი 1000 გ/კგ	არ კლას.
560	მელოდი დუო 66.8 სფ	იპროვალიკარბი+ პროპინები (55+612 გ/კგ)	U
561	მელოდი კომპაქტი წხგრ 49	იპროვალიკარბი+სპილენძის ქლორჟანგი (8.4+40.6გ/კგ)	U
562	მელტემი, სფ	მანკოცები+მეტალაქსილი (640+80 გ/კგ)	U
563	მენეჯი 15 სფ	იმიბენკონაზოლი (150 გ/კგ)	III
564	მენსპანი, ეკ	ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ	II
565	მენტა ინოქსი, ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
566	მენტაკოლი 70 სფ	პროპინები (700 გ/კგ)	U
567	მენტა კომბი, სფ	პროპინები +ციმოქსანილი (700 გ/კგ+60 გ/კგ)	U
568	მენტა პრელუდ, სკ	პირიმეთანილი 300 გ/ლ	U
569	მეტსილი-60 წხგრ	მეტსულფურონ-მეთილი 600 გ/კგ	U
570	მერი-X-480 წხ	გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, 360 გ/ლ გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით	U
571	მერპანი 80 წდგრ	კაპტანი (800 გ/კგ)	II
572	მეტადექს პელეტი 5%,გრ	მეტალდეჰიდი 50 გ/კგ	U
573	მეტალაქსანი, სფ	მანკოცები+მეტალაქსილი (640+80 გ/კგ)	U
574	მეტეორი, სფ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
575	მეტკუპერი, სფ	სპილენძის ქლორჟანგი+მეტალაქსილი (420+80 გ/კგ)	U
576	მეტრაბუზ დ 700 წდგრ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
577	მეტრიკი, კსკ	კლომაზონი+მეტრიბუზინი (60+233 გ/ლ)	III
578	მეტსი, წხგრ	მეტსულფურონ-მეთილი (600 გ/კგ)	U
579	მეტსილი 60 წხგრ	მეტსულფურონ-მეთილი 600 გ/კგ	U
580	მიდაში, წდფ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
581	მიდაში პლიუსი, წდფთშ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
582	მიკალი სფ 75	ალუმინის ფოსფიდი+ფოლპეტი (500+250 გ/კგ)	U
583	მიკალ ფლემი წხგრ 75	ალუმინის ფოსფიდი+ფოლპეტი (500+250 გ/კგ)	U
584	მილაგრო 40 სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
585	მილაგრო ექსტრა 6ზდ	ნიკოსულფურონი (60 გ/ლ)	U
586	მილადარი, კს	ნიკოსულფურონი (45 გ/ლ)	U
587	მილდიკატი, კს	ნატრიუმის ფოსფიტი 250 გ/ლ +ციაზოფამიდი 25 გ/ლ	II
588	მირავის დუო 200 სკ	დიფენკონაზოლი 125 გ/ლ+პედიფლუმეტოფენი 75 გ/ლ	U
589	მირავის პრაიმ, სკ	ფლუდიოქსანილი 250 გ/ლ+პედიფლუმეტოფენი 150 გ/ლ	U
590	მისტიკი 250 ეკ	ტებუკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
591	მისტიკი 250 წხე	ტებუკონაზოლი (250 გ/ლ)	II
592	მოვენტო 100 კს	სპიროტეტრამატი 100 გ/ლ	U
593	მოკაპი კაპს 400	ეტოპროფოსი (400 გ/ლ)	II
594	მოსეტამი 20 წხფ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	U
595	მოქსიმატი 505 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (465+40 გ/კგ)	U
596	მუსონ ექსტრა, წდგრ	2,4 დ დიმეთილამინის მარილი 800 გ/კგ	U
597	მუზა , წხგრ	მეტრიბუზინი 750 გ/კგ	II

598	მუსტანგი , სკ	ტეზუკონაზოლი (430 გ/ლ)	U
599	ნანდო , სკ	ფლუაზინამი (500 გ/ლ)	III
600	ნატივო, წზგრ	ტრიფლოქსისტრობინი+ტეზუკონაზოლი (250+500 გ/კგ)	U
601	ნატრიუმის ჰუმატი, ხპ	ჰუმინური მჟავების ნატრიუმის მარილი (300 გ/კგ)	U
602	ნბკ, წს	Steinernema carpocapsa (5 მლნ ნემატოდა 1 გ პოროლონის გუბკაში)	II
603	ნემასოლი, წზ	მეტამ-სოდიუმი (510 გ/ლ)	III
604	ნეორამი, წზგრ	სპილენძის ქლორჟანგი (900 გ/კგ)	III
605	ნეორონი, ეკ	ბრომპროპილატი (500 გ/ლ)	U
606	ნერო, წდგრ	ტრიბენურონ-მეთილი (750 გ/კგ)	U
607	ნივოთიონი, ეკ	მალათიონი (500 გ/ლ)	U
608	ნიკოგანი, ზდ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
609	ნიკონი, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
610	ნიკოფურონი, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
611	ნიკოში, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
612	ნიკოში პლიუსი, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
613	ნიმბუსი 24 ეკ	მიკლობუტანილი(245 გ/ლ)	III
614	ნისორანი, სფ	ჰექსიტიაზოქსი (100 გ/კგ)	U
615	ნოკდაუნი, წზკ	გლიფოსატი (360 გ/ლ)	III
616	ნორდოქს 75 წდგრ	სპილენძის (1) ოქსიდი 86% (75% სპილენძის მიხედვით)	U
617	ნუპრიდი 600 სკ	იმიდაკლოპრიდი (600 გ/ლ)	III
618	ნუპრიდი 200 წზკ	იმიდაკლოპრიდი (200 გ/ლ)	III
619	ნურელ-დ, ეკ	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი (500+50 გ/ლ)	II
620	ნიკოფურონი, სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
621	ნომოლტი, კს	ტეფლუბენზურონი (150 გ/ლ)	
622	ობერონი სკ 240	სპირომესიფენი (240 გ/ლ)	III
623	ობერონ რაპიდი სკ 240	აბამექტინი+სპირომესიფენი (11, 4+233 გ/ლ)	II
624	ოვიპრონი 2000, ეკ	პარაფინის მინერალური ზეთი (800 გ/ლ)	U
625	ოლეოლუქი, ეკ	პარაფინის ზეთი 830 გ/ლ	U
626	ოლიმპი 10 წე	ფლუსილაზოლი (100 გ/ლ)	U
627	ომიტი, ეკ	პროპარგიტი (570 გ/ლ)	U
628	ომნუსი 57 % ეკ	პროპარგიტი (570 გ/ლ)	U
629	ონდარი, წზგრ	კაპტანი (500 გ/კგ)	II
630	ორიუსული, წდგრ	ტეზუკონაზოლი+გოგირდი (45+700 გ/კგ)	U
631	ორდანი, სფ	სპილენძის ოქსიქლორიდი+ციმოქსანილი (689+42 გ/კგ)	U
632	ორდუსი, სფ	ფენპიროქსიმატი (50 გ/კგ)	III
633	ორვეგო, კს	დიმეტომორფი+ამეტოკტრადინი (225+300 გ/ლ)	III
634	ორიონი, სკ	ინდოქსაკარბი+ემამექტინ ბენზოატი (106 გ/ლ+53 გ/ლ)	II
635	ორტუსი 5 სკ	ფენპიროქსიმატი (51,2 გ/ლ)	II
636	ოსსიქლორი 50,სფ	სპილენძის ქლორჟანგი (500 გ/კგ)	U
637	ოსსიქლორი 35 წდგრ	სპილენძის ქლორჟანგი (სპილენძის მიხედვით 350 გ/კგ)	II
638	პაიამინი , წზ	2,4 დ დიმეტოლამინის მარილი (500 გ/ლ)	III
639	პანდა, წზ	პენდიმეტალინი (330 გ/ლ)	U
640	პანდორა 330 ეკ	პენდიმეტანილი (330 გ/ლ)	U
641	პანტერა, ეკ	კვიზალოფოპ-პ-ტეფურილი (40 გ/ლ)	U
642	პანჩი 40 ეკ	ფლუსილაზოლი (400 გ/ლ)	U
643	პარდუსი 480 სკ	ბენტაზონი 480 გ/ლ	III
644	პაროქსი 24 , ეკ	ოქსიფლუორფენი 240 გ/ლ	U
645	პაროქსიფენი 24 ეკ	ოქსიფლუორფენი (240 გ/ლ)	U
646	პასადოზლი 70 სფ	პროპინები+ფლოპიკოლიდი (650 გ/კგ+50 გ/კგ)	II
647	პასკალი 20 ს	აგეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	II
648	პატამილი, სფ	მეტალაქსილი +მანკოცები (80+640 გ/კგ)	U
649	პატრული, წდგრ	მეტსულფურონ-მეთილი (600 გ/კგ)	U
650	პენკილერი , ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
651	პენტაგონი, წზ	ბენტაზონი (480 გ/ლ)	U
652	პენტოს 100 ეკ	პენკონაზოლი 100 გ/ლ	U
653	პენ-ფორსი 100 ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
654	პერგადო C , წდგრ	მანდიპროპამიდი+სპილენცის ოქსიქლორიდი (25+245 გ/კგ)	III

655	პერმიტი, ეკ	პენკონაზოლი 100 გ/ლ	U
656	პერფექტო 175 სკ	ლამბდაციპალოტრინი + იმიდაკლოპრიდი (50+125 გ/ლ)	II
657	პესოსი 100 ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
658	პეტრა, ეკ	ლამბდაციპალოტრინი (50 გ/ლ)	II
659	პექსი 240 ეკ	ოქსიფლუორფენი (240 გ/ლ)	U
660	პივოტი, წკ	იმაზეტაპირი (100 გ/ლ)	U
661	პითიო პრო, წზგრ	ფამოქსადონი 225 + ციმოქსანილი 300 გ/კგ	III
662	პილოტი, წზგრ	რიმსულფურონი (250 გ/ლ)	U
663	პინაკლი, ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
664	პირატი, სფ	(ტემუფენპირატი 200 გ/კგ)	U
665	პირინექს სუპერი ეკ 420	ქლორპირიფოსი+ბიფენტრინი (400+20 გ/ლ)	II
666	პირიფოსი, ეკ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
667	პიროელექტრა 48 ეკ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
668	პირუსი 400 სკ	პირიმეტანილი (400 გ/ლ)	U
669	პლაკოლი 70 სფ	პრიპინები (700 გ/კგ)	U
670	პლანრიზ, ს	Pseudomonas fluorescens (ტიტრი არანაკლებ 210 ⁹)	U
671	პლატინ კარბენდაზიმი სფ	კარბენდაზიმი (500 გ/კგ)	U
672	პლენუმი 500 წდგრ	პიმეტროზინი (500 გ/კგ)	III
673	პოვერ სულფური, წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
674	პოლიგორი, ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
675	პოლიმეტრინი 10 უმშ	ალფაციპერმეტრინი (10 გ/ლ)	III
676	პოლიმეტ ბორდო, სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ)	III
677	პოლირამი დფ, წდგრ	მეთირამი (700 გ/კგ)	U
678	პოლტიგლია 20 სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	II
679	პოლტიგლია მანიკა, წდგრ	ბორდოული სითხე 20% (სპილენძის მიხედვით 200 გ/კგ)	II
680	პონჩო ითშ 600, სდკ	კლოტანიდინი (600 გ/ლ)	III
681	პორსელენი, წზგრ	ემამექტინ ბენზოატი (5%)	U
682	პოსეიდონი 80 სფ	ალუმინის ფოსფორი (800 გ/კგ)	III
683	პოტეგონი 20 სკ	აცეტამიპრიდი 200 გ/კგ	III
684	პრეტატორი 2,5 ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	U
685	პრევიკური, წზ 607	პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი (607 გ/ლ)	U
686	პრევიკური ენერჯი წე 840	ალუმინის ფოსფორი +პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი (310+530 გ/ლ)	U
687	პრეპარატი 30, მზე	ნავთობის ზეთი (760 გ/ლ)	U
688	პრესტიჟი კს 290	იმიდაკლოპრიდი +პენციკურონი (140+150 გ/ლ)	U
689	პრეფექტო 100 ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
690	პრიზანი 4, ეკ	ქლორპირიფოს-მეთილი (480 გ/ლ)	II
691	პრიზანი 25 სფ	ქლორპირიფოს-ეთილი (250 გ/ლ)	II
692	პრიმექსტრა გოლდი, სკ	მეტოლაქლორი+ატრაზინი (400+320 გ/ლ)	U
693	პრიუსი 400 სკ	პირიმეტანილი (400 გ/ლ)	U
694	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი, წზ	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი (720 გ/ლ)	III
695	პროგრესი, წზგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	III
696	პროკლეიმი, წზგ	ემამექტინ ბენზოატი (50 გ/კგ)	U
697	პროკურე, ეკ	პროპიკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
698	პრომოტრინი, სფ	პრომეტრინი (50გ/კგ)	U
699	პრომეთე, წდგრ	მეტალაქსილი+მანკოცები (80+640 გ/კგ)	U
700	პრომე გოლდი, სფ	პრომეტრინი (500 გ/კგ)	U
701	პროპაფექტი 57 ეკ	პროპარგიტი (570 გ/ლ)	U
702	პროპკონაზოლი, ეკ	პროპიკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
703	პროსპერი კაპს 300	სპიროქსამინი (300 გ/ლ)	U
704	პროტექტ-ოაშ 50 სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (500 გ/კგ)	III
705	პროტექტი, სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (770 გ/კგ)	III
706	პროტეუსი ზდ 110	თიაკლოპრიდი+დელტამეტრინი (110 გ/ლ)	III
707	პროტონი, წდგრ	დიმეტომორფი+ფოლპეტი 113 გ/კგ+ 600 გ/კგ)	U
708	პროფაილერი წდგრ 71.1	ფლოპიკოლიდი + ალუმინის ფოსფორი (944.4+666.7 გ/კგ)	U
709	პულსარი 40, წზ	იმაზამოქსი (40 გ/ლ)	U
710	პუმ სუპერი 7.5, ზწე	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი+ანტიდოტი (69+75 გ/ლ)	U

711	რაიოვი, ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
712	რაინკოზებ ექსტრა, წზგ	მანკოცები 750 გ/კგ	U
713	რამინ 30 წზგ	სპილენძის ოქსიკლორიდი 550 გ/კგ, სპილენძის მიხედვით 300 გ/კგ	U
714	რანსულფური 80, წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
715	რაპიდ გოლდი 72 სგ	მანკოცები+ციმოქსანილი (640+80 გ/კგ)	U
716	რაპიდ გოლდი პლუს 72 სგ	მანკოცები+ციმოქსანილი+სპილენძის ქლორჟანგი (120+40+290 გ/კგ)	U
717	რაპირა 5 ეკ	კვიზალაფოპ-პ-ეთილი (50 გ/ლ)	U
718	რატიციდი, ფ	თუთიის ფოსფიდი (800 გ/კგ)	II
719	რაუნდაპი მაქსი, წზ	გლიფოსატი კალიუმის მარილი (450 გ/ლ)	U
720	რაუნდაპი ექსტრა, წზ	გლიფოსატი კალიუმის მარილი (540 გ/ლ)	U
721	რაქსილი, კს 60	ტებუკონაზოლი (60 გ/ლ)	U
722	რაქსილი, სგ	ტებუკონაზოლი (20 გ/კგ)	U
723	რაქსილი ულტრა, სდკ 120	ტებუკონაზოლი (120 გ/ლ)	U
724	რეგალისი, წზგ	პროპექსადიონ-კალციუმი (100 გ/კგ)	III
725	რეგენტი 20 გ . გრ	ფიპრონილი (20 გ/კგ)	U
726	რეგლონ სუპერი, წკ	დიკვატი (150 გ/ლ)	III
727	რედ პალკი, წზ	გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ, 360 გ/ლ გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით	U
728	რევუს ტოპი 500 სკ	მანდიპროპამიდი + დიფენოკონაზოლი (250+250 გ/ლ)	U
729	რეზიუმე, წდფთშ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/ლ)	III
730	რეინგრანი , წზ	ბენტაზონი 480 გ/ლ	U
731	რეინკალი, სკ	ფენბიროქსიმატი (50 გ/ლ)	III
732	რეტენგო, ეკ	პირაკლოსტრობინი (200 გ/ლ)	U
733	რექს დუო, სკ	თიოფანატ-მეთილი+ეპოქსიკონაზოლი (310+187 გ/ლ)	U
734	რიბასო, ზდ	ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ	U
735	რიდოზები მც 72 სგ	მეტალაქსილი + მანკოცები (80+640 გ/კგ)	U
736	რიდოლეტი მც, სგ	მეტალაქსილ + მანკოცები (80+640 გ/კგ)	U
737	რიდომილი გოლდი მც, წდგრ	მანკოცები+მეფენოქსამი (640+40 გ/კგ)	U
738	რიდომილი გოლდი მც, სგ	მანკოცები+მეფენოქსამი (640+40 გ/კგ)	U
739	რიდომილ გოლდ პლუსი 42.5 სგ	მეფენოქსამი + სპილენძის ჰიდროქსიდი 25+400 გ/კგ	III
740	რიდონეტი მც 72 სგ	მანკოცები + მეტალაქსილი (680+40 გ/კგ)	U
741	რივეტი 24 ეკ	კარფენტრაზონ-ეთილი (240 გ/ლ)	III
742	რივომეტრინი 25 ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
743	რითმი, სკ	პირიმეთანილი (300 გ/ლ)	U
744	რიმექსი, წდგრ	რიმსულფურონი (250 გ/კგ)	U
745	რიტმუსი, ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
746	რიფიტი , წზგ	ტრიფლოქსისტრობინი (500 გ/კგ)	III
747	რკინის შაბიამანი	რკინის (II) სულფატი	III
748	როდოლიტი, სკ	ტებუკონაზოლი (60 გ/ლ)	U
749	როდოლიტ სუპერი, წზე	ტებუკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
750	როდოლიტი ექსტრა, წდგრ	ტებუკონაზოლი (800 გ/კგ)	U
751	როვონე 50 სგ	იპროდიონი (500 გ/კგ)	U
752	როვრალი 50 სგ	იპროდიონი (500 გ/კგ)	U
753	როვრალი აკვაფლო, სკ	იპროდიონი (500 გ/ლ)	III
754	როკ ენ როლ , სკ	აზოქსისტრობინი 200 გ/ლ+დიფენოკონაზოლი 125 გ/ლ	U
755	როკეტი 20 ხ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	II
756	როკიფსო, ზდ	თიაკლოპრიდი 240 გ/ლ	III
757	როტტერი, წდგრ	მეტსულფურონ-მეთილი(600 გ/კგ)	U
758	როტუნდისი, სკ	აზოქსისტრობინი (250 გ/ლ)	U
759	რუზიგანი 12 ეკ	ფენარიმოლი (120 გ/ლ)	U
760	რუზინი 2 ფ	ტებუკონაზოლი 20 გ/კგ	U
761	საგა 480 ეკ	ქლორპირიფოსი(480 გ/ლ)	II
762	საირენი, ეკ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
763	საირუქსი 25, ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
764	საკოზები მ-45 სგ	მანკოცები (800 გ/კგ)	U
765	სალიტი 40 სკ	დოდინი (400 გ/ლ)	II
766	სამბა 500 სკ	S-მეტოლაქლორი + ტერბუტილაზინი (321, 5 გ/ლ + 187, 5 გ/ლ)	III

767	სამშაბიტი, სფ	პირიდაბენი (200 გ/კგ)	U
768	სამშაბიტი, ეკ	კრეზოქსიმ-მეთილი + დიფენოკონაზოლი (100+ 200 გ/ლ)	U
769	სანაზოლი, ეკ	პროპიკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
770	სანაკოლი, სფ	პროპინეზი (700 გ/კგ)	U
771	სანშაბიტი, სფ	პირიდაბენი (200 გ/კგ)	U
772	სანსტეპი სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
773	სანფორსი 48 წხ	გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	U
774	სარბანი 48 უმმ, ეკ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
775	სარბანი 24 უმმ, ეკ	ქლორპირიფოსი (240 გ/ლ)	II
776	საფაგორი, ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
777	საფაკოლი, სფ	პროპინეზი (700 გ/კგ)	U
778	საფაკოლი კომბი, სფ	პროპინეზი+ციმექსანილი (700 +60 გ/კგ)	U
779	საფა ბორდოს ნარევი, სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (200 გ/გ/კგ)	III
780	საფა რიდონეტ გოლდი მც 68, სფ	მანკოცები+მეტალაქსილი (640+40 გ/კგ)	U
781	საფმაიტი, ეკ	პროპარგიტი (570 გ/ლ)	U
782	საფკონილი 500 სკ	ქლოროტალონილი (500 გ/ლ)	U
783	სილიტი 400 სკ	დოდინი (400 გ/ლ)	II
784	სელესტ ტოპი 312.5 კს	თიამეთოქსამი + დიფენოკონაზოლი +ფლუდიოქსონილი 262.5+25+25გ/ლ	III
785	სენკრონი 70 წდგრ	მეტრბიზინი (700 გ/კგ)	II
786	სერბანი 4 ეკ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
787	სერკადისი, სკ	ფლუქსაპროქსადი (300 გ/ლ)	II
788	სერკადის პლუსი, კს	დიფენოკონაზოლი 50 გ/ლ+ფლუქსაპროქსადი 75 გ/ლ	III
789	სერ სუპერი, ეკ	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი (50 გ/ლ)	III
790	სერტეკორი 50 სკ	მეფენოქსამი+ტეზუკონაზოლი (20+30 გ/ლ)	III
791	სერტო პლიუსი, წდგრ	ტრიტოსულფურონი 250 გ/კგ+დიკამბა 500 გ/კგ	U
792	სექმონი, წხგრ	მზოსკალიდი+პირაკლოსტრობინი (267+67 გ/კგ)	U
793	სვიპი,ხ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	U
794	სვიტჩი 62.5 წდგრ	ციპროკონაზოლი+ფლუდიოქსანილი (375+250 გ/კგ)	U
795	სვიფტი, წხ	იმაზეტაპირი (100 გ/ლ)	U
796	სიგნუმი, წდგრ	მზოსკალიდი+პირაკლოსტრობინი (267+67 გ/კგ)	U
797	სიდოპრიდი, სდკ	იმიდაკლოპრიდი (600 გ/ლ)	U
798	სალიტი 400 სკ	დოდინი (400 გ/ლ)	II
799	სივანტო პრაიმი 200 წხ	ფლუპირადიფურონი (200 გ/ლ)	III
800	სილტაკი, ეკ	(3-(პოლიოქსიეთილენ) პროპილჰეფტა მეთილ-ტრისილოქსანი 7 გ/ლ	U
801	სიპკამოლი ე. ეკ	პარაფინის ზეთი (800 გ/ლ)	U
802	სიპერკორი, ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
803	სიტრინი 50% სკ	ციპერმეტრინი (500 გ/ლ)	II
804	სკალა სკ 400	პირიმეთანილი (400 გ/ლ)	U
805	სკანდალი 250 ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
806	სკაპი, ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
807	სკორი, ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	III
808	სკორპი, ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
809	სკორპიონი, ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
810	სკორპიონი, წხ	დიკვატი დიბრომიდი (150 გ/ლ)	II
811	სკორტი 250 ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	III
812	სმაჩი, სკ	სპიროდიკლოფენი (240 გ/ლ)	U
813	სმერჩი, წხ	გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი (410 გ/ლ)	U
814	სნეილ გრანულეს გრ, პილ	მეტალდეჰიდი (60 გ/კგ)	U
815	სოლორამი, წდგრ	მეთირამი (700 გ/კგ)	U
816	სონრაუნდი 480 წხ	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	U
817	სონფიქსი1 ფთმ	დინიკონაზოლი (10 გ/კგ)	U
818	სორტი სუპერი , ეკ	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი (50 გ/ლ)	II
819	სპილენძის ქლორჟანგი, ფ	სპილენძის ქლორჟანგი (900 გ/კგ)	III
820	სპილენძის შაბიამანი	სპილენძის სულფატი (980 გ/კგ)	II
821	სპილენძის შაბიამანი,ფ	სპილენძის სულფატი (980 გ/კგ)	II
822	სპინტორი სკ 240	სპინოზადი A+სპინოზადი B (240 გ/ლ)	III
823	სპინქს ექსტრა, წდგრ	დიმეტომორფი+ფოლპეტი (113+600 გ/კგ)	U

824	სპოდელ, წხგრ	ემამექტინ ბენზოატი 50 გ/კგ	U
825	სპონსორი 330 ე	პენდიმეტალინი (330 გ/ლ)	U
826	სპორტაკი, ეკ	პროქლორაზი(450 გ/ლ)	U
827	სპრეი ოლი 11E, ეკ	პარაფინის ზეთი (848 გ/ლ)	U
828	სპრინტერი 700 წდგრ	დიტიანონი (700 გ/კგ)	III
829	სპრინტი 50 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	U
830	სტაბილანი, წხ	ქლორმექვატოქლორიდი (600 გ/ლ)	III
831	სტაგერ მ-45, სფ	მანკოცები 800 გ/კგ	U
832	სტელლარი, წხ	დიკამბა+ტოპრომეზონი (50+160 გ/ლ)	U
833	სტომპი, ეკ	პენდიმეტალინი (330 გ/ლ)	U
834	სტოპი, ეკ	პენდიმეტალინი (330 გ/ლ)	U
835	სტორი 250 ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	III
836	სტრატოს ულტრა, ეკ	ციკლოქსიდიმი (100 გ/ლ)	III
837	სტრაჟი, სე	ციპროდინილი (750 გ/ლ)	U
838	სტრობი 500 წდგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	U
839	სტრობსტარი წხგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	U
840	სულტანი, წხკ	იმიდაკლოპრიდი (200 გ/ლ)	U
841	სულფი, წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
842	სულფოლაკი 80 წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
843	სულფონი 40 სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
844	სულფური 80% წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
845	სუმი - ალფა, ეკ	ესფენვალერატი (50 გ/ლ)	II
846	სუმი-8, სფ	დინიკონაზოლი (20 გ/კგ)	U
847	სუმილექსი, სფ	პროციმიდონი (500 გ/კგ)	III
848	სუმიტიონი, ეკ	ფენიტროტინი (500 გ/ლ)	II
849	სუპერვინი, კს	ფლუტრიაფოლი +თიაზენდაზოლი (30+45 გ/ლ)	U
850	სუპერ დიანონი 700 წდგრ	დიტიანონი (700 გ/კგ)	III
851	სუპერვილი ფორტე 550 ეკ	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი (500 გ/ლ + 50 გ/ლ)	II
852	სუპერ კოპერი, ეკ	სპილენძის ქლორჟანგი (900 გ/ლ)	III
853	სუპერ სენქორი, სფ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
854	სუპერსტარი , სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	U
855	სუპერ ცინკი, ტექ	თუთიის ფოსფიდი (800 გ/კგ)	II
856	სქაინერი 500 სფ	ქლორტალონილი+ სპილენძის ოქსიქლორიდი (250+250 გ/კგ)	U
857	ტაგიანტი 30 ს	ჰექსაკონაზოლი	III
858	ტავანა 100 ეკ	ალფაციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
859	ტალავი 20 სფ	ტემუფენპირატი(200 გ/კგ)	U
860	ტალენდო 200 ეკ	პროკუინაზიდი (200 გ/ლ)	U
861	ტალდექს ექსტრა, პილ მის	მეტალდეჰიდი 60 გ/კგ	U
862	ტალსტარი 10 ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
863	ტანგრა, ეკ	ფლუაზიფოპ-პ-ეთილი (125 გ/ლ)	U
864	ტანკავ ექსტრა, წხგრ	კაპტანი 800 გ/კგ	II
865	ტანოსი,წდგრ	ფამოქსადონი250+ციმოქსანილი 250 გ/კგ	U
866	ტასპა 500 ეკ	დიფენოკონაზოლი+პროპიკონაზოლი (250+250 გ/ლ)	U
867	ტატეტუ კს 550	პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი+მანკოცები (248+302 გ/ლ)	U
868	ტეზიკური ფთშ 060	ტემუკონაზოლი (60 გ/ლ)	U
869	ტეზუჯი 060 სკ	ტემუკონაზოლი (60 გ/ლ)	U
870	ტეზკარპი 150 სკ	ინდოქსაკარბი (150 გ/ლ)	U
871	ტელდორი, 50 წხგრ	ფენჰექსამიდი (500 გ/კგ)	U
872	ტემპი, წხგ	აგეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	U
873	ტენჩანტი, ეკ	ქლორპირიფოსი +ციპერმეტრინი (500+50 გ/ლ)	II
874	ტენჩანტ პლიუსი 150 სკ	ქლორიპირიფოსი (400 გ/ლ)+ბიფენტრინი (20 გ/ლ)	II
875	ტერა ნიმის ზეთი	აზადირაქტინი 0,03%	U
876	ტერდოკი 080 ეკ	კლოდინაფოპ-პროპარგილი +კლოკვინტოსეტ-მეთილი (80+20 გ/ლ)	U
877	ტერსელი, წდგრ	დიტიანონი+პირაკლოსტრობინი (160 გ/კგ)	U
878	ტილტი, ეკ	პროპიკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
879	ტილტუსტი, ეკ	პროპიკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
880	ტიმორექს გოლდი, ეკ	Melaleuca Alternifolia -ს ეთერზეთი (23,8%)	U
881	ტინა, ეკ	აბამექტინი (18 გ/ლ)	II

882	ტი რექსი, ეკ	პროპიკონაზოლი+ტრიადიმეფონი (150+150 გ/ლ)	III
883	ტიტანი, მდს	რიმსულფურონი (250 გ/კგ)	U
884	ტიტუსი, მდს	რიმსულფურონი (250 გ/კგ)	U
885	ტმთდ, სფ	თირამი (800 გ/კგ)	III
886	ტოკტა სუპერი, ეკ	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი (50 გ/ლ)	III
887	ტოპაზი, ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
888	ტოპიკი, ეკ	კლოდინაფოპ-პ-პროპარგილ+ანტიდოტი (80+20 გ/ლ)	U
889	ტოპკაპი 240 ეკ	კლოდინაფოპ-პროპარგილ+ კლოკვინტოსეტ-მექსილ (240 გ/ლ+20 გ/ლ)	U
890	ტოპკონაზოლი, ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
891	ტოპოგარდი, სპ	ტერბუტრინი+ტერბუტილაზინი (350 + 150 გ/კგ)	U
892	ტორნადო 500 წხ	გლიფოსატის მჟავა (500 გ/ლ)	U
893	ტორპედო 18 ეკ	აბამექტინი (18 გ/ლ)	II
894	ტოტალი, წხ	გლიფოსატი ტრიმეზიუმის მარილი (480 გ/ლ)	U
895	ტოტრილი 225 ეკ	იოქსინილი (225 გ/ლ)	II
896	ტოფსინი მ, სფ	თიოფანატ-მეთილი (700 გ/კგ)	III
897	ტრიდე, წდგრ	ტრიფლოქსისტრობინი (500 გ/კგ)	III
898	ტრიმაქსი, სფ	ტრიადიმენოლი (250 გ/ლ)	III
899	ტრინოლ-2 მზე	მინერალური ზეთი (700 გ/ლ)	U
900	ტროპერი 72 სფ	მანკოცები+მეტალაქსილი (680+40 გ/კგ)	U
901	ტრუი, 75 წდგრ	ტრიბენურონ-მეთილი (750 გ/კგ)	U
902	ტურბანი 4 ეკ	ქლორპირიფოსი (480 გ/ლ)	II
903	ტუტაბსი, ფერომონით გაყვნილი რეზინის სეპტა 990 გ/კგ	EZZ-3.8.11-ტეტრადეკატრინილ აცეტატ (95%)+ EZ-3.8-ტეტრადეკადიენილ აცეტატ (5%)	U
904	ულტიმატუმი, ეკ	ქლორპირიფოსი +ციპერმეტრინი (500+50 გ/ლ)	II
905	ულტრატოქსი, სკ	თიაკლოპრიდი (480 გ/ლ)	II
906	უნივერსალი, სფ	მეტალაქსილი მ+მანკოცები (80+640 გ/კგ)	U
907	უნიკორნი, წხგრ	გოგირდი+ტეზუკონაზოლი (700+45 გ/კგ)	U
908	უნიმარკი 70 წდგრ	მეტრებუზინი (700 გ/კგ)	U
909	ურაგანი ფორტე, წხ	გლიფოსატი კალიუმის მარილი (500 გ/ლლ)	U
910	ურაგანი, წხ	გლიფოსატი (360 გ/ლ)	U
911	ფავორიტი 70 სფ	პროპინები (700 გ/კგ)	III
912	ფაინსულფური 80 წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
913	ფაიტერ ზლუ, სფ	დიმეტომორფი+სპილენძის ქლორჟანგი 60++400 გ/კგ	U
914	ფალკონი ეკ 460	ტეზუკონაზოლი+ტრიადიმენოლი+სპიროქსამინი (250+167+43 გ/ლ)	U
915	ფანტიკი ფ, წხგრ	ბენალაქსილი მ+ფოლპეტი (375+480 გ/კგ)	U
916	ფასინეითი, წხ	ამონიუმ გლუფოსინატი (280 გ/ლ)	U
917	ფასტაკი, ეკ	ალფაციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
918	ფაქტორი, ეკ	ბრომპროპილატი (500 გ/ლ)	U
919	ფელიქსი 75,7 წდგრ	გლიფოსატი ამონიუმის მარილი (757 გ/კგ)	U
920	ფენდი, ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
921	ფენდონა, კს	ალფაციპერმეტრინი 15 გ/ლ	U
922	ფენიქსი 60% წხ	2,4დ დიმეთილამონიუმის მარილი (600 გ/ლ)	U
923	ფენიქს გოლდი 720 წხ	2,4დ დიმეთილამონიუმის მარილი (720 გ/ლ)	U
924	ფიბულა, გრ	მეტალქდეპიდი 6%	III
925	ფიტოლავინი-300, მფ ფიტოლავინი-100, მფ	შტრეპტომიცეს ლავენდულაე, შტრეპტომიცეს გრისეუმ (ბა-300000)	U
926	ფიტომაგი, ფ	1-მეთილციკლოპროპენი (20 გ/კგ)	III
927	ფიტოვერმი , ეკ	ავერსექტინი B(2 გ/ლ)	III
928	ფიტოსპორინი -მ, ფ ფიტოსპორინი-მ, პ	Bacillus subtilis (ტიტრი არანაკლები 2 მლრდ. ცოცხალი უჯრედებისა და სპორების)	U
929	ფინალი, ეკ	კარბენდაზიმი (500 გ/ლ)	U
930	ფიური 10 წე ფიური, ეკ	ზეტაციპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
931	ფლინტი წხგრ 50	ტრიფლოქსისტრობინი (500 გ/კგ)	III
932	ფლინტ სტარი სკ 520	ტრიფლოქსისტრობინი +პირიმეთანილი (520 გ/კგ)	U
933	ფლუენტი, ეკ	ფლუაზიფოპ-პ-ზუთილი (125 გ/ლ)	U
934	ფლუზიტოპი, ეკ	ფლუაზიფოპ-პ-ზუთილი (150 გ/ლ)	II
935	ფლუმაიტი 200 სკ	დიფლოვიდაზინი (200 გ/ლ)	II
936	ფოზოსი, ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U

937	ფოლიკური ეკ 250	ტეზუკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
938	ფოლიკური ზტ. ეკ	ტეზუკონაზოლი +ტრიადიმეფონი (125+100 გ/ლ)	U
939	ფოლპანი, სფ	ფოლპეტი (500 გ/კგ)	U
940	ფორეი 76 ზ. წს	Bacillus thuringiensis subs. kurstaki (ზა-16700 ეა/მგ)	U
941	ფორისი, სკ	ფოლტრიაფოლი (500 გ/ლ)	U
942	ფორმულა, წზგრ	ტიფენსულფურონ-მეთილი (750 გ/კგ)+ ზან ტანდემი	U
943	ფორმულა სუპერი 5 ეკ	კვიზალოფოპ- ეთილი (50 გ/ლ)	III
944	ფორსე 1.5 გრ	ტეფლუტრინი (15 გ/კგ)	III
945	ფოს-ბი, ეკ	დიმეთოათი (400 გ/ლ)	II
946	ფოსბელ 80 სფ	ალუმინის ფოსეთილი (800 გ/კგ)	III
947	ფოსბელ ექსტრა 80 სფ	ალუმინის ფოსეთილი 500+ფოლპეტი 250+ციმოქსანილი 40	U
948	ფოსბელ პლიუსი,სფ	ალუმინის ფოსეთილი (350 გ/კგ)+ მანკოცები (350 გ/კგ)	III
949	ფოსილი 70 წდგრ	დიითანონი (700 გ/კგ)	III
950	ფოსტოქსინი, აბი, გრ, პილ	ალუმინის ფოსფიდი (560 გ/კგ)	არ კლას.
951	ფოსფინი, აბი, გრ	ალუმინის ფოსფიდი (560 გ/კგ)	არ კლას.
952	ფოუზილე, ეკ	ფოლუაზიფოპ-პ-ზუთილი (125 გ/ლ)	II
953	ფრონტიერ ოპტიმა, ეკ	დიმეთენამიდი-პ (720 გ/ლ)	II
954	ფუზილადი -ფორტე, ეკ	ფოლუაზიფოპ-პ-ზუთილი (150 გ/ლ)	II
955	ფულპასი, ეკ	პენკონაზოლი (100 გ/ლ)	U
956	ფულსპიდი, ეკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
957	ფუნგიკინგი, სფ	პროპინები (700 გ/კგ)	U
958	ფუნგიკინგი პლიუსი, სფ	პროპინები (700 გ/კგ)	U
959	ფუნდაზოლი, სფ	ბენომილი (500 გ/კგ)	U
960	ფუნქსი 25 ეკ	დიფენოკონაზოლი (250 გ/ლ)	U
961	ფურორე-სუპერი 69 მწე	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი (69 გ/ლ)	U
962	ქათენგი, სე	ფლორასულამი 6,25 გ/ლ+2,4 დ ეთილპექსილ ეთერი 452,42 გ/ლ	U
963	ქვადრის მაქსი 593.5 კს	აზოქსისტრობინი +ფოლპეტი 93.5+400 გ/ლ	III
964	ქლორპირიფიტი-აგრო, ეკ	ქლორპირიფოსი +ციპერმეტრინი (500+50 გ/ლ)	II
965	ხელპი, სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (500 გ/კგ)	U
966	ცეზარი, ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
967	ცელფოსი, აბი	ალუმინის ფოსფიდი (560 გ/კგ)	არ კლას.
968	ცელიტელი სფ	მანკოცები +მეტალაქსილი (640+80 გ/კგ)	U
969	ციდელი ტოპი 140 დკ	დიფენოკონაზოლი + ციფლუფენამიდი (125+15 გ/ლ)	III
970	ციმბალი წზგრ	ციმოქსანილი 450 გ/კგ	U
971	ციმოზები, სფ	ციმოქსანილი+მანკოცები (50 გ/კგ+450 გ/კგ)	U
972	ციმო სუპერი, სფ	ციმოქსანილი+მანკოცები (50 გ/კგ+450 გ/კგ)	U
973	ციპერსანი, ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
974	ციპი პლიუსი, ეკ	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი (480+50 გ/ლ)	II
975	ციპრინი, ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
976	ციპრო პლიუსი 75 წდგრ	ციპროდინილი (750 გ/კგ)	III
977	ციხომი ბლუ	ცინები+სპილენძის ქლორჟანგი (340+170 გ/კგ)	U
978	ციტეიშნ, ეკ	კლოდინაფოპ-პროპარგილი+ ანტიდოტი (80+20 გ/ლ)	III
979	ხელპი, სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (500 გ/კგ)	U
980	ხვასტოქსი 750 წზ	მგპა მჟავა (750 გ/ლ)	II
981	ხორუსი, წდგრ	ციპროდინილი (750 გ/კგ)	U
982	შავიტი ფ 71,5 სფ	ტრიადიმენოლი+ფოლპეტი (15+700 გ/კგ)	III
983	შავიტი ფ 71,5 სფ	ტრიადიმენოლი+ფოლპეტი (15+700 გ/კგ)	III
984	შაოლინ ექსტრა წზდრ	ციპროდინილი 375+ ფლუდიოქსანილი 250 გ/კგ	U
985	შენფოსი, აბი	ალუმინის ფოსფიდი (570 გ/კგ)	არ კლას.
986	შერპა, ეკ	ალფაციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
987	შოკი, წზ	გლიფოსატი ტრიმეზიუმის მარილი (480 გ/ლ)	U
988	შტორმი, ბრ	ფლოკუმაფენი (0.05 გ/კგ)	II
989	შტორმი პელეტი, პილ	ფლოკუმაფენი (0,005 %)	U
990	შტორმი სეკიურე, ბლოკ მის	ფლოკუმაფენი (0,005 %)	U
991	ჩემპიონი, სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (770 გ/კგ)	III
992	ჯაკო 50 წდგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	U
993	ჯეკ პოტი , ეკ	პენკონაზოლი+დიფენოკონაზოლი (100+200 გ/ლ)	III
994	ჯენსილი, სკ	ტეზუკონაზოლი (60გ/ლ)	U

995	ჯეტისი 2,5 ეკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III
996	ზაბლა 100 ეკ	ბიფენტრინი (100 გ/ლ)	II
997	ზარბორი 300 ეკ	დიფენოკონაზოლი (150 გ/ლ)+პროპიკონაზოლი (150 გ/ლ)	III
998	ჰელიოსი, ეკ	დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ	U
999	ჰერბიმატი 330 ეკ	პენდიმეტანილი (330 გ/ლ)	U
1000	ჰიბერსიბი, კპ	ჰიბერელინის მჟავას ნატრიუმის მარილი (90 გ/კგ)	U
1001	ჰელგა სუპერი, ეკ	ხიზალაფოპ-პ-ეთილი (125 გ/ლ)	III
1002	ჰელიოკუივრი, სკ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (400 გ/ლ)	U
1003	ჰელიოსუფრი, სკ	გოგირდი (700 გ/ლ)	U
1004	ჰეროლდი, წსკ	დიფლუბენზურონი (240 გ/ლ)	U
1005	ჰეტეროაუქსინი, წპ	ინდოლ-3-მმარმჟავა (920 გ/კგ)	III
1006	ჰექსილი ფთშ 2	ტებუკონაზოლი (20 გ/კგ)	U
1007	ჰექტაფერმინი, წხ	2,4-დ მჟავა დიმეტილამინის მარილი (500 გ/ლ)	U
1008	ჰექტაშ ზაკირი, სფ	სპილენძის ქლორჟანგი (500 გ/კგ)	III
1009	ჰექტაშ ბორდო 20, სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი (740 გ/კგ)	II
1010	ჰექტაშ დელტარინი 12,5 უმშ	დელტამეტრინი (12,5 გ/ლ)	III
1011	ჰექტაშ პრიზანი 240 უმშ	ქლორპირიფოსი (240 გ/ლ)	II
1012	ჰექტოლინეუმი, მზე	ნავთობის ზეთი (700 გ/ლ)	U
1013	ჰექტორ მაქსი, წდგრ	დიკამბა 550 გ/კგ+ ნიკოსულფურონი 92 გ/კგ+ რიმსულფურონი 23 გ/კგ	U
1014	ჰიდრომიკრონი 77 სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (700 გ/კგ)	III
1015	ჰიპნოზი 05 წზგრ	ეგმამექტინ ბენზოატი (50 გ/კგ)	U
1016	ჰორმა, წხ	2, 4 დ +მცვა (275 +275 გ/ლ)	II
1017	ჰოსტრაკოლ კომბო სფ	პროპინები+ციმოქსანილი (700 გ/კგ+60 გ/კგ)	III

შენიშვნა: პესტიციდების საშიშროება კლასიფიცირებულია ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) კლასიფიკაციის (2009) მიხედვით:

IA კლასი - განსაკუთრებულად საშიში;

IB კლასი - ძლიერ საშიში;

II კლასი - ზომიერად საშიში;

III კლასი -ნაკლებად საშიში ;

U - არ იწვევს მწვავე მოწამვლის საშიშროებას ნორმალური ხმარებისას;

არ კლას - ფუმიგანტები არ კლასიფიცირდება.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 21 თებერვლის ბრძანება №2-163 - ვებგვერდი, 25.02.2020წ.

თავი VI. პესტიციდების საშიშროების კლასები ფუტკრებისათვის და მათი გამოყენების პირობები

მუხლი 23. პესტიციდების საშიშროების კლასები ფუტკრებისათვის და მათი გამოყენების პირობები

1. პირობები პესტიციდებისათვის, რომლებიც შეტანილია პირველ თავში:

ციფრობრივი აღნიშვნები (1), (2) და (3) კატალოგის პირველ გრაფაში ნიშნავს პრეპარატის საშიშროების კლასს ფუტკრების მიმართ სავსელ პირობებში:

(1) კლასი – ფუტკრების მიმართ მაღალტოქსიკური. აუცილებელია დაცული იქნეს შემდეგი რეგლამენტები: მცენარეთა შესხურება უნდა ჩატარდეს გვიან საღამოს მზის ჩასვლის შემდეგ, ქარის სიჩქარე 1-2 მ/წამში; დამცავი ზონა საფუტკრედან არანაკლებ 4-5 კმ-ისა ფუტკრების ფრენის შეზღუდვა – 4-6 დღე-ღამე.

(2) კლასი – ფუტკრების მიმართ საშუალოდ ტოქსიკური. დაცულ უნდა იქნეს შემდეგი რეგლამენტები: შესხურება უნდა ჩატარდეს საღამოს საათებში მზის ჩასვლის შემდეგ, ქარის

სიჩქარე 2-3 მ/წამში, დამცავი ზონა საფუტკრედან – არანაკლებ 3-4 კმ-ისა ფუტკრების ფრენის შეზღუდვა – 2-3 დღე-ღამე.

(3) კლასი - ფუტკრების მიმართ ნაკლებ ტოქსიკური პესტიციდები. დაცული უნდა იქნეს შემდეგი რეგლამენტები: შესხურება ტარდება დილის ან საღამოს საათებში, ქარის სიჩქარე 4-5 მ/წამში, დამცავი ზონა საფუტკრედან 2-3 კმ, ფუტკრების ფრენის შეზღუდვა – 3-24 საათით.

2. პესტიციდების გამოყენებისას აუცილებელია დაცული იქნეს მოთხოვნები ფუტკრების მოწამვლის პროფილაქტიკისათვის: წინასწარ უნდა გაფრთხილდეს ადგილობრივი მოსახლეობა, მეფუტკრეები მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების ვადის და ადგილის შესახებ.

თავი VII. ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც არ საჭიროებენ აუცილებელ კონტროლს პროდუქციასა და გარემოს ობიექტებში

მუხლი 24. ნივთიერებები და პრეპარატები, რომლებიც არ საჭიროებენ აუცილებელ კონტროლს პროდუქციასა და გარემოს ობიექტებში

№	მოქმედი ნივთიერება	პრეპარატის სავაჭრო სახელწოდება
1	აბამექტინი	ვერტიმექი, ტორპედო, ალგამექი 1,8, ვერტამექტინი ფორტე 50 წდგრ, აცენტე, არვილმექი, კრაფტი 18, ევდალ მექტინი, ობერონ რაპიდი, ვერტევი, ტინა, ბერმექტინი, აბამექტი
2	ალუმინის ფოსფატი	მიკალი, ევალი, ალიეტი, მიკალ ფლემი, პროფაილერი, პოსეიდონი, ფოსბელ 80 სფ, ფოსბელ ექსტრა , ფოსბელ პლიუსი, პრევიკურ ენერჯი
3	ამიდოსულფურონი	გროდილი მაქსი
4	აცეტამიპრიდი	აცე, მოსეტამი, ტემპი, გოლდპლანი, ევდალ აფიტრიდი, ესკაპე, პასკალი, როკეტი, ადმიტი, არმორი, აგროპლანი
5	ბენტაზონი **	ბაზაგრანი, ბაზაგრანი მ, ბენტაზონი, პენტაგონი, ევდალ როქსანი, რეინგრანი, პარდუსი, ბენტაგონი
6	ბიფენტრინი	ტალსტარი, პირინექს სუპერი, ინსაკარი, ანტიხრუში, ზონდერი, ხაზლა, თეიქოფი, ფენდი, ბატალიონი, კურა-კურა, ცეზარი, გლადიუსი, ბაიტი
7	ბრომუკონაზოლი	ვექტრა
8	გალაქსიფოპ-P-მეთილი	ზელეკ-სუპერი
9	გლიფოსატი	გლიალკა, გლისოლი, გლიფოსატი, რაუნდაპი, დომინატორი, კლინი, ნოკდაუნი, ვალსაგლიფი, გლიფოსანი, გლიაციტი, გეიზერი, ურაგანი ფორტე, ზერო, გლიფოგანი, რუმბო, სვიპი, კლიმი, კორფოსატ მაქსი, სვიპი, ფელიქსი, სმერჩი, გლინი, ტორნადო, გლიფოვიტი, რაუნდაპი მაქსი, რაუნდაპი ექსტრა, რაუნდაპი მაქსი, პაროქსიფენი, კორფოსატი მაქსი, ევდალ იზოფოსატი 36, ევდალ იზოფოსატი 48, სონრაუნდი 48, კლინ აპი, სანფორსი 48, ბოქსერი, სვიფტი, კაილეო, კლინერი, კორფოსატი, ნოკდაუნ მაქსი, კლინი იქსტრიმ, კლიმი, კლიმი+, დიკსი, მერი, ბომბა
10	გლიფოსატი ტრიმეზიუმში	ტოტალი, შოკი
11	გოგირდი	გოგირდი, კოლოიდური გოგირდი, თიოვიტი ჯეტ, პოვერ სულფური, კუმულუსი დფ, ორიუსული, სულფოლაკი, სულფი, კოსავეტი, კარჯილ დფ, გოგირდ +, ევდალ სულფური, სულფექს გოლდი, ფაინსულფური, ჰელიოსულფური, რანსულფური, სულფურ, ინფერნო
12	დესმედიფამი	ბეტანალი მ, ბეტანალი ც, ბურეფენი ფდ 11, ბაიტან უნივერსალი, ბეტანალ ექსპრესი, ბელვედერი
13	დიაფენთიურონი	პეგასი
14	დიკამბა	ბანველი, დიალენი, დიალენ სუპერი , ველოსიტი, ვალსამინი, ლინტური, დიანატი, დიკოპურ ტოპი, ამინოპელიკ სუპერი, ჰექტორ მაქსი, სერტო პლიუსი, ვაგაბონდი, ჰექტორ მაქსი, სტელარი, სერტოპლიუსი, გოლიაფი, აისი, რიმაქსი
15	დინიკონაზოლი მ	სუმი-8, კონილი, მაქსილ-8, ალიანსი, სონფექსი 1 ფთშ
16	დიფენოკონაზოლი	დივიდენდი, დივიდენდი სტარი, სკორი, სკორპიონი, ფუნიქსი, სკაპი, ტასპა, ატიკი, სელესტ ტოპი, კორბეტი, ჰარბორი, აპპლორი, ბროდერი, სკანდალი, ჯეკ-პოტი, რაიოკი, დინალი, ევდალ დონაზოლი, სამშიტი, ევდალ დიფენპრო, რევეს ტოპი, იზოლდეფეკორე, სკორპი, სტორი, ციდელი ტოპი, სკორტი, პრივატი, ჰელიოსი, ანტალია, გრავიტონი
17	დიფლუბენზურონი	დიმილინი, ჰეროლდი, ალფამილინი
18	იმაზალილი	ბაიტან უნივერსალი, მაგმატილი
19	თიაზენდაზოლი	ტექტო, ვინციტი, სუპერვინი

20	თიამეთოქსამი ***	აქტარა, მედალი, სელესტ ტოპი, კუნგფუ სუპერი, რენოვა, მედალ გოლდი, მისტი, ეფორია
21	კარბოქსინი	ვიტავაქსი 200 ფფ, ფენორამი, კარბოქსინი
22	კარფენტრაზონ ეთილი	რივეტი
23	კლოფენტიზინი	აპოლო
24	ლუფენურონი	მატჩი, ბოქსი, ლუფოქსი (39)
25	მანკოცები*	აკრობატ მც, დითან მ-45, რიდომილ გოლდი მც, გალბენი მ-5-68, კლიპი, ვალსაზები, რიდონეტი მც, ავანგარდი, მანგრიფი, დითან მ-45, რაპიდ გოლდი, რაპიდ გოლდი პლუს, კურზები, საკოზები, მანკოში, მანკოსილი, ტროპერი, მაქსიმო, მანკოცები-სუპერი, მანკოლაქსილი, კუპროფიქსი 30 დისპერს, კადილაკი, ეფდალ აკროზოტი, ეფდალ ციმოქსაზები, დრაკო ბლუ, მანკოზატი მც არმეთილი, მალზები, მაქსიმუმი, პატამილი, კარზეპი, ეფდალ მანტოლაქსი, მაქსალინი, სუპერსტარი, კინგკოზები მ-45, ერფრუტი, კამბაზი, მელტემი, ლანგრიფი, კარმენი, რიდოლეტი, ვიოლეტი, აქტორმენი, ციმო სუპერი, ინდოფილი, მოქსიმატი, მაქსიმუმი, არივა გოლდი, ფოსბელ პლიუსი, რეინკოზებ ექსტრა, სტაგერი, აკრომენი
26	მეტალაქსილი	აპრონი, რიდომილ მც, ვალსალაქსილი, რიდონეტი მც, ტროპერი, მაქსიმო, ვალსალაქსილი ჩ პლიუსი, იუნომილი მც, მეტალაქსანი, ვიქტორი, პრომეთე, მ-2, მანკოლაქსილი, რიდოზები მც-72, რიდონეტ გოლდ მც 68 სფ, არმეთილი მ, პატამილი, მალზები მ-2, უნივერსალი, მატადორ გრანდი, ეფდალ მანტოლაქსი, მელტემი, კარმენი, რიდოლეტი, ვიოლეტი, პატამილი, რელაქსი, პლანეტა
27	მეტსულფურონ-მეთილი	მეტსი, როტტერი, ალე, იმპერატორი, პატრული, ეფდალ მეტეორი, მეტსილი
28	მეფენოქსამი	აპრონ გოლდი, მაქსიმ გოლდი, რიდომილ გოლდი მც, აპრონ იქს ელი 350, რიდომილ გოლდ პლიუსი, სერტიკორი
29	პირიდატი	ლენტაგრანი, პირიდატი
30	ოქსიფლუორფენი	ალაქსი, გალიგანი, გალაქსი, ფორმულა სუპერი, პექსი, კოლტარი, ეფდალ ოქმოსტი, გონდოლიერი, მორბიდილი, პაროქსი
31	რიმსულფურონი	ტიტუსი, მასი, პილოტი, რიმექსი, ჰექტორ მაქსი, ესკუდო, ვიდაგერი, აისი, ტიტანი
32	ტრიადიმენოლი	ბაიტან უნივერსალი, ფალკონი, შავიტი
33	ტრიასულფურონი	ტრეზორი მ, ლინტური, ლოგრანი
34	ტრიბენურონ მეთილი	გრანსტარი, ტრუი, გრანლენდი, კორიდა, ნერო, ექსპრესი
35	ტრიტიკონაზოლი	კორრიოლისი, ინშურ პერფორმი
36	ტრიფლოქსისტრობინი	ზატო, ზატო სტარი, ფლინტი, ფლინტ სტარი, რიფიტი, ლუნა სენსიტივენ სკ 500, ეფდალ ლოქსბინი
37	ფენაზახინი	დემიტანი
38	ფენმედიფამი	ბეტანალი ამ, ბურეფენი ფდ 11, ბეტანალ ექსპრესი, ბელვედერი
39	ფენოქსიკარბი	ინსეგარი, ლუფოქსი(24)
40	ფიპრონილი****	ადონისი, რეგენტი
41	ფლუტრაფოლი	ვინციტი, იმპაქტი, სუპერვინი
42	ფუბერიდაზოლი	ბაიტან უნივერსალი
43	ციმოქსანილი	კურზატი რ, იტერალი, რაპიდ გოლდი, რაპიდ გოლდი პლუს, კურზები, კორზ სუპერი, ექსპერტ ტიმი, საფაკოლი კომბი, ტანოსი, ეფდალ ციმოქსაზები, ზახისტი, ორდანი, ენერკოლ კომბი, ალექტო, მატადორ გრანდი, სუპერსტარი, ეფდალ მოკანი, ეფდალ პიროქსომი, ერფრუტი, მენტაკოლ კომბი, ციმო სუპერი, ჰოსტრაკოლ კომბო, მოქსიმატი, ფოსბელ ექსტრა, ციმბალი
44	ჰიბერილინის მჟავას ნატრიუმის მარილი	ჰიბერსიბი, გოლდ გიბზი, გიბგრო, ეფდალ ბლუგები, მეგაფილ ტაბლეტი, აგრო გიბ, გიბერექი
45	ჰექსითიაზოქსი	ნისორანი
46	ჰიმექსაზოლი	ტაჩიგარენი, ტაგიანტი

* - მხოლოდ ნიადაგისა და წყლის შემთხვევაში;

** - გარდა სიმინდისა და სოიასი (თესლი, ზეთი);

*** - გარდა ვაშლისა და მსხლის;

**** - გარდა კარტოფილისა.

შენიშვნა: კონტროლი არ ხორციელდება პრეპარატების გამოყენების რეგლამენტების მკაცრი დაცვისას. სახელმწიფო კატალოგში პრეპარატებზე რომლის კონტროლი არ არის აუცილებელი შესაბამის გრაფაში მითითებულია ნა - ნორმირება არ არის საჭირო მოცემულ გარემოში.

თავი VIII. პესტიციდების გამოყენების შეზღუდვები კომუნალურ მეურნეობაში

მუხლი 25. შეზღუდვები კომუნალურ მეურნეობაში

1. ტყე-პარკებში, ბოტანიკურ ბაღებში, სამრეწველო საწარმოების სანიტარიულ-დაცვით ზონებში, საავტომობილო და რკინიგზებზე მთელ სავეგეტაციო პერიოდში ნებადართულია ქიმიური პრეპარატებით ერთი და ბიოლოგიური პრეპარატებით ორი დამუშავება.

2. ქალაქების პარკებში, სკვერებში, ბულვარებში, პროსპექტებში დასაშვებია ქიმიური პრეპარატებით ერთი და მიკრობიოლოგიური პრეპარატებით ორი დამუშავება ხარჯვის მინიმალური ნორმის და საცხოვრებელი სახლებიდან მინიმუმ 50 მ სანიტარულ-დაცვითი ზონის არსებობის გათვალისწინებით.

3. აკრძალულია ნებისმიერი პესტიციდის გამოყენება საბავშვო, სპორტულ, სამედიცინო დაწესებულებების, სკოლების, საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, მდინარეების, წყალდაცვითი ზონების, ტბების, წყალსატევების, წყალმომარაგების წყაროების სანიტარიული დაცვის ზონის პირველი და მეორე სარტყელების ტერიტორიაზე, საცხოვრებელი სახლების და ჰაერ-შემწოვი დანადგარების უშუალო სიახლოვეს.

4. ეზოებში და სახლებთან მიმდებარე ნაკვეთებზე დასაშვებია პესტიციდების შერჩევითი კერობრივი დამუშავება ხარჯვის მინიმალური ნორმით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი მოსალოდნელია მავნებელთა მასობრივი გამრავლება ან მწვანე ნარგავების დაავადებანი.

5. ქალაქების მწვანე ნარგავების დამუშავება ხდება შლანგიანი აპარატურით. პესტიციდების შესხურება უნდა მოხდეს დილით ან საღამოს ყველაზე დაბალი ტემპერატურის, დაბალი ინსოლიაციის და ჰაერის მინიმალური ნაკადის დროს, გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია პრეპარატების გამოყენება დღის საათებში. თუ ამინდი ღრუბლიანი და გრილია. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მცენარეების კერობრივ დამუშავებას. ერთჯერზე არ არის რეკომენდირებული 5 ჰა-ზე მეტი ფართობის დამუშავება.

6. მწვანე ნარგავების პესტიციდებით დამუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს კომუნალური და თევზსამეურნეო დანიშნულების ღია წყალსატევების დაცვითი ღონისძიებანი. დამუშავება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი დასამუშავებელ ობიექტებსა და ღია წყალსატევებს შორის არის არანაკლებ 200 მ სანიტარიულ-დაცვითი ზონა.

7. ქალაქების და დასახლებული პუნქტების მწვანე ნარგავების დამუშავების წინ, მცენარეთა დაცვის სამსახურები ვალდებული არიან გააფრთხილონ მოსახლეობა ჩასატარებელი შესხურების შესახებ. დამუშავებული ფართობების საზღვარზე (შესასვლელში და გასასვლელში) უნდა განთავსდეს ერთიანი გამაფრთხილებელი ნიშნები გარკვეული ვადით. ამ ვადებში დამუშავებულ ფართობებზე ადამიანებისა და შინაური ცხოველების ყოფნა აკრძალულია.

8. სკვერებისა და პარკების პესტიციდებით დამუშავებისას უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ბავშვთა ქვიშის სათამაშო მოედნებსა და სავაჭრო წერტილებში (ფარდულებში, პავილიონებში, რესტორნებში) საკვები პროდუქტების დაცვა დაბინძურებისაგან. პესტიციდების გამოყენების შემდეგ უნდა განხორციელდეს სპორტულ მოედნებზე, ფარდულებთან, რესტორნებთან, პავილიონებთან და სხვ. განლაგებული საპარკო

ინვერტარისა და მოწყობილობების (მელსკამები, საბავშვო და სპორტული სათამაშოები) სველი დამუშავება. აუცილებლობის შემთხვევაში ბავშვთა სათამაშო ქვიშის შეცვლა.

თავი IX . საქართველოში რეგისტრირებული მოქმედი ნივთიერებები

მუხლი 26. პირობითი აღნიშვნები

1. ბი – ბიოლოგიური ინსექტიციდი.
2. ზრ – ზრდის რეგულატორი.
3. ლიმ – ლიმატოციდი.
4. ბფ – ბიოლოგიური ფუნგიციდი.
5. ნ – ნემატოციდი.
6. ი – ინსექტიციდი.
7. რ – როდენტიციდი.
8. ია – ინსექტოაკარიციდი.
9. ფთშ – ფუნგიციდი თესლის შესაწამლად.
10. იფ – ინსექტოფუნგიციდი.
11. ფუმ – ფუმიგანტი.
12. ითშ – ინსექტიციდი თესლის შესაწამლად.
13. ფუნგ – ფუნგიციდი.
14. დეს – დესიკანტი.
15. ჰ – ჰერბიციდი.
16. დეფ – დეფოლიანტი.

მუხლი 27. საქართველოში რეგისტრირებული მოქმედი ნივთიერებების ჩამონათვალი

N	მოქმედი ნივთიერება	პრეპარატის სავაჭრო დასახელება	ჯგუფი	ხელახალი რეგისტრაციის ვადა (თვე, წელი)
	2	3	4	5
1	აბამექტინი	ვერტიმეკი	ბი	10.2020
	„	ალგამეკი 1,8	„	04.2022
	„	ვერტამექტინ ფორტე 50	„	01.2024
	„	არვილმეკი	„	04.2020
	„	კრაფტი	„	01.2021
		ეფდალ მექტინი	„	05. 2022
		ვერტეკი	„	02. 2022
		ტინა	„	03.2022
		ბერმექტინი	„	09 .2023
		აბამექტი	„	12.2022
		დიკაპრიონი	„	12.2022
2	აზოქსისტრობინი	ქვადრისი	ფუნგ	08. 2024
	„	დორისი	„	03.2020
	„	აზოქსი	„	12.2020
	„	აფფიქსი	„	02..2022
		როტუნდისი	„	06.2023
		ლაცერტა		07.2024
		აზობინი		11.2024
3	აზოქსისტრობინი+დიფენოკონაზოლი	ლაცერტა მაქს	ფუნგ	05.2024
	„	როკ ენ როლი	„	11.2024
4	აზოქსისტრობინი+ფოლპეტ	ქვადრის მაქსი	ფუნგ	10.2020
5	ალუმინის ფოსფატი	ალიეტი	ფუნგ	12.2024
	„	პოსეიდონი	„	04.2020
	„	ფოსბელ 80	„	09 .2023
6	ალუმინის ფოსფატი+მანკოცები	ფოსბელ პლიუსი	ფუნგ	09.2023
7	ალუმინის ფოსფატი + ფოლპეტ	მიკალ ფლეში	ფუნგ	12.2022

8	ალუმინის ფოსფატი +ფოლპეტი +ციმოქსანილი	ფოსფელ ექსტრა	ფუნგ	07.2023
9	ალუმინის ფოსფატი-პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი	პრევიკურ ენერჯი	ფუნგ	12.2024
10	ალუმინის ფოსფატი	ფოსტოქსინი	ფუმ	03.2021
	"	იონგფოსი	"	02.2023
	"	მგფოსი	"	02.2024
11	ალფა-პინენი+პ-ჰიდროქსიბენზოიკ მჟავა+ეტანოლი	ტომოვიტი	ფერ	10.2021
12	ალფა-ციპერმეტრინი	ფასტაკი	ი	02.2020
	"	ალპაკი	"	02.2020
	"	ფენდონა	"	02.2021
	"	სუპერ ჰექტამეტრინი	"	09.2021
	"	ბესტ ალფა	"	04.2022
	"	ეფდალ ალფატრინი	"	06.2022
	"	ალარმი	"	11.2022
	"	ფასი	"	12.2021
	"	ბალისტა	"	10.2022
	"	პოლიმეტრინი	"	06.2023
	"	კალიბრი	"	03.2024
	"	ალფალაფი	"	05.2022
13	ალფა-ციპერმეტრინი +იმიდაკლოპრიდი+კლოტანიდინი	ბორეი ნეო	ი	12.2021
14	ამიდოსულფურონი+იოდოსულფურონ-მეთილი	გროდილ მაქსი	ჰ	12.2020
15	ამისულბრომი	ლიმაი	ფუნგ	04.2024
16	ამონიუმის გლუფოსინატი	ბასტა	ჰ, დეფ	12.2022
		ვისტა	"	02.2023
		ფასინეითი	ჰ	02.2022
		ბარსულტრა	"	10.2021
		გალანტი	"	12.2021
17	Ampelomyces Quisqualis strain	ოვნიერი	ბფ	06.2023
18	Argemonina, Berberina, Ricinina, α-Terthienil მცენარეების ექტრაქტი	ბიო დიე	ბი	08.2024
19	აცადირაქტინი	ნიმბეციდინი	ბი	03.2023
		ტერა ნიმის ზეთი	"	07.2024
20	აცეტამიპრიდი	აცე	ი	12.2020
	"	მოსეტამი	"	07.2024
	"	გოლდპლანი	"	02.2023
	"	ეფდალ აფიტრინი	"	04.2023
	"	პასკალი	"	12.2024
	"	როკეტი	"	03.2020
	"	აგროპლანი	"	07.2020
21	აცეტამიპრიდი+ლამბდაციპლოტრინი	ადმიტი	ი	11.2024
	"	არმორი	"	02.2020
22	აცეტამიპრიდი+ციპერმეტრინი	ეპედი	ი	11.2022
23	Bacillus subtilis, შტამი ИПМ-215	ბაქტოფიტი, სკ	ბფ	05.2021
24	Bacillus subtilis, შტამი 26-Д	ფიტოსპორინი-M	ბფ	05.2021
25	Bacillus amyloliquefaciens შტამი QST-713	სერენადე ასო	ბფ	12.2021
26	Bacillus thuriniensis var. kurstaki	ლეპიდინი	ბი	09.2023
	"	ლეპიდოციდი სკ-მ	"	03.2024
27	Bacillus thuriniensis var. thuriniensis	ბიტოქსიზაგილინი	ბი	03.2022
28	ბენალაქსილი მ+ფოლპეტი	ფანტიკი ფ	ფუნგ	11.2020
29	ბენთიავალიკარბ-იზოპროპილი+მანკოცები	ვალბონი	ფუნგ	12.2022
30	ბენტაზონი	პენტაგონი	ჰ	12.2020
	"	ბაზაგრანი	"	03.2020
	"	ეფდალ როქსანი	"	05.2020
	"	პარდუსი	"	02.2024
	"	რეინგრანი	"	09.2024
	"	ბენტაგონი	"	10.2024
31	ბიფენაზატი	აკრამაიტი	ია	09.2023
32	ბიფენტრინი	ტალსტარი	ი	09.2023
	"	ინსაკარი	"	12.2020

	„	ზონდერი	„	03.2022
	„	ჰაზლა	„	06.2022
	„	თეიქოფ	„	09.2022
	„	კურა-კურა	„	02.2023
	„	ბატალიონი	„	03. 2023
	„	ფენდი	„	03. 2023
	„	ცეზარი	„	09.2023
	„	გლადიუსი	„	04.2021
	„	ზაიტი	„	05.2022
33	ბიფენტრინი+ იმიდოკლოპრიდი	ანტიბრუშმი	ი	09.2022
34	Beauveria bassiana strain Bb-1	ნოსტალჯისტი BL	ბი	02.2022
35	Beauveria bassiana შტამი 71666,	ბიონსექტ 2	ბი	02.2021
36	Beauveria bassiana შტამი N - 024 (IMI 501797)	ბოვერ-ჯი	ბი	02.2024
37	ბოსკალიდი	კანტუსი	ფუნგ	02.2021
38	ბოსკალიდი+პირაკლოსტრობინი	სიგნუმი	ფუნგ	02.2021
		სექშონ	„	10.2021
		ბელისი	„	12.2024
39	ბრომოქსინილი ოქტანოატი	ბუქტრილი 327,5 ეკ	ჰ	11.2021
40	ბუპროფეზინი	აპლაუდი	ი	02.2021
41	Garlic extract მცენარის Allium sativum +Chilly Pepper extract + Cinnamon Extract მცენარის Cinnamomum zeylanicum	პროგრანიკ გამმა	ბი	08.2024
42	გლიფოსატი	ნოკდაუნი	ჰ	02. 2020
	„	ვალსაგლიფი	„	02. 2021
	“	გლიფოსანი	“	06.2023
	„	ფელიქსი	„	02.2023
	„	ზერო	„	04.2023
	„	კლინი იქსტრიმი	„	09.2023
43	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი	კლინი	ჰ	11. 2024
		გლიაცინტი	“	02.2024
		გლიფოგანი	ჰ, დეს	11.2024
		ტორნადო	ჰ	03.2023
		გლიფოვიტი	„	03.2023
		ეფდალ იზოფოსატი 480 წხ	„	03.2023
		სონრაუნდი 48 წხ	„	02.2023
		კლინ-აპი	„	12.2023
		სმერჩი	„	12.2019
		რუმბო	“	03.2020
		კლინერი	„	04.2023
		გეიზერი	„	06.2023
		კლიმი	„	03.2024
		დიქსი	„	03.2024
		კლიმი+	„	03.2024
		კლინერ ექსტრა	„	04.2024
		ბომბა	„	07.2024
		მერი	„	09.2024
		რედ ჰალკი	„	11.2024
		ბოქსიორი	„	10.2024
44	გლიფოსატი კალიუმის მარილი	ურაგან ფორტე	ჰ	08. 2024
	„	რაუნდაპ მაქსი	„	05.2023
45	გლიფოსატ ტრიმეზიუმის მარილი	შოკი	ჰ	01.2020
46	გოგირდი	თიოვიტ ჯეტი	იფ	08. 2024
	„	ჰოვერ სულფური	ფუნგ	02. 2020
	“	კუმულოს დფ	“	01.2023
	“	სულფოლაკი	“	01.2024
	“	სულფი	“	12.2019
	“	კოსავეტი	“	03.2020
	„	ეფდალ სულფური	„	06.2022

	„	ფანსულფური	„	04.2024
	„	რანსულფური	„	04.2023
	„	ჰელიოსფური	„	06.2023
	„	სულფური	„	10 .2023
	„	ინფერნო	„	12.2023
	„	ლაიფსული	„	12.2024
	„	მერთონი	იფ	12.2024
47	დელტამეტრინი	დეცისი პროფი	ი	12.2020
	“	დელტარინი	“	12.2023
	“	დელტა	“	02.2024
	„	დეცის ფლუქსი ეკ 025	„	12. 2021
	„	ჰექტამ დელტარინი 12,5 უმშ	„	02.2023
	„	ეფდალ დელმეტრინი	„	09.2023
		დეკაგარდი	„	09.2024
		დ66	„	02.2023
		ჯეტსისი	„	06.2023
		ცეზარი	„	08 .2023
		რიტმუსი	„	09.2023
		ბოლდისტ დე ლუქსი	„	10.2024
48	დიტიანონი	დელანი	ფუნგ	01.2023
	“	დიტიმეგა	“	09.2024
	„	ფოსილი	„	05.2022
	„	სპრინტერი	„	10.2024
	„	დანონი 70 წდგრ	„	12.2021
	„	სუპერ დიანონი	„	08.2022
	„	დელავიტი	„	12.2022
	„	ალიგატორი	„	12.2024
49	დიტიანონი+ პირაკლოსტრობინი	ტერსელი	ფუნგ	11.2023
50	დიტიანონი+ პირიმეთანილი	მალაქიტი	ფუნგ	12.2024
51	დიკამბა დმა	ვაგაბონდი	ჰ	09.2021
52	დიკამბა მჟავა	დიანატი	ჰ	11.2021
53	დიკამბა+ტოპრომაზონი	სტელარი	ჰ	02.2020
54	დიკამბა+ ნიკოსულფურონი+რიმსულფურონი	ჰექტორ მაქსი	ჰ	11.2021
55	დიკამბა+ტრიბენურონ-მეთილი	რიმაქსი დ	ჰ	10.2024
56	დიკვატი დიბრომიდი	რეგლონ -სუპერი	დეფ,ჰ	10.2020
	„	სკორპიონი	დეს	12.2020
57	დიმეტოატი	საფაგორი	ი	02. 2020
	„	დინგო	„	07. 2023
	“	პოლიგორი	“	12.2023
	„	დიმევიტი	„	09.2022
	„	ეფდალ კემიდონი	„	02. 2023
	„	ალპგორი	„	03.2023
	„	ფოს-ზი	„	11.2023
	„	დუმბლე	„	11.2020
		ბი-58 ტოპი		02.2023
58	დიმეტენამიდი-ჰ	ფრონტიერ ოპტიმა	ჰ	11.2024
59	დიმეტომორფი	დიმეკური 500 სკ	ფუნგ	03.2024
60	დიმეტომორფი+ამეტოკტრადინი	ორვეგო	ფუნგ	05.2022
61	დიმეტომორფი+ფოლპეტი	სფინქსი-ექსტრა	ფუნგ	05.2023
	“	დუეტ ფორტე	„	12.2021
	„	პროტონი	„	12.2022
62	დიმეტომორფი+დიტიანონი	აკრობატ ტოპი	ფუნგ	02.2021
63	დიმეტომორფი+სპილენძის ქლორჟანგი	ფაიტერ ბლუ	ფუნგ	03.2021
64	დინოტეფურანი	სტარკლი	ფუნგ	12. 2022
65	დიფენოკონაზოლი	სკორი	ფუნგ	08. 2024
	„	სკორპიონი	„	03. 2021
	„	ფუნქსი	“	09.2022
	“	სკაპი	“	11.2022
	„	აპლორი	„	04.2022
	„	რაიოკი	„	01.2023

	„	ევდალ დონაზოლი	„	02.2023
	„	სკორპი	„	07.2022
	„	სტორი	„	04.2020
	„	სკორტი	„	03.2022
	„	პრივატი	„	12.2023
	„	ჰელიოსი	„	03.2021
	„	ანტალია	„	11.2022
	„	გრაფიტონი	„	11.2024
66	დიფენოკონაზოლი+კრეზოქსიმ-მეთილი	სამშობი	ფუნგ	12.2021
67	დიფენოკონაზოლი+პიდიფლუმეტოფენი	მირავის დუო	ფუნგ	11.2024
68	დიფენოკონაზოლი+პროპიკონაზოლი	ტასპა	ფუნგ	08.2024
	„	ჰარბორი 300 ეკ	„	12.2021
	„	ბროდერი	„	04.2022
	„	ჯეკ-პოტი	„	09.2022
69	დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლი	დივიდენდი სტარი	ფთშ	10.2020
70	დიფენოკონაზოლი+ციფლუფენამიდი	დინალი	ფუნგ	11.2020
	„	ციდელ ტოპი	„	11.2020
71	დიფლუმენზურონი	ჰეროლდი	ი	01.2023
72	დიფლუმენზურონი+ალფაცპერმეტრინი	ალფამილინი	ი	12.2022
73	დოდინი	სილიტი	ფუნგ	10.2024
	„	სალიტი	„	03.2022
74	EZZ-3.8.11-ტეტრადეკატრიენ-1-ილ აცეტატ (95%)+EZ-3.8-ტეტრადეკადიენილ აცეტატ (5%)	ტუტაზსი	ფერ	12.2024
75	EZZ-3.8.11-ტეტრადეკატრიენ-1-ილ აცეტატ +EZ-3.8-ტეტრადეკადიენ-1-ილ აცეტატ , 0,071%	ფეროდისი	ფერ	11.2021
76	(E, E)- 8,10-დოდეკადიენ-1-ოლი + 1-დოდეკანოლი +1-ტეტრადეკანოლი)	შინ-ეტსუ მდ სტტ , დისპენსერი	ფერ	11.2022
77	(E, Z)- 7,9-დოდეკადიენ-1-ილ აცეტატი	შინ-ეტსუ მდ ლტტ , დისპენსერი	„	11.2022
78	1-მეთილციკლოპროპენი	ეიბიჯი სან	ზრ	06.2024
79	ემამექტინ ბენზოატი	პროკლეიმი	ზი	10.2020
	„	ჰიპნოზი	„	02.2024
	„	ბესტგოლი	„	06.2021
	“	ბეკჩი	„	01.2024
	“	სპოდჰელი	„	04.2024
	“	ევდალ ემაბენ 5	„	04.2024
	“	კლიპ	“	05.2024
	“	პორსელენი	„	12.2024
	„	ბრენდონი	„	12.2024
80	ესფენვალერატი	სუმი ალფა	ი	12.2023
81	ეტოფუმეზატი+ფენმედიფამი+დესმედიფამი	ბეტანალ ექსპერტი	ჰ	12.2022
82	ვალეფენალატი + მანკოცები	ვალის-მ	ფუნგ	02.2024
83	ვალეფენალატი + ფოლპეტი	ვალეფ-ფ	ფუნგ	02.2024
84	ზეტაციპერმეტრინი	ფიური	ი	06.2023
85	თიაკლოპრიდი	კალიფსო	ი	12.2024
	“	ულტრატოქსი	“	01.2020
	„	როკიფსო	„	06.2022
86	თიაკლოპრიდი +დელტამეტრინი	პროტეუსი	ი	12.2024
87	თიამეტოქსამი	აქტარა	ი	10.2020
	„	მედალი	„	01.2020
	“	რენოვა 25 წდგრ	„	02.2022
	„	მისტი	„	05.2022
88	თიამეტოქსამი+ლამბდაციპლოტრინი	მედალ გოლდი	ი	03.2023
	„	ეფორია	„	05.2024
89	თიამეტოქსამი+დიფენოკონაზოლი+ფლუდიოქსანილი	სელესტ ტოპი	ითშ, ფთშ	10.2020
90	თიოფანატ-მეთილი	კვარტეტი	ფუნგ	11.2021
	“	ზახისნიკი	„	12.2021
91	თიოფანატ-მეთილი+ეპოქსიკონაზოლი	რექს დუო	ფუნგ	11.2021
92	თირამი	თირამ გრანულო	ფუნგ	07.2023

93	თუთიის ფოსფიდი	თუთიის ფოსფიდი	რ	12. 2020
	“	სუპერ ცინკი	“	08.2020
	”	რატიციდი	”	06.2022
	”	დეტია მაუს გიფტკორნერი	”	07.2023
94	იზოპიროზამი+დიფენოკონაზოლი	ემზრელია	ფუნგ	08.2024
95	იმაზამოქსი	პულსარი	ჰ	02.2021
	”	ბეითორი	“	02.2021
	”	პულსარ პლიუსი	”	11.2021
96	იმიბენკონაზოლი	მენეჯი	ფუნგ	03.2021
97	იმიდაკლოპრიდი	ნუპრიდი	ითშ	12. 2024
	”	კონფიდორ მაქსი	ი	12. 2020
	”	სულთანი	”	01. 2020
	“	იმიდორი მაქსი	“	01.2020
	“	კონფიდორი	”	12.2021
	”	იმიდაგოლდი	”	10.2020
	”	სიდოპრიდი	ითშ	12.2020
	”	რეზიუმე	”	03. 2023
	“	ეფდალ იმიდრიდი 70 წდფთშ	”	10.2022
	”	ნუპრიდი 200	ი	03.2021
	”	გაუზო სდკ 600	ითშ	03.2022
	”	იმიდორ დ	ი	08.2022
	”	კონფიდრიდი	”	05.2022
	”	ჰირო	”	05.2022
98	იმიდაკლოპრიდი+ლამბდაციპალოტრინი	პერფექტო 175 სკ	ი	12.2022
		ანტიკოლორადი	”	09.2022
99	იმიდაკლოპრიდი+მინერალური ზეთი	ეფდორ ოილი	ი	02.2023
100	იმიდაკლოპრიდი + პენციკურონი	პრესტიჟი	ითშ, ფთშ	12. 2024
	“	პრემიუმი	”	02. 2021
101	ინდაზიფლამი	ბეკანო 500 სკ	ჰ	12.2023
102	ინდოქსაკარბი	აგანტი	ი	12. 2019
	”	კაიზერი	”	11.2022
	”	ტეზკარპი 150	”	06.2022
	”	აგაკანტი	”	06. 2023
	”	ტუნზი	”	05.2024
103	ინდოქსაკარბი +ემამექტინ ბენზოატი	ორიონი	”	12.2024
104	იპროვალიკარბი+პროპინები	მელოდი დუო	ფუნგ	12.2023
105	იპროდიონი	როვრალი აკვაფლო	ფუნგ	05.2020
	”	კარნავალი	”	06.2022
106	იპსდიენოლი+2-მეთილ-3-ბუტენ-2-ოლ	იპსოვიტი	ფერ	10.2021
107	იპსენოლი+2-მეთილ-3-ბუტენ-2-ოლ	სექსოვიტი	ფერ	10 .2021
108	კაპტანი	მერპანი	ფუნგ	11.2024
	”	ონდარი	”	10.2022
	”	ეფდალ კაპტანიმი	”	12.2021
	”	მასს კაპტანი	”	12.2022
	”	სიმკაპტანი	”	04.2020
	”	ინტერკაპტანი	”	11.2022
	”	ტანკაპ ექსტრა	”	04.2021
	”	კაპტანლი	”	11.2022
109	კაპტანი + კალიუმის ფოსფიტი (ფოსფოროვანი მჟავა)	კარნეოლი	ფუნგ	08 .2023
110	კარბენდაზიმი	ინდაზოლი	ფუნგ, ფთშ	12. 2020
	“	ფინალი	“	01.2020
111	კარფენტრაზონ-ეთილი	რივეტი	ჰ, დეს	12.2023
112	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი	ფორმულა სუპერი	ჰ	09.2021
	”	კვინ სტარ მაქსი	”	09. 2022
	”	ჰელგა სუპერი	”	02.2023
	”	ეფდალ ზალოსუპერი	”	04.2023
	”	ბაკკარდი	”	10.2024
	”	სორტი სუპერი	”	12.2020
	”	იაგუარი	”	02.2024
113	კვიზალოფოპ-პ-ტეფურილი	პანტერა	ჰ	03.2022

114	კლეტოდები	კვიკსტები	ჰ	12.2023
115	კლოდინაფოპ პროპარგილი + კლოკვინტოსეტ-მექსილი	კონკერი	ჰ	01. 2020
	”	ციტიმენ	”	06. 2022
	”	კოვზოი	”	12.2023
	”	ტერდოვი	”	02.2023
	”	ტოპკაპი	”	02.2024
	”	ეფდალ კლოპარი	”	12.2023
	”	აგატი	”	12.2024
	”	კონკერ ექსტრა	”	09. 2023
116	კლოთიანიდინი+პენფლუფენი	ემესტო კვანტუმი	ითმ+ფთმ	12.2022
117	კლოთიანიდინი+იმიდაკლოპრიდი	გაუჩო პლიუსი	ითმ	12.2022
118	კლოფენტიზინი	აპოლო	ი	12.2022
119	კოლოიდური ვერცხლი+პოლი ჰექსამეთილენ ბიგუანიდ ჰიდროქლორიდი	ზერებრა აგრო	ზრ	12.2020
120	კრეზოქსიმ-მეთილი	სტრობი	ფუნგ	02. 2020
	”	პროგრესი	”	12. 2020
	“	სტრობსტარი	“	01.2020
	”	დრენჩი	”	05.2022
	”	ეფდალ კრესდიტი 50 წდგრ	”	12.2023
	”	ჯაკო	”	03. 2020
	”	კაზმიტი	”	02.2021
121	კრეზოქსიმ-მეთილი+ბოსკალიდი	კოლისი	ფუნგ	11.2021
122	კრეზოქსიმ-მეთილი+დიფენოკონაზოლი	სამშიტი	ფუნგ	12.2021
123	Creosote Bush Extract ბუჩკის Larrea tridentata ექსტრაქტი	პროგრანიკ მეგა	ფუნგ/ბაქტ	08.2024
124	ლამბდა-ციპლოტორინი	კარატე	ი	08. 2024
	”	კარატე ზეონი	”	08. 2022
	”	ვალსამზა	”	02. 2021
	“	კაიზო	“	12.2023
	“	გრანდი 5	“	09.2024
	“	კუნგ ფუ	“	11.2024
	”	ეფდალ ლამტორინი	”	02.2023
	“	ლამბდა-CY	”	02..2022
	”	პეტრა	”	02.2022
	”	ლამდექსი	”	08.2023
	”	ლოკ-5	”	05.2024
	”	ინტეგრალი	”	07.2024
125	ლუფენურონი+ფენოქსიკარბი	ლუფოქსი	ი	11.2020
126	მაგნიუმის ფოსფიდი	დეგემ მაგტოქსინი ტბ	ფუმ	07.2023
	”	დეგემ პლაიტ ფირ	”	07.2023
127	მალათიონი	მალაფოსი	ი	12. 2020
	”	ნივათიონი	”	07. 2022
	”	მალათიონი	”	10.2022
128	მანდიპროპამიდი+სპილენძის ქლორჟანგი	პერგადო C	ფუნგ	08.2022
129	მანდიპროპამიდი+დიფენოკონაზოლი	რეესუს ტოპი	ფუნგ	12.2023
130	მანკოცები	ვალსაზები	ფუნგ	07. 2023
	“	დითანი მ-45	ფუნგ	02.2023
	“	საკოზები	“	11.2023
	“	მანკოზი	“	02.2024
	“	მანკოსილი	“	09.2023
	”	მანგრიფი 75 წდგრ	”	09.2021
	”	დრაკო ბლუ	”	10.2022
	”	ეფდალ მაკო მ-45	”	02.2023
	”	ლანგრიფი	”	11.2022
	”	ინდოფილ 72 სფ ბლუ	”	03. 2023
	”	რეინკოზებ ექსტრა	”	04. 2024
	”	სტაგერი	”	06.2022
131	მანკოცები+დიმეთომორფი	ავანგარდი	ფუნგ	01. 2020
	”	აკრობატი მც გრ	“	02. 2023
	“	დიმანკო	“	03.2021

	“	ლიდერი	“	01.2020
	”	ეფდალ აკრობოტ მც	”	05.2022
	”	მაქსიმუმი	”	04.2023
	”	კარმენი	”	03.2020
	”	აქტორმენი	”	01.2021
	”	არივა გოლდი	”	06. 2023
	”	აკრომენი	”	12.2023
132	მანკოცები+მეტალაქსილი	ცელიტელი	ფუნგ	12.2021
	”	რიდონეტი მც	”	02. 2020
	”	ვალსალაქსილი	”	07. 2023
	“	მეტალაქსანი	“	10.2022
	”	ვიქტორი	”	12. 2020
	“	ტროპერი	“	12.2023
	”	მანკოლაქსილი	”	03.2022
	”	არმეთილი მ	”	10.2022
	”	პატამილი	”	04.2023
	”	მალზები	”	05.2023
	”	ეფდალ მანტალაქსი	”	12.2023
	”	ვიოლეტი	”	11.2020
	”	რიდონილი	”	12.2023
	”	რელაქსი	”	01.2024
	”	პლანეტა	”	12.2023
133	მანკოცები+მეტალაქსილი მ	მანკომ დოო	ფუნგ	02.2024
	“	უნივერსალი	“	01.2020
	”	ლირა	”	02.2024
134	მანკოცები + მეფენოქსამი	რიდომილ გოლდი მც წდგრ	ფუნგ	08. 2022
135	მანკოცები + ციმოქსანილი	კურზები	ფუნგ	12. 2023
	“	კორზ სუპერი	“	09.2023
	“	ვალსალაქსილ C პლიუსი	“	07.2023
	“	სპრინტი	“	12.2019
	”	ეფდალ ციმოქსაზები	”	02.2023
	”	კარზეპი	”	03.2023
	”	სუპერსტარი	”	02.2024
	”	კორზები	”	11.2022
	”	რამბლერი	”	03.2020
	”	ციმო სუპერი	”	12.2020
	”	მოქსიმატო	”	04.2023
	”	ციმაქსი	”	01.2024
136	მეტილ (E, E, Z)-2,4,6 დეკატრიენოატი + მურგანთიოლი)	ჰერკონი	ფერ	02.2022
	”	ფეროკონი	”	02.2023
	”	ჰალხალი	”	12.2022
	”	ჰალხალი	”	01.2024
	”	P588-კომბო	”	11 2024
137	მეტირამი	პოლირამი დფ	ფუნგ	02.2023
	”	სოლორამი	”	12.2021
138	მეტირამი +პირაკლოსტრობინი	კაბრიო ტოპი	ფუნგ	02. 2021
139	მეტირამი+ციმოქსანილი	ალექტო	ფუნგ	12.2021
140	მეზოტრიონი	ლექტორი	ჰ	09.2024
141	მეზოტრიონი+ ნიკოსულფურონი	ელუმისი	ჰ	08.2022
142	Melaleuca Alternifolia, Etheric Oil	ტიმორექს გოლდი	ზფ	12.2024
143	მეტალდეპიდი	ეფდალ კიმტოქსი	მოლ	05. 2020
	”	ტალდექს ექსტრა	”	06.2022
	”	სნეილ გრანულს	”	09.2022
	”	ლოკოციდი	”	05.2023
	”	ფიბულა	”	10.2024
144	მეტამ-სოდიუმი	ნემასოლი	ფუნგ, ი, ნ	12. 2024
145	მეტომილი	ლანატი	ი	02.2021
146	მეტრაფენონი	ვივანდო	ფუნგ	02.2021

147	მეტრიბუზინი	ზენკორი ლიკვიდი 600	ჰ	08.2024
	„	მაჯესტიკი	„	01. 2020
	“	ზარნელაცელი	“	09.2024
	„	სენკრონი	“	11.2024
	“	მისტრალი	“	11.2024
	“	ეფდალ მეზუზინი	„	04.2023
	“	უნიმარკი	„	10.2023
	„	ანტისაპა	„	12.2021
	„	ლაგუნი	„	08.2020
	„	სუპერ სენქორი	„	02.2021
	„	ზანდერილა 70 სფ	„	11.2021
	„	მეტრაბუზ დ	„	08.2022
		მუზა		12.2024
148	მეტრიბუზინი+კლომაზონი	მეტრიკი	ჰ	01.2020
149	მეტსულფურონ-მეთილი	მეტსი	ჰ	12. 2020
	“	როტტერი	“	10.2022
	„	პატრული	„	02.2023
	„	იმპერატორი	„	10.2022
	„	ეფდალ მეტეორი	„	12.2023
	„	მეტსილი	“	11. 2024
150	მეფენოქსამი	აპრონ იქს ელი 350	ფუნგ, ფთშ	10.2020
151	მეფენოქსამი+სპილენძის ოქსიქლორიდი	რიდომილ გოლდ პლიუსი	ფუნგ	10..2020
152	მეფენოქსამი+ტებუკონაზოლი	სერტიკორი	ფთშ	11.2024
153	მიკლოზუტანილი	ნიმბუსი 24 ეკ	ფუნგ	08.2022
	„	მიკლოფილი	„	11.2022
	„	განზო	„	07.2024
154	ნატრიუმის პარა-ნიტროფენოლატი +ნატრიუმის ორტოფენოლატი +ნატრიუმის 5-ნიტროგუაიაკოლატი	ატონიკი	ზრ	07.2023
155	ნატრიუმის ფოსფიტი + ციაზოფამიდი	მილდიკატი	ფუნგ	03.2024
156	ნიკოსულფურონი	ელიმინატორი	ჰ	06.2023
	“	ნიკოფურონი	“	01.2020
	“	ნიკოგანი	“	12.2020
	“	სულფონი	„	09.2021
	„	იკანოსი 40 ზდ	„	12.2021
	„	მილადარი	„	09.2022
	„	ეფდალ ალსონი	„	04.2023
	„	კალსონი	„	03.2023
	„	ნიფურონი	„	12.2019
	„	ვეინი	„	03.2020
	„	ნიკონი	„	02.2022
	„	მენსურონი	„	10.2022
	„	გაფან ესტრა	“	04.2021
	„	მაჩეტე	“	09.2022
157	ნიკოსულფურონი+ტიფენსულფურონ-მეთილი	დუბლონი გოლდი	ჰ	01.2023
158	Neem მცენარის ცხიმოვანი მჟავების კალიუმის მარილები	პროვეტ ოვი-დიე	ბი	08.2024
159	Neem Extract მცენარის Azadirachta indica +Cinnamon Extract მცენარის Cinnamomum zeylanicum	პროგრანიკ ნიიმაკარ	ბია	08.2024
160	2.4 დ (ამინის მარილები)	დიამინი	ჰ	02. 2020
	„	ბესტ ამინი 500	„	02.2023
	„	დეამინი	„	10.2020
161	2.4 დ (დიმეთილამინის მარილი)	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი	ჰ	11. 2024
	“	ჰექტაფერმინი	“	12.2023
	„	ფენიქს გოლდი 720	„	10.2022
	„	პრიმო	„	02.2023
162	2.4დ (2 ეთილჰექსილეთერი)	ესტერონი 600 ეკ	ჰ	08.2021
	“	ამილინი	“	12.2019
	„	ესთეტი	„	03.2022
163	2,4-დ-2-ეთილჰექსილის ეთერი +ფლორამსულამი	ბალერინა	ჰ	01. 2023

	„	ეფდალ ულტრამიქსი	„	03..2024
	“	აგენტი	„	12.2021
	“	კორვეტი	„	09..2022
	“	ქათენგი	„	01.2024
164	2.4დ (მჟავა)	ეფდალ დიმეტრინი	ჰ	04.2023
	“	დუამინი	“	11.2024
165	2.4დ (მჟავა)+ გლიფოსატი (მჟავა)	კაილეო	ჰ	03.2021
166	2.4დ (მჟავა)+ დიკამბა	გოლიაფი	ჰ	09.2022
167	2.4 დ (დიმეთილამინის მარილი) + დიკამბა (დიმეთილამინის მარილი)	ამინოპელიკ სუპერი	ჰ	12.2020
168	2,4 დ+მცპა	ჰორმა	ჰ	03.2022
	“	დისერბონ კნ	„	07.2024
169	ოქსამილი	ვიდატი 10 ლ	ნ	11.2022
170	ოქსათიაპიპროლინი + ზოქსამიდი	ზორვეკ ვინაბელი	ფუნგ	06.2024
171	ოქსიფლუორფენი	გალაქსი	ჰ	10.2024
	“	გალიგანი	“	12. 2024
	„	პაროქსიფენი	„	12.2021
	„	გოალი 2 ე	„	08.2021
	„	პექსი	„	09.2021
	„	ეფდალ ოქმოსტი	„	12.2023
	„	გონდოლიერი	„	12.2022
	“	მორბიდოლი	„	12.2023
	“	ექსტრა	„	10.2024
	„	პაროქსი	„	11. 2024
172	პაკლოზუტრაზოლი	ბონზი 004 სკ	ზრ	05.2024
173	პარაფინის ზეთი	სიპკამოლი ე	ი	05.2021
	„	ეკო ოილ სპრეი	„	03.2024
	„	სპრეი ოილი 11E	„	06.2022
	„	ოვიპრონი 2000	„	08.2023
	“	ინსექტოილი	“	12.2023
	“	კუპონი 800	“	06.2024
	“	ოლეოლუქსი	“	07.2024
174	პარაფინის მინერალური ზეთი	ტრინოლი-2	ი	11. 2023
	„	ჰექტოლინეუმი	“	12.2023
	“	აგრომინერალ ოილი	“	08.2020
	“	ეფდალ სუნოლი	„	02.2023
175	პენდიმეტალინი	სტომპი	ჰ	02. 2020
	„	ვალსატოპი	„	02. 2021
	“	სტოპი	“	12.2019
	“	პანდორა	“	11.2024
	“	პენდიგანი	“	11.2024
	„	სპონსორი 330 ე	„	03. 2020
	„	ჰერბიმატი	„	08. 2022
	„	პანდა	„	09.2022
	„	ეფდალ პენალინი	„	12.2023
	„	რესორტი 33 ეკ	„	11. 2021
	„	დრაგო	“	10. 2022
176	პენთიოპირადი	აფეთი	ფუნგ	02.2021
177	პენკონაზოლი	ტოპაზი	ფუნგ	08. 2024
	„	პრეფექტო	„	07. 2023
	„	პინნაკლი	„	01. 2020
	“	პენ-ფორსი	“	09.2023
	“	კობუზი	“	11. 2024
	“	ტოპკონაზოლი	“	01.2020
	„	ეფდალ პეკოზოლი	„	06.2022
	„	პენკილერი	„	03.2023
	„	ფულპასი	„	04.2023
	„	მენტა ინოქსი	„	01.2021
	„	ფობოსი	„	12.2020
	“	პესოსი	„	07.2022

	“	პენტოსი	“	02. 2024
	“	პერმიტი	“	11.2024
178	Pepino mosaic virus, შტამი CH ₂ , იზოლატი 1906	PMV-01	ბფ	01. 2024
179	პიმეტროზინი	პლენუმი	ი	02.2022
180	პინოქსაიდენი	აქსიალი	ჰ	08. 2024
	“	აქსიალი 50 ეკ	”	09.2024
181	პირაკლოსტრობინი	რეტენგო	ფუნგ.	03.2022
182	პირაკლოსტრობინი+ტრიტიკონაზოლი	ინშურ პერფორმი	ფთშ	02. 2021
183	პირაფლუფენ-ეთილი	კაბუკი	ჰ, დეს	02. 2022
184	პირიდაზენი	სამმატი	ი	07.2023
	”	ეფდალ პირდენი	ი	09.2023
	“	მაიტ კილერი	“	11.2024
	”	ლავანტე 20 სვ	”	04.2020
	“	ენიგმა	“	10.2024
185	პირიმეთანილი	სკალა	ფუნგ	03.2023
	”	რითმი	”	12.2023
	”	პირუსი	”	10.2024
	”	მენტა პრელუდ	”	05.2024
186	პირიმიფოსმეთილი	აქტელიკი	ი	08. 2024
187	პირიმიფოსმეთილი+პირიდაზენი+აცეტამიპრიდი	ანტიკლემზ მაქსი	ი	12.2021
188	პიროპროქსიფენი	ვენტო	ი	11.2022
189	პროკუინაზიდი	ტალენდო	ი	08.2023
190	პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი	ბოტრინი	ფუნგ	01.2020
	“	პროპაკურ ნ	”	05.2020
	“	ეფდალ პროკარი	”	12.2021
	”	ევაკური	”	02.2021
	“	პრევენტი	”	11.2021
191	პროპაზიზაფოპი	აგილი	ჰ	12.2020
192	პროპიზამიდი	ეფდალ პროკერბი	ჰ	03.2021
193	პროპიკონაზოლი	ბამპერი	”	02.2020
	“	პროპკონაზოლი	”	02.2023
	“	ტოპკაზოლი	”	12.2021
194	პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლი	ალტო სუპერი	ფუნგ	08.2022
195	პროპინები	ანტრაკოლი	ფუნგ	08. 2022
	“	საფაკოლი	”	03.2021
	”	პლაკოლი	”	05.2022
	”	ფავორიტი	”	12.2022
	”	ალგაკოლი	”	09.2023
	”	ეფდალ პრონები	”	02.2023
	”	ჰოსტრაკოლი	”	03.2023
	”	მენტაკოლი	”	01.2021
196	პროპინები+ციმოქსანილი	საფაკოლი კომბი	ფუნგ	03.2021
	”	მენტაკოლ კომბი	”	01.2021
	”	ჰოსტრაკოლ კომბი	”	02.2021
197	პროპინები+ფლუოპიკოლიდი	პასადოზლი	ფუნგ	08.2022
198	პროსულფოკარბი-მეტრიბუზინი	არკადე	ჰ	09.2021
199	პროქლორაზი	ემსონი	ფუნგ	08.2023
	“	ეფდალ ექსუმი	”	07.2024
200	პროპექსადიონ-კალციუმი	რეგალისი	ზრ	05.2022
	“	რეგალისი +	”	06.2024
201	Pseudomonas fluorescens strain pf 1	ცედრიქსი	ბფ	06.2023
202	რიმსულფურონი	ტიტუსი	ჰ	02. 2021
	“	მაისი	”	12. 2020
	“	პილოტი	”	01.2020
	”	ესკუდო	”	01.2023
	”	ვიდაგერი	”	04.2023
	”	არპადი	”	01. 2022
	”	ტიტანი	”	03.2023
203	(3-(პოლიოქსიეთილენ) პროპილჰეფტა მეთილ-ტრისილოქსანი)	სილკატი	ი	10.2024

204	S-მეთილის აციბენზოლარი	ბიონი	ფუნგ	05.2024
205	S-მეტოლქლორი +ტერბუტილაზინი	სამზა 500 სკ	ჰ	06.2021
206	სპილენძის (1) ოქსიდი	ნორდოქსი	ფუნგ	06.2024
207	სპილენძის სულფატი	სპილენძის შაბიამანი, ხფ 980 თქ	ფუნგ	04.2020
	“	კუპროქსატი	”	12. 2024
	”	კუპერ სულფატ პენტაჰიდრატი	”	06.2022
	”	სპილენძის შაბიამანი, ფ 980	”	06.2022
	”	სპილენძის შაბიამანი ხფ 980	”	04.2024
	”	სპილენძის შაბიამანი ფ 980-990	”	04.2020
	”	ეფდალ გოზტაში	”	03.2024
208	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი	ბორდო კაფარო ბლუ	ფუნგ	11. 2020
	“	კუპერვალი	”	12.2023
	“	კუპერვალ ბლუ	”	11.2024
	“	ჰექტაშ ბორდო	”	12.2023
	“	პოლტიგლია 20სფ	”	09.2020
	“	ბორდოფლო ნიუ	”	03.2021
	”	ბორდოს ნარევი 20%	”	11.2022
	”	ბორდოს ნარევი მაქსი	”	04.2020
	”	ბლუ ბორდო დისპერს	”	10.2023
	”	ბორდო სალდეგო 20 სფ	”	12.2023
	”	ბორეკაფი	”	05.2021
	”	სულკალ 648,4	”	11.2022
	”	პოლიმეტ ბორდო	”	03.2023
	”	ეფდალ ბაკსული	”	02.2024
	”	ბორდოს ნარევი 15% სფ	”	05.2024
	”	ბორდოტან 20 სფ	”	04.2024
209	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი+მანკოცები	კუპროფიქს 30 დისპერს	ფუნგ	03.2022
210	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი+ციმოქსანილი	კუპერტინ სუპერი	ფუნგ	11.2024
211	სპილენძის ქლორფანგი	კუპროფლო	ფუნგ	04.2023
	“	სუპერკოპერი	”	07. 2023
	“	ნეორამი	”	10. 2020
	“	აბიგა პიკი	”	03.2020
	“	ოსსიქლორი	”	03.2021
	”	ბესტ ბაკირი 50	”	05.2021
	”	ეფდალ ბაკიროქსი 50 სფ	”	03.2024
	”	ZZკუპროტანი	”	09.2024
	”	რამინ 30	”	11. 2024
	”	კუპერ 88	”	05.2024
	”	კუპრბლუ	”	05.2024
	”	დრიბლინგი	”	12.2024
212	სპილენძის ქლორფანგი+იპროვალიკარბი	მელოდი კომპაქტი	ფუნგ	11.2021
213	სპილენძის ქლორფანგი + ციმოქსანილი	კურზატი რ	ფუნგ	11 .2024
	“	ექსპერტ ტიმი	”	12.2023
	”	ორდანი	”	12.2022
	”	ეფდალ მოკანი	”	12.2023
214	სპილენძის ქლორფანგი+მეტალაქსილი	მეტკუპერი	ფუნგ	02.2023
		კუპრექსი	”	07.2024
215	სპილენძის ჰიდროქსიდი	კოსაიდი 2000	ფუნგ	10. 2024
	“	ჩემპიონი	”	12. 2024
	“	იროკო	”	12.2023
	”	პროტექტი	”	12.2021
	”	გარტი	”	09.2022
	”	ჰიდრომიკრონი	”	12.2023
	”	ფუნგურანი	”	08.2024
	”	ჰელიოკუივრი	”	06.2023
	”	კუპერ ჩემპიონი	”	07.2023

	„	ევდალ ბაროქსი	„	03.2024
	„	ბარონი	„	12.2024
216	სპილენძის ჰიდროქსიდი+მეტალაქსილი	ბლუფოქსი	„	12.2024
217	სპილენძის ჰიდროქსიდი+სპილენძის ქლორჟანგი	აირონი	ფუნგ	05.2024
218	სპინოსადი A+D სპინოზადი D	სპინტორი	ბი	11.2022
219	სპიროდიკლოფენი	ენვიდორი	ია	12. 2020
	„	კონტიერი	„	02. 2022
	„	სნაიპერი	„	12.2024
220	სპირომესიფენი	ობერონი	ია	12.2023
221	სპირომესიფენი+აზამექტინი	ობერონ რაპიდი	ია	12.2021
222	სპიროტეტრამატი	მოვენტო	ი	10.2021
223	სპიროქსამინი	პროსპერი	ფუნგ	12.2021
224	სპიროქსამინი+ ტებუკონაზოლი+ტრიადიმენოლი	ფალკონი	ფუნგ	12. 2024
225	Steinernema feltiae	ჯეო-ნემა	ბი	12.2020
	„	ნემიცელი	„	10.2021
226	ტაუ-ფლუვალინატი	მავრიკი 240	ი	12. 2020
227	ტებუკონაზოლი	მისტიკი	ფუნგ	12.2023
	“	როდოლიტ სუპერი	„	02.2024
	“	როდოლიტ ექსტრა	„	12.2019
	“	არბალეტი	„	12.2022
	„	როდოლიტი	ფთშ	02.2024
	“	გიზმო	„	06.2020
	„	რაქსილი ულტრა	„	07.2021
	„	ჯენსილი	„	01.2024
	„	ჰექსილი	„	08.2020
	„	ევდალ ტებუქსილი	„	09.2021
	„	ევდალ ტებუზოლი	„	10.2021
	„	რუბინი	ფთშ	09.2022
	„	ტებუჯი	„	10.2022
	„	მუსტანგი	ფუნგ	02.2023
	„	კონილი 2ფთშ	ფთშ	03.2023
	„	ბეტკური	ფუნგ	06.2023
	„	კონილი 2 ფთშ	ფთშ	03.2023
	„	ავალონი	ფუნგ	07.2024
228	ტებუკონაზოლი+აზოქსისტრობინი	კუსტოდია	ფუნგ	08.2023
229	ტებუკონაზოლი+გოგირდი	უნკორნი	ფუნგ	04.2020
230	ტებუკონაზოლი+ფლუტრიაფოლი	აქსიომა	ფუნგ	02.2024
231	ტებუკონაზოლი +ციპროდინილი	ბენელუსი	ფუნგ	08.2023
232	ტებუფენპირადი	მასაი	ია	12.2023
	„	ტალავი 20 სფ	„	09.2021
	„	ევდალ ტებუსაი	„	12.2023
	„	სელდონი	„	12.2022
	„	პირატი	„	12.2024
233	ტეტრაკონაზოლი	დომარკი	ფუნგ	06.2020
234	ტეფლუტრინი	ფორსი 1,5გრ	ი	09.2021
235	ტეფლუბენზურონი	ნომოლტი	ი	05.2022
236	ტიფენსულფურონ-მეთილი	ფორმულა	ჰ	09.2022
237	ტრიადიმენოლი	ტრიმაქსი	ფუნგ	02.2023
	„	ბაიომკა	„	05.2021
238	ტრიასულფურონი	ლოგრანი	ჰ	10.2020
	ტრიბენურონ-მეთილი	გრანსტარი	ჰ	02. 2020
	“	ტრუი	„	02.2024
	“	ექსპრესი	„	02.2020
	„	ნერო	„	01.2023
239	ტრიტერპენ მჟავები	ნოვოსილი	ზრ	12.2024
240	ტრიტოსულფურონი+დიკამბა	სერტო პლიუსი	ჰ	11.2021
241	ტრიფლოქსისტრობინი	ზატო	ფუნგ	12. 2024
	“	ტრიდე	„	12.2019
	„	ევდალ ლოქსბინი	„	12.2023
	„	გურადორი	„	02 2022

242	ტრიფლოქსისტრობინი+პირიმეტანილი	ზატო სტარი	ფუნგ	12.2022
243	ტრიფლოქსისტრობინი + ტებუკონაზოლი	ნატივო წგრ 75	ფუნგ	12. 2022
244	ტრიფლუმურონი	ალსისტინი 480 სკ	ი	12.2020
245	Trihoderma harzianum შტამი T-22	ტრიანუმ G.გრ	ბფ	09.2021
246	Trichoderma Koningii შტამი B-7 MDI	ბიოკატენა	ბფ	07.2024
247	ფამოქსადონი+ციმოქსანილი	ტანოსი	ფუნგ	12.2022
	”	ბურჟუა	”	04.2020
	”	პითიო პრო	ფუნგ	02.2024
248	ფენამიდონი+პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი	კონსენტო	ფუნგ	12.2021
249	ფენამიფოსი	ეფდალ ფენოსი	ნ	12.2021
250	ფენმედიფამი+დესმედიფამი	ბელვედერი	ჰ	12.2020
251	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილ+ ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ-მექსილი	პუმა სუპერ 7.5	ჰ	12. 2020
	”	ლასტიკ ექსტრა	”	01.2023
252	ფენპროქსიმატი	ორდუსი	ია	08.2024
	”	ორტუსი	”	02.2021
253	ფენჰექსამიდი	ტელდორი	ფუნგ	12.2022
	”	ეფდალ ფენდორი	“	04.2024
254	ფიპრონილი	რეგენტი 20	ი	02. 2021
255	ფლუაზინამი	ნანდო	ფ	10.2022
	”	ბანჯო	ფუნგ	12.2021
256	ფლუაზინამი+დიმეტომორფი	ბანჯო ფორტე	ფუნგ	12.2021
257	ფლუაზიფოპ-პ-ბუთილი	ფუზილადი ფორტე	ჰ	08.2022
	“	ფლუენტი	”	02.2024
	“	ფლუზიტოპი	”	01.2020
	”	ფოლზილე	”	02.2023
258	ფლუბენდიამიდი	ბელტი	ი	01. 2023
259	ფლუბენდიამიდი+თიაკლოპრიდი	ბელტ ექსპერტი	ი	12.2022
260	ფლუდიოქსონილი	გეოქსი	ფუნგ	01.2024
261	ფლუდიოქსანილი +პიდიფლუმეტოფენი	მირავის პრაიმ	ფუნგ	11.2024
262	ფლუოპიკოლიდი+პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი	ინფინიტო	ფუნგ	12.2023
263	ფლუოპიკოლიდი+ალუმინის ფოსფატი	პროფალიერი	ფუნგ	12.2023
264	ფლუოპირამი+ტრიფლოქსისტრობინი	ლუნა სენსიტივ 500	ფუნგ	12, 2021
265	ფლუპირადიფურონი	სივანტო პრაიმი	ი	12.2021
266	ფლუტრიაფოლი	ფორისი	ფუნგ	01.2022
267	ფლუტრიაფოლი+თიაზენდაზოლი	სუპერვინი	ფთშ	09.2022
268	ფლუქსაპროქსადი	სერკადისი	ჰ	02.2022
269	ფლუქსაპროქსადი+დიფენოკონაზოლი	სერკადის პლიუსი	ჰ	01.2024
270	ფლოკუმაფენი	შტორმი	რ	02. 2020
271	ფოლპეტი	ფოლპანი	ფუნგ	08.2023
272	ფოლპეტი+ ტრიადიმენოლი	შავიტი ფ	ფუნგ	02.2020
	”	შავიტი ფ წზგრ	ფუნგ	08.2023
273	ფორამსულფურონი+იოდოსულფურონ-მეთილ-ნატრიუმი+ანტიდოტი	მაისტერი	ჰ	12.2022
274	ფორამსულფურონი+ იოდოსულფურონ-მეთილ ნატრიუმი+ თიენკარბაზონ-მეთილი +ციპროსულფამიდი	მაისტერ პაუერი	ჰ	02.2021
275	ფოსფოროვანი მჟავას მონო +ფოსფოროვანი მჟავას დიკალიუმის მარილები	გეოფიტი	ფუნგ	08.2024
276	ქლორანტრანილიპროლი	კორაგენი	ფუნგ	12.2023
277	ქლორანტრანილიპროლი+ლამბდაციპალოტრინი	ამპლიგო	ი	12.2023
278	ქლოროტალონილი	ბრავო	ფუნგ	08.2022
279	ქლოროტალონილი + სპილენძის ქლორჟანგი	სკაინერი	ფუნგ	06. 2022
280	ქლორპირიფოსი	ლოქსლი	ი	12.2020
	”	პიროელექტრა	”	09.2022
	”	სარბანი	”	02.2020
	”	პირინექსი	”	11.2022
	”	პირიფოსი	”	10. 2022
	”	ჰექტაშ პრიბანი 240 უმშ	”	02. 2023
	”	ალბანი 25 სფ	”	02.2023
	”	დურსბანი	“	08.2022

	„	საგა	„	12.2019
	„	სარბან 24 უმშ	„	01.2022
	„	დელფოსი	„	03.2022
	„	ლოქსლი 240 უმშ	„	03.2023
281	ქლორპირიფოსი+ბიფენტრინი	პირინექს სუპერი	ი	05.2023
	„	ბუფფალო	„	11.2022
	„	ტენჩანტ პლიუსი	„	03.2023
282	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი	ვალსარელი	ი	07. 2023
	„	ტენჩანტი	„	01. 2020
	„	ნურელ დ	„	02.2023
	„	ეფდალ ფოსეტრინი	„	08.2022
	„	ქლორპირიფიტი-აგრო	„	09.2022
	„	ბრენდ დ	„	10.2022
	„	სუპერვილ ფორტე	„	12.2019
	„	ულტიმატუმი	„	12.2020
	„	საპები	„	05.2022
	„	ბოიკოტი	„	09. 2022
283	ქლორპირიფოს- ეთილი	პრიბანი-4	ი	12.2021
	„	პრიბანი 25 სფ	ი, ითშ	08.2020
	„	ეფდალ პირინოს	„	03.2021
	„	მენსბანი 4	ი	12 .2021
	„	ალბანი 4	„	12.2022
284	ქლორპროპამი	გრო-სტოპ ფოგი	ზრ	08.2020
285	ციკლოქსიდიმი	სტრატოს ულტრა	ჰ	06.2022
286	ციმოქსანილი	ციმზალი	ფუნგ	02.2024
287	ციმოქსანილი+მეტალაქსილი	ზახისტი	ფუნგ	09.2022
288	ციპერმეტრინი	ვალსაციპერი	ი	07. 2023
	„	ალექსანდერ	„	12. 2020
	„	რივომეტრინი	„	12.2021
	„	ციპერსანი	„	10.2022
	„	კრალი 250 ეკ	„	12.2021
	„	საირუსი	„	03.2022
	„	ციპრინი	„	11.2021
	„	ეფდალ კიმეტრინი	„	02.2021
	„	მატადორი	„	02.2020
	„	ბესტ სიპერი	„	02.2021
	„	სიტრინი	„	03.2022
	„	ლორკანი	„	09.2022
289	ციპროდინილი	ხორუსი	ფუნგ	10.2020
	„	ციპრო პლიუსი	„	12.2021
	„	კორუსი	„	12.2022
	„	სტრაჟი	„	12.2021
	„	ათლეტი	„	10.2024
	„	კორიტუსი	„	06.2021
290	ციპროდინილი +ფლუდიოქსანილი	სვიტჩი	ფუნგ	10.2020
291	ცირამი	ზირაფლო	ფუნგ	03.2021
292	ცის-ვერბენოლი+იპსიდენოლი	აკუვიტი	ფერ	10.2021
293	ჰიბერელინის მჟავა	გოლდ გიბზი	ზრ	02.2021
	„	გიბგრო	„	12.2021
	„	ეფდალ ბლუგები	„	12.2023
		მეგაფილ ტაბლეტი	„	11.2023
		გიბერქეი	„	12.2024
		აგრო გიბზ	„	12.2024
294	ჰიმექსაზოლი	ტენნისი	ფუნგ	11.2023
295	ჰექსითიაზოქსი	ექსიტოქსი	ი	03.2022

მუხლი 28. პირობითი აღნიშვნები

1. ბი – ბიოლოგიური ინსექტიციდი.

2. ბიოტექ-ბიოტექნიკური საშუალება.
3. ზფ-ბიოლოგიური ფუნგიციდი.
4. ი – ინსექტიციდი.
5. ია-ინსექტოაკარიციდი.
6. ითშ – ინსექტიციდი თესლის შესაწამლად.
7. ნ – ნემატოციდი.
8. რ – როდენტიციდი.
9. ფერ-ფერომონი.
10. ფთშ – ფუნგიციდი თესლის შესაწამლად.
11. ფუმ – ფუმიგანტი.
12. ფუნგ – ფუნგიციდი.
13. ჰ – ჰერბიციდი.

მუხლი 29. რეგისტრირებული მოქმედი ნივთიერებები, რომელთა პრეპარატული ფორმების არსებული ნაშთების გახარჯვა დაშვებულია

№	მოქმედი ნივთიერება	პრეპარატის სავაჭრო დასახელება	ჯგუფი	საშეღავათო პერიოდის ამოწურვის ვადა
1	აბამექტინი	ტორპედო	ბი	12. 2020
2	აზოქსისტრობინი	კონრადი	ფუნგ	10.2020
3	ალფა-ციპერმეტრინი	ტავანა	ი	03.2021
4	ალუმინის ფოსფილი+ ფოლპეტი	მიკალი	ფუნგ	12. 2021
5	ალუმინის ფოსფიდი	აგრიფოსი	ფუმ	04.2020
6	ატრაზინი+პრომეტრინი	კოკო გოლდი	ჰ	05.2021
7	აცეტამიპრიდი	ესკაპე	ი	03.2021
8	აცეტოქლორი+ანტიდოტი	ვალსაგარდ ექსტრა	ჰ	06.2020
9	Bacillus thuringensis subsp. kurstaki	ფორეი	ბი	02. 2020
10	ბეტა-ციპერმეტრინი	კინმიქსი უმშ	ი	12. 2020
11	ბროდიფაკუმი	კილრატ	რ	06.2021
		კაპკანი	„	08.2020
12	ბრომოქსინილი+ტერბუტილაზინი	ზეგრანი	ჰ	09.2021
13	ბრომოქსინილი+2,4 დ 2-ეთილჰექსილის ეთერი	ბუქტრილ უნივერსალი	ჰ	10.2021
14	ბრომპროპილატი	ფაქტორი	ი	12. 2021
15	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი	სვიპი	ჰ	02.2020
	„	ეფდალ იზოფოსატ 36	ჰ	02.2020
		სანფორსი 48 წხ	„	03.2021
16	გლიფოსატი კალიუმის მარილი	რაუნდაპ ექსტრა	ჰ	04.2020
17	გოგირდი	სულფექს გოლდი	„	04.2020
18	დაზომეტი	ბაზამიდ გრანულიატი	ი, ნ, ფუნგ	07.2020
19	დელტამეტრინი	პრედატორი	„	03.2021
		იზოლდესისი	„	04.2021
		დეცისი ბლუ	ი	12. 2022
		დეცისი უმშ	„	12. 2021
20	დიკამბა+რიმსულფურონი	აისი	ჰ	12.2021
21	დინიკონაზოლი მ	მაქსილი -8	ფთშ	12.2020
		ეფდალ დინექსი	ფთშ	07.2020
		კონილი	ფთშ	02.2022
		სონფიქსი 1 ფთშ	ფთშ	09.2020
		ალიანსი	ფთშ	12. 2020
22	დიმეთოატი	ბი-58 ახალი	ი	02.2020
		ვერტიკალი	„	03.2021

	”	ბინგო	”	12.2021
	“	ბი-ფოსფინი	“	12.2021
23	დიფენოკონაზოლი	იზოლდიფეკორი	ფუნგ	04.2021
24	დიფლოვიდაზინი	ფლუმაიტი	ია	09.2020
25	ბრომოქსინილი+ ტერბუტილაზინი	ზეგრანი	ჰ	09.2022
26	თიაკლოპრიდი	თიაკლომექსი	ი	04.2020
27	იმაზეტაპირი	სვიფტი	ჰ	12.2021
28	იმიდაკლოპრიდი	იმიდამექსი	ი	04.2020
		გორტკა	”	09.2020
		ეფდალ იმიდრიდი 60 ითშ	”	04.2021
		მიდაში	“	12.2020
		კონფიპრიდი	”	06.2021
29	იმიდოკლოპრიდი + მეტალაქსილი +ციმოქსანილი	მატადორ გრანდი	ითშ/ფთშ	12.2020
30	იპროდიონი	ეფდალ იპროდიონი	ფუნგ	05.2020
		როვონე	ფუნგ, ფთშ	07.2020
		როვრალი	ფუნგ	10.2020
		ზეანოლი	ფუნგ	05.2020
		ალიანსი	ფთშ	12.2020
31	კვიზალოფოპ-პ -ეთილი	სერ-სუპერი	ჰ	03.2021
		რაპირა	”	12.2021
		თოვტა სუპერი	ჰ	10.2022
32	კლოთიანიდინი	პონჩო ითშ 600	ითშ	01.2020
33	კლოდინაფოპ პროპარგილი + კლოკვინტოსეტ-მექსილი	ტოპიკი	ჰ	08. 2022
34	ლამბდა-ციპალოტრინი	ტეკვანდო კაპსულა	”	10.2020
	”	კავანჩა	”	03.2021
35	ლინურონი	აფალონი	ჰ	07.2020
36	ლუკრეზინი	ბიორაგი	ზრ	04.2020
37	მანკოცები	მანკოზატი	ფუნგ	12.2020
		კინგკოზები მ-45	”	02.2021
38	მანკოცები+დიმეტომორფი	კამბაზი მც	”	05.2021
39	მანკოცები+კარბენდაზინი	იგლი	ფუნგ	12.2021
40	მანკოცები+მეტალაქსილი	მელტემი	”	03.2021
	“	საფა რიდონეტ გოლდი მც 68	“	10.2021
	”	რიდოლეტი	”	12.2021
41	მანკოცები+ციმოქსანილი	მაქსალინი	”	12. 2020
		ერფრუტი	”	03.2021
42	1-მეთილციკლოპროპენი	ფიტომაგი	ზრ	09.2020
43	მეტალდეჰიდი	მეტადექს პელეტი	ლიმ	12.2020
44	Metarhizium acridum	გრინ გარდ სკ პრემიუმი	ბი	01.2021
45	მეტოლასლორი+ატრაზინი	პრიმექსტრა გოლდი	ჰ	12.2020
46	ნიკოსულფურონი	სამსონი ექსტრა	ჰ	01.2020
	”	ფულსპიდი	ჰ	12.2020
47	2.4 დ (დიმეთილამინის მარილი)	პაიამინი	”	05.2021
		ლენტემული დ		10. 2021
48	2.4 დ (მჟავა)+დიკამბა (მჟავა)	დიკოპურ ტოპი	ჰ	10.2020
49	პარაფინის ზეთი	ინსექტიციდი ქეი	”	12.2020
50	პენდიმეტალინი+ კლომაზონი	ალკანსე	ჰ	12.2021
51	პენკონაზოლი	ერპლანტი	”	03.2021

52	პრომეტრინი	გეზაგარდი	ჰ	08. 2022
	“	პრომოტრინი	“	12.2021
	“	პრომე გოლდი	“	05.2021
	”	ამეტრინი	”	12.2021
53	პროპარგიტი	ომნუსი	ია	05.2020
	”	ეფდალ პრომიტე	ია	05.2020
	”	გოლდმაიტი	ია	05.2020
		პროპაფექტი 57	ია	02.2021
54	პროპიკონაზოლი	ტილტუსტ	ფუნგ	11.2021
		პროკურე	”	12.2022
55	პროპიკონაზოლი+ტრიადიმეფონი	ტი რეკსი	ფუნგ	12.2020
56	პროპინები	კორუნები	ფუნგ	05.2020
		ანტრაკოლ ბლაუ	ფუნგ	12.2020
		ფუნგიკინგი	”	12.2020
		იზოლპროპინები	”	04.2021
		მაიოზი	”	02.2021
		სანაკოლი	”	06.2021
57	პროპინები+ციმოქსანილი	ენერკოლ კომბი	ფუნგ	12.2020
		ეფდალ პიროქსომი	”	03.2021
58	რკინის (II) სულფატი	რკინის შაბიამანი	ფუნგ	11.2020
59	სპილენძის სულფატი	კუპროსულფი	”	12.2021
60	სპილენძდამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი	კოპერ-ქაუნტ-N	ფუნგ	02.2021
61	სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი	პოლტიგლია მანიკა, წდგრ	”	01.2021
		იზოლბლუ ბორდომიქსი	”	04.2021
		ბორდო ლუქსი	”	12.2021
62	სპილენძის ქლორჟანგი	ჰექტაშ ბაკირი	”	12.2021
		ოსსიქლორი 35 წზგრ	”	01.2021
63	სპიროდიკლოფენი	სმაჩი	”	12.2020
64	“ტეზუკონაზოლი	ტეზიკური	ფთშ	10.2021
65	ტეზუფენპირადი	იაკუზა	”	03.2021
66	ტრიადიმეფონი	აგსტარი	ფუნგ	03.2020
	”	რიფიტი	ფუნგ	03.2020
67	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი	ფურორე სუპერი	ჰ	12.2019
68	ფლოკუმაფენი	შტორმი სეკიურე	”	06.2022
		შტორმი პელეტი	”	06.2022
69	ფლუაზიფოპ-პ ბუთილი	ბრეის სუპერი	”	12.2020
	“	ტანგრა	”	12.2022
70	ფლუფენაცეტი+მეტრიბუზინი	არტისტი	ჰ	09.2021
71	ქლორმეკვატოქლორიდი	სტაბილანი	ზრ	12. 2021
72	ქლოროტალონილი	საფკონილი	ფუნგ	01.2021
73	ქლორპირიფოსი	სერბანი 4	”	04.2020
	”	ტურბან 4	”	12.2021
74	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი	სანსირო	ი	03.2020
75	ციპროდინილი	კარპაზი	ფუნგ	01.2021
76	ჰიმექსაზოლი	ტაგინტი	ფუნგ	02.2020

შენიშვნა: კატალოგის 29-ე მუხლში მოყვანილი პრეპარატების იმპორტი არ დაიშვება
მათი ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებამდე.

*საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 21 თებერვლის
ბრძანება №2-163 - ვებგვერდი, 25.02.2020წ.*