



02014260210030008



19861

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1426

2 Οκτωβρίου 2003

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση της 498/296512/3.10.2002 (ΦΕΚ Β/1328/2002) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας. .... 1
- Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία mancozeb, ως προς το φάσμα δράσης... 2

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 263971 (1)  
Τροποποίηση της 498/296512/3.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Β/ 1328/2002) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

β) Του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 «Περί οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α' 280).

γ) Του άρθρου 33 του Ν. 2538/1997 «περί τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 242) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 (Α' 280).

δ) Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) και ειδικότερα του άρθρου 29Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154), ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση

της διατάξεων του Ν. 1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α' 154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38).

ε) Του Ν.2362/1995 (Α' 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού».

στ) Του Ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινот. Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων...και άλλες διατάξεις» (Α' 200).

ζ) Του Ν. 2732/1999 (Α' 154) περί «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας».

η) Του άρθρου 24 του Ν. 2945 (Α' 223/2001) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας».

θ) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57).

ι) Του Καν. (Ε.Κ.) 1221/1997 του Συμβουλίου «περί των γενικών κανόνων εφαρμογής για ενέργειες βελτίωσης της παραγωγής και της εμπορίας του μελιού» (L 173) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΚ) 2070/98 του Συμβουλίου (L265).

ια) Του Καν. (Ε.Κ.) 2300/1997 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1221/1997...» (L 319) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (Ε.Κ.) 758/98 «για τροποποίηση του Καν. (Ε.Κ) 2300/1997...», (L105), 1472/98 (L/194), 2633/98 (L333) της Ε.Ε. και 1336/2001 (L 180).

ιβ) Του Καν. (ΕΟΚ) 729/1997 και του Καν. 1258/99 «Περί χρηματοδότησεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» L94).

ιγ) Του Καν. (ΕΚ) 1663/95 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 729/70 του Συμβουλίου όσον αφορά στη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ.

2. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας του μελιού έτους 2003, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, όπως εγκρίθηκε με την Ε(2002) 2675 τελικό 17.7.2002 και τροποποιήθηκε με τις αριθ. Ε(2003) 2028 τελικό /2.7.2003 και Ε(2003) 2846 τελικό /8.8.2003 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Την 498/296512/3.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Β/1328/2002) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Γε-

ωργίας περί υλοποίησης του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας μελιού έτους 2003.

4. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.

5. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την 498/296512/3.10.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Γεωργίας ως εξής:

1. Στο σημείο ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη 3.368.438 €

2. Στο σημείο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη 950.146 €

3. Στο σημείο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙV: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη 55.429 €

4. Στο σημείο ΕΝΕΡΓΕΙΑ V: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη 57.388 €

Κατά τα λοιπά ισχύει η 498/296512/3.10.2002 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β/1328/2002).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

Αριθ. 111099

(2)

Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία mancozeb, ως προς το φάσμα δράσης.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλο-

φορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 14 (παρ. ε, στ και ιζ) και 22 (παρ. ια).

2. Την Κ.Υ.Α. 94073/27.4.2001 (Β' 586) που αφορά στα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Την Κ.Υ.Α. 97252/21.5.99 (Β' 1240) που αφορά στην «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Υπ. Απόφασης 352654/10.5.95 (Β' 518), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής».

4. Την Κ.Υ.Α. 352654/10.5.95 (Β' 518) που αφορά στα «Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ».

5. Την 399580/30.10.2001 (Β' 1479) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημηχάλη», αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία mancozeb, ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 13) καθώς και το σημείο 23 ως εξής:

#### 13. Φάσμα δράσης

Απαγορεύουμε τη χρήση του στις καλλιέργειες: αμυγδαλιά, σπανάκι, αγκινάρα, αραχίδα, φρέσκα κρεμμυδάκια και στα όσπρια (φασόλια, μπιζέλια, κουκιά, φακές, ρεβύθια, αρακάς), και ο πίνακας του σημείου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ			Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		Κιλά δ.ο./100 Λίτρα νερό	Λίτρα νερού /ha	Κιλά δ.ο. /ha		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέιπ φρουτ, κίτριά, νεραντζιά)	Ανθράκωση ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )					Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας καθώς και μετά από χαλάζι.
	Φυτόφθορα καρπών ( <i>Phytophthora spp.</i> )	0,16-0,32	1000-4000	3,2-12,8	3	Εφαρμογές πριν τις φθινοπωρινές βροχές με καλή διαβροχή των χαμηλών κλάδων.
	Καπνιά ( <i>Capnodium citri</i> )					
	Σεπτορίωση ( <i>Septoria sp.</i> )					

<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> (Μηλιά, αχλαδιά)	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis V. pirina</i> )  Σεπτορίωση ( <i>Septoria sp</i> )	0,12-0,16	1000-2000	1,6-3,2	4	4 εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα (καρπίδιο)
<b>ΠΥΡΙΝΟΚΑΡΠΑ</b> (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά)	Κορύνεο ( <i>Stigmia carophila</i> )	0,16-0,20	1500	2,4-3,0	4	Εφαρμογή στη ρόδινη κορυφή, στην πτώση των πετάλων, μετά την πτώση των φύλλων.
<b>ΑΜΠΕΛΙ</b>	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )  Φώμοψη ( <i>Phomopsis viticola</i> )	0,16-0,28	500-1000	1,6 – 2,8	4	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 14 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση  1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές, κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1 <sup>ου</sup> φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων
<b>ΦΡΑΟΥΛΑ</b>	Κηλίδωση φύλλων ( <i>Mycosphaerella fragariae</i> )	0,16	500-1000	0,8-1,6	2	εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.
<b>ΕΛΙΑ</b>	Κυκλοκόνο ( <i>Spilocaea oleagina</i> )  Γλοιοσπόριο ( <i>Gloeosporium olivarium</i> )  Καπνιά ( <i>Carponidium oleaophilum</i> )	0,2-0,24	1500-3000	3,0-6,0	2	Μία εφαρμογή αρχές Οκτώβρη και επανάληψη χωρίς την άνοιξη  2 εφαρμογές, η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα  Αντιμετωπίζεται με τις επεμβάσεις που γίνονται για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου
<b>ΚΑΡΟΤΟ</b>	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria dauci</i> )  Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium macrocarpum</i> )	0,16	500-1000	1,6	4	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.
<b>ΠΡΑΣΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ</b> (ξερό), ΣΚΟΡΔΟ	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria spp.</i> )  Σκωρίαση ( <i>Puccinia allii</i> )  Περονόσπορος ( <i>Peronospora destructor</i> )  Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis spp.</i> )	0,16-0,66	300-500	0,8-2,0	4	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.

<p><b>ΤΟΜΑΤΑ</b></p>	<p>Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)</p> <p>Σεπτορίωση (<i>Septoria lycopersici</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria spp.</i>)</p> <p>Ανθράκωση (<i>Colletotrichum phomoides</i>)</p> <p>Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium fulvum</i>)</p> <p>Βακτηριώσεις (<i>Pseudomonas spp.</i>, <i>Xanthomonas versicatoria</i>)</p>	0,16	500-1000	1,6	4	<p>Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.</p> <p>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.</p> <p>Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων μέχρι την καρπόδεση</p>
<p><b>ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ</b></p>	<p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)</p>	0,16	500-1000	1,6	4	<p>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα</p>
<p><b>ΠΙΠΕΡΙΑ</b></p>	<p>Περωνόσπορος (<i>Peronospora tabacina</i>)</p> <p>Ανθράκωση (<i>Colletotrichum capsici</i>)</p>	0,16	500-1000	1,6	4	<p>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα</p>
<p><b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</b> (Αγγούρι, κολοκίθι, πεπόνι, καρπούζι)</p>	<p>Περωνόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</p> <p>Ανθράκωση (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)</p> <p>Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)</p>	0,16	500-1000	1,6	4	<p>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα</p>
<p><b>ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΙ, ΛΑΧΑΝΟ</b></p>	<p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria brassicae</i>)</p> <p>Περωνόσπορος (<i>Peronospora parasitica</i>)</p>	0,16	650-850	1,6	4	<p>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα</p>
<p><b>ΣΕΛΙΝΟ</b></p>	<p>Σεπτορίωση (<i>Septoria sp.</i>)</p> <p>Κερκοσπορίωση (<i>Cercospora apii</i>)</p>	0,16		1,6	4	<p>Εφαρμογές στο σπορείο από το φύτευμα των φυτών μέχρι τη μεταφύτευσή τους και στο χωράφι με διάστημα μεταξύ εφαρμογών 7 ημέρες</p>

ΦΑΣΟΛΙΑ, ΜΠΙΖΕΛΙΑ	<p>Σκωρίαση (<i>Uromyces spp.</i>)</p> <p>Ανθράκωση (<i>Colletotrichum sp.</i>)</p> <p>Περονόσπορος (<i>Peronospora sp.</i>)</p> <p>Προσβολή λαϊμού και ριζών (<i>Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani</i>)</p>	0,16	600-1000	1,6	4	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα
ΜΑΡΟΥΛΙ	Περονόσπορος ( <i>Bremia lactucae</i> )	0,16	600-1000	1,6	2	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα
ΠΑΤΑΤΑ	<p>Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)</p> <p>Ριζοκτονίαση (<i>Rhizoctonia spp.</i>)</p>	0,16-2,4	500-1000	1,6-2,4	4	<p>Εφαρμογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση</p> <p>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα</p> <p>Λίγο πριν τη σπορά</p>
<p>ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη)</p> <p>Απολύμανση σπόρων</p>	<p>Δαυλίτης, (<i>Tilletia tritici</i>)</p> <p>άνθρακες, (<i>Ustilago spp.</i>)</p> <p>γυμνές και καλυμμένες φουζαριώσεις, (<i>Fusarium spp.</i>)</p> <p>ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium spp.</i>)</p> <p>σεπτορίωση, (<i>Septoria spp.</i>)</p>	0,162 kg/ 100 kg σπόρου	-	-	-	Λίγο πριν τη σπορά
<p>ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ</p> <p>Απολύμανση σπόρων</p>	<p>Ανθρακας (<i>Ustilago maydis</i>)</p> <p>Φουζάριο (<i>Fusarium moniliforme</i>)</p> <p>Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium spp.</i>)</p>	0,16-0,24kg/100 kg σπόρου			1	Λίγο πριν τη σπορά

<b>ΡΥΖΙ</b> Απολύμανση σπόρων	Δαυλίτης, άνθρακες, γυμνές και καλυμμένες φουζαριώσεις, σεπτορίωση, ελμινθοσπορίωση	0,16- 0,24kg/100 kg σπόρου			1	Λίγο πριν τη σπορά
<b>ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΑΑ</b> Απολύμανση σπόρων	Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora beticola</i> )  Μύκητες εδάφους ( <i>Pythium spp.</i> )	0,2-0,28  0,40- 0,64kg/100 kg σπόρου	-	-	5  1	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 15 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα  Λίγο πριν τη σπορά
<b>ΚΑΠΝΟΣ</b>	Περονόσπορος ( <i>Peronospora tabacina</i> )	0.144	1000	1.44	4	Στα σπορεία οι ψεκασμοί αρχίζουν μια εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών και επαναλαμβάνονται μετά από κάθε πότισμα ή βροχή. Στο χωράφι, εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες μέχρι ένα μήνα μετά τη μεταφύτευση εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου.
<b>ΒΑΜΒΑΚΙ</b> Απολύμανση σπόρων	Δαυλίτης, άνθρακες, γυμνές και καλυμμένες φουζαριώσεις, σεπτορίωση, ελμινθοσπορίωση	0,16- 0,24kg/100 kg σπόρου			1	Λίγο πριν τη σπορά
<b>ΚΑΛΩΔΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</b> Γαρυφαλλο Γλαδίολος Τριαντάφυλλο Ζίννια-Ντάλια Χρυσάνθεμο Λεύκα Κωνοφόρα	Σκωρίαση ( <i>Uromyces dianthii</i> )  Σκωρίαση ( <i>Puccinia gladioli</i> )  Μελανή κηλίδωση φύλλων ( <i>Diplocarpon rosae</i> )  Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria sp.</i> )  Ασκοχύτωση ( <i>Ascochyta spp. chrysanthemi</i> )  Σεπτορίωση ( <i>Septoria sp</i> )	0.16-0.24	1000	1.6-2.4	5	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής
<b>Λυκίσκος</b>	Περονόσπορος  Ωίδιο			0,08-0,1	4	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής

## Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

3. Σε εσπεριδοειδή το mancozeb έχει μέτρια δράση στα ακάρεα.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

ΠΙ Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή:	14 ημέρες
Μηλοειδή:	28 ημέρες
Πυρηγόκαρπα:	28 ημέρες
Αμπέλι:	28 ημέρες
Φράουλα:	3 ημέρες
Ελιές:	21 ημέρες
Καρότο:	28 ημέρες
Πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο:	28 ημέρες
Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά:	14 ημέρες

Κολοκυνθοειδή:	(αγρός), 7 ημέρες (θερμοκήπιο) 14 ημέρες
Κουνουπίδι, λάχανο:	(αγρός), 7 ημέρες (θερμοκήπιο) 21 ημέρες
Σέλινο:	14 ημέρες
Φασόλια, μπιζέλια:	21 ημέρες
Μαρούλι:	14 ημέρες
Πατάτα:	7 ημέρες
Σιτηρά:	28 ημέρες
Ζαχαρότευτλα:	28 ημέρες
Καπνός:	30 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

II. Οι διορθωμένες ετικέτες θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**