

Ορίζουμε ως ακολούθως την ποιότητα και τις χρήσεις των σκευασμάτων CAPTAN που κυκλοφορούν στη χώρα μας καθώς και τη σήμανση και τις προφυλάξεις που θ' αναγράφονται υποχρεωτικά στην ετικέτα τους.

1. Ποιότητα κυκλοφορούντων σκευασμάτων.

α. Από 1.10.1988 οι εισαγόμενες ποσότητες CAPTAN τεχνικά καθαρο (TECHNICAL) που προορίζονται για την παρασκευή σκευασμάτων που θ' κυκλοφορήσουν στη χώρα μας καθώς και εκείνες των εισαγομένων για το ίδιο σκοπό σκευασμάτων βρέξιμης σκόνης (WP) CAPTAN θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με τις αντίστοιχες του FAO και συγκεκριμένα με:

- (1) Το τεχνικά καθαρό: με FAO SPECIFICATION CODE 40/1/S/5;
- (2) Τα σκευάσματα: με FAO SPECIFICATION CODE 40/3/S/4;

β. Από 1.1.89 τα σκευάσματα βρέξιμης σκόνης CAPTAN που κυκλοφορούν στη χώρα μας θα έχουν τις προδιαγραφές που ορίζονται με την περίπτωση (2) του προηγούμενου εδαφίου α.

γ. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σκευασμάτων CAPTAN αμιγών ή μιγμάτων σε μορφή σκόνης επίτασης (D) καθώς και η χρήση βρεξιμων σκευασμάτων του (WP) για επιτάσεις.

δ. Απαγορεύεται η χρήση σκευασμάτων που περιέχουν CAPTAN στις καλλιέργειες που ορίζονται με την παρ. 3 δ (2) της παρούσας απόφασης.

2. Οι ασθένειες για τις οποίες επιτρέπεται η χρήση του CAPTAN (μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση) είναι οι ακόλουθες:

- Αμπέλια - Σταφίδες: Περονόσπορο, βοτρυτή.
- Πυρηνόκαρπα: Φαιά σήψη, κορύνιο, εξώασκο.
- Μηλοειδή: Φουζικλάδιο.
- Λαχανικά: Τήξη σπορείων, βοτρυτή, αλτερνάρια και σελτόρια και με μέτρια δράση σκωρίαση, σκληρωτίνια, ανθράκνωση και περονόσπορο.
- Μποστανικά: Τήξη σπορείων, βοτρυτή και με μέτρια δράση περονόσπορο, ανθράκνωση, σκληρωτίνια, κλαδοσπόριο.
- Πατάτα: περονόσπορο μέτρια δράση.
- Καλλωπιστικά: τήξεις.

Δοσολογία:

Για τα σκευάσματα: 50% WP 250 γρ/100 λίτρα νερό.

Για τα σκευάσματα: 83% WP 150 γρ/100 λίτρα νερό.

Οι δόσεις επιτρέπεται ν' αυξάνονται μόνο στους χειμερινούς ψεκασμούς φυλλοβόλων.

3. Από 1.8.88 όλα τα σκευάσματα που περιέχουν CAPTAN θα φέρουν στη συσκευασία τους έστω και με αυτοκόλλητη ετικέτα τις εξής ενδείξεις:

α. Τοξικολογική κατάταξη - Σήμανση.

Ερεθιστικό: Χι, Σταυρός του Αγίου Ανδρέα, ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη το χρησιμοποιείτε περισσότερο απ' ό,τι χρειάζεται και εφαρμόζεται αυστηρά τις προφυλάξεις.

Ενδείξεις σε πειραματόζωα προκαλούν υπόνοιες ότι είναι καρκινογόνο.

β. Πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον.

Είναι πολύ τοξικό για τα ψάρια.

- Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων.

γ. Προφυλάξεις.

- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ποτά.

- Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, γιλιτιά και μάσκα.

- Μην αναπνέετε τη σκόνη ή στο ψεκαστικό υγρό - Μην ψεκάσετε αντίθετα στον άνεμο.

- Απομακρύνετε από το χώρο ψεκασμού οποιονδήποτε άσχετο και οπωσδήποτε έγκυες γυναίκες και παιδιά.

- Μην αυξάνετε τις δόσεις και τηρείτε αυστηρά τα όρια τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.

- Αλλάξτε αμέσως τα βρεγμένα από ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλυθείτε καλά.

- Αν πέσει στα μάτια, ρίξτε άφθονο νερό επί 15'.

- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε πριν τελειώσετε τον ψεκασμό και πλυθείτε καλά.

- Μη μολύνετε τα νερά.

- Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό.

δ. Περιορισμοί:

(1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

- Αμπέλι: 40 μέρες.

- Πυρηνόκαρπα (εκτός από αμυγδαλιά): 20 μέρες

- Αμυγδαλιά: 30 μέρες.

- Μηλοειδή: 15 μέρες.

- Λαχανικά που τρώγονται αφού μαγειρευθούν: 20 μέρες.

- Λαχανικά που οι καρποί τους τρώγονται ωμοί: μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

- Αγγούρια - Κολοκύθια: μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

- Καρπούζια - πεπόνια: 20 μέρες πριν τη συγκομιδή.

(2) Απαγορεύεται η χρήση του:

- Στα θερμοκήπια.

Αριθ. 75622

(3)

Προδιαγραφές περιορισμοί στην κυκλοφορία, χρήση και σήμανση του CAPTAN.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. δ, ε, ζ, η και ιε του άρθρου 14 και το άρθρο 22 του Ν. 721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων.

2. Την αριθ. 2/2η Συνεδρίαση/14.3.88 γνωμοδότηση του ΑΣΥΓΕΦ.

3. Τις αριθ. 344172/7.5.86 (ΦΕΚ 31/Β/86) και 260347/16.3.87 (ΦΕΚ 83/Β/87) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Δημ. Πιτσιώρη και Κ. Τσιγαρίδα, αποφασίζουμε:

- Στους καρπούς των εσπεριδοειδών.
- Στα φύλλα των φυλλωδών λαχανικών που τρώγονται ωμά.
- Στη φράουλα.
- Σε ημερομηνίες πλησιέστερες της συγχομιδής από τις κρινόμενες πιο πάνω.

(3) Ν' αποφεύγεται η είσοδος σ' έκταση που φεκάσθηκε με CAPTAN επί 4 μέρες μετά τον ψεκάσμό.

4. Από 1.1.1989 απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητου και οι ενδείξεις της παρ. 2 της παρούσης θ' αναγράφονται υποχρεωτικά επί της συσκευασίας.

5. Η τυποποίηση και συσκευασία στη χώρα μας σκευασμάτων που περιέχουν CAPTAN επιτρέπεται μόνο από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που:

- α. Έχουν άδεια λειτουργίας.
  - β. Περιλαμβάνονται στο Μητρώο αναγνωρισμένων βιομηχανιών του Υπουργείου Γεωργίας.
  - γ. Απέχουν τουλάχιστον 50 μέτρα από κατοικίες.
  - δ. Ενημερώνουν τους εργάτες για τους κινδύνους που περιλαμβάνει.
  - ε. Εφοδιάζουν τους εργάτες με τ' απαραίτητα προστατευτικά ρούχα και μέσα και να φροντίζουν να τα χρησιμοποιούν.
6. Απαγορεύεται η συσκευασία σκευασμάτων που περιέχουν CAPTAN σε μέγεθος μικρότερο από 100 γρ. και μεγαλύτερο από 5 κιλά.

7. Άδειες εισαγωγής.

α. Από της υπογραφής της παρούσας η εισαγωγή τεχνικά καθαρού CAPTAN προκειμένου να τυποποιηθεί και σκευασμάτων του προκειμένου να υποσυσκευασθούν στη χώρα μας επιτρέπεται μόνον εφόσον η βιομηχανία ή βιοτεχνία που θα γίνει η τυποποίηση ή συσκευασία πληροί τους όρους που ορίζονται με την παρ. 5 της ίδιας απόφασης.

β. Από 1.8.88 η εισαγωγή τεχνικά καθαρού CAPTAN και σκευασμάτων του, εφόσον πρόκειται να κυκλοφορήσουν στη χώρα μας, επιτρέπεται με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (αυτοκόλλητο, συσκευασία) ότι έχουν εφαρμοσθεί τα οριζόμενα με τις παρ. 3 και 4 της παρούσας απόφασης ενώ από 1.10.88 και με την παρ. 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΔΗΜ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ

