

METAREX M

Esca Granulare per il controllo di lumache, limacce e chiocciolone su legumi, fruttifere ed ornamentali
 Contiene sostanza amaricante

METAREX INO – COMPOSIZIONE

- Metaldeide pura g 2.5
- Denatonio benzoato (amaricante)..... g 0.02
- Coformulanti q.b. a g 100

Contiene (R)-p-menta-1,8-diene. Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRODOTTO DESTINATO AGLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature; non distarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

DE SANGOSSE S.A.S. – BP 5 – Z.I. Bonnel – 47480 PONT-DU-CASSE - Francia
 Tel. 00(33)5.53.69.36.30

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
 Stabilimento di Produzione: DE SANGOSSE S.A.S. – BP 5 – Z.I. Bonnel – 47480 PONT-DU-CASSE - Francia
 Taglie: 0.2 – 0.25 – 0.5 – 0.75 – 1 – 1.5 – 2 kg Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli/ i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Conservare a temperature inferiori a 30°C. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso o consultare un Centro Anti-Veleni.

CARATTERISTICHE

METAREX M è un'esca che agisce quando ingerita dai parassiti. I granuli di METAREX M immobilizzano le lumache, segue la morte. I migliori risultati si ottengono se applicato in condizioni di tempo umido e miti, dopo una pioggia o successivamente all'irrigazione, quando le lumache sono molto attive.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

L'applicazione del prodotto avviene generalmente in primavera o all'inizio dell'estate e dell'autunno (fare riferimento agli stadi sotto riportati).

In caso di forte infestazione può essere necessario ripetere il trattamento (con intervallo minimo tra le applicazioni pari a 5 giorni). E' consigliabile applicare il prodotto nel tardo pomeriggio, prima che le lumache inizino a nutrirsi. Per un effetto ottimale (in termini di persistenza nel suolo) non applicare se è prevista pioggia nelle ore successive.

Dose autorizzata: 0.5 g/m² (30 granuli/m²)

Dose massima/annua: 2.8 g/m² per coltura all'anno.

Applicare uniformemente i granuli attorno alle piante, alla dose di 0.5 g/m² (30 granuli/m²).

In caso di applicazione in prossimità di colture edibili, prendere le opportune precauzioni per evitare che i granuli rimangano sulle foglie.

Colture in pieno campo:

Colture	Stadio di crescita
Vite per uva da tavola o da vino, more, altre bacche e piccoli frutti, fragole	Dalla semina/trapianto fino alla fine della fioritura.
Patata	Dall'impianto fino a 7 giorni prima della raccolta

Colture	Stadio di crescita
Barbabietola da zucchero, da foraggio, rossa, rapa	Dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere
Cavolfiori, broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles	Dalla semina fino all'inizio dello sviluppo delle teste
Lattuga, altre insalate, spinaci, altre verdure a foglia verde (portulaca, bietola), erbe aromatiche (cerfoglio, erba cipollina, sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello)	Dalla semina fino allo stadio di rosetta
Piselli e fagioli, freschi e secchi	Dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere
Carciofo	Dal trapianto fino allo sviluppo delle teste
Mais dolce	Dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere
Tappeti erbosi	In qualsiasi stadio
Floreali ed ornamentali	In qualsiasi stadio

Colture in serra:

Colture	Stadio di crescita
Fragola	Dal trapianto fino alla fine della fioritura
Lattuga, altre insalate, spinaci, altre verdure a foglia verde (portulaca, bietola), erbe aromatiche (cerfoglio, erba cipollina, sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello)	Dalla semina fino allo stadio di rosetta
Floreali ed ornamentali	In qualsiasi stadio


Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per la patata

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare



27 GEN 2014



l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **27 GEN. 2014**

14A00953

