

**563.**

Na osnovu člana 78 stav 3 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), Vlada Crne Gore na sjednici od 23. marta 2017. godine, donijela je

**UREDBU**  
**O ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODNJU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA**  
**ŽIVOTINJE ZA POSEBNE NUTRITIVNE POTREBE\***

**Predmet**

**Član 1**

Ovom uredbom propisuju se zahtjevi za proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe.

**Stavljanje na tržište i korišćenje hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe**

**Član 2**

Subjekat u poslovanju hranom za životinje (u daljem tekstu: subjekat poslovanja), dužan je da stavlja na tržište samo hranu za životinje za posebne nutritivne potrebe, koja ispunjava zahtjeve date u Prilogu koji je sastavni dio ove uredbe.

**Novčane kazne**

**Član 3**

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako stavlja na tržište hranu za životinje za posebne nutritivne potrebe koja ne ispunjava zahtjeve date u Prilogu 1 koji je sastavni dio ove uredbe (član 2).

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura.

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 3.000 eura.

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura.

**Zalihe hrane**

**Član 4**

Hrana za životinje za posebne nutritivne potrebe koja se stavlja na tržište u skladu sa propisima koji su važili do početka primjene ove uredbe, može se stavlјati na tržište do isteka zaliha, a konzervirana hrana i hrana sa dužim rokom trajanja do isteka roka upotrebe.

## **Stupanje na snagu**

### **Član 5**

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

-----  
\* U ovu uredbu prenijeta je Direktiva 2008/38/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 5 marta 2008 godine o utvrđivanju popisa predviđenih namjena korišćenja hrane za životinje za posebne prehrambene potrebe

Broj: 07-695

Podgorica, 23. marta 2017. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

## ZAHTEVI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE NUTRITIVNE POTREBE

Posebna nutritivna potreba	Osnovna nutritivna svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeni period korišćenja	Ostali zahtjevi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Poboljšavanje rada bubrega u slučaju hronične bubrežne insuficijencije</b>	Visokokvalitetni proteini i ograničeni nivoi fosfora najviše 5g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12% i sirovih proteina najviše 220g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12% ili	Psi	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Hrana za životinje stavlja se na tržište kao potpuna krmna smjesa; Preporučena svarljivost proteina: najmanje 85%; Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet od veterinara.” Na uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti uvijek dostupna”.
	Smanjena apsorpcija fosfora uključivanjem lantan karbonat oktahidrata	Odrasli psi	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina (ako su dodate) Lantan karbonat oktahidrat	Do šest mjeseci	Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.” U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti uvijek dostupna”
	Visokokvalitetni proteini i ograničeni nivoi fosfora najviše 6,2 g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12% i sirovih proteina najviše 320g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12% ili	Mačke	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Hrana za životinje stavlja se na tržište kao potpuna krmna smjesa. Preporučena svarljivost proteina: najmanje 85%. Na oznaci se navodi: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.” U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti uvijek dostupna.”
	Smanjena apsorpcija fosfora uključivanjem lantan karbonat oktahidrata	Odrasle mačke	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Sadržaj esencijalnih masnih kisjelina (ako su dodate) Lantan karbonat oktahidrat	Do šest mjeseci	Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.” U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti uvijek dostupna.”
<b>Za topljenje struvitnih kamenaca</b>	Svojstvo acidifikacije mokraće, nizak nivo magnezijuma, ograničen nivo visoko kvalitetanih proteina	Psi	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum Hloridi Sumpor Materije koje acidifikuju mokraću	Pet do 12 nedjelja	U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti uvijek dostupna.” Na pakovanju, rezervoaru ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
	Svojstvo acidifikacije mokraće i nizak nivo magnezijuma	Mačke	Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum Hloridi Sumpor Ukupni taurin Materije koje acidifikuju mokraću		
<b>Za smanjenje ponovne pojave struvitnih kamenaca</b>	Svojstvo acidifikacije mokraće i umjeren nivo magnezijuma	Psi i mačke	Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum Hloridi Sumpor Materije koje acidifikuju mokraću	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
<b>Za smanjenje nastanka uratnih kamenaca</b>	Nizak nivo purina, nizak nivo visoko kvalitetnih proteina	Psi i mačke	Izvor proteina	Do šest mjeseci ili doživotno, u slučajevima ireverzibilnog poremećaja metabolizma mokraćne kisjeline	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
<b>Za smanjenje nastanka oksalatnih</b>	Nizak nivo kalcijuma, nizak nivo vitamina D, svojstvo alkalizovane mokraće	Psi i mačke	Kalcijum Fosfor Kalijum Natrijum Magnezijum	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.”

kamenaca			Hloridi Sumpor Ukupni D vitamin Hidroksi-prolin Materije koje alkalizuju mokraću		
Za smanjenje nastanka cistinskih kamenaca	Nizak nivo proteina, umjeren nivo sumpornih amino-kisjelina, svojstvo alkalizovane mokraće	Psi i mačke	Ukupne sumporne amino-kisjeline Natrijum Kalijum Hloridi Sumpor Materije koje alkalizuju mokraću	Do jedne godine	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za smanjenje intolerancije na sastojke i hranljive materije	Odabrani izvor proteina	Psi i mačke	Izvor proteina Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate)	Tri do osam nedjelja: ako znaci intolerancije nestanu, ovom se hranom za životinje može hraniti neograničeno dugo	
	i/ili				
	Odabrani izvor ugljenohidrata		Izvor ugljenohidrata Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate)		
Za smanjenje akutnih poremećaja resorpcije u crijevima	Povećan nivo elektrolita i lako svarljivih materija	Psi i mačke	Lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade Natrijum Kalijum Izvor sluzi (ako su dodate)	Jedna do dvije nedjelje	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Kod akutnog proliva i tokom oporavka od akutnog proliva.” i „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za postizanje ravnoteže hranljivih materija pri maldigestiji	Lako svarljivi sastojci, nizak nivo masti	Psi i mačke	Lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade	Tri do 12 nedjelja, a doživotno u slučajevima hronične insuficijencije pankreasa	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za poboljšanje rada srca u slučaju hroničnog zastoja srca	Nivo natrijuma mora biti manji od 2,6g/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12%	Psi i mačke	Magnezijum Kalijum Natrijum	Do šest mjeseci	Hrana za životinje stavlja se na tržište kao potpuna krmna smjesa. Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za regulaciju snabdijevanja glukozom ( <i>Diabetes mellitus</i> )	Nizak nivo ugljenohidrata koji brzo otpuštaju glukozu	Psi i mačke	Izvor ugljenohidrata Prema potrebi, postupak prerade ugljenohidrata Skrob Ukupni šećer Fruktoza (ako je dodata) Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate) Izvor kratko- i srednje-lančanih masnih kiselina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za poboljšanje rada jetrenih funkcija u slučaju hronične insuficijencije jetre	Visoko kvalitetni proteini, umjeren nivo proteina, visok nivo esencijalnih masnih kiselina i visok nivo lako svarljivih ugljenohidrata	Psi	Izvor proteina Sadržaj esencijalnih masnih kiselina Lako svarljivi ugljenohidrati, a prema potrebi i način njihove prerade Natrijum Ukupni bakar	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara. U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.”
	Visoko kvalitetni proteini, umjeren nivo proteina, visok nivo esencijalnih masnih kiselina	Mačke	Izvor proteina Sadržaj esencijalnih masnih kiselina Natrijum Ukupni bakar	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara. U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.”
Za regulaciju metabolizma lipida u slučajevima hiperlipidemije	Nizak nivo masti i visok nivo esencijalnih masnih kiselina	Psi i mačke	Sadržaj esencijalnih masnih kiselina Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)	Do dva mjeseca	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za smanjenje nivoa joda u hrani za životinje u slučaju hipertireoze	Ograničen nivo joda: najviše 0,26 mg/kg potpune hrane za kućne ljubimce s djelom vlage od 12 %	Mačke	Ukupni jod	Do tri mjeseca	Hrana za životinje stavlja se na tržište kao potpuna krmna smjesa. Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za smanjenje nivoa bakra u jetri	Ograničen nivo bakra: najviše 8,8 mg/kg potpune hrane za kućne ljubimce sa sadržajem vlage od 12%	Psi	Ukupni bakar	Do šest mjeseci	Hrana za životinje stavlja se na tržište kao potpuna krmna smjesa. Na oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
Za smanjenje prekomjerne tjelesne težine	Nizak nivo energije		Energetska vrijednost	Dok se ne postigne željena tjelesna težina	U uputstvu o korišćenju se mora navodi se odgovarajući dnevni obrok
Za uvođenje uobičajenog	Visoka kaloričnost, visoka koncentracija esencijalnih hranjivih materija i lako svarljivih sastojaka	Psi i mačke	lako svarljivi sastojci i, prema potrebi, način njihove prerade; energetska vrijednost; sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodate).	Do postizanja oporavka	Ako je posebno navedeno da se hrana za životinje daje sandom, na oznaci se navodi: „Davati pod nadzorom veterinara.”
	Dopunska krmna smjesa	Psi	<i>Enterococcus faecium</i> DSM	Deset do 15 dana	Uputstva za upotrebu hrane za životinje

<b>hranjenja i/ili oporavak</b>	može sadržavati <i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.		10663/NCIMB 10415 uključujući dodatu količinu		obezbjeđuje se poštovanje najviše količine stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama za potpunu krmnu smješu. Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara."
<b>Za poboljšanje funkcije kože u slučajevima dermatoze ili prekomjernog gubitka dlake</b>	Visok nivo esencijalnih masnih kiselina	Psi i mačke	Sadržaj esencijalnih masnih kiselina	Do dva mjeseca	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet veterinara."
<b>Za regulaciju metabolizma zglobova u slučaju osteoartritisa</b>	Psi: Najmanji dio suve materije sadržan u ukupnoj količini omega – 3 masnih kiselina 3,3% i eikosapentaenoičnoj kiselini (EPA) 0,38%. Primjeren nivo vitamina E. Mačke: Najmanji dio suve materije sadržane u ukupnoj količini omega – 3 masnim kiselinama 1,2 % i dekosahexaenoičnoj kiselini (DHA) 0,28 %. Povećan nivo metionina i mangana. Odgovarajući nivo vitamina E.	Psi i mačke	Psi: Ukupne omega-3 masne kiseline Ukupna EPA Ukupni vitamin E Mačke: Ukupne omega-3 masne kiseline Ukupna DHA Ukupni metionin Ukupni mangan Ukupni vitamin E	Do tri mjeseca	Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara."
<b>Za smanjenje rizika od pojave mliječne groznice</b>	Nizak nivo kalcijuma	Krave za mužu	Kalcijum Fosfor Magnezijum	Jedna do četiri nedjelje prije teljenja	U uputstvu o korišćenju naznačiti: „Prestati hraniti nakon teljenja."
	i/ili				
	Nizak odnos katjona/anjona		Kalcijum Fosfor Natrijum Kalijum Hloridi Sumpor	Jedna do četiri nedjelje prije teljenja	U uputstvu o korišćenju naznačiti: „Prestati hraniti nakon teljenja."
	ili				
	-.Visok nivo zeolita (sintetički natrijum aluminijum silikat)		Sadržaj sintetičkog natrijum aluminijum silikata	Dvije nedjelje prije teljenja	U uputstvu o korišćenju naznačiti: „Ograničiti količinu hrane za životinje kako bi se garantovao najveći dnevni unos natrijum aluminijum silikata od 500g po životinji". -„Prestati hraniti nakon teljenja."
	ili				
	Visok nivo kalcijuma (u obliku vrlo dostupnih kalcijumovih soli)		Ukupan sadržaj kalcijuma, izvori i pojedinačne količine kalcijuma	Započeti kod prvih znaka teljenja do dva dana nakon teljenja	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Uputstvo za korišćenje, tj. broj davanja i vrijeme prije i nakon teljenja." Tekst „Preporučuje se prije korišćenja zatražiti savjet stručnjaka za ishranu životinja."
<b>Za smanjenje rizika od pojave ketoze</b>	Izvori energije bogati prekursorima glukoze	Krave i ovce za mužu	Sastojci koji služe kao izvori energije bogati prekursorima glukoze Propan-1,2-diol (ako je dodat kao prekursor glukoze) Glicerol (ako je dodat kao prekursor glukoze)	Tri do šest nedjelja nakon teljenja Posljednjih šest nedjelja prije teljenja i prve tri nedjelje poslije jagnjenja	
<b>Za smanjenje rizika od pojave pašne tetanije (hipomagnezije mije)</b>	Visok nivo magnezijuma, lako svarljivi ugljenohidrati, umjeren nivo proteina i nizak nivo kalijuma	Preživari	Skrob Ukupni šećer Magnezijum Natrijum Kalijum	Tri do deset nedjelja tokom perioda brzog rasta trava	U uputstvima o korišćenju dati smjernice o uravnoteženom dnevnom obroku sa posebnom pažnjom na uključivanje vlaknastih sirovina i sirovina sa lako dostupnim izvorima energije. U slučaju hrane za ovce na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za rasplodne ovce u laktaciji".
<b>Za smanjenje rizika od pojave acidoze</b>	Nizak nivo brzo fermentirajućih ugljenohidrata i visoki puferni kapacitet	Preživari	Skrob Ukupni šećer	Najviše dva mjeseca	U uputstvima o korišćenju dati smjernice o uravnoteženom dnevnom obroku sa posebnom pažnjom na uključivanje vlaknastih sirovina i sirovina sa brzo fermentirajućim izvorima ugljenohidrata. -U slučaju hrane za mliječne krave, na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za visoko mliječne krave." U slučaju hrane za tov preživara, na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za intenzivnu ishranu životinja."
<b>Za dugoročno snabijevanje</b>	Visok nivo -.elemenata u tragovima,i/ili -.vitamina, provitamina i hemijski tačno definisanih materija sličnog efekta.	Preživari sa funkcionalnim buragom	nazive i ukupne količine svih dodatih elemenata u tragovima, vitamina, provitamina i hemijski tačno definisanih materija sličnog efekta,	Do 12 mjeseci	primjena u obliku bolusa je dozvoljena. Bolus može da sadrži i do 20% gvožđa u inertnom obliku koji nije bio raspoloživ, da bi se povećala njegova gustina. Na oznaci hrane za životinje navodi se:

<b>pašnih životinja elementima u tragovima i/ili vitaminima</b>	Dopunska krmna smješa može da sadrži dodatke hrani za životinje u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.		dnevnu stopu otpuštanja za svaki element u tragovima i/ili vitamin ako se koristi bolus, najduži period kontinuiranog otpuštanja elementa u tragovima ili vitamina ako se koristi bolus.		„Izbjegavati istovremeno davanje dodataka sa najvišom količinom iz drugih izvora uz one koji su u sastavu bolusa, ako je primjenljivo. Prije upotrebe treba zatražiti savjet veterinara u pogledu: ravnoteže elemenata u tragovima u dnevnom obroku, stanja elemenata u tragovima u stadu. bolus sadržava x% inertnog gvožđa kako bi se povećala njegova gustina, ako je primjenljivo.”
<b>Za nadoknadu za nedostatak gvožđa nakon rođenja</b>	Visok nivo jedinjenja gvožđa odobrenih u skladu sa funkcionalnom grupom „mineralna mješavina” kategorije „nutritivni dodaci” Dopunska krmna smješa može da sadrži gvožđe u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Prasad i telad	Ukupna količina gvožđa	Do tri mjeseca nakon rođenja	Uputstvima za upotrebu hrane za životinje mora se garantovati poštovanje najviših količina gvožđa za potpunu krmnu smješu.
<b>Za poboljšanje obnavljanja kopita, papaka i kože</b>	Visok nivo cinka. Dopunska krmna smješa može da sadrži cink u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Konji, preživari i svinje	Ukupna količina--cinka, metionina.	Do osam nedjelja	Uputstvima za upotrebu hrane za životinje mora se obezbijediti poštovanje najviših količina cinka za potpunu krmnu smješu.
<b>Za poboljšanje pripreme životinje za estrus i razmnožavanje</b>	-visok nivo selena, i -najmanja količina vitamina E po kilogramu potpune krmne smješe sa sadržajem vlage od 12% za svinje iznosi 53mg, za zečeve 35mg, pse, mačke, lasice 88mg, -najmanja količina vitamina E po životinji i danu za ovce iznosi 100mg, za goveda 300mg, za konje 1 100mg, ili -visok nivo vitamina A, -i/ili vitamina D, -i/ili najmanja količina beta-karotina od 300mg po životinji i danu. Dopunska krmna smješa može da sadrži selen, vitamine A i D u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Sisari	Nazivi i ukupne količine za sve dodate elemente u tragovima i vitamine.	Krave: dvije nedjelje prije završetka perioda gestacije sve do potvrde sljedeće gestacije, Krmače: sedam dana prije pa sve do tri dana nakon prašenja i sedam dana prije pa sve do tri dana prije parenja, Ostale ženke sisara: od posljednjeg dijela gestacije do potvrde sljedeće estacije, Mužjaci: tokom razdoblja aktivnosti razmnožavanja	Uputstvima za upotrebu hrane za životinje mora se garantovati poštovanje najviših količina za potpunu krmnu smjesu. Na oznaci hrane za životinje navodi se: „Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane”.
	-visok nivo vitamina A i/ili vitamina D -ili -visok nivo selena i/ili cinka /ili najmanja količina vitamina E od 44mg/kg u potpunoj krmnoj smješi sa sadržajem vlage od 12%. Dopunska krmna smješa može da sadrži selen, cink, vitamine A i D u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Ptice	Nazivi i ukupne količine za sve dodate elemente u tragovima i vitamine.	za ženke: za vrijeme estrusa, za mužjake: tokom perioda aktivnosti razmnožavanja.	
<b>Za očuvanje ravnoteže vode i elektrolita za podršku fiziološkog varenja</b>	Pretežno elektroliti: natrijum, kalijum i hloridi Puferi kapacitet : najmanje 60 mmol po litru napitka pripremljenog za hranjenje Lakosvrljivi ugljenohidrati	Telad, svinje, jagnjad, jarad i ždrebad	Natrijum Kalijum Hloridi Izvor ugljenohidrata Bikarbonati i/ili citrati (ako su dodati)	Jedan do sedam dana	Preporučeni nivo elektrolita po litru napitka pripremljenog za hranjenje: Natrijum: 1,7g – 3,5g Kalijum: 0,4g – 2,0g Hloridi: 1g – 2,8g Na oznaci navodi se: „U slučajevima opasnosti, tokom poremećaja ili tokom oporavka od proлива.” „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.” Navodi se u uputstvu o korišćenju: Preporučen unos pripremljenog miješanog napitka i mlijeka, prema potrebi. U slučaju da je nivo bikarbonata i/ili citrata iznad 40mmol po litru napitka pripremljenog za hranjenje: „Istovremeno hranjenje mlijekom

					treba izbjegavati kod životinja sa sirištem."
<b>Za smanjenje rizika od pojave mokraćnih kamenaca</b>	Nizak nivo fosfora i magnezijuma, svojstvo acidifikacije mokraće	Preživari	Kalcijum Fosfor Natrijum Magnezijum Kalijum Hloridi Sumpor Materije koje acidifikuju mokraću	Do šest nedjelja	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Posebno za intenzivnu ishranu mladih životinja.” U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.”
<b>Za smanjenje reakcije na stres</b>	-Visok nivo magnezijuma i/ili -Lako svarljive sirovine	Svinje	Magnezijum  Lako svarljive sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)	Jedan do sedam dana	Dati uputstva u slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane
<b>Za uspostavljanje fiziološkog varenja</b>	Nizak puferni kapacitet i lako svarljivi sastojci  Lako svarljivi sastojci	Prasad  Svinje	lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade, puferni kapacitet, izvor adstrigenata (ako su dodati), izvor sluzi (ako je dodata).  lako svarljivi sastojci i, prema potrebi, način njihove prerade, izvor adstrigenata (ako su dodati), izvor sluzi (ako je dodata).	Dvije do četiri nedjelje	Na oznaci navodi se: „U slučajevima opasnosti od smetnji varenja, za vrijeme njihovog trajanja ili tokom oporavka od probavnih smetnji.”
	Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi „Stabilizatori crijevne flore” kategorije „Zootehnički dodaci” u skladu sa propisom o aditivima u hrani za životinje (Prilog 1) ili do zaključenja postupka ponovnog izdavanja odobrenja dodaci hrani za životinje koji pripadaju grupi 'Mikroorganizmi'. Dopunska krmna smješa može da sadrži dodatke funkcionalne grupe „Stabilizatori crijevne flore/mikroorganizama” u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Životinjske vrste za koje je odobreno korišćenje stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama	Naziv i dodata količina stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama	Do četiri nedjelje	-Na oznaci hrane za životinje navodi se: „U slučajevima opasnosti od probavnih poremećaja, tokom poremećaja ili tokom oporavka od probavnih poremećaja.” Ako je primjenljivo: „Hrana za životinje sadržava stabilizator crijevne flore/mikroorganizme u koncentraciji više od sto puta većoj od odobrene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.” U uputstvima za upotrebu hrane za životinje obezbjeđuje se poštovanje zakonske najviše količine stabilizatora crijevne flore/mikroorganizama za potpunu krmnu smješu.
<b>Za smanjenje opasnosti od pojave zatvora</b>	Materije koje podstiču pokretljivost crijeva	Krmače	Materije koje podstiču pokretljivost crijeva	Deset do 14 dana prije prašenja i deset do 14 dana nakon prašenja	
<b>Za smanjenje opasnosti od pojave sindroma masne jetre</b>	Nizak nivo energije uz visok udio metaboličke energije iz lipida i visok nivo polinezasićenih masnih kiselina	Koke nosilje	Energetska vrijednost Postotak dijela metaboličke energije iz lipida Sadržaj poli-nezasićenih masnih kiselina	Do 12 nedjelja	
<b>Za uspostavljanje ravnoteže hranljivih materija pri malapsorpciji</b>	Nizak nivo zasićenih masnih kiselina i visok nivo vitamina rastvorljivih u mastima	Živina, osim gusaka i golubova	Dio zasićenih masnih kiselina u ukupnim masnim kiselinama Ukupni vitamin A Ukupni vitamin D Ukupni vitamin E Ukupni vitamin K	Tokom prve dvije nedjelje nakon izlijevanja pilića	
<b>Za uspostavljanje ravnoteže hranljivih materija pri hroničnom smanjenju funkcije tankog crijeva</b>	Ugljeni hidrati, proteini i masti visoke predcekalne svarljivosti	Kopitari	Izvor predcekalno visoko svarljivih ugljenih hidrata, proteina i masti, a prema potrebi i način njihove prerade	Do šest mjeseci	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje i načinu na koji se hrana daje uz napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka. Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
<b>Za uspostavljanje ravnoteže hranljivih materija pri hroničnom smanjenju funkcije debelog crijeva</b>	Lako svarljiva vlakna	Kopitari	Izvor vlakna Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje i načinu na koji se hrana daje. Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
<b>Za smanjenje reakcije na stres</b>	Lako svarljive sirovine	Kopitari	Magnezijum Lako svarljive sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)	Dvije do četiri nedjelje	Dati uputstva u kojim se određenim slučajevima preporučuje korišćenje ove hrane za životinje.
<b>Za nadoknadu</b>	Pretežno elektroliti i lako resorptivni ugljeni hidrati	Kopitari	Kalcijum Natrijum Magnezijum	Jedan do tri dana	Dati uputstva o određenim slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje.



<b>elektrolita u slučaju njihovog gubitka znojenjem</b>			Kalijum Hloridi Glukoza		Kada ova hrana za životinje čini značajan dio dnevnog obroka, dati uputstva sa ciljem sprječavanja rizika zbog nagle promjene osobina hrane za životinje. U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.”
<b>Za sportske napore i oporavak od njih</b>	Visok nivo seleni i najmanja količina od 50mg vitamina E po kilogramu potpune krmne smješe sa sadržajem vlage od 12%. Dopunska krmna smješa može da sadrži jedinjenja seleni u koncentraciji koja je više od sto puta veća od odgovarajuće utvrđene najviše količine u potpunoj krmnoj smješi.	Kopitari:	Ukupna količina vitamina E, seleni.	Do osam nedjelja prije sportskog napora – do četiri nedjelje nakon sportskog napora	Uputstvom za upotrebu hrane za životinje moraju se poštovati najviše određene količine seleni za potpunu krmnu smješu.
<b>Za uvođenje uobičajene ishrane ili oporavak</b>	Visok nivo esencijalnih i lako svarljivih hranljivih materija	Kopitari	Lako svarljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodate)	Do postizanja oporavka	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane. Ako se hrana daje sandom, na pakovanju, oznaci navodi se: „Davati pod nadzorom veterinara.”
<b>Za podršku jetrenim funkcijama u slučaju hronične insuficijencije jetre</b>	Nizak nivo proteina koji moraju biti visokog kvaliteta i visoko svarljivi ugljeni hidrati	Kopitari	Izvor proteina i vlakana Visoko svarljivi ugljeni hidrati, a prema potrebi i način njihove prerade Metionin Holin Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)	Do šest mjeseci	Dati uputstva o slučajevima kada se preporučuje korišćenje ove hrane za životinje i o načinu na koji se hrana daje uz napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka. Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.”
<b>Za poboljšanje rada bubrega u slučaju hronične bubrežne insuficijencije</b>	Nizak nivo fosfori i nizak nivo proteina visokog kvaliteta	Kopitari	Izvor proteina Kalcijum Fosfor Kalijum Magnezijum Natrijum	Do šest mjeseci	Na pakovanju, posudi ili oznaci navodi se: „Preporučuje se prije korišćenja ili produženja korišćenja zatražiti savjet veterinara.” U uputstvu o korišćenju navodi se: „Voda mora biti stalno dostupna.”

Radi ostvarivanja nutritivne potrebe hrane za životinje, može da se koristi jedno ili oba osnovna nutritivna svojstva označena sa “i/ili, a za svako nutritivno svojstvo na oznaci se navodi odgovarajuća nutritivna potreba.

Dodaci hrani za životinje koji se dodaju hrani za životinje za posebne nutritivne potrebe, moraju da ispunjavaju zahtjeve utvrđene posebnim propisom i navode se na oznaci.

Na oznaci hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe navodi se porijeklo hrane ili porijeklo sastojaka u hrani, kao i informacije na osnovu kojih je moguće utvrditi usaglašenost hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe sa odgovarajućim osnovnim nutritivnim svojstvima (tačan naziv, naziv/vrstu sastojka i/ili sastojaka, vrstu životinja ili dijela tijela životinja).

Na oznaci hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe navodi se supstanca koja je prisutna u izvornom obliku koju sadrži ta hrana, a koja istovremeno predstavlja i dodatak hrani za životinje riječju „ukupno” i to: količina izvorno prisutne supstance bez dodataka i/ili količina sa dodacima u skladu sa propisanim odstupanjima.

Kada hrana za životinje za posebne nutritivne potrebe sadrži sastojak ili dodatak hrani za životinje u povećanoj količini, radi obezbjeđivanja posebne nutritivne potrebe, na oznaci se navode informacija o količini povećanih sastojaka ili dodataka: „ako je dodato”.

Na oznaci hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe navodi se i preporučeni period korišćenja u kojem se očekuje postizanje nutritivnih potreba.

Za dopunske krmne smješe za posebne nutritivne potrebe, na oznaci se navodi uputstvo za upotrebu sa uputstvom za pripremu uravnoteženog dnevnog obroka

Ukoliko se hrana za životinje za posebne nutritivne potrebe stavlja na tržište u obliku bolusa, koja je hranivo ili dopunska krmna smješa i koja je namijenjena za pojedinačno oralno davanje prisilnim hranjenjem životinja, na oznaci se navodi najduži period kontinuiranog otpuštanja bolusa i dnevne stope otpuštanja za svaki dodatak i najviša količina dodatka po kilogramu potpune krmne smješe, tokom cijelog perioda hranjenja (učinak sporog otpuštanja) i dnevni nivo otpuštanja dodatka u probavnom traktu koji se ne smije premašiti.