

На основу члана 57. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси

**ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О КВАЛИТЕТУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ**
- Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 113/12 -

Члан 1.

У Правилнику о квалитету хране за животиње („Службени гласник РС”, број 4/10), у члану 89. Табела 45 - Кокцидиостатици мења се и гласи:

„Табела 45

Кокцидиостатици

Е број	Име и рег. бр.	Додатак традиционално име	Композиција, хемијска формула и опис	Врста и категорија животиње	Употребљиво старост животиње до	mg активне супстанце по kg смеше		Остали услови	Максималан остатак резидуа у релевантним намерницама животињског порекла
						мин. садржај	мак. садржај		
Е 758	Pfizer Ltd	Robenidin hydrochloride 66 g/kg (Cycostat 66G)	Састав додатка: Robenidin hidrohlorid 66 g/kg Lignosulfonat: 40 g/kg Kalcijum sulfonat dihidrat: 894 g/kg Robenidin hidrohlorid C ₁₅ H ₁₃ C ₁₂ N ₅ HCL	Зечеви за одгој	-	50	66	Забрањена употреба пет дана пре клања	
Е 758	Pfizer Ltd	Robenidin hydrochloride 66 g/kg (Cycostat 66G)	Састав додатка: Robenidin hidrohlorid 66 g/kg Lignosulfonat: 40 g/kg Kalcijum sulfonat dihidrat: 894 g/kg Robenidin hidrohlorid C ₁₅ H ₁₃ C ₁₂ N ₅ HCL	Пилићи за тов	-	30	36	Забрањена употреба пет дана пре клања	
				Ђурке	-	30	36		
Е 763	Pfizer Ltd	Lasalocid A sodium 15 g/100g Avatec 15%cc	Састав додатка: Lasalocid A natrijum 15 g/100g Активна супстанца: C ₃₄ H ₅₃ O ₈ Na	Ђурке	12 недеља	90	125	Забрањена употреба пет дана пре клања. Овај додатак садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци може бити контраиндикована	

E 764	Intervet International bv	Halofuginone hydrobromide 6 g/kg Stenorol	Састав додатка: Halofuginon hidrohlorid 6 g/kg Активна супстанца: $C_{16}H_{12}BrClN_3O_3NB$ r	Пилићи одгојени за носиље	16 недеља	2	3	-	
E 766	Intervet International bv	Salinomycin sodium 120 g/kg Sacoх 120 Микрогранулисан	Састав додатка: Salinomycin natrijum 120 g/kg Активна супстанца: $C_{42}H_{69}O_{11}Na$	Пилићи за тов	-	60	70	Забрањена употреба пет дана пре клања. Назначено у упутству за употребу: Опасно за коње и ћурке. Овај додатак садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована	
E 766	Intervet International bv	Salinomycin sodium 120 g/kg Sacoх 120	Састав додатка: Salinomycin natrijum 120 g/kg Активна супстанца: $C_{42}H_{69}O_{11}Na$	Зечеви за тов	-	20	25	Забрањена употреба пет дана пре клања. Назначено у упутству за употребу: Опасно за коње. Овај додатак садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована.	
	Pfizer Ltd	Salinomycin sodium 120 g/kg (Salinomax 120G)	Састав додатка: Salinomycin natrijum 120 g/kg Kalcium lignosulfonat: 40/g/kg Kalcijum sulfat dehidrat до 1000 g/kg Састав додатка: Salinomycin natrijum, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$ Natrijumova so polietil monougljenična kiselina proizvedena fermentacijom <i>Streptomyces albus</i> (ATCC 21838/US 9401-06), CAS No: 35 721-31-8 nečistoća: < 42 mg elaiofilin/kg	Пилићи за тов	-	60	70	Забрањена употреба пет дана пре клања. Назнака код упутства за употребу: „Опасно за коње и ћурке”; Овај додатак садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (тиамулин) може бити контраиндикован	

			salinomicin natrijum. < 42 mg 17-epi-20 dezoksisalinomicin/kg salinomicin natrijum						
E 766	KRKA,d.d.N.Mesto, Slovenia	Salinomycin sodium (Kokcisan 120 G)	Састав додатка: Salinomicin natrijum 120 g/kg Kalcijum karbonat do 1000g/kg Сахароза: 80-100 г/кг Кукурузни скроб: 20г/кг Активне супстанце: $C_{42}H_{69}O_{11}Na$ CAS број:55721-31-8, Natrijumova so polietil monougljенична kiselina proizvedena fermentacijom <i>Streptomyces albus</i> (CBS 101071) Нечистоћа < 42 mg 17-epi-20 dezoksisalinomicin/kg salinomicin natrijum.	Пилићи за тов		60	70	Забрањена употреба три дана пре клања. Назначено у упутству за употребу: Опасно за коње и ћурке. Овај додаток садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована	5µg Salinomicyn natrijuma/kg Свих свежих ткива
E 770	Pfizer Ltd	Maduramicin ammonium alpha 1g/100g Cygro 1%	Састав додатка: Maduramicin amonium alfa 1g/100g Активна супстанца: $C_{47}H_{83}O_{17}N$	Пилићи за тов	-	5	5	Забрањена употреба пет дана пре клања. Назначено у упутству за употребу: Опасно за коње. Овај додаток садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована	
				Ћурке	16 недеља	5	5	Забрањена употреба пет дана пре клања. Назначено у упутству за употребу: Опасно за коње. Овај додаток садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих	

								супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована	
E 771	Jenssen Pharmaceutica N.V.	Diclazuril 0,5 g/100 g Clinacox 0,5% premix Diclazuril 0,2g/100g Clinacox 0,2% premix	Састав додатка: Diklazuril 0,5g/100 g Активна супстанца: C ₁₇ H ₉ C ₁₃ N ₄ O ₂	Пилићи за тов	-	1	1	Додатак треба да се инкорпорира у потпуну смешу у облику витаминско минералне предсмеше. Дилазурил не сме да се меша са другим кокцидиостатицима За безбедност: заштитити дисајне органе, наочаре и рукавице треба да се употребе током руковања. Програм мониторинга на бактерије и Eimeria spp. Планира се и извршава од стране носиоца дозволе	1500 µg Diclazuril-a /kg Свеже јетре 1500 µg Diclazuril-a /kg Свежих бубрега 500 µg Diclazuril-a /kg Свежег мишићног ткива 500 µg Diclazuril-a /kg Свеже коже/масноће
				Ђурке за тов	12 недеља	1	1		
				Пилићи одгојени за носиље	16 недеља	1	1	-	
E 772	Eli Lilly Company	Narasin 80 g/kg Nikarbazin 80 g/kg Maxiban G160	Састав д: Narazin 80 g/kg Nikarbazin 80 g/kg Активна супстанца: Narazin C ₄₃ H ₇₂ O ₁₁ Nikarbazin C ₁₉ H ₁₈ N ₆ O ₆	Пилићи за тов	-	80	100	Забрањена употреба пет дана пре клања. Назначено у упуству за употребу: Опасно за коње. Овај додатак садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована	
E 756	Pfizer Ltd	Decoquinat e - 60,6 g/kg (Deccox)	Састав додатка: Dekokvinat: 60,6 g/kg Активна супстанца: Dekokvinat C ₂₄ H ₃₅ NO ₅	Пилићи за тов		20	40	Забрањена употреба три дана пре клања	

E 757	Eli Lilly and Company Limited	Monensin sodium (Elancoban G100 - Elancoban 100 - Elancogran 100 - Elancoban G200 - Elancoban 200)	Састав додатка: C ₃₆ H ₆₁ O ₁₁ Na Monensin A: не мање од 90 % Monenzin: A+ B: не мање од 95 %	Пилићи за тов	-	100	125	Забрањена употреба три дана пре клања. Назначено у упуству за употребу: Опасно за коње. Овај додаток садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована
				Пилићи одгојени за носиље	16 недеља	100	120	
				Ћурке за тов	16 недеља	60	100	
E 1701	Huvepharma NV Belgium	Monensin sodium (Coxidin)	Састав а додатка: C ₃₆ H ₆₁ O ₁₁ Na Monenzin A: не мање од 90 % Monenzin: A + B: не мање од 95 % Monenzin C 0,2-0,3 % Monenzin natrijum техничка супстанца еквивалентна активности monenzina: 25 %	Пилићи за тов	-	100	125	1. Забрањена употреба три дана пре клања. 2. Кокцидиостатик треба да се убаци у храну у виду премикса. 3. Максимална дозвољена доза монензин натријума у допунским смешама-625 мг/кг за товне пилиће; - 500 мг/кг за ћурке. 4. Монензин натријум не сме да се меша са другим кокцидиостатацима 5. Назначено у упуству за употребу: Опасно за коње. Овај додаток садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована. 6. Носити заштитно одело, рукавице и заштити очи и лице. У случају недовољне вентилације у објекту обезбедити респираторну опрему
				Ћурке за тов	16 недеља	90	100	
E 765	Eli Lilly and Company Limited	Narasin 100 g/kg Monteban G 100	Састав додатка: Narazin: 100 g активности /kg	Пилићи за тов	-	60	70	Забрањена употреба пет дана пре клања. Назнака у инструкцији за употребу: Опасно за коње, ћурке и зечева.

								Овај додатак садржи извесне јонофоре: истовремена употреба сличних лековитих супстанци (tiamulin) може бити контраиндикована	
E 773	Phibro Animal Health, srl	Semduramicin sodium (Aviax 5 %)	Састав додатка: Semduramicin натријум: 51,3 g/kg	Пилићи за тов	-	20	25	Забрањена употреба пет дана пре клања.”	

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-245/2009-09
У Београду, 26. новембра 2012. године

МИНИСТАР

Горан Кнежевић