

٣ - بناء على النتائج المخبرية والحقلية المعتمدة رسمياً تقوم الإدارة المركزية للمشروع بالإعلان عن ثبوت المرض واتخاذ الإجراءات الرقابية والعلاجية اللازمة .

مادة ٤- بعد ثبوت الإصابة في المنحل تتخذ الإجراءات التالية :

١ - اتلاف الطوائف المصابة (نحل + اطارات حضنه + اطارات عسل) وفق الانظمة النافذة .
٢ - تعقيم بقية أجزاء الخلية باستخدام محلول الفورمالين تركيز ١٠٪ بعد ازاله البقايا الشمعية والبروبوليس .

٣ - معالجه بقية طوائف المنحل التي لم تظهر فيها الإصابة حقلية ومخبرياً للوقايه من المرض بتعديتها بالمحاليل السكرية مضافا اليها المضاد الحيوي أو كسبي تتراسكلين أو أي مادة أخرى تعتمد من قبل ادارة المشروع المركزية .

٤ - حظر نقل الطوائف المصابة الى المراعي المتلفه والتزام صاحب المنحل بذلك حتى ثبوت خلو الطوائف من المرض حقلية ومخبرياً .

٥ - يمنع استخدام العسل الناتج عن الطوائف المصابة في تغذية الطوائف الاخرى وتصنيع الكاندي السكري أو البروتيني .

٦ - يمنع نقل الادوات والتجهيزات من المنحل المصاب الى المناحل الاخرى .

٧ - يمنع استخدام البسه المرابي خارج منطه المصاب ويلتزم بتطهيرها بعد كل كشف على الطوائف باستخدام محلول الفورمالين تركيز ١٠٪

مادة ٥ - تقع مسؤوليه تنفيذ الاجراءات الواردة في هذا القرار على عاتق الفنيين المشرفين على المناحل وعلى دوائر مشروع تربيته النحل في مديريات الزراعه والاصلاح الزراعي والمصالح التابعه لها في المحافظات وذلك بتقديم المساعدة الفنيه والاشراف على التنفيذ والاعلام عن كل مخالفه .

مادة ٦ - تقوم ادارة المشروع بالاعلان عن خلو المنحل من المرض بعد مضي مدة الحضانه والمقدرة به٥ يوماً

قرار رقم ٤٧/ت

بموجب القرار رقم ٤٧/ت تاريخ ٢٠-٥-٢٠٠٣

١ - تعتمد اجراءات التاليه للتشخيص والوقايه ومكافحة مرض تعفن الحضنه الامريكي عند النحل

مادة ٢ - مرض تعفن الحضنه الامريكي مرض معدي وبائي يصيب طوائف النحل تسببه جراثيم عضوية الشكل (*Paenibacillus Larvae*) (عصيات لارفي) حيث تؤثر على يرقات افراد طائفه النحل - عاملات ذكور - ملكات اعتباراً من اليوم الاول لعمر اليرقه وتؤدي الى موت جميع اليرقات بعد عسله التغطيه في العيون السداسيه وبديه تحول اليرقات الى عذراوات حيث تتحول اليرقات في النهايه الى الشكل اللزج ومن ثم على شكل قشور نلتشق بجوانب اليون السداسية .

٢ - التشخيص المخبري : يتم في المخابر المعتمدة رسمياً وفق التعليقات الواردة في دليل الامراض .

١ - التشخيص الحقلية يعتمد على ظهور رائحة ضمن الخلية نتيجة تحلل اليرقات تشبه رائحه الغراء الفاسد مترافقه مع تقعر أغطيه العيون السداسية للحضنه ووجود ثقبوب فيها واختلاف في الواهسا اضافه الى تحول لون اليرقات من اللون الابيض الى اللون البني وتغير قوامها الى القوام اللزج .

مضافا لها فترة التشبيه اذا دخلت مدة الحضانة ضمن الفترة المذكورة وذلك بعد ظهور اخر نتيجته مخبريه سلبيه مترافقه مع زوال الاعراض السريرية للمرض •
ماد ٧- يطبق بحق كل من يخالف احكام هذا القرار
الحيوانيه •