

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	
НАКАЗ	
02.02.2016 № 55	
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 р. за № 207/28337

Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я

[№ 282 від 30.03.2016](#)

[№ 1042 від 05.10.2016](#)

[№ 268 від 13.03.2017](#)

[№ 612 від 07.06.2017](#)

[№ 240 від 13.02.2018](#)

[№ 1363 від 20.07.2018](#)

[№ 1413 від 19.06.2019](#)

[№ 2443 від 11.12.2019](#)

[№ 1276 від 28.05.2020](#)

[№ 960 від 18.05.2021](#)

[№ 961 від 18.05.2021](#)

[№ 2850 від 22.12.2021](#)

[№ 543 від 29.03.2022](#)}

На виконання [статті 16⁵](#) Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та [підпункту 12](#) пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити [Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів](#), що додаються.

2. Департаменту громадського здоров'я (Осташко С.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

Міністр	О. Квіташвілі
ПОГОДЖЕНО:	
Т.в.о. Голови	

Державної санітарно-епідеміологічної служби України	С. Протас
Перший віце-президент Національної академії медичних наук України, академік НАН і НАМН України, член-кореспондент РАМН	Ю.І. Кундієв
Міністр аграрної політики та продовольства України	О.М. Павленко

	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 02.02.2016 № 55 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року № 1276)
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 р. за № 207/28337

ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ І РЕГЛАМЕНТИ **безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів**

{Гігієнічні нормативи і регламенти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я [№ 282 від 30.03.2016](#); із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я [№ 1042 від 05.10.2016](#); в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я [№ 268 від 13.03.2017](#)}

{Зміни до Гігієнічних нормативів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я [№ 612 від 07.06.2017](#)}

{Гігієнічні нормативи і регламенти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я [№ 240 від 13.02.2018](#)}

{Зміни до Гігієнічних нормативів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я [№ 1363 від 20.07.2018](#)}

{Гігієнічні нормативи і регламенти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я [№ 1413 від 19.06.2019](#)}

{Зміни до Гігієнічних нормативів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я [№ 2443 від 11.12.2019](#)}

{Гігієнічні нормативи і регламенти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я [№ 1276 від 28.05.2020](#)}

{Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я [№ 961 від 18.05.2021](#)}

{Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я [№ 960 від 18.05.2021](#)}

{Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я [№ 2850 від 22.12.2021](#)}

{Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я [№ 543 від 29.03.2022](#)}

Директор департаменту громадського здоров'я	С. Осташко
--	------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України
02 лютого 2016 року № 55
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 28 травня 2020 року № 1276)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2016 р.
за № 207/28337

ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ І РЕГЛАМЕНТИ безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Таблиця 1

№ з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень у продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично допустима концентрація/орієнтовно безпечний рівень впливу в повітрі робочої зони, мг/м³	Гранично допустима концентрація/орієнтовно безпечний рівень впливу в атмосферному повітрі, мг/м³	Гранично допустима концентрація/орієнтовно допустимий рівень у воді, мг/дм³	Гранично допустима концентрація/орієнтовно допустимий рівень у ґрунті, мг/кг	Регламенти безпечного застосування			Клас небезпечності	
				культура	максимально допустимий рівень					строки, дні				
										очікування до збору врожаю	виходу на оброблені ділянки			
											ручні роботи	механізовані роботи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	AG- P1- 625, ME			Контроль за пропаксіафоном та імізаціпром										
		пропаксіафоп, 25 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа визначення методом газорідної хроматографії)	/1,0	/0,0003	0,001/ загально-санітарний (далі-заг-сан.)	0,15	не потребує (далі-не погр.)	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)	

					(далі- межа визн. ГРХ)- 0,2)								
		імазетапір ,37,5 г/л	1,0		0,1* (межа визначен ня методом високого ефективн ої рідинної хроматог рафії (далі- межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,5	/0,04	0,006/ заг.-сан.	0,03/ водно- міграцій ний (далі- водн.- мігр.)				
		пропахіза фоп,25 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/1,0	/0,0003	0,001/ заг.-сан.	0,15	-	-	-	
		імазетапір ,37,5 г/л	1,0		не погр.*	/0,5	/0,04	0,006/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
		пропахіза фоп,25 г/л +	0,003	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,0003	0,001/ заг.-сан.	0,15	не погр.	не погр.	3	
		імазетапір ,37,5 г/л	1,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,3)	/0,5	/0,04	0,006/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
		пропахіза фоп,25 г/л +	0,003	соє (олія)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/1,0	/0,0003	0,001/ заг.-сан.	0,15	-	-	-	
		імазетапір ,37,5 г/л	1,0		не погр.*	/0,5	/0,04	0,006/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
2	ARY- 0930-01, КС	мезотріон ,480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ санітарн о- токсикол огічний (далі- сан- токс.)	/0,4	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
3	ARY- 0938- 001,КС (МІП- 753, КС)	пентіопір ад, 200 г/л	0,1	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,5	/0,01	0,003/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					-	-	-	

				соєви́шник (на́сіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	не попр.	3	
				соєви́шник (о́лія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					-	-	-	
				со́я (зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	не попр.	3	
				со́я (о́лія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					-	-	-	
				тома́ти	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14	7	3	
				тома́тний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				виногра́д	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	
				виногра́дний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				яблу́ка	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
4	СМГ- СТАР			<i>Контроль за тербутилазином та S-метолахлором</i>									
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не попр.	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (о́лія)	не попр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		не попр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				

		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
5	Абакус Плюс, КЕ	флуксапі роксад, 30 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруні)
		пропікон азол, 125 г/л +	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ органоле пичний (далі- орг.)	/0,2				
		піраклост робін, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
6	Аболір, РГ	гліфосату амонійна сіль, 757 г/кг (в кислотну му еквівален ті -687 г/кг)	0,01	обробка землі під пар, землі несільсько- господарсь кого призначенн я, осіння та весняна обробка сільськогос подарських угідь	не погр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансло ка- ційний (далі- трансл.)	не погр. (гербици д)	7 (герби цид)	3 (гербиц ид)	3
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)					14 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				ріпак (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,4)					14 (дасика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
7	Абсол ют, КС	карбендаз им, 500 г/л	0,01	соя (зерно)	0,2** (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не погр.	4	3 (високо стійкий у воді)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
8	Авенор WG, ВГ	сульфосу льфурон, 750 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,005* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/1,5	/0,001	0,02/ сан.-токс.	0,03/ водн.- мігр.	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
9				Контроль за прaxлоразом									

	Авіцен на, СЕ	тебуконаз ол, 50 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та пруні)
		прохлора з, 250 г/л +	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3				
		крезокс м-метил, 50 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1				
1 0	Аврора WG, ВГ	карфентр авон-етил, 400 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,01/ заг.-сан. (межа визн. ГРХ- 0,002)	/0,6	не погр.	не погр.	3	3
1 1	Агрен, СЕ	Контроль за 2,4-Д											
		2,4-Д2- етил- гексил-ов ий ефір, 452 г/л +	0,0001	просо	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	1,0'	/0,0003	0,002/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		2,4-Д2- етил- гексил-ов ий ефір, 452 г/л +	0,0001	сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	1,0'	/0,0003	0,002/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
1 2	Агрен Форте, РК	2-метил- 4- хлорфено кси- оцтова кислота у формі диметил- аміної солі, 750 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ГРХ- 0,05)	1,0/ небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,02	0,003/ орг.	/0,02	не погр.	не погр.	3	2
				горох (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	3	
				льон (насіння)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				льон(олія)	не погр.					-	-	-	
1 3	Агрі Супер (Agri Super), КЕ	хізалофоп- т- етил, 50 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	2
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 4	Агріку р, РК	пропамок арб	0,02	томати	0,05* (межа	/0,7	/0,007	0,08/ сан.-токс.	/0,1	35	7	3	2

		гідрохлорид, 722 г/л			визн. ВЕРХ-0,025)								
				томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					-	-	-	
				огірки	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)					35	7	3	
1 5	Агріпер Супер 500, РК	2-метил-4-хлорфенокси- оцтова кислота у формі диметил-аміної солі калію, натрію, в кислотному еквіваленті, 500 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ГРХ-0,05)	1,0/ небезпечний при потрап- лянні на шкіру	/0,02	0,003/ орг.	/0,02	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				просо	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	3	
				горох (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	3	
1 6	Агрітус (Agritus), ВГ	римсульфурон, 250 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	3	2
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 7	Агріфос, БГ			Контроль за фосфіном									
		фосфід алюмінію, 560 г/кг		зерно хлібних злаків	0,1* (межа визначення індикаторними трубками Дрегера (далі - межа визн. інд. труб. Дрегера) - 0,007)	0,1/	0,01 - максим альна разова; 0,001 - середнь о-добова/	0,005/ сан.-токс.	/0,4	20 ≤МДР	5<Г ДК	5<ГД К	1
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007)					20 ≤МДР	5<Г ДК	5<ГД К	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007)					20 ≤МДР	5<Г ДК	5<ГД К	
				арахіс, какао (боби), горіхи,	0,05* (межа визн. інд. труб.					20 ≤МДР	5<Г ДК	5<ГД К	

				цукор, спеції, сухі овочі, сухі фрукти, тютюн, чай	Дрегер- 0,007)								
				складські приміщенн я, трюми, вагони, контейнери						-	5<Г ДК	5<ГД К	
1 8	Агрозахист, КС	імдаклоп рид, 500 г/л	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)
1 9	Агрозахист, КС	карбендаз им, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
2 0	Агрохімік, КЕ	хізалофоп- т- етил, 90 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	7	3	3 (небезп ечний при попаданні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
2 1	Агроуні версал, ТН	прохлора з, 60 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	Контроль за прохлоразом та тебуконазол					не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		тебуконаз ол, 15 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3				
2 2	Адвака т, КС	метрибуз ин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мігр.	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у пруді)
				соя (олія)	не погр.*								
2 3	Азимут Класик, КЕ	тебуконаз ол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при попаданні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
2 4	Азимут , КЕ	Контроль за тебуконазолом та триходимефеном											
		тебуконаз ол, 250 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)

		триадиме фон, 100 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/ небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,03/ трансл.				та грунт)	
2 5	Азоксип н, КС	азоксистр обін, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-		
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	не погр.	3		
2 6	Азоцип ер Нео, КС	Контроль за азоксистробіном та ципроконазолом												2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі та грунт)
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3		
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01					
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-		
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01					
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3		
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01					
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3		
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01					
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-		
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01					
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн.)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3		

					ВЕРХ-0,2)								
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соя(олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак(олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01				
27	Айдахо, КС	тербутила зин, 500 г/л	0,003	соєвишник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий увод)
		соєвишник (олія)	не погр.*	-	-					-			
		кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	не погр.	не погр.					3			
		кукурудза (олія)	не погр.*	-	-					-			
28	Аканто Плюс 28, КС			Контроль за пілоксистробином та ципроконазолом									
		пілоксистр обін, 200 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,003/ заг.-сан.	/0,2	30	не погр.	3	2 (високо стійкий увод)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)								
		пілоксистр обін, 200 г/л +	0,01	нут	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,003/ заг.-сан.	/0,2	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)								
		пілоксистр обін, 200 г/л +	0,01	люпин	не погр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.-сан.	/0,2	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.								
29	Аконіт БТ, КС	флутуриадол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн.)	/0,1	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не погр.	3	3 (високо стійкий)

					ГРХ-0,05)	при потрап- лянні на шкіру							уводі та прупі)
				яблука	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					30	7	3	
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					-	-	-	
30	Акррам айг 480, КС	біфензат, 480 г/л	0,01	огірки	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,02	0,015/ заг.-сан.	/0,6	20	7	3	2 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високос- тійкий уводі)
				соя (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не попр.	3	
				соя (олія)	не попр.					-	-	-	
31	Акріс, СЕ (BAS 65701 Н)			Контроль за диметеномідом-П та тербутилизином									
		диметена мід-П, 280 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	не попр.	не попр.	3	3 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, алерген, високос- тійкий уводі)
		тербутила зин, 250 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)								
		диметена мід-П, 280 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		тербутила зин, 250 г/л	0,003		не попр.*								
		диметена мід-П, 280 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	не попр.	не попр.	3	
		тербутила зин, 250 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)								
		диметена мід-П, 280 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		тербутила зин, 250 г/л	0,003		не попр.*								
32	Аксакал, ВГ	флорасулам, 250 г/кг	0,05	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фототокс.	не попр.	не попр.	3	2
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн.)					не попр.	не попр.	3	

					ВЕРХ-0,1)								
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
33	Аксіал 050 ЕС, КЕ	піноксаден, 50 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	не погр.	3	2
34	Аксіал Кросс 050 ЕС, КЕ	піноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л	0,005 0,05	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1) 0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0 /1,0	/0,01 /0,003	0,01/ сан.-токс., заг.-сан. 0,1/ сан.-токс.	/0,3 0,05/ фітотокс.	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру)
35	Актаро фіт, КЕ	аверсектин С, 0,2%	0,08	огірки закритого ґрунту	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,4	не нормується	не нормується	не нормується	2	2	2	3
36	Актеллік 500 ЕС, КЕ	пріміфіос-метил, 500 г/л	0,01	соя ¹ (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	2,0	/0,001	0,01/ орг.	0,5/ трансл.	30	7	3	3
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
37	Аліата н 105, МД	нікосульфурон, 30 г/л + мезотріон, 75 г/л	2,0 0,001	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01) 0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0 /0,2	/0,01 /0,006	0,001/ заг.-сан. 0,02/ сан.-токс.	/0,2 /0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високоспійкий у воді)
		нікосульфурон, 30 г/л + мезотріон, 75 г/л	2,0 0,001	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0 /0,2	/0,01 /0,006	0,001/ заг.-сан. 0,02/ сан.-токс.	/0,2 /0,4	- -	- -	- -	
38	Альбат 80 WP, ЗП	фосетилалюмінію, 800 г/кг	2	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)	2,0	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	30	не погр.	3	2
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,5)					40	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
39	Альтекс, КЕ	альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005	яблука ²	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	25	10	4	3 (небезпечний при потрап

				яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	лянні на шкіру				-	-	-	лянні на шкіру та слизові оболонки очей)	
				капуста ²	0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)					30	10	4		
4 0	Альтерно, КЕ			Контроль за метконазолом та піраклолпробіном										
		метконазол, 80 г/л +	0,001	горох (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мікр.	30	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високотійкий у воді та ґрунті)	
		піраклолпробін, 130 г/л	0,03		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6					
4 1	Альто 240 ЕС, КЕ	ципрокон азол, 240 г/л	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01	30	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей)	
				буряки цукрові	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)					30	7	3		
4 2	Амір SE, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилловим ефіром		Контроль за 2,4-Д						
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високотійкий у воді)	
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)			0,1/ сан.-токс.	0,05/ фототокс.					
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3		
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)			0,1/ сан.-токс.	0,05/ фототокс.					
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-		

		452,42 г/л +											
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		не погр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		2,4-Д2- етил- гексил- ий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл	не погр.	не погр.	3	
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		2,4-Д2- етил- гексил- ий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	просо	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл	не погр.	не погр.	3	
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
4 3	Аміста рГолд 250SC, КС	Контроль за азоксистробіном та дифеноконазолом											
		азоксистр обін, 250 г/л +	0,03	соняшник ¹ (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі та грунті)
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		азоксистр обін, 250 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		азоксистр обін, 250 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		азоксистр обін, 125 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
				азоксистр обін, 125	0,03	соя (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-

		г/л +											
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
4 4	Аміста р Екстра Голд 280 ОД, МД	азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків ¹	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
4 5	Аміста р Екстра, 280SC, КС	азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	2
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	непогр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002			/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
4 6	Ампіліг о 150 ZC, ФК	хлорантр анілі- прол, 100 г/л +	0,02	соєвишник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	7	3	2 (високо стійкий уводі та пруні)
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		хлорантр анілі- прол, 100 г/л +	0,02	соєвишник (олія)	непогр.*	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		хлорантр анілі-	0,02	томати	0,1* (межа	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	20	7	3	

		прод, 100 г/л +			визн. ВЕРХ- 0,05)							
		лвмбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе- чний при попапа- нннн на шкнру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05			
		хлоранпр аннлн- прод, 100 г/л +	0,02	томапний ск	не попр.*	/1,5	0,015	0,001/ заг.-сан.	0,1	-	-	-
		лвмбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,1 небезпе- чний при попапа- нннн на шкнру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05			
		хлоранпр аннлн- прод, 100 г/л +	0,02	томапн ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	0,015	0,001/ заг.-сан.	0,1	20	7	3
		лвмбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе- чний при попапа- нннн на шкнру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05			
		хлоранпр аннлн- прод, 100 г/л +	0,02	томапний ск	не попр.*	/1,5	0,015	0,001/ заг.-сан.	0,1	-	-	-
		лвмбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,1 небезпе- чний при попапа- нннн на шкнру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05			
		хлоранпр аннлн- прод, 100 г/л +	0,02	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	0,015	0,001/ заг.-сан.	0,1	30	7	3
		лвмбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе- чний при попапа- нннн на шкнру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05			
		хлоранпр аннлн- прод, 100 г/л +	0,02	яблучний ск	не попр.*	/1,5	0,015	0,001/ заг.-сан.	0,1	-	-	-

	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	хлорантраїлі-прол, 100 г/л +	0,02	яблука ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,15	0,015	0,001/заг.-сан.	0,1	30	7	3	
	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	хлорантраїлі-прол, 100 г/л +	0,02	яблучний сік	непогр.*	0,15	0,015	0,001/заг.-сан.	0,1	-	-	-	
	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	хлорантраїлі-прол, 100 г/л +	0,02	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,15	0,015	0,001/заг.-сан.	0,1	20	7	3	
	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	хлорантраїлі-прол, 100 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,15	0,015	0,001/заг.-сан.	0,1	30	7	3	
	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	хлорантраїлі-прол, 100 г/л +	0,02	соя (олія)	непогр.*	0,15	0,015	0,001/заг.-сан.	0,1	-	-	-	
	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,1 небезпечний	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				

					ГРХ-0,02)	при потрап лянні на шкіру							
		хлорант анілі- прол, 100 г/л +	0,02	картопля ²	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	20	7	3	
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		хлорант анілі- прол, 100 г/л +	0,02	кукурудза ¹ (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	7	3	
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		хлорант анілі- прол, 100 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
4 7	Анзор, КС			Контроль за азоксистербіном та тебуконазолем									
		азоксис- тр обін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	3 (небезп- ечний при попап- лянні на слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді)
		тебукона- зол, 200 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксис- тр обін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебукона- зол, 200 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксис- тр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		тебукона- зол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

					визн. ГРХ- 0,07)								
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
4 8	Антик ліщ Макс, КЕ	<i>Контроль за піриміфос-метилом, придабеном та ацетаміридом</i>											
		піриміфо с-метил, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	20	/0,001	0,01/ орг.	0,5/ трансл.	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
		придабен , 150 г/л +	0,03		0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетамір ид, 50 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		піриміфо с-метил, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не погр.	20	/0,001	0,01/ орг.	0,5/ трансл.	-	-	-	
		придабен , 150 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетамір ид, 50 г/л	0,01		не погр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		піриміфо с-метил, 200 г/л +	0,01	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	20	/0,001	0,01/ орг.	0,5/ трансл.	30	7	3	
		придабен , 150 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетамір ид, 50 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		піриміфо с-метил, 200 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	20	/0,001	0,01/ орг.	0,5/ трансл.	-	-	-	
		придабен , 150 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетамір ид, 50 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		піриміфо с-метил, 200 г/л +	0,01	декоративні культури відкритого прунгу ²	не погр.	20	/0,001	0,01/ орг.	0,5/ трансл.	3	3	3	

		придабен , 150 г/л +	0,03		не погр.	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		ацетаміпр ид, 50 г/л	0,01		не погр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
4 9	Антик ліщ ПРО, КЕ	придабен , 200 г/л	0,03	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1	20	7	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
5 0	Антико лорад Макс, КС			Контроль за імідаклопримом та лямбда-цихлотрином									
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді)
		лямбда- цихлотр ин, 100 г/л	0,003		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезп ечний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	
		лямбда- цихлотр ин, 100 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезп ечний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		лямбда- цихлотр ин, 100 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезп ечний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	
лямбда- цихлотр ин, 100 г/л	0,003	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезп ечний при пограп лянні на шкіру		/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05						

		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	30	не погр.	4	
		лямбда- цигалопр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не погр.*	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		лямбда- цигалопр ин, 100 г/л	0,003		не погр.*	0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	яблука, груші	0,07* (межа визн. ТЦХ- 0,07)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	30	10	4	
		лямбда- цигалопр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	яблучний, грушевий соки	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		лямбда- цигалопр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	30	не погр.	4	
		лямбда- цигалопр ин, 100 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не погр.*	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	

		лвмбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		імдаклопрід, 300 г/л +	0,06	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,005	0,007/заг.-сан.	0,04	20	10	4	
		лвмбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
5 1	Антилюпа, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	соєвишник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,07	0,005	0,01/заг.-сан.	0,1	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соєвишник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,05)	0,07	0,005	0,01/заг.-сан.	0,1	не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 2	Антисла, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	соє (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3	0,003	0,1/заг.-сан.	0,2/водн.-мікр.	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у пруні)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 3	Антихрущ, КС			<i>Контроль за імдаклопридом та біфентрином</i>									
		імдаклопрід, 100 г/л +	0,06	яблука ²	0,07* (межа визн. ТПХ-0,07)	0,2	0,005	0,007/заг.-сан.	0,04	30	10	4	3 (високостійкий у воді та пруні)
		біфенприд, 100 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,01	0,001	0,005/заг.-сан.	0,1				
		імдаклопрід, 100 г/л +	0,06	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	0,2	0,005	0,007/заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		біфенприд, 100 г/л	0,02		не погр.*	0,01	0,001	0,005/заг.-сан.	0,1				
5 4	Антракол 70 WP, ЗП			<i>Контроль за пропінебом та пропілат-тіосечовиною</i>		<i>Контроль за пропінебом</i>		<i>Контроль за пропінебом та пропілат-тіосечовиною</i>					
		пропінеб, 700 г/кг	0,0015	соє (зерно)	0,05 (парофазний метод межа визначення)	0,5	0,001	0,003/сан.-токс.	0,5/водн.-мікр.	20	не погр.	3	2

					методом газової хроматографії (далі - межа визн. ГХ)-0,05)								
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
		пропілен-тіосечовина (метаболіт пропінебу)	0,0001	соє (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)			0,02					
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
55	Аптілауд 25, КС	бупрофезин, 250 г/л	0,001	огірки (закритий ґрунт)	0,6** (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1	0,001	0,004/сан.-токс.	0,1	3	3	не погр.	2 (високостійкий у ґрунті)
				томати (закритий ґрунт)	0,6** (межа визн. ГРХ-0,01)					3	3	не погр.	
				яблука	0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)					20	5	3	
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					-	-	-	
56	Апріорі, ВГ			Контроль за мезотріонам									
		нікосульфурон, 230 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	1,0	0,01	0,001/заг.-сан.	0,2	не погр.	7	3	2 (високостійкий у воді)
		мезотріон, 570 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,006	0,02/сан.-токс.	0,4				
		нікосульфурон, 230 г/кг +	2,0	кукурудза (олія)	не погр.*	1,0	0,01	0,001/заг.-сан.	0,2	-	-	-	
		мезотріон, 570 г/кг	0,001		не погр.*	0,2	0,006	0,02/сан.-токс.	0,4				
57	Апрон XL350 FS, TH	металаксин-М, 350 г/л	0,03	капуста цвітна	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	0,01	0,001/заг.-сан.	0,05	не погр.	не погр.	не погр.	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		металаксин-М, 350 г/л	0,03	капуста	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	0,01	0,001/заг.-сан.	0,05	не погр.	не погр.	не погр.	
				цибуля (ріпка)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
58	Арес, TH		0,03	соняшник (насіння)	0,1* (межа	0,5/	0,01	0,001/заг.-сан.	0,05	не погр.	не погр.	не погр.	3

		металакс ил-М, 350 г/л			визн. ГРХ-0,1)								
				соєвишник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 9	Аріас (Arias), РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соєвишник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соєвишник (олія)	не погр.*								
6 0	Армор, КС	імадаклоп рид, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді)
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імадаклоп рид, 300 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імадаклоп рид, 300 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		не погр.*	/0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
6 1	Аріст, ВГ	флуфена цет, 240 г/кг +	0,004	-	-	/0,7	/0,001	0,002/ заг.-сан., сан.-токс.	/0,2				2 (алерге н, високос стійкий у воді)
		метрибуз ин, 175 г/кг	0,004	-	-	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.- мігр.				
6 2	Аріс Плюс, КС			Контроль за міклобутанілом, тebuконазолом та карбендазімом									
		міклобута ніл, 125 г/л +	0,03	соєвишник (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл., водн.- мігр.,	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)

								фітотокс .				та грунт)
		тебуконаз ол, 125 г/л +	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0			
		тіофанат- метил, 250 г/л	0,08		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4			
		карбендаз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1			
		міклобута ніл, 125 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мігр, фітотокс .	-	-	-
		тебуконаз ол, 125 г/л +	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0			
		тіофанат- метил, 250 г/л	0,08		не погр.	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4			
		карбендаз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		не погр.	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1			
6 3	Архітек т, СЕ			Контроль за мепікват-хлоридом та піраклостробіном								
		мепікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	соняшник (насіння)	1,0 (межа визначен ня фотомет ричним методом (далі- межа визн. ФМ-0,5)	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	50	не погр.	3
		прогексад іон кальцію, 25 г/л +	0,02		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,2			
		піраклост робін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6			
		мепікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	соняшник (олія)	не погр.	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	-	-	-
		прогексад іон кальцію,	0,02		не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,2			
												3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)

		25 г/л +											
		піраклост робін, 100 г/л	0,03		не погр.	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		метікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	ріпак (насіння)	1,0* (межа визн. ФМ-0,5)	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	50	не погр.	3	
		прогексад іон кальцію, 25 г/л +	0,02		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,2				
		піраклост робін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		метікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	ріпак (олія)	не погр.	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	-	-	-	
		прогексад іон кальцію, 25 г/л +	0,02		не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,2				
		піраклост робін, 100 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
6 4	АС Селект ив (Тіамат ,) ПН	тіаметокс ам, 100 г/л +	0,02	Контроль за тіаметоксамом та ацетаміпрідом						не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)
		ацетаміпр ид, 100 г/л +	0,01		0,025* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		флудіокс оніл, 20 г/л	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
6 5	Аскот SC, KC	флутетсу лам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс ., водно- мір, трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді та грунті)
		флорасул ам, 75 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
6 6	Аскра Хро			Контроль за біскафеном, флупіридом, протіоконізолом, протіоконізолом-дестіо (1)									3 (небезп

	260 ЕС, КЕ	біксафен, 65 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	3	счний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді та ґрунті)
		флуопіра м, 65 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,02/ заг.-сан.	/0,08				
		пропіокон азол, 130 г/л	0,001		0,1*(1) (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2 (1)				
6 7	Аспект Про 533 SC, KC			<i>Контроль за флуфенацетом та тербутилказіном</i>									
		флуфена цет, 200 г/л +	0,004	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,001	0,002/ заг.-сан, сан.-токс.	/0,2	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		тербутила зин, 333 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		флуфена цет, 200 г/л +	0,004	соняшник (олія)	не погр.	/0,7	/0,001	0,002/ заг.-сан, сан.-токс.	/0,2	-	-	-	
		тербутила зин, 333 г/л	0,003		не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		флуфена цет, 200 г/л +	0,004	кукурудза (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,001	0,002/ заг.-сан, сан.-токс	/0,2	не погр.	не погр.	3	
		тербутила зин, 333 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		флуфена цет, 200 г/л +	0,004	кукурудза (олія)	не погр.	/0,7	/0,001	0,002/ заг.-сан, сан.-токс	/0,2	-	-	-	
		тербутила зин, 333 г/л	0,003		не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
6 8	Аспіс, КЕ	пропіокхл ор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	2 (алерге н, високос тійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
6 9	Апіс, ВП	ацетаміпр ид, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	3	3 (високо

					ВЕРХ-0,05)								стійкий уводі)
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не попр.	3	
				соє (олія)	не попр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
7 0	АТО ЖУК, КС			<i>Контроль за тіаметоксамом, лямбда-цихлотрином та альфа-циперметрином</i>									
		тіаметокс ам, 100 г/л +	0,02	картопля ²	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5 аерозол ь	0,03	0,04/ сан.-токс.	0,1	30	10	4	3 (високо стійкий уводі)
		лямбда- цигалопр ин, 50 г/л +	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпе чний при попапа лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.					
		альфа- ципермет рин, 15 г/л	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,1 небезпе чний при попапа лянні на шкіру	0,003	0,002/ заг.-сан.	0,03				
7 1	Афрод ита 250 SC, КС (Afrody ta 250 SC)	азоксистр обін, 250 г/л	0,03	соєшпник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	30	не попр.	3	3 (небезп ечний при попапа лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий уводі)
				соєшпник (олія)	не попр.*					-	-	-	
7 2	Ацетал, КЕ	ацетохло р, 900 г/л	0,001	соєшпник (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	1,0	0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн- мір.	не попр.	не попр.	3	2 (алерге н, високо стійкий уводі)
				соєшпник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					-	-	-	
7 3	Ацифе н, РК	ацифлуор фен, 214 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2 небезпе чний при попапа лянні на шкіру	0,01	0,002/ сан.-токс.	0,2	не попр.	не попр.	3	3 (небезп ечний при попапа лянні на шкіру
				соє (олія)	не попр.*					-	-	-	

													та слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)	
7 4	База, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, алерген)	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-		
7 5	Баз Ультра , ВГ	тебуконаз ол, 750 г/кг	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не потр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)	
7 6	Байне трайк ЕС, КЕ	флурокс пір, 333 г/л	0,2	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	не потр.	3	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)	
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-		
7 7	Баслер, МЕ			Контроль за тебуконазолом та метконазолом										
		тебуконаз ол, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	50	не потр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі та фрунті)	
		метконаз ол, 50 г/л	0,001		0,2** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.- мігр.					
		тебуконаз ол, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	-	-	-		
		метконаз ол, 50 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.- мігр.					
		тебуконаз ол, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не потр.	3		
		метконаз ол, 50 г/л	0,001		0,1* (межа визн.)	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.- мігр.					

					ГРХ-0,05)								
78	Балери на, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 615 г/л +	0,0001	сорго (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		флорасул ам, 7,4 г/л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
79	Балери на Супер, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	не погр.	не погр.	3	3
		флорасул ам, 15 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	не погр.	не погр.	3	
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	-	-	-	
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		не погр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
80	Балор, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
81	Бамбу 480, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру, високосмисливий у воді)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	

													та грунт)
8 2	Банджо Форте, КС	<i>Контроль за диметоморфом та флуазинамом</i>											
		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	томати	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	2 (високо стійкий у воді)
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	цвібуля (ріпка)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	30	7	3	
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	картопля	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,3)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	40	не погр.	3	
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,2 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				

		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	соя(зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	40	не погр.	3	
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,2 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
		диметомо рф, 200 г/л +	0,1	соя(олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		флуазина м, 200 г/л	0,01		0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2				
8 3	Банген, РК	бенпазон, 480 г/л	0,1	соя(зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3
				соя(олія)	не погр.*					-	-	-	
				горох	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
8 4	Бард 200SL, РК	дикват, 200 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ- 0,05)	0,05/ небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	2
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя(зерно)	0,5* (межа визн. ФМ- 0,25)					6	не погр.	3	
				соя(олія)	не погр.*					-	-	-	
				сося(олія)	не погр.*					-	-	-	
8 5	Баріон, ЕН	металакс ил-М, 350 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	0,5/ небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05	не погр.	не погр.	не погр.	3 (небезп ечний при потрап лянні на
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	

				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	не погр.	слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
8 6	Барігон Супер 97,5FS, ТН			Контроль за флудіоксифілом, протіоконазолом (1), протіоконазолом- дестіо (2), тебуконазолом (3)									
		флудіокс оніл, 37,5 г/л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий уводі)
		пропіокон азол, 50 г/л +	0,001		0,1 (2) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (1)	/0,003 (1)	0,001/ (1) заг- сан.	/0,2 (2)				
		тебуконаз ол, 10 г/л	0,03		0,2* (3) (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ (3) заг- сан.	/1,0 (3)				
8 7	Барка 334, РК (Baraka 334SL)			Контроль за клоніридом									
		клоніралі д, 267 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	2,0	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі та пруні)
		піклорам, 67 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	5,0	/0,02	0,04/ сан.-токс.	0,05/ трансл.				
		клоніралі д, 267 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не погр.*	2,0	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		піклорам, 67 г/л	0,02		не погр.*	5,0	/0,02	0,04/ сан.-токс.	0,05/ трансл.				
8 8	Баркас, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексильовим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2- етил- гексильо вий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на шкіру та слизові оболон ки очей)
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
8 9	Баркле й Корріб, КЕ			Контроль за прохлорізом									
		прохлора з, 300 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі та пруні)
		епоксико назол, 75 г/л	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
9 0	Баркле й			Контроль за флуроксипіром		Контроль за флуроксипір- метилом		Контроль за флуроксипіром					

	Харлер ЕС,КЕ	флуроокси пр- метил, 290г/л	0,2	мак	0,025* (межа визн. ГРХ- 0,025)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	7	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на шкіфу та слизові оболон ки очей, алерген)
9 1	Бастна т Екстра, РГ	глюфоси нат амонію, 800г/кг	0,02	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,02	/0,002	0,02/ заг.-сан.	/0,1	10	не погр.	3	2 (небезп ечний при попрап лянні на слизові оболон ки очей)
9 2	Белену с,КЕ	пропізохл ор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
9 3	Белкар, КЕ			<i>Контроль за залишками фено-метилу та піклорама</i>									
		галаукси фен- метил, 10 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,006	0,04/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на шкіфу та слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді та пруді)
		піклорам, 48 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	5,0'	/0,02	0,04/ сан.-токс.	0,05/ трансл.				
		галаукси фен- метил, 10 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не погр.*	2,0'	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		піклорам, 48 г/л	0,02		не погр.*	5,0'	/0,02	0,04/ сан.-токс.	0,05/ трансл.				
9 4	Белг 480SC, КС	флубенді амід, 480 г/л	0,003	соє (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
				сорго (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не погр.	3	
9 5	Белг Експер т-480 SC,КС			<i>Контроль за флубендіамідом та тіаклопридом</i>									
		флубенді амід, 480 г/л +	0,003	виноград	0,8 (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	28	7	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		тіаклопри д, 240 г/л	0,006		0,1 (межа	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-				

				визн. ВЕРХ- 0,1)				мігр, фітотокс .				
	флубенді амід, 480 г/л +	0,003	виноградни й сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,2	0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	-	-	-	
	тіаклопри д, 240 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мігр, фітотокс .				
	флубенді амід, 480 г/л +	0,003	яблука	0,8** (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	0,2	0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	14	7	3	
	тіаклопри д, 240 г/л	0,006		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мігр, фітотокс .				
	флубенді амід, 480 г/л +	0,003	яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,2	0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	-	-	-	
	тіаклопри д, 240 г/л	0,006		0,06* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мігр, фітотокс .				
	флубенді амід, 480 г/л +	0,003	груші	0,8** (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	0,2	0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	14	7	3	
	тіаклопри д, 240 г/л	0,006		0,3** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мігр, фітотокс .				
	флубенді амід, 480 г/л +	0,003	грушевий сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,2	0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	-	-	-	
	тіаклопри д, 240 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мігр, фітотокс .				
	флубенді амід, 480 г/л +	0,003	персики	0,8** (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	0,2	0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	14	7	3	
	тіаклопри д, 240 г/л	0,006		0,5** (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мігр, фітотокс .				
	флубенді амід, 480 г/л +	0,003	персиковий сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,2	0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	-	-	-	

		тіакопри д, 240 г/л	0,006		0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мігр., фітотокс .				
9 6	Бельве дер Форте, СЕ			<i>Контроль за етофумезатом</i>									
		десмедиф ам, 100 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТШХ- 0,02)	1,0/	/0,01	0,1/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	не погр.	7	3	2 (високо стійкий у воді)
		фенмеді фам, 100 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01	/0,5	/0,001	0,5/ орг.	0,25/ трансл.				
		етофумез ат, 200 г/л	0,1		0,2* (межа визн. ТШХ- 0,2)	/0,1	/0,01	0,05/ заг.-сан.	/0,15				
9 7	Бенгав ин 480 SL, PK	бенгавон, 480 г/л	0,1	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0 небезпе чний при попада нні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
9 8	Бенгав ан, PK	бенгавон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0 небезпе чний при попада нні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при попада нні на слизові оболон ки очей)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
9 9	Беркут, KE	тебуконаз ол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при попада нні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
1 0 0	Бестсел ер Турбо S 200, KS	альфа- ципермет рин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при попада нні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не погр.	4	
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)					-	-	-	
				буряки цукрові	0,02* (межа визн.					не погр.	10	4	

					ГРХ-0,02)								
101	Бетадин, КЕ			<i>Контроль за дієтостістю</i>									
		диметосат, 300 г/л +	0,0005	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,003/	0,001/ сан.-токс.	0,3/ трансл.	30	не погр.	4	3 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей)
		бета-циперметрин, 40 г/л	0,005		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,002	0,002/ заг.-сан.	0,02				
102	Біорекс с375, РК			<i>Контроль за бентизоном та МЦПА</i>									
		бенпазон, 250 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,05	0,01/ сан.-токс.	0,4	не погр.	не погр.	3	3
		2-метил-4-хлорфенокси-оцтова кислота (МЦПА), 125 г/л	0,008		0,2** (межа визн. ГРХ-0,05)	1,0/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,02	0,003/ орг.	0,02				
		бенпазон, 250 г/л +	0,1	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,05	0,01/ сан.-токс.	0,4	не погр.	не погр.	3	
		2-метил-4-хлорфенокси-оцтова кислота (МЦПА), 125 г/л	0,008		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	1,0/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,02	0,003/ орг.	0,02				
103	Бластер, ЗП	гексипізокс, 200 г/кг	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5	0,05	0,001/ заг.-сан.	0,1	35	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
104	Блокбастер, КЕ	біфенприд, 100 г/л	0,02	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,01	0,001	0,005/ заг.-сан.	0,1	30	10	4	3 (високо стійкий у воді)
				яблучний сік	0,15 (межа визн. ГРХ-0,15)					-	-	-	

				картопля	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					30	10	4	
				троянди	не погр.					не погр.	10	4	
				ялівць	не погр.					не погр.	10	4	
1 0 5	Блу Бордо, ВГ	міді сульфат, 770 г/кг	0,05 (по міді)	картопля	10* (межа визн. ТШХ- 1,0)	0,5/	0,003- максим альна разова; 0,001- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	14	1	2
				томати	5* (межа визн. ТШХ- 1,0)					20	14	1	
				томатний сік	5* (межа визн. ТШХ- 1,0)					-	-	-	
1 0 6	Блю Стар, ЗП	міді гідроксид, 770 г/кг	0,05 (по міді)	виноград ²	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)	0,5/	0,03- максим альна разова; 0,005- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
				виноградни й сік	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)					-	-	-	
				яблука ²	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)					30	7	3	
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)					-	-	-	
				томати ²	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)					20	7	3	
				томатний сік	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)					-	-	-	
1 0 7	Блюз, КС	<i>Контроль за дифеноконазолом та крезоксим-метилом</i>											
		дифеноко назол, 200 г/л +	0,002	яблука ²	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	2 (високо стійкий у воді)
		крезоксид м-метил, 100 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1				
		дифеноко назол, 200 г/л +	0,002	яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	

		крезокси м-метил, 100 г/л	0,1		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1				
		дифенокс назол, 200 г/л +	0,002	абрикоси ²	0,08* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	
		крезокси м-метил, 100 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1				
		дифенокс назол, 200 г/л +	0,002	абрикосови й сік	0,08* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		крезокси м-метил, 100 г/л	0,1		не погр.	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1				
		дифенокс назол, 200 г/л +	0,002	троянди ²	не погр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	7	7	не погр.	
		крезокси м-метил, 100 г/л	0,1		не погр.	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1				
1 0 8	Боліва р Форте, КС			Контроль за тебуконазолі та крезоксим-метиліом									
		тебуконаз ол, 240 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		крезокси м-метил, 100 г/л	0,1		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1				
1 0 9	Бомбар дир Аква, РК	імідаклоп рид, 200 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	3	3
1 1 0	Бомбар дир, ВГ	імідаклоп рид, 700 г/кг	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	3	3
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 1 1	Бонафа йт, ВГ			Контроль за пропінебом та ПТС		Контроль за пропінебом		Контроль за пропінебом та ПТС					
		пропінеб, 700 г/кг	0,0015	томати	0,05* (межа визн. ГХ- 0,05)	/0,5	/0,001	0,003/ сан.-токс.	0,5/ водн.- мікр.	20	7	3	2 (небезп ечний при пограп лянні
				томатний сік	0,01* (межа					-	-	-	

					визн. ГХ-001)								на слизові оболонки очей)
				яблука	0,05* (межа визн. ГХ-005)					30	7	3	
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГХ-005)					-	-	-	
				виноград технічних сортів	0,05* (межа визн. ГХ-005)					50	7	3	
		пропілен-тіосечовина (ППС) (метаболіт пропінебу)	0,0001	томати	0,01* (межа визн. ВЕРХ-001)				0,02	-	-	-	
				томатний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-001)					-	-	-	
				яблука	0,01* (межа визн. ВЕРХ-001)					-	-	-	
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-001)					-	-	-	
				виноград технічних сортів	0,01* (межа визн. ВЕРХ-001)					-	-	-	
1 1 2	Борей Нео, КС			<i>Контроль за альфа-циперметрином та імідаклопридом</i>									
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-001)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,003	0,002/ заг.-сан.	0,03	30	не погр.	4	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високоспійкий у воді та ґрунті)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-005)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04				
		клетанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-002)	1,5	0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс.				
		альфа-циперметрин, 125 г/л +	0,005	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-002)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,003	0,002/ заг.-сан.	0,03	30	10	4	
		імідаклоприд, 100	0,06		0,01* (межа	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04				

		г/л +			визн. ВЕРХ- 0,01)							
		кюпіанід ин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .			
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4
		імдакюп рид, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		кюпіанід ин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .			
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	соняшник (олія)		/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-
		імдакюп рид, 100 г/л +	0,06		не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		кюпіанід ин, 50 г/л	0,08		не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .			
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	картопля	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	10	4
		імдакюп рид, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		кюпіанід ин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .			
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	томати	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	10	4

		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клетанід ин, 50 г/л	0,08		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, флѳотокс .				
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	томатний сік	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клетанід ин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, флѳотокс .				
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не поп.	4	
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клетанід ин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, флѳотокс .				
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не поп.	/0,1 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		не поп.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клетанід ин, 50 г/л	0,08		не поп.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, флѳотокс .				
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1 небезпе- чний при попап- лянні	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не поп.	4	

				на шкіру								
	імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
	клетіанід ин, 50 г/л	0,08		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
	альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	соя (олія)	не погр.	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
	імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
	клетіанід ин, 50 г/л	0,08		не погр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
	альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	кукурудза ¹ (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	
	імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
	клетіанід ин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
	альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
	імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
	клетіанід ин, 50 г/л	0,08		не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
	альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе чний при попап	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	

					лянні на шкіру							
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		клетанід ин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .			
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		клетанід ин, 50 г/л	0,08		не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .			
		альфа- ципермет рин, 125 г/л +	0,005	горох (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпе чний при попап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	20	10	4
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04			
		клетанід ин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .			
1 1 3	Бранде р, КС			<i>Контроль за азоксистроїном та тебуконазолу</i>								
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3
		тебуконаз ол, 160 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0			
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3
		тебуконаз ол, 160 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0			

3
(високо
стійкий
увод)

		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 160 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соєшпник ¹ (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 160 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соєшпник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 160 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
1 1 4	Брігід, ТН			<i>Контроль за тіаіметоксамі</i>									
		тіаіметокс ам, 150 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий уводі)
		тебуконаз ол, 50 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 50 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
1 1 5	Брігекс 40 РК	імаіаімокс , 40 г/л	3,0	соєшпник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				соєшпник (олія)	не погр.					-	-	-	
				соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
1 1 6	Бродекс іф, КЕ	хііаіофоі -іі-іііі, 200 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 1 7	Брокер, РК	ііііфоіаіу іііііііііі амііііа сііі, 480 г/л	0,01	землі під посадку овочевих та посів сііііііііііііііі підарсіііііііііі культуіі, обіііііііііі землі під паіі, землі несііііііііііііііі	не погр.	1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансіі.	не погр.	7	3	3

				господарсь кого призначенн я, обробка підпи після збирання врожаю ¹									
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)					не погр.	7	3	
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	7	3	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
				картопля	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	7	3	
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не погр.	7	3	
1 1 8	Брокс, РК	імазамокс , 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не погр.	не погр.	3	
1 1 9	Бузіл, ВГ	метрибуз ин, 700 г/кг	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТПХ, СФ-0,03)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.- мігр.	не погр.	7	3	3 (високо стійкий у грунті)
				томати	0,25* (межа визн. ТПХ, СФ-0,03)					не погр.	7	3	
				томатний сік	не погр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 2 0	Букаг 500, КС	тебуконаз ол, 500 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн.)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	3 (небезп ечний)

					ГРХ-0,07)								при потрап- лянні на слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)					50	не попр.	3	
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
1 2 1	Буксир, КЕ (Гауерс прей 905 ЕС)			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилієвим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д 2- етил- гексиліє- вий ефір, 905 г/л	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ транс.	не попр.	не попр.	3	3 (небезп- ечний при потрап- лянні на слизові оболон- ки очей)
1 2 2	Бустер Фаст, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не попр.	не попр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
				соє (олія)	не попр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)					не попр.	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
1 2 3	Бюкспр ил 327,5 ЕС, КЕ	бромокс- ніл октаноат, 327,5 г/л	0,001	цибутя (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,3	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,1	не попр.	7	3	2
1 2 4	Вайбра нс RFC 1125 FS, TH			Контроль за седіксаном та метиліксілом-М									
		седіксан, 50 г/л +	0,1	соє (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,03	0,004/ заг.-сан.	/0,2	не попр.	не попр.	не попр.	2 (високо- стійкий у воді)
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		металікс ил-М, 37,5 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		седіксан, 50 г/л +	0,1	соє (олія)	не попр.	/1,0	/0,03	0,004/ заг.-сан.	/0,2	-	-	-	
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		не попр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		металікс ил-М, 37,5 г/л	0,03		не попр.	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
				Контроль за тіаметоксамом									

1 2 5	Вайбра нс Інтегра л235 FS,TH	седаксан, 25 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/0,03 (межа визн. ВЕРХ- 0,008)	0,004/ (межа визн. ВЕРХ- 0,004); заг.-сан.	/0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	не погр.	не погр.	не погр.	3 (алерге н, високо стійкий увод)
тіаметокс ам, 175 г/л +		0,02	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)		/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1					
флудіокс оніл, 25 г/л +		0,015	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)		/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2					
тебуконаз ол, 10 г/л		0,03	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)		/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0					
1 2 6	Вайбра нс 500 FS,TH	седаксан, 500 г/л	0,1	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,03	0,004/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий увод)
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
1 2 7	Вайбра нс Тріо 60FS, TH			Контроль за флудіоксонилом та тебуконазолом									3 (високо стійкий увод)
		седаксан, 25 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,03	0,004/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
тебуконаз ол, 10 г/л	0,03	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4		/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0						
1 2 8	Вальте р, ЗП			Контроль за манкоцебом, металаксилем, ЕТС									2 (високо стійкий увод)
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	картопля ²	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	14	7	3	
		металакс ил, 80 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	томати ²	0,5* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	14	7	3	
		металакс ил, 80 г/кг	0,03		0,2** (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	томатний сік	0,05* (межа визн.)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	

					ГРХ-0,05)								
		металаксил, 80 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не погр.	не погр.	не нормується	не нормується	-	-	-	
	томати			0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	-					-	-		
	томатний сік			0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	-					-	-		
129	Вамп 200, ВП	ацетаміпрід, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	3	2 (високостійкий у воді)
		ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	30	не погр.					3			
		ріпак (олія)	не погр.*	-	-					-			
		яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	30	5					3			
		яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	-	-					-			
130	Варта, КЕ			Контроль за пропіконазолом та азоксистробіном									
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		азоксистробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соє (олія)	не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	

		азоксистр обін, 100 г/л	0,03		не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		пропікон азол, 200 г/л +	0,04	соєвишник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		азоксистр обін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		пропікон азол, 200 г/л +	0,04	соєвишник (олія)	не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	
		азоксистр обін, 100 г/л	0,03		не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
1 3 1	Варяг, КС			<i>Контроль за металахлором та тербутилзіном</i>									
		метолхл ор, 315 г/л +	0,01	сorgho	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	не погр.	не погр.	7	3 (високо стійкий увод)
		тербутила зин, 190 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
1 3 2	Вейрон, КС			<i>Контроль за флутетсуламом та флорасуламом</i>									
		флутетсу лам, 120 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	/0,16	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
		флорасул ам, 80 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
1 3 3	Векста дим 240, KE (Vextadim 240 EC)	клетодим, 240 г/л	0,01	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкір та слизові оболон ки очей)
				соєвишник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соєвишник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соєв (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ, ВЕРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	3	
				соєв (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,15 (межа визн. ТШХ, ВЕРХ- 0,08)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	

1 3 4	Векста- мітрон 700SC (Vesta mitron 700SC), КС	метаміпро н, 700 г/л	0,03	буряки цукрові	0,2** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,5/	/0,03	0,05/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	7	3	2 (високо стійкий у воді)
1 3 5	Венцед ор, ТН			<i>Контроль за тваринами</i>									
		тирам, 400 г/л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)
		тебуконаз ол, 25 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
1 3 6	Веріва рк20 SC, КС	циантрапі ліпрол, 200 г/л	0,002	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3
				томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					-	-	-	
1 3 7	Вертим ек018 ЕС, КЕ	абамекти н, 18 г/л	0,0002	опірки ²	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	7	7	3	2
				яблука ²	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					14	7	3	
				сунія ²	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					14	7	3	
				перель ²	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					7	7	3	
				баклажани ²	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					7	7	3	
				груші ²	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					14	7	3	
				грушевий сік	не погр.					-	-	-	
				виноград ²	0,01** (межа визн.)					14	7	3	

					ВЕРХ-0,005)								
				виноградний сік	не погр.					-	-	-	
				грецькі горіхи ²	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,01)					14	7	3	
138	Вершина, КС			Контроль за тебуконазолом та азоксистробіном									
		тебуконазол, 30 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 22 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
139	Ветеран, РК	ацетаміпрід, 200 г/л	0,01	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	45	5	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
			яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	-					-	-		
			сливи	0,03** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	45					5	3		
			сливовий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	-					-	-		
			ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	30					не погр.	3		
			ріпак (олія)	не погр.*	-					-	-		
140	Вето 250, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
			ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	30					не погр.	3		
			ріпак (олія)	не погр.*	-					-	-		
			соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	35					не погр.	3		
			соя (олія)	не погр.*	-					-	-		
141	Віжж, ВГ			Контроль за амікарбазоном та мезотріоном									
		амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02 (сума амікарбазону та	/0,5 (межа визн.	/0,001 (межа визн.	0,002/ заг.-сан. (межа визн.	/0,2 (межа визн.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при

					його метаболітів) (межа визн. ВЕРХ-0,02)	ВЕРХ-0,25)	ВЕРХ-0,001)	ВЕРХ-0,002)	ВЕРХ-0,02)				пограп- лянні на слизові оболон- ки очей, високос- тійкий у воді)
		мезотріон ,288 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сант-токс.	/0,4				
		амікарбазон, 280 г/кг +	0,005	кукурудза (олія)	не погр.	/0,5 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,002)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	-	-	-	
		мезотріон ,288 г/кг	0,001		не погр.	/0,2	/0,006	0,02/ сант-токс.					
1 4 2	Вінг П, КЕ			<i>Контроль за диметеномідом-П та пендіметаліном</i>									
		диметена мід-П, 212,5 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	не погр.	7	3	3
		пендімет алін, 250 г/л	0,008		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2				
		диметена мід-П, 212,5 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		пендімет алін, 250 г/л	0,008		не погр.*	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2				
		диметена мід-П, 212,5 г/л +	0,02	соєвийшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	не погр.	7	3	
		пендімет алін, 250 г/л	0,008		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2				
		диметена мід-П, 212,5 г/л +	0,02	соєвийшник (олія)	не погр.*	/0,7	/0,01	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		пендімет алін, 250 г/л	0,008		не погр.*	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2				
1 4 3	Вінсес 40, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соєвийшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
				соєвийшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	

1 4 4	Віталій т, РК	імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та пруні)
		імазапїр, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпе чний при попаді ляння на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапїр, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпе чний при попаді ляння на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
1 4 5	ВК 1101, ЗП	трифлусу льфурон- метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3	3 (високо стійкий у воді)
1 4 6	Вояць, КС			Контроль за тербутилізіном та S-металахлором									
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	7	2 (високо стійкий у воді)
		S- металахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не погр.*								
S- металахл ор, 312,5 г/л	0,01	не погр.*											
1 4 7	Воленс, МЕ			Контроль за ацифлуорфеном									
		ацифлуор фен, 200 г/л +	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТЦХ, ВЕРХ- 0,1)	/0,2 небезпе чний при попаді ляння на шкіру	/0,01	0,002/ сан.-токс.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при попаді ляння на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
		кломазон, 42 г/л	0,04		0,02** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		ацифлуор фен, 200 г/л +	0,01	соє (олія)	не погр.*	/0,2 небезпе чний при попаді ляння	/0,01	0,002/ сан.-токс.	/0,2	-	-	-	

						на шкіру							
		клотимзон, 42 г/л	0,04		не погр.*	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
1 4 8	Воліам Флексі 300SC, КС			Контроль за тіаметоксамом та хлорантрахініпролом									
		тіаметокс ам, 200 г/л +	0,02	томат ³	0,04* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	7	7	-	3 (високо стійкий у воді та грунті)
		хлорантр анілі- прол, 100 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)			0,001/ заг.-сан.					
		тіаметокс ам, 200 г/л +		томатний сік	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1 не погр.					-	-	-	
		хлорантр анілі- прол, 100 г/л											
1 4 9	Волюда р(РІМ 700), ВГ			Контроль за римсульфураном та тіфенсульфуран-метилом									
		римсуль фуран, 500 г/кг +	0,02	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	3	3
		трибенур он-метил, 200 г/кг	0,005		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)			/0,003					
		римсуль фуран, 500 г/кг +	0,02	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	
трибенур он-метил, 200 г/кг	0,005	не погр.*	/0,1		/0,003			0,06/ заг.-сан.					
1 5 0	Вулкан Плюс, РК	гідросату ізопропіл аміна сіль, 480 г/л	0,01	осіння та весняна обробки сільськогос- подарських угодь, міжрядь в садах та виноградни- ках ²	не погр.*	1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	3 (високо стійкий у воді)
1 5 1	Гавань Плюс, МД			Контроль за мезотріоном та нікосульфуронам									
		мезотріон , 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
		нікосуль фуран, 30 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)			/1,0					
		мезотріон , 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
нікосуль фуран, 30 г/л	2,0	не погр.*	/1,0		/0,01			0,001/ заг.-сан.					

1 5 2	Гавань, МД	нікосуль фуран, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 5 3	Газтокс ін (Gastoxi n), ТБ	фосфід алюмінію ,560 г/кг		Контроль за фосфіном									1
				зерно хлібних злаків, запаси в трюмах, контейнера х, елеваторах, складах	0,1* (межа визн. інд. труб. Дрегера- 0,007)	0,1/	0,01 - максим альна разова; 0,001 - середнь о- добова/	0,005/ сан.-токс.	/0,4	20 ≤МДР	7<Г ДК	7<ГД К	
1 5 4	Галант, РК	глюфоси нат амонію, 150 г/л	0,02	соняшник (насіння)	1,0 (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,02	/0,002	0,02/ заг.-сан.	/0,1	7 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	3
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
1 5 5	Галкон, ТН			Контроль за дифенкоконазолом									3 (високо стійкий у воді)
		азоксистр обін, 27 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	
		дифенко назол, 92 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)								
		азоксистр обін, 27 г/л +	0,03	соя (олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		дифенко назол, 92 г/л	0,002		не погр.								
		азоксистр обін, 27 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	
		дифенко назол, 92 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)								/0,2
1 5 6	Галід, КС			Контроль за імідаклопридом									2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді та прунті)
		імідаклоп рид, 250 г/л +	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	20	10	4	
		біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)								
		імідаклоп рид, 250 г/л +	0,06	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	20	10	4	

	біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250 г/л +	0,06	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
	біфенпри н, 50 г/л	0,02		не погр.	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250 г/л +	0,06	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	20	10	4	
	біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	
	біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	
	біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250 г/л +	0,06	соя (олія)	не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
	біфенпри н, 50 г/л	0,02		не погр.	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250 г/л +	0,06	буряки цукрові	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	40	10	4	
	біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250 г/л +	0,06	соняшник ¹ (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	
	біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	імдаклоп рид, 250	0,06	соняшник (олія)	не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	

		г/л +											
		біфенпри н, 50 г/л	0,02		не погр.	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		імдакюп рид, 250 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4	
		біфенпри н, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		імдакюп рид, 250 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		біфенпри н, 50 г/л	0,02		не погр.	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
1 5 7	Гамбіт, КС	прометри н, 500 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0'	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				горох (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0'	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	
				картопля	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)					90	7	3	
				морква	0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)					120	7	3	
1 5 8	Гар- монд 750, ВГ	трибенур онметил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 5 9	Гарант, РК	гліфосату ізопропіл амінна сіль, 480 г/л	0,01	землі під посадку овочевих та посів сільськогос- подарських культур	не погр.*	1,0'	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	2

				навесні та восени після збирання врожаю									
1 6 0	Гаучо Ево 275 FS, TH			<i>Контроль за імідаклопридом та клотіаїдином</i>									
		імідаклоп рид, 175 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та пруні)
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
1 6 1	Гаучо Цлюс 466FS, TH			<i>Контроль за клотіаїдином та імідаклопридом</i>									
		клотіанід ин, 233 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді та пруні)
		імідаклоп рид, 500 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанід ин, 233 г/л +	0,08	сorgho	0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	
		імідаклоп рид, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанід ин, 233 г/л +	0,08	соя (зерно)	0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	
		імідаклоп рид, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		клотіанід ин, 233 г/л +	0,08	соя (олія)	не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	-	-	-	
		імідаклоп рид, 500 г/л	0,06		не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
1 6 2	Гексам айт, KE	гекспіпазо кс, 50 г/л	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високос
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				яблука	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,02)					30	7	3	
				яблучний сік	не погр.*					-	-	-	

													тійкий уволі)
1 6 3	Гексор ан, КС	гексипіазо кс, 200 г/кг	0,04	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5	0,05	0,001/ заг.-сан.	0,1	35	не попр.	3	2 (високо стійкий уволі та пруні)
				соє (олія)	не попр.					-	-	-	
1 6 4	Геліант екс SC, КС	галаукси фен- метил, 71,399 г/л, в кислотну му еквівален ті -68,5 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	1,0	0,006	0,04/ сан.-токс.	0,3	не попр.	не попр.	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на шкіру та слизові оболон ки очей)
				соняшник (олія)	не попр.*					-	-	-	
1 6 5	Герой, РК			Контроль за імазамоксом та імазатіром									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	1,0	0,04	0,06/ заг.-сан.	0,4	не попр.	не попр.	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий уволі та пруні)
		імазатір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	1,0 небезп ечний при попрап лянні на шкіру	0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не попр.	1,0	0,04	0,06/ заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		імазатір, 15 г/л	1,0		не попр.	1,0 небезп ечний при попрап лянні на шкіру	0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
1 6 6	Гліфог олд, ВР	гліфосату ізопропіл- амінна сіль, 480 г/л	0,01	виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	1,0	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не попр.	7	3	3
				виноградни й сік	не попр.					-	-	-	
				яблука	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не попр.	7	3	
				яблучний сік	не попр.					-	-	-	
1 6 7	Гліфос ил, РК	гліфосату ізопропіл амінна сіль, 480 г/л	0,01	осіння обробка сільськогос подарських улі ²	не попр.*	1,0	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий уволі)
		бенпазон, 480 г/л	0,1	соє (зерно)	0,1* (межа	1,0 небезп	0,05	0,01/ сан.-токс.	0,4	не попр.	не попр.	3	3 (небезп

1 6 8	Глобаг ран 480, РК				визн. ТШХ- 0,1)	чний при потрап лянні на шкіру							счний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, алерген)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
				горох (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
1 6 9	Глобас ульф, ВГ	тіфенсуль фурон- метил, 750 г/кг	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,1	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,05	не погр.	не погр.	3	3 (небезп счний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 7 0	Глобст ар, ВГ	трибенур он-метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 7 1	Глорі, ВГ			Контроль за азоксистробіном, манкоцебом, ЕТС		Контроль за азоксистробіном та манкоцебом							
		азоксистр обін, 50 г/кг +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	не погр.	3	3 (алерге н, високос тійкий увол)
		манкоцеб , 700 г/кг	0,005		0,1** (межа визн. ГРХ- 0,05)								
		азоксистр обін, 50 г/кг +	0,03	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		манкоцеб , 700 г/кг	0,005		не погр.								
		ЕТС (метаболі т манкоцеб у)	0,0003	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	не погр.	не погр.	не нормует ся	не нормует ся	не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.*								
1 7 2	Голікс Голд, МС	метаміпро н, 700 г/л	0,030	буряки цукрові	0,03* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,5/	/0,03	0,05/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий увол)
1 7 3	Голікс Титан, КС			Контроль за метамітроном									
		метаміпро н, 525 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,2** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,5/	/0,03	0,05/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	7	3	3 (високо стійкий увол)

		квінмерак ,40 г/л	0,08		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,16/ 	/0,2				
1 7 4	Горностаї, РК			<i>Контроль за імазамоксом та імазіпіром</i>									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та пруді)
		імазіпір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазіпір, 15 г/л	1,0		не погр.*	/1,0 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
1 7 5	Грано БГ,КЕ	пропікон азол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/ 	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та пруді)
1 7 6	Гранпо р, ВГ	трибенур он-метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3 (алерге н)
1 7 7	Грін 2013_4	клетодим, 240 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3
				соняшник (олія)	не погр.					-	-		
1 7 8	Грін 2013_8 SC	тербутила зин, 500 г/л	0,003	соя(зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та пруді)
				соя(олія)	не погр.*					-	-		
				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.		
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-		
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.		
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-		
1 7 9	Грін 2013-6, КС	тіаклопри д, 480 г/л	0,006	картопля	0,1* (межа визн.)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.- мігр.	20	7	3	3 (високо)

					ВЕРХ-0,05)				фітотокс .				стійкий у воді)
				соя (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)					35	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
180	Грін-2, ТН	кюпанідин, 600 г/л	0,08	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)								
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
181	Грін-3, ВГ			<i>Контроль за нікосульфуроном та римсульфуроном</i>									
		нікосульфурон, 500 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високо стійкий у воді)
		римсульфурон, 250 г/кг	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		нікосульфурон, 500 г/кг +		кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
		римсульфурон, 250 г/кг			не погр.								
182	Грінекс, РК			<i>Контроль за фосфористою кислотою та пропанокарбом дідроксидом</i>		<i>Контроль за пропанокарбом</i>		<i>Контроль за фосфористою кислотою та пропанокарбом дідроксидом</i>					
		алюміній фосфоновокислий, 400 г/л +	2,0 (по фосфокислоті)	томати	0,6* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	20	7	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
		пропанокارب, 200 г/л	0,02 (по пропанокарбгидрохлориду)		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1				
		алюміній фосфоновокислий	2,0 (по фосфокислоті)	томатний сік	0,4* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	-	-	-	

		ий, 400 г/л +	ристий кисло п)		визн. ФМ-0,2)							
		пропамок арб, 200 г/л	0,02 (по пропа - мокар б гідро- хлори ду)		0,025* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1			
		алюміній фосфо- новокисл ий, 400 г/л +	2,0 (по фосф о- ристий кисло п)	виноград	0,5* (межа визн. ФМ- 0,25)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	40	7	3
		пропамок арб, 200 г/л	0,02 (по пропа - мокар б гідро- хлори ду)		0,005 (межа визн. ГРХ- 0,005)	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1			
		алюміній фосфо- новокисл ий, 400 г/л +	2,0 (по фосф о- ристий кисло п)	виноградни й сік	0,2* (межа визн. ФМ-0,1)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	-	-	-
		пропамок арб, 200 г/л	0,02 (по пропа - мокар б гідро- хлори ду)		0,005 (межа визн. ГРХ- 0,005)	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1			
		алюміній фосфо- новокисл ий, 400 г/л +	2,0 (по фосф о- ристий кисло п)	соняшник (насіння)	0,3 (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	40	не попр.	3
		пропамок арб, 200 г/л	0,02 (по пропа - мокар б гідро- хлори ду)		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1			
		алюміній фосфо- новокисл ий, 400 г/л +	2,0 (по фосф о- ристий кисло п)	соняшник (оля)	не попр.	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	-	-	-
		пропамок арб, 200 г/л	0,02 (по пропа - мокар		не попр.*	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1			

			б гідро- хлори ду)										
		алюміній фосфо- новокисл ий, 400 г/л +	2,0 (по фосф о- ристій кисло ті)	соя (зерно)	0,3* (межа визн. ФМ- 0,25)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	20	не потр.	3	
		пропамок арб, 200 г/л	0,02 (по пропа - мокар б гідро- хлори ду)		0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1				
		алюміній фосфо- новокисл ий, 400 г/л +	2,0 (по фосф о- ристій кисло ті)	соя (олія)	не потр.	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	-	-	-	
		пропамок арб, 200 г/л	0,02 (по пропа - мокар б гідро- хлори ду)		не потр.*	/0,8	/0,06	0,08/ сан.-токс.	/0,1				
1 8 3	Грінфо рт АС, КС	азоксистр обін, 250 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	3 (високо стійкий у воді та грунті)
		флутріаф ол, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	/0,1 небезпе чний при попада нні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
1 8 4	Грінфо рт БЗ 480, РК	бенпазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТЦХ- 0,1)	/1,0 небезпе чний при попада нні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	3
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	
1 8 5	Грінфо рт Кломаз он, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не потр.	не потр.	3	3 (небезп ечний при попада нні на шкіру та слизові оболон ки очей,
				соя (олія)	не потр.*					-	-	-	

													високо- стійкий у воді)
1 8 6	Грінфорт Конфі, ТН	імідаклоп- рид, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо- стійкий у воді)
1 8 7	Грінфорт Лайт, РК			Контроль за імізамоксом та імазіпром									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп- ечний при пограп- лянні на слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді та грунт)
		імазіпро, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезп- ечний при пограп- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазіпро, 15 г/л	1,0		не погр.*	/1,0 небезп- ечний при пограп- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
1 8 8	Грінфорт НК 40, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*								-
1 8 9	Грінфорт Проніт, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп- ечний при пограп- лянні на слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*								
1 9 0	Грінфорт Харні, ВГ	тіфенсульфурон- метил, 750 г/кг	0,01	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,1	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,05	не погр.	не погр.	3	3
				соя (олія)	не погр.*								
1 9 1	Грінфорт Циперметрин, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезп- ечний при пограп- лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	3 (небезп- ечний при пограп- лянні на шкіру та

													слизові оболонки очей)
192	Гроділ Максі 375 OD, МД			<i>Контроль за амідосульфуроном та йодсульфурон- метилом напрію</i>		<i>Контроль за амідосульфуроном</i>		<i>Контроль за йодсульфурон- метилом напрію</i>					
		амідосульфурон, 100 г/л +	0,2	льон (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	1,0/	/0,001	0,003/ заг.-сан.	/0,25	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високо стійкий у воді)
		йодсульфурон-метил напрію, 25 г/л +	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.				
		антидот мефеніпр-діетил, 250 г/л	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
		амідосульфурон, 100 г/л +	0,2	льон (олія)	не погр.*	1,0/	/0,001	0,003/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-	
		йодсульфурон-метил напрію, 25 г/л +	0,03		не погр.*	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.				
		антидот мефеніпр-діетил, 250 г/л	не погр.		не погр.*	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
193	Грум БТ, РК	хлормекват хлорид, 750 г/л	0,001	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ТЦХ-0,2)	0,3/ небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,02	0,2/ сан.-токс.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
194	Гуд-Харвест Гліфосат 360, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л в кислому еквіваленті-360 г/л	0,01	осіння та весняна обробка сільськогосподарських угідь, обробка землі під пар	не погр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високо стійкий у воді)
195	Гуд-Харвест ЕФД, КЕ			<i>Контроль за етофурмехатом</i>									
		десмедіфам, 71 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТЦХ-0,02)	1,0/	/0,01	0,1/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	не погр.	7	3	2 (високо стійкий у воді)
		фенмедіфам, 91 г/л +	0,03		0,2* (межа визн.)	/0,5	/0,001	0,5/ орг.	0,25/ трансл.				

					ГРХ-0,01)								
		етофумезат, 112 г/л	0,1		0,2* (межа визн. ППХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,05/ заг.-сан.	/0,15				
196	Дайги Екстра 60D, МД	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
197	Девайс Ультра, РК			Контроль за імізамоксом та імізапіром									
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.-мір.				
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.-мір.				
198	Дезарал Екстра, КС	карбендазим, 250 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,15* (межа визн. ППХ-0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не погр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		флупірафол, 125 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)								
199	Делавіт, КС	дипіанон, 350 г/л	0,01	яблука	3,0** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,5	/0,01	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	3 (небезпечний при потрапленні на
				яблучний сік	0,1 (межа					-	-	-	на

					визн. ВЕРХ- 0,1)								слизові оболон ки очей)
				виноград	0,5 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	7	3	
				виноградни й сік	не погр.					-	-	-	
2 0 0	Делюте, КЕ	S- метолакл ор, 960 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,025)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	не погр.	15	7	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високос тіякий у воді)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	7	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	7	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	7	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
2 0 1	Дельта сейв (Deltaseive), МД			Контроль затиаклопридам									
		тіаклопри д, 120 г/л +	0,006	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мір, фітотокс .	20	не погр.	3	2
		дельтамет рин, 20 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезп ечний при потрап лянні на шкіру	/0,003	0,006/ сан.-токс.	0,01/ трансл.				
2 0 2	Десика нт Макс, РК	дикват дибромід, 300 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ- 0,05)	0,05/ небезп ечний при потрап лянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. ФМ- 0,05)					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)					6	не погр.	3	
				соя (олія)	0,1 (межа визн. ФМ- 0,05)					-	-	-	

				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)					7	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
				сорго	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)					6	не попр.	3	
2 0 3	Десика щ, РК	дикват дибромід, 150 г/л	0,002	картопля	0,2* (межа визн. ФМ-0,2)	0,05/ небезпе чний при попаді лянні на шкіру	0,003	0,02/ орг.	0,2	7	10	3	3 (небезп ечний при попаді лянні на шкіру та слизові оболон ки очей)
2 0 4	Дестро й, КС			<i>Контроль за імідаклопримом та лямбда-цигалотрином</i>									
		імідаклоп рид, 250 г/л +	0,06	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	20	10	4	2 (високо стійкий у воді)
		лямбда- цигалотр ин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 250 г/л +	0,06	томати ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	20	10	4	
		лямбда- цигалотр ин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 250 г/л +	0,06	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 80 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоп рид, 250 г/л +	0,06	яблука ²	0,07* (межа визн. ТШХ- 0,07)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	30	10	4	

		лямбда-цигалотрин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		імдаклопрід, 250 г/л +	0,06	яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	0,2	0,005	0,007/заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 80 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
205	Десфілар, ЗП	манкоцеб, 680 г/кг +	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	0,01	0,01/заг.-сан.	0,1	14	7	3	3
		цимоксаніл, 45 г/кг	0,05		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	1,0	0,03	0,06/сан.-токс.					
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не погр.	не погр.	не нормується	не нормується				
206	Дефолт, РК	клопиралід, 300 г/л	0,15	зерно хлібних злаків ²	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	2,0/	0,01	0,04/сан.-токс.	0,1	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
207	Дехсанін, РК	гліфосату калієва сіль, 663 г/л	0,01	осіння та весняна обробка землі несільськогосподарського призначення, землі під пар	не погр.	1,0/	0,01	0,02/сан.-токс.	0,5/трансл.	не погр.	7	3	3 (високостійкий у воді)
208	Деліс 100 ЕС, КЕ	дельтаметрин, 100 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,003	0,006/сан.-токс.	0,01/трансл.	20	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
		ріпак (насіння)		ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)					20	не погр.	3	
		ріпак (сіль)								-	-	-	
		буряки цукрові			0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)					30	7	3	

209	Детис-ф-Люкс 25 ЕС, КЕ	дельтаметрин, 25 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,003	0,006/ сан.-токс.	0,01/ трансл.	20	не погр.	3	2 (небезпечний при потрап-лянні на слизові оболонки очей)
			соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	30					не погр.	3		
			соняшник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	-					-	-		
			морква	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	20					не погр.	3		
210	Джек Пот, КЕ			Контроль за дифеноконазолом та пенконазолом									
		дифеноко назол, 200 г/л +	0,002	виноград	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	3 (небезпечний при потрап-лянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		пенконаз ол, 100 г/л	0,007		0,4** (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,8	/0,02	0,003/ заг.-сан.	/0,1				
		дифеноко назол, 200 г/л +	0,002	виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		пенконаз ол, 100 г/л	0,007		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,8	/0,02	0,003/ заг.-сан.	/0,1				
211	Дженфілд БТ, КЕ	піраклост робін, 300 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	не погр.	3	3
212	Джерба, ВГ			Контроль за дикамбою									
		нікосульфурон, 150 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрап-лянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		дикамба, 600 г/кг	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
		нікосульфурон, 150 г/кг +	2,0	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	-	-	-	
		дикамба, 600 г/кг	0,004		не погр.*	1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
213	Джип, КС	флуазинам, 500 г/л	0,01	томати	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2 небезпечний при потрап-	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,2	10	7	3	2 (високостійкий у воді)

				томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	лягні на шкіру				-	-	-	та пруні)
2 1 4	Дисафлор 440, КЕ			Контроль за дикамбою									
		дикамба, 422 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрап-лянні на слизові оболонки очей, високотійкий у воді)
		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	
		флорасулам, 18 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		дикамба, 422 г/л +	0,004	кукурудза (олія)	не погр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 18 г/л	0,05		не погр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
2 1 5	Диктагор, КС			Контроль за імідаклопридом та альфа-циперметрином									
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	3	2
		альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.					
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	
		альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.					
2 1 6	Дифуре Про, КЕ			Контроль за дифенокназолом та пропіконазолом									
		дифенокназол, 150 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	2 (небезпечний при потрап-лянні на слизові
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн.	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				

					ГРХ-0,05)								оболонки очей, алерген, високоспійкий у воді та ґрунті)
		дифенон азол, 150 г/л +	0,002	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3	30	7	3	
		пропікон азол, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	0,001	0,15/ орг.	0,2				
217	Дівіксон, КЕ	флорпіра уксифенбензил, 25 г/л	0,02	рис ¹	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	0,15 (межа визн. ВЕРХ-0,07)	0,006 (межа визн. ВЕРХ-0,006)	0,001/ (межа визн. ВЕРХ-0,001) заг.-сан.	0,14 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	не погр.	не погр.	3	3
218	Дікогер 6 Супер, РК			Контроль за 2М-4Х та дикамбою									
		2М-4Х диметил аміна сіл, 660 г/л (у кисло-тн му еквівалент) +	0,008	кукурудза (зерно)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,02	0,003/ орг.	0,02	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високоспійкий у воді)
		дикамби диметил аміна сіл, 90 г/л (у кисло-тн му еквівалент)	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансп.				
		2М-4Х диметил аміна сіл, 660 г/л (у кисло-тн му еквівалент) +	0,008	кукурудза (олія)	не погр.	1,0/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,02	0,003/ орг.	0,02	-	-	-	
		дикамби диметил аміна сіл, 90 г/л (у кисло-тн му еквівалент)	0,004		не погр.*	1,0/	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансп.				
219	Дімба Форте, ВГ			Контроль за дикамбою та нікосульфуроном									
		дикамба, 600 г/кг +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансп.	не погр.	не погр.	3	3 (високоспійкий у воді)
		нікосульфурон, 120 г/кг	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	0,0	0,01	0,001/ заг.-сан.	0,2				

		дикамба, 600 г/кг +	0,004	кукурудза (оля)	не погр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	-	-	-	
		нікосуль фурон, 120 г/кг	2,0		не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
2 2 0	Дикам ба 480 SL, PK (торгов а назва Мінсрв /Океал 480 SL, PK)	дикамба, 480 г/л	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				кукурудза (оля)	не погр.*					-	-	-	
2 2 1	Док Про, ЗП			<i>Контроль за цимоксанілом та міклобутанілом</i>									
		цимоксан їд, 300 г/кг +	0,05	картопля ²	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	7	3	3 (високо стійкий у грунті)
		міклобута ніл, 200 г/кг	0,03		0,06** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мігр, фітотокс				
		цимоксан їд, 300 г/кг +	0,05	соє (зерно)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не погр.	3	
		міклобута ніл, 200 г/кг	0,03		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мігр, фітотокс				
		цимоксан їд, 300 г/кг +	0,05	соє (оля)	не погр.	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		міклобута ніл, 200 г/кг	0,03		не погр.	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мігр, фітотокс				
2 2 2	Дорпан 480, KE	хлорпіри фос, 480 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,3 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	10	4	2
2 2 3	Дог, KE			<i>Контроль за пропіконізолом</i>									
		пропікон азол, 250 г/л +	0,04	соєвпшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	2 (небезп ечний при попаді лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		пропікон азол, 250 г/л +	0,04	соєвпшник (оля)	не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	

		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				уводі та фрунті)
		пропікон азол, 250 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		пропікон азол, 250 г/л +	0,04	соя (олія)	не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
2 2 4	Дятел, КЕ			Контроль за хлорпірифосом									
		хлорпіри фос, 500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,3 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	не погр.	4	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
		ципермет рин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
2 2 5	Еванс, КС	лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	20	не погр.	4	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					14	не погр.	4	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				буряки цукрові	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					20	10	4	
				горох	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)					14	10	4	
2 2 6	Еверест , ВГ	флукарба зону натрієва сіль, 700 г/кг	0,025	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,05/ сан.-токс.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
2 2 7	Евіто Т, КС			Контроль за флуоксастробіном та тебуконазолом									
		флуоксас тробін,	0,007	соняшник (насіння)	0,05* (межа	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.	30	не погр.	3	2 (небезп

		180 г/л +			визн. ВЕРХ- 0,05)							счний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді та пруні)			
		тебуконаз ол, 250 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0						
		флуоксас тробін, 180 г/л +	0,007	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.	-	-		-		
		тебуконаз ол, 250 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0						
		флуоксас тробін, 180 г/л +	0,007	соє (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.	30	не погр.		3		
		тебуконаз ол, 250 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0						
		флуоксас тробін, 180 г/л +	0,007	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.	-	-		-		
		тебуконаз ол, 250 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0						
		Контроль за клетодимом													
		2 2 8	Европо ши, КЕ												
				клетодим, 140 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				хізалофоп -п-епил, 70 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8				
клетодим, 140 г/л +	0,01			соняшник (олія)	не погр.	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-			
хізалофоп -п-епил, 70 г/л	0,01				не погр.	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8						
клетодим, 140 г/л +	0,0			ріпак (насіння)	0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3			
хізалофоп -п-епил, 70 г/л	0,01				0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8						
клетодим, 140 г/л +	0,01			ріпак (олія)	не погр.	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-			
хізалофоп -п-епил, 70 г/л	0,01	не погр.	/0,2		/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8								
клетодим, 140 г/л +	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТІХ- 0,05)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3					

		хізалофоп -п-епіл, 70 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8					
		клетодим, 140 г/л +	0,0	соя (олія)	не погр.	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-		
		хізалофоп -п-епіл, 70 г/л	0,01		не погр.	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8					
		клетодим, 140 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3		
		хізалофоп -п-епіл, 70 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8					
		клетодим, 140 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3		
		хізалофоп -п-епіл, 70 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8					
2 2 9	Егіда, КС	мезотріон ,480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-		
2 3 0	Екзор, ТН	тіаметокс ам, 600 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-		
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	не погр.		
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-		
2 3 1	Екран Є- Форму ла ЕС, КЕ	S- метолахл ор, 945 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий увод)	
		антидот беноксак ор, 15 г/л	не погр.		не погр.									не погр.
			S- метолахл ор, 945 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	-	-		-
			антидот беноксак ор, 15 г/л	не погр.		не погр.								
2 3 2	Ексірел ь, СЕ	ціантрані ліпрол, 100 г/л	0,002	черешня	0,05** (межа визн.	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3	20	7	3	2 (небезп ечний	

				черешневи й сік	ВЕРХ- 0,05) 0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					-	-	-	при попрап лянні на шкіфу та слизові оболон ки очей)
2 3 3	Експре с® Голд, ВГ			<i>Контроль за трибенурон-метилом</i>									
		трибенур он-метил, 562 г/кг +	0,005	сояшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,1	0,003	0,06/ заг.-сан.	0,01	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
		тіфенсуль фурон- метил, 187,5 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1	0,01	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		трибенур он-метил, 562 г/кг +	0,005	сояшник (олія)	не погр.*	0,1	0,003	0,06/ заг.-сан.	0,01	-	-	-	
		тіфенсуль фурон- метил, 187,5 г/кг	0,01		не погр.*	0,1	0,01	0,01/ сан.-токс.	0,05				
2 3 4	Екстра біт,КЕ	S- метолахл ор,960 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,025)	0,5	0,02	0,02/ сан.-токс.	0,02	не погр.	15	7	3 (небезп ечний при попрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий увод)
2 3 5	Екстра корн, СЕ			<i>Контроль за тербутилазином та S-метолахлором</i>									
		тербутила зин,187,5 г/л +	0,003	сояшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,0	0,05	0,005/ заг.-сан.	0,04	не погр.	не погр.	7	2 (небезп ечний при попрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий увод)
		S- метолахл ор,312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5	0,02	0,02/ сан.-токс.	0,02				
		тербутила зин,187,5 г/л +	0,003	сояшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
		S- метолахл ор,312,5 г/л	0,01		не погр.*								
2 3 6	Елатус PIA358 ЕС,КЕ			<i>Контроль за пропіконазолом та солитенолом</i>									
		пропікон азол, 208,33 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків ¹	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5	0,001	0,15/ орг.	0,2	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на слизові
		солитенол ,83,3 г/л +	0,01		0,04** (межа визн.)	0,1 (межа визн.)	0,002 (межа визн.)	0,001/ (межа визн.)	0,03 (межа визн.)				

					ВЕРХ-0,04)	ВЕРХ-0,05)	ВЕРХ-0,0016)	ВЕРХ-0,001) заг.-сан.	ВЕРХ-0,02)				оболонки очей, алерген, високостійкий у воді та ґрунті)
		ципрокон азол, 66,67 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
237	Елегант 2 FD, СЕ	2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	не погр.	не погр.	3	3
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05	кукурудза (олія)	не погр.	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	-	-	-	
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001		не погр.	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05	сorgho	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	не погр.	не погр.	3	
		2,4-Д2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
238	Еліг Хантер Duo, КС	клотіанідин, 150 г/л +	0,08	Контроль за клотіанідином та лямбда-цигалотрином									
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансп., фітотокс.	40	не погр.	4	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		клотіанідин, 150 г/л +	0,08		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003	ріпак (олія)	не погр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансп., фітотокс.	-	-	-	
		клотіанідин, 150 г/л +	0,08		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

239	Ельмір е100, KE (Elmire 100, EC)	біфентрин, 100 г/л	0,02	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1	30	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді та прунті)
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
240	Ембрел ін 140 SC, KC			Контроль за ізоіпріазамом та дифеноконазолем									
		ізоіпріазам , 100 г/л +	0,01	вишні	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,5	/0,005	0,001/ заг.-сан.	/0,4	20	7	3	2 (високо стійкий у воді та прунті)
		дифеноко назол, 40 г/л	0,002		0,04* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		ізоіпріазам , 100 г/л +	0,01	вишневий сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,5	/0,005	0,001/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		дифеноко назол, 40 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		ізоіпріазам , 100 г/л +	0,01	персики	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,5	/0,005	0,001/ заг.-сан.	/0,4	30	7	3	
		дифеноко назол, 40 г/л	0,002		0,08* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		ізоіпріазам , 100 г/л +	0,01	персиковий сік	не погр.	/0,5	/0,005	0,001/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		дифеноко назол, 40 г/л	0,002		0,08* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
241	Еместо Кванту м 3735 FS, TH			Контроль за клотіанідом та пенфлуфеном									
		клотіанід ин, 207 г/л +	0,08	картопля	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, флїтокс .	не погр.	не погр.	3 (при оброб ці бульбі прунту) не погр. (при оброб ці бульб)	2 (високо стійкий у воді та прунті)
		пенфлуф ен, 66,5 г/л	0,02		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	0,06/ водн.- мігр.				
242	Еместо Кванту м, 2735 FS, TC			Контроль за пенфлуфеном та клотіанідом									
		пенфлуф ен, 55,5 г/л +	0,02	картопля ²	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	0,06/ водн.- мігр. (межа визн. ВЕРХ- 0,03)	50	7	3	2 (високо стійкий у воді та прунті)
		клотіанід ин, 207 г/л	0,08		0,05 (межа визн.)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл,				

					ВЕРХ-0,05)				фітотокс.				
2 4 3	ЕнВіАг ро, КС	спіродикл офен, 240 г/л	0,001	яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,2	0,0007	0,002/ сан-токс.	0,4	40	7	3	3
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)								
2 4 4	Енжіо 247SC, КС	тіаметокс ам, 141 г/л +	0,02	<i>Контроль за тіаметоксами та лямбда-цигалотрином</i>									
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5 аерозол ь	0,03	0,04/ сан-токс.	0,1	20	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру)
					0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	0,001	0,01/ сан-токс.	0,05				
2 4 5	Еліс, ВГ			<i>Контроль за фимоксидом</i>					<i>Контроль за фимоксидом, цимоксавілом</i>				
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соєвишник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	1,0	0,03	0,06/ сан-токс.	0,04	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
		фамоксад он, 250 г/кг	0,01		0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,4				
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соєвишник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0	0,03	0,06/ сан-токс.	0,04	-	-	-	
		фамоксад он, 250 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,4				
2 4 6	Естада 488, КС	мілі гідроксид, 488 г/л	0,05 (по мілі)	яблука	5,0* (межа визн. ААС-0,5)	0,5/ 0,03- максим альна разова; 0,005- середнь о- добова/		1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові і оболон ки очей)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					-	-	-	
				виноград	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					30	7	3	
				виноградни й сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					-	-	-	

				томати	5,0* (межа визн. AAC-0,5)					8	7	3	
				томатний сік	5,0* (межа визн. AAC-0,5)					-	-	-	
2 4 7	Етофол ,КС	етофумез ат,500 г/л	0,1	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ПШХ- 0,2)	/0,1	/0,01	0,05/ заг.-сан.	/0,15	не погр.	7	3	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, алерген)
2 4 8	Ефімер, КЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексильовим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2- етил- гексильов ий ефір, 905 г/л	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
				кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ- 0,015)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
2 4 9	Єврайт, РК			Контроль за імізамоксом та імізапіром									
		імізамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високо- стійкий у воді)
		імізапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
		імізамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
імізапір, 15 г/л	1,0	не погр.*	/1,0		/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.						
2 5 0	Євро БТ,РК			Контроль за імізамоксом та імізапіром									
		імізамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)

		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				та грунт)
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
2 5 1	ЄВРО- 3315			<i>Контроль за імазамоксом та імазапіром</i>									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та грунт)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
2 5 2	Євро- Ленд (Є/ЛЛ- 48), РК			<i>Контроль за імазамоксом та імазапіром</i>									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та грунт)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпе- чний при попап- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпе- чний при попап- лянні	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мігр.				

						на шкіру							
253	Життедар, КС	тіабендазол, 50 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		флупірафол, 50 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.				
254	Жокей, КС	ципроконазол, 80 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01	30	7	3	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
255	Жук OFF, КС	клотанідин, 200 г/л +	0,08	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансп., фітотокс.	20	10	4	3 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
256	Забрато, КС	флупірафол, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	30	не погр.	не погр.	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високо стійкий у воді та ґрунті)
257	Зарниця, КС	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		епоксиконазол, 187,5 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				

2 5 8	Захисник Екстра, КС			<i>Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат-метилу і карбендазиму) та флутриафолом</i>		<i>Контроль за тіофанат-метилом та флутриафолом</i>			<i>Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом, флутриафолом</i>				
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	40	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		флутриафол, 190 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не погр.*	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не погр.	3	
		флутриафол, 150 г/л	0,002		не погр.*	/0,3	/0,001	0,006/ сан.-токс.	/0,1				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		не погр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТПХ-0,05)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не погр.	3	
		флутриафол, 190 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
2 5 9	Захисник, КС			<i>Контроль за тіофанат-метилом (1), карбендазимом (2)</i>									
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	яблука, груші	0,5* (1) (межа визн. ТПХ-0,08)	0,1/ (1)	/0,01 (1)	0,05/ (1) орг.	/0,4 (1)	30	7	3	3 (високо стійкий у воді)
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (2) (межа визн. ТПХ, ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1 (2)				

				яблучний, грушевий соки	0,03*(2) (межа визн. ПШХ, ВЕРХ- 0,03)					-	-	-	
2 6 0	Зенкор Ліквід 600 SC, КС	метрибуз ин, 600 г/л	0,004	горох	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мікр.	не погр.	7	3	3 (високо стійкий у воді)
2 6 1	Зеро, КЕ	хізалофоп -н-етил, 90 г/л	0,01	картопля ²	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	7	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на шкіру)
2 6 2	Злаквід ин, ВГ	сульфо- сульфури н, 750 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,005* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/1,5	/0,001	0,02/ сан.-токс.	0,03/ водн- мікр.	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
2 6 3	Знахар, КЕ	дифенок назол, 250 г/л	0,002	виноград	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді та пруні)
				виноградни й сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
2 6 4	Зорбек Вінабрі я, КС			Контроль за фоліетом									
		оксапіліп ролін, 10 г/л +	0,1	виноград	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,008)	0,0002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,0002)	/0,3 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	40	7	3	3 (високо стійкий у воді та пруні)
		фоллет, 500 г/л	0,01		0,03 (межа визн. ВЕРХ- 0,03)	0,5/	/0,001	0,04/ орг.	/0,3				
		оксапіліп ролін, 10 г/л +		виноградни й сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	-	-	-					
фоллет, 500 г/л		0,005 (межа визн. ВЕРХ- 0,005)											
2 6 5	Зорбек Інканті я, СЕ			Контроль за фамоксидом									
		оксапіліп ролін, 30 г/л +	0,1	картопля	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,02	0,0002/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	3 (високо стійкий у воді та пруні)
фамоксид он, 330 г/л	0,01	0,02* (межа	/1,0		/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4						

					визн. ВЕРХ- 001)								
		оксапіагіп ролін, 30 г/л +	0,1	цїбуля (ріпка)	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 001)	/1,0	/0,02	0,0002/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	
		фамоксад он, 330 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 001)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		оксапіагіп ролін, 30 г/л +	0,1	томати	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 001)	/1,0	/0,02	0,0002/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	
		фамоксад он, 330 г/л	0,01		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 002)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		оксапіагіп ролін, 30 г/л +	0,1	томатний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 001)	/1,0	/0,02	0,0002/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		фамоксад он, 330 г/л	0,01		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 001)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
2 6 6	Імазо- Глоб, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 05)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 025)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
2 6 7	Імазокс с40SL, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 025)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
2 6 8	ІМІ- ВІТ, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 05)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 025)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
2 6 9	Імідж, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн.)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо

					ВЕРХ-0,5)								стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
270	Імідон Флоу, РК	імдаклоп рид, 200 г/л	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	20	3	1	2 (небезпечний при потрап- ленні на слизові оболон- ки очей, високос- тійкий у воді)
271	Імісід, БТ, ТН	імдаклоп рид, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високос- тійкий у воді)
272	Імпекс Дуо, РК			Контроль за імазамоксом та імазагіром									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високос- тійкий у воді)
		імазагір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпечний при попа- дленні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазагір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпечний при попа- дленні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
273	Імперіал, РК			Контроль за імазамоксом та імазагіром									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високос- тійкий у воді та грунті)
		імазагір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпечний при попа- дленні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазагір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпечний при	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				

						потрап лянні на шкіру							
2 7 4	Імпреза ,РК			<i>Контроль за імізамоксом та імазіпіром</i>									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді та грунті)
		імазіпір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мір.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазіпір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мір.				
2 7 5	Індіго, ТН	імідаклоп рид, 600 г/л	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
2 7 6	Ін Сег SC, KC	імідаклоп рид, 600 г/л	0,06	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)
2 7 7	Іназума , ВГ			<i>Контроль за ацетаміпридом та лямбда-цигалотрином</i>									
		ацетаміпр ид, 100 г/кг +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	40	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді)
		лямбда- цигалотр ин, 30 г/кг	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпр ид, 100 г/кг +	0,01	ріпак (олія)	не погр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	

	лямбда-цигалопрін, 30 г/кг	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	ацетаміпрід, 100 г/кг +	0,01	соняшник ¹ (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	30	не погр.	4	
	лямбда-цигалопрін, 30 г/кг	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	ацетаміпрід, 100 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	-	-	-	
	лямбда-цигалопрін, 30 г/кг	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	ацетаміпрід, 100 г/кг +	0,01	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	20	10	4	
	лямбда-цигалопрін, 30 г/кг	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	ацетаміпрід, 100 г/кг +	0,01	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	-	-	-	
	лямбда-цигалопрін, 30 г/кг	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
	ацетаміпрід, 100 г/кг +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	30	не погр.	4	
	лямбда-цигалопрін, 30 г/кг	0,003		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				

					ГРХ-0,01)	при потрап- лянні на шкіру							
278	Інспектор, ВГ	імдакюпрід, 700 г/кг	0,06	капуста ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	14	7	3	3 (високостійкий у воді)
279	Інспектор, КЕ	Контроль за ацетаміпрідом та лямбда-цигалотрином											3 (небезпечний при потрап-лянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	40	не погр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не погр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	10	4	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	4	

		лямбда-цигалопрін, 50 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	соєвий шпик (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалопрін, 50 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	30	не погр.	4	
		лямбда-цигалопрін, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	соє (олія)	не погр.*	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалопрін, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	30	не погр.	4	
		лямбда-цигалопрін, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпрід, 150 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не погр.*	0,2	0,003	0,02/сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалопрін, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потрапленні	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				

						на шкіру							
280	Інтерн, КЕ	пріміфо с-метил, 500 г/л	0,01	вишні	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	2,0/	/0,001	0,01/ орг.	0,5/ трансл.	20	7	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				вишневий сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				черешні	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					20	7	3	
				черешневий сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
281	Інферио, ВГ	сірка, 800 г/кг	не нормується	яблука	не погр.**	6,0/	/0,07	не нормується	не нормується	30	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей)
				яблучний сік	не погр.**					-	-	-	
282	Іткен РК270, РК	підразид малеїнової кислоти, 270 г/л	0,05**	картопля	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)	/1,5***	/0,02***	0,004****/ заг.-сан.	/1,0****	50	7	3	2 (високо стійкий уводі)
		(у вигляді калійної солі, 360 г/л)		цибуля (ріпка)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)					40	7	3	
283	Каваді, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий уводі та пруні)
284	Кайліс, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,08	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі та пруні)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
285	Кайіман, КЕ			Контроль за хізілофоп-п-етилотм та кетодимом									
		хізілофоп-п-етил,	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3 (небезп

		60 г/л +			визн. ВЕРХ- 0,05)								сечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
		клетодим, 120 г/л	0,01		0,1*	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1				
		хізалофоп -п-епил, 60 г/л +	0,01	соє (олія)	не погр.*	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	-	-	-	
		клетодим, 120 г/л	0,01		не погр.*	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1				
		хізалофоп -п-епил, 60 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	
		клетодим, 120 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1				
		хізалофоп -п-епил, 60 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не погр.*	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	-	-	-	
		клетодим, 120 г/л	0,01		не погр.*	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1				
2 8 6	Калігул а, КС	фенпрок симат, 280 г/л	0,01	соє (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,3)	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
2 8 7	Каліпсо 480SC, КС	тіаклопри д, 480 г/л	0,006	суніця	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мір, фітотокс .	15	7	3	2 (високо стійкий у воді)
2 8 8	Каліпсо Спрей AL, КР	тіаклопри д, 0,015%	0,006	смородина	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мір, фітотокс .	60	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				смородино вий сік	не погр.					-	-	-	
2 8 9	Каліф, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	7	3	3 (небезп сечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
2 9 0	Кальм а, КЕ	тринекса пак-епил, 175 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	30	не погр.	3	3 (небезп сечний при пограп лянні на шкіру, алерген ,

													високо- стійкий у воді)
291	Камеліо т, КЕ	міклобута ніл, 250 г/л	0,03	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,7	0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мігр., фітотокс	30	7	3	3
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					-	-	-	
				томати	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)								
				томатний сік	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)					-	-	-	
292	Камзол , РК	метконез ол, 60 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,2	0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн- мігр.	30	не попр.	3	3 (високо- стійкий у воді та пруді)
				ріпак (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ- 0,02)					50	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
293	Каноні р Ультра FS, TH	імідаклоп рид, 600 г/л	0,06	соєвишник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	не попр.	не попр.	не попр.	2 (високо- стійкий у воді)
				соєвишник (олія)	не попр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не попр.	не попр.	не попр.	
				кукурудза (олія)	не попр.					-	-	-	
294	Кантаріс, TH	Контроль за прохлоразом та тіаметоксамом											2 (високо- стійкий у воді та пруді)
		прохлора з, 150 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	0,1	0,001	0,06/ сан.-токс.	0,3	не попр.	не попр.	не попр.	
		тіаметокс ам, 250 г/л +	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5 аерозол ь	0,03	0,04/ сан.-токс.	0,1				
		флутріаф ол, 50 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	0,1 небезпе- чний при попаді ляння на шкіру	0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				

2 9 5	Кап- Лайф, ВГ	каптан, 800г/кг	0,1	соя(зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3/	/0,01	0,2/ сан.-токс.	/1,0	30	не попр.	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на слизові оболон ки очей)
				соя(олія)	не попр.*					-	-	-	
2 9 6	Капіта л, КС			Контроль за азокси-тробином, ципроконазолом та епоксиконазолом									
		азокси-тр обін, 150 г/л +	0,03	соя(зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді та прудні)
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азокси-тр обін, 150 г/л +	0,03	соя(олія)	не попр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		не попр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		не попр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азокси-тр обін, 150 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не попр.	3	
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азокси-тр обін, 150 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не попр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		не попр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		не попр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азокси-тр обін, 150 г/л +	0,03	соняшник №(насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не попр.	3	
		ципрокон азол, 60	0,002		0,2* (межа	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				

		г/л +			визн. ГРХ-02)								
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азоксистр обін, 150 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		не погр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азоксистр обін, 150 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азоксистр обін, 150 г/л +	0,03	кукурудза ¹ (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		азоксистр обін, 150 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 60 г/л +	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		епоксико назол, 50 г/л	0,004		не погр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
2 9 7	Капо, КС			<i>Контроль за азоксистробином та ципроконазолом</i>									
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруні)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				

		азоксиспр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
2 9 8	Капуг Екстра, РК	гліфосату калійна сіль, 663 г/кг, в кислотну му еквівален ті-540 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
2 9 9	Капуг, РК	гліфосату ізопропіл амінна сіль, 480 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
3 0 0	Караба с, КС	карбендаз им, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не погр.	4	3
3 0 1	Карате Зеон 050 CS, СК	лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30	не погр.	4	2
3 0 2	Карате Плюс ЕС, КЕ	біфенпри н, 100 г/л	0,02	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді та пирні)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 0 3	Карбен азол, КС			Контроль за карбендазіму та ципроконазолом									
		карбендаз им, 300 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ТЦХ- 0,3)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді та пирні)
		ципрокон азол, 66 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		карбендаз им, 300 г/л +	0,01	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ТЦХ- 0,4)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.		-	-	-	
		ципрокон азол, 66 г/л	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.					
	Карбу Дуо			Контроль за лениціом та		Контроль за лениціом		Контроль за лениціом та					3 (високо)

304	Актив, ВГ			трифлулсульфурон-метилом				трифлулсульфурон-метилом					стійкий у воді)
		ленацил, 714 г/кг +	0,01	буряки цукрові	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,5/	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/1,0	не погр.	7	3	
		трифлулсульфурон-метил, 71 г/кг	0,05		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.-сан.	/0,1				
305	Карібу, ВГ	трифлулсульфурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3	3 (високо стійкий у воді)
306	Каріоліс, ГН			Контроль за флуодіоксонилом та металаксилом-М									3 (високо стійкий у воді)
		флуодіоксоніл, 25 г/л +	0,015	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флуодіоксоніл, 25 г/л +	0,015	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не погр.**	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флуодіоксоніл, 25 г/л +	0,015	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флуодіоксоніл, 25 г/л +	0,015	ріпак (олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не погр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
307	Карнеоль™, КС			Контроль за калієм та фосфористою кислотою									2 (алерген)
		каптан, 360 г/л +	0,1	яблука	0,03* (межа визн. ТПХ-0,03)	0,3/	/0,01	0,2/ сан.-токс.	/1,0	40	7	3	
		фосфіт калію, 660 г/л (в еквіваленті фосфористі кислоти-440 г/л)	2,0		0,2* (межа визн. ФМ-0,1)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5				
			0,1	яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,3/	/0,01	0,2/ сан.-токс.	/1,0	-	-	-	
			2,0		0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5				

					визн. ФМ- 0,05)								
3 0 8	Картеа/ Kartes, КС			Контроль за клотінідіном та лямбда-цигалотрином									
		клотінід ин, 150 г/л +	0,08	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	40	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		клотінід ин, 150 г/л +	0,08	ріпак (олія)	не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	-	-	-	
лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру		/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05						
3 0 9	Кассен т-400, КС			Контроль за імідаклетридом									
		імідаклетр рид, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	35	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді)
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклетр рид, 300 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	40	не погр.	4	
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклетр рид, 300 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

		імдаклопрід, 300 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	40	не погр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імдаклопрід, 300 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не погр.*	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
3 1 0	Квад Глоб 150, РК	дикавга-іон, 150 г/лу формі дикавг дибромід у	0,002	соя ¹ (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)	0,05/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,003	0,02/ орг.	0,2	6	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на шкіру)
				соя (олія)	0,1* (межа визн. СФ-0,05)					-	-	-	
				ріпак ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)					7	не погр.	3	
				ріпак (олія)	0,5* (межа визн. СФ-0,5)					-	-	-	
				соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)					6	не погр.	3	
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. СФ-0,05)					-	-	-	
				зерно хлібних злаків ¹	0,4* (межа визн. СФ-0,4)					7	не погр.	3	
3 1 1	Квадріс Топ325 SC, KC			Контроль за азоксистробіном та дифеноконазолом									
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	14	7	3	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	часник	10,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	14	7	3	

		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,5 (межа визн. ГРХ-0,5)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
3 1 2	Квелек с270, ВГ			Контроль за галауксифен-метилом та флорасуламом									
		галаукси фен- метил, 100 г/кг +	0,02	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,006 (межа визн. ВЕРХ- 0,004)	0,04/ (межа визн. ВЕРХ- 0,006) сан.-токс.	/0,3 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)
		флорасул ам, 100 г/кг	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		антидот клоквінто сегу формі кислоти, 70,8 г/кг	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
3 1 3	Квін Стар Макс, КЕ	хізалофоп -г-етил, 125 г/л	0,01	цвібуля (ріпка)	0,4* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	7	3	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
		3 1 4	Кельві н Плюс, ВГ			Контроль за дикамбаю та нікосульфуроном							
дифлуфе нзопір, 170 г/кг +	0,04			кукурудза (зерно)	0,4 (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	7	3	2 (високо стійкий уводі)
дикамба, 424 г/кг +	0,004				0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
нікосуль фурон, 106 г/кг	2,0				0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
дифлуфе нзопір, 170 г/кг +	0,04			кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
дикамба, 424 г/кг +	0,004				не погр.*	1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
нікосуль фурон, 106 г/кг	2,0				не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
3 1 5	Кілеза, КС	мезотріон , 100 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	

													кличей, високо- стійкий у воді)
3 1 6	Кіно Плюс, ТН			Контроль за флуксатіроксидами									
		флуксапі роксида, 33,3 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,7	/0,01	0,004/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3 (небезп- ечний при попада- нні на слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді та пиріт)
		трифлора- зол, 33,3 г/л +	0,025		0,025* (межа визн. ГРХ- 0,025)	/0,2	/0,002	0,001/ заг.-сан.	0,05/ водн.- мікр.				
		флудіокс- оніл, 33,3 г/л	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
3 1 7	Кіпер, КС			Контроль за тіабендазолом та тебуконазолом									
		тіабендаз- ол, 250 г/л +	0,1	соняшник ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	30	не погр.	3	3 (високо- стійкий у воді та пиріт)
		тебуконаз- ол, 162,5 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіабендаз- ол, 250 г/л +	0,1	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	-	-	-	
		тебуконаз- ол, 162,5 г/л	0,03		не погр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіабендаз- ол, 250 г/л +	0,1	соє (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	30	не погр.	3	
		тебуконаз- ол, 162,5 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіабендаз- ол, 250 г/л +	0,1	соє (олія)	не погр.	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	-	-	-	
		тебуконаз- ол, 162,5 г/л	0,03		не погр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіабендаз- ол, 250 г/л +	0,1	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	30	не погр.	3	
		тебуконаз- ол, 162,5 г/л	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		тіабендаз- ол, 250 г/л +	0,1	ріпак (олія)	не погр.	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	-	-	-	

		тебуконаз ол, 162,5 г/л	0,03		не погр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
3 1 8	Кларк, ВГ	азоксистр обін, 500г/кг	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі)
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					30	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					30	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				виноград	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					30	7	3	
				виноградни й сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					-	-	-	
3 1 9	Клагге р, КЕ	кломазон, 480г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 2 0	Клемат іс, СК	кломазон, 360г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі та грунт)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 2 1	Клессо БТ, КС			Контроль за клофентезином									
		клофенте зин, 500	0,004	соя (зерно)	0,05* (межа	/1,0	/0,002	0,01/ сан-	/0,07	40	не погр.	3	3

		г/л +			визн. ВЕРХ- 0,05)			токс., заг.-сан.					
		феніпрокс симат, 50 г/л	0,01		0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,3)	0,05	0,005	0,003/ заг.-сан.	0,03				
		клофенте зин, 500 г/л +		soя (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
		феніпрокс симат, 50 г/л			не погр.*								
3 2 2	Клінеф ект, ВГ	імазамокс , 700 г/кг	3,0	soя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	1,0	0,04	0,06/ заг.-сан.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий увод)
				soя (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 2 3	Клінеф Макс, ВГ			<i>Контроль за римсульфураном та тіфенсульфуран-метилом</i>									
		римсуль фуран, 250 г/кг +	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	1,0	0,01	0,002/ заг.-сан.	0,03	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
		флорасул ам, 80 г/кг +	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0	0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		тіфенсуль фуран- метил, 150 г/кг	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	0,1	0,01	0,01/ сан.-токс.	0,01				
		римсуль фуран, 250 г/кг +	0,02	кукурудза (олія)	не погр.	1,0	0,01	0,002/ заг.-сан.	0,03	-	-	-	
		флорасул ам, 80 г/кг +	0,05		не погр.	1,0	0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		тіфенсуль фуран- метил, 150 г/кг	0,01		не погр.	0,1	0,01	0,01/ сан.-токс.	0,01				
3 2 4	Клюдек сПро, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	soя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,5	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі та прупні)
				soя (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 2 5	Клюм БТ, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	soя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,5	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
				soя (олія)	не погр.*					-	-	-	

3 2 6	Кломазон 480, КЕ (Chlomazon 480 ЕС)	кломазон, 480 г/л	0,04	ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 2 7	Кломап, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 2 8	Клюпі-200, КС	клюданідин, 200 г/л	0,08	картопля ²	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс.	20	7	3	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
3 2 9	Колібріс, КС			Контроль за тіаклопридом та новалуроном									
		тіаклоприд, 280 г/л +	0,006	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мікр. фітотокс.	14	7	3	3 (високостійкий у воді)
		новалурон, 120 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		тіаклоприд, 280 г/л +	0,006	яблучний сік	0,06* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мікр. фітотокс.	-	-	-	
		новалурон, 120 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
3 3 0	Колосаль Про, МЕ			Контроль за пропіконазолом та тебуконазолом									
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	2 (високостійкий у воді)
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соняшник (олія)	не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	горох (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2** (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

					визн. ГРХ-0,2)								
3 3 1	Колът 690,ЗП /Тіас 690,ЗП	Контроль за манкоцебом та ЕТС											
		диметомо рф, 90 г/кг +	0,1	томати ²	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	20	7	3	3 (високо стійкий уводі)
		манкоцеб , 600 г/кг	0,005		0,5* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		диметомо рф, 90 г/кг +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		манкоцеб , 600 г/кг	0,005		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан., орг.	/0,1				
		ЕТС (метаболі т манкоцеб у)	0,003	томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	не погр.	не погр.	не нормуєт ься	не нормуєт ься	-	-	-	
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					-	-	-	
3 3 2	Коман дор Гранд, ТН	Контроль за імідаклопридом											
		альфа- ципермет рин, 50 г/л +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий уводі)
		імідаклоп рид, 500 г/л	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		альфа- ципермет рин, 50 г/л +	0,005	соєвишник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	не погр.	
		імідаклоп рид, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		альфа- ципермет рин, 50 г/л +	0,005	соєвишник (олія)	не погр.	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-	

		імдактоп рид, 500 г/л	0,06		не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04					
		альфа- ципермет рин, 50 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при попапа лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	не погр.		
		імдактоп рид, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04					
		альфа- ципермет рин, 50 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не погр.	/0,1 небезпе чний при попапа лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	-	-	-		
		імдактоп рид, 500 г/л	0,06		не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04					
3 3 3	Комма нд 48, КЕ	кломезон, 480 г/л	0,04	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	2	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-		
				рис	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3		
3 3 4	Конвой , КЕ	тебуконаз ол, 167 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруні)	
		триаде нол, 43 г/л +	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ- 0,026)	/0,5	/0,01	/0,05 сан.-токс.	0,02/ трансл.					
		спіроксам ін, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2 небезпе чний при попапа лянні на шкіру	/0,03	0,02/ сан.-токс.	/0,4					
3 3 5	Конвізо ОД, МД	Контроль за формсульфураном та тіснкарбон-метилом												
		форам- сульфура н, 50 г/л +	0,5	буряки цукрові	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,5	/0,03	0,002/ заг.-сан.	/0,08	не погр.	7	3	3 (небезп ечний при попапа лянні на слизові оболон ки очей, алерген	
		тіснкарба зон- метил, 30 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,02	0,01/ заг.-сан.	/0,4					

													високос- тійкий у воді)
3 3 6	Конік 306, SE (Konik 306, SE)			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2- етил- гексиллов ий ефір, 475 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,5/	0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	2
		флорасул ам, 6,6 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ флїтокс .				
3 3 7	Конкур , КС	метрибуз ин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3	0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мігр.	не погр.	не погр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
				соя (олїя)	не погр.*					-	-	-	
3 3 8	Коннек- т 1125 SC, КС			Контроль за імідаклопридом									
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	не погр.	не погр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
		бета- цифлутри- н, 12,5 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)								
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06	соняшник (олїя)	не погр.	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		бета- цифлутри- н, 12,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)								
3 3 9	Контакт ор Дуо, КС			Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином									
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	яблука, груші	0,07* (межа визн. ТНХ- 0,07)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	30	10	4	3 (високо- стійкий у воді)
		лямбда- цигалотри- ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)								
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	яблучний, грушевий соки	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		лямбда- цигалотри- ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)								0,1 небезпе- чний при попадан- ня на шкіру

340	Корвет, КС	флугметсулам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс., водно-мігр., трансп.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)	
		флорасулам, 75 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.					
341	Корвізар, КЕ	Контроль за фенпропідином												
		флупірафол, 100 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	30	не погр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)	
		тебуконазол, 150 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0					
		фенпропідин, 300 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,03	0,03/ заг.-сан.	/0,4					
342	Коронет 300 SC, КС	Контроль за тебуконазолом та трифлуксистробіном												
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	50	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)	
		трифлуксистробін, 100 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1					
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	-	-	-		
трифлуксистробін, 100 г/л	0,02	не погр.	/0,8		/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1							
343	Корум, РК	Контроль за бенізоном												
		беніпазон, 480 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)	
		імазамокс, 22,4 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4					

		бенпазон, 480 г/л +	0,1	соє (олія)	не погр.*	/1,0 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
		імазамокс ,224 г/л	3,0		не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	
		бенпазон, 480 г/л +	0,1	горох	0,1* (межа визн. ПШХ- 0,1)	/1,0 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4				
		імазамокс ,224 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4				
3 4 4	Косайд 2000, ВГ	міді гідроксид, 488 г/л	0,05 (по міді)	черешня	5,0* (межа визн. СФ-1,0)	0,5/ 0,03- максим альна разова; 0,005- середнь о- добова/		1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	7	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
черешневи й сік	5,0* (межа визн. СФ-1,0)	-	-	-									
картопля	5,0* (межа визн. СФ-1,0)	20	7	3									
соє (зерно)	5,0* (межа визн. СФ-1,0)	30	7	3									
соє (олія)	не погр.	-	-	-									
3 4 5	Космос 500, ГН	фіпроніл, 500 г/л	0,0002 5	кукурудза (зерно)	0,002* (межа визн. ГРХ- 0,001)	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мір.	не погр.	не погр.	не погр.	2
кукурудза (олія)	не погр.	-	-	-									
соняшник (насіння)	0,002* (межа визн. ГРХ- 0,001)	не погр.	не погр.	не погр.									
соняшник (олія)	не погр.	-	-	-									
3 4 6	Креато рБТ, ГН	дифенокс назол, 200 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
ципрокон азол, 63 г/л	0,002	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1		/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01						

													та пункт)
3 4 7	Кредо, КС	карбендаз им, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не попр.	4	3 (високо стійкий уводі)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)					20	10	4	
				соєвишник (насіння)	0,3* (межа визн. ПІДХ- 0,3)					30	не попр.	4	
				соєвишник (олія)	0,4* (межа визн. ПІДХ- 0,4)					-	-	-	
3 4 8	Кремед 330, КС			<i>Контроль за крезоксим-метилом, епоксиганазолом та дифеноганазолом</i>									
		крезоксид м-метил, 125 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1	30	не попр.	3	3 (високо стійкий уводі та пункт)
		епоксидно назол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		дифеноко назол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		крезоксид м-метил, 125 г/л +	0,1	соєвишник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1	30	не попр.	3	
		епоксидно назол, 125 г/л +	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		дифеноко назол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		крезоксид м-метил, 125 г/л +	0,1	соєвишник (олія)	не попр.**	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1	-	-	-	
		епоксидно назол, 125 г/л +	0,004		не попр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		дифеноко назол, 80 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				

		кресокси м-метил, 125 г/л +	0,1	соє (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1	30	не потр.	3					
		епоксико назол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4								
		дифеноко назол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3								
		кресокси м-метил, 125 г/л +	0,1	соє (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1	-	-	-					
		епоксико назол, 125 г/л +	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4								
		дифеноко назол, 80 г/л	0,002		не потр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3								
		кресокси м-метил, 125 г/л +	0,1	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг- сан.	/0,1	30	7	3					
		епоксико назол, 125 г/л +	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4								
		дифеноко назол, 80 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3								
		3 4 9	Кромат о, ГН	Контроль за імідаклопридом та фіпронілом													3 (високо стійкий у воді та грунті)
				імідаклоп рид, 480 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр.		не потр.	не потр.		
				фіпроніл, 50 г/л	0,0002 5		0,002 (межа визн. ГРХ- 0,001)	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мір.						
імідаклоп рид, 480 г/л +	0,06			соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	не потр.					
фіпроніл, 50 г/л	0,0002 5				0,002* (межа визн. ГРХ- 0,001)	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мір.								
імідаклоп рид, 480 г/л +	0,06			соняшник (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-					
фіпроніл, 50 г/л	0,0002 5	не потр.	/0,01		/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мір.										

		імдактоп рид, 480 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	не погр.	не погр.	не погр.	
		фіпроніл, 50 г/л	0,0002 5		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,01	0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мікр.				
		імдактоп рид, 480 г/л +	0,06	соя (олія)	не погр.	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		фіпроніл, 50 г/л	0,0002 5		не погр.	0,01	0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мікр.				
		імдактоп рид, 480 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	не погр.	не погр.	не погр.	
		фіпроніл, 50 г/л	0,0002 5		0,002* (межа визн. ГРХ- 0,001)	0,01	0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мікр.				
		імдактоп рид, 480 г/л +	0,06	соя (олія)	не погр.	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		фіпроніл, 50 г/л	0,0002 5		не погр.	0,01	0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн- мікр.				
3 5 0	Кронве р, КЕ	пендимет алін, 330 г/л	0,008	соєви́шник (на́сіння)	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	0,5/	0,002	0,05/ орг.	0,2	не погр.	7	3	2 (небезп ечний при по́трап ленні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді та грунті)
				соєви́шник (олія)	не погр.					-	-	-	
3 5 1	Крудю, КЕ	лямбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезп ечний при по́трап ленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05	20	не погр.	4	2
				ріпак (на́сіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					20	не погр.	4	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				картопля	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					20	10	4	

3 5 2	Круз 350, ТН	клетанид ин, 50 г/л	0,08	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансп., флїтотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді та грунті)
3 5 3	Купер, МС	міді гідроксид, 300 г/л	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТПХ- 1,0)	0,5/	0,03- максим альна разова; 0,005- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ААС-0,5)					-	-	-	
				груші	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					30	7	3	
				грушевий сік	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					-	-	-	
				вишні	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					30	7	3	
				вишневий сік	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					-	-	-	
				черешні	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					30	7	3	
				черешневи й сік	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					-	-	-	
				сливи	5,0 (межа визн. ФМ-0,5)					30	7	3	
				сливовий сік	5,0 (межа визн. ФМ-0,5)					-	-	-	
				абрикоси	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					30	7	3	
				абрикосови й сік	5,0* (межа визн. ААС- 0,04)					-	-	-	
3 5 4	Купрок сат, КС	міді сульфат, 345 г/л	0,05 (по міді)	соняшник (насіння)	5,0 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,5/	0,003- максим альна разова; 0,001 -	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	14	1	4

				соняшник (олія)	не попр.		середнь о- добова/			-	-	-	
				соя (зерно)	5,0* (межа визначен ня спектро- фотомет ричним методом (далі - межа визн. СФ-1,0)					30	14	1	
				соя (олія)	не попр.					-	-	-	
3 5 5	Кустоді я, КС			Контроль за азоксистероїном та тебуконазолом									
		азоксистер обін, 120 г/л +	0,03	нут(зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не попр.	3	2 (високо стійкий уводі)
		тебуконаз ол, 200г/л	0,03		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистер обін, 120 г/л +	0,03	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не попр.	3	
		тебуконаз ол, 200г/л	0,03		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистер обін, 120 г/л +	0,03	морква	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	
		тебуконаз ол, 200г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистер обін, 120 г/л +	0,03	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	
		тебуконаз ол, 200г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистер обін, 120 г/л +	0,03	томати	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	20	7	3	
		тебуконаз ол, 200г/л	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистер обін, 120 г/л +	0,03	томатний сік	0,01* (межа визн.)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	

					ВЕРХ-001)								
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-005)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
3 5 6	Кустодія, КС (МСW 710, КС)	Контроль за азоксистроїном та тебуконазолом											
		азоксистр обн, 120 г/л +	0,03	соєвишник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-02)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	7	3	2 (високо стійкий у воді)
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-007)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 120 г/л +	0,03	соєвишник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-004)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 120 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	7	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0025)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 120 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 120 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-02)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	7	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,01* (межа визн. ВЕРХ-001)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 120 г/л +	0,03	соє (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-		
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-005)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 120	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	7	3	

		г/л +			ВЕРХ-02)								
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 120 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
3 5 7	Кушон, КС	метаміпро н, 700 г/л	0,03	буряки цукрові	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,5/	/0,03	0,05/ заг.-сан.	/0,4	не погр. -	7 -	3 -	2 (високо стійкий уводі)
3 5 8	Ладон Про, КЕ	пропівохл ор, 720 г/л	0,01	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6		не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий уводі)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 5 9	Лайфл айн, РК	глюфоси нат амонію, 280 г/л	0,02	соняшник ¹ (насіння)	1,0 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,02	/0,002	0,02/ заг.-сан.	/0,1	7 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	2
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соє ¹ (зерно)	1,0 (межа визн. ГРХ-0,02)					13 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
				обробка міждядь в садах та виноградни ках	не погр.					не погр. (гербици д)	7 (герби цид)	3 (герби цид)	
3 6 0	Латіва, ТН	клетанід ин, 600 г/л	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий уводі та прунті)
				соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн.)					не погр.	не погр.	не погр.	

					ВЕРХ-0,05)								
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
3 6 1	Лаудіс 300 WG, ВГ	тембопріон, 200 г/кг +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,00005 (межа визн. ВЕРХ-0,00005)	0,0002/ сан.-токс. (межа визн. ВЕРХ-0,0001)	/0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високоспійкий у воді)
		антидот ізоксадіфен-епіл, 100 г/кг	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
		тембопріон, 200 г/кг +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.	/0,1	/0,00005	0,0002/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
		антидот ізоксадіфен-епіл, 100 г/кг	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
3 6 2	Легенд, КС	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	20	7	3	2
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,025)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	не погр.	не погр.	3	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	-	-	-	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		1,0* (межа визн. ГРХ-0,5)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
				Контроль за мезотріном та пікосульфураном									

3 6 3	Легенд а,МД	мезотріон ,75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
		нікосуль фурон, 30 г/л	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		мезотріон ,75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	
		нікосуль фурон, 30 г/л	2,0		не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
3 6 4	Лінкс- Про WG, ВГ			Контроль за пропінебом, цимоксанілом та ПТС		Контроль за пропінебом та цимоксанілом		Контроль за пропінебом, цимоксанілом та ПТС					
		цимоксан ід, 150 г/г +	0,05	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	7	3	3
		пропінеб, 600 г/г	0,0015		0,05* (межа визн. ГХ- 0,05)	/0,5	/0,001	0,003/ сан.-токс.	0,5/ водн- мікр.				
		пропілен- тіосечови на (метаболі т пропінеб у)	0,0001		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)				/0,02				
3 6 5	Лінкс- Фіто WG, ВГ			Контроль за цимоксанілом та диметоморфом									
		цимоксан ід, 200 г/г +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
		диметомо рф, 500 г/г	0,1		0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,3)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		цимоксан ід, 200 г/г +	0,05	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		диметомо рф, 500 г/г	0,1		не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
		цимоксан ід, 200 г/г +	0,05	картопля	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	7	3	
		диметомо рф, 500 г/г	0,1		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ заг.-сан.	/0,04				
				Контроль за цитатрихінілпролом									

3 6 6	Лірум 78 SC, КС	абамекти н, 18 г/л +	0,0002	яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	2	
		циантрапі лі-прол, 60 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3					
		абамекти н, 18 г/л +	0,0002	яблучний сік	не погр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-		
		циантрапі лі-прол, 60 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3					
3 6 7	Лобера, КЕ	хізалофоп -гексил, 150 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	2	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-		
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,01)					не погр.	7	3		
3 6 8	Логано 480 SC, КС	мезотріон , 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-		
3 6 9	Лок-5, КЕ	лямбда- цигалотр ин, 50 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30	не погр.	4	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)	
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-		
3 7 0	Лумісе на, ТН	оксапіпіл ролін, 200 г/л	0,1	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,02	0,0002/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді та пирні)	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-		
3 7 1	Луна Експірі енс 400 SC, КС			Контроль за флуотітрамом та тебуконазолом										
		флуотітра м, 200 г/л +	0,01	цибуля (ріпка)	0,1** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	20	7	3	2 (високо стійкий у воді)	

		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,1** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				та пункт)
3 7 2	Луна Сенсей шен 500SC, КС			<i>Контроль за флуопірамом та трифлористробіном</i>									
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	яблука ²	0,5*** (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	30	7	3	2 (високо стійкий уводі та пункт)
		трифлор истробіл, 250 г/л	0,02		0,04* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	яблучний сік	не погр.*	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	-	-	-	
		трифлор истробіл, 250 г/л	0,02		не погр.*	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	персики ²	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	30	7	3	
		трифлор истробіл, 250 г/л	0,02		0,04* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	периковий сік	не погр.*	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	-	-	-	
		трифлор истробіл, 250 г/л	0,02		не погр.*	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	виноград	0,4 (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,08	15	7	3	
		трифлор истробіл, 250 г/л	0,02		0,06* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	виноградни й сік	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,08	-	-	-	
		трифлор истробіл, 250 г/л	0,02		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	суніци	0,1 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,08	14	7	3	
		трифлор истробіл, 250 г/л	0,02		0,04 (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
		флуопіра м, 250 г/л +	0,01	сунічний сік	0,05 (межа визн.)	/1,0	/0,003	0,02/ сан-	/0,08	-	-	-	

					ГРХ- 0,05)			токс., заг.-сан.					
		трифлос- и-стробін, 250 г/л	0,02		0,02 (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
3 7 3	Малбо н, РК	бенпазон, 480 г/л	0,1	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0 небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 7 4	Мадера 48, РК			Контроль за імізамоксом та імазапіром									
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо- стійкий у воді та пруді)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0 небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мір.				
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапір, 15 г/л	1,0		не погр.	/1,0 небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.- мір.				
3 7 5	Мазор ін SC, КС	мезотріон ,480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	2 (небезп- ечний при пограп- лянні на слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 7 6	Макета 50, КЕ	хізалофоп- т-епіл, 50 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	7	3	2 (небезп- ечний при пограп- лянні на слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн.)					не погр.	не погр.	3	

					ВЕРХ-0,1)								
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
3 7 7	Максим 025 FS, TH	флудіокс оніл, 20 г/л	0,015	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3
				соняшник (олія)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)					-	-	-	
3 7 8	Максим 480 FS, TH	флудіокс оніл, 480 г/л	0,015	капуста	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	2
				цвібуля (ріпка)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не погр.	не погр.	не погр.	
3 7 9	Максим Аванс 195FS, TH	Контроль за тіабендазолом, флудіоксонілом та металаксілом-М											
		тіабендаз ол, 150 г/л +	0,1	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді)
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		металакс ил-М, 20 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		тіабендаз ол, 150 г/л +	0,1	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	-	-	-	
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		металакс ил-М, 20 г/л	0,03		не погр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		тіабендаз ол, 150 г/л +	0,1	нут (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		металакс ил-М, 20 г/л	0,03		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		тіабендаз ол, 150 г/л +	0,1	горох (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	
		флудіокс оніл, 25 г/л	0,015		0,2* (межа	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				

		г/л +			визн. ТІХХ- 0,1)								
		металакс ил-М, 20 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
3 8 0	Макс м Кватро 385,5 FS, TH			<i>Контроль за тіобендазолом та метилаксілом-М</i>									
		тіабендаз ол, 304,57 г/л +	0,1	кукурудза (зерно)	0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	2
		азоксистр обін, 15,54 г/л +	0,004		0,2 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		флудіокс оніл, 39,47 г/л +	0,015		0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		металакс ил-М, 31,91 г/л	0,03		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		тіабендаз ол, 304,57 г/л +	0,1	кукурудза (олія)	не погр.	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0	-	-	-	
		азоксистр обін, 15,54 г/л +	0,004		не погр.	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		флудіокс оніл, 39,47 г/л +	0,015		не погр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		металакс ил-М, 31,91 г/л	0,03		не погр.	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
3 8 1	Макс м Тріо 60FS, TH			<i>Контроль за флудіоксіном та дифеноксізолом</i>									
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та грунті)
		дифенокс назол, 25 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
3 8 2	Макс он, KE	тебуконаз ол, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
				<i>Контроль за пропіконізолом та ципроконізолом</i>									
3 8 2	Макс он, KE	пропікон азол, 250 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та грунті)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				

3 8 3	Макста р,КЕ	флуроокси пр- мспил, 250г/л	0,2	газонні трави ²	не погр.	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у ввід)
3 8 4	Мангаг ,ВГ			<i>Контроль за манкоцебом та ЕТС</i>		<i>Контроль за манкоцебом</i>							
		манкоцеб ,750г/кг	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	20	7	3	2
				томати	0,5* (межа визн. ГРХ- 0,05)					14	7	3	
				томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
				виноград	0,5* (межа визн. ГРХ- 0,05)					30	7	3	
				виноградни й сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
				яблука	0,04* (межа визн. ГРХ- 0,02)					30	7	3	
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					-	-	-	
				груші	0,04 (межа визн. ГРХ- 0,02)					30	7	3	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)					-	-	-	
		ЕТС (метаболі т манкоцеб у)	0,0003	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	не погр.	не погр.	не нормуст ься	не нормуст ься	-	-	-	
				томати	0,02* (межа визн.					-	-	-	

					ВЕРХ-0,02)								
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					-	-	-	
				виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					-	-	-	
				виноградний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					-	-	-	
				яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					-	-	-	
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					-	-	-	
				груші	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					-	-	-	
				грушевий сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					-	-	-	
385	Маніто ба, КС	епоксико назол, 50 г/л + фоллет, 375 г/л	0,001	Контроль за фоллетом						30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
			0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	1,0/	/0,01	0,1/ заг.-сан.	0,25/ трансл.				
					0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,04/ орг.	/0,3				
386	Маркз, БГ ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3
387	Маркус SC, КС	фллубендід амід, 480 г/л	0,003	кукурудза ¹ (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
388	Масай, ЗП	тебуфенпірад, 200 г/кг	0,002	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,002	0,004/ сан.-токс.	/0,1	30	7	3	2 (високо стійкий у воді)
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	

389	Мападо р Макс, ТН	імідаклоп рид, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий уводі)	
				картопля ² (крім ранніх сортів)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.		
390	Мапар, КС	метрибуз ин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3	0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн-мір.	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі)	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-		
391	Метпер, КС			Контроль за тіофанат-метилом та карбендзімом		Контроль за тіофанат-метилом		Контроль за тіофанат-метилом та карбендзімом						
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	20	не погр.	3	2	
				яблука	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,08)					20	7	3		
				яблучний сік	не погр.					-	-	-		
				виноград (технічні сорти)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	7	3		
				виноградни й сік	не погр.					-	-	-		
				буряки цукрові	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)					20	7	3		
				Контроль за карбендзімом (сумою тіофанат-метилу і карбендзіму)										
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	не погр.	3		
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-		
		карбендзім (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/	0,001	0,1/ орг.	0,1	20	не погр.	3		
				яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					20	7	3		
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,03)					-	-	-		

				соєвишник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	не попр.	3	
				соєвишник (оля)	не попр.					-	-	-	
				виноград (технічні сорти)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					30	7	3	
				виноградни й сік	не попр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)					20	7	3	
3 9 2	Медакс Топ, КС			<i>Контроль за метилатхлоридом та прогексационом-кальцію</i>									
		метилат- хлорид, 300 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,4 (межа визн. ФМ-0,2)	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	30	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		прогексацио н кальцію, 50 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,2				
3 9 3	Медісо н 263 SC, КС			<i>Контроль по трифлораксизобіном та протіоксационом-дестію</i>									
		протіоксацио н, 175 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,3** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2	30	7	3	2 (високо стійкий у воді)
		трифлораксизобі н, 88 г/л	0,02		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1				
3 9 4	Мезотр екс, КС	мезотріон , 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				кукурудза (оля)	не попр.*					-	-	-	
3 9 5	Меква Про 750, РК	хлормеква л хлорид, 750 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ТПХ- 0,05)	0,3/ небезпе чний при попадан ня на шкіру	/0,02	0,2/ сан.-токс.	/0,2	не попр.	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді)
3 9 6	Мелон, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не попр.	7	3	3 (високо стійкий у воді)
				кукурудза (оля)	не попр.*					-	-	-	
3 9 7	Мендо р, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не попр.	7	3	2 (небезп ечний при попадан ня на
				соя (оля)	не попр.*					-	-	-	

													шкіру та слизові оболонки очей, високоспійкий (увод)
398	Меркурій, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
399	Мерпант ^{ТМ} Платинум, ВГ	каптан, 780 г/кг	0,1	яблука	0,03* (межа визн. ТПХ-0,03)	0,3/	/0,01	0,2/ сан.-токс.	/1,0	40	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, алерген)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					-	-	-	
400	Метарі (Metagri), СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилівим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д 2-етилгексилівий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,5/	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05			/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
401	Метакса, ТН	тіаметоксам, 350 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	3
				соя (зерно)	0,04** (межа визн. ВЕРХ-0,04)					не погр.	не погр.	не погр.	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
402	Метрин, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мігр.	не погр.	не погр.	3	2 (високоспійкий увод)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
403	Менатат, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн.	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	3 (високоспійкий

					ГРХ-0,05)								уводі та групі)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)					30	7	3	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
404	Мідер Про, ТН	імідаклоп-рид, 600 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий уводі)
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не погр.	не погр.	не погр.	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				буряки цукрові	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					не погр.	не погр.	не погр.	
405	Мікро, ВП	ацетаміпр-ид, 200 г/кг	0,01	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	0,2	0,003	0,02/ сан.-токс.	0,1	45	5	3	2 (небезпечний при потрап-ленні на слизові оболонки очей, високо стійкий уводі)
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					-	-	-	
406	Мікрог-юл Спеці-аль, ВГ	сірка, 800 г/кг	не нормується	зерно хлібних злаків	не погр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	30	не погр.	3	3
				виноград ²	30,0 (межа визн. ВЕРХ-40)					30	7	3	
				виноградни-й сік	не погр.					-	-	-	

				soя(зерно)	не погр.					30	не погр.	3	
				soя(олія)	не погр.					-	-	-	
407	Міледі Спрей, КР	імідаклоп рид, 0,1 г/л	0,06	декоративні культури захищеного ґрунту ²	не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	3	не погр.	3 (високо стійкий увод)
408	Мілонг а, СЕ	<i>Контроль за тербутилізином та S-метолахлором</i>											
		тербутила зин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
					0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
					не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	соєвишник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	
					0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	соєвишник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
					не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	сорго	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	
					0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	soя(зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	
					0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	soя(олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
					не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
				<i>Контроль за 2,4-Д</i>									

409	Міракс, РК	24-Д-диметилла мінна сіль, 344 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	1,0/	0,0003	0,002/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		диамбидиметилла мінна сіль, 120 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
		24-Д-диметилла мінна сіль, 344 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.	1,0/	0,0003	0,002/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	-	-	-	
		диамбидиметилла мінна сіль, 120 г/л	0,004		не погр.	1,0/	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.				
410	Міраль д, КС	фенпіроксам, 500 г/л	0,01	соя (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,3)	0,05	0,005	0,003/ заг.-сан.	0,3	30	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
411	Міст Супер, ФК			Контроль за тіаметоксамом тиліамбда-циалотрином									
		тіаметоксам, 126 г/л +	0,02	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,025)	0,5 аерозоль	0,03	0,04/ сан.-токс.	0,1	30	10	4	2 (високостійкий у воді)
		лямбда-цигалотрин, 95 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
412	Містард, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1	0,003	0,06/ заг.-сан.	0,01	не погр.	не погр.	3	3
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
413	Містраль, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТПХ-0,03)	0,3	0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мір.	не погр.	7	3	3
414	Містраль Топ, КС	метрибузин, 480 г/л	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТПХ-0,05)	0,3	0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мір.	не погр.	7	3	2 (високостійкий у воді)
				томати	0,25* (межа визн.)					не погр.	7 (томати без-	3	

					ПШХ-0,03)						розса дні) 15 (тома ти розса дні)		
				томатний сік	не погр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	7	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 1 5	Мкс 1, КС	прометри н, 500 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0'	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
4 1 6	Мкс 2, КЕ			<i>Контроль за протіканням та цитроконізмом</i>									
		пропікон азол, 250 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5'	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі та грунті)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
4 1 7	Мобіль, ВГ	ципродин ід, 700 г/кг	0,03	яблука	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,05	0,2/ заг.-сан.	/0,2	30	7	3	2
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
				виноград	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					10	7	3	
				виноградни й сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
4 1 8	Мовен то 100 SC, КС	спіротетр амат, 100 г/л	0,01	<i>Контроль за сумою спіротетримату та спіротетримат-енату; вироксеною як спіротетримат</i>		/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25				
				яблука	0,3** (межа					21	7	3	2

					визн. ВЕРХ- 0,1)								
				яблучний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				груші	0,3** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					21	7	3	
				грушевий сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				огірки	0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					7	7	3	
				виноград	0,8** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	2
				виноградни й сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				огірки закритого грунту	0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					3	3	не попр.	
				томати відкритого грунту	1,0** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					20	7	3	
				томати закритого грунту	1,0** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					7	3	не попр.	
				томатний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				капуста	0,3** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14	7	3	
				соя (зерно)	0,9** (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					50	не попр.	3	
				соя (олія)	0,4** (межа визн. ВЕРХ- 0,4)					-	-	-	

				цибуля (ріпка) (забороняє ся реалізація цибулі на перо)	0,3** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	
4 1 9	Мокса 250 ЕС, КЕ	тринекса пак-етил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	30	не попр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий увод)
4 2 0	Молте но, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соєвпшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий увод)
				соєвпшник (олія)	не попр.					-	-	-	
				соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не попр.	не попр.	3	
				соє (олія)	не попр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не попр.	не попр.	3	
4 2 1	Мостіл ан Про, РК	ацетаміпр ид, 120 г/л	0,01	ріпак ¹ (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не попр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий увод)
				ріпак (олія)	не попр.					-	-	-	
4 2 2	Мостар т, РГ	ацетаміпр ид, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не попр.	3	3 (високо стійкий увод)
4 2 3	Мотор, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соєвпшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий увод)
				соєвпшник (олія)	не попр.					-	-	-	
				соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не попр.	не попр.	3	

				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не погр.	не погр.	3	
4 2 4	Мушкет Плюс 460, МД			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексиловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		йодсульфурон-метил напрію, 5 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452,42 г/л +	0,0001		0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		антидот мефенпір-діетил, 25 г/л	не погр.			не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
4 2 5	Напалм Форте, РК	гліфосату калійна сіль, 550 г/л	0,01	кукурудза ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14 (десикант)	не погр. (десикант)	3 (десикант)	3 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
4 2 6	Некор, КЕ			Контроль за сумою тринексана-етилу та тринексана-кислоти в перерахунок на тринексана-етил		Контроль за тринексана-етилем		Контроль за сумою тринексана-етилу та тринексана-кислоти в перерахунок на тринексана-етил					
		тринексана-етил, 250 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	не погр.	не погр.	3	2
4 2 7	Нікор 040 SC, КС (Nikom 040 SC)	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
4 2 8	Ніко 43, МД	нікосульфурон, 43 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	7	3	2 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
4 2 9	Нікоган 040, МД	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 3 0	Нокаут Екстра, КС	альфа-ципермет	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн.)	/0,1 небезпечний	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	2 (небезпечний)

		рин, 200 г/л			ГРХ- 0,01)	при пограп лянні на шкіру							при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей)
				соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					30	не погр.	4	
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
4 3 1	Нукон 25 Хай БЮ (NUSO P 25 HI BЮ), ВГ	хлорокис міді, 423,7 г/кг	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0; межа визначен ня методом атомно- адсорбції йної спекрос копії (далі- ААС)- 0,5)	0,5/	0,003- максим альна разова; 0,001 - середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	3	1	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0; ААС-0,5)					-	-	-	
				виноград	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0; ААС-0,5)					30	3	1	
				виноградни й сік	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0; ААС-0,5)					-	-	-	
				огірки	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0; ААС-0,5)					20	3	1	
				томати	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0; ААС-0,5)					20	3	1	
				томатний сік	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0; ААС-0,5)					-	-	-	
4 3 2	Оберон Рapid 240SC, КС			Контроль за спіромезифеном									
		спіромезі фен, 228,6 г/л +	0,01	виноград	0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,8 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	0,002 (межа визн. ВЕРХ- 0,001)	0,0002/ заг.-сан. (межа визн.	0,4 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	50	7	3	2

								ВЕРХ-0,0002)						
		абамектин, 11,4г/л	0,0002		0,005 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3					
		спіромезі фен, 228,6 г/л +	0,01	виноградний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,8 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,002 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,0002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,0002)	/0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	-	-	-		
		абамектин, 11,4г/л	0,0002		не погр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3					
		спіромезі фен, 228,6 г/л +	0,01	яблука	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,8 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,002 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,0002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,0002)	/0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	30	7	3		
		абамектин, 11,4г/л	0,0002		0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3					
		спіромезі фен, 228,6 г/л +	0,01	яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,8 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,002 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,0002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,0002)	/0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	-	-	-		
		абамектин, 11,4г/л	0,0002		не погр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3					
433	Оклант, ВГ	піаметоксам, 250 г/кг	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	20	не погр.	3	3	
				соя (зерно)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)					30	не погр.	3		
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-		
434	Оплот, Тріо, КС			Контроль за дифеноконазолом										
		тебуконазол, 45г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)	
		дифеноконазол, 90 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3					
		азоксистробін, 40 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3					
435	Опора, КЕ	клотазон, 480г/л	0,04	ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-		
				Контроль за протирозом та тебуконазолом										

4 3 6	Орбіт Про, КЕ	прохлора з,300г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	не попр.	3	3 (небезп ечний при попрап лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
		тебуконаз ол,200г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
4 3 7	Орнам ент FS, ТН	флудіокс оніл,25 г/л	0,015	соя(зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не попр.	не попр.	не попр.	2
				соя(олія)	не попр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ТЦХ- 0,02)					не попр.	не попр.	не попр.	
				кукурудза (олія)	не попр.					-	-	-	
4 3 8	Ортус, КС	фенпірок симат, 50 г/л	0,01	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,03)	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	2 (небезп ечний при попрап лянні на слизові оболон ки очей)
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)					-	-	-	
				виноград	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
				виноградни й сік	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)					-	-	-	
4 3 9	Оскар Преміу м, СЕ			Контроль за тербутилазином та пропізахлором									
		тербутила зин,215 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не попр.	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		пропізохл ор,450г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		тербутила зин,215 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не попр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		пропізохл ор,450г/л	0,01		не попр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		тербутила зин,215 г/л +	0,003	соєвишник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не попр.	не попр.	3	

		пропізохл ор, 450 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		тербутила зин, 215 г/л +	0,003	сосяшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		пропізохл ор, 450 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
4 4 0	Пайт, КЕ	біфенпри н, 100 г/л	0,02	сося (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1	30	не потр.	4	2 (небезп ечний при потрап лянні на шкіфу та слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі та прунті)
				сося (олія)	не потр.*					-	-	-	
				яблука	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)					30	10	4	
				яблучний сік	не потр.*					-	-	-	
				виноград	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)					30	10	4	
				виноградни й сік	0,15* (межа визн. ГРХ- 0,15)					-	-	-	
4 4 1	Пангол ін, ВГ	трифлусу ль-фурон- метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.-сан.	/0,1	не потр.	7	3	3 (високос тійкий уводі)
4 4 2	Панда, КЕ	пендимет алін, 330 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2	не потр.	не потр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі та прунті)
4 4 3	Пантео н WG, ВГ	римсуль фурон, 500 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не потр.	не потр.	3	3
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не потр.	7	3	
4 4 4	Парабе лдум, КС	імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином									
				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн.)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	35	не потр.	4	2 (високос тійкий уводі)

		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		ВЕРХ-005) 0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
4 4 5	Парацетол, КС	флутриафол, 250 г/л	0,01	соєвий насіння) соєвий (олія) соє (зерно) соє (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2) не погр.* 0,2* (межа визн. ГРХ-0,2) не погр.*	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,006/сан.-токс.	0,1/трансл.	30 - 30 -	не погр. - не погр. -	3 - 3 -	3
4 4 6	Паритет, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	соєвий насіння) соєвий (олія) соє (зерно) соє (олія) картопля горох	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,05) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0	0,02	0,002/сан.-токс.	0,5/трансл.	не погр. - не погр. - не погр. не погр.	7 - 7 - 7	3 - 3 - 3	2 (високо стійкий у воді)
4 4 7	Патріот, КС	імідаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 15 г/л + клетоданін, 50 г/л	0,06 0,005 0,08	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,01* (межа визн. ГРХ-0,01) 0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,2 0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру 1,5	0,005 0,003 0,02	0,007/заг.-сан. 0,002/заг.-сан. 0,004/заг.-сан.	0,04 0,03 0,03/трансл., фітотокс.	30	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді та пруні)
4 4 8	Пегас, КЕ	прохлора, 3,450 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн.)	0,1	0,001	0,06/сан.-токс.	0,3	30	не погр.	3	3 (небезпечний)

					ГРХ-0,04)									при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
449	Пектораль SL, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-		
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)					не погр.	не погр.	3		
				соя (олія)	не погр.					-	-	-		
450	Пергадо R270 WG, ВГ	Контроль за мандіпропамідом та мідією												
		мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	томати	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	0,02/ заг.-сан.	/0,3		14	7	3	3 (високостійкий у воді)	
		міді хлорокси д, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТПХ-1,0)	0,5/	0,003-максимальна разова; 0,001-середньодобова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.					
		мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	томатний сік	не погр.	/1,5	0,02/ заг.-сан.	/0,3		-	-	-		
		міді хлорокси д, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТПХ-0,5)	0,5/	0,003-максимальна разова; 0,001-середньодобова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.					
		мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	огірки	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	0,02/ заг.-сан.	/0,3		14	7	3		
		міді хлорокси д, 245 г/кг	0,05 (по міді)		5,0* (межа визн. ТПХ-1,0)	0,5/	0,003-максимальна разова; 0,001-середньодобова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.					
		мандіпропамід, 25 г/кг +	0,03	виноград	0,2 (межа визн.	/1,5	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3		

					ВЕРХ-0,1)								
		мілі хлорокси д, 245 г/кг	0,05 (по мілі)		5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)	0,5/	0,003- максим альна разова; 0,001- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		мандіпро памід, 25 г/кг +	0,03	виноградни й сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		мілі хлорокси д, 245 г/кг	0,05 (по мілі)		5,0* (межа визн. ТШХ-1,0)	0,5/	0,003- максим альна разова; 0,001- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
		мандіпро памід, 25 г/кг +	0,03	цибуля (ріпка)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,5	/0,05	0,02/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	
		мілі хлорокси д, 245 г/кг	0,05 (по мілі)		5,0* (межа визн. ФМ-2,5)	0,5/	0,003- максим альна разова; 0,001- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.				
4 5 1	Петра (Бродст райс, Пітон), ВГ	флутметсу лам, 800 г/кг	0,2	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс „водню- мігр., трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 5 2	Піктор Актив, КС			Контроль за піраклостробіном та боскалідом									
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	7	3	2 (високо стійкий у грунті)
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03 заг.- сан.	/0,4				
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		боскалід, 150 г/л	0,04		не погр.	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	40	7	3	
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1** (межа визн.)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				

					ВЕРХ-0,1)								
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	соє(олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	буянки пухрові	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	7	3	
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	7	3	
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	7	3	
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		боскалід, 150 г/л	0,04		не погр.	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
4 5 3	Піорун 200, РК (Piorun 200 SL)	ацетамілпр ид, 200 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	40	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 5 4	Піризкс ЗП			Контроль за експлуатацією та придобаном									
		гексагізкс, 140 г/кг +	0,04	соє(зерно)	0,05* (межа визн.)	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)

					ГРХ-0,05)								
		придабен, 300 г/кг	0,03		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		гексипіазо кс, 140 г/кг +	0,04	соя (олія)	не погр.*	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		придабен, 300 г/кг	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
4 5 5	Пірика нс, 200 КС	пірипроксифен, 200 г/л	0,07	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/2,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	30	7	3	2 (високо стійкий у воді)
				яблучний сік	не погр.					-	-	-	
4 5 6	Пледж 50, 3П	флутіюкс азид, 511 г/кг	0,002	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,001	0,004/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	2
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					не погр.	не погр.	3	
4 5 7	Плену м 50 WG, ВГ	піметрозин, 50 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/0,002 (межа визн. ВЕРХ-0,001)	0,0002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ-0,0002)	/0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
4 5 8	Поксі, КЕ	епоксико назол, 75 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	30	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на шкіру, високостійкий у воді та ґрунті)
4 5 9	Польві с, КЕ	ацетохлор, 900 г/л	0,001	соєвий горошок (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	1,0/	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мір.	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				соєвий горошок (олія)	не погр.					-	-	-	
	Покрова	прометрин, 500 г/л	0,005	соєвий горошок (насіння)	0,1* (межа	5,0/	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (високо

460	Екстра, КС				визн. ГРХ-0,1)								стійкий у воді)
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
461	Пончо 600FS, ТН	клетанід ин, 600 г/л	0,08	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
462	Пончо Волю 610FS, ТН			Контроль за клетівнідином									2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		клетанід ин, 508 г/л +	0,08	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс .	не погр.	не погр.	не погр.	
		Bacillus firmus, 102 г/л	не погр.		не погр.								
		клетанід ин, 508 г/л +	0,08	кукурудза (олія)	не погр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс .	-	-	-	
Bacillus firmus, 102 г/л	не погр.	не погр.	не погр.		не погр.								
463	Прайм, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексильовим ефіром		Контроль за 2,4-Д					2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		2,4-Д2-етилгексильовий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)								
		2,4-Д2-етилгексильовий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		флорасул ам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)								
464	Прем'єр Профі, 79%, РН			Контроль за імідаклопридом та флутріафолом									2 (небезпечний при потрап
		фосфори ста кислота, 400 г/л +	2,0	зерно хлібних злаків	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	не погр.	не погр.	не погр.	

		алюмінію фосфід, 250 г/л +			0,3* (межа визн. ФМ-0,3)								лянні на слизові оболонки очей, високоспійкий у воді та ґрунті)		
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04						
		флутриафол, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.						
		фосфори ста кислота, 400 г/л +	2,0	соя (зерно)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	не погр.	не погр.	не погр.			
		алюмінію фосфід, 250 г/л +			не погр.										
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04						
		флутриафол, 250 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.						
		фосфори ста кислота, 400 г/л +	2,0	соя (олія)	не погр.*	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	-	-	-			
		алюмінію фосфід, 250 г/л +			не погр.										
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04						
		флутриафол, 250 г/л	0,01		не погр.*	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.						
		4 6 5	Престо, КС			Контроль за клотіаїдином та лямбда-цихлотрином									
				клотіанідин, 200 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансп., фітотокс.	30	не погр.	4	3 (високоспійкий у воді)

		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				та пруні)
		клетанідин, 200 г/л +	0,08	картопля	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)	1,5	0,02	0,004/заг.-сан.	0,03/трансл. фітотокс.	20	10	4	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		клетанідин, 200 г/л +	0,08	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	1,5	0,02	0,004/заг.-сан.	0,03/трансл. фітотокс.	40	не погр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		клетанідин, 200 г/л +	0,08	ріпак (олія)	не погр.*	1,5	0,02	0,004/заг.-сан.	0,03/трансл. фітотокс.	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		клетанідин, 200 г/л +	0,08	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	1,5	0,02	0,004/заг.-сан.	0,03/трансл. фітотокс.	30	не погр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
		клетанідин, 200 г/л +	0,08	кукурудза (олія)	не погр.*	1,5	0,02	0,004/заг.-сан.	0,03/трансл. фітотокс.	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпечний при потрап	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				

						ляни на шкіру							
		кюпіанід ин, 200 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фїтотокс .	30	не попр.	4	
		лямбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе чний при попап ляни на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		кюпіанід ин, 200 г/л +	0,08	соняшник (олїя)	не попр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фїтотокс .	-	-	-	
		лямбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе чний при попап ляни на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		кюпіанід ин, 200 г/л +	0,08	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фїтотокс .	20	10	4	
		лямбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при попап ляни на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
4 6 6	Принц ес 450, KE (Princes 450, EC)	прохлора з, 450 г/л	0,001	зерно хлїбних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	не попр.	3	2 (небезп ечний при попап ляни на слизові оболон ки очей, високос тїйкий у водї та прунї)
4 6 7	Піракс ор, KE			Контроль за піраклостробїном									
		флуксапі роксад, 75 г/л +	0,02	зерно хлїбних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,7	/0,01	0,004/ сан.-токс.	/0,3	30	не попр.	3	2 (високо спїйкий у водї та прунї)
		піраклост робїн, 150 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				

4 6 8	Пріма Форте 195,СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2- етилгексилловими мерфіром		Контроль за 2,4-Д					
		флорасул ам, 5 г/л +	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс. .	не погр.	не погр.	3	3
		амінопіра лід, 10 г/л +	0,05		0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,05	0,002/ заг.-сан.	/0,4				
		2,4-Д2- етил- гексиллов ий ефір, 180 г/л	0,0001		0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		флорасул ам, 5 г/л +	0,05	кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс. .	не погр.	не погр.	3	
		амінопіра лід, 10 г/л +	0,05		0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,05	0,002/ заг.-сан.	/0,4				
		2,4-Д2- етил- гексиллов ий ефір, 180 г/л	0,0001		0,015* (межа визн. ГРХ- 0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		флорасул ам, 5 г/л +	0,05	кукурудза (олія)	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс. .	-	-	-	
		амінопіра лід, 10 г/л +	0,05		не погр.	/1,5	/0,05	0,002/ заг.-сан.	/0,4				
		2,4-Д2- етил- гексиллов ий ефір, 180 г/л	0,0001		не погр.	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
4 6 9	Провеї ,ЗП			Контроль за прохлоразом та карбендазимом									
		прохлора з, 500 г/кг +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
		карбендз им, 135 г/кг	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/ 	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
4 7 0	Програ ундЕС, КЕ	пропізохл ор, 720 г/л	0,01	соєвишник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соєвишник (олія)	не погр.*					-	-	-	

4 7 1	Проза, KE	пропізохл ор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводл)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 7 2	Прокле йм 5 SG, PT	емамекпи н бензоат, 50 г/кг	0,001	персики	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан-токс.	/0,3	14	7	3	2 (високо стійкий уводл)
				периковий сік	не погр.					-	-	-	
				черешні	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					14	7	3	
				черешневи й сік	не погр.					-	-	-	
4 7 3	Прокса ніл 720, KE	пропізохл ор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводл)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 7 4	Прокан , KE	пропізохл ор, 720 г/л	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводл)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
			0,025	картопля	0,1* (межа	/1,0	/0,002	0,2/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	2 (високо

4 7 5	Проман 600 SC, KC	метобром урон, 600 г/л			визн. ГРХ-0,02)								стійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 7 6	Промос тар, KC			Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином									
		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	30	не погр.	4	2 (високо стійкий у воді)
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	20	не погр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	соє (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
4 7 7	Промарокс, KE	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	1,0	0,01	0,002/ орг.	0,6	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
		пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа	1,0	0,01	0,002/ орг.	0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп

4 7 8	Пропо ніг 720, КЕ			визн. ГРХ-0,2)									счний при попрап лянні на слизові оболон ки очей, алерген , високос тійкий уводі)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)								
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
				горох (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
4 7 9	Пропо ніг Дуо, КЕ			Контроль за пропізохлором									
		пропізохл ор, 720 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп счний при попрап лянні на слизові оболон ки очей, алерген , високос тійкий уводі)
		кломазон, 30 г/л	0,04		0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		пропізохл ор, 720 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	, високос тійкий уводі)
		кломазон, 30 г/л	0,04		не погр.*	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		пропізохл ор, 720 г/л +	0,01	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп счний при попрап лянні на слизові оболон ки очей, алерген , високос тійкий уводі)
		кломазон, 30 г/л	0,04		0,2** (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		пропізохл ор, 720 г/л +	0,01	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		кломазон, 30 г/л	0,04		не погр.*	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
4 8 0	Пропо ніг Т, СЕ			Контроль за пропізохлором та тербутилказином									
		пропізохл ор, 450 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	2 (небезп счний при попрап лянні на шкіфу та слизові оболон ки очей, алерген , високос тійкий уводі)
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохл ор, 450 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	, високос тійкий уводі)
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		пропізохл ор, 450 г/л +	0,01	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп счний при попрап лянні на шкіфу та слизові оболон ки очей, алерген , високос тійкий уводі)
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				

		пропізохл ор, 450 г/л +	0,01	соя (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
4 8 1	Пропул ьс 250 SE, CE			<i>Контроль за флуопірамом та протіоконазолом-дестіо</i>									
		флуопіра м, 125 г/л +	0,01	ріпак ¹ (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та грунті)
		протіокон азол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,1*** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		флуопіра м, 125 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не погр.*	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	-	-	-	
		протіокон азол- дестіо, 125 г/л	0,001		не погр.*	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		флуопіра м, 125 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	30	не погр.	3	
		протіокон азол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		флуопіра м, 125 г/л +	0,01	соя (олія)	не погр.*	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	-	-	-	
		протіокон азол- дестіо, 125 г/л	0,001		не погр.*	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		флуопіра м, 125 г/л +	0,01	картопля	0,03*** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/1,0	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,08	30	7	3	
		протіокон азол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,02** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
4 8 2	Проспе р 300 CS, СК	спіроксам ін, 300 г/л	0,01	виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,03	0,02/ сан.-токс.	/0,4	30	7	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
				виноградни й сік	0,005* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					-	-	-	
4 8 3	Пульса р	імазамокс , 25 г/л	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо

	Плюс, РК				ВЕРХ- 0,25)								стійкий уводі)			
				соя(олія)	не погр.*					-	-	-				
				горох (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)					не погр.	не погр.	3				
4 8 4	Пульса р Старт, РК	імазамокс , 120 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий уводі)			
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-				
4 8 5	Разит, КС			Контроль за ацетаміпрідом та імідаклопрідом									3 (високо стійкий уводі)			
		імідаклоп рид, 140 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	4				
		альфа- ципермет рин, 100 г/л +	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)											
		ацетаміпр ид, 160 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)											
		імідаклоп рид, 140 г/л +	0,06	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	10	4				
		альфа- ципермет рин, 100 г/л +	0,005		0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)											
		ацетаміпр ид, 160 г/л	0,01		0,025* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)											
		4 8 6	Райнер, ВП	ацетаміпр ид, 200 г/кг	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30		7	3	3 (високо стійкий уводі)
						яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)					45		7	3	
						яблучний сік	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					-		-	-	

				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не попр.	3	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
4 8 7	Ракурс, КС			<i>Контроль за ципроконазолом та епоксиконазолом</i>									
		ципрокон азол, 160 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1	0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруні)
		епоксико назол, 240 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,01	0,0005	0,004/ заг.-сан.	0,4				
		ципрокон азол, 160 г/л +	0,002	соя (олія)	не попр.*	0,1	0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	
		епоксико назол, 240 г/л	0,004		не попр.*	0,01	0,0005	0,004/ заг.-сан.	0,4				
		ципрокон азол, 160 г/л +	0,002	соєвий насіння	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1	0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	30	не попр.	3	
		епоксико назол, 240 г/л	0,004		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,01	0,0005	0,004/ заг.-сан.	0,4				
		ципрокон азол, 160 г/л +	0,002	соєвий (олія)	не попр.*	0,1	0,01	0,03/ сан.-токс.	0,01	-	-	-	
		епоксико назол, 240 г/л	0,004		не попр.*	0,01	0,0005	0,004/ заг.-сан.	0,4				
4 8 8	Ранголі 315,ЕВ	тебуконаз ол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	0,4	0,02	0,025/ заг.-сан.	0,1	30	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
4 8 9	Ранголі 715,ТН	флудіокс оніл, 25 г/л	0,015	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,1	0,002	0,1/ орг.	0,2	не попр.	не попр.	не попр.	2 (високо стійкий у воді та пруні)
				кукурудза (олія)	не попр.*					-	-	-	
4 9 0	Ранголі 815,ТН	тіаметокс ам, 350 г/л	0,02	соєвий насіння	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5 аерозол ь	0,03	0,04/ сан.-токс.	0,1	не попр.	не попр.	не попр.	2
				соєвий (олія)	не попр.*					-	-	-	
4 9 1	Ранголі 1015, ВГ	метрибуз ин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3	0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не попр.	не попр.	3	2 (високо стійкий у пруні)
				соя (олія)	не попр.*					-	-	-	

4 9 2	Рандеву, ВГ	трифлусуль-фурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген)
4 9 3	Ранкон а 450, ТН	іпконазол, 450 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,5	/0,004	0,006/ заг.-сан.	/0,05	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)					не погр.	не погр.	не погр.	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 9 4	Ранекс 500SC, КС (Ranex 500SC)	мезазахлор, 500 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
4 9 5	Рapidус WG, ВГ	йодсульфурон-метил напрію, 50 г/кг +	0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
		антидот мефенпір-діетил, 150 г/кг	не погр.		не погр.								
		йодсульфурон-метил напрію, 50 г/кг +	0,03	кукурудза (зерно)	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.	не погр.	не погр.	3	
		антидот мефенпір-діетил, 150 г/кг	не погр.		не погр.								
		йодсульфурон-метил напрію, 50 г/кг +	0,03	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.	-	-	-	
		антидот мефенпір-діетил, 150 г/кг	не погр.		не погр.								
4 9 6	Рансан 500SC, КС	мезазахлор, 500 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,025)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	0,05* (межа					-	-	-	

					визн. ГРХ- 0,04)								
4 9 7	Раунда п Прокт ив (МОН 79376), РК	гліфосату калієва сіль, 441 г/л	0,01	осіння та весняна обробка землі несільсько- господарсь кого призначенн я, землі під пар, міжрядь в садах та виноградни ках	не погр.	1,0'	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл	не погр. (гербици д)	7 (гербици д)	3 (гербици д)	3 (високо стійкий увод)
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)					14 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	2,0 (межа визн. ВЕРХ- 0,4)					14 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,3 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					11 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
4 9 8	Раунда п Флекс, РК	гліфосату калійна сіль, 588 г/л, в кислотну му еквівален ті -480 г/л	0,01	осіння та весняна обробка сільськогос- подарських угідь, обробка землі під пар, землі несільсько- господарсь кого призначенн я, міжрядь в садах та виноградни ках	не погр.*	1,0'	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл	не погр. (гербици д)	7 (гербици д)	3 (гербици д)	3 (високо стійкий увод)
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)					14 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	

				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,4)					14 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				ріпак(олія)	не погр.*					-	-	-	
				соєвишник (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					11 (десика нт)	не погр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				соєвишник (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 9 9	Рафаль 480, KE	клумезон, 480 г/л	0,04	соє(зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,5	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру, високос тійкий у воді та грунті)
				соє(олія)	не погр.*					-	-	-	
5 0 0	Реслон Форте 200SL, PK	дикват дибромід, 200 г/л	0,002	виноград	0,05** (межа визн. СФ-0,05)	0,05/	0,003	0,02/ орг.	0,2	не погр.	10	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей)
				виноградни й сік	не погр.*					-	-	-	
				яблука	0,05** (межа визн. СФ-0,05)					не погр.	10	3	
				яблучний сік	не погр.*					-	-	-	
5 0 1	Редіо M120 FS, TH			<i>Контроль за протіоконазол-дестію та металаксил</i>									
		проіюкон азол, 100 г/л +	0,001	соє(зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,2	0,003	0,001/ заг.-сан.	0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)
		металакс ил, 20 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		проіюкон азол, 100 г/л +	0,001	соє(олія)	не погр.	0,2	0,003	0,001/ заг.-сан.	0,2	-	-	-	
		металакс ил, 20 г/л	0,03		не погр.	0,5/	0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		проіюкон азол, 100 г/л +	0,001	горох	0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,2	0,003	0,001/ заг.-сан.	0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металакс ил, 20 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
				<i>Контроль за азоксистробіном та ципроконазол</i>									

502	Рейкон, КС (Reikon, SC)	азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
503	Рейпар, КС	прометри н, 500 г/л	0,005	картопля ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	2 (високо стійкий у воді)
504	Рекорд Квадро, ТН			Контроль за епоксиконазолом		Контроль за епоксиконазолом, карбоксином, імідаклопридом, ацетаміпридом							
		епоксико назол, 75 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		карбокси н, 170 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/	/0,015	0,1/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 70 г/л +	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04				
		ацетаміприд, 100 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
505	Рекс Плюс, СЕ			Контроль за фенпропіморфом та епоксиконазолом									
		фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ТПХ-0,2)	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,5	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у ґрунті)
		епоксико назол, 84 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		фенпропіморф, 250 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,5 (межа визн. ГРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.		30	7	3	
епоксико назол, 84 г/л	0,004	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01		/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4						
506	Релакс, ЗП			Контроль за манкоцебом, металаксілом та ЕТС									
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томати	0,5* (межа визн.	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	14	7	3	3 (високо

					ГРХ-0,05)								стійкий уводі)
		металакс ил, 80 г/кг	0,03		0,2** (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		металакс ил, 80 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)		/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		ЕТС (метаболі т манкоцеб у)	0,0003	томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не погр.	не погр.	не нормует ся	не нормует ся	-	-	-	
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)								
5 0 7	Ремонт аль, ВГ			Контроль за манкоцебом та ЕТС									
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	14	7	3	3 (високо стійкий уводі)
		металакс ил-М, 40 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	томати	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	14	7	3	
		металакс ил-М, 40 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		металакс ил-М, 40 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		ЕТС (метаболі т манкоцеб у)	0,0003	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не погр.	не погр.	не нормует ся	не нормует ся	-	-	-	
				томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					-	-	-	

				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)					-	-	-	
508	Репер ККР			Контроль зиклопіраїдом									
		клопіралі д, 100 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	2,0	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високо стійкий у воді)
		флуроксипір, 15 г/л	0,2		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2				
		клопіралі д, 100 г/л +	0,15	ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	2,0	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		флуроксипір, 15 г/л	0,2		0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2				
509	Респлер, КС	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	соя (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТПХ-0,1)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ТПХ-0,01)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
510	Респард ил, ЕВ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	50	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)					30	не погр.	3	
511	Ридоміл Голд МЦ68 WG, ВГ			Контроль зикманкоцебом, металаксиллом та ЕТС									
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	часник	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	30	7	3	3 (високо стійкий у воді)
		металаксил, 40 г/кг	0,03		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				

		ЕТС (метаболі т манкоцеб у)	0,0003		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	не погр.	не погр.	не нормуст ся	не нормуст ся				
5 1 2	Римон Фаст, КС			Контроль за новалуроном та бифентрином									
		новалуро н, 50 г/л +	0,01	кукурудза ¹ (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	7	3	2 (високо стійкий уводі)
		бїфентри н, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		новалуро н, 50 г/л +	0,01	кукурудза (олїя)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		бїфентри н, 50 г/л	0,02		не погр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		новалуро н, 50 г/л +	0,01	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	7	3	
		бїфентри н, 50 г/л	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.					
		новалуро н, 50 г/л +	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		бїфентри н, 50 г/л	0,02		не погр.*	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.					
		новалуро н, 50 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	7	3	
		бїфентри н, 50 г/л	0,02		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.					
		новалуро н, 50 г/л +	0,01	соя (олїя)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
бїфентри н, 50 г/л	0,02	не погр.*	/0,01		/0,001	0,005/ заг.-сан.							
5 1 3	Рїас 300 ЕС,КЕ	Контроль за дифеноксизолом та пропїзоксизолом											
		дифенок назол, 150 г/л +	0,002	соєвпшник ¹ (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тїйкий уводі та прупн)
		пропїкон азол, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		дифенок назол, 150 г/л +		соєвпшник (олїя)	0,4* (межа визн. ГРХ-04)					-	-	-	
		пропїкон азол, 150 г/л			не погр.								

5 1 4	Рівайв 429 ME	емаексип н бензоат, 42,9 г/л	0,001	гіршокашпа н звичайний	не погр.	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3
5 1 5	Рінді, ВГ	Контроль за диамбом											
		диамбон напрісва сіль, 617 г/кг +	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
		нікосуль фурон, 93,9 г/кг +	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		римсуль фурон, 23,5 г/кг	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
		диамбон напрісва сіль, 617 г/кг +	0,004	кукурудза (олія)	не погр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	-	-	-	
		нікосуль фурон, 93,9 г/кг +	2,0		не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		римсуль фурон, 23,5 г/кг	0,02		не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
5 1 6	Родіміч, РК	імазамокс ,40 г/л	3,0	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високос тійкий у воді)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 1 7	Родстер (RODS TER), ВГ	трибенур он-метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3
5 1 8	Рондус 750 РГ	етаметсул фурон- метил, 750 г/кг	0,02	ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3
				ріпак (олія)	не погр.*								
5 1 9	Ротам- тебукон азол 430 CS, КС	тебуконаз ол, 430 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	3 (високос тійкий у воді та грунті)
5 2 0	Рубікон , ВГ	Контроль за азоксистробилом та тебуконазолом											
		азоксистр обін, 250 г/кг +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високос тійкий у воді)
		тебуконаз ол, 500 г/кг	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 250	0,03	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	

		г/кг +											
		тебуконаз ол, 500 г/кг	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 250 г/кг +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 500 г/кг	0,03		0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обн, 250 г/кг +	0,03	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 500 г/кг	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
5 2 1	Руніко, ВГ	нікосуль фурон, 750 г/кг	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
		кукурудза (олія)	не погр.*	-	-					-			
5 2 2	Рутарг а, КЕ	хізалофоп -гепіл, 150 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	2
		соє (олія)	не погр.	-	-								
5 2 3	Руфас, КЕ	альфа- ципермет рин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	2
5 2 4	Сальса 75, ВГ	етаметсул ьфу-рон- метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 2 5	Сальто, КС			Контроль за тіофанат-метилом та карбендасимом		Контроль за тіофанат- метилом		Контроль за тіофанат- метилом та карбендасимом					
		тіофанат- метил, 500 г/л	0,08	соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі та пруні)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	

				зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не погр.	3	
				яблука	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)					20	7	3	
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ПЦХ- 0,03)					-	-	-	
				виноград (технічні сорти)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	
				виноградни й сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					-	-	-	
				буряки цукрові	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)					20	7	3	
				капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	7	3	
				<i>Контроль за карбендазимом (сумого тіофанат-метилуї карбендазиму)</i>									
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
		карбендз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				яблучний сік	0,03* (межа визн. ВЕРХ- 0,03)					-	-	-	
				виноград (технічні сорти)	0,5* (межа визн.					-	-	-	

					ВЕРХ-0,02)								
				виноградний сік	не погр.*					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)					-	-	-	
				капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 2 6	Самум 150РК	дикват дибромід, 150г/л	0,002	соя (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)	0,05/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,003	0,02/ орг.	0,2	6	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 2 7	Самум Форте 374РК	дикват дибромід, 374г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)	0,05/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,003	0,02/ орг.	0,2	6	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)					6	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 2 8	Самурай, ТН			Контроль за тіаметоксамом									
		дифеноксид, 25 г/л +	0,002	картопля	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)
		флузоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1	0,002	0,1/ орг.	0,2				
		тіаметоксам, 262,5 г/л	0,02		0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5 аерозоль	0,03	0,04/ сан.-токс.	0,1				
5 2 9	Самшит, КС			Контроль за дифеноксидом			Контроль за дифеноксидом та флузоксонілом						
		крезоксим-метил, 100г/л +	0,1	картопля	0,01** (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1	0,05	0,3/ орг., заг.-сан.	0,1	14	7	3	3 (високо стійкий у воді)
		дифеноксид, 200 г/л	0,002		0,1** (межа визн. ГРХ-0,01)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3				

					визн. ГРХ-0,1)								
5 3 0	Санма йт,ЗП	пiридабен ,200 г/л	0,03	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1	20	7	3	2
				яблучний сiк	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
5 3 1	Сарапе, КЕ/ Азара мiс,КЕ	абамекпи н, 18 г/л	0,0002	яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	2
				яблучний сiк	не погр.*					-	-	-	
				томати закритого прунту	0,005 (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					7	3	не погр.	
				томатний сiк	не погр.					-	-	-	
5 3 2	Сатiс, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилловим ефiром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2- етил- гексиллов ий ефiр, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ- 0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап ляння на слизові оболон ки очей)
		флорасул ам,6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фiтотокс .				
		2,4-Д2- етил- гексиллов ий ефiр, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		флорасул ам,6,25 г/л	0,05		не погр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фiтотокс .				
5 3 3	Сахеб, КЕ			Контроль за хлорпiрiфосом									
		хлорпiри фос,500 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,3 небезп ечний при потрап ляння на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	10	4	2
		ципермет рин,50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 небезп ечний при потрап ляння на шкіру	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
5 3 4	Світч 625 WG, ВГ			Контроль за ципродиніом та флудіоксоніом									
		ципродин іл,375 г/кг +	0,03	люхина	0,2 (межа	/0,1	/0,05	0,2/ заг.-сан.	/0,2	30	7	3	2

					визн. ГРХ-0,2)								
		флудіокс оніл, 250 г/кг	0,015		0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
5 3 5	Секатор Плюс 39WG, ВГ	йодсульф урон- метил напрію, 10г/кг +	0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при попаді лянні на слизові оболон ки очей, алерген , високос тійкий у воді та пруді)
		дифлуфе нікан, 240г/кг +	0,05** **		0,02* (межа визн. ГРХ, ВЕРХ- 0,02)	/0,5*** *	/0,001** **	/0,15*** сан- токс.	/0,15*** *				
		амідосуль фуран, 40 г/кг +	0,2		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	1,0	/0,001	0,003/ заг.-сан.	/0,25				
		антидот мефенпір -діетил, 100г/кг	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
5 3 6	Селебрі ті,КЕ	хізалофоп -гі-етил, 125г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	2
				соя (олія)	не погр.					-	-	-	
				соєвий насілля	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соєвий олія	не погр.					-	-	-	
				ріпак (насілля)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
5 3 7	Селект 120,КЕ	клетодим, 120г/л	0,01	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	20	7	3	2 (небезп ечний при попаді лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
				томатний сік	не погр.*					-	-	-	
				огірки	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					20	7	3	
				кавуни	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14	7	3	
				капуста	0,5 (межа визн.)					30	7	3	

					ВЕРХ-0,1)								
538	Селеніг Макс, КЕ	клетодим, 240 г/л	0,01	картопля ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	7	3	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
539	Селест Топ 3125 FS, TH			Контроль за тіаметоксамом, флудіоксонієм, дифеноконазолом									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		тіаметокс ам, 25 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		тіаметокс ам, 262,5 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		тіаметокс ам, 262,5 г/л +	0,02	соя (олія)	не погр.	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015		не погр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		не погр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
540	Селфос , ПГ			Контроль за фосфіном									1 (небезпечний при потрап
		фосфід алюмінію , 560 г/кг		зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,001)	0,1/	0,01 - максим альна разова; 0,001 -	0,005/ сан.-токс.	/0,4	20 ≤МДР	5-10Г ДК	5-10ГД К	

				соя (зерно)	0,05* (межа визначення лінійно-колюристичним методом (далі - межа визн. ЛКМ)-0,007)		середнь о-добова/			20 ≤МДР	5- 10<Г ДК	5- 10<ГД К	лянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ЛКМ-0,007)					20 ≤МДР	5- 10<Г ДК	5- 10<ГД К	
				ріпак (насіння)	0,05** (межа визн. ЛКМ-0,007)					20 ≤МДР	5- 10<Г ДК	5- 10<ГД К	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ЛКМ-0,007)					20≤МДР	5- 10<Г ДК	5- 10<ГД К	
				трюми, вагони, контейнери						-	5- 10<Г ДК	5- 10<ГД К	
				Контроль за протівохлором та метрибузином									
5 4 1	Сентин ел, КЕ	протівохлор, 576 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		метрибузин, 60 г/л	0,004		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мігр.				
		протівохлор, 576 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		метрибузин, 60 г/л	0,004		не погр.*	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мігр.				
		протівохлор, 576 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	
		метрибузин, 60 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мігр.				
		протівохлор, 576 г/л +	0,01	соя (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		метрибузин, 60 г/л	0,004		не погр.*	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мігр.				
		протівохлор, 576 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	
		метрибузин, 60 г/л	0,004		0,1 (межа визн.)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.-мігр.				

					ВЕРХ-0,1)								
		пропіохл ор, 576 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		метрибуз ин, 60 г/л	0,004		не погр.*	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мігр.				
		пропіохл ор, 576 г/л +	0,01	горох (зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	
		метрибуз ин, 60 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мігр.				
5 4 2	Серіакс ,КЕ			<i>Контроль за епоксиконизолом, піраклостробіном та флуксатіпроксадом</i>									
		піраклост робін, 67 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	20	не погр.	3	2 (небезп ечний при попаде нні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді та пириті)
		епоксико назол, 42 г/л +	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		флуксаті роксад, 42 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,7	/0,01	0,004/ сан.-токс.	/0,3				
5 4 3	Серіакс сПлюс, КС			<i>Контроль за флуксатіпроксадом та дифеноконизолом</i>									
		флуксаті роксад, 75 г/л +	0,02	яблука	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,7	/0,01	0,004/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	2 (високо стійкий у воді та пириті)
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		флуксаті роксад, 75 г/л +	0,02	яблучний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,7	/0,01	0,004/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		флуксаті роксад, 75 г/л +	0,02	груші	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,7	/0,01	0,004/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3	
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		флуксаті роксад, 75 г/л +	0,02	грушевий сік	0,05 (межа визн.)	/0,7	/0,01	0,004/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	

					ВЕРХ-0,05)								
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3				
		флуксапі роксад, 75 г/л +	0,02	цибуля (ріпка)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,7	0,01	0,004/ сан.-токс.	0,3	14	7	3	
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3				
		флуксапі роксад, 75 г/л +	0,02	кавуни	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,7	0,01	0,004/ сан.-токс.	0,3	20	7	3	
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3				
		флуксапі роксад, 75 г/л +	0,02	капуста	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,7	0,01	0,004/ сан.-токс.	0,3	14	7	3	
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,3 (межа визн. ГРХ-0,25)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3				
		флуксапі роксад, 75 г/л +	0,02	морква	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,7	0,01	0,004/ сан.-токс.	0,3	14	7	3	
		дифеноко назол, 50 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3				
5 4 4	Синерид, МД	тіаклопри д, 240 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.- мікр., фітотокс.	30	не попр.	3	2
				соняшник (олія)	не попр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
5 4 5	Синтакс, АГ	Контроль за гекситіазоксом та абамектином											
		гекситіазо кс, 204 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5	0,05	0,001/ заг.-сан.	0,1	30	не попр.	3	2 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей,
		абамектин, 36 г/кг	0,0002		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	0,04	0,0002	0,0003/ заг.-сан.	0,3				

		гексипазо кс, 204 г/л +	0,04	соя (олія)	не погр.*	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	високо стійкий уводі)
		абамекти н, 36 г/кг	0,0002		не погр.*	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3				
5 4 6	Сингов ан SA, CE			Контроль за клопіралідом та піклорамам									3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий уводі та грунті)
		клопіралі д, 267 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	2,0'	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	3	
		піклорам, 80 г/л +	0,02		0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	5,0'	/0,02	0,04/ сан.-токс.	0,05/ трансл.				
		амінопіра лід, 17 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,5	/0,05	0,002/ заг.-сан.	/0,4				
		клопіралі д, 267 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не погр.*	2,0'	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		піклорам, 80 г/л +	0,02		не погр.*	5,0'	/0,02	0,04/ сан.-токс.	0,05/ трансл.				
		амінопіра лід, 17 г/л	0,05		не погр.*	/1,5	/0,05	0,002/ заг.-сан.	/0,4				
5 4 7	Систив а, TH (BAS 70005 F)	флуксапі роксад, 333 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,7 (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,008)	0,004/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,3 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий уводі)
5 4 8	Сіванг о 200 SL, PK	флупіраді фузон, 200 г/л	0,02	виноград	0,4 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	0,002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,002)	/0,4 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	14	7	3	2 (високо стійкий уводі)
				виноградни й сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					-	-	-	
				яблука	0,4** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					14	7	3	
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					-	-	-	
				груші	0,4** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					14	7	3	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					-	-	-	
				капуста	0,02 (межа визн.					28	7	3	

					ВЕРХ-0,01)								
5 4 9	Сігнум, ВГ			<i>Контроль за піраклостробінном та боскалідом</i>									
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томати	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	20	7	3	3 (високо стійкий у пруні)
		піраклост робін, 67 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	томатний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклост робін, 67 г/кг	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	35	7	3	
		піраклост робін, 67 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	суніця	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	15	7	3	
		піраклост робін, 67 г/кг	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	сунічний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		піраклост робін, 67 г/кг	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		боскалід, 267 г/кг +	0,04	грецькі горіхи	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	30	7	3	
		піраклост робін, 67 г/кг	0,03		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
5 5 0	Сілард ,ТН	флудіокс оніл, 25 г/л	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не попр.	не попр.	не попр.	3

				soя (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	не погр.	
				soя (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 5 1	Сіміт 400КС	допн, 400 г/л	0,1	яблука	0,9 (межа визн. ВЕРХ- 0,4)	0,4 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,008)	0,003/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,003)	0,10 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	60	7	3	2 (небезп ечний при попапа лнннн на слизові оболон ки очей, високос тійкий увод)
				яблучний сік	0,025 (межа визн. ВЕРХ- 0,025)					-	-	-	
5 5 2	Сімба, КЕ	S- металхл ор, 960 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5	0,02	0,02/ сан.-токс.	0,02	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при попапа лнннн на слизові оболон ки очей, високос тійкий увод)
				кукурудза (олія)	не погр.*								
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,025)					не погр.	7	3	
				soя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	3	
				soя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				капуста	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	3	
5 5 3	Сіметр а325 SC, KC			Контроль за азокси-тробіном та ізопіразамом									
		азокси-тр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	0,10	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	50	не погр.	3	2 (небезп ечний при попапа лнннн на слизові оболон ки очей, високос тійкий увод)
		ізопіразам , 125 г/л	0,01		0,4** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,5	0,005	0,001/ заг.-сан.	0,4				
		азокси-тр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не погр.*	0,10	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	-	-	-	

		ізоіразам , 125 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/0,5	/0,005	0,001/ заг.-сан.	/0,4				
5 5 4	Сінпазо SC, KC			<i>Контроль за азоксистробіном та ципроконазолем</i>									
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий увод)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.*								
5 5 5	Сінпамі но-мікс OD, MD			<i>Контроль за амідосульфуроном та йодсульфурон-метиліом натрію</i>									
		амідосуль фурон, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0	/0,001	0,003/ заг.-сан.	/0,25	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
		йодсульф урон- метил натрію, 25 г/л +	0,03		0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,002	0,06/ сан.-токс.	0,01/ трансл.				
		антидот мефенпір -діетил, 250 г/л	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
5 5 6	Сінпмез oSE, CE			<i>Контроль за S-метолахлором та тербутилизіном</i>									
		S- метолахл ор, 375 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	не погр.	не погр.	7	3 (високо стійкий увод)
		тербутила зин, 125 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		мезотріон , 37,5 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4				
		S- метолахл ор, 375 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	-	-	-	

		тербутила зин, 125 г/л +	0,003		не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		мезотріон ,37,5г/л	0,001		не погр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4				
5 5 7	Спрінг, ВГ			<i>Контроль за нікосульфуроном (1), тіфенсульфурон-метилом (2) та флорасуламом (3)</i>									
		нікосуль фурон, 650 г/кг +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (1) (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0 (1)	/0,01 (1)	0,001/ (1) заг.- сан.	/0,2 (1)	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
		тіфенсуль фурон- метил, 60 г/кг +	0,01		0,05* (2) (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,1	/0,01	0,01/ (2) сан- токс.	/0,05 (2)				
		флорасул ам, 40 г/кг	0,05		0,1 (3) (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ (3) сан- токс.	0,05/ (3) фітотокс .				
		нікосуль фурон, 650 г/кг +	2,0	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0 (1)	/0,01 (1)	0,001/ (1) заг.- сан.	/0,2 (1)	-	-	-	
		тіфенсуль фурон- метил, 60 г/кг +	0,01		не погр.*	/0,1	/0,01	0,01/ (2) сан- токс.	/0,05 (2)				
		флорасул ам, 40 г/кг	0,05		не погр.*	/1,0	/0,003	0,1/ (3) сан- токс.	0,05/ (3) фітотокс .				
5 5 8	Скай, ВГ	кресокс м-метил, 500 г/кг	0,1	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.- сан.	/0,1	30	7	3	3
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
				виноград	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					50	7	3	
				виноградни й сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
5 5 9	Сквар, РК	дикват- іон, 150 г/лу формі дикват дигромід у	0,002	горох (зерно)	0,05* (межа визн. ФМ- 0,025)	0,05/ .	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	10	3	2 (небезп ечний при попран нянні на шкіру та слизові оболон

													ки очей)
560	Скорпіон Форте, РК	дикват дибромід, 280 г/л	0,002	соє ¹ (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)	0,05/	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соє (олія)	0,1* (межа визн. ФМ-0,05)						-	-	
				ріпак ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)					7	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
561	Слаш, КЕ			Контроль за клопірхидом									
		клопіралід, 120 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,2)	2,0/	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей, високотійкий у воді)
		галауксифен-метил, 5 г/л	0,02		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,006	0,04/ сан.-токс.	/0,3				
		клопіралід, 120 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не погр.	2,0/	/0,01	0,04/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		галауксифен-метил, 5 г/л	0,02		не погр.	/1,0	/0,006	0,04/ сан.-токс.	/0,3				
562	Слейд Ультра, ТН			Контроль за прохлорізом									
		прохлораз, 125 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високотійкий у воді та ґрунті)
		тебуконазол, 25 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		крезоксиметил, 25 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,05	0,3/ орг., заг.-сан.	/0,1				
563	Смарт Фреш ТМ Протабс, ТБ	1-метил-циклопропен, 2,0%	0,0009	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/50	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	1	1	
				яблучний сік	не погр.*								
564	СМ ЕВРІК, РК			Контроль за імізамоксом та імазіпромом									
		імізамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн.)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високотійкий)

					ВЕРХ-05)								уводі та прунті)
		імазагір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-05)	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.-мір.				
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазагір, 15 г/л	1,0		не погр.*	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.-мір.				
5 6 5	СМІП-ГОЛД ТЗ,КС	тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі)
		S-метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S-метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		не погр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
5 6 6	Снарід, РК	імдаклоп рид, 200 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					20	3	1	
5 6 7	Сойгар дWG, ВГ	хлоримур он-епіл, 750 г/кг	0,001	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/2,0	/0,001	0,002/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 6 8	Сойгар дГолд SL,РК	ацифлуор фең, 214 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,01	0,002/ сан.-токс.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей, високос
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	

													пійкий у воді)
5 6 9	Солє БГ, ВГ			<i>Контроль за фамоксидом</i>									
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соєвишник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не погр.	3	3
		фамоксад он, 250 г/кг	0,01		0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соєвишник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		фамоксад он, 250 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
5 7 0	Солєйл ,КЕ			<i>Контроль за бромуксизолом та тебуксизолом</i>									
		бромукон азол, 167 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1	/0,005	0,002/ заг.-сан.	0,01/ водн.- мігр.	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на шкір та слизові оболон ки очей, високос пійкий у воді та грунт)
		тебуксиз ол, 107 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
5 7 1	Солє БГ, ВГ			<i>Контроль за цимоксизолом та металаксизолом</i>									
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соєвишник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
		металакс ил, 80 г/кг	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соєвишник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		металакс ил, 80 г/кг	0,03		0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
5 7 2	Сокзар, РК (БЗПФ -1,РК)	гліфосату амонійна сіль, 480 г/л	0,01	обробка землі під пар, під посіви зернових колюсових культур, землі	не погр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові

				несільсько-господарського призначення									оболонки очей)
573	Соліни 40, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	1,0	0,01	0,001/ заг.-сан.	0,02	не погр.	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, алерген, високоспійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
574	Сонідо 400FS, ТН	паклоприд, 480 г/л	0,006	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,3	0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мір, фітотокс.	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високоспійкий у воді)
				кукурудза (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					-	-	-	
575	Сора-Нет, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	1,0	0,01	0,002/ орг.	0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високоспійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
576	Сора-Нет, КЕ (ВК-1401)	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соєвий горошок (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	1,0	0,01	0,002/ орг.	0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високоспійкий у воді)
				соєвий горошок (олія)	не погр.					-	-	-	
				соєвий горошок (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				соєвий горошок (олія)	не погр.					-	-	-	
577	Сотейра, РК			Контроль за імізамоксами									
		імізамокс, 33 г/л +	3,0	соєвий горошок (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	1,0	0,04	0,06/ заг.-сан.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високоспійкий у воді)
		імізапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	1,0	0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.-мір.				

						на шкіру							
		імазамокс ,33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапір, 15 г/л	1,0		не погр.*	/1,0 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн- мір.				
5 7 8	Спайде р, КС			<i>Контроль за флутріафоном, імазілілом та тіабендазолом</i>									
		флутріаф ол, 37,5 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	/0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		імазіліл, 15 г/л +	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,16				
		тіабендаз ол, 25 г/л	0,1		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.	/1,0				
5 7 9	Спінт, КС			<i>Контроль за азоксистробіном та епоксиконазолі</i>									
		азоксистр обін, 240 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		епоксико назол, 160 г/л	0,004		0,1** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
5 8 0	Спінт, КЕ	дифеноко назол, 250 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	3 (небезп ечний при попаді лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					30	не погр.	3	
5 8 1	Спінт, КЕ	пропахіза фол, 100 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,0003	0,001/ заг.-сан.	0,15	не погр.	не погр.	3	2 (небезп ечний при попаді лянні на слизові оболон
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	

				соє (олія)	не погр.					-	-	-	ки очей)
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	7	3	
Контроль за пропінномізом та тебуконазол													
5 8 2	Стайер 500 KE	пропінкон азол, 300 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропінкон азол, 300 г/л +	0,04	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропінкон азол, 300 г/л +	0,04	соє (олія)	не погр.	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		не погр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропінкон азол, 300 г/л +	0,04	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	50	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропінкон азол, 300 г/л +	0,04	ріпак (олія)	не погр.	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		не погр.	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропінкон азол, 300 г/л +	0,04	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	7	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		пропінкон азол, 300 г/л +	0,04	яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

					визн. ГРХ- 0,05)								
		пропікон азол, 300 г/л +	0,04	яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
5 8 3	Сталва рг 500, КС	метазакло р, 500 г/л	0,03	капуста	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	7	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,025)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
5 8 4	Станда к ТОП, ТН			<i>Контроль за фіпропілом, піраклостробіном та карбендазимом</i>									
		піраклост робін, 25 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	не погр.	не погр.	не погр.	2
		фіпропіл, 250 г/л +	0,0002 5		0,02 (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн.- мікр.				
		тіофанат- метил, 225 г/л	0,08		0,5 (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
		карбендз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		піраклост робін, 25 г/л +	0,03	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		фіпропіл, 250 г/л +	0,0002 5		не погр.	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн.- мікр.				
		тіофанат- метил, 225 г/л	0,08		не погр.	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
		карбендз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		не погр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
5 8 5	Стар 20, ВП	ацетамір ид, 200 г/кг	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн.)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	7	3	3 (високо стійкий у воді)

					ВЕРХ-0,025)								
586	Старт, КС	азоксистеробін, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	30	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)					30	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				томати	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					14	7	3	
				томатний сік	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)					30	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
587	Старт, КЕ	пендиметалін, 330 г/л	0,008	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,5/	0,002	0,05/ орг.	0,2	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у грунті)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
588	Старт, КС			Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином									
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	35	не погр.	4	2 (високо стійкий уводі)
лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру		0,001								
589	Стеллар Плюс, РК			Контроль за топрамезоном та дикамбою									
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	0,5	0,002	0,002/ сан.-токс.	0,3	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
		дикамба, 160 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)								
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (олія)	не погр.*	0,5	0,002	0,002/ сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		дикамба, 160 г/л	0,004		не погр.*								
590	Стеллар, РК (BAS			Контроль за топрамезоном та дикамбою									
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн.	0,5	0,002	0,002/ сан.-токс.	0,3	не погр.	не погр.	3	3 (високо

	77601 Н)				ВЕРХ-02)								стійкий у воді)
		дикамба, 160 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан-токс.	0,25/ трансл.				
		топрамез он, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5	/0,002	0,002/ сан-токс.	/0,3	-	-	-	
		дикамба, 160 г/л	0,004		не погр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан-токс.	0,25/ трансл.				
5 9 1	Стрім Турбо SE, KE			<i>Контроль за тербутилізином та S-метолахлором</i>									
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	7	3 (небезп ечний при попап лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соєшпник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	7	3 (високо стійкий у грунті)
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соєшпник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан-токс.	/0,02				
5 9 2	Стомп Аква, СК	пендимет алін, 445 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,002* (межа визн. ГРХ- 0,002)	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у грунті)
				соєшпник (насіння)	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)					не погр.	не погр.	3	
				соєшпник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соєя (зерно)	0,02* (межа визн.					не погр.	не погр.	3	

					ГРХ-0,02)								
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				томати	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					35	7	3	
				томатний сік	не погр.*					-	-	-	
				цибуля (ріпка)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					20	7	3	
				морква	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					50	7	3	
				картопля	0,01* (межа визн. ТПХ-0,01)					30	7	3	
				капуста	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					40	7	3	
				огірки	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					40	7	3	
				горох	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					не погр.	7	3	
				часник	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)					40	7	3	
				полуниця	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)					35	7	3	
				полуничний сік	не погр.					-	-	-	
593	Строби, КС			Контроль за піраклостробіном та епоксиконазолом									
		піраклост робін, 62,5 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруні)
		епоксико назол, 62,5 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 62,5 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	7	3	

		епоксико назол, 62,5 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 62,5 г/л +	0,03	соє(зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	40	не потр.	3	
		епоксико назол, 62,5 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		піраклост робін, 62,5 г/л +	0,03	соє(олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	-	-	-	
		епоксико назол, 62,5 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
5 9 4	Сумаро ,КС	мезотріон ,480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				кукурудза (олія)	не потр.*					-	-	-	
5 9 5	Суперк іл Форте, 550 KE			Контроль за хлорпірифосом									
		хлорпіри фос,500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,3/ небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	не потр.	4	2
		ципермет рин,50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
		хлорпіри фос,500 г/л +	0,001	яблука	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,3/ небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	40	10	4	
		ципермет рин,50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
		хлорпіри фос,500 г/л +	0,001	яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	0,3/ небезпе чний при потрап лянні	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	

				на шкіру								
	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,2 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,04-максимальна разова; 0,01-середньо-добова/	0,006/сан.-токс.	0,02/трансл.				
	хлортіри фос, 500 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,3/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,002/заг.-сан.	0,2/трансл.	40	10	4	
	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,2 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,04-максимальна разова; 0,01-середньо-добова/	0,006/сан.-токс.	0,02/трансл.				
	хлортіри фос, 500 г/л +	0,001	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,3/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,002/заг.-сан.	0,2/трансл.	40	не погр.	4	
	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,2 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,04-максимальна разова; 0,01-середньо-добова/	0,006/сан.-токс.	0,02/трансл.				
	хлортіри фос, 500 г/л +	0,001	соє (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,3/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,002/заг.-сан.	0,2/трансл.	-	-	-	
	циперметрин, 50 г/л	0,003		не погр.*	0,2 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,04-максимальна разова; 0,01-середньо-добова/	0,006/сан.-токс.	0,02/трансл.				
	хлортіри фос, 500 г/л +	0,001	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,3/ небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,002/заг.-сан.	0,2/трансл.	30	не погр.	4	
	циперметрин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,2 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,04-максимальна разова; 0,01-середньо-добова/	0,006/сан.-токс.	0,02/трансл.				

					визн. ГРХ-0,1)	чний при пограп лянні на шкіру	альна разова; 0,01 - середнь о- добова/						
		хлорпіри фос, 500 г/л +	0,001	ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3/ небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	
		ципермет рин, 50 г/л	0,003		не погр.*	/0,2 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
5 9 6	Супер Стар, КС			<i>Контроль за азоксистроbinом та тебуконазол</i>									
		азоксистр обін, 120 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,025* (межа визн. ГРХ- 0,025)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 120 г/кг +	0,03	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/кг	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
5 9 7	Сухові й Некст, РК	дикват дибромід, 280 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)	0,05/ небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соє ¹ (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)					6	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)					7	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
5 9 8	Сухові й Пауер SL, РК	глюфоси нат амонію, 200 г/л	0,02	соє ¹ (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,02	/0,002	0,02/ заг.-сан.	/0,1	10	не погр.	3	2
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
				соняшник ¹ (насіння)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)					5	не погр.	3	

				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-		
5 9 9	Сухо й Форте, РК	дикват дибромід, 374г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)	0,05/ небезпе чний при попрап лянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	2 (небезп ечний при попрап лянні на слизові оболон ки очей)	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-		
				соя ¹ (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)					6	не погр.	3		
				соя(олія)	не погр.*					-	-	-		
				ріпак ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)					7	не погр.	3		
				ріпак(олія)	не погр.*					-	-	-		
6 0 0	Сферік о, ТН			Контроль за флудіоксонієм та бензаксілом-М										
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий уводі)	
		беналакс ил-М, 20 г/л	0,001		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,5	/0,005	0,002/ заг.-сан.	/0,4					
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	нут(зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.		
		беналакс ил-М, 20 г/л	0,001		0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,5	/0,005	0,002/ заг.-сан.	/0,4					
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	соя(зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.		
		беналакс ил-М, 20 г/л	0,001		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,005	0,002/ заг.-сан.	/0,4					
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	соя(олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-		
		беналакс ил-М, 20 г/л	0,001		не погр.*	/0,5	/0,005	0,002/ заг.-сан.	/0,4					
		6 0 1	Сценік Голд 350FS, ТН			Контроль за флуопікалідом та флуоксастробіном								
флуопіко лід, 200 г/л +	0,02			ріпак (насіння)	0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,5	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.		2 (високо стійкий уводі та трупні)
флуоксас тробін, 150г/л	0,007				0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.					
флуопіко лід, 200	0,02			ріпак(олія)	не погр.*	/1,5	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-		

		г/л +											
		флуоксас тробін, 150 г/л	0,007		не погр.*	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.				
		флуопіко лід, 200 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/1,5	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	
		флуоксас тробін, 150 г/л	0,007		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.				
		флуопіко лід, 200 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не погр.*	/1,5	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		флуоксас тробін, 150 г/л	0,007		не погр.*	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл.				
6 0 2	Т-2,КС			Контроль за імідаклопрідом та лямбда-цигалотрином									
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	10	4	2 (високо стійкий у воді)
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при попаді лягні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	10	4	
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при попаді лягні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		імідаклоп рид, 300 г/л +	0,06	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1 небезпе чний при попаді лягні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
6 0 3	Т-12, РК	гліфосату калійна сіль, 551 г/л, в кислотну му	0,01	землі сільськогос- подарськог о призначенн я ²	не погр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	2

		еквівалент -450 г/л											
6 0 4	Табу Нео, КС			Контроль за імідаклопридом та клотіанідом									
		імідаклоп рид, 400 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді та грунті)
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
		імідаклоп рид, 400 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
		імідаклоп рид, 400 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
		імідаклоп рид, 400 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
		імідаклоп рид, 400 г/л +	0,06	соя (олія)	не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
		імідаклоп рид, 400 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
		імідаклоп рид, 400 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не погр.*	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		клотіанід ин, 100 г/л	0,08		не погр.*	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .				
				Контроль за імідаклопридом та фіпропілом									

605	Табу Супер, КС	імдаклоп рид, 400 г/л +	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий увод)
		фіпроніл, 100 г/л	0,0002 5		0,001* (межа визн. ГРХ-0,001)	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн.-мір.				
		імдаклоп рид, 400 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	
		фіпроніл, 100 г/л	0,0002 5		0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн.-мір.				
		імдаклоп рид, 400 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		фіпроніл, 100 г/л	0,0002 5		не погр.	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн.-мір.				
		імдаклоп рид, 400 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	
		фіпроніл, 100 г/л	0,0002 5		0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн.-мір.				
		імдаклоп рид, 400 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не погр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		фіпроніл, 100 г/л	0,0002 5		не погр.	/0,01	/0,0004	0,001/ сан.-токс.	0,05/ водн.-мір.				
606	Табу, КС	імдаклоп рид, 500 г/л	0,06	картопля ² (пізні сорти)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий увод)
607	Тава, РК	етefon, 480 г/л	0,006	зерно хлібних злаків	0,5* (межа визн. ГРХ-0,008)	/1,0	/0,02	0,01/	/0,5	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
608	Тазумі WG, ВГ	етаметсул ьфузон-метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий увод)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	

				ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 0 9	Тайгер Екстра, ВГ	метрибуз ин, 750 г/кг	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ПШХ, СФ-0,03)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн.- мір.	не погр.	7	3	2 (високо стійкий у грунті)
				соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 1 0	Таленд о20, КЕ	проквіназ ид, 200 г/л	0,001	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,001	0,002/ сан.-токс.	/0,04	14	7	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
				яблучний сік	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
6 1 1	Талер, КЕ	тебуконаз ол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соя (зерно)	0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					30	не погр.	3	
				соя (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ- 0,07)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
6 1 2	Талер, ВП	ацетамір ид, 200 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				яблука	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,025)					45	5	3	
				яблучний сік	0,01 (межа визн.)					-	-	-	

					ВЕРХ-0,01)								
				ріпак (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
6 1 3	Тангей зерК, ВГ	каптан, 800 г/кг	0,1	яблука	0,03* (межа визн. ТПХ-0,03)	0,3/	/0,01	0,2/ сан.-токс.	/1,0	40	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,01)					-	-	-	
6 1 4	Танос 50,ВГ			Контроль за фамоксидонам									
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соя (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не погр.	3	3
		фамоксидон, 250 г/кг	0,01		0,04 (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		цимоксан іл, 250 г/кг +	0,05	соя (олія)	не погр.	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		фамоксидон, 250 г/кг	0,01		не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
6 1 5	Тарга Макс, КЕ	хізалофоп-п-етил, 100 г/л	0,01	соєвий горох (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соєвий горох (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соєвий горох (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	3	
				соєвий горох (олія)	не погр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,02)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
				морква	0,05* (межа визн. ТПХ-0,002)					не погр.	7	3	
				цибуля (ріпка)	0,4* (межа визн.)					не погр.	7	3	

[illegible]

6 1 8	Таффіні 320, КС	азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		ципрокон азол, 120 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соє (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 120 г/л	0,002		не погр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 120 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		ципрокон азол, 120 г/л	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/ сан.-токс.	/0,01				
6 1 9	Твікс, КЕ			Контроль за хлорпірифосом									
		хлорпіри фос, 500 г/л +	0,001	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,3/ небезпе чний при попаді лянині на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	не погр.	4	2 (небезп ечний при попаді лянині на слизові оболон ки очей)
		ципермет рин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 небезпе чний при попаді лянині на шкіру	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
		хлорпіри фос, 500 г/л +	0,001	ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3/ небезпе чний при попаді лянині на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	
		ципермет рин, 50 г/л	0,003		не погр.*	/0,2 небезпе чний при попаді лянині на шкіру	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				

6 2 0	Тобу Топ, 250KE	тебуконаз ол, 250 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не попр.	3	3 (високо стійкий увод)
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)					30	не попр.	3	
6 2 1	Тезис, КС	тебуконаз ол, 500 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не попр.	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий увод)
6 2 2	Тейзер, КС	азоксистр обіл, 250 г/л	0,03	соєвишник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не попр.	3	2 (високо стійкий увод)
				соєвишник (олія)	не попр.*					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	не попр.	3	
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не попр.	3	
				кукурудза (олія)	не попр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)					30	не попр.	3	
				соє (олія)	не попр.*					-	-	-	
6 2 3	Тельдо р, 50 WG, ВГ	фенгекса мід, 500 г/кг	0,18	виноград	4,0** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/2,0	/0,005	0,006/ орг., заг.- сан.	0,65/ трансл, водн- мігр, фїтотокс .	15	7	3	3 (високо стійкий увод)
				виноградни й сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				персик	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					20	7	3	
				периковий сік	0,1* (межа визн.					-	-	-	

					ВЕРХ-0,1)								
				черешня	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,1)					20	7	3	
				черешневий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
				суніця	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					10	7	3	
				сунічний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					-	-	-	
6 2 4	Тербі- S, КС			<i>Контроль за S-метопластором та тербутилізіном</i>									
		S-метопласт ор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	не погр.	не погр.	7	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S-метопласт ор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		не погр.*								
6 2 5	Терлан, КС	тербутила зин, 500 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 2 6	Тесон, КЕ			<i>Контроль за 2,4-Д</i>		<i>Контроль за 2,4-Д 2-етилгексиліновим ефіром</i>		<i>Контроль за 2,4-Д</i>					
		2,4-Д 2-етилгексиліновий ефір, 615 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		флорасул ам, 7,4 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фл.токс.				
	Терія, КС			<i>Контроль за прохлоразом</i>		<i>Контроль за прохлоразом, тритіконізолом та азоксистробіном</i>							

6 2 7		прохлора з, 60 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	2 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді та грунті)
		трипикона зол, 20 г/л +	0,025		0,025* (межа визн. ГРХ- 0,025)	/0,2	/0,002	0,001/ заг.-сан.	0,05/ водн.- мір.				
		азоксистр обін, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
6 2 8	Тетрафікс с 15, ВГ	тефлутри н, 15 г/кг	0,005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,007	0,001/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболон ки очей)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				буряки цукрові	0,06* (межа визн. ГРХ- 0,03)					не погр.	7	3	
6 2 9	Тверол дБГ, СЕ			Контроль за S-метолахлором та тербутилизином									3 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
		S- метолахл ор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	не погр.	не погр.	7	
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S- метолахл ор, 312,5 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	-	-	-	
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S- метолахл ор, 312,5 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	не погр.	не погр.	7	
		тербутила зин, 187,5 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S- метолахл ор, 312,5 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не погр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02	-	-	-	
	тербутила зин, 187,5 г/л	0,003	не погр.*		/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04					
				Контроль за карибендизимом									

630	Тіом (ГФМ-500), КС	тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	7	3	3	
			виноградний сік	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	-					-	-			
			яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	20					7	3			
			яблучний сік	0,03* (межа визн. ВЕРХ-0,03)	-					-	-			
631	Тігон, МД	нікосульфурон, 80 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	7	3	2 (високо стійкий у воді)	
			кукурудза (олія)	не потр.*	-					-	-			
632	Токсифос 500 ТАБ, ТБ			Контроль за фосфіном										
		фосфід алюмінію, 560 г/кг	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. індикаторними трубками н-0,07)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	20	7 (доп усклюде й та загрузка приміщення)		1	
			соя (зерно)	0,05* (межа визн. індикаторними трубками н-0,07)	20					7 (доп усклюде й та загрузка приміщення)				
			зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. індикаторними трубками н-0,07)	20					7 (доп усклюде й та загрузка приміщення)				
			складські приміщення, трюми							7 (доп усклюде й та загрузка)				

											примі- щення)		
6 3 3	Топазин, КС			Контроль за тербутилазином та S-метолахлором									
		тербутила- зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила- зин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		не погр.*	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила- зин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила- зин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01	не погр.*	/1,0		/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02						
6 3 4	Топazio, ВГ	сірка, 800 г/кг	не норм успіся	зерно хлібних злаків	не погр.	6,0	/0,07	не нормує- ся	не нормує- ся	30	не погр.	3	2
				буряки цукрові	не погр.					30	3	3	
				ріпак (насіння)	50,0 (межа визн. ВЕРХ- 10,0)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-	
				яблука	50,0 (межа визн. ВЕРХ- 5,0)					30	3	3	
				яблучний сік	не погр.					-	-	-	
6 3 5	Топшо- т, 113 ОД, МД			Контроль за цизалопф-бутилом									
		пенокси- лам, 13,33 г/л +	0,005	рис ¹	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	3	2 (небезп- ечний при пограп- лянні на слизові оболон- ки очей,
цигалопф- п-бутил, 100г/л	0,003	0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02) (по сумі	/1,5		/0,001	0,006/ сан.-токс. (по сумі кислоти та ефіру)	/0,4 (по сумі кислоти та ефіру)						

					кислоти та ефіру)								алерген)
636	ТОР БТ,КЕ	альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не погр.	4	
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)					-	-	-	
637	Торбо, ВГ			Контроль за трибенурон-метилом та тіфенсульфурон-метилом									
		трибенурон-метил, 300 г/кг +	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
		тіфенсульфурон-метил, 300 г/кг +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,01)								
флорасулам, 100 г/кг	0,05	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0		/0,003								
638	Торлай тинг, РК			Контроль за імізамоксом та імізапіром									
		імізамокс ,33 г/л +	3,0	соєвий горошок (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		імізапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)								
		імізамокс ,33 г/л +	3,0	соєвий горошок (олія)	не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
імізапір, 15 г/л	1,0	не погр.*	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру		/0,05								
639	Торнадо 540, РК	гліфосату калійна сіль, 662,0 г/л, в кислотному еквіваленті -540 г/л	0,01	осіння та весняна обробки сільськогосподарських угідь, обробка землі під пар, землі несільськогосподарського	не погр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр. (гербіцид)	7 (гербіцид)	3 (гербіцид)	3 (високостійкий у воді)

				призначення									
				соняшник ¹ (насіння)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					11 (десика нт)	не попр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				соняшник (олія)	не попр.*					-	-	-	
				сорго (зерно)	5,0 (межа визн. ВЕРХ- 1,0)					14 (десика нт)	не попр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				горох ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14 (десика нт)	не попр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				кукурудза ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14 (десика нт)	не попр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				кукурудза (олія)	не попр.*					-	-	-	
				ріпак ¹ (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,4)					14 (десика нт)	не попр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				ріпак (олія)	не попр.					-	-	-	
				соя ¹ (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					14 (десика нт)	не попр. (деси кант)	3 (десик ант)	
				соя (олія)	не попр.					-	-	-	
6 4 0	Торрін то 500, КЕ	прохлора з,300 г/л +	0,001	Контроль за прохлором та тебуконазол									
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
					0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
6 4 1	Траумі кс БТ, КС			Контроль за карбендасимом, епоксиконазолом, тебуконазолом		Контроль за тіофаніп- метилом, епоксиконазолом		Контроль за карбендасимом, епоксиконазолом, тебуконазолом					
		тіофаніп- метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді та пруді)
		епоксико назол, 120 г/л +	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		тебуконаз ол, 70 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				

		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
6 4 2	Триада ККР			Контроль за пропіконазолом, тебуконазолом та епоксиконазолом									
		пропіконазол, 140 г/л +	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	2 (небезпечний при пограб- лянні на шкіру та слизові оболон- ки очей, високо- стійкий у воді та грунті)
		тебуконазол, 140 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		епоксиконазол, 72 г/л	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
6 4 3	Трибунал, РГ	трибенурон-метил, 500 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 4 4	Триміта™, ТН			Контроль за імідаклопридом									
		флудіоксоніл, 50 г/л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо- стійкий у воді)
		тебуконазол, 30 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
імідаклоприд, 400 г/л	0,06	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2		/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04						
6 4 5	Триазолон FS, КС	трипиконазол, 20 г/л +	0,025	зерно хлібних злаків	0,025* (межа визн. ГРХ- 0,025)	/0,2	/0,002	0,001/ заг.-сан.	0,05/ водн.- мікр.	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо- стійкий у воді та грунті)
		прохлораз, 60 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3				
6 4 6	Тристар, ВГ			Контроль за флуроксипіром		Контроль за флуроксипір-метиліом		Контроль за флуроксипіром					
		трибенурон-метил, 500 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн.)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	2 (високо- стійкий у воді та грунті)

		40 г/кг +			ВЕРХ- 0,005)								стійкий у воді)
		тіфенсуль фуран- метил, 40 г/кг +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,1	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		флуроксн гір- метил, 360 г/кг	0,2		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,025)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2				
6 4 7	Тріафе рТ300 КС			<i>Контроль за флутриафолом та тебуконазолом</i>									
		флутриаф ол, 75 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	/0,1 небезпе- чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		тебуконаз ол, 225 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		флутриаф ол, 75 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе- чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	50	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 225 г/л	0,03		0,5* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		флутриаф ол, 75 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не погр.*	/0,1 небезпе- чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		тебуконаз ол, 225 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
6 4 8	Трінті, КС			<i>Контроль за дифлуфенізіном, хлоротолуоном та пендиметаліном</i>									
		дифлуфе нікан, 40 г/л +	0,05	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,5	/0,001	/0,15 сан.-токс.	/0,15	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
		хлоротолу рон, 250 г/л +	0,01		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,003	0,02/ заг.-сан.	/0,06				
		пендимет алін, 300 г/л	0,008		0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,5/ небезпе- чний	/0,002	0,05/ орг.	/0,2				
6 4 9	Трой, РК	бенпазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн.)	/1,0 небезпе- чний	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний)

					ТШХ-0,1)	при потрап лянні на шкіру							при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
				соє(олія)	не погр.*					-	-	-	
6 5 0	Трон, ВГ (Рангол і915)	римсуль фурон, 250г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	3	3
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 5 1	Тру, ВГ	трибенур он-метил, 750г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не погр.	не погр.	3	3
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 5 2	Турбо Престо, КС			Контроль за клотінідіном та лямбда-цигалотрином									
		клотіанід ин, 200 г/л +	0,08	яблука ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	30	10	4	3 (високо стійкий у воді та пруні)
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		клотіанід ин, 200 г/л +	0,08	яблучний сік	0,025* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		клотіанід ин, 200 г/л +	0,08	картопля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс .	30	10	4	
		лямбда- цигалотр ин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
6 5 3	Ультра- трейн, КЕ	малаціон, 10%	0,02	зерно хлібних злаків (запаси на зберігання)	3,0* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/ небезпе чний при пограп	0,015/	0,05/ орг.	2,0/ трансл.	30	3	3	3 (алерге н)

				складські приміщення		лянні на шкіру				не погр.	3	3	
654	Урожай, ВГ	тебуконазол, 750 г/кг	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	0,4	0,02	0,025/ заг.-сан.	0,10	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
655	Фабус 497, КС			Контроль за карбендасимом та епоксиконазолом		Контроль за тіофанат-метилом та епоксиконазолом		Контроль за карбендасимом та епоксиконазолом					
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТПХ-0,05)	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		епоксиконазол, 187 г/л	0,004		0,1 (межа визн. ГРХ-0,02)	0,01	0,0005	0,004/ заг.-сан.	0,4				
		карбендасим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ТПХ-0,1)	0,1/	0,001	0,1/ орг.	0,1				
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	буяки цукрові	0,05* (межа визн. ТПХ-0,05)	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	30	7	3	
		епоксиконазол, 187 г/л	0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,01	0,0005	0,004/ заг.-сан.	0,4				
		карбендасим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТПХ-0,06)	0,1/	0,001	0,1/ орг.	0,1				
656	Файро ВДЖ, РГ	гліфосату амонійна сіль, 75,7 %, в кислотну еквіваленті - 68%	0,01	зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	1,0/	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	3
				обробка землі під пар, землі несільсько-господарського призначення	не погр.*					не погр.	7	3	
657	Файер, ТС			Контроль за тирином									
		тирам, 400 г/л +	0,005	соєвишник (насіння)	0,45* (межа визн. ВЕРХ-0,45)	0,5/	0,05-максимальна разова; 0,02-середньодобова/	0,01/ сан.-токс.	0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3
		металаксил-М, 116	0,03		0,1* (межа визн.)	0,5/	0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05				

		г/л +			визн. ГРХ- 0,04)								
		тіабендаз ол, 20 г/л	0,1		0,4* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.					
		тірам, 400 г/л +	0,005	соняшник (олія)	не погр.*	0,5/	0,05- максим альна рзхова; 0,02- середнь о- добова/	0,01/ сан.-токс.	/0,2	-	-	-	
		металакс ил-М, 116 г/л +	0,03		не погр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		тіабендаз ол, 20 г/л	0,1		не погр.*	/1,0	/0,08	0,05/ сан.-токс.					
6 5 8	Фанданго 200 ЕС, КЕ			Контроль за флуоксистробіном, протіоконозолем та протіоконозолом-дестію									
		флуоксастробін, 100 г/л +	0,007	цибуля (ріпка)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,005	0,01/ сан.-токс.	0,4/ трансл (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	20	7	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 100 г/л	0,001		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
6 5 9	Фантазі, КС			Контроль за азоксистробіном та дифеноконазолом									
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високостійкий у воді)
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
6 6 0	Фантік М, ЗП			Контроль за манкоцебом та ЕТС									
		беналаксил-М, 4% +	0,001			/0,5	/0,005	0,002/ заг.-сан.	/0,4		7	3	2
		манкоцеб, 65%	0,005			0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1				
6 6 1	Фантом, КС	флупірифол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн.)	/0,1 небезпечний при	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)

					ГРХ-0,008)	потрап лянні на шкіру							та пруги)	
6 6 2	Фастак ,КЕ	альфа- ципермет рин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03	30	не потр.	4	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)	
				соя(зерно)	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)						не потр.	4		
				соя(олія)	не потр.						-	-		-
				кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,01)						30	не потр.		4
				кукурудза (олія)	не потр.						-	-		-
6 6 3	Феве р 300FS, ТН			Контроль за протиоконсолом- дестію		Контроль за протиоконсолом			Контроль за протиоконсолом- дестію					
		протиокон азол, 300 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високо стійкий уводі)	
		кукурудза (олія)	не потр.*	-	-					-				
6 6 4	Фезан Плюс, КС			Контроль за хлороталонілом та тебуконазолом										
		хлоротал оніл, 166 г/л +	0,003	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,2 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,01	/0,05 сан.-токс.	/0,2	30	не потр.	3	2 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий уводі та пруги)	
тебуконаз ол, 60г/л	0,03	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4		/0,02									0,025/ заг.-сан.
6 6 5	Федера л,РК	гліфосату ізопропіл амінна сіль, 480 г/л +	0,01	обробка землі під пар, землі несільсько- господарсь кого призначенн я ²	не потр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не потр.	7	3	3 (високо стійкий уводі)	
		дикамба, 60 г/л	0,004		не потр.*	1,0/								/0,01
6 6 6	Фенікс 069,КЕ (Feniks 069, ЕС)	феноксап ропіл- етил, 69 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТПХ- 0,2)	/0,6	/0,002	0,0003/ заг.-сан.	/0,04	не потр.	не потр.	3	2 (високо стійкий уводі)	
6 6 7	Фенікс Дуо (АХГ- 84),КС	флутріаф ол, 187 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	/0,1 небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не потр.	3	3 (високо стійкий уводі та пруги)	

		тіофанат-метил, 310 г/л (по карбендзиму)	0,08		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
668	Фіст, СК	пендиметалін, 38,70 %	0,008	соняшник (насіння)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
669	Фітал ®, РК	Контроль за сумою фосфористої кислоти та алюмінію фосфіту											
		фосфори ста кислота, 80 г/л +	2,0	кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	60	не погр.	3	3 (небезпечний при потрап-лянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		алюмінію фосфіт, 570 г/л			0,3* (межа визн. ФМ-0,3)								
		фосфори ста кислота, 80 г/л +	2,0	кукурудза (олія)	не погр.	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	-	-	-	
		алюмінію фосфіт, 570 г/л			не погр.								
		фосфори ста кислота, 80 г/л +	2,0	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	60	не погр.	3	
		алюмінію фосфіт, 570 г/л			0,3* (межа визн. ФМ-0,3)								
		фосфори ста кислота, 80 г/л +	2,0	соняшник (олія)	не погр.	/0,2	/0,02	0,3/ сан.-токс.	/0,5	-	-	-	
		алюмінію фосфіт, 570 г/л			не погр.								
670	Флагман Екстра, РК	Контроль за бензизонам та ацидфлуорфеном											
		бензотон, 360 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	
		ацидфлуорфен, 160 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)								/0,2 небезпечний при потрап-лянні на шкіру
		бензотон, 360 г/л +	0,1	соя (олія)	не погр.	/1,0 небезпечний	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-	

		ацифлуор фен, 160 г/л	0,01		не погр.	при попаді ляння на шкіру /0,2 небезпе чний при попаді ляння на шкіру	/0,01	0,002/ сан.-токс.	/0,2				
6 7 1	Флейм Плюс, SC, KC	флорасул ам, 50 г/л	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .	не погр.	не погр.	3	3
				кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
6 7 2	Флінг Стар 520, KC та Скала 400, KC	піримета ніл	0,02			/1,0	/0,02	0,04/ сан.-токс.	/0,3				
6 7 3	Флори спин, КР	Контроль за пенконзолом та піридабенем											
		піридабен , 0,15 г/л +	0,03	декоративні культури відкритого грунту, у тому числі квіти ²	не погр.	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1	3	3	не погр.	3 (високо стійкий у грунті)
		пенконаз ол, 0,2 г/л +	0,007		не погр.	/0,8	/0,02	0,003/ заг.-сан.	/0,1				
		тіаметокс ам, 0,1 г/л	0,02		не погр.	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		піридабен , 0,15 г/л +	0,03	декоративні кімнатні культури ²	не погр.	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1	час очікува ння до входу і перебув ання людей в побутов их приміщ еннях - 6 годин, включа ючи 20 хвилин провітр ювання; час очікува ння до контакт у з рослина ми - 1 доба			
		пенконаз ол, 0,2 г/л +	0,007		не погр.	/0,8	/0,02	0,003/ заг.-сан.	/0,1				
		тіаметокс ам, 0,1 г/л	0,02		не погр.	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		флутуіокс азин, 51%	0,002	соя (зерно)	0,05* (межа	/1,0	/0,001	0,004/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	2

6 7 4	Флузіо н WG, ВГ				визн. ВЕРХ- 0,05)								
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
6 7 5	Флуме т, ВГ	флуметсу лам, 800 г/кг	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс „водно- мір, трансл.	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруді)
				соє (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 7 6	Фокс 325 SC, КС			<i>Контроль за трифлуксистеробін, протіококсолом-дестію (1) та протіококсолом (2)</i>									
		трифлукс и-стеробін, 150 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	50	не погр.	7	2 (небезп ечний при по трап лянні на сли зові оболон ки очей, алерген , високо стійкий у воді)
		проіокон азол, 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				
		трифлукс и-стеробін, 150 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не погр.	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		проіокон азол, 175 г/л	0,001		не погр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				
		трифлукс и-стеробін, 150 г/л +	0,02	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	35	не погр.	7	
		проіокон азол, 175 г/л	0,001		0,05** (1) (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				
		трифлукс и-стеробін, 150 г/л +	0,02	соє (олія)	не погр.**	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		проіокон азол, 175 г/л	0,001		не погр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				
		трифлукс и-стеробін, 150 г/л +	0,02	горох (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	25	не погр.	7	
		проіокон азол, 175 г/л	0,001		0,05 (1) (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)				

6 7 7	Фокус Дабл, КС			<i>Контроль за тіофанат-метилом, карбендазимом та епоксиконазолом</i>		<i>Контроль за тіофанат- метилом та епоксиконазолом</i>		<i>Контроль за тіофанат- метилом, карбендазимом та епоксиконазолом</i>					
		тіофанат- метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не попр.	3	2 (високо стійкий уводі та пруні)
		епоксико назол, 180 г/л	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4				
		карбендз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
6 7 8	Фонтес, ЗП			<i>Контроль за манкоцебом та ЕТС</i>		<i>Контроль за манкоцебом</i>							
		манкоцеб , 800 г/кг	0,005	томати	0,5* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	20	7	3	2
				томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
				виноград	0,5* (межа визн. ГРХ- 0,05)					30	7	3	
				виноград технічних сортів (на вино- матеріали)	5,0 (межа визн. ГРХ- 0,05)					30	7	3	
				виноградни й сік	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
				яблука	0,04* (межа визн. ГРХ- 0,02)					30	7	3	
				яблучний сік	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					-	-	-	
				груші	0,04 (межа визн. ГХ- 0,02)					30	7	3	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ГХ- 0,01)					-	-	-	
		ЕТС (метаболі	0,0003	томати	0,02* (межа	не попр.	не попр.			-	-	-	

		Т манкоцеб у)			визн. ВЕРХ- 0,02)			не нормуст ся	не нормуст ся				
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					-	-	-	
				виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					-	-	-	
				виноград технічних сортив (на вино- матеріали)	не погр.*					-	-	-	
				виноградни й сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)					-	-	-	
				яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					-	-	-	
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					-	-	-	
				груші	0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					-	-	-	
				грушевий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)								
6 7 9	Форс 200 CS, СК	тефлутри н, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1	/0,007	0,001/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	2
6 8 0	Фортен за 600 FS, TH	циантрапі ліпрол, 600 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,003	0,004/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 8 1	Франк орн, КС	мезотріон , 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)

				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 8 2	Фронд а, КС	<i>Контроль за ацетаміпрідом та лямбда-цигалотрином</i>											
		ацетаміпр ид, 100 г/л +	0,01	картопля	0,025* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	0,2	0,003	0,02/ сан.-токс.	0,1	30	10	4	3 (високо стійкий у воді)
		лямбда- цигалотр ин, 30 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1 небезпе чний при попаді лягінні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпр ид, 100 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,003	0,02/ сан.-токс.	0,1	40	не погр.	4	
		лямбда- цигалотр ин, 30 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,1 небезпе чний при попаді лягінні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпр ид, 100 г/кг +	0,01	ріпак (олія)	не погр.	0,2	0,003	0,02/ сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 30 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпе чний при попаді лягінні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпр ид, 100 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,2	0,003	0,02/ сан.-токс.	0,1	40	не погр.	4	
		лямбда- цигалотр ин, 30 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,1 небезпе чний при попаді лягінні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
		ацетаміпр ид, 100 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	не погр.*	0,2	0,003	0,02/ сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 30 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1 небезпе чний при попаді лягінні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
	Фронт ьр		0,02	кукурудза (зерно)	0,02* (межа	0,7	0,01	0,1/ орг.	0,1	не погр.	7	3	3

683	Оптим а,КЕ	диметена мід-П, 720г/л			визн. ВЕРХ-0,02)								
				кукурудза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)								
684	Фулка ра,КЕ	прохлора з, 450г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
685	Фузарин, КС			Контроль за протоксізом та тебуконазолом									
		прохлора з,300г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		тебуконазол, 150г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
686	Фукусія, ТН	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3
				кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ТПХ-0,01)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)					не погр.	не погр.	не погр.	
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-	
687	Фулпор Голд 500, КС			Контроль за карбендазімом та флутриафолом									
		карбендазім, 300 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не погр.	3	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
флутриафол, 200г/л	0,01	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру		/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансп.						

		карбендаз им, 300 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	20	не погр.	3	
		флутриад ол, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан-токс.	0,1/ трансл.				
		карбендаз им, 300 г/л +	0,01	соя (олія)	не погр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		флутриад ол, 200 г/л	0,01		не погр.*	/0,1 небезпе чний при попаді лянні на шкіру	/0,001	0,006/ сан-токс.	0,1/ трансл.				
6 8 8	Фунгабі н Т 480, ТН	карбендаз им, 148 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високо стійкий у воді та грунті)
		тирам, 332 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,5/	0,05- максим альна разова; 0,02 - середнь о- добова/	0,01/ сан-токс.	/0,2				
		карбендаз им, 148 г/л +	0,01	соя (олія)	не погр.	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		тирам, 332 г/л	0,005		не погр.	0,5/	0,05- максим альна разова; 0,02 - середнь о- добова/	0,01/ сан-токс.	/0,2				
6 8 9	Фундаз им 500, КС	карбендаз им, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не погр.	4	3
6 9 0	Футури н, ВГ	дикамба напрісва сіль, 660 г/кг +	0,004	газонні трави ²	не погр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	1	1	3 (високо стійкий у воді)
		тіфенсуль фурон- метил, 60 г/кг	0,01		не погр.	/0,1	/0,01	0,01/ сан-токс.	/0,05				

691	ХаммерДуо, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д 2-етилгексилловий ефір, 491,5 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансп.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
		флорасул ам, 8,5 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.				
692	Хангер, РК			Контроль за імазамоксом та імазапіром									
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.-мігр.				
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		імазапір, 15 г/л	1,0		не погр.*	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,05	0,1/ заг.-сан.	0,03/ водн.-мігр.				
693	Хелпіг, РК	дикамба, 480 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансп.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
694	Хімера, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
695	Хізал 125, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не погр.**					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)

					ВЕРХ-0,05)								ки очей)
				соя (оля)	не погр.**					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (оля)	не погр.**					-	-	-	
				буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)					не погр.	7	3	
6 9 6	Хлорис ,ЕН			<i>Контроль за хлорисом</i>									
		прохлора з, 60 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,001	0,06/ сан-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		тебуконаз ол, 15 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
6 9 7	Хлорпі риві-агро, КЕ			<i>Контроль за хлорпірифосом</i>									
		хлорпіри фос, 500 г/л +	0,001	яблука	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,3/ небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансп.	40	10	4	2
		ципермет рин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	0,04-максим альна разова; 0,01 - середнь о-добова/	0,006/ сан-токс.	0,02/ трансп.				
		хлорпіри фос, 500 г/л +	0,001	яблучний сік	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,3/ небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансп.	-	-	-	
		ципермет рин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 небезпечний при потрап-лянні на шкіру	0,04-максим альна разова; 0,01 - середнь о-добова/	0,006/ сан-токс.	0,02/ трансп.				
		хлорпіри фос, 500 г/л +	0,001	сорго	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	0,3/ небезпечний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансп.	30	не погр.	4	

		ципермет рин, 50 г/л	0,003		0,3** (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,2 небезпе- чний при попаді лянні на шкіру	0,04- максим альна рзова; 0,01 - середнь о- добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
6 9 8	Хорда, ТН			<i>Контроль за флудіоксонілом та метиліксілом-М</i>									
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ПШХ- 0,01)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо- стійкий у воді)
		металікс ил-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
		металікс ил-М, 10 г/л	0,03		не погр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	соя (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металікс ил-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	соя (олія)	не погр.*	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
		металікс ил-М, 10 г/л	0,03		не погр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	соєви́шник (на́сіння)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металікс ил-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	соєви́шник (олія)	не погр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
		металікс ил-М, 10 г/л	0,03		не погр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	рі́пак (на́сіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металікс ил-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25	0,015	рі́пак (олія)	не погр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	

		г/л +											
		металакс ил-М, 10 г/л	0,03		не погр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіокс оніл, 25 г/л +	0,015	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металакс ил-М, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
6 9 9	Хотспю т, МД			Контроль за цизифлоф-бутилом									
		пенноксу лам, 13,33 г/л +	0,005	рис	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	3	3
		цигалофо п-бутил, 100 г/л	0,003		0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)(по сумі кислоти та ефіру)	/1,5	/0,001	0,006/ сан.-токс. (по сумі кислоти та ефіру)	/0,4 (по сумі кислоти та ефіру)				
7 0 0	Центур іон Профі, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,07	/0,005	0,01/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий у воді)
			соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	не погр.					не погр.	3		
			соняшник (олія)	не погр.	-					-	-		
			соя (зерно)	0,1 (межа визн. ТШХ- 0,05)	не погр.					не погр.	3		
			соя (олія)	не погр.	-					-	-		
			ріпак (насіння)	0,15 (межа визн. ТШХ- 0,08)	не погр.					не погр.	3		
			ріпак (олія)	не погр.	-					-	-		
7 0 1	Цербер, КЕ			Контроль за хлортрифосом									
		хлортри фос, 500 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,3/ небезп ечний при пограп лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	не погр.	4	2
		ципермет рин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	0,04- максим альна разова; 0,01 - середнь	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				

							о- добова/						
7 0 2	Церера 459 (Cere 459), СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-этилгексиловим ефіром		Контроль за 2,4-Д					2
		2,4-Д2- етил- гексилов ий ефір, 453 г/л +	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	
		флорасул ам, 6 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		2,4-Д2- етил- гексилов ий ефір, 453 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ- 0,015)	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не погр.	не погр.	3	
		флорасул ам, 6 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
		2,4-Д2- етил- гексилов ий ефір, 453 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5	/0,0005	0,002/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		флорасул ам, 6 г/л	0,05		не погр.*	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс .				
7 0 3	Церко шлеф, КС			Контроль за дифенонанолом та карбендазимом									
		дифенано назол, 250 г/л +	0,002	соєвишник (насіння)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	3
		карбендз им, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/ 0,001	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		дифенано назол, 250 г/л +	0,002	соєвишник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		карбендз им, 250 г/л	0,01		не погр.*	0,1/ 0,001	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		дифенано назол, 250 г/л +	0,002	соє(зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3	
		карбендз им, 250 г/л	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/ 0,001	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		дифенано назол, 250 г/л +	0,002	соє(олія)	не погр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	

		карбендазим, 250 г/л	0,01		не погр.	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1						
704	Церон 480SL, РК	стефон, 480 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,02	0,01/	/0,5	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)		
		соняшник (олія)		не погр.	-					-	-				
705	Циделі Топ 140 ДС, ДК	Контроль за дифеноконазолом та цифлутримідом													3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високотійкий у воді та ґрунті)
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	30	7	3			
		цифлутримід, 15 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1						
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	яблучний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-			
		цифлутримід, 15 г/л	0,01		не погр.*	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1						
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	огірки відкритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	14	7	3			
		цифлутримід, 15 г/л	0,01		0,04** (межа визн. ГРХ-0,04)	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1						
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	огірки закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	3	2	не погр.			
		цифлутримід, 15 г/л	0,01		0,04** (межа визн. ГРХ-0,04)	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1						
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	томати закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	3	2	не погр.			
		цифлутримід, 15 г/л	0,01		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1						
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	томатний сік	не погр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-			

		цифлуфе намід, 15 г/л	0,01		не погр.	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		дифеноко назол, 125 г/л +	0,002	морква	0,2 (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	20	7	3	
		цифлуфе намід, 15 г/л	0,01		0,02** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
7 0 6	Цимок сил, ЗП			<i>Контроль за цимоксанином та флутриафолом</i>									
		цимоксан іл, 300 г/кг +	0,05	соєвпшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та пруні)
		флутриаф ол, 210 г/кг	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		цимоксан іл, 300 г/кг +	0,05	соєвпшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		флутриаф ол, 210 г/кг	0,01		не погр.*	/0,1 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		цимоксан іл, 300 г/кг +	0,05	соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	30	не погр.	3	
		флутриаф ол, 210 г/кг	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
		цимоксан іл, 300 г/кг +	0,05	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,03	0,06/ сан.-токс.	/0,04	-	-	-	
		флутриаф ол, 210 г/кг	0,01		не погр.*	/0,1 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.				
7 0 7	Цирку ль, КЕ	лямбда- цигалопр ин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпечний при попаданні	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	20	не погр.	4	2
				ріпак (насіння)	0,1* (межа					20	не погр.	4	

					визн. ГРХ-0,1)	на шкіру							
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	4	
				соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
7 0 8	Ціпте ль, ЗП			<i>Контроль за манкоцебом, металаксілом та ЕТС</i>		<i>Контроль за манкоцебом</i>		<i>Контроль за манкоцебом та металаксілом</i>					
		манкоцеб , 640 г/кг +	0,005	картопля	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,1	14	7	3	3 (небезп ечний при пограп лянні на слизові оболон ки очей, високос тійкий уводі)
		металакс ил, 80 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		ЕТС (метаболі т манкоцеб у)	0,0003		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	не погр.	не погр.	не нормуст ься	не нормуст ься	-	-	-	
7 0 9	Челенд ж 600 SC, KC	аклоніфе н, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/0,005 (межа визн. ВЕРХ- 0,004)	0,01/ (межа визн. ВЕРХ- 0,005) заг.-сан.	/0,08 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі та прунт)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				морква	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					не погр.	7	3	
				цибуля (ріпка) (забороняє ться реалізація цибулі на перо)	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					не погр.	7	3	
7 1 0	Чемп Ультра ДР, ВГ	міді гідроксид, 576 г/кг	0,05 (по міді)	зерно хлібних злаків	5,0* (межа визн. СФ-1,0) (по міді)	0,5/	0,03- максим альна разова; 0,005- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	не погр.	3	2 (небезп ечний при пограп лянні на шкіру та слизові оболон ки очей)
				буряки цукрові	5,0* (межа визн. ААС- 0,04) (по міді)					20	7	3	
7 1 1	Шерма н, КЕ	абамекти н, 20 г/л	0,0002	виноград	0,01 (межа визн.)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	7	3	2 (небезп ечний)

					ВЕРХ-0,005)								при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				виноградний сік	не погр.*					-	-	-	
				яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	
				яблучний сік	не погр.*					-	-	-	
				соє (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)					14	7	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
712	Широ, ВГ	трифлу-сульфурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,1	0,15/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3	3 (високо- стійкий у воді)
713	Штарга, КЕ	хізалофоп-г-метил, 50 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
714	Штармоні, ВГ	тіфенсульфурон-метил, 750 г/кг	0,01	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1	/0,01	0,01/ сан.-токс.	/0,05	не погр.	не погр.	3	3
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
715	Штарнес, КЕ	ацетохлор, 900 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,008)	1,0	/0,0001	0,002/ сан.-токс.	0,5/ водн.-мігр.	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрап- лянні на слизові оболонки очей, високо- стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
716	Штефакарицид, КС	спіродиклофен, 240 г/л	0,001	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2	/0,0007	0,002/ сан.-токс.	/0,4	30	не погр.	3	2
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
717	Штефазон, РК	бенгазон, 480 г/л	0,1	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потрап- лянні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	

7 1 8	Штефамба, РК	дикамбау формі диметил мінної солі, 480 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ- 0,04)	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,25/ трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
7 1 9	Штефране, КЕ	флуорокси пір, 333 г/л	0,2	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ГРХ- 0,025)	1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
7 2 0	Штефдикват, РК	дикват дибромід, 374г/л	0,002	соє (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)	0,05/ небезпе чний при потрап лянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
				соє (олія)	0,1* (межа визн. ФМ- 0,05)					-	-	-	
7 2 1	Штеф-екстра, СЕ			Контроль за тербутилазином та S-метолахлором									
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соєвпшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	7	3 (небезп ечний при потрап лянні на шкіру та слизові оболон ки очей, високо стійкий у воді)
		S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0	/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соєвпшник (олія)	не погр.*	1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
S- метолахл ор, 312,5 г/л	0,01	не погр.*	1,0		/0,02	0,02/ сан.-токс.	/0,02						
7 2 2	Штефемод, КЕ			Контроль за сумою ефіру та кислоти в перерахунок на ефір		Контроль за тринаєтакетиліом		Контроль за сумою ефіру та кислоти в перерахунок на ефір					
		тринекса пак-спид, 250г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	35	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на слизові оболон ки очей)
7 2 3	Штефво-хлор, КЕ	пропізохл ор, 720г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезп ечний при потрап лянні на
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	

													слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
7 2 4	Штефіто, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,006	0,02/ сан.-токс.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
7 2 5	Штефіом, КЕ	клотазон, 480 г/л	0,04	ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	0,5	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
7 2 6	Штефір, КС			<i>Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином</i>									
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,2	0,005	0,007/ заг.-сан.	0,04	30	не погр.	4	3 (високостійкий у воді)
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/ сан.-токс.	0,05				
7 2 7	Штефіакт, КС	флутриафол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не погр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
7 2 8	Штефіпропругий, ТН			<i>Контроль за дифеноконазолем</i>									
		дифеноконазол, 40 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високостійкий у воді)
		тебуконазол, 40 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	0,4	0,02	0,025/ заг.-сан.	1,0				
		азоксистробін, 15 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3				
7 2 9	Штефістробін, КС	азоксистробін, 250 г/л	0,03	буряки цукрові	0,1 (межа визн.)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	не погр.	7	3	3 (високо)

					ВЕРХ-0,1)								стійкий у воді)
			0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	не погр.	3	
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)					30	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)					30	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
730	Шпиль, КС			Контроль за епоксиконазолом та карбендазімом		Контроль за епоксиконазолом та тіофанат-метилом		Контроль за епоксиконазолом та карбендазімом					
		епоксиконазол, 187 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
		карбендазім (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
731	Штума, ЕВ	феноксап-роп-етил, 69 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТПХ, ВЕРХ-0,2)	/0,6	/0,002	0,0003/ заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високо стійкий у воді)
		антидот кюквінто-сет-мексил, 34,5 г/л	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
732	ЮНІ-ГЛІ 360, РК	гліфосату ізопропіл-амінна сіль, 480 г/л, в кислому еквіваленті-360 г/л	0,01	осіння та весняна обробки сільськогосподарських угідь	не погр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	не погр.	3	2
733	ЮНІ-ГРАС 150, КЕ	хізалофоп-етил, 150 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	2
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	

				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
7 3 4	ЮНІ- КВАТ 200, РК	дикват, 200 г/л	0,002	соєвишник (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ- 0,05)	0,05/ небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	2
				соєвишник (олія)	0,1* (межа визн. ФМ- 0,05)					-	-	-	
				соє (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ- 0,25)					6	не погр.	3	
				соє (олія)	0,1* (межа визн. ФМ- 0,05)					-	-	-	
7 3 5	ЮНІ- КО 80, МД	нікосуль- фузон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	2 (високо- стійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
7 3 6	ЮНІ- КС 35%, КЕ			Контроль за ацетаміфосом та лямбда-цигалотрином									
		ацетаміпр ид, 20 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	35	не погр.	4	3 (високо- стійкий у воді)
		лямбда- цигалотр ин, 15 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпр ид, 20 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	35	не погр.	4	
		лямбда- цигалотр ин, 15 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпр ид, 20 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не погр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотр ин, 15 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпе- чний при пограп	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05				

						лянні на шкіру							
7 3 7	ЮНІ- МЕТР И 700, ВГ	метрибуз ин, 600 г/л	0,004	соє (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3	0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
7 3 8	ЮНІ- ПРОМ 500, КС	прометри н, 500 г/л	0,005	соєвишник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0	0,02	0,002/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				соєвишник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
				соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соє (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
7 3 9	Юні- Тет430, КС	тебуконаз ол, 430 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	0,4	0,02	0,025/ заг.-сан.	1,0	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та грунті)
				ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ- 0,07)					50	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
7 4 0	Юні- Флора 250, ВГ	флорасул ам, 250 г/кг	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	1,0	0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.	не погр.	не погр.	3	2
				кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
7 4 1	ЮНІ- ФЛУ 250, КС	флутриаф ол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	0,1 небезпе чний при пограп лянні на шкіру	0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та грунті)
				соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					30	не погр.	3	
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
7 4 2	Юніма рк, ВГ	метрибуз ин, 700 г/кг	0,004	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,3	0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не погр.	не погр.	3	2
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
7 4 3	Юніфо рм 446 SE, CE	азоксистр обін, 322 г/л +	0,03	Контроль за азоксистробінном та метаксиллом-М									
				цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	30	7	3	2 (небезп ечний при пограп

		металакс ил-М, 124г/л	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				лянні на слизові оболон ки очей, високос пійкий у воді та грунті)
		азоксистр обін, 322 г/л +	0,03	кавуни	0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
		металакс ил-М, 124г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		азоксистр обін, 322 г/л +	0,03	картопля	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	
		металакс ил-М, 124 г/л	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ- 0,04)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
7 4 4	Ямаго, СЕ			Контроль за карбендізімом (сумою тіофанат-метилу і карбендізіму) та тетраконізолом		Контроль за тіофанат- метилом та тетраконізолом		Контроль за тіофанат- метилом, карбендізімом та тетраконізолом					
		тіофанат- метил, 233 г/л +	0,08	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не погр.	3	2
		тетракона зол, 70 г/л +	0,002		0,02** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,3	/0,001	0,005/ сан.-токс.	/0,1				
		карбендіаз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат- метил, 233 г/л +	0,08	соя (олія)	не погр.*	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
		тетракона зол, 70 г/л +	0,002		не погр.*	/0,3	/0,001	0,005/ сан.-токс.	/0,1				
		карбендіаз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		не погр.*	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		тіофанат- метил, 233 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не погр.	3	
		тетракона зол, 70 г/л	0,002		0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,3	/0,001	0,005/ сан.-токс.	/0,1				

	карбендз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/ /0,001	0,1/ орг.	/0,1				
	тіофанат- метил, 233 г/л +	0,08	соняшник (олія)	непотр.*	0,1/ /0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
	тетракона зол, 70 г/л +	0,002		непотр.*	/0,3	/0,001	0,005/ сан.-токс.				
	карбендз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		непотр.*	0,1/ /0,001	0,1/ орг.	/0,1				
	тіофанат- метил, 233 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,1/ /0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не потр.	3	
	тетракона зол, 70 г/л	0,002			/0,3	/0,001	0,005/ сан.-токс.				
	карбендз им (метаболі т тіофанат- метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/ /0,001	0,1/ орг.	/0,1				

¹ Препарат рекомендовано для застосування авіаційним методом.

² Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.

* Державні санітарні правила та норми "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті" (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001 року № 137.

** EU Pesticides database.

*** Codex Maximum Residue Limits (MRLs), Codex Alimentarius Commission.

**** Тимчасові нормативи.

Таблиця 2

№ з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень в продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично-допустима концентрація/орієнтовно безпечний рівень впливу в повітрі робочої зони, мг/м³	Гранично-допустима концентрація/орієнтовно безпечний рівень впливу в атмосферному повітрі, мг/м³	Гранично-допустима концентрація/орієнтовно допустимий рівень у воді, мг/дм³	Гранично-допустима концентрація/орієнтовно допустимий рівень у ґрунті, мг/кг	Регламенти безпечного застосування			Клас небезпечності
				культура	максимально допустимий рівень					строки, дні			
										очікування до збору врожаю	виходу на оброблені ділянки		
											ручні роботи	механізовані роботи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Protect DUO/Протект/Дуо, КС			Контроль за клотініпідном та тіакоптрідом									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		клотініпідн, 100 г/л+	0,08	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс.	20	7	3	
		тіакоптрід, 200 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мір, фітотокс.	-	-	-	
		клотініпідн, 100 г/л+	0,08	томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс.	30	7	3	
		тіакоптрід, 200 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мір, фітотокс.				
		клотініпідн, 100 г/л+	0,08	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітотокс.	-	-	-	
		тіакоптрід, 200 г/л	0,006		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мір, фітотокс.				
2	Protect-Fungus/Протект Фунгус, КЕ			Контроль за дифеноконазолом та пропіконазолом									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		дифеноконазол, 150 г/л+	0,002	виноград	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан-токс.	/0,3	30	7	3	
		пропіконазол, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		дифеноконазол, 150 г/л+	0,002	виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан-токс.	/0,3	-	-	-	

		пропікона зол, 150 г/л	0,04		0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		дифеноко назол, 150 г/л+	0,002	персик и	0,08* (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3	30	7	3	
		пропікона зол, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		дифеноко назол, 150 г/л+	0,002	персик овий сік	0,08* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3	-	-	-	
		пропікона зол, 150 г/л	0,04		0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		дифеноко назол, 150 г/л+	0,002	томати	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3	30	7	3	
		пропікона зол, 150 г/л	0,04		0,1 (межа визн. ГРХ- 0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		дифеноко назол, 150 г/л+	0,002	томатн ий сік	0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3	-	-	-	
		пропікона зол, 150 г/л	0,04		0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
3	PROTECT/ ПРОТЕКТ, КС	спіродикл офен, 240 г/л	0,001	яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2	/0,0007	0,002/ сан- токс.	/0,4	40	7	3	2
				яблун ий сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					-	-	-	
				виногр ад	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					30	7	3	
				виногр адний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					-	-	-	
				полун иця	0,02* (межа визн.)					40	7	3	

					ВЕРХ-0,02)								
				полун ичний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)								
4	S-мето- лахлор-Стар, KE	S- метолахло р, 960 г/л	0,01	кукуру да (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5	0,02	0,02/ сан- токс.	0,02	не попр.	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				кукуру да (олія)	не попр.*					-	-	-	
5	Авідо, TH			Контроль за тіофанат- метилом та карбендасимом		Контроль за тіофанат- метилом		Контроль за тіофанат- метилом та карбендасимом					3 (високо стійкий у групі)
		тіофанат- метил, 435 г/л+	0,08	соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,2	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	не попр.	не попр.	не попр.	
		крезоксим- метил, 50 г/л+	0,1		0,01** (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,1	0,05	0,3/ орг., заг.-сан.	0,1				
		цимоксаніл, 15 г/л	0,05		0,5* (межа визн. ГРХ- 0,2)	0,1	0,03	0,06/ сан- токс.	0,04				
		карбендасим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	0,001	0,1/ орг.	0,1				
		тіофанат- метил, 435 г/л+	0,08	соя (олія)	не попр.	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	-	-	-	
		крезоксим- метил, 50 г/л +	0,1		не попр.	0,1	0,05	0,3/ орг., заг.-сан.	0,1				
		цимоксаніл, 15 г/л	0,05		не попр.	0,1	0,03	0,06/ сан- токс.	0,04				
		карбендасим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не попр.	0,1/	0,001	0,1/ орг.	0,1				
6	Агроз, KE	диметопат, 400 г/л	0,0005	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,5/ небезпе- чний при пограп- лянні на шкіру	0,003/	0,001/ сан- токс.	0,3/ трансл.	30	10	4	2
7	Агрітокс, PK	2-метил-4- хлорфено- кси- оцтова кислота у	0,008	кукуру да (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	1,0/ небезпе- чний при пограп-	0,02	0,003/ орг.	0,02	не попр.	не попр.	3	3 (небезпе- чний при пограп-

		формі диметил-аміної солі, 500 г/л		кукурудза (олія)	не погр.*	явні на шкіру				-	-	-	явні на слизові оболонки очей)
8	Азокс, КЕ	гекситазокс, 100 г/л	0,04	соє (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5	0,05	0,001/ заг.-сан.	0,1	30	не погр.	3	2
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
9	Азокс-Стар, КЕ	азоксистеробін, 250 г/л	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				соє (олія)	не погр.					-	-	-	
10	АЙ-МОКС ЕКСТРА (I-MOX XTRA), ВГ	імазамокс, 700 г/кг	3,0	соє (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)	1,0	0,04	0,06/ заг.-сан.	0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
11	Айлар, КС	аклоніфен, 200 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	1,0	0,005	0,01/ заг.-сан.	0,08	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у пруні)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				горох (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					не погр.	7	3	
12	Акадія, КС	Контроль за азоксистеробіном та тебуконазолем											
		азоксистеробін, 120 г/л+	0,03	нут (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,4	0,02	0,025/ заг.-сан.	1,0				
		біодобавка Актив, 350 г/л			не погр.								
		азоксистеробін, 120 г/л+	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0	0,01	0,01/ заг.-сан.	0,3	30	не погр.	3	
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	0,4	0,02	0,025/ заг.-сан.	1,0				
		біодобавка Актив, 350 г/л			не погр.								

1 3	Аліон 500 SC, КС	азоксистр обін, 120 г/л+	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 02)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не потр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л+	0,03		0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		біодобавк а Актив, 350 г/л			не потр.								
		азоксистр обін, 120 г/л+	0,03	соє (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		біодобавк а Актив, 350 г/л			не потр.								
		азоксистр обін, 120 г/л+	0,03	ріпак (насінн я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 02)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не потр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л+	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		біодобавк а Актив, 350 г/л			не потр.								
		азоксистр обін, 120 г/л+	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		біодобавк а Актив, 350 г/л			не потр.								
		азоксистр обін, 120 г/л+	0,03	соняш ник (насінн я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 02)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не потр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л +	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		біодобавк а Актив, 350 г/л			не потр.								
		азоксистр обін, 120 г/л+	0,03	соняш ник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л +	0,03		не потр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		біодобавк а Актив, 350 г/л			не потр.								
індивідуа л, 500 г/л	0,005	яблука	0,01 (межа)	/1,0 (межа)	/0,003 (межа)	0,001/ (межа)	/0,14 (межа)	не потр.	7	3	2 (високо		

					визн. ВЕРХ- 0,01)	визн. ВЕРХ- 0,1)	визн. ВЕРХ- 0,002)	визн. ВЕРХ- 0,001); заг.-сан.	визн. ВЕРХ- 0,05)				стійкий у воді)	
			яблучн ий сік	не погр.										
			виногр ад	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)							не погр.	7		3
			виногр адний сік	не погр.							-	-		-
1 4	Альберто, ТН	тіаметокса м, 350 г/л	0,02	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан- токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	2	
1 5	Амікон, ЕВ			Контроль за міклубутанієм та піраклостробіном										
		міклубута ніл, 125 г/л +	0,03	соняш ник (насінн я)	0,1 (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мітр, філоторок с.	30		3	3 (небезпе чний при попадан ня на слизові оболонк и очей, високос тійкий у грунті)	
		піраклост робін, 125 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6					
		міклубута ніл, 125 г/л +	0,03	соняш ник (олія)	не погр.	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мітр, філоторок с.	-	-	-		
		піраклост робін, 125 г/л	0,03		не погр.	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6					
1 6	Амістар Голд250 SC, КС			Контроль за азоксистробіном та дифеноконазолом										
		азоксистр обін, 125 г/л+	0,03	ріпак (насінн я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та грунті)	
		азоксистр обін, 125 г/л+	0,03	ріпак (олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-		
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		не погр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3					
		азоксистр обін, 125 г/л+	0,03	полун иця ²	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3		
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,2 (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3					
		азоксистр обін, 125 г/л +	0,03	полун ичний сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-		

		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		азоксистр обін, 125 г/л +	0,03	виногр ад ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		азоксистр обін, 125 г/л +	0,03	виногр адний сік	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,005)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		азоксистр обін, 125 г/л +	0,03	газонні трави ²	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не погр.	7	3	
		дифеноко назол, 125 г/л	0,002		не погр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
1 7	Анзор, КС			Контроль за азоксистробіном та тебуконазолом									3 (небезпе- чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей, високос- тійкий у воді)
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіни я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		тебуконаз ол, 200 г/л	0,03		не погр.*	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
1 8	Аншлаг, КС			Контроль за альфа-циперметрином та імідаклопридом									
		імідаклоп рид, 100 г/л +	0,06	картоп ля ²	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	10	4	2 (високо- стійкий у воді та пруді)
		альфа- ципермет	0,005		0,03* (межа небезпе	/0,1	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				

		рин, 125 г/л +			визн. ГРХ-0,03)	чний при потрап- янні на шкіру							
		клопіанід н, 50 г/л	0,08		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, філоторк с.				
1 9	Апрув БТ, МД	тіаклопри д, 240 г/л	0,006	ріпак (насіні я)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водні- мір, філоторк с.	30	не потр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
2 0	Архітект, СЕ			Контроль за метікват-хлоридом та піріаклостробіном									3 (небезпе- чний при пограп- янні на слизові оболонк и очей)
		метікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	соє (зерно)	0,05 (межа визн. ФМ- 0,05)	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	40	не потр.	3	
		прогексалі он кальціто, 25 г/л+	0,02		0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,2				
		піріаклост робін, 100 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		метікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	соє (олія)	не потр.	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	-	-	-	
		прогексалі он кальціто, 25 г/л +	0,02		не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,2				
		піріаклост робін, 100 г/л	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
2 1	Аспід, КС	тіаклопри д, 480 г/л	0,006	ріпак (насіні я)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водні- мір, філоторк с.	30	не потр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				картоп ля	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					20	7	3	
				яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)					30	7	3	
				яблучні й сік	0,06* (межа визн. ВЕРХ- 0,06)					-	-	-	

				вишні	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	
				вишне вий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
				череш ні	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					30	7	3	
				череш невий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					-	-	-	
2 2	Баксіга, МД	флорпірау ксифен- бензил, 12,5 г/л + пеноксул ам, 20 г/л	0,02 0,005	рис ¹	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,005) 0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,5 /1,0	/0,006 /0,001	0,001/ заг.-сан. 0,01/ сан.- токс.	/0,14 /0,3	не погр.	не погр.	3	3 (небезпе чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей)
2 3	Балеріна Форте, СЕ	2,4-Д2- епит- гексилови й ефір, 300 г/л + підкорам, 37,5 г/л + флорасула м, 10 г/л	0,0001 0,02 0,05	зерно хлібни х злаків	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02) 0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01) 0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	0,5/ /1,0	/0,0005 /0,003	0,002/ сан.- токс. 0,1/ сан.- токс.	0,1/ трансл. 0,05/ трансл. 0,05/ фітоток с.	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та грунті)
		2,4-Д2- епит- гексилови й ефір, 300 г/л + підкорам, 37,5 г/л + флорасула м, 10 г/л	0,0001 0,02 0,05	кукуру да (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,015) 0,01* (межа визн. ГРХ- 0,02) 0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,5 /1,0	/0,0005 /0,003	0,002/ сан.- токс. 0,1/ сан.- токс.	0,1/ трансл. 0,05/ трансл. 0,05/ фітоток с.	не погр.	не погр.	3	

		2,4-Д2- епил- гексильови й ефір, 300 г/л +	0,0001	кукуру дза (олія)	не погр.	/0,5	/0,0005	0,002/ сан- токс.	0,1/ трансл.	-	-	-		
		пiклорам, 37,5 г/л +	0,02		не погр.	5,0/	/0,02	0,04/ сан- токс.	0,05/ трансл.					
		флорасула м, 10 г/л	0,05		не погр.	/1,0	/0,003	0,1/ сан- токс.	0,05/ фіпоток с.					
2 4	Балеро ЕС, КЕ	пропiкона зол, 250 г/л	0,04	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді)	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-		
				ріпак (насінн я)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)					50	не погр.	3		
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-		
2 5	Балій, МЕ	Контроль за азокси- с- тробном та пропiконазолом												3 (небезпе чний при попадан ні на слизові оболонк и очей, високо стійкий у пруні та воді)
		азокси- с- тробн, 120 г/л +	0,03	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг-сан.	/0,3	30	не погр.	3		
		пропiкона зол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2					
		азокси- с- тробн, 120 г/л +	0,03	соняш ник (насінн я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг-сан.	/0,3	30	не погр.	3		
		пропiкона зол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2					
		азокси- с- тробн, 120 г/л +	0,03	соняш ник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг-сан.		-	-	-		
		пропiкона зол, 180 г/л	0,04		не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2					
		азокси- с- тробн, 120 г/л +	0,03	ріпак (насінн я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг-сан.	/0,3	30	не погр.	3		
		пропiкона зол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2					
		азокси- с- тробн, 120 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг-сан.		-	-	-		

		пропікона зол, 180 г/л	0,04		не попр.*	0,5/ /1,0	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		азоксистр обін, 120 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не попр.	3	
		пропікона зол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	0,5/ /1,0	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		азоксистр обін, 120 г/л +	0,03	соє (олія)	не попр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.		-	-	-	
		пропікона зол, 180 г/л	0,04		не попр.*	0,5/ /1,0	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		азоксистр обін, 120 г/л +	0,03	виногр ад	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	40	7	3	
		пропікона зол, 180 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,03)	0,5/ /1,0	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		азоксистр обін, 120 г/л +	0,03	виногр адний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.		-	-	-	
		пропікона зол, 180 г/л	0,04		0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)	0,5/ /1,0	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		азоксистр обін, 120 г/л+	0,03	буряки цукров і	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
		пропікона зол, 180 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/ /1,0	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
2 6	Бар'єр, КС	метрибуз ин, 600 г/л	0,004	картоп ля	0,1** (межа визн. ТШХ, СФ- 0,03)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не попр.	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді)
2 7	Белл 480 SC, КС	флутбендіа мід, 480 г/л	0,003	кукуру дза ¹ (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,003/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	30	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруні)
				кукуру дза (олія)	не попр.					-	-	-	
				соняш ник (насіни я)	0,05* (межа визн.)					30	не попр.	3	

					ВЕРХ-0,05)									
				соняшник (олія)	не погр.					-	-	-		
28	Бетарен 22, КЕ			Контроль за десмедифамом та фенмедифамом										3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
		десмедифам, 110 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТПХ-0,02)	1,0	0,01	0,1/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	не погр.	7	3		
		фенмедифам, 110 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5	0,001	0,5/ орг.	0,25/ трансл.					
		десмедифам, 110 г/л +	0,001	буряки столові	0,1* (межа визн. ТПХ-0,02)	1,0	0,01	0,1/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	не погр.	7	3		
		фенмедифам, 110 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5	0,001	0,5/ орг.	0,25/ трансл.					
29	Біг Лайф, РК	бенпазон, 480 г/л	0,1	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	1,0	0,05	0,01/ сан-токс.	0,4	не погр.	не погр.	3	3	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-		
30	Біцепс 300, КЕ			Контроль за десмедифамом та фенмедифамом										
		десмедифам, 150 г/л +	0,001	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ТПХ-0,02)	1,0	0,01	0,1/ заг.-сан.	0,25/ трансл.	не погр.	7	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)	
		фенмедифам, 150 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5	0,001	0,5/ орг.	0,25/ трансл.					
31	Ботіа, КС			Контроль за піридатом та мезотріоном										2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високотоксичний у воді)
		піридат, 300 г/л +	0,002	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ТПХ-0,05)	1,0	0,01	0,002/ заг.-сан.	0,03	не погр.	не погр.	3		
		мезотріон, 90 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,006	0,02/ сан-токс.	0,4					
		піридат, 300 г/л +	0,002	кукурудза (олія)	не погр.	1,0	0,01	0,002/ заг.-сан.	0,03	-	-	-		
		мезотріон, 90 г/л	0,001		не погр.	0,2	0,006	0,02/ сан-токс.	0,4					
32	Венон, КС			Контроль за клопінаїдином та ацифа-циперметрином										3 (високотоксичний)
		клопінаїдин, 0,08	0,08	зерно хлібні	0,02** (межа визн.)	1,5	0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл.	40	не погр.	4		

		200 г/л +		х злаків	ВЕРХ- 0,02				фіготок с.				у воді та прунті)
		альфа- ципермет рин, 100 г/л	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,003	0,002/ заг.-сан.	/0,03				
3 3	Віарес, КС	ацетаміпр ид, 300 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1	30	не потр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
3 4	Віж, ВГ			<i>Контроль за амікарбазоном та мезотріоном</i>									
		амікарбаз он, 280 г/кг +	0,005	кукуру дза (зерно)	0,02 (сума амікарб азону та його метаболі тів) (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ- 0,001)	0,002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,002)	0,02/ (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки и очей, високос тойкий у воді)
		мезотріон, 288 г/кг	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан- токс.	/0,4				
		амікарбаз он, 280 г/кг +	0,005	кукуру дза (олія)	не потр.	/0,5 (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/0,001 (межа визн. ВЕРХ- 0,001)	0,002/ заг.-сан. (межа визн. ВЕРХ- 0,002)	/0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	-	-	-	
		мезотріон, 288 г/кг	0,001		не потр.	/0,2	/0,006	0,02/ сан- токс.					
3 5	Він, ВГ	трибенуро н-метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки и очей)
3 6	Вінніг Форте SC, КС			<i>Контроль за флутріафоном</i>									
		тіабендазо л, 25 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,08	0,05/ сан- токс.	/1,0	не потр.	не потр.	не потр.	2 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки и очей, високос тойкий у воді та прунті)
		флутріафо л, 37,5 г/л +	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		імазаліл, 15 г/л	0,01		0,05* (межа визн.)	/0,5	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,16				

					ГРХ-0,05)								
		тіабендазо л, 25 г/л +	0,1	соє (олія)	не погр.	/1,0	/0,08	0,05/ сан- токс.	/1,0	-	-	-	
		флутріафо л, 37,5 г/л +	0,01		не погр.	/0,1 небезпе чний при попаді янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		імазаліл, 15 г/л	0,01		не погр.	/0,5	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,16				
		тіабендазо л, 25 г/л +	0,1	горох (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,08	0,05/ сан- токс.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	
		флутріафо л, 37,5 г/л +	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1 небезпе чний при попаді янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		імазаліл, 15 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,16				
		тіабендазо л, 25 г/л +	0,1	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,08	0,05/ сан- токс.	/1,0	не погр.	не погр.	не погр.	
		флутріафо л, 37,5 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	/0,1 небезпе чний при попаді янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		імазаліл, 15 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,003	0,02/ сан- токс., заг.-сан.	/0,16				
3 7	Грінфорт АС, КС			Контроль за азоксистробіном та флутріафолом									3 (високо стійкий уводі та групи)
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соняш ник (насіни я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		флутріафо л, 120 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1 небезпе чний при попаді янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03		не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	

		флутриафо л, 120 г/л	0,01	соняш ник (олія)	не погр.*	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		флутриафо л, 120 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	соє (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		флутриафо л, 120 г/л	0,01		не погр.*	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насінн я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		флутриафо л, 120 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		флутриафо л, 120 г/л	0,01		не погр.*	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03	виногр ад	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	45	7	3	
		флутриафо л, 120 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		азоксистр обін, 200 г/л +	0,03		0,1* (межа визн.)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	

				виноградний сік	ВЕРХ-0,005)								
		флутриафол, 120 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,006/сан-токс.	0,1/трансл.				
38	Грінфорт Док, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	0,4	0,02	0,025/заг-сан.	1,0	50	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
39	Грінфорт Преміум, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексилевим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2-етилгексилевий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	0,5/	0,0005	0,002/сан-токс.	0,1/трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (високостійкий у воді)
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0	0,003	0,1/сан-токс.	0,05/філотокс.				
		2,4-Д2-етилгексилевий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.*	0,5	0,0005	0,002/сан-токс.	0,1/трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		не погр.*	1,0	0,003	0,1/сан-токс.	0,05/філотокс.				
40	Грінфорт Проніт, КЕ	пропізоксолор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	1,0	0,01	0,002/орг.	0,6	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
41	Грінфорт Стар, ТН			Контроль за флудіоксонілом та ципроконазолом									
		флудіоксоніл, 18,75 г/л +	0,015	горох (зерно)	0,2* (межа визн. ТПХ, ВЕРХ-0,1)	1,0	0,002	0,1/орг.	0,2	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
ципроконазол, 6,25 г/л	0,002	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,1		0,01	0,03/сан-токс.	0,01						
42	Грінфорт Супер, КЕ			Контроль за пропіконазолом та ципроконазолом									2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		пропіконазол, 250 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн.)	0,5/	0,001	0,15/орг.	0,2	30	не погр.	3	

					ГРХ-0,1								янні на слизові оболонки очей, високостійкий у пруні)
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/сан.-токс.	/0,01				
		пропікона азол, 250 г/л +	0,04	соняшник (олія)	не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/орг.	/0,2	-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/сан.-токс.	/0,01				
		пропікона азол, 250 г/л +	0,04	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,001	0,15/орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01	0,03/сан.-токс.	/0,01				
		пропікона азол, 250 г/л +	0,04	соє (олія)	не погр.*	0,5/	/0,001	0,15/орг.	/0,2	-	-	-	
		ципрокон азол, 80 г/л	0,002		не погр.*	/0,1	/0,01	0,03/сан.-токс.	/0,01				
4 3	Грінфорт Циперметрин, КЕ	альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005	ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,003	0,002/заг.-сан.	/0,03	30	не погр.	4	3 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)					-	-	-	
4 4	Дедало Еліт, МЕ	24-дихлорфенокси-оцтова кислота, 300 г/л	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	1,0/	/0,0002	0,002/сан.-токс.	0,1/трансл.	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
4 5	Деліс 100 ЕС, КЕ	дельтаметрин, 100 г/л	0,003	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,003	0,006/сан.-токс.	0,01/трансл.	30	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,01 (межа визн. ГРХ-0,005)					-	-	-	

				груші	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					30	7	3	
				груше вий сік	0,01 (межа визн. ГРХ- 0,005)					-	-	-	
				персик и	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,005)					30	7	3	
				персик овий сік	0,01 (межа визн. ГРХ- 0,005)					-	-	-	
				виногр ад	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,005)					30	7	3	
				виногр адний сік	0,01 (межа визн. ГРХ- 0,005)					-	-	-	
				томати	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,01)					20	7	3	
				томатн ий сік	0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)					-	-	-	
				капуст а	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					20	7	3	
				цибуля (ріпка)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					20	7	3	
				морква	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					20	не попр.	3	
				кукуру да (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					30	не попр.	3	
				кукуру да (олія)	0,04* (межа визн. ГРХ- 0,04)					-	-	-	
				соняш ник	0,02* (межа визн.					30	не попр.	3	

				(насінн я)	ГРХ- 0,02)								
				соняш ник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					-	-	-	
				соє (зерно)	0,03* (межа визн. ГРХ- 0,03)					30	не попр.	3	
				соє (олія)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					-	-	-	
				горох (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					30	не попр.	3	
				рис (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					20	не попр.	3	
				огірки	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)					20	7	3	
4 6	Діагро Макс, ГР	хлорпіри фос, 150 г/кг + №-4-9,6 %, P2O5- 32-48%, MgO-2-4 %, SO3- 2-7%, Zn- 1-3%, Mn -1-3%	0,001	буряки цукров і	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,3 небезпе чний при попадан ні на шкіру	0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	не попр.	10	4	2
				соняш ник (насінн я)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					не попр.	не попр.	4	
				соняш ник (олія)	не попр.					-	-	-	
				кукуру дза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)					не попр.	не попр.	4	
				кукуру дза (олія)	не попр.					-	-	-	
4 7	Діагро Старт, ГР	хлорпіри фос, 30 г/кг + №-4-9,6 %, P2O5- 32-48%, MgO-2-4 %, SO3- 2-7%, Zn- 1-3%, Mn -1-3%	0,001	буряки цукров і	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,02)	0,3 небезпе чний при попадан ні на шкіру	0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	не попр.	10	4	2
				соняш ник (насінн я)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)					не попр.	не попр.	4	
				соняш ник (олія)	не попр.					-	-	-	

				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	4	
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
48	Діфкор, КЕ	дифеноксизол, 250 г/л	0,002	яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/сан-токс.	/0,3	30	7	3	3 (високо стійкий у воді)
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					-	-	-	
				груші	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					30	7	3	
				грушевий сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					-	-	-	
				томати	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					14	7	3	
				томатний сік	не погр.					-	-	-	
				картопля	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)					14	7	3	
49	Док Про, ЗП	Контроль за цимоксанілом та міклобутанієм											3 (високо стійкий у ґрунті)
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	/1,0	/0,03	0,06/сан-токс.	/0,04	30	7	3	
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,7	/0,003	0,05/заг.-сан.	0,35/трансл. водн.-мікр. фітотокс.				
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соняшник (олія)	не погр.	/1,0	/0,03	0,06/сан-токс.	/0,04	-	-	-	
міклобутаніл, 200 г/кг	0,03	не погр.	/0,7		/0,003	0,05/заг.-сан.	0,35/трансл. водн.-мікр. фітотокс.						
50	Евентус, МЕ	Контроль за бенфеназоном та клотазоном											3 (небезпечний при потрапінні)
		бенфеназон, 480 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потрапінні	/0,05	0,01/сан-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	

					яні на шкіру							яні на шкіру та слизові оболонки очей, високотійкий у воді)
		кломазон, 50 г/л	0,04		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4			
		бенпазон, 480 г/л +	0,1	соє (олія)	не погр.*	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,05	0,01/ сан.-токс.	/0,4	-	-	-
		кломазон, 50 г/л	0,04		не погр.*	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4			
5 1	Еліот, МД			Контроль за нікосульфуроном та мезотріоном								
		нікосульфурон, 30 г/л +	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3
		мезотріон, 75 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4			3 (високотійкий у воді)
		нікосульфурон, 30 г/л +	2,0	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2	-	-	-
		мезотріон, 75 г/л	0,001		не погр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан.-токс.	/0,4			
5 2	Еміпрід, ВГ			Контроль за емаметин бензоатом та ацетаміпрідом								
		емаметин бензоат, 100 г/кг +	0,001	соняшник (насіння)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3
		ацетаміпрід, 100 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1			2 (високотійкий у воді)
		емаметин бензоат, 100 г/кг +	0,001	соняшник (олія)	не погр.*	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-
		ацетаміпрід, 100 г/кг	0,01		не погр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1			
		емаметин бензоат, 100 г/кг +	0,001	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	30	не погр.	3
		ацетаміпрід, 100 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1			
		емаметин бензоат, 100 г/кг +	0,001		не погр.*	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-

		ацетамір ид, 100г/кг	0,01	кукуру дза (олія)	не попр.*	0,2	0,003	0,02/ сан- токс.	0,1				
5 3	Есток, ВГ	етаметсул ьфу-рон- метил, 750г/кг	0,02	ріпак (насінн я)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	1,7	0,006	0,015/ заг.-сан.	0,1	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
				соняш ник (насінн я)	0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					не попр.	не попр.	3	
				соняш ник (олія)	не попр.*					-	-	-	
5 4	Захисник Екстра, КС			Контроль за карбендазимом (сумою тіофанат- метилу і карбендазиму) та флутріафолам		Контроль за тіофанат- метилом та флутріафолам		Контроль за тіофанат- метилом, карбендазимом, флутріафолам					3 (високо стійкий у воді та грунті)
		тіофанат- метил, 405 г/л +	0,08	соняш ник (насінн я)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	40	не попр.	3	
		флутріафо л, 255 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				
		карбендз им (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	0,001	0,1/ орг.	0,1				
		тіофанат- метил, 405 г/л +	0,08	соняш ник (олія)	не попр.*	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	-	-	-	
		флутріафо л, 255 г/л	0,002		не попр.*	0,3	0,001	0,006/ сан- токс.	0,1				
		карбендз им (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не попр.*	0,1/	0,001	0,1/ орг.	0,1				
		тіофанат- метил, 405 г/л +	0,08	зерно хлібни х злаків	1,0* (межа визн. ТІХ- 0,05)	0,1/	0,01	0,05/ орг.	0,4	30	не попр.	3	
		флутріафо л, 255 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,008)	0,1 небезпе чний при пограпл	0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.				

						яні на шкіру							
		карбендазим (метаболіт пофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
5 5	Зо.Лайф, ВГ	міді сульфат, 78,6%	0,05 (по міді)	картопля	10* (межа визн. ТШХ, СФ-1,0)	0,5/	0,003-максимальна разова; 0,001-середньо-добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	20	7	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
5 6	Імексаб, КЕ	абамектин, 18 г/л	0,0002	соє (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	14	не потр.	3	2
				соє (олія)	не потр.*					-	-	-	
5 7	Імпакт К, КС			Контроль за флуптріафолом та карбендазимом									
		флуптріафол, 117,5 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	не потр.	не потр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та прунті)
		карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
		флуптріафол, 117,5 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,006/ сан.-токс.	0,1/ трансл.	-	-	-	
		карбендазим, 250 г/л	0,01		не потр.	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
5 8	Іскен РК 270, РК	гідратид малеїнової кислоти, 270 г/л	0,05	картопля	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	/1,0	50	7	3	2 (високостійкий у воді)
		(у вигляді калійної солі, 360 г/л)		цибуля (ріпка)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-1,0)					40	7	3	
5 9	Кальма, КЕ	тринексап ак-епіл, 175 г/л	0,004	соняшник (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01	0,005/ заг.-сан.	/0,6	40	не потр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на шкіру, алерген, високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
6 0		етefon, 660 г/л	0,006	соняшник	0,1* (межа	/1,0	/0,02	0,01/	/0,5	не потр.	не потр.	3	3 (небезп

	Кампосан Екстра SL, PK			(насінн я)	визн. ГРХ- 0,05)								чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей)
				соняш ник (олія)	не погр.					-	-	-	
6 1	Канонір, ВГ	імідаклоп рид, 700 г/кг	0,06	зерно хлібни х злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	30	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
6 2	Каттані, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукуру дза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан- токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				кукуру дза (олія)	не погр.*					-	-	-	
6 3	Каріоліс, ТН			Контроль за флудіоксонілом та металаксілом-М									
		флудіоксо ніл, 25 г/л +	0,015	кукуру дза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий уводі)
		металаксі л-М, 10 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіоксо ніл, 25 г/л +	0,015	кукуру дза (олія)	не погр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
		металаксі л-М, 10 г/л	0,03		не погр.	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіоксо ніл, 25 г/л +	0,015	соє (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	
		металаксі л-М, 10 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		флудіоксо ніл, 25 г/л +	0,015	соє (олія)	не погр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	-	-	-	
металаксі л-М, 10 г/л	0,03	не погр.	0,5/		/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05						
6 4	Катадін, КЕ			Контроль за ацетаміпридом та емамектином безвоатом									
		ацетаміпр ид, 64% +	0,01	яблука	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1	30	7	3	3 (небезпе чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей, високо стійкий у воді)
		емамекти н бензоат, 4,8%	0,001		0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/ сан- токс.	/0,3				
ацетаміпр ид, 64% +	0,01	яблучн ий сік	0,01* (межа визн.	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1	-	-	-			

					ВЕРХ-0,01)								
		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		не погр.	/0,1	/0,0004	0,002/сан-токс.	/0,3				
		ацетаміпр ид, 6,4% +	0,01	капуста	0,4 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2	/0,003	0,02/сан-токс.	/0,1	14	7	3	
		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/сан-токс.	/0,3				
		ацетаміпр ид, 6,4% +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/сан-токс.	/0,1	14	не погр.	3	
		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,0004	0,002/сан-токс.	/0,3				
		ацетаміпр ид, 6,4%+	0,01	соя (олія)	не погр.*	/0,2	/0,003	0,02/сан-токс.	/0,1	-	-	-	
		емамектин бензоат, 4,8%	0,001		не погр.	/0,1	/0,0004	0,002/сан-токс.	/0,3				

65	Квелекс 270, ВГ			Контроль за галауцифен-метилом та флорасуламом									
		галауцифен-метил, 100 г/кг +	0,02	зерно хлібних злаків ¹	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,006	0,04/сан-токс.	/0,3	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високотійкий у воді)
		флорасулам, 100 г/кг	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/сан-токс.	0,05/фітотокс.				
		антидот глюквіносету формі кислоти, 70,8 г/кг	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				

66	Кейдж, КС			Контроль за карбендасимом та епоксиконазолом		Контроль за тіофанат-метилом, епоксиконазолом		Контроль за карбендасимом та епоксиконазолом					3 (високотійкий у воді та ґрунті)
		тіофанат-метил, 310 г/л +	0,08	зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ТПХ-0,5)	0,1/	/0,01	0,05/орг.	/0,4	30	не погр.	3	
		епоксиконазол, 187 г/л	0,004		0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,0005	0,004/заг.-сан.	/0,4				
		карбендасим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ТПХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/орг.	/0,1				

67	Клатч, КЕ	хізалофоп-п-етил, 125 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	7	3	2
68	Клінкор, МД			Контроль за флуроксипіром та нікосульфуроном		Контроль за флуроксипір-метилом та нікосульфуроном		Контроль за флуроксипіром та нікосульфуроном					3 (високо стійкий у воді)
		флуроксипір-метил, 110 г/л +	0,2	кукурудза (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ, ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	
		нікосульфурон, 40 г/л	2,0		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		флуроксипір-метил, 110 г/л +	0,2	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	-	-	-	
		нікосульфурон, 40 г/л	2,0		не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
69	Клюк, КЕ	пропізоклор, 720 г/л	0,01	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	7	3	3 (високо стійкий у воді)
70	Когерент, КС	хлорантра ніл-прол, 200 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,015	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та пруні)
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				зерно хлібних злаків	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,01)					30	не погр.	3	
				ріпак (насіння)	0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	

7 1	Колібріс, КС	тіаклопри д, 280 г/л +	0,006	ріпак (насінн я)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мітр, філоторк с.	35	не потор.	3	3 (високот стійкий уводі)
		новаторо н, 120 г/л	0,01		0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1				
		тіаклопри д, 280 г/л +	0,006	ріпак (олія)	не потор.	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн- мітр, філоторк с.	-	-	-	
		новаторо н, 120 г/л	0,01		0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1				
		7 2	Комманд 48, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,5	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	не потор.	не потор.
соя (олія)	не потор.*					-	-					-	
7 3	Конвой, ВГ			Контроль за трибенурон-метилом, флорасуламом та триасульфуроном									
		трибенуро н-метил, 300 г/кг +	0,005	зерно хлібни х злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,005)	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не потор.	не потор.	3	3 (небезпе чний при попадан ні на слизові оболонк и очей, високот стійкий у воді)
		флорасула м, 105 г/кг +	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан- токс.	0,05/ філоторк с.				
		триасульф урон, 95 г/кг	0,005		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,08)	/2,0	/0,02	0,004/ заг.-сан.	/0,1				
7 4	Корвізар М, КЕ			Контроль за фенпропідом									
		міклобута ніл, 100 г/л +	0,03	зерно хлібни х злаків	0,02** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,7	/0,003	0,05/ заг.-сан.	0,35/ трансл, водн- мітр, філоторк с.	30	не потор.	3	3 (високот стійкий уводі та пруді)
		тебуконз ол, 150 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		фенпропі дин, 300 г/л	0,005		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,03	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
7 5	Корморан, КЕ			Контроль за новатороном та ацетаміптордом									
		новаторо н, 100 г/л +	0,01	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1	30	7	3	3 (високот стійкий уводі)

		ацетаміпр ид, 80 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1	-	-	-	
		новалуро н, 100 г/л +	0,01	яблучн ий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1				
		ацетаміпр ид, 80 г/л	0,01		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1				
		новалуро н, 100 г/л +	0,01	томати	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1	20	7	3	
		ацетаміпр ид, 80 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1				
		новалуро н, 100 г/л +	0,01	томатн ий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1	-	-	-	
		ацетаміпр ид, 80 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1				
		новалуро н, 100 г/л +	0,01	цибуля	0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1	30	7	3	
		ацетаміпр ид, 80 г/л	0,01		0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1				
		новалуро н, 100 г/л +	0,01	картоп ля	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,0	/0,01	0,02/ сан- токс.	/0,1	35	7	3	
ацетаміпр ид, 80 г/л	0,01	0,025* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/0,2		/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1						
7 6	Копар, КЕ	S- метолахло р, 960 г/л	0,01	кукуру да (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан- токс.	/0,02	не погр.	не погр.	3	2 (небезпе чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей, високос тійкий у воді)
				кукуру да (олія)	не погр.					-	-	-	
	Крес, ТН			Контроль за карбоксином та тирхамом									

7 7		карбоксин , 200 г/л +	0,01	зерно хлібни х злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0/	/0,015	0,1/ сан- токс.	/0,05	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високо стійкий у воді)
		парам, 200 г/л	0,005		0,05* (межа визн. ТНХ- 0,05)	0,5/	0,05- максима льна рахова; 0,02- середнь о- добова/	0,01/ сан- токс.	/0,2				
7 8	Кросбі, СЕ			<i>Контроль за протіканням, тіофанат- метилом та карбендзімом</i>		<i>Контроль за протіканням та тіофанат- метилом</i>		<i>Контроль за протіканням, тіофанат- метилом та карбендзімом</i>					3 (небезпе чний при пограп ляні на слизові оболонк и очей, високо стійкий у воді та грунті)
		пропікона зол, 1875 г/л +	0,04	зерно хлібни х злаків	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30	не погр.	3	
		тіофанат- метил, 375 г/л	0,08		1,0* (межа визн. ТНХ- 0,05)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
		карбендзі м (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
7 9	Кспор, КС			<i>Контроль за флутетсуламом та флорасуламом</i>									3 (небезпе чний при пограп ляні на слизові оболонк и очей, високо стійкий у воді)
		флутетсу лам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібни х злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітоток с, водно- мір, трансл.	не погр.	не погр.	3	
		флорасула м, 75 г/л	0,05		0,01* (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан- токс.	0,05/ фітоток с.				
8 0	Лазурит Ультра, КС	мсприбуз ин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий у грунті)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				картоп ля	0,1** (межа визн. ТНХ, СФ- 0,03)					не погр.	7	3	
				томати (розсад ні та посівні)	0,25 (межа визн. ТНХ, СФ- 0,03)					не погр.	7	3	
				томатн ий сік	не погр.*					-	-	-	

				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				нут (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
8 1	Лайфсуд, ВГ	сірка, 800 г/кг	не нормується	яблука	не погр.**	60/	/0,07	не нормується	не нормується	30	7	3	3
				яблучний сік	не погр.**					-	-	-	
8 2	Лентагран 45, ЗП	піддигат, 45 г/кг	0,002	капуста	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	7	3	2 (алерген)
				цибуля (ріпка)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)					не погр.	7	3	
8 3	Лентагран 600 ЕС, КЕ	піддигат, 600 г/л	0,002	нут (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03	не погр.	не погр.	3	3
8 4	Лімекс, КЕ	лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30	не погр.	4	2 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей)
				кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					-	-	-	
8 5	Лювітор, КС	тіаклоприд, 240 г/л	0,006	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн-мігр, філтокс.	35	7	3	3 (високостійкий у воді)
				яблучний сік	0,06* (межа визн. ВЕРХ-0,06)					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)					30	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				Контроль за формсульфураном									

8 6	Майстер 62 WG, ВГ	форамсул ьфурон, 300 г/кг +	0,5	кукуру да (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,03	0,002/ заг.-сан.	/0,08	не попр.	не попр.	3	3 (небезпе чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей, високос тійкий у воді)
		йодсульф урон- метил напріо, 20 г/кг +	0,03		0,025* (межа визн. ВЕРХ- 0,025)	/1,0	/0,002	0,06/ сан- токс.	0,01/ трансл.				
		антидот ізоксадіфе н-епіл, 300 г/кг	не попр.		не попр.	не попр.	не попр.	не попр.	не попр.				
		форамсул ьфурон, 300 г/кг +	0,5	кукуру да (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,03	0,002/ заг.-сан.	/0,08	-	-	-	
		йодсульф урон- метил напріо, 20 г/кг +	0,03		не попр.*	/1,0	/0,002	0,06/ сан- токс.	0,01/ трансл.				
		антидот ізоксадіфе н-епіл, 300 г/кг	не попр.		не попр.	не попр.	не попр.	не попр.	не попр.				

8 7	Максим 480 FS, TH	флудіоксо ніл, 480 г/л	0,015	томати	0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2	не попр.	не попр.	не попр.	2
томатн ий сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	-	-	-									
огірки	0,04* (межа визн. ВЕРХ- 0,04)	не попр.	не попр.	не попр.									
перець	0,1 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	не попр.	не попр.	не попр.									
8 8	Меланж БТ, КС			Контроль за азоксистробіном та протіоконізолаом- дестію		Контроль за азоксистробіном та протіоконізолаом			Контроль за азоксистробіном та протіоконізолаом -дестію				3 (високо стійкий у воді та грунті)
азоксистр обін, 230 г/л +	0,03	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35	не попр.	3			
протіокон азол, 220 г/л	0,001	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2							
		азоксистр обін, 230 г/л +	0,03	соняш ник	0,2* (межа визн.)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	50	не попр.	3	

		пропокон азол, 220 г/л	0,001	(насінн я)	ВЕРХ- 02)	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		азоксистр обін, 230 г/л+	0,03	соняш ник (олія)	не погр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		пропокон азол, 220 г/л	0,001		не погр.	/0,2	/0,003	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
8 9	Мерлін Флекс Дуо 475 SC, KC			Контроль з ізоксафлупотолом та тербутилказіном									
		ізоксафлю тол, 50 г/л +	0,001	кукуру дза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,1	/0,001	0,01/ сан- токс.	/0,05	не погр.	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та грунті)
		тербутила зин, 375 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		анпидот ципросул фамід 50 г/л	0,02		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
		ізоксафлю тол, 50 г/л +	0,001	кукуру дза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,1	/0,001	0,01/ сан- токс.	/0,05	-	-	-	
		тербутила зин, 375 г/л +	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		анпидот ципросул фамід 50 г/л	0,02		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
		ізоксафлю тол, 50 г/л +	0,001	сорго (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,1	/0,001	0,01/ сан- токс.	/0,05	не погр.	не погр.	3	
		тербутила зин, 375 г/л +	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		анпидот ципросул фамід 50 г/л	0,02		0,5 (межа визн. ВЕРХ- 0,5)	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.				
9 0	Метабін (Metabeet), CE			Контроль з хлорпрофамом та мезотріоном									
		хлорпроф ам, 100 г/л +	0,02	буряки цукров і	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	20/	/0,02	0,07/ сан- токс.	/0,07 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	не погр.	7	3	2 (високо стійкий у воді)

		метаміпро н, 400г/л	0,03		0,2** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	0,5/	/0,03	0,05/ заг.-сан.	/0,4				
9 1	Метаксarb, КС			Контроль за карбендазимом та металаксилом									
		карбендаз им, 200г/л +	0,01	соняш ник (насінн я)	0,3* (межа визн. ПШХ- 0,3)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не попр.	4	3 (високо стійкий у воді)
		металакси л, 100г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		карбендаз им, 200г/л +	0,01	соняш ник (олія)	не попр.	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		металакси л, 100г/л	0,03		не попр.	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		карбендаз им, 200г/л +	0,01	соє (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ- 0,15)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	30	не попр.	4	
		металакси л, 100г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
		карбендаз им, 200г/л +	0,01	соє (олія)	не попр.	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1	-	-	-	
		металакси л, 100г/л	0,03		не попр.	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	0,05/ трансл.				
9 2	Метрибу- зин-Стар, КС	метрибуз ин, 600г/л	0,004	соє (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
		соє (олія)		не попр.*	-					-	-		
9 3	Метризан, ВГ	метрибуз ин, 700г/кг	0,004	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,3	/0,003	0,1/ заг.-сан.	0,2/ водн- мір.	не попр.	не попр.	3	2
		соє (олія)		не попр.*	-					-	-		
9 4	Модесто Плюс510 FS, ТН			Контроль за клотіанідом, флуопіклідом та флуоксастробіно м			Контроль за клотіанідом та флуоксастробіном						2 (високо стійкий у воді та грунті)
		клотіанід н, 300г/л +	0,08	соняш ник (насінн я)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл. фітоток с.	не попр.	не попр.	не попр.	
		флуопікол ід, 120г/л +	0,02		0,01** (межа визн.)								

					ГРХ-0,01)								
		флуоксаст робін, 90 г/л	0,007		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,005	0,01/ сан- токс.	0,4/ трансл.				
		кюпанід н, 300 г/л +	0,08	соняш ник (олія)	не погр.	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітоток с.	-	-	-	
		флуопікол ід, 120 г/л +	0,02		не погр.	/1,5	/0,01	0,01/ сан- токс.	/0,1				
		флуоксаст робін, 90 г/л	0,007		не погр.	/1,0	/0,005	0,01/ сан- токс.	0,4/ трансл.				
9 5	Набоб/Дуо, РК			Контроль за безпечністю									
		бенгавон, 400 г/л +	0,1	соєя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,05	0,01/ сан- токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки и очей, високос- тійкий у воді)
		імазамокс, 25 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4				
		бенгавон, 400 г/л +	0,1	соєя (олія)	не погр.*	/1,0 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,05	0,01/ сан- токс.	/0,4	-	-	-	
		імазамокс, 25 г/л	3,0		не погр.*	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4				
		бенгавон, 400 г/л +	0,1	горох	0,1* (межа визн. ТШХ- 0,1)	/1,0 небезпечний при попаданні на шкіру	/0,05	0,01/ сан- токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	
		імазамокс, 25 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/1,0	/0,04	0,06/ заг.-сан.	/0,4				
9 6	Нордокс 75, ВГ (NORDOX 75 WG)	оксид міді, 860 г/кг	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)	0,5/ максима- льна разова; 0,005- середнь о- добова/	1,0/ орг.	3,0/ заг.-сан.	30	7	3	3 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки и очей)	
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ- 0,5)					-	-		-
				томати	5,0* (межа визн. ТШХ- 1,0)					20	7		3

				томатний сік	5,0* (межа визн. ППХ-0,5)					-	-	-	
97	ОксіЕС,КЕ	оксифлуорфен,240 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1	/0,001	0,007/заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				цвібуля (ріпка)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,02)					не погр.	7	3	
				соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,02)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
98	Ореол Максі,КЕ	хізалофоп-п-спил, 125 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,04	0,0001/заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3 (високо стійкий уводі)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
99	Отгер Форте,КС			Контроль за тербутилизинам та S-метолахлором									
		тербутила зин,187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	7	2 (високо стійкий уводі)
		S-метолахлор р,312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)								
		тербутила зин,187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S-метолахлор р,312,5 г/л	0,01		не погр.*								
		тербутила зин,187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05	0,005/заг.-сан.	/0,04	не погр.	не погр.	7	
		S-метолахлор р,312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)								
		тербутила зин,187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не погр.*	/1,0	/0,05	0,005/заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
S-метолахлор р,312,5 г/л	0,01	не погр.*	/0,5		/0,02								

		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не попр.	не попр.	7	
		S- метолахло р, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5	/0,02	0,02/ сан- токс.	/0,02				
		тербутила зин, 187,5 г/л +	0,003	соє (олія)	не попр.*	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-	
		S- метолахло р, 312,5 г/л	0,01		не попр.*	/0,5	/0,02	0,02/ сан- токс.	/0,02				
1 0 0	Паскаль, ТН			Контроль за тіаметоксидом									
		тіаметокса м, 250 г/л +	0,02	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан- токс.	/0,1	не попр.	не попр.	не попр.	3 (високо стійкий у воді)
		флудіоксо ніл, 50 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		тебуконаз ол, 30 г/л+	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		азоксистр обін, 20 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
1 0 1	Піларген, КС			Контроль за тебуконазолом та піраклостробінан									
		тебуконаз ол, 230 г/л +	0,03	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	35	не попр.	3	2 (високо стійкий у воді)
		піраклост робін, 115 г/л	0,03			0,2** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.				
1 0 2	Полігарт Максі, КС	тебуконаз ол, 430 г/л	0,03	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не попр.	3	2 (небезпе чний при попрати янні на слизові оболонк и очей, високос стійкий у воді)
1 0 3	Полігарт, КЕ	тебуконаз ол, 250 г/л	0,03	соняш ник (насінн я)	0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)

				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
104	Пончо Вовіво 610 FS, TH			Контроль за клотінідіном									
		клотінідин, 508 г/л +	0,08	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс.	не погр.	не погр.	не погр.	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		Bacillus firmus, 102 г/л	не погр.		не погр.	не погр.	не погр.	не погр.					
105	Ранчо, КС	клотінідин, 480 г/л	0,08	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02	0,004/ заг.-сан.	0,03/ трансл, фітотокс.	30	не погр.	3	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
106	Регістан Ультра, РК	дикват дибромід, 374 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)	0,05/ небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	6	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
107	Резидент, КС			Контроль за феніпроксиматом та піридабенем									
		феніпроксимат, 120 г/л +	0,01	соє (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	2
		піридабен, 300 г/л	0,03		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		феніпроксимат, 120 г/л +	0,01	соє (олія)	не погр.*	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		піридабен, 300 г/л	0,03		не погр.**	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		феніпроксимат, 120 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	30	не погр.	3	
		піридабен, 300 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		феніпроксимат, 120 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не погр.	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-	
		піридабен, 300 г/л	0,03		не погр.	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				
		феніпроксимат, 120 г/л +	0,01	яблука	0,2* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,05	/0,005	0,003/ заг.-сан.	/0,3	30	7	3	
		піридабен, 300 г/л	0,03		0,2* (межа визн.)	/0,2	/0,001	0,2/ заг.-сан.	/0,1				

					ГРХ-0,1)								
		фенпроксимат, 120 г/л +	0,01	яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	0,05	0,005	0,003/ заг.-сан.	0,3	-	-	-	
		піндабен, 300 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,2	0,001	0,2/ заг.-сан.	0,1				
		фенпроксимат, 120 г/л +	0,01	виноград	0,2* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,05	0,005	0,003/ заг.-сан.	0,3	30	7	3	
		піндабен, 300 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,2	0,001	0,2/ заг.-сан.	0,1				
		фенпроксимат, 120 г/л +	0,01	виноградний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	0,05	0,005	0,003/ заг.-сан.	0,3	-	-	-	
		піндабен, 300 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,2	0,001	0,2/ заг.-сан.	0,1				
108	РІДОВЕР ЕКСТРА (RIDOVER XTRA), PT	гліфосат кислота, 800 г/кг, в перерахунку на гліфосат амонійну сіль - 888 г/кг	0,01	осіння після збирання врожаю, весняна передпосівна обробка сільськогосподарських угідь, обробка ґрунту під пар	не погр.	1,0	0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	не погр.	7	3	3 (високо стійкий у воді)
109	Сетар 375 SC, KC			Контроль за дифеноконазол та паклобутриазолом									
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соняшник (насілля)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3	50	не погр.	3	3 (високо стійкий у воді та ґрунті)
		паклобутриазол, 125 г/л	0,002		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)	0,5	0,002	0,004/ сан.-токс.	0,2				
		дифеноконазол, 250 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	0,2	0,001	0,001/ сан.-токс.	0,3	-	-	-	

		паклобутр азол, 125 г/л	0,002		не погр.	/0,5	/0,002	0,004/ сан- токс.	/0,2					
1 1 0	Сигнал WG, ВГ	боскалід, 500 г/кг	0,04	соє (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді та пруні)	
				соє (олія)	не погр.					-	-	-		
				соняш ник (насінн я)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не погр.	3		
				соняш ник (олія)	не погр.					-	-	-		
				ріпак (насінн я)	0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)					30	не погр.	3		
				ріпак (олія)	не погр.					-	-	-		
1 1 1	Сігур, ВГ	Контроль за мезотріоном та нікосульфуроном												
		мезотріон, 515 г/кг +	0,001	кукуру дза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан- токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпе чний при попапл янні на слизові оболонк и очей, високос тійкий у воді)	
		нікосульф урон, 200 г/кг +	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2					
		римсульф урон, 250 г/кг	0,02		0,05* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03					
		мезотріон, 515 г/кг +	0,001	кукуру дза (олія)	не погр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан- токс.	/0,4					
		нікосульф урон, 200 г/кг +	2,0		не погр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2					
		римсульф урон, 250 г/кг	0,02		не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ заг.-сан.	/0,03					
1 1 2	Сокіл, КЕ	хізалофоп -п-етил, 125 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	3 (небезпе чний при попапл янні на слизові оболонк и очей)	
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-		
				соняш ник (насінн я)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3		
				соняш ник (олія)	не погр.*					-	-	-		

				ріпак (насінн я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не попр.	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
1 1 3	Старес, КЕ	пропізохл ор, 720 г/л	0,01	соняш ник (насінн я)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соняш ник (олія)	не попр.*					-	-	-	
				кукуру дза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)					не попр.	не попр.	3	
				кукуру дза (олія)	не попр.*					-	-	-	
				ріпак (насінн я)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)					не попр.	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
				буряки цукров і	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,1)					не попр.	7	3	
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)					не попр.	не попр.	3	
				соя (олія)	не попр.*					-	-	-	
1 1 4	Старпро 430, КС/Баунті 430, КС	тебукоказ ол, 500 г/л	0,03	ріпак (насінн я)	0,07 (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг-сан.	/1,0	50	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				ріпак (олія)	0,1 (межа визн. ГРХ- 0,1)					-	-	-	
1 1 5	Співен, КЕ	пропізохл ор, 720 г/л	0,01	соняш ник (насінн я)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
				соняш ник (олія)	не попр.*					-	-	-	
1 1 6	Стопп 330, КЕ	пендимет алін, 330 г/л	0,008	зерно хлібни х злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	0,5/	/0,002	0,05/ орг.	/0,2	не попр.	не попр.	3	2 (високо стійкий у групі)
1 1 7	СТОПЖук OFF, КС			<i>Контроль за квітіння і діююю т. в. м. б. д. - ц. х. л. о. п. р. и. о. м.</i>									
		кюліпанідн н,	0,08	картоп ля ²	0,05* (межа	/1,5	/0,02	0,004/ заг-сан.	0,03/ трансл.	30	10	4	2 (високо

		150 г/л +			визн. ВЕРХ-0,025)				фітотокс.				стійкий у воді та ґрунті)
		лямбда-цигалюрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	0,001	0,01/сан.-токс.	0,05				
118	Талстар 10 %, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,01	0,001	0,005/заг.-сан.	0,1	30	не погр.	4	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
				соє (олія)	не погр.*					-	-	-	
119	Темис, КС	тебуконазол, 500 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,07)	0,4	0,02	0,025/заг.-сан.	1,0	30	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
				ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					-	-	-	
120	Тесон 622, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексильовим ефіром		Контроль за 2,4-Д					
		2,4-Д2-етилгексильовий ефір, 615 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	0,5	0,0005	0,002/сан.-токс.	0,1/трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
		флорасулам, 7,4 г/л	0,05		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0	0,003	0,1/сан.-токс.	0,05/фітотокс.				
		2,4-Д2-етилгексильовий ефір, 615 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не погр.*	0,5	0,0005	0,002/сан.-токс.	0,1/трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 7,4 г/л	0,05		не погр.*	1,0	0,003	0,1/сан.-токс.	0,05/фітотокс.				
121	Тедфут Голд, ТН			Контроль за тіаметоксамом та тедфутурином									
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5 аерозоль	0,03	0,04/сан.-токс.	0,1	не погр.	не погр.	не погр.	3
		тедфутурин, 80 г/л	0,005		0,2* (межа визн.)	0,1	0,007	0,001/заг.-сан.	0,1				

					ГРХ-02)								
		тіаметоксамет, 200 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не погр.*	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		тефлуприн, 80 г/л	0,005		не погр.*	/0,1	/0,007	0,001/заг.-сан.	/0,1				
1 2 2	Тефут Про, СК	тефлуприн, 200 г/л	0,005	буряки цукрові	0,06* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1	/0,007	0,001/заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	2
				кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)					не погр.	не погр.	не погр.	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	не погр.	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 2 3	Тефут, ГР	тефлуприн, 15 г/кг	0,005	буряки цукрові	0,06* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1	/0,007	0,001/заг.-сан.	/0,1	не погр.	7	3	3
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	3	
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 2 4	Тіаприд SC, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,3	/0,002	0,005/заг.-сан.	0,09/водн.-мікр., фітотокс.	30	не погр.	3	2 (високо стійкий у воді)
				соняшник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05* (межа визн.)					30	не погр.	3	

					ВЕРХ-0,05)								
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				гірчичя (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)					30	не погр.	3	
1 2 5	Тіаприн, ТН			Контроль за тіаметоксамом									
		тіаметокса м, 500 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	3
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,001/заг.-сан.	/0,04				
		тіаметокса м, 500 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не погр.	/0,5	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		не погр.	/0,01	/0,001	0,001/заг.-сан.	/0,04				
		тіаметокса м, 500 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,001	0,001/заг.-сан.	/0,04				
1 2 6	Тірада, КС			Контроль за тирадамом									
		тірада, 400 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,45* (межа визн. ВЕРХ-0,45)	0,5/	0,05 - максимальна разова; 0,02 - середньодобова/	0,01/сан.-токс.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	3 (високостійкий у воді)
		дифеноксиназол, 30 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,001	0,001/сан.-токс.	/0,3				
		тірада, 400 г/л +	0,005	соняшник (олія)	не погр.*	0,5/	0,05 - максимальна разова; 0,02 - середньодобова/	0,01/сан.-токс.	/0,2	-	-	-	
		дифеноксиназол, 30 г/л	0,002		0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,001	0,001/сан.-токс.	/0,3				
		тірада, 400 г/л +	0,005		0,05* (межа визн.)	0,5/	0,05 - максимальна	0,01/сан.-токс.	/0,2	не погр.	не погр.	не погр.	

1 2 7	Трансформ ВГ			кукуру да (зерно)	ВЕРХ- 0,05)		разова; 0,02 - середнь о- добова/						
		дифенок назол, 30 г/л	0,002		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		тирам, 400 г/л +	0,005	кукуру да (оля)	не попр.*	0,5/	0,05 - максима льна разова; 0,02 - середнь о- добова/	0,01/ сан- токс.	/0,2	-	-	-	
		дифенок назол, 30 г/л	0,002		не попр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		тирам, 400 г/л +	0,005	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,5/	0,05 - максима льна разова; 0,02 - середнь о- добова/	0,01/ сан- токс.	/0,2	не попр.	не попр.	не попр.	
		дифенок назол, 30 г/л	0,002		0,05 (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		тирам, 400 г/л +	0,005	соя (оля)	не попр.*	0,5/	0,05 - максима льна разова; 0,02 - середнь о- добова/	0,01/ сан- токс.	/0,2	-	-	-	
		дифенок назол, 30 г/л	0,002		не попр.*	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		тирам, 400 г/л +	0,005	горох, нут (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	0,5/	0,05 - максима льна разова; 0,02 - середнь о- добова/	0,01/ сан- токс.	/0,2	не попр.	не попр.	не попр.	
		дифенок назол, 30 г/л	0,002		0,15 (межа визн. ГРХ- 0,1)	/0,2	/0,001	0,001/ сан- токс.	/0,3				
		сульфокс афлор, 500 г/кг	0,002	яблука	0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,5	/0,0006	0,004 сан- токс.	/0,14	14	7	3	2 (небезпе чний при погратл янні на слизові оболонк и очей, високос
				яблучн ий сік	0,01 (межа визн. ВЕРХ- 0,01)					-	-	-	

				капуст а	0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					15	7	3	тійкий у воді)
1 2 8	Трансформ, ВГ	сульфокса флор, 500 г/кг	0,002	зерно хлібни х злаків	0,2** (межа визн. ВЕРХ- 0,02)	/0,5 (межа визн. ВЕРХ- 0,25)	/0,0006 (межа визн. ВЕРХ- 0,0005)	0,004/ (межа визн. ВЕРХ- 0,002); сан- токс.	/0,14 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	28	не попр.	3	2 (небезпе чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей, високос тійкий у воді)
				ріпак (насінн я)	0,15** (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					27	не попр.	3	
				ріпак (олія)	не попр.*					-	-	-	
				буряки цукров і	0,02 (межа визн. ВЕРХ- 0,02)					13	7	3	
1 2 9	ТрінітіWG, ВГ	трифлорс истро-бін, 500г/кг	0,02	соняш ник (насінн я)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	50	не попр.	3	3
				соняш ник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)					-	-	-	
1 3 0	Унісулам, КС	флорасула м, 100г/л	0,05	зерно хлібни х злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан- токс.	0,05/ філоток с.	не попр.	не попр.	3	3 (високо стійкий у воді)
1 3 1	Фар,ТН			Контроль за тирамом				Контроль за тирамом та металаксілом-М					
		тирам, 400г/л +	0,005	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,5/	0,05- максима льна разова; 0,02- середнь о- добова/	0,01/ сан- токс.	/0,2	не попр.	не попр.	не попр.	3 (небезпе чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей, високос тійкий у воді та пруні)
		металаксі л-М, 116 г/л +	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				
		тіабендазо л, 20г/л	0,1		0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,08	0,05/ сан- токс.	/1,0				
		тирам, 400г/л +	0,005	соє (олія)	не попр.*	0,5/	0,05- максима льна разова; 0,02- середнь о- добова/	0,01/ сан- токс.	/0,2	-	-	-	
		металаксі л-М, 116	0,03		не попр.*	0,5/	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,05				

		г/л +											
		табендазо л, 20 г/л	0,1		не попр.*	/1,0	/0,08	0,05/ сан- токс.	/1,0				
1 3 2	ФАС,КС	альфа- ципермет рин, 100 г/л	0,005	капуст а ²	0,04* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпе чний при потрапл янні на шкіру	/0,003	0,002/ заг-сан.	/0,03	30	10	4	2 (високо стійкий уводі)
1 3 3	ФАС,КС	альфа- ципермет рин, 100 г/л	0,005	зерно хлібни х злаків	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/0,1 небезпе чний при потрапл янні на шкіру	/0,003	0,002/ заг-сан.	/0,03	30	не потр.	4	2 (небезпе чний при потрапл янні на шкіру та слизові оболонк и очей, високо стійкий у воді)
1 3 4	Флоу.Лайф, КС	флутриафо л, 250 г/л	0,01	буряки цукров і	0,1 (межа визн. ГРХ- 0,04)	/0,1 небезпе чний при потрапл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.	30	7	3	3 (високо стійкий уводі та грунті)
1 3 5	Флузіон WG, ВГ	флутіокса зин, 510 г/кг	0,002	соє (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,0	/0,001	0,004/ сан- токс.	/0,4	14 (десик ант)	не потр.	3	2
			соє (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	-					-	-		
			соняш ник ² (насінн я)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	14 (десик ант)					не потр.	3		
			соняш ник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	-					-	-		
			ріпак ² (насінн я)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	10 (десик ант)					не потр.	3		
			ріпак (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	-					-	-		
1 3 6	Фокс 325 SC, КС			Контроль за трифлюксистробіном, протіококсизолом-дестіо (1) та протіококсизолом (2)									
		трифлюкс и- стробін	0,02	кукуру дза (зерно)	0,05* (межа визн.)	/0,8	/0,01	0,03/ заг-сан.	/0,1	30	не потр.	3	2 (небезпе чний)

		150 г/л +			ГРХ-0,05								при потрапленні на слизові оболонки очей, алерген, високотійкий у воді)
		пропокон азол, 175 г/л	0,001		0,1 (1) (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001 (2)/ заг.-сан.	/0,2 (1)				
		трифлорекс-стробіл, 150 г/л +	0,02	кукурудза (олія)	не погр.	/0,8	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-	
		пропокон азол, 175 г/л	0,001		не погр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001 (2)/ заг.-сан.	/0,2 (1)				
137	Фоліо, КЕ			Контроль за пропівохлором та флурохлоридом									
		пропівохлор, 580 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не погр.	не погр.	3	2 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високотійкий у воді)
		флурохлоридон, 200 г/л	0,009		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,09	0,04/ сан.-токс.	/0,03				
		пропівохлор, 580 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не погр.*	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		флурохлоридон, 200 г/л	0,009		не погр.*	/1,0	/0,09	0,04/ сан.-токс.	/0,03				
138	Форзат БТ, КС			Контроль за флурметсулімом та флорасулімом									
		флурметсулам, 100 г/л +	0,2	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,02	0,02/ заг.-сан.	0,05/ фітотокс., водно-мігр., трансл.	не погр.	не погр.	3	3 (високотійкий у воді та ґрунті)
		флорасулам, 75 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003	0,1/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс. с.				
139	Форит, КЕ			Контроль за флуроксипіром		Контроль за флуроксипіриметиліом		Контроль за флуроксипіром					
		флуроксипіриметил, 333 г/л	0,2	сorgho (зерно)	0,05 (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,003	0,01/ заг.-сан.	/0,2	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей, високотійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
140	Форс 15G, ГР	тефлутрин, 15 г/кг	0,005	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,007	0,001/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	2
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	

1 4 1	Форс200CS, СК	тефлутри н, 200г/л	0,005	соняш ник (насінн я)	0,05* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,1	/0,007	0,001/ заг.-сан.	/0,1	не погр.	не погр.	не погр.	2
				кукуру дза (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 4 2	Фортеза 600FS, TH	ціантрані лїпрол600 г/л	0,002	соняш ник (насінн я)	0,05 (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/1,5	/0,003	0,004/ сан- токс.	/0,3	не погр.	не погр.	не погр.	3 (небезпе чний при попада нні на слизові оболонк и очей)
				соняш ник (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 4 3	Фосінор, РК			Контроль за глюфосинатом амонію (сума глюфосинату; його солей, метаболітів, виражені як глюфосинат)		Контроль за глюфосинатом амонію		Контроль за глюфосинатом амонію (сума глюфосинату; його солей, метаболітів, виражені як глюфосинат)					2 (небезпе чний при попада нні на слизові оболонк и очей)
		глюфосин атамонію, 200г/л	0,02	зерно хлібни х злаків	0,1** (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,02	/0,002	0,02/ заг.-сан.	/0,1	10 (десик ант)	не погр. (деси кант)	3 (десика нт)	
				кукуру дза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)					не погр. (гербіц ид)	не погр. (гербі цид)	3 (гербіц ид)	
				кукуру дза (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	1,0* (межа визн. ГРХ- 0,02)					не погр. (гербіц ид) 10 (десик ант)	не погр. (гербі цид, десик ант)	3 (гербіц ид, десика нт)	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соняш ник ¹ (насінн я)	1,0* (межа визн. ГРХ- 0,02)					не погр. (гербіц ид) 10 (десик ант)	не погр. (гербі цид, десик ант)	3 (гербіц ид, десика нт)	
				соняш ник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насінн я)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)					не погр. (гербіц ид) 10 (десик ант)	не погр. (гербі цид, десик ант)	3 (гербіц ид, десика нт)	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 4 4	Фосфал, ТБ			Контроль за фосфіном									
		фосфід алюмінію, 560г/кг		зерно хлібни х злаків	0,1* (межа визн. інд.)	0,1/ 1	0,01- максима льна разова	0,005/ сан- токс.	/0,4	20 ≤МДР	7<ГД К	7<ГДК	1

				запаси в трюма х	туб. Дрегера -0,007)		0,001 - середнь о добова/						
1 4 5	Фултайм, МД			Контроль за мезотріоном, нікосульфуроном та піклорамам									
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукуру да (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/0,2	/0,006	0,02/ сан- токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	3 (небезпе чний при пограпл янні на слизові оболонк и очей, високос тійкий у воді та грунті)
		нікосульф урон, 37,5 г/л +	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ- 0,01)	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
		піклорам, 17,5 г/л	0,02		0,2 (межа визн. ВЕРХ- 0,2)	5,0/	/0,02	0,04/ сан- токс.	0,05/ трансл.				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукуру да (олія)	не потр.*	/0,2	/0,006	0,02/ сан- токс.	/0,4	-	-	-	
		нікосульф урон, 37,5 г/л +	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
піклорам, 17,5 г/л	0,02	не потр.*	5,0/		/0,02	0,04/ сан- токс.	0,05/ трансл.						
1 4 6	Фунгімакс СЕ			Контроль за тіофанат- метилом (сумою тіофанат- метилу та карбендасимом), пропіконазолом та тріадимефоном		Контроль за тіофанат- метилом та пропіконазолом		Контроль за тіофанат- метилом, карбендасимом, пропіконазолом та тріадимефоном					3 (високо стійкий у воді)
		тіофанат- метил, 200 г/л +	0,08	зерно хлібни х злаків	1,0* (межа визн. ТІПХ- 0,05)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	30	не потр.	3	
		пропікона зол, 120 г/л +	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	0,5/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
		тріадиме фон, 50 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
		карбендас им (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
1 4 7	Фунгісид, КЕ			Контроль за піраклостробіном та пропіконазолом									3 (високо стійкий у воді та грунті)
		піраклост робін, 150 г/л +	0,03	зерно хлібни х злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6	30	не потр.	3	
пропікона зол, 120	0,04	0,1* (межа визн.)	0,5/		/0,001	0,15/ орг.	/0,2						

		г/л +			ГРХ- 0,05								
1 4 8	Харвест Смарт, ПП	1-метил- циклопро- пен, 33 г/кг	0,0009	яблука	0,01* (межа визн. ГРХ- 0,01)	/50	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	не погр.	4
				яблучн ий сік	не погр.*					-	-	-	
1 4 9	Церон 480 SL, РК	етерон, 480 г/л	0,006	соє (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ- 0,05)	/1,0	/0,02	0,01/	/0,5	не погр.	не погр.	3	3 (небезпеч- ний при попаданні на слизові оболонки ночей)
				соє (оля)	не погр.					-	-	-	
1 5 0	Цукрон+, РК	клопіралід , 300 г/л	0,15	кукуру- дза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,1)	2,0/	/0,01	0,04/ сан- токс.	/0,1	не погр.	не погр.	3	3 (високо- стійкий у воді)
				кукуру- дза (оля)	не погр.*					-	-	-	
1 5 1	ЮНИ-ГАС 150, КЕ	хізалофоп- т-етил, 150 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ- 0,05)	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.-сан.	/0,8	не погр.	не погр.	3	2
				соє (оля)	не погр.*					-	-	-	
				соняш- ник (насіни- я)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				соняш- ник (оля)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіни- я)	0,2* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр.	не погр.	3	
				ріпак (оля)	не погр.*					-	-	-	
1 5 2	ЮНИ-КВАТ 200, РК	дикват, 200 г/л	0,002	ріпак (насіни- я)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)	0,05/ небезпеч- ний при попаданні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	не погр.	3	2
				ріпак (оля)	не погр.*					-	-	-	
1 5 3	ЮНИ-ГЛІ 360, РК	гілфосагу ізопропіл- амінна сіль, 480 г/л, в кислотну му еквівалент і- 360 г/л	0,01	соє (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)	1,0/	/0,01	0,02/ сан- токс.	0,5/ трансл.	не погр. (гербі- цид)	не погр. (гербі- цид)	3 (гербі- цид, десика- нт)	3
				соє (оля)	не погр.					-	-	-	
				кукуру- дза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ- 0,1)					не погр. (гербі- цид) 14	не погр. (гербі- цид)	3 (гербі- цид, десика- нт)	

										(десикант)	десикант)		
				кукурудза (олія)	не погр.					-	-	-	
154	ЮНІ-ДАЗОН 480, РК	бенпазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,05	0,01/сан.-токс.	/0,4	не погр.	не погр.	3	3 (небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей)
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
				горох (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)					не погр.	не погр.	3	
				кукурудза (олія)	не погр.*					-	-	-	
155	ЮНІ-КС35 %КЕ	Контроль за ацетаміпримом та лямбда-цигалотрином											
		ацетаміпр ид, 20 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	4	3 (високо стійкий у воді)
		лямбда-цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпр ид, 20 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не погр.	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 15 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпр ид, 100 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1	30	не погр.	4	
		лямбда-цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05				
		ацетаміпр ид, 100 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	не погр.*	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин	0,003		0,4* (межа визн.)	/0,1 небезпечний	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05				

		н, 30 г/л			ГРХ- 02)	при пограпл янні на шкіру							
		ацетамір ид, 100 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ- 0,05)	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1	30	не погр.	4	
		лямбда- цигалотри н, 30 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,01/ сан- токс.	/0,05				
		ацетамір ид, 100 г/кг +	0,01	соя (олія)	не погр.*	/0,2	/0,003	0,02/ сан- токс.	/0,1	-	-	-	
		лямбда- цигалотри н, 30 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ- 0,02)	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,01/ сан- токс.	/0,05				
1 5 6	Юні-Таб 430, КС	тебуконаз ол, 430 г/л	0,03	соняш ник (насіни я)	0,07* (межа визн. ГРХ- 0,07)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	30	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі та групи)
				соняш ник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,15** (межа визн. ГРХ- 0,01)					30	не погр.	3	
				соя (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 5 7	Юні-ФЛУ 250, КС	флутриафо л, 250 г/л	0,01	соняш ник (насіни я)	0,4* (межа визн. ГРХ- 0,2)	/0,1 небезпе чний при пограпл янні на шкіру	/0,001	0,006/ сан- токс.	0,1/ трансл.	30	не погр.	3	2 (високо стійкий уводі та групи)
				соняш ник (олія)	не погр.*					-	-	-	
				ріпак (насіни я)	0,2* (межа визн. ГРХ- 0,2)					50	не погр.	3	
				ріпак (олія)	не погр.*					-	-	-	
				кукуру дза (зерно)	0,01 (межа визн. ГРХ- 0,01)					40	не погр.	3	
				кукуру дза (олія)	не погр.*					-	-	-	
1 5 8	Ютака, СЕ			Контроль за тіофанат- метилом (сумою)		Контроль за тіофанат-		Контроль за тіофанат- метилом,					2 (високо стійкий)

				тіофанат-метилу та карбендзімим; вириненою як карбендзімим) та тебуконізолом	метилом та тебуконізолом		карбендзімимом та тебуконізолом					уводі та пруні)
	тіофанат-метил, 350 г/л +	0,08	яблука	0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,08)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	70	7	3	
	тебуконіз ол, 100 г/л +	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
	цифлуфен амід, 6,3 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,006	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
	карбендзім (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1* (межа визн. ТПХ-0,1)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				
	тіофанат-метил, 350 г/л +	0,08	яблучний сік	0,03* (межа визн. ТПХ, ВЕРХ-0,03)	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4	-	-	-	
	тебуконіз ол, 100 г/л +	0,03		0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0				
	цифлуфен амід, 6,3 г/л	0,01		не потр.	/1,0	/0,006		/0,1				
	карбендзім (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,03* (межа визн. ТПХ-0,03)	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

¹ Препарат рекомендовано для застосування авіаційним методом.

² Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.

* Державні санітарні правила та норми "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті" (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001 року № 137.

** EU Pesticides database.

**В.о. генерального директора
Директорату громадського здоров'я
І. Ганжа**

{Гігієнічні нормативи і регламенти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1276 від 28.05.2020}