

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2021 № 2235

**Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2021 р.
за № 1407/37029**

Про затвердження Змін до Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження»

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», абзацу сьомого підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Зміни до Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 грудня 2019 року № 2646, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 січня 2020 року за № 42/34325, що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 01 травня 2022 року.

Міністр

В. Ляшко

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | В. Магалецька |
| Голова Державної регуляторної служби України | О. Кучер |
| Президент Національної академії медичних наук України | В. Цимбалюк |
| Керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | Н. Федорович |
| Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України | О. Любченко |

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 13 жовтня 2021 року № 2235 |
| | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2021 р. за № 1407/37029 |

ЗМІНИ

до Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження»

Доповнити новою таблицею 4 такого змісту:

"Таблиця 4

**Максимально допустимі рівні залишків
кокцидіостатиків та гістомоностатиків
(що застосовувались тваринам для боротьби з кокцидіозом)
у харчових продуктах тваринного походження**

| № з/п | Діюча речовина | Залишковий індикатор | Види тварин | Максимально допустимі рівні залишків | Цільові тканини | Застереження |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Decoquinat Декоквінат | Декоквінат | Кури-бройлер и на відгодівлі | 1 000 мкг/кг | Печінка | Відсутні |
| | | | | 1 000 мкг/кг | Шкіра і жир у природних співвідношеннях | |
| | | | | 800 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 500 мкг/кг | М'язи | |
| 2 | Maduramycin ammonium Мадураміцин | Мадураміцин амонію | Кури-бройлер и на відгодівлі | 150 мкг/кг | Печінка | Не застосовувати принаймні за три дні до забою |
| | | | | 150 мкг/кг | Шкіра і жир у природних співвідношеннях | |
| | | | | 100 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 30 мкг/кг | М'язи | |
| 3 | Monensin (as monensin sodium) Монензин (як монензин натрію) | Монензин натрію | Молодняк курей-несучок (до 16 тижня), кури-бройлер и на відгодівлі, індикати (до 16 тижня) | 25 мкг/кг | Шкіра і жир | Не застосовувати принаймні за один день до забою. Небезпечно для коней. Уникати одночасного прийому з тіамуліном |
| | | | | 8 мкг/кг | Печінка | |
| | | | | 8 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 8 мкг/кг | М'язи | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Narasin Наразин | Наразин | Кури- бройлер и на відгодівл і | 50 мкг/кг | Печінка, нирки, м'язи, шкіра і жир | Небезпечно для коней, індиків та кролів. Не застосовуват и принаймні за один день до забою. |
| 5 | Nicarbazin Нікарбазин | Динітро- карбанілід (DNC) | Кури- бройлер и на відгодівл і | 15 000 мкг/кг | Печінка | Небезпечно для коней, індиків та кролів. |
| | | | | 6 000 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 4 000 мкг/кг | М'язи | |
| | | | | 4 000 мкг/кг | Шкіра і жир | |
| 6 | Robenidine hydrochlorid e Робенідин | Робенідину гідрохлори д | Кролі | 100 мкг/кг | Шкіра і жир | Відсутні |
| | | | | 200 мкг/кг | Печінка | |
| | | | | 200 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 100 мкг/кг | М'язи | |
| | | | Кури- бройлер и на відгодівл і | 800 мкг/кг | Печінка | Не застосовуват и принаймні за п'ять днів до забою |
| | | | | 350 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 200 мкг/кг | М'язи | |
| | | | | 1 300 мкг/кг | Шкіра і жир | |
| | | | Індики | 400 мкг/кг | Печінка | Не застосовуват и принаймні за п'ять днів до забою |
| | | | | 200 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 200 мкг/кг | М'язи | |
| | | | | 400 мкг/кг | Шкіра і жир | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Salinomycin sodium Саліноміцин | Саліноміцин натрію | Кури-бройлер и на відгодівлі, молодня к курей-несучок (до 12 тижня) | 150 мкг/кг | Печінка | Небезпечно для коней та індиків. Уникати одночасного прийому з тіамуліном |
| | | | | 40 мкг/кг | Нирки | |
| | | | | 15 мкг/кг | М'язи | |
| | | | | 150 мкг/кг | Шкіра і жир | |
| 8 | Semduramicin sodium Семдураміцин | - | Кури-бройлер и на відгодівлі | - | - | Не застосовувати за п'ять днів до забою |

"

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Генеральний директор Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності | І. Руденко |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|